Catálogo *de las* Plantas Vasculares *del* Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

VOLUMEN 2

Dicotyledoneae: Acanthaceae–Fabaceae (Abarema–Schizolobium)

Fernando O. Zuloaga, Osvaldo Morrone y Manuel J. Belgrano, editores


BOLIVIA
REGIÓN CENTRAL-OESTE
BRASIL
(Central-Western Brazil)
PARAGUAY
SUR DE
BRASIL
(Southern
Brazil)
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
20°
30°
40°
50°
80°
70°
60°
50°
40°
Área del Proyecto: Países
Project Area: Countries
0 1000 2000km
N
O
E
S

Andes Húmedos Nor-Centrales
(North-Central Wet Andes)
20°
Cerrado
Cerrado
Desierto
Chileno-
Peruano
(Chilean-
Peruvian
Desert)
Andes Secos
Sur-Centrales
(South-
Central
Dry Andes)
Chaco
Bosque Atlántico
(Atlantic Forest)
30°
Pampas
Chile
Mediterráneo
(Mediterranean
Chile)
Regiones Biogeográficas
Biogeographic Regions
Monte
40°
Pacífico
Templado
Húmedo
(Wet
Temperate
Pacific)
Patagonia
0 1000 2000
50°
N
O
E
S
80°
70°
60°
50°
40°

Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Catálogo de las Plantas
Vasculares del Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay)

QK
.M
2C
V.1
C

Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur

(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Volumen 2

Dicotyledoneae: Acanthaceae–Fabaceae (*Abarema–Schizolobium*)

Fernando O. Zuloaga, Osvaldo Morrone y Manuel J. Belgrano, editores

Clodomiro Marticorena (Chile) y
Eduardo Marchesi (Uruguay), editores asociados

Missouri Botanical Garden

IBODA
CONICET
ANCEFN

Missouri Botanical
Garden Library

Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur
(Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)

Volumen 2

Catalogue of the Vascular Plants of the Southern Cone
(Argentina, Southern Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay)

Volume 2

ISBN 978-1-930723-70-2 (Entire Work)
ISBN 978-1-930723-75-7 (Volume 2)
Library of Congress Control Number 2008929777

Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden
Volume 107
ISSN 0161-1542

Published November 2008.

Cover photos:
Front: Argentina, Jujuy, Pampa de Aparzo [by Fernando O. Zuloaga]. Back, top left: *Begonia cucullata* Willd. var. *arenosicola* (C. DC.) L. B. Sm. & B. G. Schub. [by Manuel J. Belgrano]; back, top right: *Mimosa uliginosa* Chodat & Hassl. [by Manuel J. Belgrano]; back, bottom left: *Mutisia spinosa* Ruiz & Pav. [by Leigh Johnson]; back, bottom right: *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. [by Manuel J. Belgrano].

Scientific Editor and Head: Victoria C. Hollowell
Managing Editor: Beth Parada
Associate Editor: Allison Brock
Editorial Assistant: Tammy M. Charron
Press Coordinator: Cirri R. Moran

Technical Editors for series: Kay Yatskievych and Sandra Arango-Caro

Cover design by Gobberdiel Strategic Communications, St. Louis, Missouri

Copyright © 2008 by Missouri Botanical Garden Press
P.O. Box 299
St. Louis, Missouri 63166-0299, U.S.A.
www.mbgpress.org

All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Tabla de Contenido

FORMATO DEL CATÁLOGO xii
Ejemplos y Explicación del Formato xii
Información Adicional del Formato xiii
Otras Abreviaturas xv

ACRÓNIMOS PARA PAÍSES. *ACRONYMS FOR COUNTRIES.* xvi
AUTORES Y REVISORES. *AUTHORS AND REVIEWERS.* xvii

DICOTYLEDONEAE 985
Acanthaceae 985
Aceraceae 1006
Achariaceae 1007
Achatocarpaceae 1007
Adoxaceae 1008
Aextoxicaceae 1008
Aizoaceae 1008
Amaranthaceae 1011
Anacardiaceae 1043
Annonaceae 1052
Apiaceae 1056
Apocynaceae 1090
Aquifoliaceae 1143
Araliaceae 1146
Aristolochiaceae 1148
Asteraceae 1154
Avicenniaceae 1566
Balanophoraceae 1566
Balsaminaceae 1567
Basellaceae 1567
Begoniaceae 1568
Berberidaceae 1575
Berberidopsidaceae 1580
Betulaceae 1580
Bignoniaceae 1581
Bixaceae 1627
Bombacaceae 1627
Boraginaceae 1631
Brassicaceae 1663
Buddlejaceae 1709
Burseraceae 1714
Cabombaceae 1714
Cactaceae 1715
Calceolariaceae 1831
Callitrichaceae 1843
Calyceraceae 1844
Campanulaceae 1853

Table of Contents

FORMAT OF THE CATALOGUE xii
Exampled and Explanation of Format xii
Additional Information about Format xiii
Other Abbreviations xv

Canellaceae 1866
Cannabaceae 1866
Capparaceae 1866
Caprifoliaceae 1870
Cardiopteridaceae 1870
Caricaceae 1871
Caryocaraceae 1873
Caryophyllaceae 1873
Cecropiaceae 1901
Celastraceae 1902
Celtidaceae 1905
Ceratophyllaceae 1908
Chenopodiaceae 1909
Chloranthaceae 1930
Chrysobalanaceae 1930
Cistaceae 1931
Clethraceae 1931
Clusiaceae 1932
Cochlospermaceae 1933
Combretaceae 1933
Connaraceae 1936
Convolvulaceae 1936
Coriariaceae 1966
Crassulaceae 1966
Cucurbitaceae 1969
Cunoniaceae 1982
Desfontainiaceae 1983
Dilleniaceae 1984
Dipsacaceae 1985
Donatiaceae 1986
Droseraceae 1986
Ebenaceae 1987
Elaeagnaceae 1987
Elaeocarpaceae 1988
Elatinaceae 1989
Empetraceae 1990
Epacridaceae 1990
Eremolepidaceae 1990
Ericaceae 1991
Erythroxylaceae 2000
Escalloniaceae 2002
Eucryphiaceae 2009
Euphorbiaceae 2010
Fabaceae (*Abarema–Schizolobium*) 2078

Mapas

MAPAS

Argentina viii
Sur de Brasil ix
Uruguay x
Chile x
Paraguay xi

Maps

MAPS

Argentina viii
Southern Brazil ix
Uruguay x
Chile x
Paraguay xi

Mapa 1. República Argentina. Se indican los nombres de las provincias seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo. Map 1. Republic of Argentina. Names of provinces are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue.

Mapa 2. Estados del sur de la República Federativa de Brasil. Se indican los nombres de los estados seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. *Map 2. Southern states of the Federative Republic of Brazil. Names of states are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue.

Mapa 3. República Oriental del Uruguay. Se indican los nombres de los departamentos seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. *Map 3. Republic of Uruguay. Names of departments are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue.

Mapa 4. República de Chile. Se indican los nombres de las regiones seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. No están incluidos los archipiélagos Juan Fernández y Desventuradas ni la Isla de Pascua. *Map 4. Republic of Chile. Names of regions are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue. *Juan Fernández and Desventuradas archipelagos are not indicated.*

Mapa 5. República del Paraguay. Se indican los nombres de los departamentos seguidos de los acrónimos usados en el *Catálogo*. Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay son tratados como uno único (APY). *Map 5. Republic of Paraguay. Names of departments are indicated, followed by the acronyms used in the* Catalogue. *Boquerón and Alto Paraguay departments are combined (APY).*



VI. FORMATO DEL CATÁLOGO

El lenguaje utilizado en el *Catálogo* es el español. Se incluye una versión en inglés de las paginias introductorias. Como se mencionó anteriormente, la información utilizada para la realización del presente trabajo se ingresó a la base de datos relacional IRIS®. Esta base de datos incluye información sobre familias, géneros, especies y categorías infraespecíficas, indicando si los taxones son nombres aceptados o sinónimos. Los nombres aceptados incluyen referencias bibliográficas, datos de hábito, ciclo de vida, estatus, elevación, distribución geográfica por país y por cada división política mayor (dentro de cada país), y se cita un espécimen de herbario para cada país. Los sinónimos se hallan cruzados con su correspondiente nombre aceptado.

En el Apéndice I (Volumen 3, pp. 3315–3340) se presenta la lista de los géneros y familias citados en este *Catálogo*.

La información florística existente en la base de datos esta disponible en línea (www.darwin.edu.ar) y se mantendrá actualizada a medida que nuevos cambios taxonómicos o nuevos registros para el área de estudio sean publicados. En la versión impresa de este *Catálogo* se incluyen novedades hasta aproximadamente el mes de octubre de 2006.

VI. FORMAT OF THE CATALOGUE

The language used in the *Catalogue* is Spanish with an English version of the introductory pages. As was mentioned earlier, the information in the present work is incorporated into the relational database IRIS. This database includes information about families, genera, species, and infraspecific taxa, indicating if the taxa are accepted names or synonyms. Entries for accepted names include bibliographic references, habit information, life cycle, status, elevation, geographical distribution by country and for each major political division within each country, and an example of an herbarium specimen for each political division. Entries for synonyms are cross-referenced to the corresponding accepted name.

Appendix I (Volume 3, pp. 3315–3340) lists the genera and families cited in this *Catalogue*.

The floristic information in the database is available online (www.darwin.edu.ar) and will be updated as new taxonomic changes or new information for the study area are published. In the printed version of this *Catalogue* novelties are included until approximately October 2006.

Ejemplos del Formato. ***Examples of Format.***	**Explicación del Formato.** ***Explanation of Format.***
FABACEAE	FAMILIA. *FAMILY NAME.*
Coordinador: Fortunato, R. H.	Coordinador(es). *Coordinator(s).*
Autores: Beyhaut, R. (Uruguay), Costa Bortoluzzi, R. L. (Caesalpinioideae del Sur de Brasil), Fortunato, R. H. (*Andira* del Sur de Brasil), Gómez-Sosa, E. V. (*Astragalus*), Izaguirre, P. (Uruguay), Lima, H. C. (*Acosmium, Amburana, Andira, Centrolobium, Dalbergia, Holocalyx, Machaerium, Myrocarpus, Myroxylon, Ormosia, Platypodium, Pterocarpus, Riedeliella, Sweetia* y *Zollernia* del Sur de Brasil), Miotto, S. T. S. (Papilionoideae del Sur de Brasil), Moura Baptista, L. R. (Mimosoideae del Sur de Brasil) y Ulibarri, E. A. (*Adesmia, Caesalpinia, Hoffmannseggia, Pomaria* y *Cercidium*).	Autor(es). *Author(s).*
Revisores: Lewis, G. P. (*Anadenanthera* y *Diptychandra*), Pennington, T. D. (*Inga*), Rico, L. (*Acacia*, Ingeae excepto *Inga*), Schrire, B. D. (*Indigofera*) y Tozzi, A. M. G. A. (*Lonchocarpus* y *Machaerium*).	Revisor(es). *Reviewer(s).*
154 géneros, 1324 especies, 617 especies endémicas, 107 especies introducidas.	Número de géneros, especies, especies endémicas, especies introducidas. *Number of genera, species, endemic species, introduced species.*

Ejemplos del Formato (Continuación). ***Examples of Format (Continued).***	**Explicación del Formato (Continuación).** ***Explanation of Format (Continued).***
Acacia Mill.	Género con abreviatura(s) de autor(es). *Genus name with abbreviation(s) of author(s).*
Número de especies: 36, 7 endémicas, 6 introducidas	Número de especies, especies endémicas y especies introducidas. *Number of species, endemic species, and introduced species.*
Acacia martii Benth.	Taxón aceptado con sigla(s) de autor(es). *Accepted taxon name with abbreviation(s) of author(s).*
Sin.: *Acacia paniculata* Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl., *Manganaroa martii* (Benth.) Speg., *Manganaroa paniculata* (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg.	Sinónimos. *Synonyms.*
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904; Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.	Referencias bibliográficas. *Bibliographic references.*
Arbusto. Nativa. 0–500 m.	Habito (y ciclo de vida), estatus, elevación. *Habit (and life cycle when appropriate), status, elevation.*
Países: ARG(FOR); PRY(CON, PHA).	Distribución: lista de las abreviaturas usadas para los países y entre paréntesis "( )" las abreviaturas para los estados, departamentos, provincias o regiones. *Distribution: list of country abbreviations and after each a parenthesis "( )" with the abbreviations of the states, departments, provinces, or regions.*
Ejemplares de Referencia: ARG[*Muello s.n.* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 7443* (G)].	Especímenes de herbario, al menos uno por país. *Herbarium specimen, at least one per country.*
Acacia paniculata Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl. = **Acacia martii** Benth.	Sinónimo, se indica como referencia cruzada del taxón aceptado. *Synonym followed by cross-reference to accepted taxon name.*
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.	Referencias bibliográficas donde se indica la sinonimia. *Bibliographic references supporting the synonymy.*
[Acacia riparia Kunth f. intermedia Hassl.]	Nombres dudosos o mal interpretados y taxones excluidos entre corchetes "[ ]." *Doubtful, misinterpreted, or excluded taxon name listed within brackets "[ ]."*
Notas: Nombre dudoso.	Nota explicando por qué el nombre va en corchetes. *Note explaining why name is in brackets.*

Información Adicional del Formato

1. El nombre de la familia se presenta en mayúsculas y **negritas** y a continuación el nombre(s) del autor(es) y revision(es) del tratamiento. Se presenta el número de géneros, especies, especies endémicas y especies introducidas incluidas en el *Catálogo*. Todos los conteos se realizaron automáticamente, no siendo responsabilidad del autor.
2. El nombre del género incluyendo el autor se indica en **negritas**. Las siglas de los autores se indican según

Additional Information about Format

1. The name of the family is given in **bold** and all capital letters. This is followed by the name of the author(s) and reviewer(s) of the family in the *Catalogue*. The next line lists the number of genera, species, endemic species, and introduced species included in the *Catalogue*. All of the calculations of numbers were generated automatically, not by the author.
2. The name of the genus is given including its author in **bold.** The abbreviations of the authors follow

Brummitt & Powell (1992), *Authors of Plant Names*. A continuación se presenta el número de especies, especies endémicas y especies introducidas incluidas en el *Catálogo*.

3. Los nombres aceptados de las especies y taxones de rango infraespecífico se indican en **negritas**, debiendo haber sido confirmados por la bibliografía (punto 5) y/o por ejemplares de referencia (punto 11). Se incluyeron todos los nombres que fueron publicados sobre la base de material perteneciente al área (Argentina, sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) y los nombres utilizados en la literatura para la región.
4. Los sinónimos se indican en *bastardillas* debajo del nombre aceptado y se incluyen como referencias cruzadas. Se indica, en líneas generales, el basónimo y los sinónimos utilizados para el área (tanto en bibliografía como en la identificación de material de herbario).
5. Las referencias bibliográficas incluyen las contribuciones relevantes al taxón tratado, indicando autor(es) y fecha de publicación (en caso de que un autor haya publicado más de un trabajo en el mismo año, los mismos se distinguen con letras a continuación del año). La bibliografía citada en este punto se presenta en forma completa al final del *Catálogo* (Volumen 3, pp. 3315–3340). Los títulos de las revistas y series se abrevian de acuerdo a Lawrence et al. (1968), *B-P-H. Botanico-Periodico-Huntianum,* y a Bridson & Smith (1991), *B-P-H/S. Botanico-Periodico-Huntianum/Supplementum.* La mayoría de los títulos de los libros se citan completos, siguiendo las recomendaciones de Stafleu & Cowan (1976–1988) y Stafleu & Mennega (1992–1997) *Taxonomic Literature*.
6. Se indica el hábito de la planta: árbol, arbolito, arbusto, enredadera, epífita, hemiepífita, hierba (acuática, palustre, subleñosa, suculenta, etc.), liana, parásita, saprófita, subarbusto y combinaciones de los mismos (por ejemplo: subarbusto epífito, árbol o arbolito).
7. En el caso de las hierbas se indica el ciclo de vida de la planta, pudiendo tratarse de un ciclo anual, bianual, anual o bianual, anual o perenne, perenne.
8. Se indica el estatus nativo o introducido del taxón en relación a la distribución geográfica. El taxón puede ser endémico del área de estudio además de ser nativo.
9. La elevación se presenta en intervalos de 100 metros (por ejemplo, 200–800 m).
10. Se indica la distribución geográfica con acrónimos para los distintos países seguidos de acrónimos para las divisiones políticas por país (estados, provincias, departamentos o regiones). Ver la lista de acrónimos en página xc.
11. Se citan especímenes de herbario (al menos uno por cada país en que se encuentra el taxón). Para cada cita de material se indica apellido e iniciales del colector, número de colección (se aceptan letras si forman parte del número y se indica *s.n.* si el ejemplar carece de numeración) y herbarios donde están depositados. Los

Brummitt & Powell (1992), *Authors of Plant Names*. Following that is the number of species, endemic species, and introduced species included in the genus in this *Catalogue*.

3. Accepted names of the species and taxa of infraspecific rank are indicated in **bold**, and were confirmed by the bibliography (point 5) and/or by reference examples (point 11). It was attempted to include all of the names that have been published based on material from the area (Argentina, southern Brazil, Chile, Paraguay, and Uruguay) and the names used found in the regional literature.
4. Synonyms are indicated in *italics* below the accepted name and are included as cross references. The basionym is indicated, as well as the synonyms used in the bibliography and/or on herbarium material identifications for the area.
5. The bibliographic references include contributions relevant to the taxon treated, indicating author(s) and date of publication (in cases where an author has published more than one work in the same year, these are distinguished with letters following the year). The bibliographic citation is presented in complete form at the end of the *Catalogue* (Volume 3, pp. 3315–3340). The titles of the journals and series are abbreviated according to Lawrence et al. (1968), *B-P-H. Botanico-Periodicum-Huntianum*, and Bridson & Smith (1991), *B-P-H/S. Botanico-Periodicum-Huntianum/ Supplementum*. The majority of the book titles are cited following the recommendations of Stafleu & Cowan (1976–1988) and Stafleu & Mennega (1992–1997) *Taxonomic Literature*.
6. Indication of the habit of the plant: tree, small tree, shrub, vine, epiphyte, hemiepiphyte, herb (aquatic, marshy, semiwoody, succulent, etc.), liana, parasite, saprophyte, subshrub, and combinations of these (for example: epiphytic subshrub, tree, or small tree).
7. Indication of the life cycle, in the case of herbs: annual, biennial, annual or biennial, annual or perennial, perennial.
8. Indication of the native or introduced status of the taxon within the flora area; when endemic to the flora area, that word is used instead of native.
9. Elevation is presented in intervals of 100 meters (for example, 200–800 m).
10. Geographic distribution is indicated by a list of acronyms for countries, each followed by acronyms for the political subdivision (states, provinces, departments, or regions). Acronyms are given on page xvi.
11. Reference herbarium specimens are cited (at least one per country in which the taxon is encountered). Each citation of material indicates the surname and initials of the collector, collection number (letters are included if part of the number and *s.n.* is used when the example lacks numeration), and herbaria where deposited. The acronyms of the herbaria follow Holmgren et al. (1990), *Index Herbariorum, Part I:*

acrónimos de los herbarios se indican según Holmgren et al. (1990), *Index Herbariorum, Part I: The Herbaria of the World.* Se incluyó un asterisco "*" en aquellos casos en que del ejemplar de referencia citado no pudo ser localizado.

12. En Notas se incluye brevemente toda la información relevante que el autor considere necesaria para aclarar aspectos taxónómicos y nomenclaturales, aclaraciones acerca de la distribución del taxón, etc.
13. Nombres mal interpretados o dudosos, citas dudosas, presencia probable de taxones en el área o taxones incluidos erróneamente sobre la base de material mal identificado aparecen entre corchetes "[ ]". Esta información es seguida por una nota donde se explica brevemente la situación incluyendo referencias bibliográficas si es necesario.

Otras Abreviaturas

auct. non = nombre erróneamente aplicado.
com. pers. = comunicación personal.
comb. illeg. = publicado como combinación ilegítima.
comb. superfl. = publicado como combinación superflua.
emend. = indica una modificación en los caracteres diagnósticos de un taxón; abreviatura seguida por el nombre del autor responsable de dicha modificación.
et al. = y otros.
ex = hace referencia al autor que ha publicado inválidamente un nombre y el autor que publicó el mismo válidamente.
f. = forma.
nom. cons. = nombre conservado en el *Código Internacional de Nomenclatura Botánica.*
nom. illeg. = nombre ilegítimo.
nom. inval. = publicado como nombre inválido.
nom. nud. = nombre no acompañado por una descripción válida.
nom. superfl. = publicado como nombre superfluo.
p.p. = en parte.
pro syn. = publicado como sinónimo.
subsp. = subespecie.
var.= variedad.

The Herbaria of the World. An asterisk "*" was used when a cited specimen could not be located.

12. Notes include briefly all the relevant information that the author considers necessary to clarify taxonomic and nomenclatural aspects, distribution of the taxon, etc.
13. Entries for doubtful or misinterpreted names or those cited erroneously elsewhere based on misidentified specimens appear inside brackets "[ ]". A note follows that briefly explains the situation, accompanied by bibliographic references, if necessary.

Other Abbreviations

auct. non = name erroneously applied.
com. pers. = personal communication.
comb. illeg. = published as an illegitimate combination.
comb. superfl. = published as a superfluous combination.
emend. = indicates a modification of the diagnostic characters of the taxon; abbreviation followed by the name of the author responsible for the modification.
et al. = and others.
ex = indicates that the author listed after the "ex" is the author of the validly published name but who attributed that name to the author listed before the "ex."
f. = form.
nom. cons. = name conserved in the *International Code of Botanical Nomenclature.*
nom. illeg. = illegitimate name.
nom. inval. = published as invalid name.
nom. nud. = name not accompanied by a valid description.
nom. superfl. = published as a superfluous name.
p.p. = in part.
pro syn. = published as a synonym.
subsp. = subspecies.
var. = variety.

ACRÓNIMOS PARA PAÍSES. *ACRONYMS FOR COUNTRIES.*

Acrónimos utilizados en el *Catálogo* para designar a los países y provincias/estados/departamentos/regiones. *Acronyms used in the* Catalogue *to designate the countries and provinces/states/departments/regions.*

Argentina (ARG)
Buenos Aires (BAI)
Catamarca (CAT)
Chaco (CHA)
Chubut (CHU)
Córdoba (COR)
Corrientes (COS)
Distrito Federal (DFE)
Entre Ríos (ERI)
Formosa (FOR)
Jujuy (JUJ)
La Pampa (LPA)
La Rioja (LRI)
Mendoza (MEN)
Misiones (MIS)
Neuquén (NEU)
Río Negro (RNE)
Salta (SAL)
San Juan (SJU)
San Luis (SLU)
Santa Cruz (SCR)
Santa Fe (SFE)
Santiago del Estero (SDE)
Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur (TDF)
Tucumán (TUC)

Brasil (BRA)
Paraná (PAR)
Rio Grande do Sul (RGS)
Santa Catarina (SCA)

Chile (CHL)
Región I – Tarapacá (I)
Región II – Antofagasta (II)
Región III – Atacama (III)
Región IV – Coquimbo (IV)
Región V – Valparaíso (V)
Región VI – O'Higgins (VI)
Región VII – Maule (VII)
Región VIII – Bío (Bío VIII)
Región IX – Araucanía (IX)
Región X – Los Lagos (X)
Región XI – Aisén (XI)
Región XII – Magallanes (XII)
Islas Desventuradas (IDE)
Islas de Juan Fernández (IJF)
Región Metropolitana de Santiago (RME)

Paraguay (PRY)
Alto Paraguay (APY)
Alto Paraná (APA)
Amambay (AMA)
Boquerón (APY)
Caaguazú (CAU)
Caazapá (CAA)
Canindeyú (CAN)
Central (CEN)
Concepción (CON)
Cordillera (COA)
Guairá (GUA)
Itapúa (ITA)
Misiones (MIE)
Ñeembucú (ÑEE)
Paraguarí (PAI)
Presidente Hayes (PHA)
San Pedro (SPE)

Uruguay (URY)
Artigas (ART)
Canelones (CAS)
Cerro Largo (CLA)
Colonia (COL)
Durazno (DUR)
Flores (FLO)
Florida (FLA)
Lavalleja (LAV)
Maldonado (MAL)
Montevideo (MON)
Paysandú (PAY)
Río Negro (RNO)
Rivera (RIV)
Rocha (ROC)
Salto (SAO)
San José (SJO)
Soriano (SOR)
Tacuarembó (TAC)
Treinta y Tres (TYT)

Nota: Los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay fueron considerados como un único departamento (APY). Los mapas incluidos en la introducción (Mapas 1–5) indican el orden político de cada país y estos mismos acrónimos aquí presentados. *Note: Departments Boquerón and Alto Paraguay were considered as one (APY). The maps included in the introduction (Maps 1–5) show the political division in each country and the acronyms used here.*

AUTORES Y REVISORES. *AUTHORS AND REVIEWERS.*

Ackermann, M. (BSB, Alemania): Loasaceae.
Aedo, C. (MA, España): Geraniaceae (*Geranium*).
Albesiano, S. (Colombia): Cactaceae (*Wigginsia*).
Al-Shehbaz, I. A. (MO, Estados Unidos de América): Brassicaceae.
Almeda, F. (CAS, Estados Unidos de América): Symplocaceae.
Alves, M. V. (UFP, Brasil): Cyperaceae (*Hypolytrum, Lagenocarpus* y *Pleurostachys*).
Anderson, C. (MICH, Estados Unidos de América): Malpighiaceae (revisor).
Andreata, R. H. (RUSU, Brasil): Smilacaceae.
Aranha Filho, J. L. M. (UEC, Brasil): Symplocaceae.
Araújo, A. C. (ICN, Brasil): Cyperaceae del Sur de Brasil.
Arbo, M. M. (CTES, Argentina): Bignoniaceae, Lentibulariaceae, Turneraceae.
Argus, G. (CAN, Canadá): Salicaceae (*Salix*).
Arroyo-Leuenberger, S. (B, Alemania): Amaryllidaceae, Epacridaceae, Hyacinthaceae, Luzuriagaceae, Philesiaceae.
Atkins, S. (K, Inglaterra): Verbenaceae (*Stachytarpheta*).
Austin, D. F. (ARIZ, Estados Unidos de América): Convolvulaceae.
Aymard C., G. (PORT, Venezuela): Dilleniaceae.
Barboza, G. E. (CORD, Argentina): Gentianaceae, Solanaceae.
Bartoli, A. (BAA, Argentina): Asteraceae (Astereae).
Baeza, C. M. (CONC, Chile): Asteraceae (Lactuceae).
Bayón, N. D. (LP, Argentina): Asteraceae (Vernonieae).
Belgrano, M. J. (SI, Argentina): Cucurbitaceae (*Apodanthera*), Laxmanniaceae.
Berg, C. C. (BG, Noruega): Cecropiaceae, Celtidaceae, Moraceae.
Berry, P. E. (MICH, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae, Phyllanthaceae (revisor), Picrodendraceae (revisor).
Beyhaut, R. (MVFA, Uruguay): Fabaceae y Poaceae de Uruguay.
Boldrini, I. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Bonifacino, M. (MVFA, Uruguay): Asteraceae (Astereae).
Borsch, T. (Nees-Institute for Biodiversity of Plants, Alemania): Amaranthaceae.
Cabral, E. L. (CTES, Argentina): Rubiaceae.
Caruzo, M. B. R. (SP, Brasil): Euphorbiaceae.
Castillo, A. (Jardín Botánico de Ezeiza, Argentina): Iridaceae.
Castro Souza, J. P. (ESA, Brasil): Violaceae (revisor).
Castro Souza, V. (ESA, Brasil): Orobanchaceae (revisor), Plantaginaceae (revisor), Scrophulariaceae.
Cervi, A. (UPCB, Brasil): Passifloraceae del Sur de Brasil.
Chautems, A. (G, Suiza): Gesneriaceae.
Cialdella, A. M. (SI, Argentina): Poaceae, Polygonaceae.
Clausen, A. M. (BAL, Argentina): Solanaceae (*Solanum* sect. *Petota*).
Conn, B. (NSW, Australia): Urticaceae (revisor).
Cordeiro, I. (SP, Brasil): Euphorbiaceae.
Costa Bortoluzzi, R. L. (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): Fabaceae (Caesalpinioideae del Sur de Brasil).
Costa e Silva, M. B. (Universidade Federal Rural do Pernambuco, Brasil): Capparaceae.
Costea, M. (WLU, Canadá): Convolvulaceae (*Cuscuta*).
Cristóbal, C. L. (CTES, Argentina): Sterculiaceae.
Croat, T. B. (MO, Estados Unidos de América): Araceae.
Davenport, L. (Samford University, Estados Unidos de América): Hydroleaceae (revisor).
De Gennaro, D. (SI, Argentina): Poaceae.
Deginani, N. B. (SI, Argentina): Hydroleaceae, Passifloraceae.
Delucchi, G. (LP, Argentina): Asteraceae (Anthemideae, Arctoteae, Calenduleae, Cardueae).
Dematteis, M. (CTES, Argentina): Asteraceae (Vernonieae).
Denham, S. S. (SI, Argentina): Poaceae.
Dhooge, S. (GENT, Bélgica): Cyperaceae (*Amphiscirpus, Phylloscirpus* y *Zameioscirpus*).
Dillon, M. (F, Estados Unidos de América): Griseliniaceae, Nolanaceae.
Dressler, S. (FR, Alemania): Marcgraviaceae.
Dutilh, J. (UEC, Brasil): Amaryllidaceae.
Eriksson, R. (GB, Suecia): Basellaceae.
Esser, H. J. (M, Alemania): Euphorbiaceae.
Ezcurra, C. (BCRU, Argentina): Acanthaceae, Apocynaceae.
Faúndez, L. (Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, Chile): Cactaceae.
Fernández Casas, F. J. (MA, España): Euphorbiaceae.
Ferrucci, M. S. (CTES, Argentina): Sapindaceae, Tiliaceae.
Filippa, E. M. (CORD, Argentina): Gentianaceae.
Fontella Pereira, J. (R, Brasil): Apocynaceae.
Ford-Wentz, D. I. (WVA, Estados Unidos de América): Portulacaceae.
Fortunato, R. H. (BAB, Argentina): Fabaceae.

Fortune Hopkins, H. (K, Inglaterra): Cunoniaceae.
França, F. (HUEFS, Brasil): Verbenaceae (*Aegiphila*).
Frasier, C. (Rutgers University, Estados Unidos de América): Loganiaceae (revisor).
Freire, A. (PH, Estados Unidos de América): Crassulaceae, Polygalaceae.
Freire, S. E. (LP, Argentina): Asteraceae.
Freitas, M. F. (RB, Brasil): Myrsinaceae (revisor).
Fritsch, P. (CAS, Estados Unidos de América): Styracaceae, Symplocaceae.
Gattuso, S. (Universidad Nacional de Rosario, Argentina): Smilacaceae.
Giberti, G. (BAF, Argentina): Aquifoliaceae.
Giúdice, G. E. (LP, Argentina): Pteridaceae.
Giuliano, D. (LP, Argentina): Asteraceae (Astereae).
Giulietti, A. M. (HUEFS, Brasil): Eriocaulaceae.
Giussani, L. (SI, Argentina): Poaceae.
Goetghebeur, P. (GENT, Bélgica): Cyperaceae (revisor).
Goldblatt, P. (MO, Estados Unidos de América): Iridaceae (revisor).
Gómez-Sosa, E. V. (SI, Argentina): Fabaceae (*Astragalus*).
Gonçalves, E. (Laboratorio de Botânica, Universidade Católica de Brasília, Brasil): Araceae.
Gonzales, J. (Amazon Conservation Association, LPB, Bolivia): Gleicheniaceae.
González-Elizondo, M. S. (CIIDIR, México): Cyperaceae (*Eleocharis*).
Graham, S. A. (MO, Estados Unidos de América): Lythraceae.
Grau, J. (M, Alemania): Loasaceae.
Grela, I. (MVJB, Uruguay): Ericaceae, Lauraceae y Salicaceae de Uruguay (revisor).
Guaglianone, E. R. (SI, Argentina): Cyperaceae, Hyacinthaceae, Laxmanniaceae, Phytolaccaceae, Smilacaceae.
Guglieri, A. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Gutiérrez, D. (LP, Argentina): Asteraceae (Helenieae, Liabeae, Mutisieae).
Harley, R. (K, Inglaterra): Lamiaceae.
Hausner, G. (Werner-Hiperst Str. 67, Wiesbaden, Alemania): Siparunaceae.
Haynes, R. R. (UNA, Estados Unidos de América): Alismataceae, Hydrocharitaceae (revisor), Limnocharitaceae (revisor), Najadaceae (revisor), Pontederiaceae, Potamogetonaceae, Ruppiaceae, Zannichelliaceae (revisor).
Hefler, S. (ICN, Brasil): Cyperaceae (*Cyperus* del Sur de Brasil).
Hoch, P. (MO, Estados Unidos de América): Onagraceae.
Holm-Nielsen, L. B. (AAU, Dinamarca): Hydrocharitaceae (revisor).
Horn, C. N. (NBYC, Estados Unidos de América): Pontederiaceae.
Iharlegui, L. (LP, Argentina): Asteraceae (Inuleae).
Izaguirre, P. (MVFA, Uruguay): Fabaceae, Orchidaceae y Poaceae de Uruguay.
Johnson, L. (BRY, Estados Unidos de América): Polemoniaceae (revisor).
Jørgensen, P. M. (MO, Estados Unidos de América): Calyceraceae (revisor), Gunneraceae (revisor), Haloragaceae (revisor), Hydnoraceae (revisor), Passifloraceae (revisor), Santalaceae (revisor), Verbenaceae (revisor).
Kameyama, C. (SP, Brasil): Acanthaceae.
Katinas, L. (LP, Argentina): Asteraceae (Mutisieae).
Kiesling, R. (MERL, Argentina): Cactaceae.
Kinoshita, L. S. (UEC, Brasil): Apocynaceae.
Krapovickas, A. (CTES, Argentina): Malvaceae.
Kuijt, J. (UVIC, Canadá): Eremolepidaceae (revisor), Loranthaceae (revisor), Viscaceae (revisor).
Kutschker, A. M. (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina): Valerianaceae
Labiak, P. H. (UPCB, Brasil): Grammitidaceae, Polypodiaceae, Vittariaceae.
Lammers, T. G. (OSH, Estados Unidos de América): Campanulaceae.
Landolt, E. (ZT, Suiza): Lemnaceae.
Larocca, J. (Laboratório de Taxonomia Vegetal, UNISINOS, Brasil): Cactaceae.
Lehnebach, C. (Chile): Orchidaceae de Chile, Ranunculaceae (*Ranunculus* de Chile).
Lehnert, M. (A-V-H Institut, Abteilung Systematische Botanik, Göttingen, Alemania): Cyatheaceae, Dicksoniaceae.
Les, D. H. (CONN, Estados Unidos de América): Ceratophyllaceae.
Levin, G. A. (ILLS, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae.
Lewis, G. P. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Anadenanthera* y *Diptychandra*).
Lidén, M. (Suecia): Fumariaceae (revisor).
Lima, H. C. (RB, Brasil): Fabaceae (*Acosmium, Amburana, Andira, Centrolobium, Dalbergia, Holocalyx, Machaerium, Myrocarpus, Myroxylon, Ormosia, Platypodium, Pterocarpus, Riedeliella, Sweetia* y *Zollernia* del Sur de Brasil).
Lima, L. R. (SP, Brasil): Euphorbiaceae.
Linder, H. P. (Z, Suiza): Restionaceae.
Lohmann, L. (SPF, Brasil): Bignoniaceae.
Lombardi, J. A. (HRCB, Brasil): Hippocrateaceae, Vitaceae.

Longhi-Wagner, H. M. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Lopes, R. C. (RFA, Brasil): Herreriaceae.
López, M. G. (CTES, Argentina): Cyperaceae (*Bulbostylis* y *Fimbristylis*).
López Sepúlveda, P. (CONC, Chile): Cyperaceae (*Cyperus* de Chile).
Luer, C. A. (MO, Estados Unidos de América): Orchidaceae (revisor).
Luteyn, J. L. (NY, Estados Unidos de América): Ericaceae.
Maas, P. J. M. (U, Holanda): Burmanniaceae, Cannaceae, Triuridaceae (revisor), Zingiberaceae (revisor).
Macluf, C. (LP, Argentina): Isoëtaceae.
Marchesi, E. (MVFA, Uruguay): Cyperaceae de Uruguay.
Marticorena, A. (CONC, Chile): Chenopodiaceae, Malvaceae (revisor), Rosaceae.
Marticorena, C. (CONC, Chile): Cyperaceae de Chile.
Martínez, S. (BAFC, Argentina): Apiaceae.
Martins, Z. (Brasil): Bromeliaceae del Sur de Brasil.
Matesevach, M. (CORD, Argentina): Solanaceae.
Maza, I. (Facultad Agronomía Universidad de Buenos Aires, Argentina): Iridaceae.
Mentz, L. A. (ICN, Brasil): Solanaceae.
Metzing, D. (Institüt fur Biologie und Umweltwissenschaften, Alemania): Cactaceae.
Mereles, F. (FCQ, Paraguay): Cyperaceae de Paraguay (*Cyperus, Eleocharis* y *Fimbristylis*).
Miller, J. S. (NY, Estados Unidos de América): Boraginaceae (*Cordia* y *Varronia*).
Miotto, S. T. S. (ICN, Brasil): Fabaceae (Papilionoideae del Sur de Brasil).
Moraes R., M. (LPB, Bolivia): Arecaceae.
Moreira, B. (SP, Brasil): Bromeliaceae.
Morrone, O. (SI, Argentina): Poaceae.
Motley, T. (ODU, Estados Unidos de América): Loganiaceae (revisor).
Moura Baptista, L. R. (ICN, Brasil): Fabaceae (Mimosoideae del Sur de Brasil).
Múlgura, M. E. (SI, Argentina): Chenopodiaceae, Malpighiaceae, Oxalidaceae, Verbenaceae.
Muñoz, M. (SGO, Chile): Alstroemeriaceae (revisor).
Nadruz, M. (RJ, Brasil): Araceae.
Noblick, L. (FTG, Estados Unidos de América): Arecaceae (revisor).
Norman, E. M. (DLF, Estados Unidos de América): Buddlejaceae (revisor).
O'Leary, N. (SI, Argentina): Verbenaceae (*Verbena*).
Øllgaard, B. (AAU, Dinamarca): Lycopodiaceae (revisor), Marattiaceae (revisor).
Pastore, J. F. (UEFS, Brasil): Polygalaceae.
Pennington, T. D. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Inga*).
Peralta, I. E. (MERL, Argentina): Portulacaceae, Solanaceae (*Solanum* sect. *Petota*).
Peralta, P. (SI, Argentina): Verbenaceae (*Glandularia, Junellia* y *Tamonea*).
Picca, P. (BACF, Argentina): Nothofagaceae.
Ponce, M. M. (SI, Argentina): Aspleniaceae, Azollaceae, Blechnaceae, Cyatheaceae, Davalliaceae, Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae, Dryopteridaceae, Equisetaceae, Gleicheniaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, Isoëtaceae, Lomariopsidaceae, Marsileaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Parkeriaceae, Polypodiaceae, Psilotaceae, Pteridaceae, Salviniaceae, Schizaeaceae, Selaginellaceae, Thelypteridaceae, Vittariaceae.
Porter, D. M. (VPI, Estados Unidos de América): Zygophyllaceae.
Pozner, R. (SI, Argentina): Calyceraceae, Cucurbitaceae, Halophytaceae.
Prado, J. (SP, Brasil): Azollaceae (revisor), Blechnaceae (revisor), Cyatheaceae (revisor), Davalliaceae (revisor), Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae (revisor), Dryopteridaceae (revisor), Equisetaceae (revisor), Gleicheniaceae (revisor), Hymenophyllaceae (revisor), Lomariopsidaceae (revisor), Marsileaceae (revisor), Ophioglossaceae (revisor), Osmundaceae (revisor), Parkeriaceae, Psilotaceae (revisor), Pteridaceae (revisor), Salviniaceae (revisor), Schizaeaceae (revisor), Selaginellaceae (revisor), Thelypteridaceae (revisor), Vittariaceae (revisor).
Prance, G. T. (K, Inglaterra): Caryocaraceae, Chrysobalanaceae, Proteaceae.
Raven, P. H. (MO, Estados Unidos de América): Onagraceae.
Renner, S. S. (M, Alemania): Monimiaceae, Siparunaceae.
Reznicek, A. A. (MICH, Estado Unidos de América): Cyperaceae (revisor).
Rico, L. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Acacia*, revisor Ingeae excepto *Inga*).
Riina, R. (MICH, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae.
Rodríguez Ríos, R. (CONC, Chile): Gleicheniaceae.
Rohwer, J. G. (HBG, Alemania): Lauraceae (revisor), Oleaceae (revisor).
Roitman, G. (BAA, Argentina): Amaryllidaceae (revisor), Iridaceae.
Rolleri, C. (LP, Argentina): Lycopodiaceae, Marattiaceae.
Rotman, A. D. (JUA, Argentina): Myrtaceae, Verbenaceae (*Diostea, Lampaya, Lantana* y *Neosparton*).

Sáenz, A. A. (LP, Argentina): Asteraceae (Heliantheae).
Salariato, D. (SI, Argentina): Poaceae.
Salimena, F. R. G. (CESJ, Brasil): Verbenaceae (*Aegiphila*).
Salino, A. (BHCB, Brasil): Dryopteridaceae, Thelypteridaceae.
Sancho, G. (LP, Argentina): Asteraceae (Astereae, Mutisieae).
Sanso, A. M. (SI, Argentina): Alstroemeriaceae, Violaceae.
Saunders, J. (SI, Argentina): Sterculiaceae (*Waltheria*).
Schinini, A. (CTES, Argentina): Bromeliaceae, Orchidaceae.
Schrire, B. D. (K, Inglaterra): Fabaceae (revisor *Indigofera*).
Sede, S. (SI, Argentina): Escalloniaceae, Saxifragaceae, Tribelaceae.
Semir, J. (UEC, Brasil): Solanaceae (*Calibrachoa* y *Petunia*).
Seo, M. N. (BACP, Argentina): Violaceae (*Hybanthus*).
Simmons, M. P. (CS, Estados Unidos de América): Celastraceae.
Simpson, B. B. (TEX, Estados Unidos de América): Krameriaceae.
Smith, A. R. (UC, Estados Unidos de América): Grammitidaceae (revisor), Polypodiaceae (revisor).
Soria, N. (FCQ, Paraguay): Asteraceae de Paraguay.
Sota, E. R. de la (LP, Argentina): Azollaceae, Blechnaceae, Cyatheaceae, Davalliaceae, Dennstaedtiaceae, Dicksoniaceae, Equisetaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, Lomariopsidaceae, Marsileaceae, Ophioglossaceae, Osmundaceae, Polypodiaceae, Psilotaceae, Salviniaceae, Schizaeaceae, Selaginellaceae, Vittariaceae.
Spooner, D. M. (WIS, Estados Unidos de América): Solanaceae (*Solanum* sect. *Petota*).
Stace, C. A. (LTR, Estados Unidos de América): Combretaceae.
Ståhl, B. (GU, Suecia): Myrsinaceae, Primulaceae (revisor), Samolaceae, Symplocaceae (revisor), Theophrastaceae.
Stehmann, J. R. (BHCB, Brasil): Solanaceae (*Calibrachoa* y *Petunia*).
Stone, D. E. (DUKE, Estados Unidos de América): Juglandaceae.
Strehl, T. (HAS, Brasil): Bromeliaceae del Sur de Brasil.
Stuessy, T. F. (WU, Austria): Asteraceae (Lactuceae, Mutisieae).
Sylvestre, L. S. (RBR, Brasil): Aspleniaceae.
Taylor, C. M. (MO, Estados Unidos de América): Rubiaceae.
Tortosa, R. D. (BAA, Argentina): Asteraceae (Astereae), Rhamnaceae.
Tozzi, A. M. G. A. (UEC, Brasil): Fabaceae (revisor *Lonchocarpus* y *Machaerium*).
Tremetsberger, K. (WU, Austria): Asteraceae (Lactuceae).
Trevisán, R. (ICN, Brasil): Cyperaceae (*Eleocharis* del Sur de Brasil).
Ulibarri, E. A. (SI, Argentina): Fabaceae (*Adesmia, Caesalpinia, Hoffmannseggia, Pomaria* y *Cercidium*).
Ulloa Ulloa, C. (MO, Estados Unidos de América): Berberidaceae, Melastomataceae.
Urtubey, E. (LP, Argentina): Asteraceae (Lactuceae, Mutisieae).
Waechter, J. (ICN, Brasil): Orchidaceae del Sur de Brasil.
Wallnöfer, B. (W, Austria): Ebenaceae.
Wanderley, M. G. L. (SP, Brasil): Bromeliaceae, Xyridaceae.
Weigend, M. (BSB, Alemania): Grossulariaceae, Loasaceae.
Wheeler, G. A. (MIN, Estados Unidos de América): Cyperaceae (*Carex* y *Uncinia*).
Wiersema, J. H. (BARC, Estados Unidos de América): Nymphaeaceae (revisor).
Wurdack, K. J. (US, Estados Unidos de América): Euphorbiaceae, Phyllanthaceae (revisor).
Xifreda, C. C. (La Plata, Argentina): Violaceae.
Yatskievych, G. (MO, Estados Unidos de América): Aspleniaceae (revisor), Parkeriaceae (revisor), Pteridaceae.
Zanin, A. (ICN, Brasil): Poaceae del Sur de Brasil.
Zanotti, C. (SI, Argentina): Calyceraceae.
Zmarzty, S. (K, Inglaterra): Achariaceae, Berberidopsidaceae, Salicaceae.
Zuloaga, F. O. (SI, Argentina): Poaceae.

Nota: Las familias en las que no se indica autor fueron realizadas por los editores generales del *Catálogo*. *Note: The families without indication of authors were prepared by the main editors of the* Catalogue.

Dicotyledoneae

ACANTHACEAE

Autores: Ezcurra, C. & Kameyama, C.

21 géneros, 119 especies, 27 especies endémicas, 5 especies introducidas.

Adhatoda flexuosa Nees = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Adhatoda gilliesii Nees = **Justicia gilliesii** (Nees) Benth.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Adhatoda tweediana Nees = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Adhatoda tweediana Nees var. *angustifolia* Nees = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Adhatoda umbrosa Nees = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1984.

Amphiscopia hatschbachii Rizzini = **Justicia hatschbachii** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **hatschbachii**
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Amphiscopia hatschbachii Rizzini var. *catharinensis* Rizzini = **Justicia hatschbachii** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **catharinensis** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Anisacanthus Nees

Número de especies: 1

Anisacanthus boliviensis (Nees) Wassh.
Sin.: *Anisacanthus caduciflorus* (Griseb.) Ariza, *Anisacanthus caducifolius* (Griseb.) Lindau, *Anisacanthus malmei* Lindau, *Anisacanthus ruber* Lindau, *Drejera boliviensis* Nees, *Jacobinia caducifolia* Griseb., *Schaueria caduciflora* Griseb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004; Wasshausen, D. C., 1992.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5026* (LP, SI)]; PRY[*Spichiger, R. 2322* (G)].

Anisacanthus caduciflorus (Griseb.) Ariza = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.
Referencias: Wasshausen, D. C., 1992.

Anisacanthus caducifolius (Griseb.) Lindau = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.
Referencias: Wasshausen, D. C., 1992.

Anisacanthus malmei Lindau = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.

Anisacanthus ruber Lindau = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.

Aphelandra R. Br.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Aphelandra chamissoniana Nees
Sin.: *Aphelandra chamissoniana* Nees var. *paranensis* Rizzini
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C., 1975.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 990* (HBR, US)].

Aphelandra chamissoniana Nees var. *paranensis* Rizzini = **Aphelandra chamissoniana** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C., 1975.

Aphelandra dusenii Lindau = **Justicia dusenii** (Lindau) Wassh. & L.B. Sm.
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Aphelandra hieronymi Griseb.
Sin.: *Odontophyllum hieronymi* (Griseb.) Sreem.
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976a; Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004; Wasshausen, D. C., 1975.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL);
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 270* (CORD)].

Aphelandra liboniana Linden ex Hook.
Sin.: *Aphelandra mirabilis* Rizzini
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C., 1975.
Arbusto. Endémica. 100–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4644* (BR, HBR)].

Aphelandra lilacina C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1986, 1993a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Chalukian, S. 1977* (SI)].

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice
Sin.: *Geissomeria cincinnata* Nees, *Geissomeria dichroa* Rizzini, *Geissomeria longiflora* Lindl.
Referencias: Profice, S. R., 2004.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5204* (SI)]; BRA[*Davidse, G. 11216* (CTES)].

Aphelandra mirabilis Rizzini = **Aphelandra liboniana** Linden ex Hook.
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C., 1975.

Aphelandra ornata (Nees) Lindau = **Aphelandra ornata** (Nees) T. Anderson
Referencias: Wasshausen, D. C., 1975.

Aphelandra ornata (Nees) T. Anderson
Sin.: *Aphelandra ornata* (Nees) Lindau, *Aphelandra venosa* Wassh. & L.B. Sm., *Lagochilium ornatum* (Nees) Nees, *Stenandrium ornatum* Nees, *Stenandrium venatum* Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C., 1975.
Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5718* (US)].

Aphelandra venosa Wassh. & L.B. Sm. = **Aphelandra ornata** (Nees) T. Anderson
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C., 1975.

Arrhostoxylum ciliatiflorum (Hook.) Nees = **Ruellia ciliatiflora** Hook.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Arrhostoxylum elegans (Poir.) Bremek. = **Ruellia elegans** Poir.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Arrhostoxylum formosum (Andr.) Nees = **Ruellia elegans** Poir.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Arrhostoxylum kuntzei (Lindau) Bremek. = **Ruellia sanguinea** Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Arrhostoxylum microphyllum Nees = **Ruellia simplex** Wright

Arrhostoxylum silvaccola Nees var. *montanum* Nees = **Ruellia elegans** Poir.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Beloperone albomarginata Lindau = **Justicia dumetorum** Morong
Referencias: Ezcurra, C., 1988, 2002.

Beloperone amherstiae Nees = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Beloperone amherstiae Nees var. *debilis* Nees = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Beloperone amherstiae Nees var. *graciliflora* Nees = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Beloperone amherstiae Nees var. *puberula* Hassl. = **Justicia brasiliana** Roth

Beloperone amherstiae Nees var. *pubescens* Hassl. = **Justicia brasiliana** Roth

Beloperone amherstiae Nees var. *villosula* Hassl. = **Justicia brasiliana** Roth

Beloperone baenitzii H. Winkl. = **Justicia baenitzii** (H. Winkl.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1988, 2002.

Beloperone brasiliana (Roth) Bremek. = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Beloperone ciliata (Nees) Hook. f. = **Justicia squarrosa** Griseb.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Beloperone corumbensis Lindau = **Justicia corumbensis** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.

Beloperone hassleri Lindau = **Justicia hassleri** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Beloperone kerri N.E. Br. = **Justicia dumetorum** Morong
Referencias: Ezcurra, C., 1988, 2002.

Beloperone mandonii Lindau = **Justicia mandonii** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.

Beloperone matthewsii Lindau = **Justicia rusby** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

[Beloperone nuda Rusby]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Beloperone pseudociliata Mildbraed = **Justicia ramulosa** (Morong) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1988.

Beloperone ramulosa Morong = **Justicia ramulosa** (Morong) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1988, 2002.

Beloperone riparia S. Moore = **Justicia chacoënsis** Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Beloperone scorpioides Nees = **Justicia xylosteoides** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a; Ezcurra, C., 2002.

Beloperone spathulata (Nees & Mart.) Nees = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Beloperone squarrosa (Griseb.) Lindau = **Justicia squarrosa** Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Beloperone thunbergioides Lindau = **Justicia thunbergioides** (Lindau) Leonard
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Blechum mexicanum Oerst. = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Blechum tweedii Nees = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Calophanes ciliatus Nees = **Dyschoriste ciliata** (Nees) Kuntze
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.

Calophanes hygrophiloides Nees = **Dyschoriste hygrophiloides** (Nees) Kuntze
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.

Calophanes lavandulaceus Nees = **Dyschoriste lavandulacea** (Nees) Kuntze
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.

Calophanes maranhonis Nees = **Dyschoriste maranhonis** (Nees) Kuntze

Calophanes tweedianus Nees = **Dyschoriste tweediana** (Nees) Kuntze
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.

Carlowrightia A. Gray

Número de especies: 1 endémica

Carlowrightia sulcata (Nees) C. Ezcurra
Sin.: *Dianthera sulcata* (Nees) Griseb., *Jacobinia sulcata* Nees, *Siphonoglossa gentianifolia* Lindau, *Siphonoglossa sulcata* (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, APA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29949* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 18098* (MO, SI)].

Chaetochlamys lilloi Lotti = **Justicia lilloi** (Lotti) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, b; 2002.

Chaetochlamys marginata Lindau = **Justicia hassleri** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Chaetochlamys rusbyi Lindau = **Justicia rusby** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Chaetochlamys tucumanensis Lillo, nom. nud. = **Justicia lilloi** (Lotti) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993b; 2002.

Chaetothylax boliviensis Lindau = **Justicia goudotii** V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Chaetothylax lythroides (Nees) Benth. ex Jacks. = **Justicia lythroides** (Nees) V.A.W. Graham
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Chaetothylax tocantinus Nees = **Justicia tocantina** (Nees) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Chaetothylax umbrosus Nees = **Justicia goudotii** V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Copioglossa pilosa Miers = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Cryphiacanthus acaulis Nees = **Ruellia morongii** Britton
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Cryphiacanthus angustifolius Nees = **Ruellia simplex** Wright
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Cryphiacanthus udus Nees = **Ruellia hygrophila** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Cyrtacanthus corymbosus Nees, nom. nud. = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1989b; 1993c.

Cyrtanthera magnifica Nees = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Cyrtanthera pohliana Nees = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Cyrtanthera pohliana Nees var. *obtusior* Nees = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Dianthera ciliata Benth. & Hook. f., hom. illeg. = **Justicia squarrosa** Griseb.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Dianthera comata L. = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Dianthera laevilinguis (Nees) Durand & B.D. Jacks. = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Dianthera nodosa (Hook.) Benth. = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Dianthera obtusifolia (Nees) Griseb. = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau

Dianthera paludosa S. Moore = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Dianthera polygaloides S. Moore = **Justicia polygaloides** (S. Moore) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Dianthera sulcata (Nees) Griseb. = **Carlowrightia sulcata** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Diapedium niederleinianum (Lindau) Kuntze = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Diapedium scutellatum (Griseb.) Kuntze = **Dicliptera scutellata** Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Diapedium tweedianum (Nees) Kuntze = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Dicliptera Juss.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Dicliptera cabrerae C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1989a, 1993a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30441* (SI)].

Dicliptera cochabambensis Lindau
Referencias: Slanis, A., Bulacio, E. V. & Grau, A., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–2400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Slanis, A. 304* (LIL)].

Dicliptera deltica Bridar. = **Dicliptera squarrosa** Nees

Dicliptera imminuta Rizzini = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Dicliptera jujuyensis Lindau
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976a; Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14526* (LP)].

Dicliptera lutea Bridar. = **Dicliptera squarrosa** Nees

[Dicliptera mucronifolia Nees]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dicliptera niederleiniana Lindau = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Dicliptera paposana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 790* (B)].

Dicliptera pohliana Nees = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Dicliptera scutellata Griseb.
Sin.: *Diapedium scutellatum* (Griseb.) Kuntze
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976a; Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Subarbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 683* (CORD, GOET), *Venturi, S. 5261* (LIL, SI)].

Dicliptera sericea Nees = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Dicliptera squarrosa Nees
Sin.: *Diapedium niederleinianum* (Lindau) Kuntze, *Diapedium tweedianum* (Nees) Kuntze, *Dicliptera deltica* Bridar., *Dicliptera imminuta* Rizzini, *Dicliptera lutea* Bridar., *Dicliptera niederleiniana* Lindau, *Dicliptera pohliana* Nees, *Dicliptera sericea* Nees, *Dicliptera suberecta* (André) Bremek., *Dicliptera tomentosa* Griseb., *Dicliptera tweediana* Nees, *Dicliptera tweediana* Nees f. *chacoensis* Hassl., *Dicliptera tweediana* Nees var. *flaviflora* Stuck., *Jacobinia suberecta* André
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R. & Olano, A., 1978; Dawson, G., 1979a; De Marco, N. & Ruiz, T., 1976a; Ezcurra, C., 1993a; Lindau, G., 1894; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Hierba. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(COL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5078* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11671* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 2873* (G)]; URY[*Hertel, R. 5606* (SI)].

Dicliptera suberecta (André) Bremek. = **Dicliptera squarrosa** Nees

Dicliptera tomentosa Griseb. = **Dicliptera squarrosa** Nees

[Dicliptera tomentosa (Vahl) Nees]
Sin.: *Justicia tomentosa* Vahl
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dicliptera tweediana Nees = **Dicliptera squarrosa** Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Dicliptera tweediana Nees f. *chacoensis* Hassl. = **Dicliptera squarrosa** Nees

Dicliptera tweediana Nees var. *flaviflora* Stuck. = **Dicliptera squarrosa** Nees

Dipteracanthus bahiensis Nees = **Ruellia bahiensis** (Nees) Morong
Referencias: Lillo, M., 1937.

Dipteracanthus brachysiphon Nees = **Ruellia brachysiphon** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus brevicaulis Nees = **Ruellia brevicaulis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus calvescens Nees = **Ruellia solitaria** Vell.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus confinis Nees = **Ruellia solitaria** Vell.

Dipteracanthus dissitifolius Nees = **Ruellia dissitifolia** (Nees) Hieron.

Dipteracanthus dissitifolius Nees var. *humilior* Nees = **Ruellia brevicaulis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus geminiflorus Nees var. *angustifolius* Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus geminiflorus Nees var. *erectus* Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus geminiflorus Nees var. *hirsutior* Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus geminiflorus Nees var. *procumbens* Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus geminiflorus Nees var. *subacaulis* Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus glanduloso-punctatus Nees = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus humilis Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus hypericoides Nees = **Ruellia hypericoides** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus multifolius Nees = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **multifolia**
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus schauerianus Nees = **Ruellia solitaria** Vell.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus tuberosus Nees = **Ruellia bulbifera** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus vindex Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Dipteracanthus viscosissimus Nees = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Drejera boliviensis Nees = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.
Referencias: Wasshausen, D. C., 1992.

Duvernoia paranaensis Rizzini = **Justicia paranaensis** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Dyschoriste Ness

Número de especies: 10, 3 endémicas

Dyschoriste axillaris Wassh. & J.R.I. Wood
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2003a, 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3947* (SI)].

Dyschoriste ceciliae Wassh. & J.R.I. Wood = **Dyschoriste trichanthera** Kobuski

[Dyschoriste ciliata (Nees) Kuntze]
Sin.: *Calophanes ciliatus* Nees
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dyschoriste humilis Lindau
Sin.: *Dyschoriste humilis* Lindau f. *variegata* Stuck., *Ruellia geminiflora* Kunth var. *humilis* Griseb., nom. nud.
Referencias: Dawson, G., 1979a; Kobuski, C. E., 1928; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2003a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 2382* (BM, K)]; URY[*Hertel, R. 829* (SI)].

Dyschoriste humilis Lindau f. *variegata* Stuck. = **Dyschoriste humilis** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1999d.

Dyschoriste hygrophiloides (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes hygrophiloides* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a; Kobuski, C. E., 1928.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(PAR, RGS); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11559* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15640* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4187* (MVFA)].

Dyschoriste lavandulacea (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes lavandulaceus* Nees, *Dyschoriste niederleinii* Lindau
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 42* (BA, CORD)]; BRA[*Riedel, L. 501* (L)]; PRY[*Hassler, E. 5002* (BM, G, K)].

[Dyschoriste maranhonis (Nees) Kuntze]
Sin.: *Calophanes maranhonis* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Dyschoriste niederleinii Lindau = **Dyschoriste lavandulacea** (Nees) Kuntze

Dyschoriste paraguariensis Kobuski
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4355* (G, K, NY, P)].

Dyschoriste sagittata Kobuski
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6383* (G, LIL, SI)].

Dyschoriste smithii Leonard
Referencias: Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9912* (US)].

Dyschoriste trichanthera Kobuski
Sin.: *Dyschoriste ceciliae* Wassh. & J.R.I. Wood
Referencias: Kobuski, C. E., 1928; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2003a.
Subarbusto. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8077* (CAS, K, SI, US)]; PRY[*Hassler, E. 7780* (BM, G, MO, NY, P, S)].

Dyschoriste tweediana (Nees) Kuntze
Sin.: *Calophanes tweedianus* Nees
Referencias: Kobuski, C. E., 1928.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tweedie, J. 771* (K)].

Dyschoriste venturii Leonard
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5865* (NY, S, SI, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 38039* (SI)].

Ebermaiera mandioccana Nees = **Staurogyne mandioccana** (Nees) Kuntze
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Ebermaiera sanctae-catharinae Ness = **Staurogyne mandioccana** (Nees) Kuntze
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Ecbolium comatum (L.) Kuntze = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Ecbolium flexuosum (Nees) Kuntze = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Ecbolium gilliesii (Nees) Kuntze = **Justicia gilliesii** (Nees) Benth.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983a.

Ecbolium lorentzianum (Lindau) Kuntze = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983a.

Ecbolium tweedianum (Nees) Kuntze = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Ecbolium umbrosum (Nees) Kuntze = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1984.

Ecbolium xylosteoides (Griseb.) Kuntze = **Justicia xylosteoides** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a.

Echinacanthus dichotomus Kuntze = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Elytraria Michx.

Número de especies: 1

Elytraria apargiifolia Nees = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Elytraria fasciculata Kunth = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Elytraria frondosa Kunth = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Elytraria imbricata (Vahl) Pers.
Sin.: *Elytraria apargiifolia* Nees, *Elytraria fasciculata* Kunth, *Elytraria frondosa* Kunth, *Elytraria ramosa* Kunth, *Elytraria scorpioides* Roem. & Schult., *Elytraria squamosa* (Jacq.) Lindau, *Elytraria tridentata* Vahl, *Justicia imbricata* Vahl, *Verbena squamosa* Jacq.
Referencias: Daniel, T. F., 1995; Ezcurra, C., 1993a; Leonard, E. C., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33881* (SI)].

Elytraria ramosa Kunth = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Elytraria scorpioides Roem. & Schult. = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Elytraria squamosa (Jacq.) Lindau = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Elytraria tridentata Vahl = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Eranthemum cordatum Nees = **Pseuderanthemum cordatum** (Nees) Radlk.

Eranthemum riedelianum Nees = **Pseuderanthemum riedelianum** (Nees) Rizzini
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Geissomeria cincinnata Nees = **Aphelandra longiflora** (Lindl.) Profice
Referencias: Profice, S. R., 2004.

Geissomeria dichroa Rizzini = **Aphelandra longiflora** (Lindl.) Profice
Referencias: Profice, S. R., 2004.

Geissomeria longiflora Lindl. = **Aphelandra longiflora** (Lindl.) Profice
Referencias: Profice, S. R., 2004.

Gerardia dulcis (Cav.) S.F. Blake = **Stenandrium dulce** (Cav.) Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Heinzelia lythroides Nees = **Justicia lythroides** (Nees) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C. & Acosta-Castellanos, S., 1997; Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Heinzelia ovalis Nees = **Justicia lythroides** (Nees) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C. & Acosta-Castellanos, S., 1997; Ezcurra, C., 2002.

Hygrophila R. Br.

Número de especies: 2

Hygrophila atricheta Bridar. = **Hygrophila costata** Nees

Hygrophila brasiliensis (Spreng.) Lindau = **Hygrophila costata** Nees
Referencias: Daniel, T. F., 1995.

Hygrophila conferta Nees = **Hygrophila guianensis** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Hygrophila conferta Nees var. *rubricaulis* Nees = **Hygrophila guianensis** Nees

Hygrophila costata Nees
Sin.: *Hygrophila atricheta* Bridar., *Hygrophila brasiliensis* (Spreng.) Lindau, *Hygrophila helodes* Nees, *Hygrophila lacustris* Morong & Britton, hom. illeg., *Hygrophila latifolia* Nees, *Hygrophila longifolia* Nees, *Hygrophila pubescens* Nees, *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Cabrera & G. Dawson, comb. superfl., *Hygrophila verticillata* (Spreng.) Herter, *Ruellia brasiliensis* Spreng., *Ruellia verticillata* Spreng.
Referencias: Dawson, G., 1979a; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Hierba acuática. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1722* (SI)]; BRA[*Ule, E. H. G. 778* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 8598* (G)]; URY[*Alonso Paz, E. 1001* (MVFQ)].

Hygrophila guianensis Nees
Sin.: *Hygrophila conferta* Nees, *Hygrophila conferta* Nees var. *rubricaulis* Nees
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 1993a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba acuática. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5032* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 5668* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 5987* (G), *Schinini, A. 29405* (SI)].

Hygrophila helodes Nees = **Hygrophila costata** Nees

Hygrophila lacustris Morong & Britton, hom. illeg. = **Hygrophila costata** Nees

Hygrophila latifolia Nees = **Hygrophila costata** Nees

Hygrophila longifolia Nees = **Hygrophila costata** Nees

Hygrophila pubescens Nees = **Hygrophila costata** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1999d.

Hygrophila verticillata (Spreng.) Cabrera & G. Dawson, comb. superfl. = **Hygrophila costata** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1999d.

Hygrophila verticillata (Spreng.) Herter = **Hygrophila costata** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1999d.

Hypoestes Sol. ex R. Br.
Número de especies: 1 introducida

Hypoestes phyllostachya Baker
Referencias: Daniel, T. F., 1995.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 1117* (FCQ)].

Jacobinia aequilabris (Nees) Lindau = **Justicia aequilabris** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Jacobinia affinis (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. = **Justicia brasiliana** Roth

Jacobinia caducifolia Griseb. = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.
Referencias: Wasshausen, D. C., 1992.

Jacobinia carnea (Lindl.) G. Nicholson = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Jacobinia ciliata Nees = **Justicia squarrosa** Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Jacobinia magnifica (Nees) Lindau = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Jacobinia obtusior (Nees) L.H. Bailey = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Jacobinia parabolica (Nees) Lindau = **Justicia brasiliana** Roth

Jacobinia pauciflora (Nees) Lindau = **Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998.

Jacobinia pohliana (Nees) Lindau = **Justicia carnea** Lindl.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Jacobinia suberecta André = **Dicliptera squarrosa** Nees

Jacobinia sulcata Nees = **Carlowrightia sulcata** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Jacobinia tenuistachys Rusby = **Justicia tenuistachys** (Rusby) Wassh. & J.R.I. Wood

Jacobinia velutina Lindau = **Justicia aequilabris** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia L., nom. cons.
Número de especies: 45, 12 endémicas

Justicia aequilabris (Nees) Lindau
Sin.: *Jacobinia aequilabris* (Nees) Lindau, *Jacobinia velutina* Lindau, *Justicia velutina* (Lindau) Lindau ex Hassl., *Orthotactus aequilabris* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2003b.
Subarbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4103* (BM, E, G, P)].

Justicia albomarginata (Lindau) V.A.W. Graham = **Justicia dumetorum** Morong

Justicia anagallis (Nees) Lindau = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau

Justicia ascendens Bridar. = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002.

Justicia axillaris (Nees) Lindau
Sin.: *Justicia campestris* (Nees) Lindau, *Rhytiglossa axillaris* Nees, *Rhytiglossa campestris* Nees
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA, CAU, CAN, COA, PAI); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28844* (CTES)]; BRA[*Sellow, F. s.n.* (B)]; PRY[*Hassler, E. 5108* (BM, G)]; URY[*Arechavaleta, J. 4792* (SI)].

Justicia baenitzii (H. Winkl.) C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone baenitzii* H. Winkl.
Referencias: Ezcurra, C., 1988, 1993a, 2002.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Iudica, C. 354* (SI)].

Justicia brasiliana Roth
Sin.: *Beloperone amherstiae* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *debilis* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *graciliflora* Nees, *Beloperone amherstiae* Nees var. *puberula* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees var. *pubescens* Hassl., *Beloperone amherstiae* Nees var. *villosula* Hassl., *Beloperone brasiliana* (Roth) Bremek., *Dianthera nodosa* (Hook.) Benth., *Jacobinia affinis* (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm., *Jacobinia parabolica* (Nees) Lindau, *Justicia nodosa* Hook., *Sericographis affinis* Rizzini, *Sericographis cordifolia* Rizzini, *Sericographis parabolica* Nees, *Sericographis squarrosa* Nees
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Stutz, L. C., 1983; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1025* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14480* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 5207* (BM, G, K, P, W)]; URY[*Rosengurtt, B. 7212* (MVFA)].

Justicia campestris (Nees) Lindau = **Justicia axillaris** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia campestris Griseb., hom. illeg. = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Justicia carnea Lindl.
Sin.: *Cyrtanthera magnifica* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees, *Cyrtanthera pohliana* Nees var. *obtusior* Nees, *Jacobinia carnea* (Lindl.) G. Nicholson, *Jacobinia magnifica* (Nees) Lindau, *Jacobinia obtusior* (Nees) L.H. Bailey, *Jacobinia pohliana* (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1320* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2863* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5730* (BM, G, LIL, SI)].

Justicia catharinensis Lindau
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 947* (HBG, US)].

Justicia chacoënsis Wassh. & C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone riparia* S. Moore, *Justicia riparia* S. Moore
Referencias: Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 18090* (G, MO)].

Justicia comata (L.) Lam.
Sin.: *Dianthera comata* L., *Ecbolium comatum* (L.) Kuntze, *Justicia humifusa* Sw., *Justicia parviflora* (Nees) Lindau, *Leptostachya comata* (L.) Nees, *Leptostachya martiana* Nees, *Leptostachya parviflora* Nees, *Psacadocalymma comatum* (L.) Bremek., *Stethoma comata* (L.) Britton, *Thalestris graminiformis* Rizzini
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a, 2002; Graham, V. A. W., 1988; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5591* (K, SI)]; BRA[*Duarte, N. 1705* (NY, RB)]; PRY[*Hassler, E. 8294* (BM, G, MO, NY, P)]; URY[*Del Puerto, O. 5945* (MVFA)].

Justicia corumbensis (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone corumbensis* Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 680* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3250* (CTES, FCQ, MO), *Hassler, E. 2754* (BM, G, K, NY)].

Justicia cuspidulata (Nees) Wassh.
Sin.: *Justicia praetermissa* Wassh. & J.R.I. Wood, *Rhytiglossa cuspidulata* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2003b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7834* (BM, G, K, MO, NY, P), *Zardini, E. M. 53512* (AS, MO, SI)].

[Justicia dasyclados (Nees) Lindau]
Sin.: *Rhytiglossa dasyclados* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Justicia diamantina Lindau = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Justicia dumetorum Morong
Sin.: *Beloperone albomarginata* Lindau, *Beloperone kerri* N.E. Br., *Justicia albomarginata* (Lindau) V.A.W. Graham, *Justicia squalida* Wassh. & J.R.I. Wood
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1988, 1993a, 2002; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2003b.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SAL); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kerr, J. G. 108* (E, K)]; PRY[*Hassler, E. 2755* (B, BM, G, K, LIL, MO, NY, P, W)].

Justicia dusenii (Lindau) Wassh. & L.B. Sm.
Sin.: *Aphelandra dusenii* Lindau
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Anual. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5798* (HBR, US)].

Justicia echegarayi Hieron. = **Justicia gilliesii** (Nees) Benth.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Justicia flexuosa (Nees) Wassh. & L.B. Sm. = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia floribunda (C. Koch) Wassh.
Sin.: *Jacobinia pauciflora* (Nees) Lindau, *Justicia pauciflora* (Nees) Griseb., nom. illeg., *Justicia rizzinii* Wassh., *Libonia floribunda* C. Koch, *Sericographis pauciflora* Nees, *Sericographis pauciflora* Nees var. *speciosior* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969; Wasshausen, D. C., 1973.
Arbusto. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 950* (US)]; BRA[*Reitz, P. R. 15378* (HBR)].

[Justicia furcata Jacq.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Justicia gilliesii (Nees) Benth.
Sin.: *Adhatoda gilliesii* Nees, *Ecbolium gilliesii* (Nees) Kuntze, *Justicia echegarayi* Hieron., *Poikilacanthus gilliesii* (Nees) Lindau
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a, 1983a.
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1814* (SI)].

Justicia glaziovii Lindau
Sin.: *Justicia velascana* Lindau, *Lophothecium paniculatum* Rizzini, *Rhytiglossa paniculata* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 10864* (BM, G, K, M, NY, P, W)].

Justicia glutinosa (Bremek.) V.A.W. Graham
Sin.: *Justicia sarotheca* V.A.W. Graham, *Sarotheca elegans* Nees, *Sarotheca glutinosa* Bremek.
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 5484* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 20344* (CTES, G, US)].

Justicia goudotii V.A.W. Graham
Sin.: *Chaetocalyx vestitus* Rizzini, *Chaetothylax boliviensis* Lindau, *Chaetothylax umbrosus* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, 2002; Graham, V. A. W., 1988; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(CAN, CEN, CON, GUA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22646* (LP)]; BRA[*Duarte, N. 1927* (RB)]; PRY[*Hassler, E. 2818* (BM, G, LIL, MO, NY, P)].

Justicia hassleri (Lindau) V.A.W. Graham
Sin.: *Beloperone hassleri* Lindau, *Chaetochlamys marginata* Lindau, *Justicia paraguayensis* V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 138* (SI)].

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **catharinensis** (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.
Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini var. *catharinensis* Rizzini
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1078* (HBR)].

Justicia hatschbachii (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm. var. **hatschbachii**
Sin.: *Amphiscopia hatschbachii* Rizzini
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2105* (HBR)].

Justicia humifusa Sw. = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Justicia hunzikeri Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a, 1983c; Ezcurra, C., 2002.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 675* (SI)].

Justicia hylobates Leonard = **Justicia yhuensis** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia imbricata Vahl = **Elytraria imbricata** (Vahl) Pers.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Justicia jujuyensis C. Ezcurra
Sin.: *Justicia leonardii* De Marco & T. Ruíz, nom. illeg., *Justicia nemoralis* Lillo, nom. nud., *Justicia nemoralis* Lillo var. *tomentosa* Lillo, nom. nud.
Referencias: Ezcurra, C., 1988, 1993a, 2002.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21684* (LP, SI)].

Justicia kleinii Wassh. & L.B. Sm.
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6848* (US)].

Justicia kuntzei Lindau
Sin.: *Lophothecium boliviensis* Bremek.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, 2002; Graham, V. A. W., 1988.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5217* (K, SI)].

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau
Sin.: *Dianthera laevilinguis* (Nees) Durand & B.D. Jacks., *Dianthera obtusifolia* (Nees) Griseb., *Dianthera paludosa* S. Moore, *Justicia anagallis* (Nees) Lindau, *Justicia ascendens* Bridar., *Justicia laevilinguis* (Nees) Lindau var. *longifolia* Nees, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuticaulis* Nees, *Justicia obtusifolia* (Nees) Lindau var. *longespicata* Hassl., *Justicia paludosa* (S. Moore) V.A.W. Graham, *Justicia repens* (Nees) Lindau, *Rhytiglossa anagallis* Nees, *Rhytiglossa laevilinguis* Nees, *Rhytiglossa laevilinguis* Nees var. *longifolia* Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees, *Rhytiglossa obtusifolia* Nees var. *hirsuticaulis* Nees, *Rhytiglossa repens* Nees
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CLA, DUR, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Seijo, G. J. 822* (CTES, G, MNES)]; BRA[*Smith, L. B. 9800* (HBR, R, US)]; PRY[*Hassler, E. 8160* (BM, G, NY, P)]; URY[*Rosengurtt, B. 4384pe* (MVFA)].

Justicia laevilinguis (Nees) Lindau var. *longifolia* Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia leonardii De Marco & T. Ruíz, nom. illeg. = **Justicia jujuyensis** C. Ezcurra
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976b; Ezcurra, C., 1988, 2002.

Justicia lilloana Ariza
Sin.: *Justicia platicarpa* Lillo, nom. nud.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a, 1983c; Ezcurra, C., 2002.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 1105* (CORD, LIL)].

Justicia lilloi (Lotti) C. Ezcurra
Sin.: *Chaetochlamys lilloi* Lotti, *Chaetochlamys tucumanensis* Lillo, nom. nud.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, b, 2002; Lotti, J., 1976.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiner, E. J. 5217* (LIL)]; PRY[*Bernardi, L. 20335* (MO), *Zardini, E. M. 58363* (MO, SI)].

Justicia lorentziana Lindau = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

[Justicia lucida (Nees) Lindau, hom. illeg.]
Sin.: *Leptostachya lucida* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Justicia luschnathii Lindau]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Justicia lutensis Wassh. & J.R.I. Wood = **Justicia polygaloides** (S. Moore) Lindau

Justicia lythroides (Nees) V.A.W. Graham
Sin.: *Chaetothylax lythroides* (Nees) Benth. ex Jacks., *Heinzelia lythroides* Nees, *Heinzelia ovalis* Nees

Referencias: Ezcurra, C. & Acosta-Castellanos, S., 1997; Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14603* (SI)]; BRA[*Hunziker, J. H. 2608* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6040* (G)].

Justicia mandonii (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone mandonii* Lindau, *Justicia odonelli* De Marco & T.Ruíz, *Justicia tucumanensis* Lillo, nom. nud.
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976b; Ezcurra, C., 1993a, 2002; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 15125* (LIL)].

Justicia matthewsii (Lindau) Rusby ex Dyer = **Justicia rusby** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia nemoralis Lillo, nom. nud. = **Justicia jujuyensis** C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1988.

Justicia nemoralis Lillo var. *tomentosa* Lillo, nom. nud. = **Justicia jujuyensis** C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Justicia nodosa Hook. = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Justicia oblonga (Nees) Lindau
Sin.: *Rhytiglossa oblonga* Nees
Referencias: Ezcurra, C. & Acosta-Castellanos, S., 1997; Ezcurra, C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, GUA); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14443* (SI)]; BRA[*Poliquesi, C. B. 508* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5929* (BM, G, LIL, SI)].

Justicia obtusifolia (Nees) Lindau = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002.

Justicia obtusifolia (Nees) Lindau var. *hirsuticaulis* Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau

Justicia obtusifolia (Nees) Lindau var. *longespicata* Hassl. = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau

Justicia odonelli De Marco & T.Ruíz = **Justicia mandonii** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.

Justicia oranensis De Marco & T.Ruíz
Sin.: *Justicia schreiteri* Lillo, nom. nud.
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976b; Ezcurra, C., 1993a, 2002.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 8564* (LIL)].

Justicia paludosa (S. Moore) V.A.W. Graham = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia paraguayensis V.A.W. Graham = **Justicia hassleri** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia paranaensis (Rizzini) Wassh. & L.B. Sm.
Sin.: *Duvernoia paranaensis* Rizzini
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 359* (HBR)].

Justicia parviflora (Nees) Lindau = **Justicia comata** (L.) Lam.

Justicia pauciflora (Nees) Griseb., nom. illeg. = **Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998.

Justicia pectoralis Jacq.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 2283* (CORD, SI)]; PRY[*Schinini, A. 14938* (CTES, G)].

Justicia phyllocalyx (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Sin.: *Poikilacanthus phyllocalyx* Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8423* (BM, G, K, LIL, MO, NY, P, W)].

Justicia platicarpa Lillo, nom. nud. = **Justicia lilloana** Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

[Justicia poeppigiana (Nees) Lindau]
Sin.: *Rhytiglossa poeppigiana* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Justicia polygaloides (S. Moore) Lindau
Sin.: *Dianthera polygaloides* S. Moore, *Justicia lutensis* Wassh. & J.R.I. Wood
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); PRY(APY, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 997* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7633* (BM, G, NY)].

Justicia praetermissa Wassh. & J.R.I. Wood = **Justicia cuspidulata** (Nees) Wassh.

Justicia pseudociliata (Mildbraed) V.A.W. Graham = **Justicia ramulosa** (Morong) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, 2002.

[Justicia racemosa Ruiz & Pav.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Justicia ramulosa (Morong) V.A.W. Graham, nom. illeg. = **Justicia ramulosa** (Morong) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Justicia ramulosa (Morong) C. Ezcurra
Sin.: *Beloperone pseudociliata* Mildbraed, *Beloperone ramulosa* Morong, *Justicia pseudociliata* (Mildbraed) V.A.W. Graham, *Justicia ramulosa* (Morong) V.A.W. Graham, nom. illeg.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ezcurra, C., 1988, 1993a, 2002; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7320* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 19151* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 2977* (BM, G, MO, NY, P)].

Justicia reitzii Leonard
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9230* (US)].

Justicia repens (Nees) Lindau = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia riojana Lindau
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a; Ezcurra, C., 2002.
Arbusto. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 546* (CORD)].

Justicia riparia S. Moore = **Justicia chacoënsis** Wassh. & C. Ezcurra

Justicia rizzinii Wassh. = **Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998.

Justicia rusby (Lindau) V.A.W. Graham
Sin.: *Beloperone matthewsii* Lindau, *Chaetochlamys rusbyi* Lindau, *Justicia matthewsii* (Lindau) Rusby ex Dyer, *Ruellia lanceolata* Morong
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.
Subarbusto. Nativa. 200–800 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4303* (LIL, MO, NY, SI, US)].

Justicia saltensis T.Ruíz & De Marco
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, 2002; Ruiz, T. & De Marco, N., 1980.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3509* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 2198* (SI)].

Justicia sarotheca V.A.W. Graham = **Justicia glutinosa** (Bremek.) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia schenckiana Lindau
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5079* (HBR, US)].

Justicia schreiteri Lillo, nom. nud. = **Justicia oranensis** De Marco & T.Ruíz
Referencias: De Marco, N. & Ruiz, T., 1976b.

Justicia scorpioides (Nees) Griseb., hom. illeg. = **Justicia xylosteoides** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a.

Justicia spathulata Nees & Mart. = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia squalida Wassh. & J.R.I. Wood = **Justicia dumetorum** Morong

Justicia squarrosa Griseb.
Sin.: *Beloperone ciliata* (Nees) Hook. f., *Beloperone squarrosa* (Griseb.) Lindau, *Dianthera ciliata* Benth. & Hook. f., hom. illeg., *Jacobinia ciliata* Nees
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a, 2002; Graham, V. A. W., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 405* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 57832* (MO, SI)].

[Justicia sulcata Vahl]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Justicia tenuistachys (Rusby) Wassh. & J.R.I. Wood]
Sin.: *Jacobinia tenuistachys* Rusby
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Justicia thunbergioides (Lindau) Leonard]
Sin.: *Beloperone thunbergioides* Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Justicia tocantina (Nees) V.A.W. Graham
Sin.: *Chaetothylax tocantinus* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1530* (G, MO, PY)].

Justicia tomentosa Vahl = **Dicliptera tomentosa** (Vahl) Nees

Justicia tucumanensis Lillo, nom. nud. = **Justicia mandonii** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.

Justicia tweediana (Nees) Benth., nom. illeg. = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Justicia tweediana (Nees) Griseb.
Sin.: *Adhatoda tweediana* Nees, *Adhatoda tweediana* Nees var. *angustifolia* Nees, *Ecbolium lorentzianum* (Lindau) Kuntze, *Ecbolium tweedianum* (Nees) Kuntze, *Justicia campestris* Griseb., hom. illeg., *Justicia diamantina* Lindau, *Justicia lorentziana* Lindau, *Justicia tweediana* (Nees) Benth., nom. illeg., *Poikilacanthus tweedianus* (Nees) Lindau, *Poikilacanthus tweedianus* (Nees) Lindau var. *angustifolius* (Nees) Lindau
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a, 1983a; Ezcurra, C., 1993a, 2002; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 9589* (BAFC, SI)]; URY[*Berro, M. B. 3502* (MVFA)].

Justicia umbrosa (Nees) Lindau, hom. illeg. = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1984.

Justicia velascana Lindau = **Justicia glaziovii** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia velutina (Lindau) Lindau ex Hassl. = **Justicia aequilabris** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Justicia xylosteoides Griseb.
Sin.: *Beloperone scorpioides* Nees, *Ecbolium xylosteoides* (Griseb.) Kuntze, *Justicia scorpioides* (Nees) Griseb., hom. illeg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a, 2002.
Arbusto. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1619* (CORD), *Cialdella, A. M. 206* (SI)]; PRY[*Spichiger, R. 2268* (G, US), *Zardini, E. M. 49831* (MO, SI)].

Justicia yhuensis Lindau
Sin.: *Justicia hylobates* Leonard
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CON, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 695* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11727* (US)]; PRY[*Hassler, E. 9568* (B, BM, G, K, NY, P)].

Lagochilium ornatum (Nees) Nees = **Aphelandra ornata** (Nees) T. Anderson
Referencias: Wasshausen, D. C., 1975.

Lepidagathis Willd.

Número de especies: 2

Lepidagathis alopecuroides (Vahl) Griseb.
Sin.: *Ruellia alopecuroidea* Vahl
Referencias: Daniel, T. F., 1995; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 20659* (C, G, US)].

Lepidagathis alvarezia (Nees) Kameyama ex Wassh. & J.R.I. Wood
Sin.: *Lophostachys alvarezia* Nees, *Lophostachys conferta* Rusby
Referencias: Ezcurra, C., 1993a; Kameyama, C., 1995; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Hierba. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5325* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 3957* (G)].

[Lepidagathis diffusa (Nees) Lindau]
Sin.: *Teliostachya diffusa* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Leptostachya comata (L.) Nees = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Leptostachya lucida Nees = **Justicia lucida** (Nees) Lindau, hom. illeg.
Referencias: Lillo, M., 1937.

Leptostachya martiana Nees = **Justicia comata** (L.) Lam.

Leptostachya parviflora Nees = **Justicia comata** (L.) Lam.

Libonia floribunda C. Koch = **Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.
Referencias: Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998.

Lophostachys alvarezia Nees = **Lepidagathis alvarezia** (Nees) Kameyama ex Wassh. & J.R.I. Wood
Referencias: Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Lophostachys conferta Rusby = **Lepidagathis alvarezia** (Nees) Kameyama ex Wassh. & J.R.I. Wood
Referencias: Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.

Lophothecium boliviensis Bremek. = **Justicia kuntzei** Lindau
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Lophothecium paniculatum Rizzini = **Justicia glaziovii** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Lychniothyrsus hygrophilus (Mart.) Bremek. = **Ruellia hygrophila** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Mendoncia Vell.

Número de especies: 2

Mendoncia coccinea Vell. = **Mendoncia velloziana** (Mart.) Nees
Referencias: Profice, S. R., 1988.

Mendoncia fulva Lindau = **Mendoncia velloziana** (Mart.) Nees

Mendoncia puberula (Mart.) Nees
Sin.: *Mendozia puberula* Mart.
Referencias: Profice, S. R., 1988; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Liana. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6982* (FLOR, HBR)].

Mendoncia velloziana (Mart.) Nees
Sin.: *Mendoncia coccinea* Vell., *Mendoncia fulva* Lindau, *Mendozia velloziana* Mart.
Referencias: Profice, S. R., 1988; Rambo, B., 1964.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9203* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 11357* (SI)].

Mendozia puberula Mart. = **Mendoncia puberula** (Mart.) Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Mendozia velloziana Mart. = **Mendoncia velloziana** (Mart.) Nees

Odontonema Nees

Número de especies: 1 introducida

Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze
Sin.: *Thyrsacanthus cuspidatus* Nees
Referencias: Daniel, T. F., 1995.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 40005* (MO, PY)].

Odontonema dubiosum Lindau = **Streblacanthus dubiosus** (Lindau) V.M. Baum
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Odontophyllum hieronymi (Griseb.) Sreem. = **Aphelandra hieronymi** Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Oplonia Raf.

Número de especies: 1

Oplonia jujuyensis Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1993; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Iudica, C. 91* (SI)].

Orthotactus aequilabris Nees = **Justicia aequilabris** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Orthotactus glandulosus Nees = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1984.

Pentstemonacanthus modestus Nees = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Poikilacanthus Lindau

Número de especies: 1

Poikilacanthus flexuosus (Nees) Lindau = **Poikilacanthus glandulosus** (Nees) Ariza
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Poikilacanthus gilliesii (Nees) Lindau = **Justicia gilliesii** (Nees) Benth.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Poikilacanthus glandulosus (Nees) Ariza
Sin.: *Adhatoda flexuosa* Nees, *Adhatoda umbrosa* Nees, *Beloperone spathulata* (Nees & Mart.) Nees, *Ecbolium flexuosum* (Nees) Kuntze, *Ecbolium umbrosum* (Nees) Kuntze, *Justicia flexuosa* (Nees) Wassh. & L.B. Sm., *Justicia spathulata* Nees & Mart., *Justicia umbrosa* (Nees) Lindau, hom. illeg., *Orthotactus glandulosus* Nees, *Poikilacanthus flexuosus* (Nees) Lindau
Referencias: Ariza Espinar, L., 1984; Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002; Rambo, B., 1964; Stutz, L. C., 1983; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1160* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3625* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1933* (G)]; URY[*Osten, C. 5424* (CORD)].

Poikilacanthus phyllocalyx Lindau = **Justicia phyllocalyx** (Lindau) Wassh. & C. Ezcurra
Referencias: Wasshausen, D. C. & Ezcurra, C., 1997.

Poikilacanthus tweedianus (Nees) Lindau = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983b.

Poikilacanthus tweedianus (Nees) Lindau var. *angustifolius* (Nees) Lindau = **Justicia tweediana** (Nees) Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983a.

Psacadocalymma comatum (L.) Bremek. = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Pseuderanthemum Radlk.

Número de especies: 1

[Pseuderanthemum cordatum (Nees) Radlk.]
Sin.: *Eranthemum cordatum* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pseuderanthemum riedelianum (Nees) Rizzini
Sin.: *Eranthemum riedelianum* Nees
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Arbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5787* (US)].

Rhytiglossa anagallis Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa axillaris Nees = **Justicia axillaris** (Nees) Lindau
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa campestris Nees = **Justicia axillaris** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa cuspidulata Nees = **Justicia cuspidulata** (Nees) Wassh.
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa dasyclados Nees = **Justicia dasyclados** (Nees) Lindau

Rhytiglossa laevilinguis Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Dawson, G., 1979a.

Rhytiglossa laevilinguis Nees var. *longifolia* Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa oblonga Nees = **Justicia oblonga** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C. & Acosta-Castellanos, S., 1997.

Rhytiglossa obtusifolia Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa obtusifolia Nees var. *hirsuticaulis* Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa paniculata Nees = **Justicia glaziovii** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Rhytiglossa poeppigiana Nees = **Justicia poeppigiana** (Nees) Lindau

Rhytiglossa repens Nees = **Justicia laevilinguis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Ruellia L.

Número de especies: 25, 5 endémicas

Ruellia alopecuroidea Vahl = **Lepidagathis alopecuroides** (Vahl) Griseb.
Referencias: Daniel, T. F., 1995.

Ruellia amoena Nees, nom. nud. = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo
Sin.: *Ruellia sanguinea* Griseb. var. *flaviflorus* Hassl., *Ruellia sanguinea* Griseb. var. *glabrescens* Hassl., *Ruellia sanguinea* Griseb. var. *tomentosula* Hassl., *Stephanophysum angustiflorum* Nees, *Stephanophysum quadrifarium* Nees
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ezcurra, C., 1989b, 1993c; Rambo, B., 1964.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6853* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 37067* (CTES)]; PRY[*Pedersen, T. M. 14390* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2053* (MVFA)].

Ruellia angustifolia (Nees) Griseb. ex Lillo, hom. illeg. = **Ruellia simplex** Wright

[Ruellia bahiensis (Nees) Morong]
Sin.: *Dipteracanthus bahiensis* Nees
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983c.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ruellia brachysiphon (Nees) Lindau
Sin.: *Dipteracanthus brachysiphon* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6540* (SI)]; BRA[*Sellow, F. 68* (B, F, K)]; PRY[*Zardini, E. M. 51250* (AS, MO, SI)].

Ruellia brasiliensis Spreng. = **Hygrophila costata** Nees
Referencias: Daniel, T. F., 1995.

Ruellia brevicaulis (Nees) Lindau
Sin.: *Dipteracanthus brevicaulis* Nees, *Dipteracanthus dissitifolius* Nees var. *humilior* Nees, *Ruellia dissitifolia* (Nees) Hieron. var. *humilior* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a, c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28593* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 3246* (HBR, US)]; PRY[*Schinini, A. 21941* (LIL)].

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra
Sin.: *Cyrtacanthus corymbosus* Nees, nom. nud., *Echinacanthus dichotomus* Kuntze, *Ruellia amoena* Nees, nom. nud., *Ruellia graecizans* Baker, *Ruellia longifolia* (Pohl) Griseb., *Ruellia serratitheca* Rusby, *Ruellia ventricosa* Kunth, *Stephanophysum brevifolium* Pohl, *Stephanophysum longifolium* Pohl, *Stephanophysum macrandrum* Bremek., *Stephanophysum ventricosum* (Kunth) Nees
Referencias: Ariza Espinar, L., 1983c; Ezcurra, C., 1989b, 1993a, c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28048* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 7431* (HBR, MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 93* (BM, CTES, PY), *Krapovickas, A. 13407* (SI)].

Ruellia brittoniana Leonard ex Fernald = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia bulbifera Lindau
Sin.: *Dipteracanthus tuberosus* Nees, *Ruellia loefgrenii* Lindau
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 5970* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1000* (LP, MBM, RB)]; PRY[*Zardini, E. M. 49147* (MO, SI)].

Ruellia calvescens (Nees) Lindau = **Ruellia solitaria** Vell.

Ruellia ciliatiflora Hook.
Sin.: *Arrhostoxylum ciliatiflorum* (Hook.) Nees, *Ruellia lorentziana* Griseb., *Ruellia lorentziana* Griseb. f. *parvifolia* Hassl., *Ruellia lorentziana* Griseb. var. *paraguariensis* Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, AMA, CAN, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30998* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7944* (G)].

Ruellia coerulea Morong = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia confinis (Nees) Lindau = **Ruellia solitaria** Vell.

[Ruellia dissitifolia (Nees) Hieron.]
Sin.: *Dipteracanthus dissitifolius* Nees
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ruellia dissitifolia (Nees) Hieron. var. *humilior* Nees = **Ruellia brevicaulis** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia dulcis Cav. = **Stenandrium dulce** (Cav.) Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Ruellia elegans Poir.
Sin.: *Arrhostoxylum elegans* (Poir.) Bremek., *Arrhostoxylum formosum* (Andr.) Nees, *Arrhostoxylum silvaccola* Nees var. *montanum* Nees, *Ruellia formosa* auct. non Humb. & Bonpl.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Kameyama, C., 1995.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6401* (MBM, US)].

Ruellia epallocaulos Leonard ex C. Ezcurra & Wassh.
Referencias: Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1992; Ezcurra, C., 1993c.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 512* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 5025* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5372* (G, GH, K, LIL, SI, US)].

Ruellia erythropus (Nees) Lindau
Sin.: *Blechum mexicanum* Oerst., *Blechum tweedii* Nees, *Pentstemonacanthus modestus* Nees, *Ruellia mattogrossensis* Lindau, *Ruellia pubiflora* Griseb., *Ruellia tweedii* (Nees) T. Anderson ex Morong & Britton, *Ruellia velascana* Lindau, *Siphonacanthus erythropus* Nees
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993a, c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 5888* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43996* (MBM, US)]; PRY[*Ramella, L. 2267lr* (G, SI)].

Ruellia filicalyx Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1997.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2574* (SI, US)]; PRY[*Mereles, F. 4655* (CTES, FCQ)].

Ruellia formosa auct. non Humb. & Bonpl. = **Ruellia elegans** Poir.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia geminiflora Kunth
Sin.: *Copioglossa pilosa* Miers, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *angustifolius* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *erectus* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *hirsutior* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *procumbens* Nees, *Dipteracanthus geminiflorus* Nees var. *subacaulis* Nees, *Dipteracanthus humilis* Nees, *Dipteracanthus vindex* Nees, *Ruellia geminiflora* Kunth var. *hirsutior* Nees, *Ruellia hirsuta* Vell.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993c; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2182* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2068* (MBM, US)]; PRY[*Hassler, E. 5382* (G)].

Ruellia geminiflora Kunth var. *hirsutior* Nees = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia geminiflora Kunth var. *humilis* Griseb., nom. nud. = **Dyschoriste humilis** Lindau
Referencias: Dawson, G., 1979a.

Ruellia glanduloso-punctata (Nees) Lindau = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia graecizans Baker = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia hirsuta Vell. = **Ruellia geminiflora** Kunth
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia hygrophila Mart.
Sin.: *Cryphiacanthus udus* Nees, *Lychniothyrsus hygrophilus* (Mart.) Bremek., *Ruellia hygrophila* Mart. var. *glabrescens* Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1993c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. 22* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2197* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7173* (MVFA)].

Ruellia hygrophila Mart. var. *glabrescens* Hassl. = **Ruellia hygrophila** Mart.

Ruellia hypericoides (Nees) Lindau
Sin.: *Dipteracanthus hypericoides* Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Rambo, B., 1964.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(MIE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tur, N. M. 1927* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 26077* (LIL)]; PRY[*Arbo, M. M. 1885* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 7173b* (MVFA, US)].

Ruellia ignorantiae Herter = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia kleinii C. Ezcurra & Wassh.
Referencias: Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1992; Ezcurra, C., 1993c.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7333* (HBR, MBM, US)].

Ruellia kuntzei Lindau = **Ruellia sanguinea** Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia lanceolata Morong = **Justicia rusby** (Lindau) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Ruellia loefgrenii Lindau = **Ruellia bulbifera** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia longifolia (Pohl) Griseb. = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1989b.

Ruellia longipedunculata Lindau
Sin.: *Stephanophysum brookeae* Bremek.
Referencias: Ezcurra, C., 1989b, 1993a, c.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27816* (SI)].

Ruellia lorentziana Griseb. = **Ruellia ciliatiflora** Hook.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia lorentziana Griseb. f. *parvifolia* Hassl. = **Ruellia ciliatiflora** Hook.

Ruellia lorentziana Griseb. var. *paraguariensis* Hassl. = **Ruellia ciliatiflora** Hook.

Ruellia macrosolen Lillo ex C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C. & de Azkue, D., 1989; Ezcurra, C., 1993a, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5211* (BA, LIL, LP, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4512* (BM, G)].

Ruellia magniflora C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 9844* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 52115* (MO, SI)].

Ruellia mattogrossensis Lindau = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia microphylla (Nees) Lindau = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia morongii Britton
Sin.: *Cryphiacanthus acaulis* Nees
Referencias: Dawson, G., 1979a; Ezcurra, C., 1993c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1964.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN, CON, PAI, SPE); URY(ART, PAY, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6574* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 29403* (LIL)]; PRY[*Kiesling, R. 9561* (G, PY, SI)]; URY[*Castellanos, A. 18371* (LIL, LP)].

Ruellia multifolia (Nees) Lindau f. *viscidula* Hassl. = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. *hirsuta* Hassl. = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **multifolia**

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **multifolia**
Sin.: *Dipteracanthus multifolius* Nees, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau var. *hirsuta* Hassl.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3299* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7621* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 3259* (G)].

Ruellia multifolia (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Sin.: *Dipteracanthus glanduloso-punctatus* Nees, *Dipteracanthus viscosissimus* Nees, *Ruellia glanduloso-punctata* (Nees) Lindau, *Ruellia multifolia* (Nees) Lindau f. *viscidula* Hassl., *Ruellia viscosissima* (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CON, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 910* (US)]; BRA[*Sellow, F. 1413* (B, K)]; PRY[*Hassler, E. 8009* (G)].

Ruellia nobilis (S. Moore) Lindau
Sin.: *Salpingacanthus nobilis* S. Moore
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 13638* (CTES, G, LIL, US)].

Ruellia pubiflora Griseb. = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia reitzii Wassh. & L.B. Sm.
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5154* (US)].

Ruellia sanguinea Griseb.
Sin.: *Arrhostoxylum kuntzei* (Lindau) Bremek., *Ruellia kuntzei* Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1989b, 1993a, c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 29a* (BA, LIL)].

Ruellia sanguinea Griseb. var. *flaviflorus* Hassl. = **Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau ex Rambo

Ruellia sanguinea Griseb. var. *glabrescens* Hassl. = **Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau ex Rambo

Ruellia sanguinea Griseb. var. *tomentosula* Hassl. = **Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau ex Rambo

Ruellia serratitheca Rusby = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia simplex Wright
Sin.: *Arrhostoxylum microphyllum* Nees, *Cryphiacanthus angustifolius* Nees, *Ruellia angustifolia* (Nees) Griseb. ex Lillo, hom. illeg., *Ruellia brittoniana* Leonard ex Fernald, *Ruellia coerulea* Morong, *Ruellia ignorantiae* Herter, *Ruellia microphylla* (Nees) Lindau, *Ruellia spectabilis* Britton, hom. illeg., *Ruellia tweediana* Griseb., *Ruellia tweediana* Griseb. ex Fernald, *Ruellia tweediana* Griseb. var. *brevifolia* Hassl., *Ruellia tweediana* Griseb. var. *spectabilis* Hassl.
Referencias: Daniel, T. F., 1995; Ezcurra, C., 1993c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, FLA, MON, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3179* (SI)]; BRA[*Palacios 1572* (LIL)]; PRY[*Arenas, P. 1265* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10459* (MVFA)].

Ruellia solitaria Vell.
Sin.: *Dipteracanthus calvescens* Nees, *Dipteracanthus confinis* Nees, *Dipteracanthus schauerianus* Nees, *Ruellia calvescens* (Nees) Lindau, *Ruellia confinis* (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Kameyama, C., 1995.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 345* (MBM, RB)].

Ruellia spectabilis Britton, hom. illeg. = **Ruellia simplex** Wright

[Ruellia tuberosa L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ruellia tweediana Griseb. = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia tweediana Griseb. ex Fernald = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia tweediana Griseb. var. *brevifolia* Hassl. = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia tweediana Griseb. var. *spectabilis* Hassl. = **Ruellia simplex** Wright

Ruellia tweedii (Nees) T. Anderson ex Morong & Britton = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia velascana Lindau = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia ventricosa Kunth = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia verticillata Spreng. = **Hygrophila costata** Nees
Referencias: Daniel, T. F., 1995.

Ruellia viscosissima (Nees) Lindau = **Ruellia multifolia** (Nees) Lindau var. **viscosissima** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Ruellia woolstonii C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Woolston, A. 989* (NY, US)].

Salpingacanthus nobilis S. Moore = **Ruellia nobilis** (S. Moore) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Sarotheca elegans Nees = **Justicia glutinosa** (Bremek.) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Sarotheca glutinosa Bremek. = **Justicia glutinosa** (Bremek.) V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Schaueria Nees

Número de especies: 1

Schaueria azaleiflora Rusby
Referencias: Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1990; Ezcurra, C., 1993a.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 8514* (SI)].

Schaueria caduciflora Griseb. = **Anisacanthus boliviensis** (Nees) Wassh.
Referencias: Wasshausen, D. C., 1992.

Sericographis affinis Rizzini = **Justicia brasiliana** Roth

Sericographis cordifolia Rizzini = **Justicia brasiliana** Roth

Sericographis parabolica Nees = **Justicia brasiliana** Roth

Sericographis pauciflora Nees = **Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998.

Sericographis pauciflora Nees var. *speciosior* Nees = **Justicia floribunda** (C. Koch) Wassh.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Peichoto, M. C., Ezcurra, C. & Wasshausen, D. C., 1998.

Sericographis squarrosa Nees = **Justicia brasiliana** Roth
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Siphonacanthus erythropus Nees = **Ruellia erythropus** (Nees) Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Siphonoglossa gentianifolia Lindau = **Carlowrightia sulcata** (Nees) C. Ezcurra

Siphonoglossa sulcata (Nees) Lindau = **Carlowrightia sulcata** (Nees) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Staurogyne Wall.

Número de especies: 2, 1 endémica

Staurogyne eustachya Lindau
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 945* (HBG, US)].

Staurogyne mandioccana (Nees) Kuntze
Sin.: *Ebermaiera mandioccana* Nees, *Ebermaiera sanctae-catharinae* Ness
Referencias: Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1851* (HBR, US)].

Stenandrium Nees

Número de especies: 6, 1 endémica

Stenandrium affine S. Moore
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9877* (G)].

Stenandrium breviflorum Bridar. = **Stenandrium diphyllum** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Stenandrium diphyllum Nees
Sin.: *Stenandrium breviflorum* Bridar., *Stenandrium diphyllum* Nees var. *longiscapum* Nees, *Stenandrium neesianum* Lindau
Referencias: Ariza Espinar, L. & Ferrucci, M. S., 1982; Ezcurra, C., 1993a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1964.
Hierba. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7580* (SI)]; BRA[*Sellow, F. 85* (K)]; PRY[*Woolston, A. L. 630* (SI)].

Stenandrium diphyllum Nees var. *exscapum* Nees = **Stenandrium dulce** (Cav.) Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Stenandrium diphyllum Nees var. *longiscapum* Nees = **Stenandrium diphyllum** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Stenandrium dulce (Cav.) Nees
Sin.: *Gerardia dulcis* (Cav.) S.F. Blake, *Nierembergia prunellaefolia* Dunal, *Ruellia dulcis* Cav., *Stenandrium diphyllum* Nees var. *exscapum* Nees, *Stenandrium parodii* Bridar., *Stenandrium trinerve* Nees
Referencias: Ariza Espinar, L. & Ferrucci, M. S., 1982; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ezcurra, C., 1993a; Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Wood, J. R. I., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VIII, IX, RME); PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ÑEE, PAI); URY(SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4893* (SI)]; BRA[*Sellow, F. 85* (K)]; CHL[*Hunziker, A. T. 20148* (CORD)]; PRY[*Hassler, E. 8055* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 10331* (MVFA)].

Stenandrium mandioccanum Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL); BRA(SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 2273* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13153* (HBR, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5373* (SI)].

Stenandrium neesianum Lindau = **Stenandrium diphyllum** Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Stenandrium parodii Bridar. = **Stenandrium dulce** (Cav.) Nees
Referencias: Dawson, G., 1965c.

Stenandrium pohlii Nees var. **breviscapum** Nees
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4098* (G)].

[Stenandrium pohlii Nees var. pohlii]
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Stenandrium pohlii Nees var. **pusillum** Nees
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, L. 49* (LE)].

Stenandrium tenellum Nees
Referencias: Rambo, B., 1964; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1212* (HBR, US)].

Stenandrium trinerve Nees = **Stenandrium dulce** (Cav.) Nees
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Stenandrium venatum Nees = **Aphelandra ornata** (Nees) T. Anderson
Referencias: Wasshausen, D. C., 1975.

Stephanophysum angustiflorum Nees = **Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau ex Rambo
Referencias: Ezcurra, C., 1993c; Rambo, B., 1964.

Stephanophysum brevifolium Pohl = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1989b; 1993c.

Stephanophysum brookeae Bremek. = **Ruellia longipedunculata** Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Stephanophysum longifolium Pohl = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Stephanophysum macrandrum Bremek. = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Stephanophysum quadrifarium Nees = **Ruellia angustiflora** (Nees) Lindau ex Rambo

Stephanophysum ventricosum (Kunth) Nees = **Ruellia brevifolia** (Pohl) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1993c.

Stethoma comata (L.) Britton = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Graham, V. A. W., 1988.

Streblacanthus Kuntze

Número de especies: 1

Streblacanthus boliviensis Lindau = **Streblacanthus dubiosus** (Lindau) V.M. Baum
Referencias: Ezcurra, C., 1993a.

Streblacanthus dubiosus (Lindau) V.M. Baum
Sin.: *Odontonema dubiosum* Lindau, *Streblacanthus boliviensis* Lindau
Referencias: Ezcurra, C., 1993a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3209* (CTES, SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4128* (SI)].

Teliostachya diffusa Nees = **Lepidagathis diffusa** (Nees) Lindau

Thalestris graminiformis Rizzini = **Justicia comata** (L.) Lam.
Referencias: Ezcurra, C., 2002; Graham, V. A. W., 1988.

Thunbergia Retz.

Número de especies: 3 introducidas

Thunbergia alata Bojer ex Sims
Referencias: Daniel, T. F., 1995; Ezcurra, C., 1993a; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Enredadera. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(SCA); PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 639* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 6295* (HBR, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1313* (G)].

Thunbergia fragans Roxb.
Referencias: Daniel, T. F., 1995; Wasshausen, D. C. & Smith, L. B., 1969.
Enredadera. Introducida. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7356* (FLOR)].

Thunbergia grandiflora Roxb.
Referencias: Daniel, T. F., 1995.
Enredadera. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 56758* (MO, SI)].

Thyrsacanthus cuspidatus Nees = **Odontonema cuspidatum** (Nees) Kuntze

ACERACEAE

1 género, 2 especies introducidas.

Acer L.

Número de especies: 2 introducidas

Acer negundo L.
Referencias: Burkart, A., 1957c; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000]; Williamson, J., 1967.
Árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 11493* (SRFA)].

Acer pseudoplatanus L.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3462* (BCRU)].

ACHARIACEAE

Autor: Zmarzty, S.

1 género,1 especie introducida.

Chilmoria pentandra Buch.-Ham. = **Hydnocarpus pentandrus** (Buch.-Ham.) Oken
Referencias: Soloaga, M., Cottier, E. & Spichiger, R., 2000.

Hydnocarpus Gaertn.

Número de especies: 1 introducida

Hydnocarpus pentandrus (Buch.-Ham.) Oken
Sin.: *Chilmoria pentandra* Buch.-Ham.
Referencias: Soloaga, M., Cottier, E. & Spichiger, R., 2000.
Árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 5086* (G)].

ACHATOCARPACEAE

1 género, 5 especies, 2 especies endémicas.

Achatocarpus Triana

Número de especies: 5, 2 endémicas

Achatocarpus balansae Schinz & Autran
Referencias: Schinz, H. & Autran, E. J. B., 1893; Skvarla, J. J. & Nowicke, J. W., 1982; Walter, H., 1909.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 674* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 2282* (G)].

Achatocarpus bicornutus Schinz & Autran = **Achatocarpus praecox** Griseb. var. **bicornutus** (Schinz & Autran) Botta
Referencias: Botta, S. M., 1987.

Achatocarpus brevipedicellatus H. Walter
Referencias: Walter, H., 1909.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6926* (G)].

Achatocarpus hasslerianus Heimerl
Referencias: Heimerl, A., 1934b.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8878* (W)].

Achatocarpus microcarpus Schinz & Autran
Referencias: Schinz, H. & Autran, E. J. B., 1893; Valenzuela Celis, E., 1993a; Walter, H., 1909.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 2281* (G)].

[Achatocarpus nigricans Triana]
Referencias: Eliasson, U., 1993; Skvarla, J. J. & Nowicke, J. W., 1982; Valenzuela Celis, E., 1993a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Achatocarpus obovatus Schinz & Autran = **Achatocarpus praecox** Griseb. f. **obovatus** (Schinz & Autran) Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1913a.

Achatocarpus praecox Griseb. f. **obovatus** (Schinz & Autran) Hauman
Sin.: *Achatocarpus obovatus* Schinz & Autran
Referencias: Digilio, A. P. L., 1974; Hauman, L. L., 1913a; Schinz, H. & Autran, E. J. B., 1893; Skvarla, J. J. & Nowicke, J. W., 1982; Walter, H., 1909.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 2283* (G), *Hassler, E. 12207* (US)].

Achatocarpus praecox Griseb. f. **spinolosus** (Griseb.) Hauman
Sin.: *Achatocarpus spinulosus* Griseb.
Referencias: Digilio, A. P. L., 1974; Hauman, L. L., 1913a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 472* (US)].

Achatocarpus praecox Griseb. var. **bicornutus** (Schinz & Autran) Botta
Sin.: *Achatocarpus bicornutus* Schinz & Autran
Referencias: Botta, S. M., 1987; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Flaster, R. B. & Santos, E., 1967; Schinz, H. & Autran, E. J. B., 1893; Walter, H., 1909.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, GUA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21187* (SI), *Burkart, A. 28618* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14119* (HBR, R)]; PRY[*Degen, R. 2798* (CTES, FCQ, MO)].

Achatocarpus praecox Griseb. var. **praecox**
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Digilio, A. P. L., 1974; Hauman, L. L., 1913a; Novara, L. J., 1993i; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(APY, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4154* (SI), *Morrone, O. 909* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 1949a* (SI), *Soria, N. 2329* (FCQ)].

Achatocarpus spinulosus Griseb. = **Achatocarpus praecox** Griseb. f. **spinolosus** (Griseb.) Hauman
Referencias: Digilio, A. P. L., 1974.

ADOXACEAE

2 géneros, 3 especies.

Sambucus L.

Número de especies: 2

Sambucus australis Cham. & Schltdl.
Sin.: *Sambucus pentagynia* Larrañaga
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974b; Bolli, R., 1994, 2001; Cabrera, A. L., 1965d; Reitz, R., 1985; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, GUA, ITA, PAI); URY(MON, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1517* (SI)]; BRA[*Bornmüller, A. 177* (G, Z), *Rambo, B. 52979* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4376* (SI), *Soria, N. 2617* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 373* (SI)].

Sambucus graveolens Willd. = **Sambucus nigra** L. subsp. **peruviana** (Kunth) R. Bolli
Referencias: Bolli, R., 1994.

Sambucus nigra L. subsp. **nigra**
Referencias: Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Ezcurra, C., 1999c; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto o árbol. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 10027* (BAB)]; CHL[*Marticorena, C. 1657* (CONC)].

Sambucus nigra L. subsp. **peruviana** (Kunth) R. Bolli
Sin.: *Sambucus graveolens* Willd., *Sambucus peruviana* Kunth
Referencias: Bolli, R., 1994; Ezcurra, C., 1999c; Pontiroli, A., 1993d.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000–2700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, NEU, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 17446* (ZT), *Morrone, O. 3806* (SI), *Novara, L. J. 8175* (SI), *Venturi, S. 5387* (SI)].

Sambucus pentagynia Larrañaga = **Sambucus australis** Cham. & Schltdl.
Referencias: Bolli, R., 1994.

Sambucus peruviana Kunth = **Sambucus nigra** L. subsp. **peruviana** (Kunth) R. Bolli
Referencias: Bolli, R., 1994.

Viburnum L.

Número de especies: 1

Viburnum glabratum Kunth var. *sphaerocarpum* Griseb. = **Viburnum seemenii** Graebn. f. **minus** Killip & A.C. Sm.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1954.

[Viburnum jelskii Zahlbr.]
Referencias: Killip, E. P. & Smith, A. C., 1931.
Notas: Cita dudosa para la flora de Chile.

Viburnum seemenii Graebn. f. **minus** Killip & A.C. Sm.
Sin.: *Viburnum glabratum* Kunth var. *sphaerocarpum* Griseb.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1954; Killip, E. P. & Smith, A. C., 1931; Pontiroli, A., 1993d.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20313* (LP, SI)].

AEXTOXICACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Aextoxicon Ruiz & Pav.

Número de especies: 1 endémica

Aextoxicon punctatum Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Dimitri, M. J., 1974a; Fortunato, R. H., 1988a, 1997a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 2164* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994944* (CONC), *Diem, J. 1107* (SI)].

AIZOACEAE

8 géneros, 19 especies, 9 especies endémicas, 8 especies introducidas.

Aizoon pubescens Eckl. & Zeyh. = **Galenia pubescens** (Eckl. & Zeyh.) Druce
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 2002.

Aptenia N.E. Br.

Número de especies: 1 introducida

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes
Sin.: *Mesembryanthemum cordifolium* L. f.
Referencias: Fabris, H. A., 1967b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ruíz Leal, R. A. & Roig, F. A., 1966[1964].
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(BAI, MEN, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7193* (LP)].
Notas: Originaria de Sudáfrica, escapada de cultivo en Argentina.

Carpobrotus N.E. Br.

Número de especies: 2, 1 endémica, 1 introducida

Carpobrotus aequilaterus auct. non (Haw.) N.E. Br. = **Carpobrotus chilensis** (Molina) N.E. Br.

Carpobrotus chilensis (Molina) N.E. Br.
Sin.: *Carpobrotus aequilaterus* auct. non (Haw.) N.E. Br., *Mesembryanthemum chilense* Molina
Referencias: Boelcke, O., 1992; Daciuk, J., 1979; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Daciuk, J. 822* (Herb. J. Daciuk)]; CHL[*Marticorena, C. 209* (CONC)].

Carpobrotus edulis (L.) N.E. Br.
Sin.: *Mesembryanthemum edulis* L.
Referencias: Boelcke, O., 1992.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 8727* (BAA)].

Cryophytum cristallinum (L.) N.E. Br. = **Mesembryanthemum crystallinum** L.

Cryophytum nodiflorum (L.) L. Bolus = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.
Referencias: Taylor, C. M., 1992.

Cypselea Turpin
Número de especies: 1 introducida

Cypselea humifusa Turpin
Referencias: Eskuche, U. G., 1989.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1723-12* (CTESN)].

Demidovia tetragonoides Pall. = **Tetragonia tetragonoides** (Pall.) Kuntze
Referencias: Fabris, H. A., 1967b; Taylor, C. M., 1994a; Troncoso, N. S., 1987a.

Galenia L.
Número de especies: 1 introducida

Galenia pubescens (Eckl. & Zeyh.) Druce
Sin.: *Aizoon pubescens* Eckl. & Zeyh.
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 2002.
Hierba. Introducida. 400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 3073* (B, CONC, SGO, Z)].

Gasoul crystallinum (L.) Rothm. = **Mesembryanthemum crystallinum** L.

Gasoul nodiflorum (L.) Rothm. = **Mesembryanthemum nodiflorum** L.

Mesembryanthemum L.
Número de especies: 2 introducidas

Mesembryanthemum chilense Molina = **Carpobrotus chilensis** (Molina) N.E. Br.
Referencias: Boelcke, O., 1992.

Mesembryanthemum cordifolium L. f. = **Aptenia cordifolia** (L. f.) Schwantes
Referencias: Fabris, H. A., 1967b.

Mesembryanthemum crystallinum L.
Sin.: *Cryophytum cristallinum* (L.) N.E. Br., *Gasoul crystallinum* (L.) Rothm.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1984a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(II, III, IV, V, IDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2714* (BAB, SI)]; CHL[*Marticorena, C. 1670* (CONC)].

Mesembryanthemum edulis L. = **Carpobrotus edulis** (L.) N.E. Br.
Referencias: Boelcke, O., 1992.

Mesembryanthemum nodiflorum L.
Sin.: *Cryophytum nodiflorum* (L.) L. Bolus, *Gasoul nodiflorum* (L.) Rothm.
Referencias: Boelcke, O., 1992; Daciuk, J., 1979; Hunziker, A. T., 1984g; Pérez-Moreau, R. L., 1984a; Taylor, C. M., 1992.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crespo, S. 1798* (BAB, SI)]; CHL[*Taylor, C. M. 10815* (CONC, MO)].

Portulaca portulacastrum L. = **Sesuvium portulacastrum** (L.) L.
Referencias: Fabris, H. A., 1967b; Taylor, C. M., 1994.

Sesuvium L.
Número de especies: 1 introducida

Sesuvium portulacastrum (L.) L.
Sin.: *Portulaca portulacastrum* L., *Sesuvium sessile* Pers., *Trianthema americana* Gillies ex Arn.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967b; Kiesling, R., 1994a; Pérez-Moreau, R. L., 1984a; Reitz, R., 1984a; Taylor, C. M., 1992; Troncoso, N. S., 1987a.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA); CHL(I); PRY(APY, PHA); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22977* (SI), *Pozner, R. 352* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5516* (HBR)]; CHL[*Villagrán, C. 1019* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 5224* (FCQ, MO, SI)]; URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].

[Sesuvium sessile Larrañaga, hom. illeg.]
Referencias: Xifreda, C. C., 1999a.
Notas: Nombre dudoso.

Sesuvium sessile Pers. = **Sesuvium portulacastrum** (L.) L.
Referencias: Troncoso, N. S., 1987a.

Tetragonia L.

Número de especies: 9, 7 endémicas, 1 introducida

Tetragonia angustifolia Barnéoud
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Arbolito. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1911* (CONC)].

Tetragonia copiapina Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 10798* (CONC, MO)].

Tetragonia espinosae Muñoz
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 212* (GH, SGO)].

Tetragonia expansa Murray = **Tetragonia tetragonoides** (Pall.) Kuntze
Referencias: Fabris, H. A., 1967b; Taylor, C. M., 1994a; Troncoso, N. S., 1987a.

Tetragonia horrida Britton = **Sclerophylax spinescens** Miers
Referencias: Gereau, R. E., 1993.

Tetragonia kuntzei Kuntze = **Tetragonia microcarpa** Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.

Tetragonia macrocarpa Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(II, III, IV, IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5050* (GH)].

Tetragonia macrocarpa Phil. var. *microcarpa* (Phil.) Reiche = **Tetragonia microcarpa** Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.

Tetragonia maritima Barnéoud
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Arbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 1330* (SGO)].

Tetragonia microcarpa Phil.
Sin.: *Tetragonia kuntzei* Kuntze, *Tetragonia macrocarpa* Phil. var. *microcarpa* (Phil.) Reiche, *Tetragonia tenella* I.M. Johnst., *Tetragonia trigona* Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 6967* (CONC)].

Tetragonia ovata Phil.
Sin.: *Tetragonia robusta* Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 9897* (G)].

Tetragonia pedunculata Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 10810* (MO)].

Tetragonia robusta Phil. = **Tetragonia ovata** Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.

Tetragonia tenella I.M. Johnst. = **Tetragonia microcarpa** Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.

Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze
Sin.: *Demidovia tetragonoides* Pall., *Tetragonia expansa* Murray
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Boelcke, O., 1992; Fabris, H. A., 1967b; Taylor, C. M., 1994a; Troncoso, N. S., 1987a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, FOR, TUC); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VII, VIII, X, IDE, IJF, RME); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8288* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 37706* (CTES)]; CHL[*Zöllner, O. 1866* (CONC)]; URY[*Alonso Paz, E. 3622* (MVFQ)].

Tetragonia trigona Phil. = **Tetragonia microcarpa** Phil.
Referencias: Taylor, C. M., 1994a.

Trianthema L.

Número de especies: 2, 1 endémica

Trianthema americana Gillies ex Arn. = **Sesuvium portulacastrum** (L.) L.

Trianthema argentina Hunz. & Coccuci
Referencias: Hunziker, A. T. & Coccuci, A. E., 1960[1959].
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 13865* (CORD)].

Trianthema portulacastrum L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1971b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1370* (LIL)]; PRY[*Mereles, F. 4823* (CTES, FCQ, MO)].

AMARANTHACEAE

Autores: Borsch, T.

15 géneros, 137 especies, 40 especies endémicas, 10 especies introducidas.

Achyranthes altissima Jacq. = **Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Sohmer, S. H., 1977.

Achyranthes bangii Standl. = **Alternanthera paniculata** Kunth

Achyranthes ficoidea (L.) Lam., nom. illeg. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **paronychioides**
Referencias: Mears, J. A., 1977; Veldkamp, J., 1978.

Achyranthes halimifolia Lam. = **Alternanthera halimifolia** (Lam.) Standl. ex Pittier

Achyranthes hassleriana (Chodat) Standl. = **Alternanthera aquatica** (D. Parodi) Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Rehfous, L., 1927.

Achyranthes lehmannii (Hieron.) Standl. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Achyranthes leiantha (Seub.) Standl. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Achyranthes lorentzii (Uline) Standl. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977.

Achyranthes mexicana (Schltdl.) Standl. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Achyranthes mucronata Lam., nom. illeg. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Achyranthes paludosa Bunbury = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Covas, G., 1939b.

Achyranthes paraguayensis Standl. = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**

Achyranthes peploides (Willd. ex Roem. & Schult.) Britton = **Alternanthera caracasana** Kunth

Achyranthes philoxeroides (Mart.) Standl. = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Mears, J. A., 1977; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Achyranthes pilosa (Moq.) Standl. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1984a.

Achyranthes porringens Jacq. = **Alternanthera porrigens** (Jacq.) Kuntze

Achyranthes puberula (Mart.) Standl. = **Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Achyranthes radicans Cav., nom. illeg. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Achyranthes ramosissima (Mart.) Standl. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Achyranthes reineckii (Briq.) Standl. = **Alternanthera reineckii** Briq.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Achyranthes repens L. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1984a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Achyranthes rufa (Mart.) Standl. = **Alternanthera rufa** (Mart.) D. Dietr.

Achyranthes seubertii Standl. = **Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.

Aerva velutina (Walp.) Moq. = **Pupalia lappacea** (L.) Juss. var. **velutina** (Walp.) Hook. f.

Alternanthera Forssk.

Número de especies: 36, 12 endémicas

Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet, nom. illeg. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1984a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet var. *dasyantha* Seub. = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977.

Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet var. *leiantha* Seub. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet var. *parvifolia* Moq. = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Fabris, H. A., 1967c.

Alternanthera adscendens Suess.
Referencias: Suessenguth, K., 1937.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 2792* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6098* (B)].

Alternanthera albida (Moq.) Griseb.
Sin.: *Achyranthes seubertii* Standl., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *amentacea* Suess., *Alternanthera albida* (Moq.) Griseb. f. *globifera* Suess., *Alternanthera tomentella* Seub., *Telanthera albida* Moq.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Grisebach, A. H. R., 1874; Moquin-Tandon, A., 1849.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 19805* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5145* (CTES, FCQ, MO)].

Alternanthera albida (Moq.) Griseb. f. *amentacea* Suess. = **Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.

Alternanthera albida (Moq.) Griseb. f. *globifera* Suess. = **Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.

Alternanthera altacruzensis Suess.
Referencias: Suessenguth, K., 1950.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7010* (LP)].

Alternanthera aquatica (D. Parodi) Chodat
Sin.: *Achyranthes hassleriana* (Chodat) Standl., *Alternanthera hassleriana* Chodat, *Mogiphanes aquatica* D. Parodi
Referencias: Chodat, R. H. & Rehfous, L., 1927; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba acuática. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); PRY(COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz 598* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 5990* (CTES, FCQ)].

Alternanthera australis Covas = **Alternanthera suessenguthii** Covas
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1984a.

Alternanthera boliviana (Moq.) Usteri = **Gomphrena boliviana** Moq. f. **boliviana**
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Alternanthera boliviana (Moq.) Usteri subsp. *amentacea* Suess. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. **brasiliana**
Sin.: *Alternanthera dentata* (Moench) Scheygr., *Gomphrena brasiliana* L., *Gomphrena dentata* Moench, *Mogiphanes brasiliensis* L., *Philoxerus brasiliensis* (L.) R. Br., *Telanthera dentata* Moq.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 496* (HBR, US)].

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. *moquinii* (Webb ex Moq.) Uline & W.L. Bray = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. *strigosa* (Hassk.) Kuntze = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze
Sin.: *Achyranthes ramosissima* (Mart.) Standl., *Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze var. *moquinii* (Webb ex Moq.) Uline & W.L. Bray, *Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze var. *strigosa* (Hassk.) Kuntze, *Alternanthera moquinii* (Webb ex Moq.) Dusén, *Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat, *Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat var. *missionum* Pedersen, *Alternanthera ramosissima* (Mart.) Chodat var. *reptans* Pedersen, *Alternanthera strigosa* Hassk., *Mogiphanes ramosissima* Mart., *Mogiphanes villosa* Mart., *Mogiphanes virgata* Schrad., *Telanthera brasiliana* (L.) Moq. f. *grisea* Chodat, *Telanthera brasiliana* (L.) Moq. var. *villosa* Moq., *Telanthera moquinii* Webb ex Moq., *Telanthera ramosissima* (Mart.) Moq., *Telanthera virgata* (Schrad.) Moq.
Referencias: Martius, C. F. P. S., 1826; Pedersen, T. M., 1997b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 2442* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5808* (SI), *Reitz, P. R. 1368* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 5856* (BM)].

Alternanthera cana Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1994; Suessenguth, K., 1935.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30164* (SI)].

Alternanthera caracasana Kunth
Sin.: *Achyranthes peploides* (Willd. ex Roem. & Schult.) Britton, *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *dasyantha* Seub., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *parvifolia* Moq., *Alternanthera parvifolia* (Moq.) Fawc. & Rendle, *Alternanthera peploides* (Willd. ex Roem. & Schult.) Urb., *Celosia humifusa* Humb. & Bonpl. ex Schult., *Illecebrum peploides* Willd. ex Roem. & Schult., *Telanthera caracasana* (Kunth) Moq.
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1967; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, SAL, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 17* (LP)].

Alternanthera chacoënsis Morong ex Morong & Britton = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **chacoënsis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a.

Alternanthera cinerella Suess.
Referencias: Suessenguth, K., 1935.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 211* (SI)].

Alternanthera collina Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molina, A. M. 1833* (BAB)].

Alternanthera dentata (Moench) Scheygr. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Alternanthera denticulata R. Br. = **Alternanthera sessilis** (L.) R. Br.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Alternanthera echinata Sm. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Melville, R., 1958.

Alternanthera felipponei Beauverd = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera ficoidea (L.) Sm.
Sin.: *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Griseb. var. *diffusa* (Mart.) Hicken, *Alternanthera tenella* Colla, *Bucholzia ficoidea* (L.) Mart., *Gomphrena ficoidea* L.
Referencias: Brummitt, R. K., 1982; Veldkamp, J., 1978.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3603* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 21085* (CTES)]; PRY[*Brunner, D. R. 1365* (MO, PY)].

Alternanthera ficoidea (L.) Sm. f. *aberrans* Pedersen, nom. inval. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. f. **aberrans** Pedersen

Alternanthera ficoidea (L.) Sm. subsp. *chacoënsis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **chacoënsis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen

Alternanthera ficoidea (L.) Sm. subsp. *pilosa* (Moq.) Pedersen = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Alternanthera flavescens Kunth
Referencias: Borsch, T., 1993.
Hierba. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 43515* (CTES)].

Alternanthera friesii Schinz = **Alternanthera micrantha** R.E. Fr.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Suessenguth, K., 1952.

[Alternanthera frutescens (L'Hér.) Steud.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto. Mencionada por Seckt (1929) para la provincia de Córdoba, Argentina, sin indicar material de herbario ni localidad de recolección, es una especie de la costa pacífica del Perú.

Alternanthera glauca (Mart.) Hosseus = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier
Sin.: *Achyranthes halimifolia* Lam.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 410* (CONC)].

Alternanthera hassleriana Chodat = **Alternanthera aquatica** (D. Parodi) Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Rehfous, L., 1927.

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. **hirsuta** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1608* (BM, CTES, G, MO, PY)].

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Sin.: *Achyranthes paraguayensis* Standl., *Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E. Fr. var. *robusta* Chodat, *Alternanthera hirtula* (Mart.) R.E. Fr. var. *rosea* (Morong) Chodat, *Alternanthera rosea* (Morong) Uline & W.L. Bray, *Mogiphanes hirtula* Mart., *Mogiphanes rosea* Morong & Britton, *Telanthera hirtula* (Mart.) Moq., *Telanthera rosea* (Morong) Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *cinnabarina* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *typica* Chodat, nom. inval.
Referencias: Fries, R. E., 1920; Hauman, L. L., 1924; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAN, PAI); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Romanczuk, M. C. 781* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2167* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1943* (K), *Pedersen, T. M. 9340* (CTES)]; URY[*Sellow, F. s.n.* (M)].

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. **nitens** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ferrucci, M. S. 642* (CTES, K, LIL)].

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. *robusta* Chodat = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Alternanthera hirtula (Mart.) R.E. Fr. var. *rosea* (Morong) Chodat = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Alternanthera inaccessa Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Arbusto. Endémica. 700 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ramella, L. 2846* (C, G)].

Alternanthera junciflora (J. Remy) I.M. Johnst. = **Alternanthera porrigens** (Jacq.) Kuntze

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen subsp. **kurtzii**
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1967, 1987a, 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC); ; PRY(APY, CEN, CON, PHA); URY(ART, COL, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 1941* (CORD, Z), *Pedersen, T. M. 13359* (SI), *Venturi, S. 2157* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1956* (K)]; URY[*Gibert, J. E. 293* (K)].

Alternanthera kurtzii Schinz ex Pedersen subsp. **sclerosperma** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ramella, L. 2340* (G), *Schinini, A. 17884* (CTES, SI)].

Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz
Sin.: *Achyranthes lehmannii* (Hieron.) Standl., *Achyranthes mexicana* (Schltdl.) Standl., *Alternanthera lehmannii* Hieron., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron. var. *lehmannii* (Hieron.) Suess., *Alternanthera mexicana* (Schltdl.) Hieron., hom. illeg., *Alternanthera microcephala* (Moq.) Schinz, *Brandesia lanceolata* Benth., *Brandesia mexicana* Schltdl., *Telanthera lanceolata* (Benth.) Moq., *Telanthera microcephala* Moq.
Referencias: Eliasson, U., 1987.
Hierba. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34891* (SI)].

Alternanthera lehmannii Hieron. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Alternanthera lorentzii Suess., hom. illeg. = **Alternanthera suessenguthii** Covas
Referencias: Covas, G., 1939b; Pedersen, T. M., 1967, 1984a; Suessenguth, K., 1937.

Alternanthera lorentzii Uline = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Covas, G., 1941.

[Alternanthera macbridei Standl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **malmeana**
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Degen, R., Ortíz, M. & Zardini, E. M., 2005; Fries, R. E., 1920; Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 623* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 359* (S)]; PRY[*Martius, C. F. P. 9155* (NY)].

Alternanthera malmeana R.E. Fr. var. **straminea** (Chodat) Pedersen
Sin.: *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *pallens* Chodat, *Telanthera rosea* (Morong) Chodat var. *straminea* Chodat
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, ITA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4939* (G), *Jörgensen, P. 4713* (SI)].

Alternanthera maritima (Mart.) A. St.-Hil.
Sin.: *Bucholzia maritima* Mart.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5368* (SI), *Reitz, P. R. 5794* (HBR, US)].

Alternanthera mexicana (Schltdl.) Hieron., hom. illeg. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Alternanthera mexicana (Schltdl.) Hieron. var. *lehmannii* (Hieron.) Suess. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Alternanthera meyeriana (Regel & Körn.) Suess.
Sin.: *Alternanthera tucumana* Lillo, *Telanthera meyeriana* Regel & Körn.
Referencias: Descole, H. R., O´Donell, C. A. & Lourteig, A., 1939a; Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 4373* (LIL)].

Alternanthera micrantha R.E. Fr.
Sin.: *Alternanthera friesii* Schinz, *Alternanthera rufescens* Suess.
Referencias: Fries, R. E., 1920; Pedersen, T. M., 1976, 1997b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1263* (SI), *Zuloaga, F. O. 6678* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17728* (S)].

Alternanthera microcephala (Moq.) Schinz
= **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Alternanthera microphylla R.E. Fr. var. **maior** Suess.
Referencias: Suessenguth, K., 1939.
Hierba. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3734* (BOON, LPB, MCNS), *Venturi, S. 4842* (SI)].

Alternanthera microphylla R.E. Fr. var. **microphylla**
Referencias: Fries, R. E., 1905.
Hierba. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3725* (BONN, LPB, MCNS), *Hunziker, A. T. 10453* (SI)].

Alternanthera moquinii (Webb ex Moq.) Dusén
= **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Alternanthera morongii Uline = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **chacoënsis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

[Alternanthera multicaulis (Mart.) Kuntze]
Sin.: *Telanthera multicaulis* (Mart.) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Alternanthera negrensis Suess. = **Alternanthera suessenguthii** Covas
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1984a.

Alternanthera nodifera (Moq.) Griseb.
Sin.: *Telanthera nodifera* Moq.
Referencias: Del Vitto, L. A., Petenatti, E. M. & Petenatti, M. E., 1999; Pedersen, T. M., 1994.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 833* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 669* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 6412* (CTES)].

[Alternanthera paniculata Kunth]
Sin.: *Achyranthes bangii* Standl., *Illecebrum paniculatum* (Kunth) Spreng., *Mogiphanes paniculata* (Kunth) Rusby, *Telanthera paniculata* (Kunth) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. f. **aberrans** Pedersen
Sin.: *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. f. *aberrans* Pedersen, nom. inval.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a, 1999.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Abbiatti, D. 4287* (LP)]; URY[*Lombardo, A. 842* (MVJB)].

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. var. *amentacea* (Suess.) Suess. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. var. *chacöensis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen
= **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **chacoënsis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen

[Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. var. ovata Chodat]
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.
Notas: Nombre dudoso.

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. var. *pilosa* (Moq.) Suess. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **chacoënsis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **chacoënsis** (Morong ex Morong & Britton) Pedersen
Sin.: *Alternanthera chacoënsis* Morong ex Morong & Britton, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *chacoënsis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera morongii* Uline, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *chacöensis* (Morong ex Morong & Britton) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *robusta* Chodat
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pedersen, T. M., 1967, 1987a.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 173* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4353* (SI), *Mereles, F. 5633* (CTES, FCQ, MO)].

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **paronychioides**
Sin.: *Achyranthes ficoidea* (L.) Lam., nom. illeg., *Alternanthera polygonoides* (L.) R. Br. ex Griseb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8719* (SI)]; BRA[*Czermack 346* (G)].

Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen
Sin.: *Achyranthes pilosa* (Moq.) Standl., *Alternanthera boliviana* (Moq.) Usteri subsp. *amentacea* Suess., *Alternanthera felipponei* Beauverd, *Alternanthera ficoidea* (L.) Sm. subsp. *pilosa* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera fioidea* (L.) Sm. subsp. *pilosa* (Moq.) Pedersen, *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *amentacea* (Suess.) Suess., *Alternanthera paronychioides* A. St.-Hil. var. *pilosa* (Moq.) Suess., *Alternanthera pilosa* Moq.
Referencias: Covas, G., 1941; Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(ITA); URY(DUR, MON, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20281* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. s.n.* (CTES, ICN)]; PRY[*Hassler, E. 1400* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 160* (SI)].

Alternanthera parvifolia (Moq.) Fawc. & Rendle = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Fabris, H. A., 1967c.

Alternanthera peploides (Willd. ex Roem. & Schult.) Urb. = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. f. **angustifolia** Suess.
Sin.: *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *lancifolia* Chodat, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *luxurians* Chodat, *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *linearifolia* Chodat
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b; Suessenguth, K., 1934.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6857* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 33508* (AS, MO)].

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Sin.: *Achyranthes paludosa* Bunbury, *Achyranthes philoxeroides* (Mart.) Standl., *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *acutifolia* (Mart.) Hicken, *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. var. *obtusifolia* (Moq.) Hicken, *Bucholzia philoxeroides* Mart., *Bucholzia philoxeroides* Mart. var. *obtusifolia* Mart., *Mogiphanes philorexoides* D. Parodi, *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *denticulata* Seub., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *obtusifolia* Moq.
Referencias: Covas, G., 1941; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1967, 1987a, 1994; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1185* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 17343* (HBR, US)]; PRY[*Mereles, F. 4104* (FCQ)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 23* (MVFA)].

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. var. *acutifolia* (Mart.) Hicken = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. var. *lancifolia* Chodat = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **angustifolia** Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. var. *luxurians* Chodat = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **angustifolia** Suess.

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. var. *obtusifolia* (Moq.) Hicken = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Mears, J. A., 1977; Pedersen, T. M., 1967, 1987a.

Alternanthera pilosa Moq. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **pilosa** (Moq.) Pedersen

Alternanthera pilosa Moq. f. *petiolata* Chodat = **Alternanthera reineckii** Briq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera pilosa Moq. var. *microphylla* Chodat = **Alternanthera reineckii** Briq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera piptantha Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 3785* (G)].

Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. ex Griseb. = **Alternanthera paronychioides** A. St.-Hil. subsp. **paronychioides**
Referencias: Mears, J. A., 1977; Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. ex Griseb. var. *diffusa* (Mart.) Hicken = **Alternanthera ficoidea** (L.) Sm.
Referencias: Mears, J. A., 1977.

[Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. ex Griseb. var. elongata Suess.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

[Alternanthera polygonoides (L.) R. Br. ex Griseb. var. radicans (Mart.) Griseb.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze
Sin.: *Achyranthes porringens* Jacq., *Alternanthera junciflora* (J. Remy) I.M. Johnst., *Telanthera junciflora* J. Remy
Referencias: San Martin, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Nativa. 0–600 m.
Países: CHL(I, II, III, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Quezada, M. 248* (CONC)].

Alternanthera praelonga A. St.-Hil. var. **australis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27220* (MBM)].

[Alternanthera procumbens Rojas Acosta]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Alternanthera pungens*.

Alternanthera puberula (Mart.) D. Dietr.
Sin.: *Achyranthes puberula* (Mart.) Standl., *Alternanthera subumbellata* Suess., *Brandesia puberula* Mart., *Pfaffia puberula* (Mart.) Spreng., *Telanthera puberula* (Mart.) Moq.
Referencias: Martius, C. F. P. S., 1826; Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4038* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5363* (S)].

[Alternanthera pulchella Kunth]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Alternanthera pulchella Kunth var. ciliata Griseb.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Alternanthera pumila O. Stützer
Sin.: *Alternanthera pumila* O. Stützer var. *coarctata* O. Stützer
Referencias: Stützer, O., 1935.
Hierba. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 1507* (SI)].

Alternanthera pumila O. Stützer var. *coarctata* O. Stützer
= **Alternanthera pumila** O. Stützer

Alternanthera pungens Kunth
Sin.: *Achyranthes leiantha* (Seub.) Standl., *Achyranthes lorentzii* (Uline) Standl., *Achyranthes mucronata* Lam., nom. illeg., *Achyranthes radicans* Cav., nom. illeg., *Achyranthes repens* L., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet var. *leiantha* Seub., *Alternanthera achyrantha* (L.) R. Br. ex Sweet, nom. illeg., *Alternanthera echinata* Sm., *Alternanthera lorentzii* Uline, *Alternanthera pungens* Kunth f. *pauciflora* Suess., *Alternanthera pungens* Kunth var. *leiantha* (Seub.) Suess., *Alternanthera repens* (L.) Link, nom. illeg., *Celosia echinata* Willd. ex Schult., *Desmochaeta sordida* Bunbury, *Guilleminea procumbens* Rojas Acosta, *Illecebrum achyrantha* L., *Illecebrum pungens* (Kunth) Spreng., *Paronychia achyrantha* (L.) Desf., *Pityranthus crassifolius* Mart., *Pupalia sordida* (Bunbury) Moq., *Telanthera pungens* (Kunth) Moq.
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Melville, R., 1958; Pedersen, T. M., 1984a, 1987a, 1994; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR); PRY(CEN); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 55b* (SI), *Venturi, S. 612* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14363* (US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4341* (SI)]; URY[*Felippone, F. 5853* (SI), *Herter, W. G. F. 225* (SI)].

Alternanthera pungens Kunth f. *pauciflora* Suess.
= **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Alternanthera pungens Kunth var. *leiantha* (Seub.) Suess.
= **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Melville, R., 1958.

Alternanthera ramosissima (Mart.) Chodat
= **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze
Referencias: Borsch, T., 2001; Eliasson, U., 1987.

Alternanthera ramosissima (Mart.) Chodat var. *missionum* Pedersen = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Alternanthera ramosissima (Mart.) Chodat var. *reptans* Pedersen = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Alternanthera reineckii Briq.
Sin.: *Achyranthes reineckii* (Briq.) Standl., *Alternanthera pilosa* Moq. f. *petiolata* Chodat, *Alternanthera pilosa* Moq. var. *microphylla* Chodat
Referencias: Covas, G., 1941; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA); URY(ART, PAY, RIV, SAO, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8013* (SI), *Pedersen, T. M. 8045* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. 46* (SI), *Smith, L. B. 15579* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 6261* (G), *Montes, J. E. 3325* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Alternanthera repens (L.) Link, nom. illeg. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Melville, R., 1958; Pedersen, T. M., 1984a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Alternanthera rosea (Morong) Uline & W.L. Bray = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Alternanthera rufa (Mart.) D. Dietr.
Sin.: *Achyranthes rufa* (Mart.) Standl., *Brandesia rufa* Mart., *Pfaffia rufa* (Mart.) Spreng., *Telanthera rufa* (Mart.) Moq.
Referencias: Martius, C. F. P. S., 1826; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 8022* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13185* (SI), *Reitz, P. R. 17880* (HBR, US)].

Alternanthera rufescens Suess. = **Alternanthera micrantha** R.E. Fr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976, 1997b.

Alternanthera scandens Herzog
Referencias: Herzog, T. C. J., 1922.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34049* (SI)].

Alternanthera serpens Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Nicora, E. G. 9724* (SI), *Vanni, R. O. 2608* (CTES)].

Alternanthera sessilis (L.) R. Br.
Sin.: *Alternanthera denticulata* R. Br., *Gomphrena sessilis* L., *Illecebrum sessilis* (L.) L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 13713* (CTES, SI), *Reitz, P. R. 11217* (HBR, US)]; PRY[*Mereles, F. 4601* (FCQ, MO)].

Alternanthera strigosa Hassk. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Alternanthera subumbellata Suess. = **Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Alternanthera suessenguthii Covas
Sin.: *Alternanthera australis* Covas, *Alternanthera lorentzii* Suess., hom. illeg., *Alternanthera negrensis* Suess.
Referencias: Covas, G., 1939b; Pedersen, T. M., 1967, 1984a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 658* (SI), *Scala, A. C. 43* (LP)].
Notas: Posible sinónimo de *Alternanthera cana*. Probablemente crezca en Paraguay.

Alternanthera tenella Colla = **Alternanthera ficoidea** (L.) Sm.

Alternanthera tomentella Seub. = **Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.
Referencias: Suessenguth, K., 1934.

Alternanthera tucumana Lillo = **Alternanthera meyeriana** (Regel & Körn.) Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

[Alternanthera villosa Kunth]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Amarantellus argentinus Speg. = **Amaranthus deflexus** L.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Pedersen, T. M., 1984a, 1987a.

Amarantellus graecizans L. var. *pubescens* Uline & W.L. Bray = **Amaranthus albus** L.
Referencias: Fabris, H. A., 1967c.

Amaranthus L.

Número de especies: 27, 8 endémicas, 9 introducidas

Amaranthus affinis Thell. = **Amaranthus asplundii** Thell. var. **asplundii**
Referencias: Hunziker, A. T., 1966b.

Amaranthus albo-marginatus Uline & W.L. Bray = **Amaranthus californicus** (Moq.) S. Watson
Referencias: Hunziker, A. T., 1965.

Amaranthus albus L.
Sin.: *Amarantellus graecizans* L. var. *pubescens* Uline & W.L. Bray
Referencias: Covas, G., 1984b; Fabris, H. A., 1967c; Hunziker, A. T., 1965; Pedersen, T. M., 1984a, 1994.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE); URY(ART, DUR, MON, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 26* (CORD), *Lacan s.n.* (SI), *Nicora, E. G. 4032* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 9326* (MVFA)].

Amaranthus ascendens Loisel. = **Amaranthus blitum** L.
Referencias: Filias, F., Gaulliez, A. & Guédès, M., 1980.

Amaranthus asplundii Thell. var. **asplundii**
Sin.: *Amaranthus affinis* Thell., *Amaranthus buchtienianus* Thell.
Referencias: Hunziker, A. T., 1966b; Pedersen, T. M., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 2400–3600 m.
Países: ARG(JUJ, SJU); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2074* (CORD)]; CHL[*Hollermayer, A. 779* (CORD)].

Amaranthus asplundii Thell. var. **australis** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1966b.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1759* (CORD)].

Amaranthus ataco Thell. = **Amaranthus vulgatissimus** Speg.

Amaranthus blitoides S. Watson
Referencias: Hunziker, A. T., 1965; Pedersen, T. M., 1984a.
Hierba. Introducida. 2900–3000 m.
Países: ARG(LPA, RNE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4214* (CORD), *Pedersen, T. M. 15338b* (SI)].

Amaranthus blitum L.
Sin.: *Amaranthus ascendens* Loisel., *Amaranthus blitum* L. var. *polygonoides* Moq., *Amaranthus lividus* L. subsp. *polygonoides* (Moq.) Probst, *Amaranthus lividus* L. var. *ascendens* (Loisel.) Thell., *Amaranthus lividus* L. var. *polygonoides* (Moq.) Thell., *Euxolus viridis* (L.) Moq. var. *ascendens* (Loisel.) Moq.
Referencias: Filias, F., Gaulliez, A. & Guédès, M., 1980; Pedersen, T. M., 1984a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(COA); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1472* (SI), *Cabrera, A. L. 7940* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 45081* (CTES)]; PRY[*Burkart, A. 18232* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4950* (SI)].

Amaranthus blitum L. var. *graecizans* (L.) Moq. = **Amaranthus graecizans** L.

Amaranthus blitum L. var. *nanus* Moq. = **Amaranthus graecizans** L.
Referencias: Thellung, A., 1914.

Amaranthus blitum L. var. *polygonoides* Moq. = **Amaranthus blitum** L.

Amaranthus bouchonii Thell.
Sin.: *Amaranthus hybridus* L. subsp. *bouchonii* (Thell.) O. Bolòs & Vigo
Referencias: Brenan, J. P. M., 1961.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4224* (BAA)].
Notas: Posible taxón infraespecífico de *Amaranthus hybridus*.

Amaranthus buchtienianus Thell. = **Amaranthus asplundii** Thell. var. **asplundii**
Referencias: Hunziker, A. T., 1965, 1966b.

[Amaranthus californicus (Moq.) S. Watson]
Sin.: *Amaranthus albo-marginatus* Uline & W.L. Bray
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Amaranthus cardenasianus Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1951.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2807* (CORD, K)].

Amaranthus celosioides Kunth
Sin.: *Amaranthus hybridus* L. var. *pergaminensis* Covas
Referencias: Covas, G., 1941; Parodi, L. R., 1930.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(BAI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 2615* (CTES)].

Amaranthus chlorostachys Willd. = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

[Amaranthus crassipes Schltdl.]
Sin.: *Euxolus crassipes* (Schltdl.) Hieron., *Scleropus amarantoides* Schrad., *Scleropus crassipes* (Schltdl.) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Amaranthus crispus (Lesp. & Thévenau) A. Terracc.
Sin.: *Amaranthus cristulatus* Speg., *Euxolus crispus* Lesp. & Thévenau
Referencias: Covas, G., 1941; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1984a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SLU); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4184* (SI), *Piccinini, B. 2064* (BAB)]; URY[*Berro, M. B. 5268* (MVFA)].

Amaranthus cristulatus Speg. = **Amaranthus crispus** (Lesp. & Thévenau) A. Terracc.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984a; Thellung, A., 1914.

Amaranthus cruentus L. = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.

Amaranthus deflexus L.
Sin.: *Amarantellus argentinus* Speg., *Euxolus deflexus* (L.) Raf.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Covas, G., 1941, 1984b; Cuvertino, J. S., 2001; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1984a, 1987a, 1994.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, IJF); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 3468* (BAB), *Hunziker, A. T. 1777* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; URY[*Buchtien, O. s.n.* (SI), *Herter, W. G. F. 658a* (SI)].

Amaranthus dubius Mart. ex Thell.
Referencias: Covas, G., 1984b.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Valovirta s.n.* (H)].

Amaranthus emarginatus Moq. ex Uline & W.L. Bray
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Quezada, M. 102* (CONC)].

Amaranthus flavus L. = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Amaranthus gracilis Desf. = **Amaranthus viridis** L.
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

[Amaranthus graecizans L.]
Sin.: *Amaranthus blitum* L. var. *graecizans* (L.) Moq., *Amaranthus blitum* L. var. *nanus* Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Amaranthus hybridus L. var. *hypochondriacus* (L.) Rob. = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Amaranthus hybridus L. var. *pergaminensis* Covas = **Amaranthus celosioides** Kunth

Amaranthus hybridus L. var. *quitensis* (Kunth) Covas = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**

Amaranthus hybridus L. subsp. *bouchonii* (Thell.) O. Bolòs & Vigo = **Amaranthus bouchonii** Thell.

Amaranthus hybridus L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
Sin.: *Amaranthus cruentus* L., *Amaranthus flavus* L., *Amaranthus paniculatus* L.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); CHL(VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6527* (CTES)]; BRA[*Klein, R. M. 5353* (HBR, US)].

Amaranthus hybridus L. subsp. **hybridus**
Sin.: *Amaranthus chlorostachys* Willd., *Amaranthus hybridus* L. var. *hypochondriacus* (L.) Rob., *Amaranthus hybridus* L. var. *quitensis* (Kunth) Covas, *Amaranthus hypochondriacus* L. var. *hypochondriacus*, *Amaranthus quitensis* Kunth, *Amaranthus quitensis* Kunth var. *stuckertianus* Thell.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1170* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5260* (HBR, US)]; CHL[*Matthei, O. R. 452* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 5580* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 805* (SI)].

Amaranthus hypochondriacus L. var. *hypochondriacus* = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Amaranthus hypocondriacus L. var. *powellii* (S. Watson) Pedersen = **Amaranthus powellii** S. Watson
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.

Amaranthus kloosianus Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1951.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2826* (CORD, K, SI)].

Amaranthus lividus L.
Referencias: Fabris, H. A., 1967c.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 522* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 12341* (BM)].

Amaranthus lividus L. var. *ascendens* (Loisel.) Thell. = **Amaranthus blitum** L.
Referencias: Filias, F., Gaulliez, A. & Guédès, M., 1980.

Amaranthus lividus L. var. *polygonoides* (Moq.) Thell. = **Amaranthus blitum** L.
Referencias: Filias, F., Gaulliez, A. & Guédès, M., 1980.

Amaranthus lividus L. subsp. *polygonoides* (Moq.) Probst = **Amaranthus blitum** L.

Amaranthus lombardoi Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1951.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(CAS, SJO).
Ejemplares de referencia: URY[*Lombardo, A. 3254* (CORD)].

Amaranthus looseri Suess.
Referencias: Hunziker, A. T., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 500 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 3620* (CORD, GH)].

Amaranthus mantegazzianus Pass.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–1800 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2555* (SI)].

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron.
Sin.: *Euxolus muricatus* Moq.
Referencias: Covas, G., 1941; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1987a, 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23329* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5169* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (SI)].

Amaranthus paniculatus L. = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **cruentus** (L.) Thell.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Amaranthus parodii Standl., hom. illeg. = **Amaranthus standleyanus** Parodi ex Covas
Referencias: Covas, G., 1941; Pedersen, T. M., 1984a, 1987a.

Amaranthus persimilis Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1951; Pedersen, T. M., 1994.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4836* (SI), *Schreiter, R. 5491* (LIL)].

Amaranthus peruvianus (Schauer) Standl.
Sin.: *Mengea peruviana* Schauer
Referencias: Hunziker, A. T., 1965.
Hierba. Nativa. 3500–4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 4217* (LIL)].

Amaranthus powellii S. Watson
Sin.: *Amaranthus hypocondriacus* L. var. *powellii* (S. Watson) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6998* (SI)].

Amaranthus quitensis Kunth = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**

Amaranthus quitensis Kunth var. *stuckertianus* Thell. = **Amaranthus hybridus** L. subsp. **hybridus**

Amaranthus retroflexus L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1966b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, SFE); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, RME); PRY(APY); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 12000* (CORD)]; CHL[*Matthei, O. R. 461* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 4806* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 4826-pe* (CORD)].

Amaranthus rosengurttii Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1966b; Pedersen, T. M., 1987a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(ART, FLO, FLA, LAV, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25925* (SI)]; BRA[*Arbo, M. M. 2424* (CTES)]; URY[*Felippone, F. 4302* (SI), *Rosengurtt, B. 1031-pe* (CORD)].

Amaranthus spicatus (Thell.) Seckt, nom. illeg. = **Amaranthus vulgatissimus** Speg.

Amaranthus spinosus L.
Referencias: Parodi, L. R., 1941c; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, LPA, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1796* (SI)]; BRA[*Hunziker, J. H. 2617* (SI), *Smith, L. B. 6237* (R, RB, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 33517* (AS, MO)].

Amaranthus standleyanus Parodi ex Covas
Sin.: *Amaranthus parodii* Standl., hom. illeg., *Amaranthus vulgatissimus* Speg. f. *chacoënsis* Thell.
Referencias: Covas, G., 1941; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Hunziker, A. T., 1966b; Pedersen, T. M., 1987a, 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4828* (SI), *Jörgensen, P. 558* (BAB)]; PRY[*Mereles, F. 5612* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. s.n.* (MVFA)].

[Amaranthus undulatus R. Br.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Amaranthus viridis L.
Sin.: *Amaranthus gracilis* Desf., *Chenopodium caudatum* Jacq., *Euxolus caudatus* (Jacq.) Moq., *Euxolus viridis* (L.) Moq.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1987a, 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, GUA, PHA); URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5131* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16706* (HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3439* (SI), *Mereles, F. 5581* (CTES, FCQ)]; URY[*Cequeira, E. 16787* (MVFA)].

Amaranthus vulgatissimus Speg.
Sin.: *Amaranthus ataco* Thell., *Amaranthus spicatus* (Thell.) Seckt, nom. illeg.

Referencias: Covas, G., 1941; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1984a, 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, MEN, SFE, SJU); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Botta, S. M. 716* (SI), *Spegazzini, C. L. 168* (LP)]; URY[*Marchesi, E. 14189* (MVFA)].

Amaranthus vulgatissimus Speg. f. *chacoënsis* Thell. = **Amaranthus standleyanus** Parodi ex Covas

Banalia brasiliana Moq. = **Herbstia brasiliana** (Moq.) Sohmer
Referencias: Sohmer, S. H., 1976.

Banalia occidentalis Moq. = **Nitrophila occidentalis** (Moq.) S. Watson

Blutaparon Raf.

Número de especies: 1

Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears var. **commersonii** (A. St.-Hil.) Mears
Sin.: *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq. var. *commersonii* (A. St.-Hil.) Moq., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil. var. *commersonii* A. St.-Hil., *Telanthera philoxeroides* (Mart.) Moq. var. *carnosa* Moq.
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Mears, J. A., 1982; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tweedie, J. s.n.* (K)]; BRA[*Reitz, P. R. 1226* (HBR, US)]; URY[*Commerson, P. s.n.* (P)].

Blutaparon portulacoides (A. St.-Hil.) Mears var. **portulacoides**
Sin.: *Iresine portulacoides* (A. St.-Hil.) Moq., *Philoxerus portulacoides* A. St.-Hil.
Referencias: Mears, J. A., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burkart, A. 25095* (SI)].

Bragantia vandelli Roem. & Schult. = **Gomphrena arborescens** L. f.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Brandesia lanceolata Benth. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Brandesia mexicana Schltdl. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Brandesia puberula Mart. = **Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Brandesia rufa Mart. = **Alternanthera rufa** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Brayulinea australis (Griseb.) Schinz = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987; Mears, J. A., 1967; Pedersen, T. M., 1976, 2000.

Brayulinea densa (Willd.) Small = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987.

Brayulinea gracilis (R.E. Fr.) Schinz = **Guilleminea gracilis** R.E. Fr.
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Bucholzia ficoidea (L.) Mart. = **Alternanthera ficoidea** (L.) Sm.

Bucholzia maritima Mart. = **Alternanthera maritima** (Mart.) A. St.-Hil.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Bucholzia philoxeroides Mart. = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Bucholzia philoxeroides Mart. var. *obtusifolia* Mart. = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Celosia L.

Número de especies: 3, 1 introducida

Celosia argentea L. f. **argentea**
Referencias: Covas, G., 1941; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niilo Söyrinki s.n.* (H)]; BRA[*Cordeiro, J. 1830* (MBM)].

Celosia argentea L. f. **cristata** (L.) Schinz
Sin.: *Celosia argentea* L. var. *cristata* (L.) Kuntze, *Celosia cristata* L.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9349* (HBR, US)].
Notas: Originaria de Asia, a veces subespontánea en baldíos y capoeiras.

Celosia argentea L. var. *cristata* (L.) Kuntze = **Celosia argentea** L. f. **cristata** (L.) Schinz
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Celosia brasiliensis Moq. = **Celosia grandifolia** Moq.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Celosia corymbifera Didr.
Sin.: *Celosia cymosa* Seub.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Crossmann, K. 356* (GOET)].

Celosia cristata L. = **Celosia argentea** L. f. **cristata** (L.) Schinz
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Celosia cymosa Seub. = **Celosia corymbifera** Didr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Celosia echinata Willd. ex Schult. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Melville, R., 1958.

Celosia gnaphaloides L. f. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Celosia grandifolia Moq.
Sin.: *Celosia brasiliensis* Moq.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1201* (HBR)].

Celosia humifusa Humb. & Bonpl. ex Schult. = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Melville, R., 1958; Pedersen, T. M., 1967.

Celosia major Griseb. = **Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth
Referencias: Covas, G., 1939b.

Celosia paniculata L. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Chamissoa Kunth

Número de especies: 3

Chamissoa acuminata Mart.
Referencias: Hauman, L. L., 1924; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Sohmer, S. H., 1977.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1172* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13715* (CTES, SI), *Smith, L. B. 9200* (HBR, R, US)]; PRY[*Marín, G. 503* (BM, CTES, G, MO, PY)].

Chamissoa acuminata Mart. var. *maximiliani* (Mart.) Sohmer = **Chamissoa maximiliani** Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.

[Chamissoa acuminata Mart. var. swansonii Sohmer]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth
Sin.: *Achyranthes altissima* Jacq., *Celosia major* Griseb., *Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth var. *laxiflora* Moq., *Chamissoa macrocarpa* Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Sohmer, S. H., 1977; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto o liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, GUA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29232* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16672* (HBR, US)]; PRY[*Stutz, L. C. 1864* (G)]; URY[*Lombardo, A. s.n.* (MVJB)].

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth var. *densipaniculata* Suess. = **Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth var. **rubella** Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth var. *laxiflora* Moq. = **Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth
Referencias: Sohmer, S. H., 1977.

[Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth var. rubella Suess.]
Sin.: *Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth subsp. *albo-grisea* Suess., *Chamissoa altissima* (Jacq.) Kunth var. *densipaniculata* Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.
Notas: Nombre dudoso.

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth subsp. *albo-grisea* Suess. = **Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth var. **rubella** Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.

Chamissoa brasiliana (Moq.) R.E. Fr. = **Herbstia brasiliana** (Moq.) Sohmer
Referencias: Sohmer, S. H., 1976.

Chamissoa celosioides Griseb. = **Chamissoa maximiliani** Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.

Chamissoa macrocarpa Kunth = **Chamissoa altissima** (Jacq.) Kunth
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Sohmer, S. H., 1977.

Chamissoa maximiliani Mart., nom. nud. = **Chamissoa maximiliani** Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.

Chamissoa maximiliani Moq.
Sin.: *Chamissoa acuminata* Mart. var. *maximiliani* (Mart.) Sohmer, *Chamissoa celosioides* Griseb., *Chamissoa maximiliani* Mart., nom. nud., *Chamissoa maximiliani* Moq. f. *celosioides* (Griseb.) Suess.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7268* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21577* (MO, NY)]; PRY[*Soria, N. 2127* (FCQ)].

Chamissoa maximiliani Moq. f. *celosioides* (Griseb.) Suess. = **Chamissoa maximiliani** Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999; Sohmer, S. H., 1977.

Chnoanthus mendocinus Phil. = **Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E. Fr. subsp. **mendocina**
Referencias: Fries, R. E., 1920; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1984a.

Chnoanthus ovatus Phil. = **Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E. Fr. subsp. **mendocina**
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1984a.

[Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq.]
Sin.: *Desmochaeta achyranthoides* Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Desmochaeta achyranthoides Kunth = **Cyathula achyranthoides** (Kunth) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.

Desmochaeta sordida Bunbury = **Alternanthera pungens** Kunth

[Euxolus arvensis Rojas Acosta]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Amaranthus quitensis*.

Euxolus caudatus (Jacq.) Moq. = **Amaranthus viridis** L.

Euxolus crassipes (Schltdl.) Hieron. = **Amaranthus crassipes** Schltdl.

Euxolus crispus Lesp. & Thévenau = **Amaranthus crispus** (Lesp. & Thévenau) A. Terracc.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984a.

Euxolus deflexus (L.) Raf. = **Amaranthus deflexus** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984a; 1987a.

Euxolus muricatus Moq. = **Amaranthus muricatus** (Moq.) Hieron.
Referencias: Brenan, J. P. M., 1961; Pedersen, T. M., 1987a.

Euxolus viridis (L.) Moq. = **Amaranthus viridis** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Euxolus viridis (L.) Moq. var. *ascendens* (Loisel.) Moq. = **Amaranthus blitum** L.

Froelichia Moench

Número de especies: 4, 1 endémica

Froelichia chacoënsis Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Rehfous, L., 1927.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 30838* (CTES)]; PRY[*Vanni, R. O. 2273* (CTES)].

[Froelichia humboldtiana (Roem. & Schult.) Seub.]
Sin.: *Froelichia lanata* (Kunth) Moq., p.p., *Gomphrena humboldtiana* Roem. & Schult.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Froelichia lanata (Kunth) Moq., p.p. = **Froelichia humboldtiana** (Roem. & Schult.) Seub.

Froelichia lanata (Kunth) Moq. f. *albiflora* Chodat = **Froelichia procera** (Seub.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Froelichia lanata (Kunth) Moq. f. *roseiflora* Chodat = **Froelichia procera** (Seub.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Froelichia lanata (Kunth) Moq. var. *paraguariensis* Chodat = **Froelichia procera** (Seub.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Froelichia lanata (Kunth) Moq. var. *procera* Seub. = **Froelichia procera** (Seub.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Froelichia paraguayensis Chodat
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4720* (SI)].

Froelichia procera (Seub.) Pedersen
Sin.: *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. f. *albiflora* Chodat, *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. f. *roseiflora* Chodat, *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. var. *paraguariensis* Chodat, *Froelichia lanata* (Kunth) Moq. var. *procera* Seub.

Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Marchioretto, M. S., Windisch, P. G. & Siqueira, J. S. J., 2002; Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 987* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 1624* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15921* (MBM, NY, US)]; PRY[*Jiménez, B. 1836* (BM, CTES, MO, PY)].

Froelichia tomentosa (Mart.) Moq.
Sin.: *Froelichia tomentosa* (Mart.) Moq. var. *angustialata* Suess., *Oplotheca tomentosa* Mart.
Referencias: Marchioretto, M. S., Windisch, P. G. & Siqueira, J. S. J., 2002; Pedersen, T. M., 1987a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); PRY(APY); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22972* (SI)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 4372* (NY)]; URY[*Del Puerto, O. 5692* (CTES)].

Froelichia tomentosa (Mart.) Moq. var. *angustialata* Suess. = **Froelichia tomentosa** (Mart.) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Gomphrena L.

Número de especies: 38, 14 endémicas

Gomphrena acaulis J. Remy = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **genuina** Stuchlik
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena acrotepala Suess. = **Gomphrena boliviana** Moq. f. **boliviana**
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena arborescens L. f.
Sin.: *Bragantia vandelli* Roem. & Schult., *Gomphrena arborescens* L. f. f. *pulcherrima* Hassl., *Gomphrena officinalis* Mart., *Xeraea arborescens* (L. f.) Kuntze
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10545* (BM)].

Gomphrena arborescens L. f. f. *intermedia* Stuchlik = **Gomphrena macrocephala** A. St.-Hil.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena arborescens L. f. f. *pulcherrima* Hassl. = **Gomphrena arborescens** L. f.

Gomphrena argentina Seub. = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**
Referencias: Suessenguth, K., 1934.

[Gomphrena bicolor Mart.]
Sin.: *Gomphrena oligocephala* J. Remy, *Xeraea oligocephala* (J. Remy) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Gomphrena boliviana Moq. f. **boliviana**
Sin.: *Alternanthera boliviana* (Moq.) Usteri, *Gomphrena acrotepala* Suess., *Gomphrena globosa* L. var. *albiflora* Moq., *Xeraea boliviana* (Moq.) Kuntze
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hunziker, A. T., 1971a; Pedersen, T. M., 1990, 1994.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1688* (LIL, SI)]; PRY[*Schinini, A. 16442* (CTES)].

Gomphrena boliviana Moq. f. **leiantha** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990, 1994.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 21047* (CORD)].

Gomphrena boliviana Moq. f. **robusta** (Hicken) Pedersen
Sin.: *Gomphrena lanceolata* R.E. Fr., *Iresine heliotropifolia* (Griseb.) Hicken f. *robusta* Hicken
Referencias: Hicken, C. M., 1912b; Pedersen, T. M., 1990, 1994.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1102* (SI)].

[Gomphrena boliviana Moq. var. tarijensis (R.E. Fr.) Pedersen]
Sin.: *Gomphrena tarijensis* R.E. Fr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Gomphrena brasiliana L. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Gomphrena celosioides Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena celosioides* Mart. f. *grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena celosioides* Mart. f. *parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena celosioides* Mart. var. *aureiflora* Stuchlik, *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *aureiflora* Chodat & Hassl., *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *aureiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik, *Gomphrena hygrophila* Mart. f. *luteiflora* Herzog
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1976, 1987a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 821* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1232* (G)].

Gomphrena celosioides Mart. f. *grandifolia* Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena celosioides Mart. f. *parvifolia* Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena celosioides Mart. f. **roseiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *roseiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik, *Gomphrena hygrophila* Mart. f. *subecristata* Herzog
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Pedersen, T. M., 1976, 1987a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAU, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3879* (SI)]; BRA[*Irgang, B. E. s.n.* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 18440* (AS, MO)].

Gomphrena celosioides Mart. var. *aureiflora* Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena celosioides Mart. var. **celosioides**
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *albiflora* Chodat, *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *albiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik, *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *genuina* Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena perennis* L. f. *ramosissima* Stuchlik, *Xeraea celosioides* (Mart.) Kuntze
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1976, 1987a, 1997b; Siqueira, J. S. J., 1992; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CAA, COA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14095* (SI), *Giberti, G. C. 79* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43998* (MBM)]; PRY[*Vanni, R. O. 1837* (CTES)]; URY[*Solís Neffa, V. 423* (CTES)].

Gomphrena cladotrichoides Suess.
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1994; Suessenguth, K., 1935.
Hierba. Anual. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 22414* (CORD), *Pedersen, T. M. 11762* (CTES, SI)].

Gomphrena colosacana Hunz. & Subils var. **andersonii** Hunz. & Subils
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 16237* (CORD)].

Gomphrena colosacana Hunz. & Subils var. **colosacana**
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 22642* (CORD)].

Gomphrena conwayi Rusby = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **conwayi** (Rusby) Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1990; Suessenguth, K., 1934.

[Gomphrena correntina D. Parodi]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Gomphrena decumbens Jacq. = **Gomphrena serrata** L.
Referencias: Mears, J. A., 1980.

Gomphrena decumbens Lag., nom. nud. = **Gomphrena serrata** L.

Gomphrena decumbens Jacq. f. *albiflora* Chodat = **Gomphrena celosioides** Mart. var. **celosioides**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Gomphrena decumbens Jacq. f. *aureiflora* Chodat & Hassl. = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena decumbens Jacq. f. *ovata* Stuchlik = **Gomphrena ferruginea** Pedersen var. **rustica** Pedersen

Gomphrena decumbens Jacq. f. *roseiflora* Chodat & Hassl. = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **roseiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena decumbens Jacq. var. *albiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. var. **celosioides**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena decumbens Jacq. var. *aureiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena decumbens Jacq. var. *boliviana* Stuchlik = **Gomphrena pallida** (Suess.) Pedersen subsp. **pallida**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena decumbens Jacq. var. *genuina* Stuchlik, nom. inval. = **Gomphrena celosioides** Mart. var. **celosioides**

Gomphrena decumbens Jacq. var. *roseiflora* (Chodat & Hassl.) Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **roseiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

[Gomphrena demissa Mart.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Gomphrena demissa Mart. var. *incana* Moq. = **Gomphrena tomentosa** (Griseb.) R.E. Fr. var. **tomentosa**
Referencias: Fries, R. E., 1920.

Gomphrena dentata Moench = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Gomphrena dunaliana Moq. = **Pfaffia dunaliana** (Moq.) Schinz

[Gomphrena elegans Mart. f. ferruginea Stuchlik]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Gomphrena elegans Mart. f. *microcephala* Suess. = **Gomphrena paraguayensis** Chodat subsp. **paraguayensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena elegans Mart. f. *nigro-virida* Stuchlik = **Gomphrena elegans** Mart. var. **elegans**
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956; Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena elegans Mart. var. **claussenioides** Suess.
Referencias: Suessenguth, K., 1934.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 705* (*)]; PRY[*Mereles, F. 5064* (FCQ, MO)].

Gomphrena elegans Mart. var. **elegans**
Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. f. *nigro-virida* Stuchlik, *Gomphrena elegans* Mart. var. *genuina* Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena hilariana* Moq., *Gomphrena viridifolia* Suess., p.p., *Xeraea elegans* (Mart.) Kuntze, *Xeraea hilariana* (Moq.) Kuntze
Referencias: Covas, G., 1941; Fabris, H. A., 1967c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pedersen, T. M., 1987a; Siqueira, J. S. J., 1992; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, FLO, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 114* (MNES, SI), *Zuloaga, F. O. 856* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5626* (HBR)]; PRY[*Ortíz, M. 414* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 10499* (MVFA)].

Gomphrena elegans Mart. var. *genuina* Stuchlik, nom. inval. = **Gomphrena elegans** Mart. var. **elegans**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena elegans Mart. var. *gracilior* Chodat & Hassl. = **Gomphrena paraguayensis** Chodat subsp. **paraguayensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena elegans Mart. var. **mesopotamica** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6357* (C, SI)].

Gomphrena elegans Mart. var. *microcephala* (Suess.) E. Holzh. = **Gomphrena paraguayensis** Chodat subsp. **paraguayensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena elegans Mart. var. **orientalis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 11394* (C)]; URY[*Pedersen, T. M. 16184* (C)].

Gomphrena elegans Mart. var. *paraguayensis* (Chodat) E. Holzh. = **Gomphrena paraguayensis** Chodat subsp. **paraguayensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena eriantha (Poir.) Moq. = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Gomphrena ferruginea Pedersen var. **adusta** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5831* (LP)].

Gomphrena ferruginea Pedersen var. **ferruginea**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3743* (BONN, LPB, MCNS), *Hawkes, J. G. 3847* (C)];

Gomphrena ferruginea Pedersen var. **rustica** Pedersen
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. f. *ovata* Stuchlik
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Abbiatti, D. 583* (LIL, LP)].

Gomphrena ficoidea L. = **Alternanthera ficoidea** (L.) Sm.

Gomphrena glabrata (Mart.) Moq. = **Pfaffia glabrata** Mart.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena glabrata (Mart.) Moq. var. *angustifolia* Seub. = **Pfaffia glabrata** Mart.

Gomphrena glabrata (Mart.) Moq. var. *latifolia* Seub. = **Pfaffia glabrata** Mart.

Gomphrena glabratoides (Suess.) J.C. Siqueira = **Quaternella glabratoides** (Suess.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena glauca (Mart.) Moq. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena globosa L.
Sin.: *Xeraea globosa* (L.) Kuntze
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9351* (HBR, MBM, US)].

Gomphrena globosa L. var. *albiflora* Moq. = **Gomphrena boliviana** Moq. f. **boliviana**
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena glutinosa R.E. Fr. = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **glutinosa** (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena gnaphaloides (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena gnaphaloides (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. var. *floccosa* Seub. = **Pfaffia helichrysoides** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena gnaphaloides (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. var. *planifolia* Seub. = **Pfaffia helichrysoides** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena gnaphiotricha Griseb. = **Gomphrena vaga** Mart.
Referencias: Borsch, T. & Ortuño, T., com. pers.

Gomphrena graminea Moq.
Sin.: *Xeraea graminea* (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a; Siqueira, J. S. J., 1992; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, ITA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29077* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17442* (K, P)]; PRY[*Zardini, E. M. 59734* (BONN, MO, PY)]; URY[*Solís Neffa, V. 445* (CTES)].

Gomphrena guaranitica Chodat
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 9298* (C, CTES, NY)].

Gomphrena haenkeana Mart.
Sin.: *Gomphrena ligulata* Griseb., *Gomphrena pulchella* Mart. f. *nana* Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. f. *simplex* Stuchlik, *Gomphrena pulchella* Mart. var. *haenkeana* (Mart.) Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. var. *ligulata* (Griseb.) Suess., *Gomphrena pulchella* Mart. var. *rosea* Stuchlik, p.p., *Xeraea haenkeana* (Mart.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 18618* (CTES), *Morrone, O. 4567* (SI)].

Gomphrena hasslerii Chodat = **Gomphrena pohlii** Moq. var. **hasslerii** (Chodat) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena helichrysoides Moq. = **Pfaffia helichrysoides** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena hilariana Moq. = **Gomphrena elegans** Mart. var. **elegans**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena holosericea (Mart.) Moq.
Sin.: *Hebanthe holosericea* Mart., *Xeraea holosericea* (Mart.) Kuntze
Referencias: Borsch, T. & Ortuño, T., com. pers.; Holzhammer, E., 1955–1956.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8924* (BR, HBR)].

Gomphrena humboldtiana Roem. & Schult. = **Froelichia humboldtiana** (Roem. & Schult.) Seub.

Gomphrena hygrophila Mart. f. *luteiflora* Herzog = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **aureiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Gomphrena hygrophila Mart. f. *subecristata* Herzog = **Gomphrena celosioides** Mart. f. **roseiflora** (Chodat & Hassl.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Gomphrena jubata (Mart.) Moq. = **Pfaffia jubata** Mart.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena lanata Poir. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a.

Gomphrena lanata Poir. var. *latifolia* Seub. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena lanata Poir. var. *oblongifolia* Moq. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena lanata Poir. var. *parvifolia* Moq. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena lanceolata R.E. Fr. = **Gomphrena boliviana** Moq. f. **robusta** (Hicken) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena ligulata Griseb. = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena luzulaeflora (Mart.) Moq. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena macrocephala A. St.-Hil.
Sin.: *Gomphrena arborescens* L. f. f. *intermedia* Stuchlik, *Gomphrena macrocephala* A. St.-Hil. var. *pulcherrima* Chodat, *Gomphrena pulcherrima* (Chodat) Chodat & Hassl., *Xeraea macrocephala* (A. St.-Hil.) Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16058* (MBM)]; PRY[*Nicora, E. G. 9864* (SI)].

Gomphrena macrocephala A. St.-Hil. var. *pulcherrima* Chodat = **Gomphrena macrocephala** A. St.-Hil.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena mandonii R.E. Fr.
Referencias: Stützer, O., 1935.
Subarbusto. Nativa. 2600–3600 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mandon, G. 1016* (S)].

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. f. **austrina** Pedersen
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, MEN, SDE, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14533* (C, CORD)]; PRY[*Hassler, E. 90* (BM), *Mereles, F. 5598* (CTES, FCQ, MO)].

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. **glutinosa** (R.E. Fr.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena glutinosa* R.E. Fr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Pedersen, 1997b).

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. **martiana**
Sin.: *Gomphrena argentina* Seub., *Gomphrena martiana* Gillies ex Moq. var. *microcephala* Suess., *Guilleminea martiana* (Gillies ex Moq.) Hook. f., *Iresine heliotropifolia* (Griseb.) Hicken, *Philoxerus heliotropifolius* Griseb., *Xeraea argentina* (Seub.) Kuntze, *Xeraea martiana* (Gillies ex Moq.) Kuntze
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1990, 1994, 1997b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gillies, J. s.n.* (K), *Pedersen, T. M. 13344* (CTES, SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 1617* (MO, PY)].

Gomphrena martiana Gillies ex Moq. var. *microcephala* Suess. = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena mendocina (Phil.) R.E. Fr. subsp. **australis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984a.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 3338* (BAB)].

Gomphrena mendocina (Phil.) R.E. Fr. subsp. **mendocina**
Sin.: *Chnoanthus mendocinus* Phil., *Chnoanthus ovatus* Phil., *Gomphrena ovata* (Phil.) R.E. Fr., *Gomphrena tomentosa* (Griseb.) R.E. Fr. var. *cana* Suess., *Iresine tomentosa* Chodat & Wilczek
Referencias: Fries, R. E., 1920; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1984a, 1994.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 9257* (LIL, MERL)].

Gomphrena meyeniana Walp. f. **flaccida** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31577* (SI)].

Gomphrena meyeniana Walp. f. **levitepala** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25164* (LP)].

Gomphrena meyeniana Walp. var. *acaulis* (J. Remy) Suess. = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **genuina** Stuchlik
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena meyeniana Walp. var. *albiflora* Stuchlik = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **genuina** Stuchlik
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena meyeniana Walp. var. *aureiflora* Stuchlik = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **meyeniana**
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Gomphrena meyeniana Walp. var. **caulescens** E. Holzh.
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 900* (SI)].

Gomphrena meyeniana Walp. var. *citrina* Suess. = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **meyeniana**

Gomphrena meyeniana Walp. var. **conwayi** (Rusby) Suess.
Sin.: *Gomphrena conwayi* Rusby
Referencias: Pedersen, T. M., 1990; Suessenguth, K., 1934.
Hierba. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2526* (SI)].

Gomphrena meyeniana Walp. var. **genuina** Stuchlik
Sin.: *Gomphrena acaulis* J. Remy, *Gomphrena meyeniana* Walp. var. *acaulis* (J. Remy) Suess., *Gomphrena meyeniana* Walp. var. *albiflora* Stuchlik, *Xeraea acaulis* (Walp.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13995* (LP)].

Gomphrena meyeniana Walp. var. **meyeniana**
Sin.: *Gomphrena meyeniana* Walp. var. *aureiflora* Stuchlik, *Gomphrena meyeniana* Walp. var. *citrina* Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10413* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1154* (E)].

Gomphrena meyeniana Walp. var. **tucumanensis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 567* (CORD, GOET)].

Gomphrena officinalis Mart. = **Gomphrena arborescens** L. f.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena oligocephala J. Remy = **Gomphrena bicolor** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena oligocephala J. Remy var. *pallida* Suess. = **Gomphrena pallida** (Suess.) Pedersen subsp. **pallida**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena ovata (Phil.) R.E. Fr. = **Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E. Fr. subsp. **mendocina**
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1984a.

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen f. **calva** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, M. F. 1420 p.p.* (M)].

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen var. **diffusa** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10114* (CTES)].

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen subsp. **munda** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3733* (BONN, LPB, MCNS), *Cabrera, A. L. 15328* (LP)].

Gomphrena pallida (Suess.) Pedersen subsp. **pallida**
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq. var. *boliviana* Stuchlik, *Gomphrena oligocephala* J. Remy var. *pallida* Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976; Suessenguth, K., 1940.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 1420* (SI)].

Gomphrena paniculata (Mart.) Moq. = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Gomphrena paraguayensis Chodat subsp. **chacoensis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Brunner, D. R. 1224* (G)].

Gomphrena paraguayensis Chodat subsp. **paraguayensis**
Sin.: *Gomphrena elegans* Mart. f. *microcephala* Suess., *Gomphrena elegans* Mart. var. *gracilior* Chodat & Hassl., *Gomphrena elegans* Mart. var. *microcephala* (Suess.) E. Holzh., *Gomphrena elegans* Mart. var. *paraguayensis* (Chodat) E. Holzh.

Referencias: Chodat, R. H., 1901; Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28517* (SI), *Schwindt, E. 632* (LIL, M)]; PRY[*Hassler, E. 4110* (G)].

Gomphrena paramillensis Suess. = **Gomphrena pumila** Gillies ex Moq.
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956.

Gomphrena paranensis R.E. Fr. subsp. **paraguariensis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 9539* (C), *Zardini, E. M. 55372* (BONN, MO)].

Gomphrena paranensis R.E. Fr. subsp. **paranensis**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15883* (S)].

Gomphrena pearcei Oliv. = **Gomphrena umbellata** J. Remy
Referencias: Fries, R. E., 1920; Holzhammer, E., 1955–1956.

Gomphrena perennis L. f. *grandifolia* Stuchlik = **Gomphrena perennis** L. var. **suffruticosa** (Griseb.) R.E. Fr.

Gomphrena perennis L. f. *parvifolia* Stuchlik = **Gomphrena perennis** L. var. **perennis**

Gomphrena perennis L. f. *ramosissima* Stuchlik = **Gomphrena celosioides** Mart. var. **celosioides**

Gomphrena perennis L. f. *villosa* (Mart.) Stuchlik = **Gomphrena perennis** L. var. **perennis**

Gomphrena perennis L. var. *brunnea* Stuchlik = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.

[Gomphrena perennis L. var. nitida Stuchlik]
Sin.: *Gomphrena perennis* L. subsp. *nitida* (Stuchlik) Stuchlik
Notas: Nombre dudoso.

Gomphrena perennis L. var. **perennis**
Sin.: *Gomphrena perennis* L. f. *parvifolia* Stuchlik, *Gomphrena perennis* L. f. *villosa* (Mart.) Stuchlik, *Gomphrena perennis* L. subsp. *genuina* Stuchlik, nom. inval., *Gomphrena villosa* Mart., *Xeraea perennis* (L.) Kuntze, *Xeraea villosa* (Mart.) Kuntze
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Covas, G., 1941; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Fontana, J. L., 1998; Fries, R. E., 1920; Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1987a; Siqueira, J. S. J., 1992; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12745* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 44898* (MBM, MO)]; PRY[*Degen, R. 2903* (FCQ)]; URY[*Alonso Paz, E. 3623* (MVFQ)].

Gomphrena perennis L. var. *rosea* (Griseb.) Stuchlik = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **rosea** (Griseb.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena perennis L. var. **silenoides** (Chodat) E. Holzh.
Sin.: *Gomphrena silenoides* Chodat
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956.
Hierba. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7491* (BM)].

Gomphrena perennis L. var. **suffruticosa** (Griseb.) R.E. Fr.
Sin.: *Gomphrena perennis* L. f. *grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena perennis* L. var. *valdecristata* Suess., *Gomphrena suffruticosa* Griseb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fries, R. E., 1920.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 2475* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 5058* (FCQ, MO)].

Gomphrena perennis L. var. *valdecristata* Suess. = **Gomphrena perennis** L. var. **suffruticosa** (Griseb.) R.E. Fr.

Gomphrena perennis L. subsp. *genuina* Stuchlik, nom. inval. = **Gomphrena perennis** L. var. **perennis**

Gomphrena perennis L. subsp. *nitida* (Stuchlik) Stuchlik = **Gomphrena perennis** L. var. **nitida** Stuchlik

[Gomphrena perennis L. subsp. pseudodecumbens Stuchlik]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Gomphrena phaeotricha Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3738* (BONN, LPB, MCNS), *Hawkes, J. G. 3599* (C)].

Gomphrena phagnaloides Griseb. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a; Suessenguth, K., 1934.

Gomphrena platycephala R.E. Fr.
Referencias: Fries, R. E., 1920; Pedersen, T. M., 1994.

Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 46390* (CTES)].

Gomphrena pohlii Moq. var. **hasslerii** (Chodat) Pedersen
Sin.: *Gomphrena hasslerii* Chodat
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5816* (BM, G, K, P)].

Gomphrena poiretiana Roem. & Schult. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena pulchella Mart. f. *grandifolia* Stuchlik = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **pulchella**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. f. *linearifolia* Stuchlik = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **pulchella**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. f. *nana* Suess. = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

[Gomphrena pulchella Mart. f. ramosissima Stuchlik]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Nombre dudoso. Descripta sin citar material de herbario.

Gomphrena pulchella Mart. f. *simplex* Stuchlik = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. var. *albisericea* E. Holzh. = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **albisericea** (E. Holzh.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. var. **bonariensis** (Moq.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vignati 143* (LP)].

Gomphrena pulchella Mart. var. *ecristata* Chodat = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **pulchella**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1976.

Gomphrena pulchella Mart. var. *haenkeana* (Mart.) Suess. = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. var. *ligulata* (Griseb.) Suess. = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. var. *rosea* Stuchlik, p.p. = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. var. *rosea* Stuchlik, p.p. = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **pulchella**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena pulchella Mart. subsp. **albisericea** (E. Holzh.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. var. *albisericea* E. Holzh.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1976, 1994.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–2900 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1121* (LP, SI)]; PRY[*Mereles, F. 5629* (CTES, FCQ, MO)].

Gomphrena pulchella Mart. subsp. **pulchella**
Sin.: *Gomphrena pulchella* Mart. f. *grandifolia* Stuchlik, *Gomphrena pulchella* Mart. f. *linearifolia* Stuchlik, *Gomphrena pulchella* Mart. var. *ecristata* Chodat, *Gomphrena pulchella* Mart. var. *rosea* Stuchlik, p.p., *Xeraea pulchella* (Mart.) Kuntze
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1976, 1987a; Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SDE, SFE, SLU); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(CAS, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4126* (SI), *Hurrell, J. A. 5088* (SI)]; BRA[*Porto, P. C. 2438* (ICN)]; PRY[*Degen, R. 3454* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 974* (MVFA)].

Gomphrena pulchella Mart. subsp. **rosea** (Griseb.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena perennis* L. var. *rosea* (Griseb.) Stuchlik, *Gomphrena rosea* Griseb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 1858* (SI)].

Gomphrena pulcherrima (Chodat) Chodat & Hassl. = **Gomphrena macrocephala** A. St.-Hil.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena pumila Gillies ex Moq.
Sin.: *Gomphrena paramillensis* Suess., *Gomphrena pygmaea* Suess., *Xeraea pumila* (Gillies ex Moq.) Kuntze
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956; Pedersen, T. M., 1990, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 4819* (SI), *Spegazzini, R. A. s.n.* (BAB)].

Gomphrena pygmaea Suess. = **Gomphrena pumila** Gillies ex Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1990, 1994.

Gomphrena radiata Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 2600–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32528* (SI), *Pedersen, T. M. 15345* (CTES, SI)].

Gomphrena regeliana Seub.
Sin.: *Gomphrena regeliana* Seub. f. *albiflora* R.E. Fr., *Gomphrena regeliana* Seub. f. *grandiflora* Chodat, *Xeraea regeliana* (Seub.) Kuntze
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9542* (MBM, US)]; PRY[*Krapovickas, A. 45882* (CTES)].

Gomphrena regeliana Seub. f. *albiflora* R.E. Fr. = **Gomphrena regeliana** Seub.

Gomphrena regeliana Seub. f. *grandiflora* Chodat = **Gomphrena regeliana** Seub.

Gomphrena riparia Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19805* (CTES, MBM), *Poliquesi, C. B. 270* (MBM)].

Gomphrena rosea Griseb. = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **rosea** (Griseb.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Gomphrena schinziana Stuchlik = **Gomphrena sellowiana** Mart.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena schlechtendaliana Mart.
Sin.: *Xeraea schlechtendaliana* (Mart.) Kuntze
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 7729* (K)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar distribución o material de referencia (Siqueira, 1992).

Gomphrena selloi Mart. = **Gomphrena sellowiana** Mart.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena sellowiana Mart.
Sin.: *Gomphrena schinziana* Stuchlik, *Gomphrena selloi* Mart., *Xeraea sellowiana* (Mart.) Kuntze
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swallen, J. R. 7224-b* (US)]; URY[*Sellow, F. s.n.* (M, P)].

Gomphrena sericea Spreng. = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

[Gomphrena serrata L.]
Sin.: *Gomphrena decumbens* Jacq., *Gomphrena decumbens* Lag., nom. nud., *Xeraea decumbens* (Jacq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Gomphrena sessilis L. = **Alternanthera sessilis** (L.) R. Br.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena silenoides Chodat = **Gomphrena perennis** L. var. **silenoides** (Chodat) E. Holzh.

Gomphrena stenophylla Spreng. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena suffruticosa Griseb. = **Gomphrena perennis** L. var. **suffruticosa** (Griseb.) R.E. Fr.
Referencias: Fries, R. E., 1920.

Gomphrena tarijensis R.E. Fr. = **Gomphrena boliviana** Moq. var. **tarijensis** (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Fries, R. E., 1920; Pedersen, T. M., 1997b.

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E. Fr. var. *cana* Suess. = **Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E. Fr. subsp. **mendocina**
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977.

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E. Fr. var. **monticola** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15343* (C, CTES, MBM)].

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E. Fr. var. **ruiz-lealii** Hunz. & Subils
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 6403* (MERL)].

Gomphrena tomentosa (Griseb.) R.E. Fr. var. **tomentosa**
Sin.: *Gomphrena demissa* Mart. var. *incana* Moq., *Gossypianthus tomentosus* Griseb., *Guilleminea tomentosa* (Griseb.) Hosseus
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fries, R. E., 1920; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 21723* (CORD)]; PRY[*Mereles, F. 5462* (CTES, FCQ, MO)].

Gomphrena triceps Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Pedersen, T. M. 11616* (C)].

Gomphrena tuberosa Spreng. = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Gomphrena tuberosa Spreng. var. *glabrescens* Moq. = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena tuberosa Spreng. var. *sericea* (Spreng.) Seub. = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena tuberosa Spreng. var. *vestita* Moq. = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Gomphrena umbellata J. Remy
Sin.: *Gomphrena pearcei* Oliv., *Xeraea pearcei* (Oliv.) Kuntze, *Xeraea umbellata* (J. Remy) Kuntze
Referencias: Fries, R. E., 1905, 1920.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3727* (BONN, LPB, MCNS), *Cialdella, A. M. 461* (SI)]; CHL[*Marquet s.n.* (CONC)].

Gomphrena uruguayensis Suess.
Hierba. Endémica. 0–400 m.
Países: URY(SAO).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 1025b* (MVFA)].

Gomphrena vaga Mart.
Sin.: *Gomphrena gnaphiotricha* Griseb., *Xeraea vaga* (Mart.) Kuntze
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956.
Subarbusto. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Borsch, T. 3735* (BONN, LPB, MCNS)].

Gomphrena villosa Mart. = **Gomphrena perennis** L. var. **perennis**
Referencias: Seubert, M. A., 1875; Siqueira, J. S. J., 1992.

Gomphrena virgata Mart.
Sin.: *Xeraea virgata* (Mart.) Kuntze
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10078* (K, MO, NY), *Dusén, P. K. H. 12008b* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 60459* (BONN, MO)].

Gomphrena viridifolia Suess., p.p. = **Gomphrena elegans** Mart. var. **elegans**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Gomphrena vitellina Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ferrucci, M. S. 641* (CTES)].

Gossypianthus australis Griseb. = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987; Pedersen, T. M., 2000.

[Gossypianthus lanuginosus (Poir.) Moq.]
Sin.: *Guilleminea lanuginosa* (Poir.) Hook. f., *Paronychia lanuginosa* Poir.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Gossypianthus tomentosus Griseb. = **Gomphrena tomentosa** (Griseb.) R.E. Fr. var. **tomentosa**
Referencias: Fries, R. E., 1920; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977.

Guilleminea Kunth

Número de especies: 6, 2 endémicas

Guilleminea australis (Griseb.) Hook. f. = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987; Pedersen, T. M., 2000.

Guilleminea chacoënsis Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12897* (C, CTES)]; PRY[*Schinini, A. 14874* (CTES)].

Guilleminea densa (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Sin.: *Brayulinea australis* (Griseb.) Schinz, *Brayulinea densa* (Willd.) Small, *Gossypianthus australis* Griseb., *Guilleminea australis* (Griseb.) Hook. f., *Guilleminea densa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq. var. *alsinaefolia* Moq., *Guilleminea illecebroides* Kunth, *Guilleminea illecebrum* Spreng., *Illecebrum densum* Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Henrickson, J., 1987; Mears, J. A., 1967; Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13067* (SI), *Lorentz, P. G. 384* (CORD, GOET)]; PRY[*Mereles, F. 5714* (CTES, FCQ)].

Guilleminea densa (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq. var. *alsinaefolia* Moq. = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987; Pedersen, T. M., 2000.

Guilleminea densa (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq. var. *gracilis* (R.E. Fr.) Mears = **Guilleminea gracilis** R.E. Fr.
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Guilleminea elongata Mears
Referencias: Mears, J. A., 1967; Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(DUR, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. 98299* (CTES, M, NY), *Rosengurtt, B. 4718* (MVFA)].

Guilleminea fragilis Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8461* (G)].

Guilleminea gracilis R.E. Fr.
Sin.: *Brayulinea gracilis* (R.E. Fr.) Schinz, *Guilleminea densa* (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq. var. *gracilis* (R.E. Fr.) Mears
Referencias: Fries, R. E., 1905; Pedersen, T. M., 1976, 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 972* (S)].

Guilleminea hirsuta Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3549* (CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 45370* (C, CTES)].

Guilleminea illecebroides Kunth = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987; Mears, J. A., 1967; Pedersen, T. M., 2000.

Guilleminea illecebrum Spreng. = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Mears, J. A., 1967; Pedersen, T. M., 2000.

Guilleminea lanuginosa (Poir.) Hook. f. = **Gossypianthus lanuginosus** (Poir.) Moq.

Guilleminea martiana (Gillies ex Moq.) Hook. f. = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**

Guilleminea procumbens Rojas Acosta = **Alternanthera pungens** Kunth

Guilleminea tomentosa (Griseb.) Hosseus = **Gomphrena tomentosa** (Griseb.) R.E. Fr. var. **tomentosa**
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977.

Hebanthe Mart.
Número de especies: 3

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena eriantha* (Poir.) Moq., *Gomphrena paniculata* (Mart.) Moq., *Hebanthe paniculata* Mart., *Iresine erianthos* Poir., *Iresine paniculata* (Mart.) Spreng., hom. illeg., *Pfaffia laurifolia* Chodat, *Pfaffia paniculata* (Mart.) Kuntze, *Pfaffia paraguayensis* Chodat, *Pfaffia reticulata* (Seub.) Kuntze var. *strigulosa* Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 2000; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Liana. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15444* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5722* (HBR, US)]; PRY[*Jiménez, B. 1528* (BM, CTES, G, MO, PY), *Zardini, E. M. 60101* (BONN, MO, PY)].

[Hebanthe grandiflora (Hook. f.) Borsch & Pedersen]
Sin.: *Pfaffia grandiflora* (Hook. f.) R.E. Fr.
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hebanthe holosericea Mart. = **Gomphrena holosericea** (Mart.) Moq.

Hebanthe occidentalis (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Sin.: *Pfaffia brachiata* Chodat, *Pfaffia brachiata* Chodat var. *grandiflora* O. Stützer, *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr., *Pfaffia occidentalis* R.E. Fr. var. *densiflora* R.E. Fr.
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997; Fries, R. E., 1920.
Liana. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL, TUC); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentry, A. 51786* (MO), *Vignale, N. D. 67* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 3366* (MO, PY)].

Hebanthe paniculata Mart. = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997; Pedersen, T. M., 2000.

Hebanthe pulverulenta Mart.
Sin.: *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze, *Pfaffia pulverulenta* (Mart.) Kuntze var. *rufescens* (Seub.) O. Stützer
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 549a* (MO), *Reitz, P. R. 4283* (HBR, US)].

Herbstia Sohmer
Número de especies: 1

Herbstia brasiliana (Moq.) Sohmer
Sin.: *Banalia brasiliana* Moq., *Chamissoa brasiliana* (Moq.) R.E. Fr.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Sohmer, S. H., 1976.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 127* (MO)]; BRA[*Smith, L. B. 8772* (HBR, NY, P, R, US)]; PRY[*Hassler, E. 11140* (G)].

Illecebrum achyrantha L. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Melville, R., 1958; Pedersen, T. M., 1984a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Illecebrum densum Willd. ex Roem. & Schult. = **Guilleminea densa** (Willd. ex Roem. & Schult.) Moq.
Referencias: Henrickson, J., 1987; Mears, J. A., 1967; Pedersen, T. M., 2000.

Illecebrum paniculatum (Kunth) Spreng. = **Alternanthera paniculata** Kunth
Referencias: Standley, P. C., 1937.

Illecebrum peploides Willd. ex Roem. & Schult. = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Illecebrum pungens (Kunth) Spreng. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Melville, R., 1958.

Illecebrum sessilis (L.) L. = **Alternanthera sessilis** (L.) R. Br.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Iresine P. Browne

Número de especies: 1

Iresine acutifolia Sw. ex Moq. = **Iresine angustifolia** Euphrasén
Referencias: Standley, P. C., 1917.

[Iresine angustifolia Euphrasén]
Sin.: *Iresine acutifolia* Sw. ex Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Iresine celosia L., nom. illeg. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Referencias: Shinners, L. H., 1962a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Iresine celosia L. var. *diffusa* (Humb. & Bonpl.) Suess. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**

Iresine celosia L. var. *nicotianoides* Suess. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **macrophylla** (Griseb.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Iresine celosioides L., nom. illeg. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Referencias: Shinners, L. H., 1962a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Iresine celosioides L. var. *macrophylla* Griseb. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **macrophylla** (Griseb.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Iresine celosioides L. var. *polymorpha* (Mart.) Griseb. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Referencias: Covas, G., 1941.

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Sin.: *Celosia paniculata* L., *Iresine celosia* L. var. *diffusa* (Humb. & Bonpl.) Suess., *Iresine celosia* L., nom. illeg., *Iresine celosioides* L. var. *polymorpha* (Mart.) Griseb., *Iresine celosioides* L., nom. illeg., *Iresine paniculata* (L.) Kuntze, hom. illeg., *Iresine polymorpha* Mart.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1987a, 1994; Shinners, L. H., 1962a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CAA, CAN, PAI); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Romanczuk, M. C. 691* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16676* (HBR, US)]; PRY[*Basualdo, I. 2375* (FCQ, MO)]; URY[*Felippone, F. 5623* (SI)].

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **macrophylla** (Griseb.) Pedersen
Sin.: *Iresine celosia* L. var. *nicotianoides* Suess., *Iresine celosioides* L. var. *macrophylla* Griseb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.
Subarbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27858* (SI), *Pedersen, T. M. 13972* (SI)].

[Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. var. spiculigera (Seub.) Eliasson]
Sin.: *Iresine spiculigera* Seub.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Iresine erianthos Poir. = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen

Iresine glomerata Spreng. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Iresine guaranitica Chodat = **Pedersenia macrophylla** (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Holub, J. L., 1998; Pedersen, T. M., 1997b.

Iresine hassleriana Chodat = **Pedersenia hassleriana** (Chodat) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Iresine hassleriana Chodat var. *macrophylla* (R.E. Fr.) Suess. = **Pedersenia macrophylla** (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Holub, J. L., 1998; Pedersen, T. M., 1997b.

Iresine heliotropifolia (Griseb.) Hicken = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**

Iresine heliotropifolia (Griseb.) Hicken f. *robusta* Hicken = **Gomphrena boliviana** Moq. f. **robusta** (Hicken) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Iresine luzuliflora (Mart.) Griseb. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen

Iresine macrophylla R.E. Fr. = **Pedersenia macrophylla** (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Holub, J. L., 1998; Pedersen, T. M., 1997b.

Iresine paniculata (L.) Kuntze, hom. illeg. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Referencias: Shinners, L. H., 1962a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Iresine paniculata (Mart.) Spreng., hom. illeg. = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Iresine polymorpha Mart. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **diffusa**
Referencias: Covas, G., 1941.

Iresine portulacoides (A. St.-Hil.) Moq. = **Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.) Mears var. **portulacoides**
Referencias: Mears, J. A., 1982.

Iresine portulacoides (A. St.-Hil.) Moq. var. *commersonii* (A. St.-Hil.) Moq. = **Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.) Mears var. **commersonii** (A. St.-Hil.) Mears
Referencias: Mears, J. A., 1982.

Iresine spiculigera Seub. = **Iresine diffusa** Humb. & Bonpl. ex Willd. var. **spiculigera** (Seub.) Eliasson

Iresine tomentosa Chodat & Wilczek = **Gomphrena mendocina** (Phil.) R.E. Fr. subsp. **mendocina**
Referencias: Hunziker, A. T. & Subils, R., 1977; Pedersen, T. M., 1984a.

Mengea peruviana Schauer = **Amaranthus peruvianus** (Schauer) Standl.
Referencias: Hunziker, A. T., 1965; Standley, P. C., 1937.

Mogiphanes aquatica D. Parodi = **Alternanthera aquatica** (D. Parodi) Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Rehfous, L., 1927.

Mogiphanes brasiliensis L. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Mogiphanes dunaliana (Moq.) Griseb. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Mogiphanes glauca (Mart.) Griseb. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Mogiphanes hirtula Mart. = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Mogiphanes paniculata (Kunth) Rusby = **Alternanthera paniculata** Kunth

Mogiphanes philorexoides D. Parodi = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Mears, J. A., 1977.

Mogiphanes ramosissima Mart. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Mogiphanes rosea Morong & Britton = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Chodat, R. H. & Rehfous, L., 1927; Pedersen, T. M., 2000.

Mogiphanes villosa Mart. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Mogiphanes virgata Schrad. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Oplotheca poiretiana (Schult.) Mart. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Oplotheca tomentosa Mart. = **Froelichia tomentosa** (Mart.) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987a.

Pedersenia Holub

Número de especies: 2

Pedersenia hassleriana (Chodat) Pedersen
Sin.: *Iresine hassleriana* Chodat
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3429* (G, P, S)].

Pedersenia macrophylla (R.E. Fr.) Pedersen
Sin.: *Iresine guaranitica* Chodat, *Iresine hassleriana* Chodat var. *macrophylla* (R.E. Fr.) Suess., *Iresine macrophylla* R.E. Fr., *Trommsdorffia macrophylla* (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10577* (SI), *Malme, G. O. A. 1920* (S)].

Pfaffia Mart.

Número de especies: 10, 1 endémica

Pfaffia brachiata Chodat = **Hebanthe occidentalis** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.

Pfaffia brachiata Chodat var. *grandiflora* O. Stützer = **Hebanthe occidentalis** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.

Pfaffia divergens O. Stützer = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen

Pfaffia dunaliana (Moq.) Schinz
Sin.: *Gomphrena dunaliana* Moq.
Referencias: Borsch, T. & Ortuño, T., com. pers.; Stützer, O., 1935.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Notas: Habita en el sur de Bolivia próximo a la provincia de Salta, Argentina. Su presencia es posible en el NW de Argentina.

Pfaffia fruticulosa Suess. var. **diffusa** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 11062* (C, CTES, G, MBM), *Zardini, E. M. 52488* (AS, BONN, MO)].

Pfaffia glabrata Mart.
Sin.: *Gomphrena glabrata* (Mart.) Moq., *Gomphrena glabrata* (Mart.) Moq. var. *angustifolia* Seub., *Gomphrena glabrata* (Mart.) Moq. var. *latifolia* Seub., *Pfaffia glabrata* Mart. var. *angustifolia* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia glabrata* Mart. var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer
Referencias: Martius, C. F. P. S., 1826; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Stützer, O., 1935.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 781* (SI)]; BRA[*Jönsson, G. 326a* (S, US)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3710* (CTES, FCQ, SI)].

Pfaffia glabrata Mart. var. *angustifolia* (Seub.) O. Stützer = **Pfaffia glabrata** Mart.

Pfaffia glabrata Mart. var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer = **Pfaffia glabrata** Mart.

Pfaffia glabratoides Suess. = **Quaternella glabratoides** (Suess.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Pfaffia glabrescens Suess. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen

Pfaffia glauca (Mart.) Spreng. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia gleasonii Suess.
Referencias: Suessenguth, K., 1938.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAB, Z)]; PRY[*Jörgensen, P. 344* (SI)].

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen
Sin.: *Alternanthera glauca* (Mart.) Hosseus, *Gomphrena glauca* (Mart.) Moq., *Gomphrena luzulaeflora* (Mart.) Moq., *Gomphrena stenophylla* Spreng., *Iresine glomerata* Spreng., *Iresine luzuliflora* (Mart.) Griseb., *Mogiphanes dunaliana* (Moq.) Griseb., *Mogiphanes glauca* (Mart.) Griseb., *Pfaffia divergens* O. Stützer, *Pfaffia glabrescens* Suess., *Pfaffia glauca* (Mart.) Spreng., *Pfaffia iresinoides* (Kunth) Spreng. var. *angustifolia* O. Stützer, *Pfaffia luzulaeflora* (Mart.) D. Dietr., *Pfaffia luzulaeflora* (Mart.) D. Dietr. f. *gracilis* O. Stützer, *Pfaffia luzulaeflora* (Mart.) D. Dietr. f. *virgata* O. Stützer, *Pfaffia luzulaeflora* (Mart.) D. Dietr. var. *microcephala* O. Stützer ex Suess., *Pfaffia luzulaeflora* (Mart.) D. Dietr. var. *paniculata* O. Stützer, *Pfaffia luzulaeflora* (Mart.) D. Dietr. var. *squarrosa* O. Stützer, *Pfaffia stenophylla* (Spreng.) Stuchlik, *Sertuernera glauca* Mart., *Sertuernera luzulaeflora* Mart.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Stützer, O., 1935.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, COA, PAI, PHA, SPE); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1094* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8805* (HBR, R, US)]; PRY[*Degen, R. 3293* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Gibert, J. E. 14* (K)].

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart.
Sin.: *Celosia gnaphaloides* L. f., *Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult., *Gomphrena lanata* Poir., *Gomphrena lanata* Poir. var. *latifolia* Seub., *Gomphrena lanata* Poir. var. *oblongifolia* Moq., *Gomphrena lanata* Poir. var. *parvifolia* Moq., *Gomphrena perennis* L. var. *brunnea* Stuchlik, *Gomphrena phagnaloides* Griseb., *Gomphrena poiretiana* Roem. & Schult., *Oplotheca poiretiana* (Schult.) Mart., *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert f. *parvifolia* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert var. *discolor* Suess., *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert var. *oblongifolia* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia lanata* (Poir.) Gibert var. *peteriana* Kuntze, *Pfaffia poiretiana* (Schult.) Stuchlik, *Pfaffia tenuis* N.E. Br., *Pfaffia tomentosa* Mart., *Xeraea phagnaloides* (Griseb.) Kuntze

Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Stützer, O., 1935.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(LAV, MAL, MON, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6548* (SI)]; BRA[*Ule, E. H. G. 1864* (HBG)]; PRY[*Hassler, E. 9111* (BM)]; URY[*Arechavaleta, J. 4295* (SI)].

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart. f. *subferruginea* O. Stützer = **Pfaffia helichrysoides** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart. var. *floccosa* (Seub.) O. Stützer = **Pfaffia helichrysoides** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia gnaphaloides (L. f.) Mart. var. *planifolia* (Seub.) O. Stützer = **Pfaffia helichrysoides** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia grandiflora (Hook. f.) R.E. Fr. = **Hebanthe grandiflora** (Hook. f.) Borsch & Pedersen
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.

Pfaffia helichrysoides (Moq.) Kuntze
Sin.: *Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. var. *floccosa* Seub., *Gomphrena gnaphaloides* (L. f.) Vahl ex Roem. & Schult. var. *planifolia* Seub., *Gomphrena helichrysoides* Moq., *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart. f. *subferruginea* O. Stützer, *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart. var. *floccosa* (Seub.) O. Stützer, *Pfaffia gnaphaloides* (L. f.) Mart. var. *planifolia* (Seub.) O. Stützer
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. s.n.* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5484* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4716* (SI)].

[Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng. var. *angustifolia* O. Stützer = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia jubata Mart.
Sin.: *Gomphrena jubata* (Mart.) Moq.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7306* (US)].

Pfaffia lanata (Poir.) Gibert = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a.

Pfaffia lanata (Poir.) Gibert f. *parvifolia* (Moq.) O. Stützer = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia lanata (Poir.) Gibert var. *discolor* Suess. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia lanata (Poir.) Gibert var. *latifolia* (Seub.) O. Stützer = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia lanata (Poir.) Gibert var. *oblongifolia* (Moq.) O. Stützer = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia lanata (Poir.) Gibert var. *peteriana* Kuntze = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia laurifolia Chodat = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Pfaffia luzulaeflora (Mart.) D. Dietr. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Pfaffia luzulaeflora (Mart.) D. Dietr. f. *gracilis* O. Stützer = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia luzulaeflora (Mart.) D. Dietr. f. *virgata* O. Stützer = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia luzulaeflora (Mart.) D. Dietr. var. *microcephala* O. Stützer ex Suess. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia luzulaeflora (Mart.) D. Dietr. var. *paniculata* O. Stützer = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia luzulaeflora (Mart.) D. Dietr. var. *squarrosa* O. Stützer = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen

Pfaffia ninae Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART).
Ejemplares de referencia: URY[*Pedersen, T. M. 16266* (C, CTES)].

Pfaffia occidentalis R.E. Fr. = **Hebanthe occidentalis** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.

Pfaffia occidentalis R.E. Fr. var. *densiflora* R.E. Fr. = **Hebanthe occidentalis** (R.E. Fr.) Borsch & Pedersen
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.

Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Pfaffia paraguayensis Chodat = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Pfaffia poiretiana (Schult.) Stuchlik = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia puberula (Mart.) Spreng. = **Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Pfaffia pulverulenta (Mart.) Kuntze = **Hebanthe pulverulenta** Mart.
Referencias: Borsch, T. & Pedersen, T. M., 1997.

Pfaffia pulverulenta (Mart.) Kuntze var. *rufescens* (Seub.) O. Stützer = **Hebanthe pulverulenta** Mart.
Referencias: Borsch, T. & Ortuño, T., com. pers.

Pfaffia reticulata (Seub.) Kuntze var. *strigulosa* Suess. = **Hebanthe eriantha** (Poir.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Pfaffia rufa (Mart.) Spreng. = **Alternanthera rufa** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Pfaffia sericea (Spreng.) Mart. = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Pfaffia sericea (Spreng.) Mart. f. *glabrescens* (Moq.) O. Stützer = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a.

Pfaffia sericea (Spreng.) Mart. f. *vestita* (Moq.) O. Stützer = **Pfaffia tuberosa** (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1967, 1987a.

Pfaffia stenophylla (Spreng.) Stuchlik = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Pfaffia tenuis N.E. Br. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976, 1987a.

Pfaffia tomentosa Mart. = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1967.

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken f. **rubella** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15575* (C)]; URY[*Pedersen, T. M. 15646* (C)].

Pfaffia tuberosa (Spreng.) Hicken f. **tuberosa**
Sin.: *Gomphrena sericea* Spreng., *Gomphrena tuberosa* Spreng., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *glabrescens* Moq., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *sericea* (Spreng.) Seub., *Gomphrena tuberosa* Spreng. var. *vestita* Moq., *Pfaffia sericea* (Spreng.) Mart., *Pfaffia sericea* (Spreng.) Mart. f. *glabrescens* (Moq.) O. Stützer, *Pfaffia sericea* (Spreng.) Mart. f. *vestita* (Moq.) O. Stützer
Referencias: Fabris, H. A., 1967c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pedersen, T. M., 1967, 1987a; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, ITA, MIE); URY(MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29359* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16534* (HBR, US)]; PRY[*Burkart, A. 18646* (MU, SI), *Jiménez, B. 1425* (CTES, PY)]; URY[*Cabrera, A. L. 32418* (SI)].

Philoxerus brasiliensis (L.) R. Br. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Philoxerus heliotropifolius Griseb. = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**
Referencias: Hieronymus, G. H. E. W., 1882.

Philoxerus portulacoides A. St.-Hil. = **Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.) Mears var. **portulacoides**
Referencias: Mears, J. A., 1982.

Philoxerus portulacoides A. St.-Hil. var. *commersonii* A. St.-Hil. = **Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.) Mears var. **commersonii** (A. St.-Hil.) Mears
Referencias: Mears, J. A., 1982.

Pityranthus crassifolius Mart. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Melville, R., 1958; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Pseudoplantago Suess.

Número de especies: 1 endémica

Pseudoplantago friesii Suess.
Referencias: Covas, G., 1939b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972; Suessenguth, K., 1934.

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1337* (SI), *Ekman, E. L. 114* (S)]; BRA[*Klein, R. M. 5091* (HBR, US)].

[Pupalia lappacea (L.) Juss. var. velutina (Walp.) Hook. f.]
Sin.: *Aerva velutina* (Walp.) Moq.
Referencias: Pedersen, T. M., 1999.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Pupalia sordida (Bunbury) Moq. = **Alternanthera pungens** Kunth

Quaternella Pedersen

Número de especies: 1 endémica

Quaternella glabratoides (Suess.) Pedersen
Sin.: *Gomphrena glabratoides* (Suess.) J.C. Siqueira, *Pfaffia glabratoides* Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b; Siqueira, J. S. J., 1992; Stützer, O., 1935.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7819* (K, S)].

Scleropus amarantoides Schrad. = **Amaranthus crassipes** Schltdl.
Referencias: Fawcett, W. & Rendle, A. B., 1914.

Scleropus crassipes (Schltdl.) Moq. = **Amaranthus crassipes** Schltdl.
Referencias: Fawcett, W. & Rendle, A. B., 1914.

Sertuernera glauca Mart. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Sertuernera luzulaeflora Mart. = **Pfaffia glomerata** (Spreng.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1967; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Telanthera albida Moq. = **Alternanthera albida** (Moq.) Griseb.

Telanthera brasiliana (L.) Moq. f. *grisea* Chodat = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Telanthera brasiliana (L.) Moq. var. *villosa* Moq. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Telanthera caracasana (Kunth) Moq. = **Alternanthera caracasana** Kunth
Referencias: Mears, J. A., 1977; Melville, R., 1958; Pedersen, T. M., 1967.

Telanthera dentata Moq. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **brasiliana**

Telanthera hirtula (Mart.) Moq. = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Hauman, L. L., 1924.

Telanthera lanceolata (Benth.) Moq. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Telanthera meyeriana Regel & Körn. = **Alternanthera meyeriana** (Regel & Körn.) Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Telanthera microcephala Moq. = **Alternanthera lanceolata** (Benth.) Schinz

Telanthera moquinii Webb ex Moq. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Telanthera multicaulis (Mart.) Moq. = **Alternanthera multicaulis** (Mart.) Kuntze

Telanthera nodifera Moq. = **Alternanthera nodifera** (Moq.) Griseb.

Telanthera paniculata (Kunth) Moq. = **Alternanthera paniculata** Kunth

Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b; Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. var. *carnosa* Moq. = **Blutaparon portulacoides** (A. St.-Hil.) Mears var. **commersonii** (A. St.-Hil.) Mears
Referencias: Mears, J. A., 1982.

Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. var. *denticulata* Seub. = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Mears, J. A., 1977.

Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. var. *linearifolia* Chodat = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **angustifolia** Suess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Telanthera philoxeroides (Mart.) Moq. var. *obtusifolia* Moq. = **Alternanthera philoxeroides** (Mart.) Griseb. f. **philoxeroides**
Referencias: Mears, J. A., 1977; Pedersen, T. M., 1997b.

Telanthera puberula (Mart.) Moq. = **Alternanthera puberula** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Telanthera pungens (Kunth) Moq. = **Alternanthera pungens** Kunth
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Telanthera ramosissima (Mart.) Moq. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze

Telanthera rosea (Morong) Chodat = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Telanthera rosea (Morong) Chodat var. *cinnabarina* Chodat = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Telanthera rosea (Morong) Chodat var. *pallens* Chodat = **Alternanthera malmeana** R.E. Fr. var. **straminea** (Chodat) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1990.

Telanthera rosea (Morong) Chodat var. *straminea* Chodat = **Alternanthera malmeana** R.E. Fr. var. **straminea** (Chodat) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Telanthera rosea (Morong) Chodat var. *typica* Chodat, nom. inval. = **Alternanthera hirtula** (Mart.) R.E. Fr. var. **hirtula**
Referencias: Pedersen, T. M., 2000.

Telanthera rufa (Mart.) Moq. = **Alternanthera rufa** (Mart.) D. Dietr.
Referencias: Smith, L. B. & Downs, R. J., 1972.

Telanthera virgata (Schrad.) Moq. = **Alternanthera brasiliana** (L.) Kuntze var. **villosa** (Moq.) Kuntze
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Trommsdorffia macrophylla (R.E. Fr.) Pedersen = **Pedersenia macrophylla** (R.E. Fr.) Pedersen
Referencias: Holub, J. L., 1998.

Xeraea acaulis (Walp.) Kuntze = **Gomphrena meyeniana** Walp. var. **genuina** Stuchlik
Referencias: Pedersen, T. M., 1997b.

Xeraea arborescens (L. f.) Kuntze = **Gomphrena arborescens** L. f.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea argentina (Seub.) Kuntze = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**

Xeraea boliviana (Moq.) Kuntze = **Gomphrena boliviana** Moq. f. **boliviana**
Referencias: Hunziker, A. T., 1971a; Pedersen, T. M., 1990.

Xeraea celosioides (Mart.) Kuntze = **Gomphrena celosioides** Mart. var. **celosioides**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea decumbens (Jacq.) Kuntze = **Gomphrena serrata** L.

Xeraea elegans (Mart.) Kuntze = **Gomphrena elegans** Mart. var. **elegans**

Xeraea globosa (L.) Kuntze = **Gomphrena globosa** L.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea graminea (Moq.) Kuntze = **Gomphrena graminea** Moq.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea haenkeana (Mart.) Kuntze = **Gomphrena haenkeana** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Xeraea hilariana (Moq.) Kuntze = **Gomphrena elegans** Mart. var. **elegans**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea holosericea (Mart.) Kuntze = **Gomphrena holosericea** (Mart.) Moq.

Xeraea macrocephala (A. St.-Hil.) Kuntze = **Gomphrena macrocephala** A. St.-Hil.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea martiana (Gillies ex Moq.) Kuntze = **Gomphrena martiana** Gillies ex Moq. var. **martiana**

Xeraea oligocephala (J. Remy) Kuntze = **Gomphrena bicolor** Mart.
Referencias: Pedersen, T. M., 1976.

Xeraea pearcei (Oliv.) Kuntze = **Gomphrena umbellata** J. Remy
Referencias: Holzhammer, E., 1955–1956.

Xeraea perennis (L.) Kuntze = **Gomphrena perennis** L. var. **perennis**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea phagnaloides (Griseb.) Kuntze = **Pfaffia gnaphaloides** (L. f.) Mart.
Referencias: Suessenguth, K., 1934.

Xeraea pulchella (Mart.) Kuntze = **Gomphrena pulchella** Mart. subsp. **pulchella**
Referencias: Pedersen, T. M., 1976; Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea pumila (Gillies ex Moq.) Kuntze = **Gomphrena pumila** Gillies ex Moq.

Xeraea regeliana (Seub.) Kuntze = **Gomphrena regeliana** Seub.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea schlechtendaliana (Mart.) Kuntze = **Gomphrena schlechtendaliana** Mart.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea sellowiana (Mart.) Kuntze = **Gomphrena sellowiana** Mart.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea umbellata (J. Remy) Kuntze = **Gomphrena umbellata** J. Remy

Xeraea vaga (Mart.) Kuntze = **Gomphrena vaga** Mart.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea villosa (Mart.) Kuntze = **Gomphrena perennis** L. var. **perennis**
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

Xeraea virgata (Mart.) Kuntze = **Gomphrena virgata** Mart.
Referencias: Siqueira, J. S. J., 1992.

ANACARDIACEAE

10 géneros, 50 especies, 17 especies endémicas, 1 especie introducida.

Amyris polygama Cav. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Anacardium L.

Número de especies: 1

Anacardium humile A. St.-Hil.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Muñoz, J. D., 1990.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13206* (SI)]; PRY[*Chodat, R. H. 348* (G)].

Aspidosperma quebracho-colorado Schltdl. = **Schinopsis quebracho-colorado** (Schltdl.) F.A. Barkley & T. Mey.
Referencias: Hunziker, A. T., 1998b.

Aspidosperma quebracho-colorado Schltdl. var. *pendula* Speg. = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Astronium Jacq.

Número de especies: 5, 1 endémica

Astronium balansae Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1938b; Fleig, M., 1987; Mattick, W. F., 1934; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1063* (LIL, SI)]; BRA[*Hagelund, K. 5226* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 2526* (G), *Schinini, A. 24043* (CTES, G)].

Astronium candollei Engl. = **Astronium urundeuva** (Allemão) Engl. var. **candollei** (Engl.) Hassl. ex Mattick
Referencias: Mattick, W. F., 1934.

Astronium fraxinifolium Schott f. *glaberrimum* Mattick = **Astronium fraxinifolium** Schott var. **glabrum** Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1968.

Astronium fraxinifolium Schott f. *subglabrum* Mattick = **Astronium fraxinifolium** Schott var. **glabrum** Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1968.

Astronium fraxinifolium Schott var. **fraxinifolium**
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Arenas, P. 1548* (CTES)].

Astronium fraxinifolium Schott var. **glabrum** Engl.
Sin.: *Astronium fraxinifolium* Schott f. *glaberrimum* Mattick, *Astronium fraxinifolium* Schott f. *subglabrum* Mattick
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. s.n.* (BAF)]; PRY[*Hassler, E. 7151* (G, LIL, MO)].

Astronium gracile Engl. f. *acuminatum* Chodat & Hassl. = **Astronium gracile** Engl. var. **acuminatum** (Chodat & Hassl.) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1968.

Astronium gracile Engl. f. *serratum* Mattick = **Astronium gracile** Engl. var. **gracile**
Referencias: Barkley, F. A., 1968.

Astronium gracile Engl. var. **acuminatum** (Chodat & Hassl.) F.A. Barkley
Sin.: *Astronium gracile* Engl. f. *acuminatum* Chodat & Hassl.
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Mattick, W. F., 1934; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Endémica. 200–300 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6224* (G)].

Astronium gracile Engl. var. **gracile**
Sin.: *Astronium gracile* Engl. f. *serratum* Mattick
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Mattick, W. F., 1934; Muñoz, J. D., 1990; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 256* (G, K, LP, M)].

Astronium graveolens Jacq.
Referencias: Barfod, A., 1987; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Árbol. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAN, CEN, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16988* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 44551* (AS, MO)].

Astronium juglandifolium Griseb. = **Astronium urundeuva** (Allemão) Engl. var. **urundeuva**
Referencias: Mattick, W. F., 1934.

Astronium urundeuva (Allemão) Engl. var. **candollei** (Engl.) Hassl. ex Mattick
Sin.: *Astronium candollei* Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Mattick, W. F., 1934; Muñoz, J. D., 1990, 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Árbol. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(CON, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3390* (LIL, US)]; PRY[*Balansa, B. 2528* (G)].

Astronium urundeuva (Allemão) Engl. var. **urundeuva**
Sin.: *Astronium juglandifolium* Griseb., *Myracrodruon urundeuva* Allemão
Referencias: Barkley, F. A., 1968; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1938b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mattick, W. F., 1934; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, SAL); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9698* (GH, LP, NY, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 7215* (G)].

Cybianthus myrtifolius Griseb. = **Schinus myrtifolius** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000.

Duvaua crenata Phil. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua dependens (Ortega) DC. var. *obovata* Arechav. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua dependens (Ortega) DC. var. *ovata* Arechav. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua dependens (Ortega) DC. var. *parviflora* Arechav. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua dependens (Ortega) DC. var. *patagonica* Phil. = **Schinus odonellii** F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua fasciculata Griseb. = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua latifolia Gillies ex Lindl. = **Schinus latifolius** (Gillies ex Lindl.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua longifolia Lindl. = **Schinus longifolius** (Lindl.) Speg. var. **longifolius**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua molle Bertero ex Marchand = **Schinus velutinus** (Turcz.) I.M. Johnst.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua ovata Lindl. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua patagonica Phil. = **Schinus patagonicus** (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua praecox Griseb. = **Schinus praecox** (Griseb.) Speg.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua praecox Griseb. var. *glomerata* Griseb. = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua praecox Griseb. var. *hyemalis* Griseb. = **Schinus praecox** (Griseb.) Speg.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua praecox Griseb. var. *montana* Griseb. = **Schinus praecox** (Griseb.) Speg.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua sinuata Griseb. = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Duvaua velutina Turcz. = **Schinus velutinus** (Turcz.) I.M. Johnst.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Haplorhus Engl.

Número de especies: 1

Haplorhus peruviana Engl.
Referencias: Ricardi, M., 1957a.
Árbol. Nativa. 500–1000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3485* (CONC)].

Laurus caustica Molina = **Lithraea caustica** (Molina) Hook. & Arn. var. **caustica**
Referencias: Barkley, F. A., 1962a.

Lithraea Miers

Número de especies: 3, 1 endémica

Lithraea brasiliensis Marchand
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1962a; Cabrera, A. L., 1938b; Fleig, M., 1987; Muñoz, J. D., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, FLA, LAV, MAL, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 713* (BA, SI)]; BRA[*Rambo, B. 44500* (LIL)]; URY[*Clos, E. C. 4971* (BAB)].

Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn. f. *pilosa* (Engl.) Cabrera = **Lithraea caustica** (Molina) Hook. & Arn. var. **pilosa** Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1962a.

Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn. var. **caustica**
Sin.: *Laurus caustica* Molina
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Barkley, F. A., 1962a.
Árbol. Endémica. 0–2800 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994857* (CONC)].

Lithraea caustica (Molina) Hook. & Arn. var. **pilosa** Engl.
Sin.: *Lithraea caustica* (Molina) Hook. & Arn. f. *pilosa* (Engl.) Cabrera
Referencias: Barkley, F. A., 1962a.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 501* (G, LIL, NY, US)].

Lithraea chichita (Speg.) Rojas Acosta = **Schinus terebinthifolius** Raddi var. **pohlianus** Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Lithraea gilliesii Griseb. = **Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1938b.

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.
Sin.: *Lithraea gilliesii* Griseb., *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. var. *lorentziana* Hieron. ex Lillo, *Lithraea ternifolia* (Hook.) F.A. Barkley, *Schinus brasiliensis* Marchand ex Cabrera, p.p., *Schinus molleoides* Vell., *Schinus ternifolius* Hook.
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1962a; Cabrera, A. L., 1938b; Fleig, M., 1987; Muñoz, J. D., 1990, 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE); URY(ART, CLA, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 419* (LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 3421* (R, S)]; PRY[*Hassler, E. 4192* (G)]; URY[*Morrone, O. 5273* (SI)].

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. var. *lorentziana* Hieron. ex Lillo = **Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Lithraea ternifolia (Hook.) F.A. Barkley = **Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Litrea crenata Phil. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Litrea molle Gay = **Schinus latifolius** (Gillies ex Lindl.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Litrea montana Phil. = **Schinus montanus** (Phil.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Cabrera, A. L., 1938b.

Litrea montana Phil. var. *patagonica* Phil. = **Schinus patagonicus** (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Litrea patagonica Phil. = **Schinus patagonicus** (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Loxopterygium Hook. f.

Número de especies: 1

Loxopterygium grisebachii Hieron. & Lorentz ex Griseb.
Referencias: Barkley, F. A., 1962b; Cabrera, A. L., 1938b; Legname, P. R., 1982; Muñoz, J. D., 2000.
Árbol. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11414* (SI)].

Loxopterygium lorentzii Griseb. = **Schinopsis lorentzii** (Griseb.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1962b; Hunziker, A. T., 1998b.

Mangifera L.

Número de especies: 1 introducida

Mangifera indica L.
Referencias: Fleig, M., 1987; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Introducida. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 799* (PACA)]; PRY[*Muñoz, J. D. 2015* (ERA)].

Mauria Kunth

Número de especies: 1

Mauria thaumatophylla Loes.
Referencias: Ayarde, H. R., 1994; Muñoz, J. D., 2000.
Arbolito o árbol. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ayarde, H. R. 157* (LIL)].

Moya ferox Griseb. = **Schinus myrtifolius** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Myracrodruon urundeuva Allemão = **Astronium urundeuva** (Allemão) Engl. var. **urundeuva**
Referencias: Mattick, W. F., 1934.

Quebrachia lorentzii (Griseb.) Griseb. = **Schinopsis lorentzii** (Griseb.) Engl.

Quebrachia morongii Britton = **Schinopsis balansae** Engl.
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinopsis Engl.

Número de especies: 7, 1 endémica

Schinopsis balansae Engl.
Sin.: *Quebrachia morongii* Britton, *Schinopsis balansae* Engl. var. *pendula* Tortorelli
Referencias: Cabrera, A. L., 1938b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Meyer, T. & Barkley, F. A., 1973; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); PRY(APY, APA, CON, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tortorelli, L. A. 391a* (SI)]; PRY[*Meyer, T. 18553* (LIL)].

Schinopsis balansae Engl. var. *pendula* Tortorelli = **Schinopsis balansae** Engl.
Referencias: Meyer, T. & Barkley, F. A., 1973.

Schinopsis brasiliensis Engl.
Referencias: Meyer, T. & Barkley, F. A., 1973; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 2376a* (AS, BAF, LIL, LP, SI)].

Schinopsis brasiliensis Engl. var. *glabra* Engl. = **Schinopsis glabra** (Engl.) F.A. Barkley & T. Mey.
Referencias: Meyer, T. & Barkley, F. A., 1973.

Schinopsis cornuta Loes.
Referencias: Meyer, T. & Barkley, F. A., 1973; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Nativa. 200–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 18095* (CTES, LIL, SI)].

Schinopsis glabra (Engl.) F.A. Barkley & T. Mey.
Sin.: *Schinopsis brasiliensis* Engl. var. *glabra* Engl.
Referencias: Meyer, T. & Barkley, F. A., 1973; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 5746* (LP)].

[Schinopsis haenkeana Engl.]
Referencias: Hunziker, A. T., 1998b; Muñoz, J. D., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Schinopsis heterophylla Ragonese & J. Castillo
Referencias: Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 1956* (BAB)]; PRY[*Schinini, A. 14977* (CTES)].
Notas: Puede tratarse de un híbrido entre *Schinopsis balansae* y *S. lorentzii* (Muñoz, 2000).

Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl.
Sin.: *Loxopterygium lorentzii* Griseb., *Quebrachia lorentzii* (Griseb.) Griseb.
Referencias: Barkley, F. A. & Meyer, T., 1950; Cabrera, A. L., 1938b; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Hunziker, A. T., 1998b; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3173* (G, GH, LP, S)]; PRY[*Rojas, T. 2376* (BAF, SI)].

Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. var. *marginata* (Engl.) Cabrera = **Schinopsis marginata** Engl.
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinopsis marginata Engl.
Sin.: *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. var. *marginata* (Engl.) Cabrera
Referencias: Hunziker, A. T., 1998b; Muñoz, J. D., 2000.
Árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1787* (BA, LIL, SI)].

[Schinopsis quebracho-colorado (Schltdl.) F.A. Barkley & T. Mey.]
Sin.: *Aspidosperma quebracho-colorado* Schltdl.
Referencias: Hunziker, A. T., 1998b; Muñoz, J. D., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Schinus L.

Número de especies: 29, 14 endémicas

Schinus apparicianus Barroso = **Schinus engleri** F.A. Barkley var. **engleri**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus areira L.
Sin.: *Schinus molle* L. var. *areira* (L.) DC.
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Legname, P. R., 1982; Muñoz, J. D., 1990, 2000; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Árbol. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, III, IV, V, RME); PRY(APA, AMA, CEN, ITA); URY(MON, PAY, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3479* (LP, NY)]; BRA[*Rambo, B. 43256* (LIL)]; CHL[*Jiles, C. 663* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 10837* (LIL)]; URY[*Arechavaleta, J. 1467* (CORD)].

Schinus brasiliensis Marchand ex Cabrera, p.p. = **Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1962a.

Schinus bumelioides I.M. Johnst.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Muñoz, J. D., 2000.
Arbolito o árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9422* (K, LIL, NY, S, SI)].

Schinus cabrerae F.A. Barkley = **Schinus piliferus** I.M. Johnst. var. **cabrerae** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus chebataroffii Herter = **Schinus weinmannifolius** Engl. var. **weinmannifolius**
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973.

Schinus chichita Speg. = **Schinus terebinthifolius** Raddi var. **pohlianus** Engl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1938b; 1939d.

Schinus chilensis Marchand = **Schinus velutinus** (Turcz.) I.M. Johnst.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus chilensis Marchand var. *glabra* Marchand = **Schinus latifolius** (Gillies ex Lindl.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus crenatus Engl. = **Schinus patagonicus** (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega f. *arenicola* Hauman = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **arenicola** (Hauman) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *crenata* Arechav. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *crenatus* Engl. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *latifolia* Marchand = **Schinus latifolius** (Gillies ex Lindl.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *obovata* Engl. = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *ovata* Marchand = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *paraguariensis* Hassl. = **Schinus longifolius** (Lindl.) Speg. var. **paraguariensis** (Hassl.) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega var. *parviflora* Marchand = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus dependens Ortega subsp. *crenata* (Phil.) Reiche = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus engleri F.A. Barkley var. **engleri**
Sin.: *Schinus apparicianus* Barroso
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1944, 1957a.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(LAV, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8792* (S, UC)]; URY[*Arechavaleta, J. 186* (G)].

Schinus engleri F.A. Barkley var. **uruguayensis** F.A. Barkley
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Fabris, H. A., 1965g; Muñoz, J. D., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 177* (BAB)]; BRA[*Wasum, R. 1820* (MBM)]; URY[*Cabrera, A. L. 3871* (LP)].

Schinus fasciculatus (Griseb.) I.M. Johnst. var. **arenicola** (Hauman) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus dependens* Ortega f. *arenicola* Hauman, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *arenicola* (Hauman) Cabrera
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Fabris, H. A., 1965g; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(CAS, COL, FLA, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8300* (SI)]; URY[*Berg, O. K. 62* (CORD)].
Notas: Probablemente crezca en Paraguay (Muñoz, 1990). Citada para Brasil sin indicar localidad o material de referencia (Barkley, 1957a).

Schinus fasciculatus (Griseb.) I.M. Johnst. var. *boliviensis* F.A. Barkley = **Schinus piliferus** I.M. Johnst. var. **boliviensis** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus fasciculatus (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Sin.: *Duvaua fasciculata* Griseb., *Duvaua praecox* Griseb. var. *glomerata* Griseb., *Duvaua sinuata* Griseb., *Schinus huyngan* Molina var. *heterophylla* Kuntze, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *fasciculatus* (Griseb.) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *heterophyllus* (Kuntze) Cabrera, *Schinus sinuatus* (Griseb.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 266* (CORD)]; PRY[*Rojas, T. 2852a* (AS, BAF, G, LIL, LP)].

Schinus ferox Hassl.
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Cabrera, A. L., 1938b; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 1578b* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 30888* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 11261a* (A, BAF, BM, F, G, GH, LIL, MO, NY, S)]; URY[*Rosengurtt, B. 8721b* (MVFA)].

Schinus gracilipes I.M. Johnst.
Sin.: *Schinus gracilipes* I.M. Johnst. var. *pilosus* F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Cabrera, A. L., 1938b; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto o árbol. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3887* (GH, SI)].

Schinus gracilipes I.M. Johnst. var. *pilosus* F.A. Barkley = **Schinus gracilipes** I.M. Johnst.
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus huyngan Molina var. *heterophylla* Kuntze = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus johnstonii F.A. Barkley
Sin.: *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Fabris, H. A., 1965g; Muñoz, J. D., 2000; Múlgura, M. E., 1988.
Arbusto. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 113* (F, G, MO, NY, SI, US)].

Schinus kauselii F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Arbusto. Endémica. 1700 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 2317* (LIL)].

Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.
Sin.: *Duvaua latifolia* Gillies ex Lindl., *Litrea molle* Gay, *Schinus chilensis* Marchand var. *glabra* Marchand, *Schinus dependens* Ortega var. *latifolia* Marchand
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a; Cabrera, A. L., 1938b.
Árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 5639* (SGO)].

Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl. var. *tomentosus* Fenzl = **Schinus velutinus** (Turcz.) I.M. Johnst.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus lentescifolius Chebat., nom. nud. = **Schinus weinmannifolius** Engl. var. **weinmannifolius**
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973.

Schinus lentiscifolius Marchand
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1944, 1957a; Cabrera, A. L., 1939d; Fleig, M., 1987; Muñoz, J. D., 1990, 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, SPE); URY(CLA, LAV, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, E. A. 5020* (LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17895* (S)]; PRY[*Bonpland, A. J. A. s.n.* (*)]; URY[*Herter, W. G. F. 1082* (G, GH, LIL, MO)].

Schinus longifolius (Lindl.) Speg. var. **longifolius**
Sin.: *Duvaua longifolia* Lindl.
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Fabris, H. A., 1965g; Muñoz, J. D., 1990, 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, CON, ITA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 685* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11855* (S)]; PRY[*Muñoz, J. D. 2034* (ERA), *Rojas, T. 6529* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 1871* (G, U)].

Schinus longifolius (Lindl.) Speg. var. **paraguariensis** (Hassl.) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus dependens* Ortega var. *paraguariensis* Hassl., *Schinus paraguariensis* (Hassl.) F.A. Barkley
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); PRY(AMA); URY(ART, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muñoz, J. D. 2217* (ERA)]; PRY[*Rojas, T. 4203* (AS, LIL, LP)]; URY[*Berro, M. B. 1510* (MVFA)].

Schinus marchandii F.A. Barkley
Sin.: *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *chubutensis* Cabrera
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a; Muñoz, J. D., 2000; Múlgura, M. E., 1988.
Arbusto. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 3361* (F, LIL, S)]; CHL[*Seki 427* (CONC)].

Schinus meyeri F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1973; Legname, P. R., 1982; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1600–1800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 9100* (SI)].

Schinus molle L. var. *areira* (L.) DC. = **Schinus areira** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1938b.

Schinus molle L. var. *hassleri* F.A. Barkley = **Schinus weinmannifolius** Endl. var. **hassleri** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 1990.

Schinus molle L. var. **molle**
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Cabrera, A. L., 1938b; Muñoz, J. D., 1990, 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); CHL(I, III); PRY(CAU, GUA, ITA, MIE); URY(ART, CLA, LAV, PAY, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23031* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 26024* (LIL)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 1614* (CONC)]; PRY[*Montes, J. E. 16111* (LIL)]; URY[*Rosengurtt, B. 4976-b* (LIL, S)].

Schinus molle L. var. **rusbyi** F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Árbol. Nativa. 2000–3000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sudzuki, H. F. 335* (SGO)].

Schinus molleoides Vell. = **Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1962a.

Schinus montana (Phil.) Engl. var. *patagonica* Reiche = **Schinus patagonicus** (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus montanus (Phil.) Engl.
Sin.: *Litrea montana* Phil.
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a; Cabrera, A. L., 1938b.
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3464* (LP), *Philippi, F. 892* (G)].

Schinus montanus (Phil.) Engl. var. *crenuloides* F.A. Barkley = **Schinus patagonicus** (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **crenuloides** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus myrtifolius (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Cybianthus myrtifolius* Griseb., *Moya ferox* Griseb.
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a; Cabrera, A. L., 1938b; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11198* (SI), *Lorentz, P. G. 317* (GH)].

Schinus odonellii F.A. Barkley
Sin.: *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *patagonica* Phil., *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera

Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto. Endémica. 500–2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1088* (SI)]; CHL[*Cox, G. s.n.* (SGO)].

Schinus paraguariensis (Hassl.) F.A. Barkley = **Schinus longifolius** (Lindl.) Speg. var. **paraguariensis** (Hassl.) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **crenuloides** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus montanus* (Phil.) Engl. var. *crenuloides* F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 1278* (GH)].

Schinus patagonicus (Phil.) I.M. Johnst. ex Cabrera var. **patagonicus**
Sin.: *Duvaua patagonica* Phil., *Litrea montana* Phil. var. *patagonica* Phil., *Litrea patagonica* Phil., *Schinus crenatus* Engl., *Schinus montana* (Phil.) Engl. var. *patagonica* Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000; Múlgura, M. E., 1988.
Arbusto o arbolito. Endémica. 100–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 91* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20000* (CONC, SGO)].

Schinus pearcei Engl.
Referencias: Ricardi, M., 1957a.
Árbol. Nativa. 1400–1500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3769* (CONC)].

Schinus piliferus I.M. Johnst. var. **boliviensis** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus fasciculatus* (Griseb.) I.M. Johnst. var. *boliviensis* F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 4502* (LIL, NY)].

Schinus piliferus I.M. Johnst. var. **cabrerae** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus cabrerae* F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000.
Arbolito. Nativa. 200–700 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 1167* (BA, BAB, LIL, NY)].

Schinus piliferus I.M. Johnst. var. **piliferus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9830* (BM, GH, K, MO)].

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *arenicola* (Hauman) Cabrera = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **arenicola** (Hauman) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p. = **Schinus johnstonii** F.A. Barkley
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *australis* Cabrera, p.p. = **Schinus marchandii** F.A. Barkley
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *chubutensis* Cabrera = **Schinus marchandii** F.A. Barkley
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *crenatus* (Phil.) Cabrera = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *fasciculatus* (Griseb.) Cabrera = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *heterophyllus* (Kuntze) Cabrera = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *ovatus* (Lindl.) Cabrera = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *parviflorus* (Marchand) Cabrera = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera = **Schinus odonellii** F.A. Barkley
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley = **Schinus polygamus** (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera var. **parviflorus** (Marchand) F.A. Barkley
Sin.: *Duvaua crenata* Phil., *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *parviflora* Arechav., *Litrea crenata* Phil., *Schinus*

dependens Ortega subsp. *crenata* (Phil.) Reiche, *Schinus dependens* Ortega var. *crenata* Arechav., *Schinus dependens* Ortega var. *crenatus* Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *parviflora* Marchand, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *crenatus* (Phil.) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *parviflorus* (Marchand) Cabrera
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 239* (BA, LP)].

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera var. **polygamus**
Sin.: *Amyris polygama* Cav., *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *obovata* Arechav., *Duvaua dependens* (Ortega) DC. var. *ovata* Arechav., *Duvaua ovata* Lindl., *Schinus dependens* Ortega var. *brevifolia* Fenzl ex Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *obovata* Engl., *Schinus dependens* Ortega var. *ovata* Marchand, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera f. *ovatus* (Lindl.) Cabrera, *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera var. *chilensis* F.A. Barkley
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 2111* (LIL, LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996120* (CONC)].

Schinus praecox (Griseb.) Speg.
Sin.: *Duvaua praecox* Griseb., *Duvaua praecox* Griseb. var. *hyemalis* Griseb., *Duvaua praecox* Griseb. var. *montana* Griseb.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(COR, LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 6987* (CORD, MO), *Lorentz, P. G. 3816* (CORD)].

Schinus ramboi F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Arbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 42500* (LIL)].

Schinus rhoifolius Mart. = **Schinus terebinthifolius** Raddi var. **rhoifolius** (Mart.) Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus roigii Ruiz Leal & Cabrera
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 15866* (MERL)].

Schinus sinuatus (Griseb.) Engl. = **Schinus fasciculatus** (Griseb.) I.M. Johnst. var. **fasciculatus**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus spinosus Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a.
Arbusto o arbolito. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11093* (GH, NY, S)].

Schinus terebinthifolius Raddi var. **acutifolius** Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 533* (LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 7588* (G, NY)]; PRY[*Muñoz, J. D. 2010* (ERA)].

Schinus terebinthifolius Raddi var. **pohlianus** Engl.
Sin.: *Lithraea chichita* (Speg.) Rojas Acosta, *Schinus chichita* Speg.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Cabrera, A. L., 1938b, 1939d; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Árbol. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 338* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 826* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 5808* (A, G, LIL, MO, NY, S)].

Schinus terebinthifolius Raddi var. **rhoifolius** (Mart.) Engl.
Sin.: *Schinus rhoifolius* Mart.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Stellfeld, C. 1304* (MBM)].

Schinus terebinthifolius Raddi var. **terebinthifolius**
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1730* (LIL, S)]; PRY[*Zardini, E. M. 47622* (AS, MO)].

Schinus ternifolius Hook. = **Lithraea molleoides** (Vell.) Engl.
Referencias: Muñoz, J. D., 2000.

Schinus velutinus (Turcz.) I.M. Johnst.
Sin.: *Duvaua molle* Bertero ex Marchand, *Duvaua velutina* Turcz., *Schinus chilensis* Marchand, *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl. var. *tomentosus* Fenzl
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 964* (GH, NY)].

Schinus venturii F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1944, 1957a; Muñoz, J. D., 2000.
Arbolito. Nativa. 500–1500 m.

Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3824* (SI), *Tortorelli, L. A. 1880* (BAB)].

Schinus weinmannifolius Engl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl. = **Schinus weinmannifolius** Engl. var. **riedelianus** Engl.
Referencias: Borba, D. F., 1976.

Schinus weinmannifolius Engl. f. *intermedius* Chodat & Hassl. = **Schinus weinmannifolius** Engl. var. **riedelianus** Engl.
Referencias: Borba, D. F., 1976.

Schinus weinmannifolius Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl. = **Schinus weinmannifolius** Engl. var. **riedelianus** Engl.
Referencias: Borba, D. F., 1976.

[Schinus weinmannifolius Engl. f. pubescens Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Schinus weinmannifolius Engl. var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p. = **Schinus weinmannifolius** Endl. var. **hassleri** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus weinmannifolius Engl. var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p. = **Schinus weinmannifolius** Engl. var. **riedelianus** Engl.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a.

Schinus weinmannifolius Engl. var. **dubius** F.A. Barkley
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1944, 1957a; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(COA, GUA, PAI); URY(CLA, DUR, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 87* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. 46089* (LIL)]; PRY[*Sparre, B. B. 1315* (LIL)]; URY[*Schroeder 19419* (BAF)].

Schinus weinmannifolius Endl. var. **hassleri** (F.A. Barkley) F.A. Barkley
Sin.: *Schinus molle* L. var. *hassleri* F.A. Barkley, *Schinus weinmannifolius* Engl. var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p.
Referencias: Barkley, F. A., 1957a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Muñoz, J. D., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7909* (A, BM, G, LIL, MO, NY, S)].

Schinus weinmannifolius Engl. var. **riedelianus** Engl.
Sin.: *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *intermedius* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. f. *paucijuga* Chodat & Hassl., *Schinus weinmannifolius* Engl. var. *angustifolius* F.A. Barkley, p.p.
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(MAL, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 3980* (LIL, US)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16369* (G, S)]; PRY[*Hassler, E. 213* (G)]; URY[*Schroeder 19434* (BA)].

Schinus weinmannifolius Engl. var. **weinmannifolius**
Sin.: *Schinus chebataroffii* Herter, *Schinus lentescifolius* Chebat., nom. nud.
Referencias: Arrillaga de Maffei, B. R., Ziliani, G. & Ren, J., 1973; Barkley, F. A., 1957a; Cabrera, A. L., 1938b; Muñoz, J. D., 1990, 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quiroga, H. 7680* (LIL, S)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2825* (R, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 9339* (G, MO, NY, S)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 3950* (MVM)].

Tapirira Aubl.

Número de especies: 1

Tapirira guianensis Aubl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Muñoz, J. D., 1990.
Árbol. Nativa. 200–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 39740* (MBM)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3663* (CTES, FCQ, SI)].

ANNONACEAE

5 géneros, 30 especies, 7 especies endémicas.

Aberemoa laevis R.E. Fr. = **Duguetia phaeoclados** (Mart.) Maas & H. Rainer
Referencias: Maas, P. J. M., 1999; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.

Annona L.

Número de especies: 13, 5 endémicas

Annona amambayensis Hassl. ex R.E. Fr. = **Annona cacans** Warm.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.

Annona cacans Warm.
Sin.: *Annona amambayensis* Hassl. ex R.E. Fr., *Annona cacans* Warm. var. *glabriuscula* R.E. Fr.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Fernández Casas, F. J., 1988; Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 1043* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 10729* (BM, C, F, MICH, MO, S, SI, UC)].

Annona cacans Warm. var. *glabriuscula* R.E. Fr. = **Annona cacans** Warm.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.

Annona calophylla R.E. Fr.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 100–200 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8174* (BM, G)].

Annona campestris R.E. Fr.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(APA, CAU, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9495* (B, BM, F, G, S, UC)].

Annona coriacea Mart. var. **coriacea**
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Goetzke, S. 306* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5861* (G)].

Annona coriacea Mart. var. **cuneata** R.E. Fr.
Referencias: Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Arbusto o árbol. Endémica. 100 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5470* (BM, G, UC)].

Annona cornifolia A. St.-Hil.
Referencias: Fries, R. E., 1931b.
Subarbusto. Nativa. 100–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10990* (S)].

Annona crassiflora Mart.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5131* (BM, G, K, UC)].

Annona crotonifolia Mart.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9841* (BM, G)].

Annona dioica A. St.-Hil.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Árbol. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9183* (S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4643* (G, K), *Kiesling, R. 9632* (G, MO, PY, SI), *Múlgura de Romero, M. E. 3639* (CTES, FCQ, SI)].

Annona fagifolia A. St.-Hil. & Tul. = **Rollinia sylvatica** (A. St.-Hil.) Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Annona furfuracea A. St.-Hil. = **Duguetia furfuracea** (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994.

Annona glabra L.
Referencias: Fries, R. E., 1931b; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13746* (S)].

Annona glaucophylla R.E. Fr.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8119* (B, BM, F, G, S, UC)].

Annona grandifolia A. St.-Hil. & Tul. = **Annona monticola** Mart.
Referencias: Fries, R. E., 1931b; Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994.

Annona montana Macfad.
Referencias: Fries, R. E., 1931b.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11997* (S)].

[Annona monticola Mart.]
Sin.: *Annona grandifolia* A. St.-Hil. & Tul.
Referencias: Fries, R. E., 1931b; Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Annona mucosa Jacq. = **Rollinia mucosa** (Jacq.) Baill.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992, 1994.

Annona nutans (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Sin.: *Annona spinescens* Mart. var. *nutans* R.E. Fr.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Safford, W. E., 1914; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18281* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4324* (AS, BM, E, F, G, K, L, M)].

Annona paraguayensis R.E. Fr.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931b; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8097* (G, S)].

Annona phaeoclados Mart. = **Duguetia phaeoclados** (Mart.) Maas & H. Rainer
Referencias: Maas, P. J. M., 1999.

Annona spinescens Mart. var. *nutans* R.E. Fr. = **Annona nutans** (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1994.

Annona sylvatica A. St.-Hil. = **Rollinia sylvatica** (A. St.-Hil.) Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Duguetia A. St.-Hil.

Número de especies: 3

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Annona furfuracea* A. St.-Hil.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Fernández Casas, F. J., 1988; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Maas, P. J. M., Westra, L. Y. T. & Chatrou, L. W., 2003; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 14251* (C, NY, P, U, W)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4422* (AS, E, G, K, L, Z), *Múlgura de Romero, M. E. 3643* (CTES, FCQ, SI)].

Duguetia lanceolata A. St.-Hil.
Referencias: Maas, P. J. M., Westra, L. Y. T. & Chatrou, L. W., 2003; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Subarbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 1735* (ICN)].

Duguetia phaeoclados (Mart.) Maas & H. Rainer
Sin.: *Aberemoa laevis* R.E. Fr., *Annona phaeoclados* Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., 1999; Maas, P. J. M., Westra, L. Y. T. & Chatrou, L. W., 2003; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8361* (G, S)].

Guatteria Ruiz & Pav., nom. cons.

Número de especies: 3, 1 endémica

Guatteria australis A. St.-Hil.
Sin.: *Guatteria parvifolia* R.E. Fr.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Záchia, R. A. 722* (B, G, ICN, K, PACA, S, SMDB, U)].

Guatteria dusenii R.E. Fr.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13752* (MO, S)].

Guatteria neglecta R.E. Fr.
Árbol. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6780* (F, MO, NY)].

Guatteria parvifolia R.E. Fr. = **Guatteria australis** A. St.-Hil.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.

Rollinia A. St.-Hil.

Número de especies: 8, 1 endémica

Rollinia dolabripetala (Raddi) R.E. Fr. var. *sericea* R.E. Fr. = **Rollinia sericea** (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia emarginata Schltdl.
Sin.: *Rollinia emarginata* Schltdl. var. *longipetala* (R.E. Fr.) R.E. Fr., *Rollinia glaucescens* Sond., *Rollinia hassleriana* R.E. Fr., *Rollinia hassleriana* R.E. Fr. var. *vestita* R.E. Fr., *Rollinia longipetala* R.E. Fr., *Rollinia sonderiana* Walp.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fernández Casas, F. J., 1988; Hunziker, A. T., 1946; Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983; Troncoso, N. S., 1987b; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996, 2004; Záchia, R. A. & Tressens, S. G., 1999.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, SPE); URY(ART).

Ejemplares de referencia: ARG[*Icart, A. s.n.* (SI), *Jörgensen, P. 1953* (GH, MO, MVM)]; BRA[*Záchia, R. A. 843* (G, G, HAS, ICN, K, PACA, S, W)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4204* (B, G, K)]; URY[*Del Puerto, O. s.n.* (MVFA)].

Rollinia emarginata Schltdl. var. *longipetala* (R.E. Fr.) R.E. Fr. = **Rollinia emarginata** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia fagifolia A. St.-Hil. = **Rollinia sylvatica** (A. St.-Hil.) Mart.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia glaucescens Sond. = **Rollinia emarginata** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia glaziovii R.E. Fr. = **Rollinia rugulosa** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia hassleriana R.E. Fr. = **Rollinia emarginata** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia hassleriana R.E. Fr. var. *vestita* R.E. Fr. = **Rollinia emarginata** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia intermedia R.E. Fr. = **Rollinia salicifolia** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia laurifolia Schltdl.
Sin.: *Rollinia laurifolia* Schltdl. var. *divergens* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltdl. var. *erecta* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltdl. var. *longipes* R.E. Fr., *Rollinia laurifolia* Schltdl. var. *reflexa* R.E. Fr.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gentry, A. H. 49830* (U)].

Rollinia laurifolia Schltdl. var. *divergens* R.E. Fr. = **Rollinia laurifolia** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia laurifolia Schltdl. var. *erecta* R.E. Fr. = **Rollinia laurifolia** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia laurifolia Schltdl. var. *longipes* R.E. Fr. = **Rollinia laurifolia** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia laurifolia Schltdl. var. *reflexa* R.E. Fr. = **Rollinia laurifolia** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia longifolia A. St.-Hil. var. *paraguariensis* Chodat = **Rollinia salicifolia** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996; Záchia, R. A. & Tressens, S. G., 1999.

Rollinia longipetala R.E. Fr. = **Rollinia emarginata** Schltdl.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia maritima Záchia
Referencias: Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996, 2004; Záchia, R. A., 1993.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6621* (HBR)]; URY[*Rosengurtt, B. 8331* (MVFA)].

Rollinia mucosa (Jacq.) Baill.
Sin.: *Annona mucosa* Jacq.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reineck s.n.* (E)].

Rollinia occidentalis R.E. Fr. = **Rollinia rugulosa** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

[Rollinia odoriflora Rojas Acosta]
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.
Notas: Nombre dudoso.

Rollinia rugulosa Schltdl.
Sin.: *Rollinia glaziovii* R.E. Fr., *Rollinia occidentalis* R.E. Fr., *Rollinia rugulosa* Schltdl. subsp. *australis* R.E. Fr.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996, 2004.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 1189* (BA), *Tressens, S. G. 6448* (CTES)]; BRA[*Záchia, R. A. 756* (ICN)].

Rollinia rugulosa Schltdl. subsp. *australis* R.E. Fr. = **Rollinia rugulosa** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia salicifolia Schltdl.
Sin.: *Rollinia intermedia* R.E. Fr., *Rollinia longifolia* A. St.-Hil. var. *paraguariensis* Chodat
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996, 2004; Záchia, R. A. & Tressens, S. G., 1999.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 704* (SI)]; BRA[*Záchia, R. A. 1021* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 12275* (BM, G, K, NY, S)].

Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Sin.: *Rollinia dolabripetala* (Raddi) R.E. Fr. var. *sericea* R.E. Fr., *Rollinia sericea* (R.E. Fr.) R.E. Fr. var. *longisepala* R.E. Fr.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1811* (NY, S, UC)].

Rollinia sericea (R.E. Fr.) R.E. Fr. var. *longisepala* R.E. Fr. = **Rollinia sericea** (R.E. Fr.) R.E. Fr.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.

Rollinia sonderiana Walp. = **Rollinia emarginata** Schltdl.
Referencias: Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 1996.

Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart.
Sin.: *Annona fagifolia* A. St.-Hil. & Tul., *Annona sylvatica* A. St.-Hil., *Rollinia fagifolia* A. St.-Hil.
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 16* (MO, S, UC)].

[Rollinia viridis Bertoni]
Referencias: Maas, P. J. M., Lubbert, Y. & Westra, L. Y. T., 1992.
Notas: Nombre dudoso.

Uvaria aromatica Lam. = **Xylopia aromatica** (Lam.) Mart.
Referencias: Fries, R. E., 1931a.

Xylopia L.

Número de especies: 3

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.
Sin.: *Uvaria aromatica* Lam., *Xylopia grandiflora* A. St.-Hil.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Fries, R. E., 1931a; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Buttura 322* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4467* (BM, G, K, Z)].

Xylopia brasiliensis Spreng.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1988; Ragonese, A. E. & Martínez Crovetto, R., 1947; Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983; Záchia, R. A. & Irgang, B. E., 2004.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Záchia, R. A. 711* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 2983* (G)].
Notas: Citada para Misiones, Argentina, sin indicar ejemplar de referencia (Latzina, 1937; Ragonese & Martínez Crovetto, 1947).

Xylopia grandiflora A. St.-Hil. = **Xylopia aromatica** (Lam.) Mart.
Referencias: Spichiger, R. & Mascherpa, J. M., 1983.

Xylopia langsdorfiana A. St.-Hil. & Tul.
Árbol. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 70562* (MBM)].

APIACEAE

Autor: Martínez, S.

48 géneros, 219 especies, 132 especies endémicas, 25 especies introducidas.

[Aethusa cynapium L.]
Referencias: Martínez, S., 1999.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Ammi L.

Número de especies: 2 introducidas

Ammi majus L.
Referencias: Constance, L., 1988; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Matthei, O. R. & Quezada, M., 1992; Parodi, L. R., 1927a; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, ERI, FOR, LPA, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU); BRA(SCA); CHL(X); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 618* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5058* (HBR, UC)]; CHL[*sin colector s.n.* (CONC)]; URY[*Hertel, R. 1074* (SI)].
Notas: En Santa Catarina, Brasil, sólo bajo cultivo (Mathias et al., 1972).

Ammi visnaga (L.) Lam.
Sin.: *Daucus visnaga* L.
Referencias: Constance, L., 1988; Lombardo, A., 1982b; Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Parodi, L. R., 1927a; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU); BRA(PAR, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, IX, IJF, RME); URY(MON).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5807* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 20581* (UC)]; CHL[*Zöllner, O. 13310* (CONC)]; URY[*Hertel, R. 679* (SI)].

Ammoselinum Torr. & A. Gray

Número de especies: 1 endémica

Ammoselinum rosengurtii Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1950; Pedersen, T. M., 2005.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(ART, CLA, FLA, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 31009* (SI, UC)]; URY[*Rosengurtt, B. 5753* (UC)].

Anethum L.

Número de especies: 1 introducida

Anethum foeniculum L. = **Foeniculum vulgare** Mill.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.

Anethum graveolens L.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Martínez Crovetto, R., 1977; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 5796* (BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 11257* (HBR, UC)].

Anethum pastinaca Wibel = **Pastinaca sativa** L.
Referencias: Constance, L., 1988.

Anthriscus Pers.

Número de especies: 2 introducidas

Anthriscus caucalis M. Bieb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Rossow, R. A., 1993b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1900 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anchorena, J. 11* (BAF)]; CHL[*Tomé, A. 24* (CONC)].

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Sin.: *Chaerophyllum sylvestris* L.
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, A. 3831* (CONC)].

Apium L.

Número de especies: 9, 5 endémicas, 2 introducidas

Apium ammi Urb. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. f. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. f. *latisectum* (Urb.) H. Wolff = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **latisectum** (Urb.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. f. *nanum* Kuntze = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. f. *pedunculata* Chodat = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. var. *filamentosum* Kuntze = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. var. *genuinum* H. Wolff = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. var. *latisectum* Urb. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **latisectum** (Urb.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ammi Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium andinum Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium angustilobum (Phil.) Reiche = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium apioides (Phil.) Reiche = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium australe Thouars = **Apium prostratum** Labill.
Referencias: Wolff, F. A. H., 1927.

Apium australe Thouars var. *latisectum* H. Wolff = **Apium prostratum** Labill.
Referencias: Wolff, F. A. H., 1927.

Apium biternatum (Phil.) Reiche = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium chilense Hook. & Arn.
Sin.: *Apium flexuosum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(II, V, VI, VII, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20020* (CONC)].

Apium commersonii DC.
Referencias: Constance, L., 1988; Lombardo, A., 1982b; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 135* (BM, G, K, SI. UC)]; URY[*sin colector 492c* (SI)].

Apium crispum Mill. = **Petroselinum crispum** (Mill.) A.W. Hill

Apium dunicola Pontiroli = **Apium prostratum** Labill.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

[Apium fernandezianum Johow]
Notas: Nombre dudoso.

Apium flexuosum Phil. = **Apium chilense** Hook. & Arn.

Apium graveolens L.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–3000 m.
Países: ARG(LPA, SJU, SLU); BRA(SCA); CHL(II, X, IJF); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11706* (BAA)]; CHL[*Villagrán, C. 2191* (CONC)]; PRY[*Krapovickas, A. 19667* (SI)].

Apium humile (Phil.) Reiche
Sin.: *Ligusticum humile* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Apium laciniatum (DC.) Urb. f. *deserticolum* H. Wolff = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium laciniatum (DC.) Urb. f. *elatius* (Hook. & Arn.) H. Wolff = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium laciniatum (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium laciniatum (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell. var. *latisectum* (Urb.) Mathias & Constance = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **latisectum** (Urb.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell. var. *multisectum* Mathias & Constance = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **multisectum** (Mathias & Constance) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium maclovianum Gand. = **Apium prostratum** Labill.
Referencias: Wolff, F. A. H., 1927.

Apium nodiflorum (L.) Lag.
Sin.: *Apium nodiflorum* (L.) Lag. var. *vulgare* (F.W. Schultz) H. Wolff, nom. inval., *Sium nodiflorum* L.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, NEU); CHL(III, IV, V, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Andrews, H. C. 25* (K)]; CHL[*Baeza, C. M. 194* (CONC)].

Apium nodiflorum (L.) Lag. var. *vulgare* (F.W. Schultz) H. Wolff, nom. inval. = **Apium nodiflorum** (L.) Lag.

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche
Sin.: *Apium andinum* Phil., *Apium angustilobum* (Phil.) Reiche, *Apium apioides* (Phil.) Reiche, *Apium panul* (Bertero ex DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche, *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff, *Apium philippii* H. Wolff, *Carum panul* (Bertero ex DC.) Griseb., *Ligusticum angustilobum* Phil., *Ligusticum apioides* Phil., *Ligusticum landbeckii* Phil., *Ligusticum nemorosum* Phil., *Ligusticum panul* Bertero ex DC., *Ligusticum peucedanoides* C. Presl ex DC., *Pimpinella andina* Phil., *Pimpinella araucana* Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 2003b; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10829* (BAA, BAB, SI, UC), *Kiesling, R. 7670* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SI)].

Apium panul (Bertero ex DC.) Reiche var. *araucanum* (Phil.) Reiche = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium peucedanoides (C. Presl ex DC.) Reiche = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium peucedanoides (C. Presl ex DC.) Reiche var. *longifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff = **Niphogeton scabra** (H. Wolff) J.F. Macbr.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1951.

Apium peucedanoides (C. Presl ex DC.) Reiche var. *tenuifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium philippii H. Wolff = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Apium pimpinellifolium (Phil.) Reiche
Sin.: *Ligusticum pimpinellifolium* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Díaz s.n.* (SGO)].

Apium prostratum Labill.
Sin.: *Apium australe* Thouars, *Apium australe* Thouars var. *latisectum* H. Wolff, *Apium dunicola* Pontiroli, *Apium maclovianum* Gand.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Constance, L., 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, SCR, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, III, IV, VIII, X, XI, XII, IJF, RME); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6323* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 7256* (HBR, UC)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14459* (CTES, SI)]; URY[*Felippone, F. 4934* (SI)].

Apium ranunculifolium (DC.) Reiche, nom. illeg. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium ranunculifolium auct. non Kunth = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Apium sellowianum H. Wolff
Referencias: Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 2005; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1927.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SFE, SJU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4966* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 17935* (UC)]; PRY[*Balansa, B. 3161* (BM, C, CORD, G, K)]; URY[*Sellow, F. 214* (*)].
Notas: La presencia de este taxón en Chile es dudosa.

Apium uruguayense Mathias & Constance = **Cyclospermum uruguayense** (Mathias & Constance) Constance

Apleura nucamentacea Phil. = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Asteriscium Cham. & Schltdl.

Número de especies: 9 endémicas

Asteriscium aemocarpon Clos
Sin.: *Asteriscium haemocarpum* Clos var. *chlorocarpum* Phil., *Asteriscium ramosissimum* Phil., *Asteriscium verrucosum* Meyen
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Anual. Endémica. 2100–3500 m.
Países: CHL(IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 174* (F, GH, K, NY, P, US)].

Asteriscium anethoides Turcz. = **Gymnophyton polycephalum** (Gillies & Hook.) Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium argentinum Chodat & Wilczek
Sin.: *Asteriscium cramble* H. Wolff
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11154* (LP, UC)].

Asteriscium chilense Cham. & Schltdl.
Sin.: *Asteriscium chilense* Cham. & Schltdl. var. *haenkei* DC., *Asteriscium poeppigii* DC., *Asteriscium pozoides* Clos, *Eryngium tricuspidatum* Dombey
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–2500 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 687* (CONC, LIL)].

Asteriscium chilense Cham. & Schltdl. var. *haenkei* DC. = **Asteriscium chilense** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium closii (Kuntze) Mathias & Constance
Sin.: *Asteriscium pungens* Drude, *Bustillosia chilensis* Clos, *Bustillosia chilensis* Clos var. *setacea* Phil., *Dipterygia closii* Kuntze
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 1368* (BM, K, SI)].

Asteriscium cramble H. Wolff = **Asteriscium argentinum** Chodat & Wilczek
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium famatinense Hieron. & H. Wolff
Referencias: Martínez, S., 2003b; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–400 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 835* (G)].

Asteriscium fimbriatum Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 200–900 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 171* (BM, GH, K, MO, SI, US)].

Asteriscium flexuosum Drude = **Gymnophyton flexuosum** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium glaucum Hieron. & H. Wolff
Referencias: Del Vitto, L. A., Petenatti, E. M. & Petenatti, M. E., 1999; Martínez, S., 2003b; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3340* (SI)].

Asteriscium haemocarpum Clos var. *chlorocarpum* Phil. = **Asteriscium aemocarpon** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium isatidicarpum Hook. & Arn. = **Gymnophyton isatidicarpum** (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium novarae Constance & Charpin
Referencias: Charpin, A. & Lazare, J. J., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Charpin, A. 23992* (G, MCNS, UC)].

Asteriscium poeppigii DC. = **Asteriscium chilense** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium polycephalum Gillies & Hook. = **Gymnophyton polycephalum** (Gillies & Hook.) Clos

Asteriscium polycephalum Hieron. ex H. Wolff, hom. illeg. = **Gymnophyton polycephalum** (Gillies & Hook.) Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium pozoides Clos = **Asteriscium chilense** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium pungens Drude = **Asteriscium closii** (Kuntze) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium ramosissimum Phil. = **Asteriscium aemocarpon** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium robustum Baill. = **Gymnophyton robustum** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium spinescens Drude = **Gymnophyton isatidicarpum** (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium spinosissimum Drude = **Gymnophyton spinosissimum** Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium verrucosum Meyen = **Asteriscium aemocarpon** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Asteriscium vidali Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Vidal Gormaz, F. s.n.* (SGO)].

Austropeucedanum Mathias & Constance

Número de especies: 1 endémica

Austropeucedanum oreopansil (Griseb.) Mathias & Constance
Sin.: *Peucedanum oreopansil* Griseb.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1952.
Hierba. Bianual. Endémica. 1000–3200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 4564* (UC), *Morrone, O. 3793* (SI)].

Azorella Lam.

Número de especies: 18, 14 endémicas

Azorella acaulis (Cav.) Drude = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Azorella albida Phil. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella ameghinoi Speg.
Sin.: *Azorella transverse-striata* Hauman
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Martínez, S., 1989, 1993a, b; Ricardi, M. & Marticorena, C., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11575* (SI)]; CHL[*T.B.P.A. 650* (BAB)].

Azorella andina (Phil.) Drude = **Huanaca andina** (Phil.) Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Azorella antipoda Gand. = **Azorella selago** Hook. f.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella apoda A. Gray = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella biloba (Schltdl.) Wedd.
Sin.: *Azorella lehmannii* Hieron., *Fragosa biloba* Schltdl.
Referencias: Hauman, L. L., 1919a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 2500–5000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1601* (SI)]; CHL[*Baeza, C. M. 582* (CONC)].

Azorella bolacina Clos = **Azorella madreporica** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella bovei Speg. = **Bolax caespitosus** Hombr. & Jacq. ex Decne.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a.

Azorella bryoides Phil. = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella cespitosa auct. non Cav. = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella cespitosa Cav. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella chamitis Pers. = **Azorella filamentosa** Lam.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella clandestina Phil. = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella columnaris H. Wolff = **Azorella compacta** Phil.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella compacta Phil.
Sin.: *Azorella columnaris* H. Wolff, *Azorella prismatoclada* Domin, *Azorella yareta* Hauman
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 3500–5200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10505* (SI)]; CHL[*Villagrán, C. 9556* (CONC)].

Azorella concolor auct. non Rendle = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Martínez, S., 1989.

Azorella concolor Rendle = **Mulinum valentini** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988.

Azorella coriacea (Lag.) Kuntze = **Pozoa coriacea** Lag.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Azorella crassifolia Pers. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella crassipes Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 1700–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6181* (BA, LP)]; CHL[*Rahmer s.n.* (SGO)].

Azorella cryptantha (Clos) Reiche
Sin.: *Mulinum cryptanthum* Clos, *Mulinum integrifolium* Hieron.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 2500–4300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cajal, J. L. 111* (SI), *Ulibarri, E. A. 1476* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 969* (SI)].

Azorella daucoides d'Urv. = **Oreomyrrhis hookeri** Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1955.

Azorella depauperata Phil. = **Azorella trifoliolata** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella diapensioides A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9385* (LP)].

Azorella diversifolia Clos var. **antillanca** J.C. Zech
Referencias: Zech, J. C., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zech, J. C. 48* (CONC, GH, OS, UC)].

Azorella diversifolia Clos var. **diversifolia**
Sin.: *Azorella incisa* (Griseb.) Wedd., *Pozoa incisa* Griseb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(NEU, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; CHL[*Sparre, B. B. 10757* (CONC)].

Azorella dusenii H. Wolff = **Azorella fuegiana** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella filamentosa Lam.
Sin.: *Azorella chamitis* Pers., *Chamitis integrifolia* Gaertn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pennington, T. D. 376* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14471* (CTES, SI)].

Azorella fuegiana Speg.
Sin.: *Azorella dusenii* H. Wolff, *Azorella mesetae* Skottsb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koslowsky, J. 83* (CORD, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92078* (CONC, SGO)].

Azorella gayana Phil. = **Azorella trifoliolata** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella gilliesii (Hook.) Hook. & Arn. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella glacialis Phil. = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella glebaria (Comm. ex Gaudich.) A. Gray = **Bolax gummifera** (Lam.) Spreng.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a.

Azorella gummifera Poir. = **Bolax caespitosus** Hombr. & Jacq. ex Decne.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a.

Azorella hookeriana Clos = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella hydrocotylifolia (Bridges) Macloskie = **Pozoa coriacea** Lag.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Azorella incisa (Griseb.) Wedd. = **Azorella diversifolia** Clos var. **diversifolia**
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella laevigata Phil. = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella lehmannii Hieron. = **Azorella biloba** (Schltdl.) Wedd.
Referencias: Martínez, S., 1993a.

Azorella lycopodioides Gaudich.
Sin.: *Azorella clandestina* Phil., *Azorella concolor* auct. non Rendle, *Azorella laevigata* Phil., *Azorella lycopodioides* Gaudich. var. *compacta* Phil., *Azorella nervosa* Phil., *Azorella philippi* Gand., *Azorella vaginata* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1161* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92127* (CONC, SGO)].

Azorella lycopodioides Gaudich. var. *compacta* Phil. = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989.

Azorella madreporica Clos
Sin.: *Azorella bolacina* Clos, *Azorella muscoides* Phil., *Azorella obtusiloba* Phil., *Azorella piligera* Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 1800–3600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)]; CHL[*Constance, L. 3507* (LIL), *Marticorena, C. 83583* (CONC)].

Azorella maquariensis Orchard = **Azorella selago** Hook. f.
Referencias: Martínez, S., 1993a.

Azorella mesetae Skottsb. = **Azorella fuegiana** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella monantha Clos
Sin.: *Apleura nucamentacea* Phil., *Azorella apoda* A. Gray, *Azorella bryoides* Phil., *Azorella caespitosa* auct. non Cav., *Azorella glacialis* Phil., *Azorella hookeriana* Clos, *Azorella nucamentacea* (Phil.) Hauman, *Azorella sessiliflora* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Martínez, S., 1989, 1993a, b.

Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9982* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92041* (CONC, SGO)].

Azorella monteroi S. Martínez & Constance
Referencias: Martínez, S. & Constance, L., 1991; Martínez, S., 1993a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 5950* (CONC, UC)].

Azorella morenonis (Kuntze) Macloskie = **Mulinum microphyllum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Azorella muscoides Phil. = **Azorella madreporica** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella nervosa Phil. = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella nivalis Phil. = **Mulinum leptacanthum** Phil.
Referencias: Constance, L., 1988.

Azorella nucamentacea (Phil.) Hauman = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella obtusiloba Phil. = **Azorella madreporica** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella patagonica Speg.
Sin.: *Azorella patagonica* Speg. var. *compacta* Speg., *Azorella plantaginea* Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16053* (BAB)]; CHL[*Baguales s.n.* (CONC)].

Azorella patagonica Speg. var. *compacta* Speg. = **Azorella patagonica** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella pectinata Phil. = **Azorella spinosa** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Martínez, S., 1993a.

Azorella philippi Gand. = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella piligera Phil. = **Azorella madreporica** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella pinnatiloba Gand. = **Azorella trifoliolata** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella plantaginea Speg. = **Azorella patagonica** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella prismatoclada Domin = **Azorella compacta** Phil.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella rahmeri Phil. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella ranunculus d'Urv. = **Schizeilema ranunculus** (d'Urv.) Domin

Azorella ranunculus d'Urv. var. *trilobata* Dusén ex Macloskie = **Huanaca andina** (Phil.) Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Azorella selago Hook. f.
Sin.: *Azorella antipoda* Gand., *Azorella maquariensis* Orchard, *Azorella selago* Hook. f. var. *compacta* Albov, *Azorella selago* Hook. f. var. *pulvinaris* Albov
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Martínez, S., 1989, 1993a, b; Pérez-Moreau, R. A., 1936.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2785* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92370* (CONC)].

Azorella selago Hook. f. var. *compacta* Albov = **Azorella selago** Hook. f.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella selago Hook. f. var. *pulvinaris* Albov = **Azorella selago** Hook. f.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella sessiliflora Phil. = **Azorella monantha** Clos
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella spinosa (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Azorella pectinata* Phil., *Fragosa spinosa* Ruiz & Pav., *Mulinum clandestinum* Phil., *Mulinum cuneatum* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Martínez, S., 1993a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20067* (CONC, SGO)].

Azorella transverse-striata Hauman = **Azorella ameghinoi** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella trifoliolata Clos
Sin.: *Azorella depauperata* Phil., *Azorella gayana* Phil., *Azorella pinnatiloba* Gand.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1364* (SI)]; CHL[*Gay, C. 1483* (SGO)].

Azorella trifurcata (Gaertn.) Pers.
Sin.: *Azorella albida* Phil., *Azorella cespitosa* Cav., *Azorella crassifolia* Pers., *Azorella gilliesii* (Hook.) Hook. & Arn., *Azorella rahmeri* Phil., *Azorella utriculata* Griseb., *Bolax gilliesii* Hook., *Chamitis tricuspidata* Gaertn., *Chamitis trifurcata* Gaertn.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 1989, 1993a, b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(III, VI, VII, VIII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3279* (SI)]; CHL[*Constance, L. 3576* (LIL, SI)].

Azorella trilobata Dusén = **Huanaca andina** (Phil.) Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Azorella utriculata Griseb. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella vaginata Phil. = **Azorella lycopodioides** Gaudich.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorella volcanica M. Hiroe = **Pozoa volcanica** Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988.

Azorella yareta Hauman = **Azorella compacta** Phil.
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Azorellopsis trisecta H. Wolff = **Mulinum albovaginatum** Gillies & Hook. var. **pauciflorum** (Reiche) J.C. Zech
Referencias: Zech, J. C., 1995.

Bolax Comm. ex A. Juss.

Número de especies: 2 endémicas

Bolax bovei (Speg.) Dusén = **Bolax caespitosus** Hombr. & Jacq. ex Decne.
Referencias: Constance, L., 1988.

Bolax caespitosus Hombr. & Jacq. ex Decne.
Sin.: *Azorella bovei* Speg., *Azorella gummifera* Poir., *Bolax bovei* (Speg.) Dusén
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15064* (BAA, BAB, UC)]; CHL[*Pisano, E. 6677* (CONC)].

Bolax columnifer Gand. = **Bolax gummifera** (Lam.) Spreng.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a.

Bolax complicatus Spreng. = **Bolax gummifera** (Lam.) Spreng.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a.

Bolax gilliesii Hook. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Bolax glebaria Comm. ex Gaudich. = **Bolax gummifera** (Lam.) Spreng.
Referencias: Constance, L., 1988; Hauman, L. L., 1919a.

Bolax gummifera (Lam.) Spreng.
Sin.: *Azorella glebaria* (Comm. ex Gaudich.) A. Gray, *Bolax columnifer* Gand., *Bolax complicatus* Spreng., *Bolax glebaria* Comm. ex Gaudich., *Hydrocotyle gummifera* Lam.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 1919* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92373* (CONC)].

Bowlesia Ruiz & Pav.

Número de especies: 12, 6 endémicas

Bowlesia acutangula Benth. = **Bowlesia lobata** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia acutiloba H. Wolff = **Bowlesia lobata** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia axilliflora Phil. = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia cana Phil. = **Homalocarpus bowlesioides** Hook. & Arn.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia cirrosa Phil. = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia dichotoma Poepp. ex DC. = **Homalocarpus dichotomus** (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance

Bowlesia dichotoma Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil. = **Homalocarpus dichotomus** (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia dichotoma Poepp. ex DC. var. *chrysocarpa* Phil. = **Homalocarpus dichotomus** (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia dichotoma Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin = **Homalocarpus digitatus** (Phil.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia dichotoma Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin = **Homalocarpus integerrimus** (Turcz.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia digitata Phil. = **Homalocarpus digitatus** (Phil.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia dumertorum Phil. = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia elata Clos = **Homalocarpus bowlesioides** Hook. & Arn.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia elegans Clos = **Homalocarpus bowlesioides** Hook. & Arn.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia flabilis J.F. Macbr.
Sin.: *Drusa acutangula* auct. non (Benth.) Drude
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965; Pérez-Moreau, R. A., 1936.
Hierba. Anual. Nativa. 2200–3900 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diers, L. 131* (SI)].

Bowlesia flexilis Meyen = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia geraniifolia Cham. & Schltdl. = **Bowlesia incana** Ruiz & Pav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia hieronymusii H. Wolff
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 44* (CORD, F, G, US)].

Bowlesia incana Ruiz & Pav.
Sin.: *Bowlesia geraniifolia* Cham. & Schltdl., *Bowlesia incana* Ruiz & Pav. f. *tenera* Urb., *Bowlesia nodiflora* DC., *Bowlesia rotundifolia* Phil., *Bowlesia tenera* Spreng.
Referencias: Constance, L., 1965, 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2003a, b; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 2005; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, RME); PRY(CEN, PAI); URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 119* (BM, GH, K, MO, NY, SI, US)]; BRA[*Smith, L. B. 12555* (HBR, UC, US)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996052* (CONC)]; PRY[*Balansa, B. 1093* (G, P, S)]; URY[*Herter, W. G. F. 176* (G, GH, K, LIL, SI, UC)].

Bowlesia incana Ruiz & Pav. f. *tenera* Urb. = **Bowlesia incana** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Bowlesia integerrima Turcz. = **Homalocarpus integerrimus** (Turcz.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia lobata Ruiz & Pav.
Sin.: *Bowlesia acutangula* Benth., *Bowlesia acutiloba* H. Wolff, *Drusa acutangula* (Benth.) Drude
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–4600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8339* (SI), *Sleumer, H. O. 2842* (LIL)]; CHL[*Mandon, G. 72* (BM)].

Bowlesia macrophysa Zöllner
Referencias: Zöllner, O., 1973.
Hierba. Anual. Endémica. 2900 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 6805* (CONC)].

Bowlesia macrosperma H. Wolff = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia nigripetala Clos = **Homalocarpus nigripetalus** (Clos) Mathias & Constance

Bowlesia nodiflora DC. = **Bowlesia incana** Ruiz & Pav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia paposana I.M. Johnst.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5550* (F, GH, K, S, UC)].

Bowlesia platanifolia H. Wolff
Referencias: Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9594* (BM, GH, K, MO, SI, US)].

Bowlesia pulchella Wedd. = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia reichei Phil. = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia rotundifolia Phil. = **Bowlesia incana** Ruiz & Pav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia ruiz-lealii Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11607* (BAA, BAB, SI, UC)].

Bowlesia sodiroana H. Wolff
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Nativa. 200–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sparre, B. B. 3011* (S, SGO, UC)].

Bowlesia tenera Spreng. = **Bowlesia incana** Ruiz & Pav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Bowlesia tripartita (Hook. & Arn.) Clos = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tripartita (Hook. & Arn.) Clos var. *axilliflora* (Phil.) Reiche = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tripartita (Hook. & Arn.) Clos var. *dumertorum* (Phil.) Reiche = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tripartita (Hook. & Arn.) Clos var. *reichei* (Phil.) Reiche = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tripartita (Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook.
Sin.: *Bowlesia cirrosa* Phil., *Bowlesia flexilis* Meyen, *Bowlesia pulchella* Wedd., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *cirrosa* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *gayana* Domin, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *heterophylla* Speg., *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *patagonica* Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 2003b; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10849* (BAA, BAB, SI, UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20057* (CONC)].

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook. var. *cirrosa* (Phil.) Reiche = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook. var. *gayana* Domin = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook. var. *heterophylla* Speg. = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook. var. *patagonica* Speg. = **Bowlesia tropaeolifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia tropaeolifolia Gillies & Hook. var. *tripartita* Hook. & Arn. = **Bowlesia uncinata** Colla
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Bowlesia uncinata Colla
Sin.: *Bowlesia axilliflora* Phil., *Bowlesia dumertorum* Phil., *Bowlesia macrosperma* H. Wolff, *Bowlesia reichei* Phil., *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *axilliflora* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *dumertorum* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *reichei* (Phil.) Reiche, *Bowlesia tripartita* (Hook. & Arn.) Clos var. *triloba* Reiche, *Bowlesia tropaeolifolia* Gillies & Hook. var. *tripartita* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 700–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 855* (BM, FI, G, GH, NY)].

Bowlesia venturii Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–3800 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4665* (BAB, GH, LIL, LP, SI, UC)].

Bupleurum L.

Número de especies: 1 introducida

Bupleurum tenuissimum L.
Referencias: Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Okada, K. A. 1419* (LP)].

Bustillosia chilensis Clos = **Asteriscium closii** (Kuntze) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Bustillosia chilensis Clos var. *setacea* Phil. = **Asteriscium closii** (Kuntze) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Carum panul (Bertero ex DC.) Griseb. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Caucalis L.

Número de especies: 1 introducida

Caucalis arvensis Huds. = **Torilis arvensis** (Huds.) Link

Caucalis daucoides L., hom. illeg. = **Caucalis platycarpos** L.
Referencias: Tutin, T. G., 1968.

Caucalis platycarpos L.
Sin.: *Caucalis daucoides* L., hom. illeg.
Referencias: Covas, G., 1966b; Tutin, T. G., 1968.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ballari 2122* (SRFA)].

Centella L.

Número de especies: 1

Centella asiatica (L.) Urb.
Sin.: *Centella biflora* Nannf., *Centella hirtella* Nannf., *Centella triflora* (Ruiz & Pav.) Nannf., *Hydrocotyle asiatica* L., *Hydrocotyle triflora* Ruiz & Pav.
Referencias: Lombardo, A., 1982b; Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1949.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME); PRY(AMA, PAI); URY(CAS, CLA, COL, MON, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3552* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13839* (CTES, SI)]; CHL[*Skottsberg, C. J. F. 340* (BA)]; PRY[*Hassler, E. 11371* (BAF)]; URY[*Castellanos, A. 95* (BA)].

Centella biflora Nannf. = **Centella asiatica** (L.) Urb.

Centella hirtella Nannf. = **Centella asiatica** (L.) Urb.
Referencias: Martínez, S., 2003b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Centella triflora (Ruiz & Pav.) Nannf. = **Centella asiatica** (L.) Urb.
Referencias: Martínez, S., 2003b.

Chaerophyllum sylvestris L. = **Anthriscus sylvestris** (L.) Hoffm.

Chamitis integrifolia Gaertn. = **Azorella filamentosa** Lam.
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S., 1989, 1993a.

Chamitis tricuspidata Gaertn. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.
Referencias: Martínez, S., 1993a.

Chamitis trifurcata Gaertn. = **Azorella trifurcata** (Gaertn.) Pers.

Conium L.

Número de especies: 1 introducida

Conium maculatum L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Constance, L., 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 2005; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, TDF); BRA(PAR, RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 2016* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 2015* (UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996106* (CONC)]; URY[*Hertel, R. 479* (SI)].

Coriandrum L.

Número de especies: 1 introducida

Coriandrum sativum L.
Referencias: Constance, L., 1988; Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997; Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Martínez, S., 2003a; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000]; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.

Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, MIS, SAL, SCR, SFE, SJU); BRA(RGS, SCA); CHL(IJF); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12624* (BAA, BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 6219* (HBR, UC)]; PRY[*Basualdo, I. 1298* (FCQ, MO)].

Crantzia attenuata Hook. & Arn. = **Lilaeopsis attenuata** (Hook. & Arn.) Fernald subsp. **attenuata**
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Crantzia brasiliensis Glaz. = **Lilaeopsis brasiliensis** (Glaz.) Affolter

Crantzia carolinensis (J.M. Coult. & Rose) Chodat = **Lilaeopsis carolinensis** J.M. Coult. & Rose
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Crantzia lineata (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Crantzia macloviana Gand. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill

Cyclospermum Lag.

Número de especies: 3, 1 endémica

Cyclospermum laciniatum (DC.) Constance
Sin.: *Apium biternatum* (Phil.) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f. *deserticolum* H. Wolff, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *gracile* (Clos) Reiche, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. var. *hispidulum* H. Wolff, *Helosciadium biternatum* Phil., *Helosciadium deserticolum* Phil., *Helosciadium gracile* Clos, *Helosciadium laciniatum* DC., *Helosciadium laciniatum* DC. var. *humile* Hook. & Arn.
Referencias: Constance, L., 1990; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1600 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Quezada, M. 395* (CONC)].

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague var. **latisectum** (Urb.) Constance
Sin.: *Apium ammi* Urb. f. *latisectum* (Urb.) H. Wolff, *Apium ammi* Urb. var. *latisectum* Urb., *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. var. *latisectum* (Urb.) Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1990; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Salgado, C. R. 22* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 13600* (HBR, UC, US)].

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Sin.: *Apium ammi* Urb., *Apium ammi* Urb. f. *filamentosum* (Kuntze) H. Wolff, *Apium ammi* Urb. f. *nanum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. f. *pedunculata* Chodat, *Apium ammi* Urb. var. *filamentosum* Kuntze, *Apium ammi* Urb. var. *genuinum* H. Wolff, *Apium ammi* Urb. var. *leptophyllum* (Pers.) Kuntze, *Apium laciniatum* (DC.) Urb. f. *elatius* (Hook. & Arn.) H. Wolff, *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell., *Apium ranunculifolium* (DC.) Reiche, nom. illeg., *Apium ranunculifolium* auct. non Kunth, *Helosciadium laciniatum* DC. var. *elatius* Hook. & Arn., *Helosciadium leptophyllum* (Pers.) DC., *Helosciadium ranunculifolium* DC., *Pimpinella leptophylla* Pers.
Referencias: Constance, L., 1988, 1990; Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Martínez, S., 2003a; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001. Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Alonso Paz, E., 1991; Lombardo, A., 1982b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(APY, APA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 687* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13100* (HBR, UC, US)]; CHL[*Marticorena, C. 9204* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 5856* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Alonso Paz, E. 3691* (MVFQ)].

Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague var. **multisectum** (Mathias & Constance) Constance
Sin.: *Apium leptophyllum* (Pers.) F. Muell. var. *multisectum* Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988, 1990; Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5916* (CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 16677* (HBR, UC)].

Cyclospermum uruguayense (Mathias & Constance) Constance
Sin.: *Apium uruguayense* Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1990.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(SJO).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 5732* (MVFA)].

Daucus L.

Número de especies: 3, 1 introducida

Daucus australis Poepp. = **Daucus montanus** Humb. & Bonpl. ex Spreng.
Referencias: Constance, L., 1988.

Daucus carota L.
Referencias: Constance, L., 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COS, NEU, RNE, SLU); BRA(RGS, SCA); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Salgado, C. R. 149* (CTES)]; BRA[*Isolda 136* (UC)]; CHL[*Gunckel, L. H. 18678* (CONC)]; URY[*Del Puerto, O. 6863* (MVFA)].

Daucus hispidifolius Clos = **Daucus pusillus** Michx.
Referencias: Constance, L., 1988.

Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng.
Sin.: *Daucus australis* Poepp., *Daucus toriloides* DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Constance, L., 1988; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(II, IV, V, VII, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6233* (BAA, BAB, UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996268* (CONC)].

Daucus montevidensis Link ex Spreng. = **Daucus pusillus** Michx.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.

Daucus pusillus Michx.
Sin.: *Daucus hispidifolius* Clos, *Daucus montevidensis* Link ex Spreng., *Daucus scaber* Larrañaga
Referencias: Constance, L., 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Martínez, S., 2003a, b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, RME); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1498* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 3282* (HBR, UC)]; CHL[*Rentzell, I. 6178* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 603* (MVFA)].

Daucus scaber Larrañaga = **Daucus pusillus** Michx.
Referencias: Constance, L., 1988.

Daucus toriloides DC. = **Daucus montanus** Humb. & Bonpl. ex Spreng.
Referencias: Constance, L., 1988.

Daucus visnaga L. = **Ammi visnaga** (L.) Lam.

Diplaspis morenonis (Kuntze) K. Schum. = **Mulinum microphyllum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Diposis DC.

Número de especies: 3 endémicas

Diposis bulbocastanum DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 6* (CONC)].

Diposis patagonica Skottsb.
Referencias: Constance, L., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3818* (BAB)].

Diposis saniculaefolia (Lam.) DC.
Sin.: *Hydrocotyle saniculaefolia* Lam.
Referencias: Lombardo, A., 1982b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(CAS, DUR, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 1953* (MVFA)].

Dipterygia closii Kuntze = **Asteriscium closii** (Kuntze) Mathias & Constance

Dipterygia flexuosa Kuntze = **Gymnophyton flexuosum** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Dipterygia foliosa Kuntze = **Gymnophyton foliosum** Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Dipterygia isatidicarpa C. Presl ex DC. = **Gymnophyton isatidicarpum** (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Dipterygia kingii Kuntze = **Gymnophyton flexuosum** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Dipterygia philippiana Kuntze = **Eremocharis fruticosa** Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Dipterygia spinescens Kuntze = **Gymnophyton isatidicarpum** (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Dipterygia spinosissima Kuntze = **Gymnophyton spinosissimum** Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Domeykoa Phil.

Número de especies: 2 endémicas

Domeykoa oppositifolia Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Hierba. Anual. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 11337* (LP)].

Domeykoa perennis I.M. Johnst.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5689* (GH)].

Drusa acutangula (Benth.) Drude = **Bowlesia lobata** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Drusa acutangula auct. non (Benth.) Drude = **Bowlesia flabilis** J.F. Macbr.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.

Elleimataenia renjifoana (Phil.) Koso-Poliansky = **Osmorhiza glabrata** Phil.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

Eremocharis Phil.

Número de especies: 1 endémica

Eremocharis flexuosa Phil. = **Eremocharis fruticosa** Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Eremocharis fruticosa Phil.
Sin.: *Dipterygia philippiana* Kuntze, *Eremocharis flexuosa* Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 100–1800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3030* (CONC)].

Eryngium L.

Número de especies: 65, 45 endémicas

Eryngium agavifolium Griseb.
Referencias: Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10378* (SI)].

Eryngium aloifolium Mart. ex Urb.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3708* (HBR, UC)].

[Eryngium andicolum H. Wolff]
Referencias: Martínez, S., 1999.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eryngium anomalum Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 100 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1704* (CONC)].

Eryngium aquaticum L. var. *subinerme* H. Wolff = **Eryngium subinerme** (H. Wolff) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium arvense Phil. = **Eryngium depressum** Hook. & Arn.
Referencias: Wolff, F. A. H., 1913.

Eryngium balansae H. Wolff
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 61751* (PACA)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3735* (CTES, FCQ, SI)].

Eryngium bellidifolium Decne. = **Eryngium nudicaule** Lam.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium bracteosum Griseb. = **Eryngium eburneum** Decne.
Referencias: Wolff, F. A. H., 1913.

Eryngium bupleuroides Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 400–900 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 11974* (CONC)].

Eryngium cabrerae Pontiroli
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2085* (LP)].

Eryngium canaliculatum Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6140* (HBR, UC, US)].

Eryngium cardosii Clos
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pinto s.n.* (CONC)].

Eryngium chamissonis Urb.
Sin.: *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltdl. var. *chamissonis* (Urb.) Mathias & Constance

Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 1997a, 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(MIE); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8213* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 3661* (HBR, UC)]; PRY[*Pedersen, T. M. 7670* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 386c* (SI)].

Eryngium chubutense Neger ex Dusén
Sin.: *Eryngium kurtzii* Hicken
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Martínez, S., 2003a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 681* (BA), *Troiani, H. O. 15734* (SI)].

Eryngium ciliatum Cham. & Schltdl.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Pérez-Moreau, R. A., 1936; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); PRY(SPE); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 613* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 53333* (PACA)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9405* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 3607* (SI)].

Eryngium coquimbanum Phil. ex Urb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 16293* (SI)].

Eryngium corallinum Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11537* (UC, US)].

Eryngium coronatum Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium coronopifolium* M.J. Decne.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Martínez, S., 2003a; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 631* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3377* (CTES, FCQ)].
Notas: Probablemente crezca en Uruguay.

Eryngium coronopifolium M.J. Decne. = **Eryngium coronatum** Hook. & Arn.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001.

Eryngium crantzioides Griseb. = **Eryngium pseudojunceum** Clos
Referencias: Constance, L., 1988.

Eryngium decaisneanum Urb. = **Eryngium pandanifolium** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium depressum Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium arvense* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Constance, L. 3552* (CONC, SI)].

Eryngium divaricatum Hook. & Arn.
Sin.: *Eryngium flaccidum* Hook. & Arn.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Martínez, S., 2003b; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 415* (BAB)]; BRA[*sin colector s.n.* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 3976* (CTES)]; URY[*Del Puerto, O. 5625* (MVFA)].

Eryngium dorae C. Norman
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Norman, C., 1931; Pedersen, T. M., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, SFE); BRA(RGS); URY(RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27332* (SI)]; BRA[*sin colector s.n.* (ICN)]; URY[*Del Puerto, O. 5621* (MVFA)].

Eryngium dusenii H. Wolff
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6209* (HBR, UC, US)].

Eryngium ebracteatum Lam.
Sin.: *Eryngium ebracteatum* Lam. var. *poterioides* (Griseb.) Urb., *Eryngium poterioides* Griseb.
Referencias: Corrêa, I. P. & Pirani, J. R., 2001; Martínez, S., 2003a, b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, CAN, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 600* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13655* (HBR, UC, US)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3612* (CTES, FCQ, SI)]; URY[*Hertel, R. 726* (SI)].

Eryngium ebracteatum Lam. var. *poterioides* (Griseb.) Urb. = **Eryngium ebracteatum** Lam.

Eryngium eburneum Decne.
Sin.: *Eryngium bracteosum* Griseb.

Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, COA); URY(ART, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 616* (LP), *Guaglianone, E. R. 1331* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 10510* (HBR, UC, US)]; PRY[*Jiménez, B. 11* (BM, CTES, PY), *Pedersen, T. M. 16085* (CTES, SI)]; URY[*Berro, M. B. 3779* (MVFA)].

Eryngium echinatum Urb.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Martínez, S., 2003a; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, COL, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 611* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 22819* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 1945* (MVFA)].

Eryngium ekmanii H. Wolff
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1283* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40518* ()]; PRY[*Montes, J. E. 13034* (CTES)].
Notas: Cita dudosa para Uruguay.

Eryngium elegans Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *genuinum* Urb., nom. inval., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *macrocephalum* Urb., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *microcephalum* Urb., *Eryngium elegans* Cham. & Schltdl. var. *uncinatum* (Cham. & Schltdl.) Urb., *Eryngium uncinatum* Cham. & Schltdl.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000]; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, COA, ITA, PAI); URY(CAS, CLA, COL, MAL, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 601* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6402* (HBR, UC)]; PRY[*Pedersen, T. M. 16093* (CTES, SI)]; URY[*Felippone, F. 4685* (SI)].

Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. *genuinum* Urb., nom. inval. = **Eryngium elegans** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. *macrocephalum* Urb. = **Eryngium elegans** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. *microcephalum* Urb. = **Eryngium elegans** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. *uncinatum* (Cham. & Schltdl.) Urb. = **Eryngium elegans** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl. var. *setosum* H. Wolff, *Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl. var. *typicum* H. Wolff, nom. inval., *Eryngium eriophorum* Cham. & Schltdl. var. *vegetius* Cham. & Schltdl.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29184* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13726* (CTES, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32408* (SI)].

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl. var. *setosum* H. Wolff = **Eryngium eriophorum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl. var. *typicum* H. Wolff, nom. inval. = **Eryngium eriophorum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium eriophorum Cham. & Schltdl. var. *vegetius* Cham. & Schltdl. = **Eryngium eriophorum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium erosum Urb. = **Eryngium junceum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium falcifolium Irgang
Referencias: Irgang, B. E., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 53856* (PACA)].

Eryngium fernandezianum Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921.
Arbusto. Endémica. 300–500 m.
Países: CHL(IJF).

Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 11244* (CONC)].
Notas: Probable híbrido entre *Eryngium bupleuroides* y *E. inaccessum*.

Eryngium fistulosum Phil. = **Eryngium pseudojunceum** Clos
Referencias: Constance, L., 1988.

Eryngium flaccidum Hook. & Arn. = **Eryngium divaricatum** Hook. & Arn.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Pontiroli, A., 1966.

Eryngium floribundum Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl. var. *angustifolium* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl. var. *pycnocephalum* Urb., *Eryngium floribundum* Cham. & Schltdl. var. *serroides* Urb.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 621* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16598* (HBR, UC)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3504* (CTES, FCQ, SI)].

Eryngium floribundum Cham. & Schltdl. var. *angustifolium* Urb. = **Eryngium floribundum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium floribundum Cham. & Schltdl. var. *pycnocephalum* Urb. = **Eryngium floribundum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium floribundum Cham. & Schltdl. var. *serroides* Urb. = **Eryngium floribundum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium glossophyllum H. Wolff
Referencias: Pontiroli, A., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18303* (LP)].

Eryngium horridum Malme
Sin.: *Eryngium paniculatum* auct. non Cav. & Dombey ex F. Delaroche, *Eryngium schwackeanum* Urb.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Irgang, B. E., 1974; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SDE, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, PAI); URY(CAS, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1310* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16555* (HBR, UC)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3560* (SI)]; URY[*Hertel, R. 655* (SI)].

Eryngium humifusum Clos
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hollermayer, A. 1202* (SI)].

Eryngium inaccessum Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bock s.n.* (CONC)].

Eryngium incantatum Lucena, Novara & A.R. Cuezzo
Referencias: Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3200 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 4451* (MCNS)].

Eryngium junceum Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium erosum* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *erosum* (Urb.) H. Wolff, *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *setigerum* Urb.
Referencias: Corrêa, I. P. & Pirani, J. R., 2001; Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8153* (HBR, UC)].
Notas: Cita dudosa para la flora de Argentina.

Eryngium junceum Cham. & Schltdl. subsp. *erosum* (Urb.) H. Wolff = **Eryngium junceum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium junceum Cham. & Schltdl. subsp. *juncifolium* Urb. = **Eryngium juncifolium** (Urb.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium junceum Cham. & Schltdl. subsp. *lineare* Urb. = **Eryngium juncifolium** (Urb.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium junceum Cham. & Schltdl. subsp. *setigerum* Urb. = **Eryngium junceum** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance
Sin.: *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *juncifolium* Urb., *Eryngium junceum* Cham. & Schltdl. subsp. *lineare* Urb.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5331* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9249* (HBR, UC, US)]; PRY[*Hassler, E. 5963* (SI)].

Eryngium koehneanum Urb.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10728* (HBR, UC, US)].

Eryngium kurtzii Hicken = **Eryngium chubutense** Neger ex Dusén
Referencias: Constance, L., 1988; Martínez, S. & Galotti, L., 2001.

[Eryngium lasseauxii Decne.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1997a; 2005.
Notas: Nombre dudoso.

Eryngium lasseauxii auct. non Decne. = **Eryngium mesopotamicum** Pedersen

Eryngium lorentzii H. Wolff
Referencias: Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 14942* (LIL)].

Eryngium luzulaefolium Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium nudum* Gillies & Hook.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6639* (CTES)]; BRA[*sin colector s.n.* (ICN)]; URY[*Berro, M. B. 2982* (MVFA)].

Eryngium macracanthum Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teillier A., S. 4703* (CONC)].

Eryngium megapotamicum Malme
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2005; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 612* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14301* (HBR, UC)]; URY[*Berro, M. B. 6703* (MVFA)].

Eryngium mesopotamicum Pedersen
Sin.: *Eryngium lasseauxii* auct. non Decne., *Eryngium pandanifolium* Cham. & Schltdl. var. *lasseauxii* (Decne.) Mathias & Constance
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 1997a, 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, COL, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 1430* (SI), *Calviño, C. 619* (SI), *Pedersen, T. M. 8058* (C)]; BRA[*Reitz, P. R. 6644* (HBR, UC)]; URY[*Rosengurtt, B. 10754* (MVFA)].
Notas: Su presente es probable en Paraguay (Pedersen, 1997).

Eryngium nudicaule Lam.
Sin.: *Eryngium bellidifolium* Decne., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *bellidifolium* (Decne.) Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *ctenodes* Griseb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *peruvianum* Urb., *Eryngium nudicaule* Lam. var. *pinnatifidum* Urb.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LRI, MIS, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, PAI); URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calviño, C. 610* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 51353* (PACA, UC)]; PRY[*Montes, J. E. 13022* (CTES)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1542* (MVFA)].

Eryngium nudicaule Lam. var. *bellidifolium* (Decne.) Urb. = **Eryngium nudicaule** Lam.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium nudicaule Lam. var. *ctenodes* Griseb. = **Eryngium nudicaule** Lam.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium nudicaule Lam. var. *peruvianum* Urb. = **Eryngium nudicaule** Lam.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001.

Eryngium nudicaule Lam. var. *pinnatifidum* Urb. = **Eryngium nudicaule** Lam.
Referencias: Martínez, S. & Galotti, L., 2001; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium nudum Gillies & Hook. = **Eryngium luzulaefolium** Cham. & Schltdl.
Referencias: Pontiroli, A., 1966.

Eryngium oligodon Griseb. = **Eryngium pandanifolium** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b.

Eryngium ombrophilum Dusén & H. Wolff
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3611* (BM, G, K)].

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium decaisneanum* Urb., *Eryngium oligodon* Griseb.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Lombardo, A., 1982b; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA); URY(CAS, COL, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6843* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2680* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6046* (SI)]; URY[*Osten, C. 5683* (SI)].

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl. var. *chamissonis* (Urb.) Mathias & Constance = **Eryngium chamissonis** Urb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1997a.

Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl. var. *lasseauxii* (Decne.) Mathias & Constance = **Eryngium mesopotamicum** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1997a.

Eryngium paniculatum auct. non Cav. & Dombey ex F. Delaroche = **Eryngium horridum** Malme
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966.

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche
Sin.: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroche var. *chilensis* DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Constance, L., 1988; Corrêa, I. P. & Pirani, J. R., 2001; Irgang, B. E., 1974; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. L. 3514* (BAB)]; BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (MBM)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994852* (CONC)].

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche var. *angustifolia-longifolia* Cham. & Schltdl. = **Eryngium stenophyllum** Urb.
Referencias: Irgang, B. E., 1974.

Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche var. *chilensis* DC. = **Eryngium paniculatum** Cav. & Dombey ex F. Delaroche
Referencias: Constance, L., 1988.

Eryngium paraguariense Urb.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 53772* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 5593* (BM)].

Eryngium plantaginifolium H. Wolff
Referencias: Martínez, S., 1999; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9935* (LIL)].
Notas: Su presencia en Argentina es dudosa.

Eryngium platyphyllum Decne. = **Eryngium serra** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium pohlianum Urb.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5236* (US)].

Eryngium polyrhizum Clos
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 3256* (CONC)].

Eryngium poterioides Griseb. = **Eryngium ebracteatum** Lam.

Eryngium pristis Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium pristis* Cham. & Schltdl. var. *abbreviatum* H. Wolff, *Eryngium pristis* Cham. & Schltdl. var. *mitigatum* Malme
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAA); URY(CLA, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1039* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14661* (UC, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6094* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 2980* (MVFA)].

Eryngium pristis Cham. & Schltdl. var. *abbreviatum* H. Wolff = **Eryngium pristis** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium pristis Cham. & Schltdl. var. *mitigatum* Malme = **Eryngium pristis** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium pseudojunceum Clos
Sin.: *Eryngium crantzioides* Griseb., *Eryngium fistulosum* Phil., *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *crantzioides* (Griseb.) Reiche, *Eryngium pseudojunceum* Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 524* (BAB)]; CHL[*Burkart, A. 9604* (SI)].

Eryngium pseudojunceum Clos var. *crantzioides* (Griseb.) Reiche = **Eryngium pseudojunceum** Clos
Referencias: Constance, L., 1988.

Eryngium pseudojunceum Clos var. *fistulosum* (Phil.) Reiche = **Eryngium pseudojunceum** Clos
Referencias: Constance, L., 1988.

Eryngium pulchellum Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 889* (SI)].

Eryngium ramboanum Mathias & Constance
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 32348* (UC)].

Eryngium raulinii Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3419* (HBR, RB)].

Eryngium regnellii Malme
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7964* (HBR, UC)].

Eryngium reitzii Mathias & Constance = **Eryngium urbanianum** H. Wolff
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium rojasii H. Wolff
Referencias: Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10075* (G)].

Eryngium rostratum Cav.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 529* (SI)].

Eryngium sanguisorba Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium sanguisorba* Cham. & Schltdl. var. *rosulatum* Urb.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, ITA); URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 7004* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 7731* (HBR, UC)]; PRY[*Jörgensen, P. 4077* (SI)]; URY[*Osten, C. 5666* (SI)].

Eryngium sanguisorba Cham. & Schltdl. var. *rosulatum* Urb. = **Eryngium sanguisorba** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium sarcophyllum Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 1355* (K)].

Eryngium schwackeanum Urb. = **Eryngium horridum** Malme
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium scirpinum Cham. & Schltdl.
Referencias: Corrêa, I. P. & Pirani, J. R., 2001; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13630* (HBR, UC, US)].
Notas: Cita dudosa para la flora Argentina.

Eryngium serra Cham. & Schltdl.
Sin.: *Eryngium platyphyllum* Decne., *Eryngium serratum* St.-Lag.
Referencias: Lombardo, A., 1982b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 2005; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN); URY(CAS, FLA, MAL, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 504* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 3723* (HBR, UC)]; PRY[*Teague, G. 603* (BM)]; URY[*Hertel, R. 654* (SI)].

Eryngium serratum St.-Lag. = **Eryngium serra** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium smithii Mathias & Constance
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10459* (HBR, K, L, P, UC, US)].

[Eryngium sparganioides Clos]
Notas: Nombre dudoso.

Eryngium stenophyllum Urb.
Sin.: *Eryngium paniculatum* Cav. & Dombey ex F. Delaroche var. *angustifolia-longifolia* Cham. & Schltdl.
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Martínez, S., 2003a; Pedersen, T. M., 2005; Pontiroli, A., 1966; Wolff, F. A. H., 1913.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAA); URY(ART, LAV, RIV, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 16187* (CTES)]; BRA[*Sacco, J. C. 4299* (ICN)]; PRY[*Schrottky, C. 221* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 399c* (SI)].

Eryngium subinerme (H. Wolff) Mathias & Constance
Sin.: *Eryngium aquaticum* L. var. *subinerme* H. Wolff
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1971b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6102* (HBR, UC, US)].

Eryngium tricuspidatum Dombey = **Asteriscium chilense** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Eryngium uncinatum Cham. & Schltdl. = **Eryngium elegans** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Eryngium urbanianum H. Wolff
Sin.: *Eryngium reitzii* Mathias & Constance
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2961* (HBR, UC)].

Eryngium zosterifolium H. Wolff
Referencias: Irgang, B. E., 1974; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8171* (HBR, L, UC, US)].

[Falcaria vulgaris Bernh.]
Referencias: Parodi, L. R., 1927a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Foeniculum Mill.
Número de especies: 1 introducida

Foeniculum vulgare Mill.
Sin.: *Anethum foeniculum* L.
Referencias: Constance, L., 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(APY); URY(CAS, CLA, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 368* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11025* (HBR, UC)]; CHL[*Matthei, O. R. 1104* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 2006* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 81* (MVFA)].

Fragosa biloba Schltdl. = **Azorella biloba** (Schltdl.) Wedd.

Fragosa spinosa Ruiz & Pav. = **Azorella spinosa** (Ruiz & Pav.) Pers.

Gymnophyton Clos
Número de especies: 6 endémicas

Gymnophyton flexuosum Clos
Sin.: *Asteriscium flexuosum* Drude, *Dipterygia flexuosa* Kuntze, *Dipterygia kingii* Kuntze, *Gymnophyton kingii* Phil., *Gymnophyton robustum* Clos var. *kingii* Reiche
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Arbusto. Endémica. 800–2600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teiller, S. 4696* (CONC)].

Gymnophyton foliosum Phil.
Sin.: *Dipterygia foliosa* Kuntze
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 1670* (SGO, UC)].

Gymnophyton isatidicarpum (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Sin.: *Asteriscium isatidicarpum* Hook. & Arn., *Asteriscium spinescens* Drude, *Dipterygia isatidicarpa* C. Presl ex DC., *Dipterygia spinescens* Kuntze, *Gymnophyton spinescens* Phil., *Mulinum isatidicarpum* C. Presl ex DC.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Arbusto. Endémica. 800–3500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Burkart, A. 9351* (BA, SI)].

Gymnophyton kingii Phil. = **Gymnophyton flexuosum** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Gymnophyton polycephalum (Gillies & Hook.) Clos
Sin.: *Asteriscium anethoides* Turcz., *Asteriscium polycephalum* Gillies & Hook., *Asteriscium polycephalum* Hieron. ex H. Wolff, hom. illeg.
Referencias: Martínez, S., 2003b; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Arbusto. Endémica. 1200–3200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8089* (GH, K, LIL, LP, MO, SI)].

Gymnophyton robustum Clos
Sin.: *Asteriscium robustum* Baill.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Arbusto. Endémica. 400–2500 m.
Países: CHL(I, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 185* (BM, G, GH, MO, SI, UC)].

Gymnophyton robustum Clos var. *kingii* Reiche = **Gymnophyton flexuosum** Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Gymnophyton spinescens Phil. = **Gymnophyton isatidicarpum** (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Gymnophyton spinosissimum Phil.
Sin.: *Asteriscium spinosissimum* Drude, *Dipterygia spinosissima* Kuntze
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Arbusto. Endémica. 2800–4500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 3869* (SGO, UC)].

Helosciadium biternatum Phil. = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium deserticolum Phil. = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium gracile Clos = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium laciniatum DC. = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium laciniatum DC. var. *elatius* Hook. & Arn. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium laciniatum DC. var. *humile* Hook. & Arn. = **Cyclospermum laciniatum** (DC.) Constance
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium leptophyllum (Pers.) DC. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Helosciadium ranunculifolium DC. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Heracleum L.

Número de especies: 1 introducida

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3531* (BCRU)].

Homalocarpus Hook. & Arn.

Número de especies: 6 endémicas

Homalocarpus bowlesioides Hook. & Arn.
Sin.: *Bowlesia cana* Phil., *Bowlesia elata* Clos, *Bowlesia elegans* Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 900–1900 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cumming, W. A. 277* (BM, K)].

Homalocarpus dichotomus (Poepp. ex DC.) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *albo-squamata* Phil., *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *chrysocarpa* Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 400–3000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2225* (CONC, LIL, UC)].

Homalocarpus digitatus (Phil.) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *digitata* (Phil.) Domin, *Bowlesia digitata* Phil.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 800–1100 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2311* (CONC, LIL, UC)].

Homalocarpus dissectus Mathias & Constance
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 100–1400 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4205* (CONC, UC)].

Homalocarpus integerrimus (Turcz.) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia dichotoma* Poepp. ex DC. var. *integerrima* Domin, *Bowlesia integerrima* Turcz.

Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5568* (BA, F, GH, K, LIL, S)].

Homalocarpus nigripetalus (Clos) Mathias & Constance
Sin.: *Bowlesia nigripetala* Clos
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 200–2000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 827* (G, GH, K, NY, P, W)].

Huanaca Cav.

Número de especies: 4 endémicas

Huanaca acaulis Cav.
Sin.: *Azorella acaulis* (Cav.) Drude, *Huanaca bergii* Hieron., *Huanaca cavanillesii* DC., *Huanaca geraniifolia* DC., *Lechleria palmata* Phil., *Oenanthe huanaca* Spreng., *Spananthe huanaca* (Spreng.) Lag.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4086* (BAB)]; CHL[*Eyerdam 24173* (G, GH, K, MO, SI, UC)].

Huanaca andina (Phil.) Phil.
Sin.: *Azorella andina* (Phil.) Drude, *Azorella ranunculus* d'Urv. var. *trilobata* Dusén ex Macloskie, *Azorella trilobata* Dusén, *Schizeilema trilobata* (Dusén) Domin, *Trisciadium andinum* Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a; Ricardi, M. & Marticorena, C., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5929* (BAB, UC)]; CHL[*Zöllner, O. 2290* (UC)].

Huanaca bergii Hieron. = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Huanaca boelckei Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5692* (BAB)]; CHL[*Werdermann, E. 666* (BM, G, GH, K, MO, SI, UC)].

Huanaca burkartii Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9644* (BA, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 5683* (CONC)].

Huanaca cavanillesii DC. = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Huanaca geraniifolia DC. = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Huanaca morenonis Kuntze = **Mulinum microphyllum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle L.

Número de especies: 18, 5 endémicas

[Hydrocotyle alchemilloides A. Rich.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Hydrocotyle araucana Phil. = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle araucana Phil. var. *patagonica* Speg. = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle asiatica L. = **Centella asiatica** (L.) Urb.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle batrachoides DC. = **Hydrocotyle ranunculoides** L. f.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle bonariensis Lam.
Sin.: *Hydrocotyle multiflora* Ruiz & Pav., *Hydrocotyle umbellata* L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Constance, L., 1988; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, IV, V, VIII); PRY(ITA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 4121* (SI), *Clos, E. C. 3396* (BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 5147* (HBR, UC)]; CHL[*Werdermann, E. 712* (CONC, SI)]; PRY[*Hassler, E. s.n.* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 76363* (MVM)].

[Hydrocotyle bonplandii A. Rich.]
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1975.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hydrocotyle bonplandii auct. non A. Rich.
= **Hydrocotyle filipes** Mathias
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1975.

Hydrocotyle bonplandii A. Rich. var. *chilensis* DC.
= **Hydrocotyle indecora** DC.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle bonplandii A. Rich. var. *filipes* (Griseb.) Pérez-Mor. = **Hydrocotyle filipes** Mathias
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1975; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle bowlesioides Mathias & Constance
Referencias: Martínez, S., 2003a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, MIS); PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6387* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 34155* (AS, MO)].

Hydrocotyle callicephala auct. non Cham. & Schltdl.
= **Hydrocotyle leucocephala** Cham. & Schltdl.
Referencias: Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle callicephala Cham.
Sin.: *Hydrocotyle callicephala* Cham. & Schltdl. var. *hirtella* Urb., *Hydrocotyle callicephala* Cham. & Schltdl. var. *villosa* Urb.
Referencias: Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pérez-Moreau, R. A., 1938a; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1305* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13703* (CTES, SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 16086* (CTES, SI)].

Hydrocotyle callicephala Cham. & Schltdl. var. *hirtella* Urb. = **Hydrocotyle callicephala** Cham.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle callicephala Cham. & Schltdl. var. *villosa* Urb. = **Hydrocotyle callicephala** Cham.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle carrerae Phil. = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schltdl.
Sin.: *Hydrocotyle araucana* Phil., *Hydrocotyle araucana* Phil. var. *patagonica* Speg., *Hydrocotyle carrerae* Phil., *Hydrocotyle chamaemorus* Cham. & Schltdl. var. *valdiviana* Reiche, *Hydrocotyle rhameri* Phil., *Hydrocotyle skottsbergii* Gand., *Hydrocotyle valdiviana* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Constance, L., 1988; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 2048* (BAB)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14296* (CTES, SI)].

Hydrocotyle chamaemorus Cham. & Schltdl. var. *valdiviana* Reiche = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle cryptocarpa Speg.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(CAS, FLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 1844* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 91060* (MVM)].

Hydrocotyle exigua (Urb.) Malme
Sin.: *Hydrocotyle hirsuta* Sw. var. *exigua* Urb., *Hydrocotyle pusilla* auct. non A. Rich.
Referencias: Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, GUA); URY(MAL, SAO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13427* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12866* (HBR, UC, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9297* (SI)]; URY[*Arrill, B. R. 1608* (MVFA)].

Hydrocotyle filipes Mathias
Sin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *filipes* (Griseb.) Pérez-Mor., *Hydrocotyle bonplandii* auct. non A. Rich., *Hydrocotyle poeppigii* DC. var. *filipes* Griseb.
Referencias: Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Mathias, M. E. & Constance, L., 1975; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 7544* (BA)].

Hydrocotyle gummifera Lam. = **Bolax gummifera** (Lam.) Spreng.

Hydrocotyle hirsuta Sw. var. *exigua* Urb. = **Hydrocotyle exigua** (Urb.) Malme
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle indecora DC.
Sin.: *Hydrocotyle bonplandii* A. Rich. var. *chilensis* DC., *Hydrocotyle marchantioides* Clos
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Constance, L., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(IV, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2564* (BAA, BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996079* (CONC), *Pedersen, T. M. 14331* (CTES, SI)].

Hydrocotyle itatiaiensis Brade
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3478* (HBR, RB)].

Hydrocotyle langsdorfii DC.
Referencias: Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 54097* (HBR, UC)].

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.
Sin.: *Hydrocotyle callicephala* auct. non Cham. & Schltdl., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltdl. var. *minuta* (Pohl) Urb., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltdl. var. *obtusiloba* Urb., *Hydrocotyle leucocephala* Cham. & Schltdl. var. *truncatiloba* Urb., *Hydrocotyle minuta* Pohl
Referencias: Álvarez, N., 2001; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a; Stutz, L. C., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, COA, ITA); URY(ART, COL, MON, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2836* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 7971* (HBR, UC, US)]; PRY[*Stutz, L. C. 1412* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 88829* (MVM)].

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. var. *minuta* (Pohl) Urb. = **Hydrocotyle leucocephala** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. var. *obtusiloba* Urb. = **Hydrocotyle leucocephala** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. var. *truncatiloba* Urb. = **Hydrocotyle leucocephala** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1938b.

Hydrocotyle marchantioides Clos = **Hydrocotyle indecora** DC.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle minuta Pohl = **Hydrocotyle leucocephala** Cham. & Schltdl.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle modesta Cham. & Schltdl.
Sin.: *Hydrocotyle modesta* Cham. & Schltdl. var. *repens* Clos
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Lombardo, A., 1982b; Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Martínez, S., 2003a, b; Pedersen, T. M., 2005; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); CHL(V, VI, X, RME); URY(ART, CAS, FLO, FLA, LAV, MON, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1244* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3353* (SGO)]; URY[*Osten, C. 4384* (SI)].

Hydrocotyle modesta Cham. & Schltdl. var. *repens* Clos = **Hydrocotyle modesta** Cham. & Schltdl.
Referencias: Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle multiflora Ruiz & Pav. = **Hydrocotyle bonariensis** Lam.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle natans Cirillo = **Hydrocotyle ranunculoides** L. f.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle poeppigii DC.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Baeza, C. M. 1656* (CONC)].
Notas: Cita dudosa para la flora Argentina (Pérez-Moreau, 1938a).

Hydrocotyle poeppigii DC. var. *filipes* Griseb. = **Hydrocotyle filipes** Mathias
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1975.

Hydrocotyle pusilla A. Rich.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, MIE); URY(LAV, MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1539* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13596* (HBR, UC, US)]; PRY[*Swart, J. J. 8656* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8022b* (MVFA)].

Hydrocotyle pusilla auct. non A. Rich. = **Hydrocotyle exigua** (Urb.) Malme
Referencias: Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav.
Sin.: *Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *quadrata* Urb., *Hydrocotyle quinqueloba* Ruiz & Pav. var. *stella* Urb., *Hydrocotyle stella* DC.
Referencias: Corrêa, I. P. & Pirani, J. R., 2001; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 13812* (CTES, SI)].

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav. var. *quadrata* Urb. = **Hydrocotyle quinqueloba** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav. var. *stella* Urb. = **Hydrocotyle quinqueloba** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Sin.: *Hydrocotyle batrachoides* DC., *Hydrocotyle natans* Cirillo, *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *brasiliensis* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *inciso-crenata* Urb., *Hydrocotyle ranunculoides* L. f. var. *lobata* Urb.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Constance, L., 1988; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 2003a, b; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(CAA, PHA); URY(COL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11692* (BAA, BAB, SI, UC)]; BRA[*Reitz, P. R. 1976* (HBR, RB)]; CHL[*Buchtien, O. 151* (BAF)]; PRY[*Mereles, F. 5296* (FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 85585* (MVM)].

Hydrocotyle ranunculoides L. f. var. *brasiliensis* Urb. = **Hydrocotyle ranunculoides** L. f.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle ranunculoides L. f. var. *inciso-crenata* Urb. = **Hydrocotyle ranunculoides** L. f.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle ranunculoides L. f. var. *lobata* Urb. = **Hydrocotyle ranunculoides** L. f.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle rhameri Phil. = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle saniculaefolia Lam. = **Diposis saniculaefolia** (Lam.) DC.

Hydrocotyle skottsbergii Gand. = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle stella DC. = **Hydrocotyle quinqueloba** Ruiz & Pav.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.

Hydrocotyle triflora Ruiz & Pav. = **Centella asiatica** (L.) Urb.
Referencias: Martínez, S., 2003a.

Hydrocotyle umbellata L.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Mathias, M. E. & Constance, L., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: CHL(I, V, VIII); PRY(APY, CAA, CEN).
Ejemplares de referencia: CHL[*Baeza, C. M. 336* (CONC)]; PRY[*Rojas, T. 2628* (AS, MO)].

Hydrocotyle umbellata L. var. *bonariensis* (Lam.) Roem. & Schult. = **Hydrocotyle bonariensis** Lam.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle valdiviana Phil. = **Hydrocotyle chamaemorus** Cham. & Schltdl.
Referencias: Constance, L., 1988.

Hydrocotyle verticillata Thunb.
Sin.: *Hydrocotyle verticillata* Thunb. var. *pluriradiata* Urb., *Hydrocotyle volckmanni* Phil.
Referencias: Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez, S., 2003a; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 2005; Pontiroli, A., 1966; Pérez-Moreau, R. A., 1938a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS); BRA(RGS, SCA); CHL(VI, VII, RME); PRY(COA); URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 4302* (CTES)]; BRA[*Klein, R. M. 5896* (FLOR, HBR, UC)]; CHL[*Schlegel, F. 3994* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 335* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5696b* (MVFA)].

Hydrocotyle verticillata Thunb. var. *pluriradiata* Urb. = **Hydrocotyle verticillata** Thunb.
Referencias: Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Hydrocotyle volckmannii Phil. = **Hydrocotyle verticillata** Thunb.
Referencias: Pérez-Moreau, R. A., 1938a.

Laretia Gillies & Hook.

Número de especies: 1 endémica

Laretia acaulis (Cav.) Gillies & Hook.
Sin.: *Selinum acaule* Cav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Constance, L., 1965; Martínez, S., 2003b; Ruíz Leal, R. A., 1975[1972].
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7598* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 16949* (SI)].

Lechleria palmata Phil. = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Levisticum Hill

Número de especies: 1 introducida

Levisticum officinale W.D.J. Koch
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 568* (CONC)].

Ligusticum angustilobum Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Ligusticum apioides Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Ligusticum divaricatilobum Clos = **Seseli libanotis** (L.) W.D.J. Koch
Referencias: Constance, L., 1965.

Ligusticum humile Phil. = **Apium humile** (Phil.) Reiche

Ligusticum landbeckii Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Ligusticum nemorosum Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Ligusticum panul Bertero ex DC. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche

Ligusticum peucedanoides C. Presl ex DC. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Ligusticum pimpinellifolium Phil. = **Apium pimpinellifolium** (Phil.) Reiche

Lilaeopsis Greene

Número de especies: 5, 1 endémica

Lilaeopsis andina A.W. Hill = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis andina A.W. Hill f. *subulata* (Wedd.) Pérez-Mor. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis andina A.W. Hill var. *microcarpa* Pérez-Mor. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis andina A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald subsp. **attenuata**
Sin.: *Crantzia attenuata* Hook. & Arn., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *attenuata* (Hook. & Arn.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985; Martínez, S., 2003a; Pedersen, T. M., 2005; Pérez-Moreau, R. A., 1937; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA); URY(CLA, COL, FLA, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29005* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1952* (MVFA)].

[Lilaeopsis attenuata (Hook. & Arn.) Fernald subsp. ulei (Pérez-Mor.) Affolter]
Sin.: *Lilaeopsis ulei* Pérez-Mor.
Referencias: Affolter, J. M., 1985.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Lilaeopsis brasiliensis (Glaz.) Affolter
Sin.: *Crantzia brasiliensis* Glaz., *Lilaeopsis carolinensis* J.M. Coult. & Rose var. *minor* A.W. Hill, *Lilaeopsis minor* (A.W. Hill) Pérez-Mor.
Referencias: Affolter, J. M., 1985; Pedersen, T. M., 2005; Pérez-Moreau, R. A., 1937.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, GUA); URY(MON, RIV, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26326* (MICH, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1606* (MBM, US)]; PRY[*Hassler, E. 6439* (BM, NY, P, UC)]; URY[*Herter, W. G. F. 81393-467* (F, MO, UC, US)].

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose
Sin.: *Crantzia carolinensis* (J.M. Coult. & Rose) Chodat
Referencias: Affolter, J. M., 1985; Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Martínez, S., 2003a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pérez-Moreau, R. A., 1937.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN, COA, PAI); URY(COL, MON, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13462* (CTES, SI)]; BRA[*Beetle, A. A. 1961* (US)]; PRY[*Hassler, E. 12271* (BM, MO, NY, UC, US)]; URY[*Osten, C. 22057* (F)].

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose var. *attenuata* (Hook. & Arn.) A.W. Hill = **Lilaeopsis attenuata** (Hook. & Arn.) Fernald subsp. **attenuata**
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis carolinensis J.M. Coult. & Rose var. *minor* A.W. Hill = **Lilaeopsis brasiliensis** (Glaz.) Affolter
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis exigua Pérez-Mor. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis hillii Pérez-Mor. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill
Sin.: *Crantzia lineata* (Michx.) Nutt. var. *subulata* Wedd., *Crantzia macloviana* Gand., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill, *Lilaeopsis andina* A.W. Hill f. *subulata* (Wedd.) Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *microcarpa* Pérez-Mor., *Lilaeopsis andina* A.W. Hill var. *multivittata* A.W. Hill, *Lilaeopsis exigua* Pérez-Mor., *Lilaeopsis hillii* Pérez-Mor., *Lilaeopsis patagonica* Pérez-Mor., *Lilaeopsis sinuata* A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985; Constance, L., 1988; Martínez, S., 2003b; Pérez-Moreau, R. A., 1937.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Apochian, C. 147* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14353* (CTES, SI)].

Lilaeopsis minor (A.W. Hill) Pérez-Mor. = **Lilaeopsis brasiliensis** (Glaz.) Affolter
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis patagonica Pérez-Mor. = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis sinuata A.W. Hill = **Lilaeopsis macloviana** (Gand.) A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Lilaeopsis tenuis A.W. Hill
Referencias: Affolter, J. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9031* (R, UC, US)].

Lilaeopsis ulei Pérez-Mor. = **Lilaeopsis attenuata** (Hook. & Arn.) Fernald subsp. **ulei** (Pérez-Mor.) Affolter
Referencias: Affolter, J. M., 1985.

Mulinum Pers.

Número de especies: 13, 11 endémicas

Mulinum albovaginatum Gillies & Hook. var. **albovaginatum**
Sin.: *Mulinum cryptanthum* Clos var. *pulvinaris* Chodat & Wilcz.
Referencias: Constance, L., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11610* (BAA, BAB, SI, US)].

Mulinum albovaginatum Gillies & Hook. var. **pauciflorum** (Reiche) J.C. Zech
Sin.: *Azorellopsis trisecta* H. Wolff, *Mulinum pauciflorum* Reiche, *Mulinum reichei* H. Wolff
Referencias: Constance, L., 1965; Zech, J. C., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 613* (E, F, G, GH, MO, S, SI, UC, US)].

Mulinum axilliflorum Griseb.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3311* (SI)].

Mulinum chillanense Phil. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum clandestinum Phil. = **Azorella spinosa** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Martínez, S., 1993a.

Mulinum crassifolium Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1957b.
Subarbusto. Endémica. 3700–4500 m.
Países: ARG(SAL); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8790* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94010* (CONC)].

Mulinum cryptanthum Clos = **Azorella cryptantha** (Clos) Reiche

Mulinum cryptanthum Clos var. *pulvinaris* Chodat & Wilcz. = **Mulinum albovaginatum** Gillies & Hook. var. **albovaginatum**
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum cuneatum Hook. & Arn. = **Azorella spinosa** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Martínez, S., 1993a.

Mulinum echegarayii Hieron.
Referencias: Hieronymus, G. H. E. W., 1881.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 5757* (SI), *Echegaray, S. s.n.* (CORD)].

Mulinum echinus auct. non DC. = **Mulinum ulicinum** Gillies & Hook.

Mulinum echinus DC.
Sin.: *Mulinum ulicinum* auct. non Gillies & Hook.
Referencias: Constance, L., 1988.
Subarbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6221* (BA, UC)].

Mulinum famatinense H. Wolff
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Wolff, F. A. H., 1921.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4600 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8353* (LP)].

Mulinum gandogeri M. Hiroe = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum hallei Skottsb.
Referencias: Constance, L., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2025* (BAB, UC)].

Mulinum hirsutum Phil. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.

Mulinum integrifolium Hieron. = **Azorella cryptantha** (Clos) Reiche
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Mulinum isatidicarpum C. Presl ex DC. = **Gymnophyton isatidicarpum** (C. Presl ex DC.) Mathias & Constance

Mulinum laxum Phil. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum leoninum Lorentz = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum leptacanthum Phil.
Sin.: *Azorella nivalis* Phil., *Mulinum patagonicum* Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 1400–2600 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11378* (BAA, BAB)]; CHL[*Baeza, C. M. 2981* (CONC)].

Mulinum lycopodiopsis Speg. = **Mulinum valentini** Speg.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum microphyllum (Cav.) Pers.
Sin.: *Azorella morenonis* (Kuntze) Macloskie, *Diplaspis morenonis* (Kuntze) K. Schum., *Huanaca morenonis* Kuntze, *Mulinum morenonis* (Kuntze) Speg., *Selinum microphyllum* Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 7574* (BAA, BAB, UC)].
Notas: La presencia de esta especie en Chile es dudosa.

Mulinum morenonis (Kuntze) Speg. = **Mulinum microphyllum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum ovalleanum Phil. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum patagonicum Gand., hom. illeg. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum patagonicum Speg. = **Mulinum leptacanthum** Phil.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum pauciflorum Reiche = **Mulinum albovaginatum** Gillies & Hook. var. **pauciflorum** (Reiche) J.C. Zech
Referencias: Zech, J. C., 1995.

Mulinum proliferum (Cav.) Pers. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum reichei H. Wolff = **Mulinum albovaginatum** Gillies & Hook. var. **pauciflorum** (Reiche) J.C. Zech

Mulinum spinosum (Cav.) Pers.
Sin.: *Mulinum chillanense* Phil., *Mulinum gandogeri* M. Hiroe, *Mulinum hirsutum* Phil., *Mulinum laxum* Phil., *Mulinum leoninum* Lorentz, *Mulinum ovalleanum* Phil., *Mulinum patagonicum* Gand., hom. illeg., *Mulinum proliferum* (Cav.) Pers., *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *leoninum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *longeinvolucrata* Hicken, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze, *Selinum proliferum* Cav., *Selinum spinosum* Cav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Constance, L., 1988; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10648* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Constance, L. 3579* (SI)].

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. f. *minus* Kuntze = **Mulinum triacanthum** Griseb.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *chillanense* (Phil.) Reiche = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *laxum* (Phil.) Reiche = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *leoninum* Kuntze = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *longeinvolucrata* Hicken = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *minus* (Kuntze) J.C. Zech = **Mulinum triacanthum** Griseb.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *proliferum* (Cav.) Kuntze = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *quinquepartitum* Kuntze = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *triacanthum* (Griseb.) Kuntze = **Mulinum triacanthum** Griseb.

Mulinum spinosum (Cav.) Pers. var. *trispinescens* Kuntze = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum triacanthum Griseb.
Sin.: *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. f. *minus* Kuntze, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *minus* (Kuntze) J.C. Zech, *Mulinum spinosum* (Cav.) Pers. var. *triacanthum* (Griseb.) Kuntze, *Mulinum triacanthum* Griseb. var. *multiflorum* Hieron., *Mulinum ulicinum* Gillies & Hook. var. *multiflorum* (Hieron.) J.C. Zech
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9221* (LP)].

Mulinum triacanthum Griseb. var. *multiflorum* Hieron. = **Mulinum triacanthum** Griseb.

Mulinum ulicinum auct. non Gillies & Hook. = **Mulinum echinus** DC.
Referencias: Constance, L., 1988.

Mulinum ulicinum Gillies & Hook.
Sin.: *Mulinum echinus* auct. non DC.
Referencias: Lucena, I. D., Novara, L. J. & Cuezzo, A. R., 2001a; Martínez, S., 2003b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Constance, L. 3856* (SI)].
Notas: La localidad del ejemplar tipo y la presencia de esta especie en Chile son dudosas.

Mulinum ulicinum Gillies & Hook. var. *multiflorum* (Hieron.) J.C. Zech = **Mulinum triacanthum** Griseb.

Mulinum valentini Speg.
Sin.: *Azorella concolor* Rendle, *Mulinum lycopodiopsis* Speg.
Referencias: Constance, L., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 300–1400 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 5834* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 870267* (CONC)].

Myrrhis andicola Kunth = **Oreomyrrhis andicola** (Kunth) Hook. f.

Myrrhis renjifoana Phil. = **Osmorhiza glabrata** Phil.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

[Niphogeton scabra (H. Wolff) J.F. Macbr.]
Sin.: *Apium peucedanoides* (C. Presl ex DC.) Reiche var. *longifolium* (C. Presl ex DC.) H. Wolff
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Notiosciadium Speg.
Número de especies: 1 endémica

Notiosciadium pampicola Speg.
Referencias: Pontiroli, A., 1966; Spegazzini, C. L., 1924.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS, CLA, FLA, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5363* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 6828b* (MVFA)].

Oenanthe L.
Número de especies: 1 introducida

[Oenanthe fistulosa L.]
Referencias: Martínez, S., 1999.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Oenanthe globulosa L.
Referencias: Lombardo, A., 1982b; Pontiroli, A., 1966; Tutin, T. G., 1968.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. s.n.* (SI)]; URY[*Osten, C. 5656* (SI)].

Oenanthe huanaca Spreng. = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Oligocladus Chodat & Wilczek
Número de especies: 1 endémica

Oligocladus andinus Chodat & Wilczek = **Oligocladus patagonicus** (Speg.) Pérez-Mor.
Referencias: Constance, L., 1988.

Oligocladus patagonicus (Speg.) Pérez-Mor.
Sin.: *Oligocladus andinus* Chodat & Wilczek, *Sanicula patagonica* Speg.
Referencias: Constance, L., 1988; Pérez-Moreau, R. A., 1936; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 134* (LP)].

Oreomyrrhis Endl.

Número de especies: 2, 1 endémica

Oreomyrrhis andicola (Kunth) Hook. f.
Sin.: *Myrrhis andicola* Kunth, *Oreomyrrhis andicola* (Kunth) Hook. f. var. *tomentosa* Wedd., *Oreomyrrhis daucoides* Urb.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1955.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sipowivz 6520* (SI)].

Oreomyrrhis andicola (Kunth) Hook. f. var. *tomentosa* Wedd. = **Oreomyrrhis andicola** (Kunth) Hook. f.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1955.

Oreomyrrhis daucoides auct. non Urb. = **Oreomyrrhis hookeri** Mathias & Constance
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1955.

Oreomyrrhis daucoides Urb. = **Oreomyrrhis andicola** (Kunth) Hook. f.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1955.

Oreomyrrhis hookeri Mathias & Constance
Sin.: *Azorella daucoides* d'Urv., *Oreomyrrhis daucoides* auct. non Urb.
Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E. & Constance, L., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 6809* (BAB)]; CHL[*Riggi, E. 8* (SI)].

Osmorhiza Raf.

Número de especies: 4, 1 endémica

Osmorhiza berteroi DC. = **Osmorhiza chilensis** Hook. & Arn.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

Osmorhiza berteroi DC. var. *gracilior* Phil. = **Osmorhiza chilensis** Hook. & Arn.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

Osmorhiza chilensis Hook. & Arn.
Sin.: *Osmorhiza berteroi* DC., *Osmorhiza berteroi* DC. var. *gracilior* Phil., *Schudia chilensis* Molina ex Clos
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Constance, L., 1988; Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19823* (P, SI, UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20083* (CONC, SGO)].

Osmorhiza depauperata Phil.
Sin.: *Osmorhiza obtusa* (J.M. Coult. & Rose) Fernald, *Washingtonia obtusa* J.M. Coult. & Rose
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988; Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3788* (UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 870311* (CONC)].

Osmorhiza glabrata Phil.
Sin.: *Elleimataenia renjifoana* (Phil.) Koso-Poliansky, *Myrrhis renjifoana* Phil., *Uraspermum glabratum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Constance, L., 1988; Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 934* (UC, WIS)]; CHL[*Gay, C. 1514* (SGO)].

Osmorhiza mexicana Griseb.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17299* (LP, UC, WIS)].

Osmorhiza obtusa (J.M. Coult. & Rose) Fernald = **Osmorhiza depauperata** Phil.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

Pastinaca L.

Número de especies: 1 introducida

Pastinaca sativa L.
Sin.: *Anethum pastinaca* Wibel
Referencias: Constance, L., 1988; Lombardo, A., 1982b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Bianual. Introducida. 500–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, RME); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4554* (BAB)]; CHL[*Matthei, O. R. 1442* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 2358* (MVFA)].

Petroselinum Hill

Número de especies: 1 introducida

Petroselinum crispum (Mill.) A.W. Hill
Sin.: *Apium crispum* Mill.

Referencias: Constance, L., 1988; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pedersen, T. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: ARG(COS, LPA, SCR); BRA(SCA); CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3479* (BAB)]; BRA[*Klein, R. M. 6282* (HBR, UC)]; CHL[*Landero 8478* (CONC)].

Peucedanum oreopansil Griseb. = **Austropeucedanum oreopansil** (Griseb.) Mathias & Constance

Pimpinella L.

Número de especies: 1 introducida

Pimpinella andina Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Pimpinella anisum L.
Sin.: *Seseli gilliesii* Hook. & Arn.
Referencias: Constance, L., 1965; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972.
Hierba. Anual. Introducida. 400–1500 m.
Países: ARG(COR, MEN); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13882* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 8598* (HBR, UC)].

Pimpinella araucana Phil. = **Apium panul** (Bertero ex DC.) Reiche
Referencias: Constance, L., 1988.

Pimpinella leptophylla Pers. = **Cyclospermum leptophyllum** (Pers.) Sprague var. **leptophyllum**
Referencias: Constance, L., 1990.

Pozoa Lag.

Número de especies: 2 endémicas

Pozoa coriacea Lag.
Sin.: *Azorella coriacea* (Lag.) Kuntze, *Azorella hydrocotylifolia* (Bridges) Macloskie, *Pozoa denticulata* Meyen, *Pozoa hydrocotylifolia* Bridges
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 8411* (BAA)]; CHL[*Werdermann, E. 611* (LIL, MO, NY, SI, UC)].

Pozoa denticulata Meyen = **Pozoa coriacea** Lag.
Referencias: Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Pozoa hydrocotylifolia Bridges = **Pozoa coriacea** Lag.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.

Pozoa incisa Griseb. = **Azorella diversifolia** Clos var. **diversifolia**
Referencias: Martínez, S., 1989, 1993a.

Pozoa volcanica Mathias & Constance
Sin.: *Azorella volcanica* M. Hiroe
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2400 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9632* (BA, SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14208* (CTES, SI)].

Sanicula L.

Número de especies: 2

Sanicula crassicaulis Poepp. ex DC.
Sin.: *Sanicula liberta* auct. non Cham. & Schltdl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Constance, L., 1988; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26507* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 667* (CONC)].

Sanicula graveolens Poepp. ex DC.
Sin.: *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla, *Sanicula macrorhiza* Bertero ex Colla var. *andina* Meigen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Constance, L., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11233* (BAA, BAB, SI, UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996276* (CONC)].

Sanicula liberta auct. non Cham. & Schltdl. = **Sanicula crassicaulis** Poepp. ex DC.

Sanicula macrorhiza Bertero ex Colla = **Sanicula graveolens** Poepp. ex DC.
Referencias: Constance, L., 1988.

Sanicula macrorhiza Bertero ex Colla var. *andina* Meigen = **Sanicula graveolens** Poepp. ex DC.
Referencias: Constance, L., 1988.

Sanicula patagonica Speg. = **Oligocladus patagonicus** (Speg.) Pérez-Mor.

Scandix L.

Número de especies: 1 introducida

Scandix pecten-veneris L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pedersen, T. M., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(ERI); CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Righelato, G. s.n.* (ERA)]; CHL[*Matthei, O. R. 633* (CONC)].

Schizeilema (Hook. f.) Domin

Número de especies: 1 endémica

Schizeilema ranunculus (d'Urv.) Domin
Sin.: *Azorella ranunculus* d'Urv.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Constance, L., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2073* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92096* (CONC)].

Schizeilema trilobata (Dusén) Domin = **Huanaca andina** (Phil.) Phil.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Schudia chilensis Molina ex Clos = **Osmorhiza chilensis** Hook. & Arn.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

Selinum acaule Cav. = **Laretia acaulis** (Cav.) Gillies & Hook.

Selinum microphyllum Cav. = **Mulinum microphyllum** (Cav.) Pers.

Selinum proliferum Cav. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.
Referencias: Constance, L., 1988.

Selinum spinosum Cav. = **Mulinum spinosum** (Cav.) Pers.

Seseli L.

Número de especies: 1 introducida

Seseli gilliesii Hook. & Arn. = **Pimpinella anisum** L.
Referencias: Constance, L., 1965.

Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch
Sin.: *Ligusticum divaricatilobum* Clos, *Seseli pencanum* Phil.
Referencias: Constance, L., 1965.
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Seseli pencanum Phil. = **Seseli libanotis** (L.) W.D.J. Koch
Referencias: Constance, L., 1965.

Sium L.

Número de especies: 1 introducida

Sium latifolium L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 100–1300 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 490* (CONC)].

Sium nodiflorum L. = **Apium nodiflorum** (L.) Lag.

Spananthe huanaca (Spreng.) Lag. = **Huanaca acaulis** Cav.
Referencias: Constance, L., 1988; Mathias, M. E. & Constance, L., 1971a.

Spermolepis Raf.

Número de especies: 1 endémica

Spermolepis castellanosi Pérez-Mor.
Referencias: Constance, L., 1988; Pérez-Moreau, R. A., 1939.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 6182* (BAB)].

Tordylium L.

Número de especies: 1 introducida

Tordylium maximum L.
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Troiani, H. O. & Prina, A. O., 1995.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 10287* (SRFA)].

Tordylium nodosum L. = **Torilis nodosa** (L.) Gaertn.

Torilis Adans.

Número de especies: 2 introducidas

Torilis anthriscus (L.) C.C. Gmel. = **Torilis japonica** (Houtt.) DC.
Referencias: Tutin, T. G., 1968.

Torilis arvensis (Huds.) Link
Sin.: *Caucalis arvensis* Huds.
Referencias: Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Matthei, O. R. & Quezada, M., 1992.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII); URY(CLA, LAV, RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14355* (HBR, US)]; CHL[*Matthei, O. R. 1199a* (CONC)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

[Torilis japonica (Houtt.) DC.]
Sin.: *Torilis anthriscus* (L.) C.C. Gmel.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Sin.: *Tordylium nodosum* L.
Referencias: Irgang, B. E. & Moura Baptista, L. R., 1970; Lombardo, A., 1982b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Mathias, M. E., Constance, L. & Araujo, D., 1972; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1966; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2001[2000].
Hierba. Anual. Introducida. 0–1900 m.

Países: ARG(BAI, LPA, MEN, SFE); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, IJF, RME); URY(CAS, CLA, FLO, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 234* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 6207* (HBR, UC)]; CHL[*Barros, E. 2970* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 283* (MVFA)].

Trisciadium andinum Phil. = **Huanaca andina** (Phil.) Phil.

Uraspermum glabratum (Phil.) Kuntze = **Osmorhiza glabrata** Phil.

Washingtonia obtusa J.M. Coult. & Rose = **Osmorhiza depauperata** Phil.
Referencias: Lowry, P. P. & Jones, A. G., 1985.

APOCYNACEAE

Autores: Ezcurra, C., Fontella Pereira, J. & Kinoshita, L. S.

62 géneros, 324 especies, 116 especies endémicas, 7 especies introducidas.

Allamanda L.

Número de especies: 1

Allamanda neriifolia Hook. = **Allamanda schottii** Pohl
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.

Allamanda schottii Pohl
Sin.: *Allamanda neriifolia* Hook.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3163* (NY)].

Amblyanthera brachyloba Müll. Arg. = **Mandevilla brachyloba** (Müll. Arg.) K. Schum.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Amblyanthera bridgesii Müll. Arg. = **Mandevilla laxa** (Ruiz & Pav.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Amblyopetalum (Griseb.) Malme

Número de especies: 1 endémica

Amblyopetalum coccineum (Griseb.) Malme
Sin.: *Oxypetalum coccineum* Griseb.
Referencias: Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tur, N. M. 1115* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 53319* (PACA)]; URY[*Herter, W. G. F. 1053a* (SI)].

Amblyopetalum coeruleum (D. Don) Malme = **Oxypetalum coeruleum** (D. Don) Decne.

Amblystigma castillonii Lillo ex T. Mey. = **Philibertia castillonii** (Lillo ex T. Mey.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Amblystigma cionophorum (Griseb.) E. Fourn. = **Philibertia cionophora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Amblystigma pedunculare Benth. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Amblystigma pilosum Malme = **Philibertia boliviana** (Baill.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Amblystigma pilosum Malme var. *catamarcense* T. Mey. = **Philibertia boliviana** (Baill.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Amblystigma pilosum Malme var. *laticaudiculatum* T. Mey. = **Philibertia boliviana** (Baill.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Ammocallis rosea (L.) Small = **Catharanthus roseus** (L.) G. Don
Referencias: Xifreda, C. C., 1984a.

Amphistelma aphyllum (Vell.) E. Fourn. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**

Amphistelma exsertum Griseb. = **Funastrum gracile** (Decne.) Schltdl.
Referencias: Pontiroli, A., 1973, 1983a.

Amphistelma melanthum (Decne.) E. Fourn. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Amphistelma tomentosum E. Fourn. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **tomentosa** (E. Fourn.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Aphanostelma bicornutum (Griseb.) Malme = **Philibertia bicornuta** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Aphanostelma bicornutum (Griseb.) Malme var. *castillonii* T. Mey. = **Melinia bicornuta** Griseb. var. **castillonii** T. Mey.

Aphanostelma candolleanum (Hook. & Arn.) Malme = **Philibertia candolleana** (Hook. & Arn.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Aphanostelma micranthum (Malme) T. Mey. = **Philibertia micrantha** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Aphanostelma parviflorum (Malme) Malme = **Philibertia parviflora** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Aphanostelma tubatum (Malme) Malme = **Philibertia tubata** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Aphanostelma volcanense T. Mey. = **Philibertia volcanensis** (T. Mey.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Apocynum erectum Vell. = **Barjonia erecta** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Araujia Brot.

Número de especies: 4, 1 endémica

Araujia albens Decne. = **Araujia sericifera** Brot.

Araujia angustifolia (Hook. & Arn.) Decne.
Sin.: *Lagenia angustifolia* (Hook. & Arn.) E. Fourn., *Physianthus angustifolius* Hook. & Arn.
Referencias: Cortadi, A., Scandizzi, A., Gattuso, S., Priolo, N., Caffini, N. & Gattuso, M., 1999; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); URY(ART, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21341* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1726* (MVFA)].

Araujia fusca Griseb. = **Araujia megapotamica** (Spreng.) G. Don
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Araujia fusca Griseb. var. *pallidiflora* Griseb. = **Araujia megapotamica** (Spreng.) G. Don
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Araujia grandiflora (Mart.) Morong = **Schubertia grandiflora** Mart.
Referencias: Meyer, T., 1944.

Araujia hortorum E. Fourn. = **Araujia sericifera** Brot.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.

Araujia megapotamica (Spreng.) G. Don
Sin.: *Araujia fusca* Griseb., *Araujia fusca* Griseb. var. *pallidiflora* Griseb., *Lagenia megapotamica* (Spreng.) E. Fourn., *Physianthus megapotamicus* Spreng.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(PAR, RGS); PRY(PAI); URY(MON, PAY, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30049* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 26027* (PACA)]; PRY[*Zardini, E. M. 5646* (FCQ, MO)]; URY[*Pedersen, T. M. 11569* (MO)].

Araujia plumosa Schltdl.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32297* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 237* (SI)].

Araujia sericifera Brot.
Sin.: *Araujia albens* Decne., *Araujia hortorum* E. Fourn., *Araujia sericifera* Brot. var. *hortorum* (E. Fourn.) Malme, *Physianthus albens* Hook., hom. illeg., *Physianthus albens* Mart.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Hicken, C. M., 1928a; Lombardo, A., 1983; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA, ITA); URY(CAS, CLA, FLO, MON, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1840* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8005* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5845* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 99835* (MO)].

Araujia sericifera Brot. var. *hortorum* (E. Fourn.) Malme = **Araujia sericifera** Brot.

Araujia stormiana Morong = **Morrenia stormiana** (Morong) Malme
Referencias: Meyer, T., 1944.

Asclepias L.

Número de especies: 12, 2 endémicas, 2 introducidas

Asclepias aequicornu E. Fourn.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAN, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 404* (S)]; BRA[*Hatschbach, G. 25507* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5838* (BM, NY)].

Asclepias altissima Jacq. = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**

Asclepias arvensis Vell. = **Oxypetalum erectum** Mart. subsp. **campestre** (Decne.) Hoehne
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Asclepias axillaris Vell. = **Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005[2004].

Asclepias barjoniaefolia E. Fourn.
Sin.: *Asclepias kuntzei* Schltdl.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Pontiroli, A., 1983a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8169* (LP)].

Asclepias boliviensis E. Fourn.
Sin.: *Asclepias weddellii* E. Fourn.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Pontiroli, A., 1983a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32272* (SI)].

Asclepias bracteolata E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 801* (HBR, RB)].

Asclepias campestris Decne. = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969.

Asclepias campestris Decne. var. *angustifolia* Kuntze = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Pontiroli, A., 1983a.

Asclepias campestris Decne. var. *schlechteri* Kuntze = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Pontiroli, A., 1983a.

Asclepias candida Vell.
Sin.: *Asclepias marginata* Decne.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, COA, PAI, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 609* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 39179* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 6460* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 6875b* (MVFA)].

Asclepias communis Vell. = **Oxypetalum banskii** Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Asclepias cordata Vell. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Asclepias curassavica L.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1983a; Rambo, B., 1958a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I); PRY(CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2229* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 11321* (MBM)]; CHL[*Jaffuel, F. 1644* (GH)]; PRY[*Montes, J. E. 3326* (SI)].
Notas: Probablemente se encuentre también en Uruguay.

Asclepias curupi E. Fourn. = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Asclepias flava Lillo
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7069* (SI)].

Asclepias foetida Cav. = **Cynanchum montevidense** Spreng.

Asclepias fruticosa L.
Referencias: Jozami, J. M. & Muñoz, J. D., 1982.
Subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SJU); URY(CAS, MON, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6100* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4370* (MVFA)].

Asclepias hispida Vell. = **Ditassa hispida** (Vell.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Asclepias jangadensis S. Moore = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Fontella Pereira, J., 1990.

Asclepias kuntzei Schltdl. = **Asclepias barjoniaefolia** E. Fourn.
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Asclepias langsdorfii E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1901.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8906* (*)]; PRY[*Hassler, E. 4706* (G)].

Asclepias macrophylla Humb. & Bonpl. ex Schult. = **Marsdenia macrophylla** (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T., 1947a.

Asclepias marginata Decne. = **Asclepias candida** Vell.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Asclepias marginata Decne. var. *bodenbenderi* Kuntze = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969.

Asclepias mellodora A. St.-Hil.
Sin.: *Asclepias campestris* Decne., *Asclepias campestris* Decne. var. *angustifolia* Kuntze, *Asclepias campestris* Decne. var. *schlechteri* Kuntze, *Asclepias curupi* E. Fourn., *Asclepias jangadensis* S. Moore, *Asclepias marginata* Decne. var. *bodenbenderi* Kuntze, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *bodenbenderi* (Kuntze) Bollwinkel, *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil., *Asclepias mellodora* A. St.-Hil. var. *multinervis* (E. Fourn.) Bollwinkel, *Asclepias multinervis* E. Fourn., *Asclepias nervosa* Decne., *Asclepias papillosa* Silveira, *Asclepias umbellata* Vell.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Ezcurra, C., 1999b; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26025* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 35390* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1471* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 95174* (G, GH, S, US, Z)].

Asclepias mellodora A. St.-Hil. var. *bodenbenderi* (Kuntze) Bollwinkel = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.

Asclepias mellodora A. St.-Hil. var. *minor* A. St.-Hil. = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Pontiroli, A., 1983a.

Asclepias mellodora A. St.-Hil. var. *multinervis* (E. Fourn.) Bollwinkel = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.

Asclepias multicaulis Vell. = **Oxypetalum erectum** Mart. subsp. **campestre** (Decne.) Hoehne
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Asclepias multinervis E. Fourn. = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.

Asclepias nervosa Decne. = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Asclepias papillosa Silveira = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Fontella Pereira, J., 1990.

Asclepias pilgeriana Schltr.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5542* (GH, US)].
Notas: Posible sinónimo de *Asclepias flava*.

Asclepias procera Aiton = **Calotropis procera** (Aiton) W.T. Aiton

Asclepias selloana E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15622* (*)].

Asclepias umbellata Vell. = **Asclepias mellodora** A. St.-Hil.
Referencias: Bollwinkel, C. W., 1969.

Asclepias weddellii E. Fourn. = **Asclepias boliviensis** E. Fourn.
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Aspidosperma Mart. & Zucc.

Número de especies: 14, 1 endémica

Aspidosperma australe Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *estrellense* Hassl., *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *longipetiolatum* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma missionum* Speg., *Aspidosperma occidentale* Malme
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25788* (BAB, LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 5820* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 10651* (G, LIL, NY, SI), *Rojas, T. 5582* (LIL)].

Aspidosperma australe Müll. Arg. var. *erythroxylum* Hassl., nom. nud. = **Aspidosperma pyrifolium** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma australe Müll. Arg. var. *estrellense* Hassl. = **Aspidosperma australe** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma australe Müll. Arg. var. *longipetiolatum* Hassl., nom. nud. = **Aspidosperma australe** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma camporum Müll. Arg.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2320* (HBR)].

Aspidosperma chakensis Speg. = **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Aspidosperma chodatii Markgr. = **Aspidosperma subincanum** A. DC.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma crotalorum Speg. = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma cuspa (Kunth) S.F. Blake
Sin.: *Aspidosperma sellowii* Müll. Arg. var. *collinum* Hassl., *Conoria cuspa* Kunth
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1951.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Arenas, P. 1622* (CTES, SI)].

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *longepetiolatum* Hassl., *Aspidosperma cylindrocarpon* Müll. Arg. var. *macrophyllum* Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16071* (F, GH, MO, NY, US)]; PRY[*Hassler, E. 8526* (G)].

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. var. *longepetiolatum* Hassl. = **Aspidosperma cylindrocarpon** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg. var. *macrophyllum* Hassl. = **Aspidosperma cylindrocarpon** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma dugandii Standl. = **Aspidosperma polyneuron** Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma guaraniticum Malme = **Aspidosperma pyrifolium** Mart.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma horko-kebracho Speg. = **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Aspidosperma macrocarpon Mart.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10575* (G, MO, NY)].

Aspidosperma missionum Speg. = **Aspidosperma australe** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma occidentale Malme = **Aspidosperma australe** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma olivaceum Müll. Arg. = **Aspidosperma pyricollum** Müll. Arg.
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma peroba Allemão ex Saldanha = **Aspidosperma polyneuron** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma dugandii* Standl., *Aspidosperma peroba* Allemão ex Saldanha, *Aspidosperma polyneuron* Müll. Arg. var. *longifolium* Hassl., *Aspidosperma venosum* Müll. Arg., *Thyroma polyneura* (Müll. Arg.) Miers
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 10562* (LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16781* (GH, MO, NY, US)]; PRY[*Caballero Marmori, G. 691* (G)].

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. var. *longifolium* Hassl. = **Aspidosperma polyneuron** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma pseudoquina Hassl. = **Rauvolfia sellowii** Müll. Arg.
Referencias: Xifreda, C. C., 1981.

Aspidosperma pyricollum Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma olivaceum* Müll. Arg.
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 417* (HBR)]; PRY[*Kiesling, R. 9599* (G, PY, SI)].
Notas: Citado erróneamente para Argentina por Latzina (Ezcurra, 1981).

Aspidosperma pyrifolium Mart.
Sin.: *Aspidosperma australe* Müll. Arg. var. *erythroxylum* Hassl., nom. nud., *Aspidosperma guaraniticum* Malme
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Chodat, R. H. 199* (G)].

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.
Sin.: *Aspidosperma crotalorum* Speg., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f. *malmeana* Markgr., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f. *schlechtendaliana* Markgr., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. f. *spegazziana* Markgr., *Aspidosperma quebracho-colorado* Schltdl. var. *pendula* Speg., *Aspidosperma quebrachoideum* Rojas Acosta, *Macaglia quebracho* Kuntze
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1981, 1984a; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Meyer, T., 1979; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA); URY(PAY, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31515* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1345* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 3240b* (MO, US)].

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. f. *malmeana* Markgr. = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. f. *schlechtendaliana* Markgr. = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. f. *spegazziana* Markgr. = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. var. *ellipticum* Markgr. = **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. subsp. *brevifolium* Hassl. = **Aspidosperma triternatum** Rojas Acosta
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Aspidosperma quebrachoideum Rojas Acosta = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Aspidosperma quirandy Hassl. var. *angustifolium* Hassl. = **Aspidosperma tomentosum** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma quirandy Hassl. var. *campestre* Hassl. = **Aspidosperma tomentosum** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma quirandy Hassl. var. *silvaticum* Hassl. = **Aspidosperma tomentosum** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma ramiflorum Müll. Arg.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10267* (HBR, Z)].

Aspidosperma reductum (Hassl.) Woodson = **Aspidosperma riedelii** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma riedelii Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma reductum* (Hassl.) Woodson, *Aspidosperma riedelii* Müll. Arg. f. *microphllum* Hassl., *Aspidosperma riedelii* Müll. Arg. subsp. *reductum* Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Nilson, A. & Sobral, M., 1994.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAU, CEN, CON).

Ejemplares de referencia: BRA[*Nilson, A. D. s.n.* (HAS, ICN)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 337* (G)].

Aspidosperma riedelii Müll. Arg. f. *microphllum* Hassl. = **Aspidosperma riedelii** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma riedelii Müll. Arg. subsp. *reductum* Hassl. = **Aspidosperma riedelii** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma rojasii Hassl. = **Aspidosperma tomentosum** Mart.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma sellowii Müll. Arg. var. *collinum* Hassl. = **Aspidosperma cuspa** (Kunth) S.F. Blake
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Aspidosperma spegazzinii Molfino ex T. Mey. = **Rauvolfia sellowii** Müll. Arg.
Referencias: Xifreda, C. C., 1981.

Aspidosperma subincanum A. DC.
Sin.: *Aspidosperma chodatii* Markgr.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10647* (MO, NY, SI)].

Aspidosperma tomentosum Mart.
Sin.: *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *angustifolium* Hassl., *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *campestre* Hassl., *Aspidosperma quirandy* Hassl. var. *silvaticum* Hassl., *Aspidosperma rojasii* Hassl.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13116* (F, GH, MO, US)]; PRY[*Bernardi, L. 20185* (G, MO, NY)].

Aspidosperma triternatum Rojas Acosta
Sin.: *Aspidosperma chakensis* Speg., *Aspidosperma horko-kebracho* Speg., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. subsp. *brevifolium* Hassl., *Aspidosperma quebracho-blanco* Schltdl. var. *ellipticum* Markgr.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20329* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12003* (G)].

Aspidosperma venosum Müll. Arg. = **Aspidosperma polyneuron** Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1951.

Astephanus R. Br.

Número de especies: 1 endémica

Astephanus cordifolius Phil. = **Philibertia candolleana** (Hook. & Arn.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Astephanus fallax (Hicken) T. Mey. = **Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini
Referencias: Ezcurra, C., 1979; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Astephanus fruticulosus Speg. = **Philibertia candolleana** (Hook. & Arn.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Astephanus geminiflorus Decne. = **Diplolepis geminiflora** (Decne.) Liede & Rapini
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Astephanus hieronymi (Lorentz) Malme = **Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Astephanus mitophorus Griseb. = **Philibertia mitophora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Astephanus multiflorus T. Mey. = **Philibertia multiflora** (T. Mey.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Astephanus streptocarpus E. Fourn.
Referencias: Fournier, E. P. N., 1882.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 1366* (G, P)].
Notas: Nombre provisorio, el género *Astephanus* no ocurre en América del Sur.

Barjonia Decne.

Número de especies: 1

Barjonia erecta (Vell.) K. Schum.
Sin.: *Apocynum erectum* Vell., *Barjonia obtusifolia* E. Fourn., *Barjonia racemosa* Decne., *Barjonia warmingii* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; da Silva Ferreira, N. M., 1979.
Subarbusto. Nativa. 300–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2776* (MBM)].

Barjonia obtusifolia E. Fourn. = **Barjonia erecta** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; da Silva Ferreira, N. M., 1979.

Barjonia racemosa Decne. = **Barjonia erecta** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; da Silva Ferreira, N. M., 1979.

Barjonia warmingii E. Fourn. = **Barjonia erecta** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; da Silva Ferreira, N. M., 1979.

Blepharodon Decne.

Número de especies: 5, 1 endémica

Blepharodon ampliflorum E. Fourn. = **Blepharodon lineare** (Decne.) Decne.

Blepharodon angustifolius Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1901.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4008* (S)].

Blepharodon bicuspidatum E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18066* (MBM)].

Blepharodon lineare (Decne.) Decne.
Sin.: *Blepharodon ampliflorum* E. Fourn., *Matelea linearis* Decne., *Nephradenia linearis* (Decne.) Benth.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1944; Rambo, B., 1958b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14346* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23197* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 45574* (AS, MO)].

Blepharodon nitidum (Vell.) J.F. Macbr.
Sin.: *Cynanchum nitidum* Vell.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8986* (MBM)]; PRY[*Pedersen, T. M. 14702* (SI)].

Blepharodon rahmeri Phil. = **Philibertia solanoides** Kunth
Referencias: Malme, G. O. A., 1936.

Blepharodon reflexum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1901.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5853* (S)].

Brachylepis candolleana Hook. & Arn. = **Philibertia candolleana** (Hook. & Arn.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Bustelina warmingii E. Fourn. = **Oxypetalum warmingii** (E. Fourn.) Fontella & Marquete

Calostigma burchellii E. Fourn. = **Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var. **burchellii** (E. Fourn.) Fontella

Calostigma dusenii Hoehne = **Oxypetalum hoehnei** Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Calostigma glabrum Decne. = **Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var. **glabrum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz

Calostigma guaraniticum Malme = **Oxypetalum guaraniticum** (Malme) Malme

Calostigma insigne Decne. = **Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var. **insigne**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Calostigma mosenii Malme = **Schistogyne mosenii** (Malme) T. Mey.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1950a.

Calotropis R. Br.

Número de especies: 1 introducida

Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton
Sin.: *Asclepias procera* Aiton
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mereles, F. & Degen, R., 1994b.
Arbusto o arbolito. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Degen, R. 2858* (FCQ)].

Cascabela bicornuta (Müll. Arg.) Lippold, nom. illeg. = **Thevetia bicornuta** Müll. Arg.

Cascabela peruviana (Pers.) Raf. = **Thevetia peruviana** (Pers.) K. Schum.

Catharanthus G. Don

Número de especies: 1 introducida

Catharanthus roseus (L.) G. Don
Sin.: *Ammocallis rosea* (L.) Small, *Lochnera rosea* (L.) Rchb. ex Endl., *Vinca rosea* L.
Referencias: Ezcurra, C., 2005; Markgraf, F., 1968; Xifreda, C. C., 1984a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(SCA); PRY(CEN, PAI); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8338* (LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 38421* (CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 12419* (CTES)]; URY[*Del Puerto, O. 12279* (MVFA)].

Ceramanthus flavus (Decne.) Malme = **Funastrum flavum** (Decne.) Malme
Referencias: Meyer, T., 1943a.

Ceramanthus gracilis (Decne.) Malme = **Funastrum gracile** (Decne.) Schltdl.
Referencias: Meyer, T., 1944.

Cerbera peruviana Pers. = **Thevetia peruviana** (Pers.) K. Schum.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Choristigma stuckertianum Kurtz ex Heger = **Morrenia stuckertiana** (Kurtz ex Heger) Malme subsp. **stuckertiana**
Referencias: Meyer, T., 1944.

Condylocarpon Desf.

Número de especies: 1

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A. DC.
Sin.: *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg., *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg. var. *acuminata* Müll. Arg., *Condylocarpon rauwolfiae* (A. DC.) Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Echites isthmica* Vell.
Referencias: Ezcurra, C., 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Fallen, M. E., 1983; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1069* (SI)]; BRA[*Silva, J. M. 4486* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5838* (G, GH, LIL, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2421* (MVFA)].

Condylocarpon rauwolfiae (A. DC.) Müll. Arg. = **Condylocarpon isthmicum** (Vell.) A. DC.
Referencias: Fallen, M. E., 1983.

Condylocarpon rauwolfiae (A. DC.) Müll. Arg. var. *acuminata* Müll. Arg. = **Condylocarpon isthmicum** (Vell.) A. DC.
Referencias: Fallen, M. E., 1983.

Condylocarpon rauwolfiae (A. DC.) Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg. = **Condylocarpon isthmicum** (Vell.) A. DC.
Referencias: Fallen, M. E., 1983.

Conoria cuspa Kunth = **Aspidosperma cuspa** (Kunth) S.F. Blake
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1951.

Corollonema boliviense Schltr. = **Oxypetalum brachystemma** Malme

Cyathostelma furcata E. Fourn. = **Jobinia lindbergii** E. Fourn.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cyathostelma latipes (Decne.) E. Fourn. = **Orthosia latipes** (Decne.) Malme

Cynanchum L.

Número de especies: 9, 8 endémicas

Cynanchum acutifolium (Phil.) Reiche = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.
Referencias: Reiche, C. F., 1910a.

Cynanchum altissimum (Jacq.) Jacq. = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**

Cynanchum aphyllum auct. non Vell. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **florida** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cynanchum aphyllum Vell. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum argentinense Liede
Sin.: *Cynanchum trifurcatum* (Griseb.) Lillo, nom. illeg., *Metastelma trifurcatum* Griseb.
Referencias: Lillo, M., 1919a; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34880* (MU, SI), *Jörgensen, P. 1162* (SI), *Venturi, S. 4004* (SI)].
Notas: Posiblemente sea una especie de *Orthosia*.

Cynanchum atacamense Liede
Sin.: *Cynanchum deserticola* A.R. Flores & J.M. Watson, *Cynanchum viride* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Cynoctonum viride* Phil.
Referencias: Flores, A. R. & Watson, J. M., 2004; Reiche, C. F., 1910a.
Enredadera. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III, IV).

Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 396* (SI)].
Notas: Posiblemente un *Diplolepis* (Liede et al., 2005).

Cynanchum birostratum Hook. & Arn. = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Cynanchum boerhaviifolium Hook. & Arn. = **Diplolepis boerhaviifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynanchum bonariense (Decne.) T. Mey. = **Ditassa burchellii** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

[Cynanchum bulligerum (Speg.) Lillo]
Sin.: *Vincetoxicum bulligerum* Speg.
Referencias: Ezcurra, C., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Cynanchum chilense (Phil.) Malme
Sin.: *Cynanchum mucronatum* (Decne.) Reiche, nom. illeg., *Cynoctonum mucronatum* Decne., *Holostemma chilense* Phil.
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Malme, G. O. A., 1936; Reiche, C. F., 1910a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pastore, A. L. 34* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].
Notas: Posiblemente un *Diplolepis* (Liede et al., 2005).

Cynanchum clausum Jacq. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Cynanchum congestum Vell. = **Orthosia urceolata** E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cynanchum connivens Hook. & Arn. = **Jobinia connivens** (Hook. & Arn.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum denticulatum Vahl = **Matelea denticulata** (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum descolei T. Mey. = **Diplolepis descolei** (T. Mey.) Liede & Rapini
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynanchum deserticola A.R. Flores & J.M. Watson = **Cynanchum atacamense** Liede

Cynanchum diemii T. Mey.
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Meyer, T., 1950b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bravo, L. D. 20* (SI), *Diem, J. 1191* (LIL)].
Notas: Posiblemente un *Diplolepis* (Liede et al., 2005).

Cynanchum diffusum (Gillies ex Hook.) Hook. & Arn. = **Orthosia virgata** (Poir.) E. Fourn.

Cynanchum ekmanii (Malme) Sundell, nom. illeg. = **Telminostelma ekmanii** (Malme) Fontella & E.A. Schwarz

Cynanchum fallax Hicken = **Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini
Referencias: Ezcurra, C., 1979; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynanchum floridum Vell. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **florida** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cynanchum foetidum (Cav.) Kunth = **Cynanchum montevidense** Spreng.

Cynanchum funale Poir. = **Orthosia funalis** (Poir.) Liede & Meve

Cynanchum glossostelma Lillo ex T. Mey. = **Jobinia glossostelma** (Lillo ex T. Mey.) Liede & Meve
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001.

Cynanchum glossostelma Lillo, nom. nud. = **Jobinia glossostelma** (Lillo ex T. Mey.) Liede & Meve
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001; Meyer, T., 1944.

Cynanchum hieronymi (Lorentz) Hicken = **Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynanchum lancifolium Hook. & Arn., hom. illeg. = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Cynanchum melanthum (Decne.) T. Mey. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum montevidense Spreng.
Sin.: *Asclepias cordata* Vell., *Asclepias foetida* Cav., *Cynanchum foetidum* (Cav.) Kunth, *Cynanchum tamifolium* Hook. & Arn., *Roulinia acuta* Decne., *Roulinia blanda* Decne., *Roulinia convolvulacea* Decne., *Roulinia cordata* (Vell.) J.F. Macbr., *Roulinia fluminensis* Decne., *Roulinia mannii* Rusby, *Roulinia modesta* Decne., *Roulinia montevidensis* (Spreng.)

Malme, *Roulinia riedelii* E. Fourn., *Roulinia selloana* E. Fourn., *Roulinia tamifolia* (Hook. & Arn.) Decne., *Roulinia versicolor* Lem., *Telminostelma foetidum* (Cav.) Fontella & E.A. Schwarz, *Vincetoxicum montevidense* (Spreng.) Kuntze
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981a; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA, SPE); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14051* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15374* (MBM)]; PRY[*Eskuche, U. G. 6152* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1511* (SI)].
Notas: Probablemente deba ser transferida a otro género.

Cynanchum mucronatum (Decne.) Reiche, nom. illeg. = **Cynanchum chilense** (Phil.) Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1936.

Cynanchum myrtifolium Hook. & Arn.
Sin.: *Cynoctonum myrtifolium* (Hook. & Arn.) Decne.
Referencias: Reiche, C. F., 1910a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 599* (K), *Hollermayer, A. 1209* (SI)].
Notas: Posiblemente un *Diplolepis* (Liede et al., 2005).

Cynanchum nanum Skottsb. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**
Referencias: Liede, S., 1997a; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynanchum nitidum Vell. = **Blepharodon nitidum** (Vell.) J.F. Macbr.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum nummulariifolium Hook. & Arn. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**

Cynanchum nummulariifolium Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **biflora** (Phil.) Hechem & C. Ezcurra
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynanchum odoratum Hook. & Arn. = **Morrenia odorata** (Hook. & Arn.) Lindl.
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Cynanchum pachyphyllum (Decne.) K. Schum.
Sin.: *Cynanchum acutifolium* (Phil.) Reiche, *Cynanchum lancifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Cynoctonum acutifolium* Phil., *Cynoctonum chiloense* Decne., *Cynoctonum nemorosum* Phil., *Cynoctonum pachyphyllum* Decne., *Vincetoxicum chiloense* (Decne.) Kuntze, *Vincetoxicum nemorosum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Reiche, C. F., 1910a; Rua, G. H. & Vidoz, F. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vidoz, F. F. s.n.* (BAA)]; CHL[*Quezada, M. 205* (CONC)].
Notas: Posiblemente un *Diplolepis* (Liede et al., 2005).

Cynanchum patagonicum (Phil.) Malme = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**

Cynanchum robertii (S. Moore) Malme = **Petalostelma robertii** (S. Moore) Liede & Meve
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001.

Cynanchum rostratum Vahl = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum rotatum Vell. = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cynanchum roulinioides (E. Fourn.) Rapini = **Telminostelma roulinioides** E. Fourn.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.

Cynanchum samuelssonii Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4439* (LIL)].

Cynanchum sarcostemma Lillo = **Petalostelma sarcostemma** (Lillo) Liede & Meve
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001.

Cynanchum scoparium Nutt. = **Orthosia funalis** (Poir.) Liede & Meve

Cynanchum stellatum Vell. = **Fischeria stellata** (Vell.) E. Fourn.
Referencias: Murphy, H., 1986.

Cynanchum subulatum Vell. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cynanchum tamifolium Hook. & Arn. = **Cynanchum montevidense** Spreng.

Cynanchum trifurcatum (Griseb.) Lillo, nom. illeg. = **Cynanchum argentinense** Liede

Cynanchum trilobulatum Lillo
Referencias: Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Lillo, M., 1919a; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11462* (SI)].
Notas: Posiblemente sea una especie de *Orthosia*.

Cynanchum undulatum (Decne.) K. Schum. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**

Cynanchum urceolatum (E. Fourn.) K. Schum. = **Orthosia urceolata** E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cynanchum viride (Phil.) Reiche, nom. illeg. = **Cynanchum atacamense** Liede

Cynanchum viride Vell. = **Matelea denticulata** (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Cynoctonum acutifolium Phil. = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Cynoctonum biflorum Phil. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **biflora** (Phil.) Hechem & C. Ezcurra
Referencias: Reiche, C. F., 1910a.

Cynoctonum boerhaviifolium (Hook. & Arn.) DC. = **Diplolepis boerhaviifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini

Cynoctonum chiloense Decne. = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Cynoctonum mucronatum Decne. = **Cynanchum chilense** (Phil.) Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1936.

Cynoctonum myrtifolium (Hook. & Arn.) Decne. = **Cynanchum myrtifolium** Hook. & Arn.

Cynoctonum nemorosum Phil. = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Cynoctonum nummulariifolium (Hook. & Arn.) Decne. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynoctonum pachyphyllum Decne. = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Cynoctonum patagonicum Phil. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynoctonum undulatum Decne. = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Cynoctonum viride Phil. = **Cynanchum atacamense** Liede

Cystostemma glandulosum Silveira = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Cystostemma umbellatum E. Fourn. = **Funastrum flavum** (Decne.) Malme

Dipladenia angustifolia Malme = **Mandevilla angustifolia** (Malme) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Dipladenia gentianioides A. DC. = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1985.

Dipladenia gentianioides A. DC. var. *velutina* (Mart. ex Stadelm.) Müll. Arg. = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Dipladenia linearis Müll. Arg. = **Mandevilla widgrenii** C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Dipladenia saponariae A. DC. = **Mandevilla coccinea** (Hook. & Arn.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Dipladenia sellowii Müll. Arg. = **Mandevilla sellowii** (Müll. Arg.) Woodson
Referencias: Markgraf, F., 1968.

Dipladenia urophylla Hook. f. = **Mandevilla urophylla** (Hook. f.) Woodson
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.

Dipladenia velutina (Mart. ex Stadelm.) A. DC. = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Dipladenia xanthostoma (Stadelm.) Müll. Arg. = **Mandevilla coccinea** (Hook. & Arn.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Diplolepis R. Br.

Número de especies: 6, 5 endémicas

Diplolepis boerhaviifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini
Sin.: *Cynanchum boerhaviifolium* Hook. & Arn., *Cynoctonum boerhaviifolium* (Hook. & Arn.) DC.
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005; Reiche, C. F., 1910a; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 121* (SI)].

Diplolepis descolei (T. Mey.) Liede & Rapini
Sin.: *Cynanchum descolei* T. Mey.
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 51* (LIL, SI)]; CHL[*Looser, G. 1178* (SI)].

Diplolepis geminiflora (Decne.) Liede & Rapini
Sin.: *Astephanus geminiflorus* Decne.
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005; Reiche, C. F., 1910a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P), *Jiles, C. 223* (SI)].

Diplolepis hieronymi (Lorentz) Liede & Rapini
Sin.: *Astephanus fallax* (Hicken) T. Mey., *Astephanus hieronymi* (Lorentz) Malme, *Cynanchum fallax* Hicken, *Cynanchum hieronymi* (Lorentz) Hicken, *Grisebachiella hieronymi* Lorentz
Referencias: Ezcurra, C., 1979, 1999b; Liede, S., 1997a; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005; Malme, G. O. A., 1936.
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerth, E. s.n.* (SI)]; CHL[*Schlegel, F. 3597* (CONC)].

Diplolepis menziesii Schult. f.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Reiche, C. F., 1910a.
Arbusto. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 996141* (CONC)].

Diplolepis nummulariifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **biflora** (Phil.) Henchem & C. Ezcurra
Sin.: *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn. var. *biflorum* (Phil.) Reiche, *Cynoctonum biflorum* Phil.
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Reiche, C. F., 1910a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11491* (BAB)].

Diplolepis nummulariifolia (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**
Sin.: *Cynanchum nanum* Skottsb., *Cynanchum nummulariifolium* Hook. & Arn., *Cynanchum patagonicum* (Phil.) Malme, *Cynanchum undulatum* (Decne.) K. Schum., *Cynoctonum nummulariifolium* (Hook. & Arn.) Decne., *Cynoctonum patagonicum* Phil., *Cynoctonum undulatum* Decne., *Vincetoxicum patagonicum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ezcurra, C., 1999b; Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944; Reiche, C. F., 1910a.
Subarbusto. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 102211/2* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1260* (SI)].

Ditassa R. Br.

Número de especies: 7, 2 endémicas

Ditassa acerosa Mart. = **Minaria acerosa** (Mart.) T.U.P. Konno & Rapini
Referencias: Konno, T. U. P., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2006.

Ditassa adnata E. Fourn. = **Macroditassa adnata** (E. Fourn.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Ditassa anomala Mart. = **Ditassa burchellii** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Ditassa bonariensis Decne. = **Ditassa burchellii** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Ditassa burchellii Hook. & Arn.
Sin.: *Cynanchum bonariense* (Decne.) T. Mey., *Ditassa anomala* Mart., *Ditassa bonariensis* Decne.
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 14912* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 38893* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 50* (SI)].

Ditassa campestris Griseb. = **Oxypetalum argentinum** Malme
Referencias: Meyer, T., 1943b; 1944.

Ditassa edmundoi Fontella & C. Valente
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Enredadera. Endémica. 500–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 218* (MBM)].

Ditassa ericoides Decne. = **Minaria acerosa** (Mart.) T.U.P. Konno & Rapini
Referencias: Konno, T. U. P., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2006.

Ditassa hispida (Vell.) Fontella
Sin.: *Asclepias hispida* Vell., *Ditassa paranensis* Malme, *Ditassa rufescens* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Konno, T. U. P. & Fontella Pereira, J., 2004; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 4565* (MBM)].

Ditassa humilis Morong = **Oxypetalum humile** (Morong) Hassl.
Referencias: Meyer, T., 1943b.

Ditassa megapotamica (Spreng.) Malme
Sin.: *Ditassa oxypetala* Decne., *Oxypetalum megapotamicum* Spreng.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6515* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 36172* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3189b* (MVM)].

Ditassa niruri Decne. = **Ditassa obcordata** Mart.
Referencias: Konno, T. U. P. & Fontella Pereira, J., 2004.

Ditassa obcordata Mart.
Sin.: *Ditassa niruri* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Konno, T. U. P. & Fontella Pereira, J., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14840* (SI)].

Ditassa oxypetala Decne. = **Ditassa megapotamica** (Spreng.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1944.

Ditassa paranensis Malme = **Ditassa hispida** (Vell.) Fontella
Referencias: Konno, T. U. P. & Fontella Pereira, J., 2004.

Ditassa racemosa Britton
Referencias: Meyer, T., 1970.
Enredadera. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 20396* (LIL)].

Ditassa rufescens Decne. = **Ditassa hispida** (Vell.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Ditassa tomentosa (Decne.) Fontella
Sin.: *Metastelma tomentosum* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24115* (MBM)].

Echites atroviolacea Stadelm. = **Mandevilla atroviolacea** (Stadelm.) Woodson
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.

Echites brachyloba (Müll. Arg.) Miers = **Mandevilla brachyloba** (Müll. Arg.) K. Schum.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites bracteata (Hook. & Arn.) Griseb. = **Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Echites chilensis A. DC. = **Elytropus chilensis** (A. DC.) Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Echites coalita Vell. = **Prestonia coalita** (Vell.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.

Echites coccinea Hook. & Arn. = **Mandevilla coccinea** (Hook. & Arn.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites dusenii Malme = **Prestonia dusenii** (Malme) Woodson
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1936.

Echites emarginata Vell. = **Mandevilla emarginata** (Vell.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Echites erecta Vell., hom. illeg. = **Mandevilla emarginata** (Vell.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Echites funiformis Vell. = **Mandevilla funiformis** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites grandiflora Hook. & Arn. var. *minor* Hook. = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Echites guaranitica A. St.-Hil. = **Macrosiphonia longiflora** (Desf.) Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites hirsuta Rich. = **Mandevilla hirsuta** (Rich.) K. Schum.
Referencias: Morales, J. F., 2005a.

Echites illustris Vell. = **Mandevilla illustris** (Vell.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Echites isthmica Vell. = **Condylocarpon isthmicum** (Vell.) A. DC.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Fallen, M. E., 1983.

Echites laxa Ruiz & Pav. = **Mandevilla laxa** (Ruiz & Pav.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites longiflora Desf. = **Macrosiphonia longiflora** (Desf.) Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Echites macrocalyx Müll. Arg. = **Peltastes macrocalyx** (Müll. Arg.) Woodson

Echites mansoana A. DC. = **Mesechites mansoana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Echites odorifera Vell. = **Temnadenia odorifera** (Vell.) J.F. Morales
Referencias: Morales, J. F., 2005b.

Echites peltata Vell. = **Peltastes peltatus** (Vell.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.

Echites petraea A. St.-Hil. = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Echites pinifolia A. St.-Hil. = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pinifolia** (A. St.-Hil.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1984a; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Echites pohliana Stadelm. = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Gentry, A. H., 1985.

Echites pubescens Hook. & Arn. = **Elytropus chilensis** (A. DC.) Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Echites quinquangularis Jacq. = **Prestonia quinquangularis** (Jacq.) Spreng.

Echites sanctae-crucis S. Moore = **Mesechites trifidus** (Jacq.) Müll. Arg.
Referencias: Morales, J. F., 2006.

Echites scabra Hoffmanns. ex Roem. & Schult. = **Mandevilla scabra** (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites spigeliiflora Stadelm. = **Mandevilla spigeliiflora** (Stadelm.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Echites stellaris Lindl. = **Temnadenia odorifera** (Vell.) J.F. Morales
Referencias: Morales, J. F., 2005b.

Echites suaveolens (Lindl.) A. DC. = **Mandevilla laxa** (Ruiz & Pav.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Echites thyrsoidea Vell. = **Forsteronia thyrsoidea** (Vell.) Müll. Arg. var. **thyrsoidea**
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Echites trifidus Jacq. = **Mesechites trifidus** (Jacq.) Müll. Arg.

Echites trifidus Jacq. var. *sanctae-crucis* (S. Moore) Malme = **Mesechites trifidus** (Jacq.) Müll. Arg.
Referencias: Morales, J. F., 2006.

Echites tweediana Hieron. = **Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Echites vauthieri A. DC. = **Prestonia coalita** (Vell.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Echites velame A. St.-Hil. = **Macrosiphonia velame** (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Referencias: Simões, A. O. & Kinoshita-Gouvêa, L. S., 2002.

Echites velloziana A. DC. = **Forsteronia velloziana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Echites velutina Mart. ex Stadelm., hom. illeg. = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Gentry, A. H., 1985.

Echites violacea Vell. = **Temnadenia violacea** (Vell.) Miers
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Echites virescens A. St.-Hil. = **Macrosiphonia virescens** (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Echites xanthostoma Stadelm. = **Mandevilla coccinea** (Hook. & Arn.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Elytropus Müll. Arg.

Número de especies: 1 endémica

Elytropus chilensis (A. DC.) Müll. Arg.
Sin.: *Echites chilensis* A. DC., *Echites pubescens* Hook. & Arn.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ezcurra, C., 1981, 1999a, 2005; Woodson, R. E., 1936.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Santos Biloni, J. 442* (LIL)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].

Exolobus patens (Decne.) E. Fourn. = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Exolobus patens (Decne.) E. Fourn. var. *paraguayensis* Malme = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981a.

Exolobus rotatus (Vell.) E. Fourn. = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Exolobus selloanus E. Fourn. = **Gonolobus parviflorus** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Fischeria DC.

Número de especies: 1

Fischeria martiana Decne. = **Fischeria stellata** (Vell.) E. Fourn.
Referencias: Murphy, H., 1986.

Fischeria stellata (Vell.) E. Fourn.
Sin.: *Cynanchum stellatum* Vell., *Fischeria martiana* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1944; Murphy, H., 1986.
Enredadera o liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5594* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 11841* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9862* (GH, MO, NY, US)].

Forsteronia G. Mey.

Número de especies: 8, 1 endémica

Forsteronia correntina C. Ezcurra & Tressens
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Hansen, B. F., 1985.
Liana. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 16831* (BAA, BAB, CTES, LP)].
Notas: Posible híbrido entre *Forsteronia thyrsoidea* y *F. glabrescens* (Hansen, 1985).

Forsteronia florinbunda Müll. Arg., hom. illeg. = **Forsteronia refracta** Müll. Arg.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Forsteronia glabrescens Müll. Arg.
Sin.: *Thyrsanthus glabrescens* (Müll. Arg.) Miers
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Meyer, T., 1979; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1637* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 4287* (HBR, US, Z)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4157* (BM, G, LIL)]; URY[*Arechavaleta, J. 18* (*)].

Forsteronia lagoensis Müll. Arg. = **Forsteronia refracta** Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1935.

Forsteronia leptocarpa (Hook. & Arn.) A. DC.
Sin.: *Parsonsia leptocarpa* Hook. & Arn., *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1683* (MBM, Z)].

Forsteronia multinervia A. DC. = **Forsteronia thyrsoidea** (Vell.) Müll. Arg. var. **thyrsoidea**
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Forsteronia multinervia A. DC. var. *glabriuscula* A. DC. = **Forsteronia thyrsoidea** (Vell.) Müll. Arg. var. **glabriuscula** (A. DC.) Woodson
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Forsteronia pubescens A. DC.
Sin.: *Thyrsanthus leptocarpus* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *pubescens* (A. DC.) Griseb., *Thyrsanthus placidus* Miers, *Thyrsanthus pubescens* (A. DC.) Miers
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32264* (SI), *Morrone, O. 4519* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 22185* (MBM, MICH)]; PRY[*Chodat, R. H. 196* (G), *Zardini, E. M. 21367* (SI)].

Forsteronia refracta Müll. Arg.
Sin.: *Forsteronia florinbunda* Müll. Arg., hom. illeg., *Forsteronia lagoensis* Müll. Arg., *Thyrsanthus myrianthus* Miers
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15107* (LIL)]; BRA[*Smith, L. B. 12731* (C, HBR, MA, NY, US, WIS)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5380* (G, LIL)].

Forsteronia rufa Müll. Arg.
Sin.: *Forsteronia rufa* Müll. Arg. var. *subglabra* Malme, *Thyrsanthus rufus* (Müll. Arg.) Miers
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14065* (G, S, US)].

Forsteronia rufa Müll. Arg. var. *subglabra* Malme = **Forsteronia rufa** Müll. Arg.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Forsteronia thyrsoidea (Vell.) Müll. Arg. var. **glabriuscula** (A. DC.) Woodson
Sin.: *Forsteronia multinervia* A. DC. var. *glabriuscula* A. DC.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1819* (HBR, M, MO, Z)].

Forsteronia thyrsoidea (Vell.) Müll. Arg. var. **thyrsoidea**
Sin.: *Echites thyrsoidea* Vell., *Forsteronia multinervia* A. DC., *Thyrsanthus multinervius* (A. DC.) Miers
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 300* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 9570* (MBM, Z)]; PRY[*Soria, N. 2427* (MO)].

Forsteronia velloziana (A. DC.) Woodson
Sin.: *Echites velloziana* A. DC.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1935.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10366* (BM, G, GH, MO, NY, US)].

Funastrum E. Fourn.

Número de especies: 3, 1 endémica

Funastrum bonariense (Hook. & Arn.) Schltdl. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.
Sin.: *Cynanchum clausum* Jacq., *Funastrum bonariense* (Hook. & Arn.) Schltdl., *Funastrum riparium* (Decne.) Schltr., *Philibertia bonariensis* (Hook. & Arn.) Malme, *Philibertia riparia* (Decne.) Benth. & Hook., *Sarcostemma bonariense* Hook. & Arn., *Sarcostemma clausum* (Jacq.) Roem. & Schult., *Sarcostemma riparium* Decne.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Holm, R. W., 1950; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21339* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7864* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4345* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15007* (MVFA)].

Funastrum flavum (Decne.) Malme
Sin.: *Ceramanthus flavus* (Decne.) Malme, *Cystostemma umbellatum* E. Fourn., *Funastrum longifolium* (Arechav.) Schltr., *Philibertia longifolia* Arechav., *Philibertia stellaris* Griseb., *Sarcostemma flavum* Decne.
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Fontana, J. L., 1998; Holm, R. W., 1950; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.

Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8962* (SI)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. s.n.* (*)]; URY[*Rosengurtt, B. 2773* (MVFA)].

Funastrum gracile (Decne.) Schltdl.
Sin.: *Amphistelma exsertum* Griseb., *Ceramanthus gracilis* (Decne.) Malme, *Philibertia exserta* (Griseb.) Schltr., *Sarcostemma carpophylloides* Morong, *Sarcostemma gracile* Decne.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Holm, R. W., 1950; Meyer, T., 1943a, 1944; Pontiroli, A., 1973.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5318* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5130* (FCQ)].

Funastrum longifolium (Arechav.) Schltr. = **Funastrum flavum** (Decne.) Malme
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Funastrum riparium (Decne.) Schltr. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Gomphocarpus R. Br.
Número de especies: 1 introducida

Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Subarbusto. Introducida. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9353* (HBR)].

Gonioanthela acuminata (Decne.) Malme = **Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005.

Gonioanthela axillaris (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz = **Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005.

Gonioanthela hatschbachii Fontella & De Lamare = **Peplonia hatschbachii** (Fontella & De Lamare) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005.

Gonioanthela odorata (Decne.) Malme = **Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005.

Gonolobus Michx.
Número de especies: 3

Gonolobus altissimus (Jacq.) Schult. = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**

Gonolobus argentinensis T. Mey. = **Matelea fiebrigii** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus argentinensis T. Mey. var. *macrophyllus* T. Mey. = **Matelea fiebrigii** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus australis (Malme) Malme = **Matelea australis** (Malme) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Gonolobus boliviensis Schltr. = **Matelea boliviensis** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus denticulatus (Vahl) W.D. Stevens = **Matelea denticulata** (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz

Gonolobus dutrae Malme = **Macroscepis dutrae** (Malme) Morillo
Referencias: Morillo, G., 1994b.

Gonolobus fiebrigii Schltr. = **Matelea fiebrigii** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus foetidus Griseb.
Sin.: *Pseudibatia foetida* (Griseb.) Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944.
Subarbusto. Nativa.
Países: ARG(CAT, COR, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 665* (LIL)].

Gonolobus friesii (Malme) T. Mey. = **Matelea friesii** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus hatschbachii Fontella & C. Valente = **Matelea hatschbachii** (Fontella & C. Valente) Morillo
Referencias: Morillo, G., 1985.

Gonolobus hirsutissimus Schltr. = **Matelea hirsutissima** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus hirtus Griseb. = **Matelea chacoensis** Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus hirtus Griseb. var. *longipedunculatus* T. Mey. = **Matelea chacoensis** Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus hispidus Hook. & Arn. = **Matelea hispida** (Hook. & Arn.) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a.

Gonolobus lanatus Griseb. = **Matelea hispida** (Hook. & Arn.) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a.

Gonolobus lilloanus T. Mey. = **Matelea hirsutissima** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Gonolobus obliquifolius Colla = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gonolobus obtusiflorus Decne. = **Matelea denticulata** (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gonolobus parviflorus Decne.
Sin.: *Exolobus selloanus* E. Fourn., *Gonolobus selloanus* (E. Fourn.) Bacigalupo
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24889* (SI)]; BRA[*Plaumann, F. 301* (RB)]; PRY[*Hassler, E. 8682* (S)]; URY[*Izaguirre, P. 2099* (MVFA)].

Gonolobus patens Decne. = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Gonolobus pyrrhotricha Decne. = **Matelea pyrrhotricha** (Decne.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Gonolobus rostratus (Vahl) Roem. & Schult.
Sin.: *Cynanchum rostratum* Vahl, *Cynanchum rotatum* Vell., *Exolobus patens* (Decne.) E. Fourn., *Exolobus patens* (Decne.) E. Fourn. var. *paraguayensis* Malme, *Exolobus rotatus* (Vell.) E. Fourn., *Gonolobus patens* Decne., *Gonolobus rotatus* (Vell.) Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2152* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10516* (HB)]; PRY[*Hassler, E. 227* (SI)].

Gonolobus rotatus (Vell.) Decne. = **Gonolobus rostratus** (Vahl) Roem. & Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gonolobus schreiteri T. Mey. = **Matelea schreiteri** (T. Mey.) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Gonolobus selloanus (E. Fourn.) Bacigalupo = **Gonolobus parviflorus** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gonolobus stelliflorus E. Fourn. = **Matelea denticulata** (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

[Gonolobus venturii Malme]
Notas: Nombre dudoso.

Gonolobus voquicillo Colla = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gothofreda aequaliflora (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum aequaliflorum** E. Fourn.

Gothofreda appendiculata (Mart.) Kuntze = **Oxypetalum appendiculatum** Mart.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda arnottiana (H. Buek) Kuntze = **Oxypetalum arnottianum** H. Buek
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda banskii (Roem. & Schult.) Kuntze = **Oxypetalum banskii** Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda birostrata (Hook. & Arn.) Kuntze = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gothofreda brevipes (Phil.) Kuntze = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gothofreda brunonis (Hook. & Arn.) Kuntze = **Tweedia brunonis** Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gothofreda capitata (Mart.) Kuntze = **Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **capitatum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda confertiflora (Decne.) Kuntze = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gothofreda cordifolia Vent. = **Oxypetalum cordifolium** (Vent.) Schltr. subsp. **cordifolium**

Gothofreda coriacea (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Gothofreda crispa (Wight ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Gothofreda densiflora (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Gothofreda eriantha (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum erianthum** Decne.

Gothofreda gracilis Morong = **Rojasia gracilis** (Morong) Malme
Referencias: Meyer, T., 1944.

Gothofreda guilleminiana (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum wightianum** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda integriloba (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Gothofreda luschnathii (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Gothofreda microstemma (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum arnottianum** H. Buek
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda mollis (Hook. & Arn.) Kuntze = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda mucronata (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **tomentosum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda nigrescens (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda obliquifolia (Colla) Kuntze = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Gothofreda oblongifolia Morong = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Gothofreda pachyglossa (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Gothofreda paludosa (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Gothofreda pannosa (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum pannosum** Decne. var. **pannosum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda paraguayensis (Schltr.) Kuntze = **Oxypetalum humile** (Morong) Hassl.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b.

Gothofreda parvifolia (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **parvifolium** (E. Fourn.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Gothofreda pedicellata (Decne.) Kuntze = **Oxypetalum cordifolium** (Vent.) Schltr. subsp. **pedicellatum** (Decne.) Fontella & Goyder
Referencias: Fontella Pereira, J., Goyder, D. J. & da Silva Ferreira, N. M., 2005.

Gothofreda proboscidea (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio

Gothofreda selloana (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Gothofreda siliculae (E. Fourn.) Kuntze = **Oxypetalum appendiculatum** Mart.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda solanoides (Hook. & Arn.) Kuntze = **Oxypetalum solanoides** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda squamulata (E. Fourn.) Kuntze
= **Oxypetalum wightianum** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda suaveolens (E. Fourn.) Kuntze
= **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda tomentosa (Hook. & Arn.) Kuntze
= **Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **tomentosum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Gothofreda wightiana (Hook. & Arn.) Kuntze
= **Oxypetalum wightianum** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Grisebachiella hieronymi Lorentz = **Diplolepis hieronymi** (Lorentz) Liede & Rapini
Referencias: Liede, S., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2005.

Gyrostelma E. Fourn.

Número de especies: 1 endémica

Gyrostelma bornmuelleri Schltr. ex Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1970; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 973* (C, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 22579* (MBM)].

Haemadictyon acutifolium Müll. Arg. = **Prestonia quinquangularis** (Jacq.) Spreng.

Haemadictyon lindmanii Malme = **Prestonia lindmanii** (Malme) Hoehne
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.

Haemadictyon riedelii Müll. Arg. = **Prestonia riedelii** (Müll. Arg.) Markgr.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.

Hancornia Gomes

Número de especies: 1

Hancornia speciosa Gomes
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Anderson, W. R. 7847* (MO)]; PRY[*Balansa, B. 1349* (G)].

Hemipogon Decne.

Número de especies: 2

Hemipogon acerosus Decne.
Referencias: Decaisne, J., 1844.
Hierba. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 10868* (G)].

Hemipogon setaceus Decne.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901.
Hierba. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11989* (MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 1996* (BM, G, MO, PY)].

Hickenia scalae (Hicken) Lillo = **Morrenia scalae** (Hicken) Goyder
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Goyder, D. J., 2001.

Holostemma chilense Phil. = **Cynanchum chilense** (Phil.) Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1936.

Ionidium diffusum Gillies ex Hook. = **Orthosia virgata** (Poir.) E. Fourn.

Jobinia E. Fourn.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Jobinia connivens (Hook. & Arn.) Malme
Sin.: *Cynanchum connivens* Hook. & Arn., *Jobinia hernandifolia* (Decne.) E. Fourn., *Metastelma hernandifolium* Decne., *Roulinia connivens* (Hook. & Arn.) Decne.
Referencias: Araujo Schwarz, E. & Fontella Pereira, J., 1995; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 38594* (MBM)]; URY[*Del Puerto, O. 11140* (MVFA)].

Jobinia furcata (E. Fourn.) Fontella = **Jobinia lindbergii** E. Fourn.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Jobinia glossostelma (Lillo ex T. Mey.) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum glossostelma* Lillo ex T. Mey., *Cynanchum glossostelma* Lillo, nom. nud.
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001; Lillo, M., 1919a; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 1177* (LIL, MO)].

Jobinia hatschbachii Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Araujo Schwarz, E. & Fontella Pereira, J., 1995; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24387* (MBM)].

Jobinia hernandifolia (Decne.) E. Fourn. = **Jobinia connivens** (Hook. & Arn.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Jobinia lindbergii E. Fourn.
Sin.: *Cyathostelma furcata* E. Fourn., *Jobinia furcata* (E. Fourn.) Fontella
Referencias: Araujo Schwarz, E. & Fontella Pereira, J., 1995; Bacigalupo, N. M., 1996a; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Liana. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2963* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17728* (MBM)].

Jobinia paranaensis Fontella & C. Valente
Referencias: Araujo Schwarz, E. & Fontella Pereira, J., 1995; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 335* (MBM)].

Lagenia angustifolia (Hook. & Arn.) E. Fourn. = **Araujia angustifolia** (Hook. & Arn.) Decne.
Referencias: Meyer, T., 1944.

Lagenia megapotamica (Spreng.) E. Fourn. = **Araujia megapotamica** (Spreng.) G. Don

Laseguea bracteata (Hook. & Arn.) K. Schum. = **Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Laseguea erecta (Vell.) Müll. Arg. = **Mandevilla emarginata** (Vell.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Laseguea erecta (Vell.) Müll. Arg. var. *glabra* Müll. Arg. = **Mandevilla emarginata** (Vell.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Laseguea hookeri Müll. Arg. = **Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Laseguea pentlandiana A. DC. = **Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Lochnera rosea (L.) Rchb. ex Endl. = **Catharanthus roseus** (L.) G. Don
Referencias: Xifreda, C. C., 1984a.

Lugonia lysimachioides Wedd. = **Philibertia lysimachioides** (Wedd.) T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1944.

Lugonia micrantha Malme = **Philibertia micrantha** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Macaglia quebracho Kuntze = **Aspidosperma quebracho-blanco** Schltdl.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1951.

Macroditassa Malme
Número de especies: 1

Macroditassa adnata (E. Fourn.) Malme
Sin.: *Ditassa adnata* E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J. & Ferreira, M. V., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Subarbusto apoyante. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6129* (MBM)].

Macropharynx Rusby
Número de especies: 1 endémica

Macropharynx meyeri (C. Ezcurra) Xifreda
Sin.: *Temnadenia meyeri* C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Fernández, S., 1997; Morales, J. F., 2005b; Xifreda, C. C., 1984b.
Liana. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2967* (LP), *Zuloaga, F. O. 7755* (SI)].
Notas: Según Morales (2005b) se trata de una especie de posición dudosa que no puede ser incluida dentro de *Temnadenia* ni *Macropharynx*.

Macroscepis Kunth
Número de especies: 3, 1 endémica

Macroscepis aurea E. Fourn.
Referencias: Meyer, T., 1944, 1977a; Pontiroli, A., 1983a; Rambo, B., 1958b.
Liana. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 10763* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20613* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6066* (SI)].

Macroscepis dutrae (Malme) Morillo
Sin.: *Gonolobus dutrae* Malme
Referencias: Morillo, G., 1994b; Rambo, B., 1958b.
Liana. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 410* (S)].

Macroscepis magnifica Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mosén, C. W. H. 1471* (S)].

[Macroscepis selloana E. Fourn.]
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Notas: Nombre dudoso.

Macrosiphonia Müll. Arg.

Número de especies: 5, 1 endémica

Macrosiphonia balansae Chodat = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg.
Sin.: *Echites guaranitica* A. St.-Hil., *Echites longiflora* Desf., *Macrosiphonia longiflora* (Desf.) Müll. Arg. var. *guaranitica* (A. St.-Hil.) Malme, *Mandevilla longiflora* (Desf.) Pichon
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1014* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9354* (HBR, US, Z)]; PRY[*Chodat, R. H. 207* (G), *Múlgura de Romero, M. E. 3589bis* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 94081* (Z)].

Macrosiphonia longiflora (Desf.) Müll. Arg. var. *guaranitica* (A. St.-Hil.) Malme = **Macrosiphonia longiflora** (Desf.) Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *minor* (Hook.) Woodson = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Sin.: *Echites grandiflora* Hook. & Arn. var. *minor* Hook., *Echites petraea* A. St.-Hil., *Macrosiphonia balansae* Chodat, *Macrosiphonia petraea* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *minor* (Hook.) Woodson, *Macrosiphonia verticillata* Müll. Arg., *Mandevilla petraea* (A. St.-Hil.) Pichon
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, GUA, ITA); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Romanczuk, M. C. 43* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 136* (HBR, Z)]; PRY[*Balansa, B. 1798* (P)]; URY[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2338* (P)].

Macrosiphonia petraea (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pinifolia** (A. St.-Hil.) Woodson
Sin.: *Echites pinifolia* A. St.-Hil., *Macrosiphonia pinifolia* (A. St.-Hil.) Malme
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PHA, SPE); URY(ART, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 18056* (G, NY)]; PRY[*Meyer, T. 18692* (LIL)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Macrosiphonia pinifolia (A. St.-Hil.) Malme = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pinifolia** (A. St.-Hil.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.

Macrosiphonia undulata C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 8603* (BAB, SI)]; PRY[*Archer 7447* (LIL)].

Macrosiphonia velame (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Sin.: *Echites velame* A. St.-Hil.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Simões, A. O. & Kinoshita-Gouvêa, L. S., 2002.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kinoshita-Gouvêa, L. S. 200067* (UEC)].

Macrosiphonia verticillata Müll. Arg. = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Macrosiphonia virescens (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Sin.: *Echites virescens* A. St.-Hil., *Macrosiphonia virescens* (A. St.-Hil.) Müll. Arg. var. *missionum* Chodat. *Mandevilla virescens* (A. St.-Hil.) Pichon
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1933.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3043* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 1604* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15653* (G, MBM)]; PRY[*Hatschbach, G. 47288* (G)].

Macrosiphonia virescens (A. St.-Hil.) Müll. Arg. var. *missionum* Chodat = **Macrosiphonia virescens** (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Mandevilla Lindl.

Número de especies: 18, 1 endémica

Mandevilla angustifolia (Malme) Woodson
Sin.: *Dipladenia angustifolia* Malme, *Mandevilla minor* Woodson
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2605* (BA, LIL, SI)]; PRY[*Hassler, E. 7204* (G)].

Mandevilla atroviolacea (Stadelm.) Woodson
Sin.: *Echites atroviolacea* Stadelm.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2312* (HBR)].

Mandevilla brachyloba (Müll. Arg.) K. Schum.
Sin.: *Amblyanthera brachyloba* Müll. Arg., *Echites brachyloba* (Müll. Arg.) Miers
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31379* (SI)].

Mandevilla bridgesii (Müll. Arg.) Woodson = **Mandevilla laxa** (Ruiz & Pav.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Mandevilla coccinea (Hook. & Arn.) Woodson
Sin.: *Dipladenia saponariae* A. DC., *Dipladenia xanthostoma* (Stadelm.) Müll. Arg., *Echites coccinea* Hook. & Arn., *Echites xanthostoma* Stadelm.
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni, M. S. 495* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 16573* (HBR, Z)]; PRY[*Hassler, E. 7125* (BM, G), *Múlgura de Romero, M. E. 3609* (CTES, FCQ, SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 94185* (Z)].

Mandevilla emarginata (Vell.) C. Ezcurra
Sin.: *Echites emarginata* Vell., *Echites erecta* Vell., hom. illeg., *Laseguea erecta* (Vell.) Müll. Arg., *Laseguea erecta* (Vell.) Müll. Arg. var. *glabra* Müll. Arg., *Mandevilla erecta* (Vell.) Woodson, nom. illeg.
Referencias: Ezcurra, C., 1992, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Markgraf, F., 1968.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 174* (BA, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11799* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 4735* (LIL)]; URY[*Grela, I. 1328* (MVJB)].

Mandevilla erecta (Vell.) Woodson, nom. illeg. = **Mandevilla emarginata** (Vell.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1992.

Mandevilla funiformis (Vell.) K. Schum.
Sin.: *Echites funiformis* Vell.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4046* (HBR)].

Mandevilla grata Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1769a* (BAB)].
Notas: Probable híbrido entre *Mandevilla laxa* y *M. pentlandiana*.

Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum.
Sin.: *Echites hirsuta* Rich.
Referencias: Morales, J. F., 2005a.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bernardi, L. 18173* (G)].

Mandevilla illustris (Vell.) Woodson
Sin.: *Echites illustris* Vell.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1933.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15913* (MBM)]; PRY[*Carnevali, R. 3915* (CTES)].

Mandevilla immaculata Woodson
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5861* (HBR)].

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson
Sin.: *Amblyanthera bridgesii* Müll. Arg., *Echites laxa* Ruiz & Pav., *Echites suaveolens* (Lindl.) A. DC., *Mandevilla bridgesii* (Müll. Arg.) Woodson, *Mandevilla suaveolens* Lindl.

Referencias: Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera o liana. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7485* (SI)].

Mandevilla linearis (Müll. Arg.) Woodson, hom. illeg. = **Mandevilla widgrenii** C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon = **Macrosiphonia longiflora** (Desf.) Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla minor Woodson = **Mandevilla angustifolia** (Malme) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Mandevilla pentlandiana (A. DC.) Woodson
Sin.: *Echites bracteata* (Hook. & Arn.) Griseb., *Echites tweediana* Hieron., *Laseguea bracteata* (Hook. & Arn.) K. Schum., *Laseguea hookeri* Müll. Arg., *Laseguea pentlandiana* A. DC., *Parsonsia bracteata* Hook. & Arn.
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1933.
Enredadera o liana. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30657* (SI), *Morrone, O. 4409* (SI), *Zuloaga, F. O. 7649* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 49783* (SI)].

Mandevilla petraea (A. St.-Hil.) Pichon = **Macrosiphonia petraea** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **petraea**
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla pohliana (Stadelm.) A.H. Gentry
Sin.: *Dipladenia gentianioides* A. DC., *Dipladenia gentianioides* A. DC. var. *velutina* (Mart. ex Stadelm.) Müll. Arg., *Dipladenia velutina* (Mart. ex Stadelm.) A. DC., *Echites pohliana* Stadelm., *Echites velutina* Mart. ex Stadelm., hom. illeg., *Mandevilla pohliana* (Stadelm.) A.H. Gentry var. *velutina* (Stadelm.) A.H. Gentry, *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, nom. illeg., *Mandevilla velutina* (Mart. ex Stadelm.) Woodson, nom. illeg. var. *glabra* (Müll. Arg.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Gentry, A. H., 1985; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2988* (BAB, G, MO, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13887* (HBR, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4211* (G, LIL)].

Mandevilla pohliana (Stadelm.) A.H. Gentry var. *velutina* (Stadelm.) A.H. Gentry = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.
Sin.: *Echites scabra* Hoffmanns. ex Roem. & Schult.
Referencias: Woodson, R. E., 1933.
Liana. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Spruce, R. 2206* (B, BM, G, K)].

Mandevilla sellowii (Müll. Arg.) Woodson
Sin.: *Dipladenia sellowii* Müll. Arg.
Referencias: Markgraf, F., 1968.
Enredadera. Perenne. Nativa. 300–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6156* (HBR, US)].

Mandevilla spigeliiflora (Stadelm.) Woodson
Sin.: *Echites spigeliiflora* Stadelm.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4238* (BM, G, SI)].

Mandevilla suaveolens Lindl. = **Mandevilla laxa** (Ruiz & Pav.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Mandevilla urophylla (Hook. f.) Woodson
Sin.: *Dipladenia urophylla* Hook. f.
Referencias: Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1933.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2364* (HBR)].

[Mandevilla velutina K. Schum.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Mandevilla velutina (Mart. ex Stadelm.) Woodson, nom. illeg. = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla velutina (Mart. ex Stadelm.) Woodson, nom. illeg. var. *glabra* (Müll. Arg.) Woodson = **Mandevilla pohliana** (Stadelm.) A.H. Gentry
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla virescens (A. St.-Hil.) Pichon = **Macrosiphonia virescens** (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Mandevilla widgrenii C. Ezcurra
Sin.: *Dipladenia linearis* Müll. Arg., *Mandevilla linearis* (Müll. Arg.) Woodson, hom. illeg.
Referencias: Ezcurra, C., 1990; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1933.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9098* (G, US)]; PRY[*Hassler, E. 5724* (G, SI)].

Marsdenia R. Br.

Número de especies: 10, 3 endémicas

Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**
Sin.: *Asclepias altissima* Jacq., *Cynanchum altissimum* (Jacq.) Jacq., *Gonolobus altissimus* (Jacq.) Schult., *Marsdenia burchellii* E. Fourn., *Marsdenia caulantha* S. Moore, *Marsdenia imthurnii* Hemsl., *Marsdenia mollisima* E. Fourn.
Referencias: Dugand, A., 1966; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Harley, R. M. & Marquete Ferreira da Silva, N., 1989; Morillo, G., 1978; Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5367* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 10608* (W)].

Marsdenia altissima (Jacq.) Dugand subsp. **faucinuda** Dugand
Referencias: Dugand, A., 1966.
Liana. Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11118* (US)].

Marsdenia brasiliensis Decne.
Referencias: Decaisne, J., 1844.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 1365* (G)].

Marsdenia burchellii E. Fourn. = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**
Referencias: Dugand, A., 1966.

Marsdenia castillonii Lillo ex T. Mey.
Referencias: Arenas, P. & Giberti, G. C. C., 1987; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, LRI, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 280* (LIL)]; PRY[*Gragson, T. L. 147* (MO)].

Marsdenia caulantha S. Moore = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**

Marsdenia guaranitica Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1901.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4466* (G)].

Marsdenia imthurnii Hemsl. = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**
Referencias: Dugand, A., 1966.

Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn.
Sin.: *Asclepias macrophylla* Humb. & Bonpl. ex Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1947a.
Enredadera. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14539* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40552* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 15072* (FCQ, MO)].

Marsdenia malmeana Rothe
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19505* (MBM)].

Marsdenia mollisima E. Fourn. = **Marsdenia altissima** (Jacq.) Dugand subsp. **altissima**
Referencias: Dugand, A., 1966.

Marsdenia montana Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958b.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9347* (HBR)]; URY[*Berro, M. B. 2399* (MVFA)].

Marsdenia paraguaiensis Morillo
Referencias: Morillo, G., 1993.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schmeda, G. 1306* (US)].

Marsdenia tressensiae S.A. Cáceres & Morillo
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1993.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cáceres Moral, S. A. 426* (BAA, BAB, CTES, SI)].

Marsdenia ulei Schltr. & Roth
Referencias: Meyer, T., 1944.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 11386* (LIL)].

Matelea Aubl.

Número de especies: 14, 7 endémicas

Matelea argentinensis (T. Mey.) Pontiroli = **Matelea fiebrigii** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Matelea australis (Malme) Pontiroli
Sin.: *Gonolobus australis* (Malme) Malme, *Pseudibatia australis* Malme
Referencias: Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a; Rambo, B., 1958b; Schulz, A. G., 1937.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(LAV, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31981* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 9067* (PACA)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].
Notas: Su presencia es probable en Paraguay.

Matelea boliviensis (Schltr.) Goyder
Sin.: *Pseudibatia boliviensis* Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2006; Meyer, T., 1950a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4618* (LIL)].

Matelea chacoensis Goyder
Sin.: *Gonolobus hirtus* Griseb., *Gonolobus hirtus* Griseb. var. *longipedunculatus* T. Mey., *Pseudibatia hirta* (Griseb.) Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2006; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 316* (CORD), *Venturi, S. 7657* (SI)].

Matelea denticulata (Vahl) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Cynanchum denticulatum* Vahl, *Cynanchum viride* Vell., *Gonolobus denticulatus* (Vahl) W.D. Stevens, *Gonolobus obtusiflorus* Decne., *Gonolobus stelliflorus* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 10727* (HBR)].
Notas: Citado para Argentina y Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Fontella Pereira et al., 1989, 2004).

Matelea dusenii Morillo
Referencias: Morillo, G., 1986[1987].
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9431* (BM)].

Matelea fiebrigii (Schltr.) Goyder
Sin.: *Gonolobus argentinensis* T. Mey., *Gonolobus argentinensis* T. Mey. var. *macrophyllus* T. Mey., *Gonolobus fiebrigii* Schltr., *Matelea argentinensis* (T. Mey.) Pontiroli
Referencias: Goyder, D. J., 2006; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T., 1944, 1977a; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 10847* (SI)].

Matelea friesii (Malme) Goyder
Sin.: *Gonolobus friesii* (Malme) T. Mey., *Pseudibatia friesii* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2006; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4505* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 2756* (BM)].

Matelea glaziovii (E. Fourn.) Morillo
Sin.: *Phaeostemma glaziovii* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Morillo, G., 1984.
Enredadera. Perenne. Nativa. 400–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1528* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7409* (MBM)].

Matelea hatschbachii (Fontella & C. Valente) Morillo
Sin.: *Gonolobus hatschbachii* Fontella & C. Valente
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Morillo, G., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6399* (MBM)].

Matelea hirsutissima (Schltr.) Goyder
Sin.: *Gonolobus hirsutissimus* Schltr., *Gonolobus lilloanus* T. Mey., *Matelea lilloana* (T. Mey.) Pontiroli
Referencias: Goyder, D. J., 2006; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Subarbusto. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4617* (LIL)].

Matelea hispida (Hook. & Arn.) Bacigalupo
Sin.: *Gonolobus hispidus* Hook. & Arn., *Gonolobus lanatus* Griseb., *Pseudibatia lanata* (Griseb.) Malme, *Pseudibatia stuckertii* Malme
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 1606* (SI)].

Matelea lilloana (T. Mey.) Pontiroli = **Matelea hirsutissima** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Matelea linearis Decne. = **Blepharodon lineare** (Decne.) Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T., 1944.

Matelea pyrrhotricha (Decne.) Fontella
Sin.: *Gonolobus pyrrhotricha* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1491* (MBM)].

Matelea reitzii Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Endémica. 900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 11987* (HBR, R)].

Matelea schreiteri (T. Mey.) Pontiroli
Sin.: *Gonolobus schreiteri* T. Mey.
Referencias: Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T., 1944, 1977a; Pontiroli, A., 1983a.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5121* (LIL)].

Melinia atropurpurea Malme = **Oxypetalum commersonianum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Melinia bicornuta Griseb. = **Philibertia bicornuta** (Griseb.) Goyder

[Melinia bicornuta Griseb. var. castillonii T. Mey.]
Sin.: *Aphanostelma bicornutum* (Griseb.) Malme var. *castillonii* T. Mey.
Notas: Nombre dudoso.

Melinia campanulata Schltr. = **Philibertia parviflora** (Malme) Goyder
Referencias: Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Melinia candolleana (Hook. & Arn.) Decne. = **Philibertia candolleana** (Hook. & Arn.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Melinia commersoniana Decne. = **Oxypetalum commersonianum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Melinia corymbosa (Malme) Fontella & Farinaccio = **Widgrenia corymbosa** Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Melinia discolor Schltr. = **Philibertia discolor** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Melinia iberae J.L. Fontana = **Widgrenia corymbosa** Malme
Referencias: Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Melinia micrantha (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres = **Philibertia micrantha** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Melinia parviflora (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres = **Philibertia parviflora** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Melinia tubata (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres = **Philibertia tubata** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Melinia volcanensis (T. Mey.) Krapov. & S.A. Cáceres = **Philibertia volcanensis** (T. Mey.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mesechites Müll. Arg.

Número de especies: 2

Mesechites mansoana (A. DC.) Woodson
Sin.: *Echites mansoana* A. DC.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4313* (G)].

Mesechites sanctae-crucis (S. Moore) Woodson = **Mesechites trifidus** (Jacq.) Müll. Arg.
Referencias: Morales, J. F., 2006.

Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg.
Sin.: *Echites sanctae-crucis* S. Moore, *Echites trifidus* Jacq., *Echites trifidus* Jacq. var. *sanctae-crucis* (S. Moore) Malme, *Mesechites sanctae-crucis* (S. Moore) Woodson
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Morales, J. F., 2006; Woodson, R. E., 1933.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30554* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7621* (G)].

Metastelma R. Br.

Número de especies: 3 endémicas

Metastelma acuminata Decne. = **Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005[2004].

Metastelma aphyllum (Vell.) Decne. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Metastelma australe Malme = **Tweedia australis** (Malme) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1995.

Metastelma berterianum (Spreng.) Decne. = **Tassadia berteroana** (Spreng.) W.D. Stevens
Referencias: Stevens, W. D., 1988.

Metastelma dusenii Malme = **Orthosia dusenii** (Malme) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Metastelma hernandifolium Decne. = **Jobinia connivens** (Hook. & Arn.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Metastelma latipes Decne. = **Orthosia latipes** (Decne.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Metastelma melanthum (Decne.) K. Schum. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Metastelma microgynostegia Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1973, 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21552* (LP)].

Metastelma odorata Decne. = **Peplonia axillaris** (Vell.) Fontella & Rapini
Referencias: Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005[2004].

Metastelma oranensis Lillo ex T. Mey.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31348* (SI)].

Metastelma robertii (S. Moore) Malme = **Petalostelma robertii** (S. Moore) Liede & Meve
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001.

Metastelma scoparium (Nutt.) Vail = **Orthosia funalis** (Poir.) Liede & Meve

Metastelma tomentosum Decne. = **Ditassa tomentosa** (Decne.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.

Metastelma trifurcatum Griseb. = **Cynanchum argentinense** Liede

Metastelma tubatum Griseb.
Referencias: Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944, 1977a.
Subarbusto. Endémica. 400–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 1422* (SI)].

Metastelma virgatum (Poir.) Decne. = **Orthosia virgata** (Poir.) E. Fourn.

Minaria T.U.P. Konno & Rapini

Número de especies: 1

Minaria acerosa (Mart.) T.U.P. Konno & Rapini
Sin.: *Ditassa acerosa* Mart., *Ditassa ericoides* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Konno, T. U. P., Rapini, A., Goyder, D. J. & Chase, M. W., 2006; Múlgura, M. E. & Ezcurra, C., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15338* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 17563* (SI)].

Mitostigma affine Griseb. = **Philibertia affinis** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma barbatum Malme = **Philibertia barbata** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma boliviense Schltr. = **Philibertia boliviensis** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma castilloni (Lillo ex T. Mey.) T. Mey. = **Philibertia castillonii** (Lillo ex T. Mey.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma caudatum Malme = **Philibertia coalita** (Lillo) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma cionophorum Griseb. = **Philibertia cionophora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma coalitum Lillo = **Philibertia coalita** (Lillo) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma cordifolium (Phil.) E. Fourn. = **Philibertia candolleana** (Hook. & Arn.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Mitostigma fiebrigii Schltr. = **Philibertia suberecta** Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma grandiflorum Schltr. = **Philibertia longistyla** Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma latiflorum Griseb. = **Philibertia latiflora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma lilloi T. Mey. = **Philibertia coalita** (Lillo) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma mitophorum (Griseb.) T. Mey. = **Philibertia mitophora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma niveum (Griseb.) Griseb. = **Philibertia nivea** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma parviflorum Malme = **Philibertia parviflora** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma rhynchophorum Griseb. = **Philibertia mitophora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1947a.

Mitostigma speciosum Malme = **Philibertia speciosa** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma subniveum Malme = **Philibertia subnivea** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma tomentosum Decne. = **Philibertia tomentosa** (Decne.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma tubatum Malme = **Philibertia tubata** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Mitostigma tucumanense T. Mey. = **Philibertia tucumanensis** (T. Mey.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Morrenia Lindl.

Número de especies: 9, 3 endémicas

Morrenia brachystephana Griseb.
Referencias: Cortadi, A., Scandizzi, A., Gattuso, S., Priolo, N., Caffini, N. & Gattuso, M., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Goyder, D. J., 2003; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, PHA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30048* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1806* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 99612* (MO)].

Morrenia connectens Malme = **Morrenia variegata** (Griseb.) T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1970; Pontiroli, A., 1983a.

Morrenia connectens Malme var. *hunzikeri* T. Mey. = **Morrenia variegata** (Griseb.) T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2003.

Morrenia grandiflora Malme = **Morrenia stuckertiana** (Kurtz ex Heger) Malme subsp. **grandiflora** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2003.

Morrenia hassleriana Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2003.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10803* (G)].

Morrenia herzogii Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2003; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5080* (LP)].

Morrenia incana S. Moore = **Morrenia stormiana** (Morong) Malme
Referencias: Meyer, T., 1944.

Morrenia intermedia T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1950a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 13845* (LIL)].
Notas: Posible híbrido entre *Morrenia odorata* y *M. brachystephana* (Goyder, 2003).

Morrenia odorata (Hook. & Arn.) Lindl.
Sin.: *Cynanchum odoratum* Hook. & Arn.
Referencias: Cortadi, A., Scandizzi, A., Gattuso, S., Priolo, N., Caffini, N. & Gattuso, M., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Goyder, D. J., 2003; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); PRY(APY, CEN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA); URY(COL, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21340* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1706* (SI)]; URY[*Dubugnon, N. 216* (MO)].

Morrenia scalae (Hicken) Goyder
Sin.: *Hickenia scalae* (Hicken) Lillo, *Oxypetalum scalae* Hicken
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Fabris, H. A., 1965a; Goyder, D. J., 2001, 2003; Meyer, T., 1944, 1947a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scala, A. C. 10* (LIL, SI)].

Morrenia schulziana T. Mey. = **Morrenia stormiana** (Morong) Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2003.

Morrenia stormiana (Morong) Malme
Sin.: *Araujia stormiana* Morong, *Morrenia incana* S. Moore, *Morrenia schulziana* T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2003; Meyer, T., 1944; Schulz, A. G., 1937.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 589* (LIL)]; PRY[*Morong, T. 1044* (MO)].

Morrenia stuckertiana (Kurtz ex Heger) Malme subsp. **grandiflora** (Malme) Goyder
Sin.: *Morrenia grandiflora* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2003; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7684* (SI)].

Morrenia stuckertiana (Kurtz ex Heger) Malme subsp. **stuckertiana**
Sin.: *Choristigma stuckertianum* Kurtz ex Heger
Referencias: Goyder, D. J., 2003; Meyer, T., 1944; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Schulz, A. G., 1937.
Enredadera. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: ARG(COR, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1228* (SI)].

Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey.
Sin.: *Morrenia connectens* Malme, *Morrenia connectens* Malme var. *hunzikeri* T. Mey., *Morrenia variegata* (Griseb.) T. Mey. var. *hunzikeri* (T. Mey.) T. Mey., *Oxypetalum variegatum* Griseb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Goyder, D. J., 2003; Meyer, T., 1970, 1977a; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2603* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2708* (FCQ)].

Morrenia variegata (Griseb.) T. Mey. var. *hunzikeri* (T. Mey.) T. Mey. = **Morrenia variegata** (Griseb.) T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2003.

Nautonia Decne.

Número de especies: 1

Nautonia nummularia Decne.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901, 1933a; Meyer, T., 1944.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 432* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 6379* (HBR, MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 48225* (AS, MO)].

Nephradenia linearis (Decne.) Benth. = **Blepharodon lineare** (Decne.) Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Orthosia Decne.

Número de especies: 8, 3 endémicas

Orthosia aphylla (Vell.) Malme = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Orthosia congesta Decne.
Sin.: *Orthosia congesta* Decne. var. *brachystephana* Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18997* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6229* (SI)].

Orthosia congesta Decne. var. *brachystephana* Malme = **Orthosia congesta** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Orthosia decaisnei E. Fourn. = **Orthosia urceolata** E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Orthosia dusenii (Malme) Fontella
Sin.: *Metastelma dusenii* Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1200–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8967* (S)].

Orthosia funalis (Poir.) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum funale* Poir., *Cynanchum scoparium* Nutt., *Metastelma scoparium* (Nutt.) Vail
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, RIV, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 14880* (MVFA)]; BRA[*Hatschbach, G. 51257* (MO)]; URY[*Del Puerto, O. 8322* (MVFA)].
Notas: Nombre provisorio.

Orthosia hatschbachii Fontella & Goes
Referencias: Fontella Pereira, J. & Góes, M. B., 2004.

Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16404* (MBM)].

Orthosia latipes (Decne.) Malme
Sin.: *Cyathostelma latipes* (Decne.) E. Fourn., *Metastelma latipes* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5273* (HBR)].

Orthosia loandensis Fontella & C. Valente
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5643* (MBM)].

Orthosia melantha (Decne.) Malme = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Orthosia tomentosa (E. Fourn.) Malme = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **tomentosa** (E. Fourn.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Orthosia urceolata E. Fourn.
Sin.: *Cynanchum congestum* Vell., *Cynanchum urceolatum* (E. Fourn.) K. Schum., *Orthosia decaisnei* E. Fourn., *Vincetoxicum congestum* (Vell.) Kuntze, *Vincetoxicum urceolatum* (E. Fourn.) Kuntze
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6383* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 746* (MBM)].

Orthosia virgata (Poir.) E. Fourn.
Sin.: *Cynanchum diffusum* (Gillies ex Hook.) Hook. & Arn., *Ionidium diffusum* Gillies ex Hook., *Metastelma virgatum* (Poir.) Decne., *Periploca virgata* Poir.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY); URY(LAV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30044* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 532* (MBM)]; PRY[*Degen, R. 3270* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Osten, C. 5523* (SI)].

Oxypetalum R. Br.

Número de especies: 73, 36 endémicas

Oxypetalum acerosum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9524* (G, MO)].

Oxypetalum aequaliflorum E. Fourn.
Sin.: *Gothofreda aequaliflora* (E. Fourn.) Kuntze
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 32939* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9520a* (SI)].

Oxypetalum albiflorum Schltr. = **Oxypetalum brachystemma** Malme

Oxypetalum alpinum (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Oxypetalum pachyglossum* auct. non Decne., *Oxypetalum umbellatum* auct. non Gardner, *Oxypetalum umbellatum* Gardner var. *pallidum* Hoehne
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7876* (MBM, RB)].

Oxypetalum andinum Phil. = **Tweedia andina** (Phil.) G.H. Rua
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum angustifolium Phil. = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum appendiculatum Mart.
Sin.: *Gothofreda appendiculata* (Mart.) Kuntze, *Gothofreda siliculae* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum siliculae* E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1944; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28705* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15869* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3824* (LIL)].

Oxypetalum arenicola Hauman ex Lillo
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)].

Oxypetalum argentinum Malme
Sin.: *Ditassa campestris* Griseb.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SFE); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6289* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 26106* (PACA)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Rambo, 1958b).

Oxypetalum arnottianum H. Buek
Sin.: *Gothofreda arnottiana* (H. Buek) Kuntze, *Gothofreda microstemma* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum capitatum* Hook. & Arn., nom. illeg., *Oxypetalum clavatum* Malme, *Oxypetalum microstemma* E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Malme, G. O. A., 1901, 1933a; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, SPE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 509* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10966* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9560* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4802* (SI)].

Oxypetalum arnottianum H. Buek var. *brachystephanum* Malme = **Oxypetalum brachystephanum** (Malme) Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.

Oxypetalum atropurpureum (Malme) T. Mey. = **Oxypetalum commersonianum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990.

Oxypetalum aurantiacum Malme ex Chodat & Hassl.
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CAU); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7720* (G)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (MVM)].

Oxypetalum aureum Chodat = **Oxypetalum erianthum** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901.

Oxypetalum balansae Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 20b* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19080* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 1336* (SI)].

Oxypetalum banskii Schult.
Sin.: *Asclepias communis* Vell., *Gothofreda banskii* (Roem. & Schult.) Kuntze, *Oxypetalum maritimum* Hook. & Arn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Stienstra, B. H. 34* (SI)].

Oxypetalum barberoanum T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1943b; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 10843* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 8451* (LIL)].

Oxypetalum berterianum Spreng. = **Tassadia berteroana** (Spreng.) W.D. Stevens
Referencias: Stevens, W. D., 1988.

Oxypetalum brachystemma Malme
Sin.: *Corollonema boliviense* Schltr., *Oxypetalum albiflorum* Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2004a; Meyer, T., 1943b, 1944, 1977a; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30631* (SI)].

Oxypetalum brachystephanum (Malme) Malme
Sin.: *Oxypetalum arnottianum* H. Buek var. *brachystephanum* Malme, *Oxypetalum paraguayense* auct. non Schltr.
Referencias: Malme, G. O. A., 1901, 1908.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3252* (G)].

Oxypetalum brevipes Phil. = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum brunonis (Hook. & Arn.) Decne. = **Tweedia brunonis** Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum burchellii (E. Fourn.) Malme = **Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var. **burchellii** (E. Fourn.) Fontella

Oxypetalum campestre Decne. = **Oxypetalum erectum** Mart. subsp. **campestre** (Decne.) Hoehne
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Oxypetalum capitatum Hook. & Arn., nom. illeg.
= **Oxypetalum arnottianum** H. Buek
Referencias: Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1943b.

Oxypetalum capitatum Mart. subsp. **angustum** Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (SI)].

Oxypetalum capitatum Mart. subsp. **capitatum**
Sin.: *Gothofreda capitata* (Mart.) Kuntze
Referencias: Angely, J. A., 1959; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1983a; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, COA, GUA, PAI); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15370* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43358* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. s.n.* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 2012* (MVFA)].

Oxypetalum capitatum Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio
Sin.: *Gothofreda proboscidea* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat, *Oxypetalum hasslerianum* Chodat var. *mirabile* Malme, *Oxypetalum proboscideum* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Farinaccio, M. A. & Araujo Schwarz, E., 1997; Malme, G. O. A., 1901.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); BRA(PAR); PRY(CON, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2477* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 15450* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 3816* (BAB)].

Oxypetalum ceratostemma Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9522* (G)].

Oxypetalum charrua T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1943, 1944; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Endémica. 200–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)]; BRA[*Rambo, B. 9513* (PACA)].

Oxypetalum chodatianum Malme
Sin.: *Oxypetalum paranense* Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Malme, G. O. A., 1901.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2562* (S)]; PRY[*Hassler, E. 4405* (G)].

Oxypetalum clavatum Malme = **Oxypetalum arnottianum** H. Buek
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum coalitum E. Fourn.
Referencias: Rambo, B., 1958b.
Hierba. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 34607* (PACA)].

Oxypetalum coccineum Griseb. = **Amblyopetalum coccineum** (Griseb.) Malme
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944.

Oxypetalum coeruleum (D. Don) Decne.
Sin.: *Amblyopetalum coeruleum* (D. Don) Malme, *Tweedia coerulea* D. Don, *Tweedia versicolor* Hook.
Referencias: Meyer, T., 1943b; Rambo, B., 1958a, b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 47966* (PACA)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVJB)].

Oxypetalum commersonianum (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Melinia atropurpurea* Malme, *Melinia commersoniana* Decne., *Oxypetalum atropurpureum* (Malme) T. Mey.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983; Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22683* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 658* (B)]; URY[*Gallinal, J. P. 2925* (MO)].

Oxypetalum confertiflorum Decne. = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum confusum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 1859* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 3074* (R)].

[Oxypetalum cordifolium (Vent.) Schltr. subsp. cordifolium]
Sin.: *Gothofreda cordifolia* Vent.
Referencias: Fontella Pereira, J., Goyder, D. J. & da Silva Ferreira, N. M., 2005.
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Oxypetalum cordifolium (Vent.) Schltr. subsp. **pedicellatum** (Decne.) Fontella & Goyder
Sin.: *Gothofreda pedicellata* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum pedicellatum* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Goyder, D. J. & da Silva Ferreira, N. M., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3121* (HBR)].

Oxypetalum coriaceum Decne. = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 1987.

Oxypetalum crispum Wight ex Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda crispa* (Wight ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda integriloba* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda oblongifolia* Morong, *Oxypetalum integrilobum* E. Fourn., *Oxypetalum kuntzei* Schltr., *Oxypetalum oblongifolium* (Morong) Lillo, *Oxypetalum pratense* Griseb., *Oxypetalum spegazzinii* Hauman ex Lillo, *Oxypetalum suaveolens* Speg., hom. illeg.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1958a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 3482* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 37090* (CTES)]; PRY[*Jörgensen, P. 4346* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3925* (LP)].

Oxypetalum curtiflorum Malme = **Oxypetalum muticum** E. Fourn.

Oxypetalum curtiflorum Malme var. *indutum* Malme = **Oxypetalum muticum** E. Fourn.

Oxypetalum densiflorum Decne. = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 1987.

Oxypetalum dusenii Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2313* (R, S)].

Oxypetalum echegarayi Hieron. = **Tweedia echegarayi** (Hieron.) Malme
Referencias: Meyer, T., 1944; Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum erectum Mart. subsp. **campestre** (Decne.) Hoehne
Sin.: *Asclepias arvensis* Vell., *Asclepias multicaulis* Vell., *Oxypetalum campestre* Decne.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7387* (SI)].

Oxypetalum erianthum Decne.
Sin.: *Gothofreda eriantha* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum aureum* Chodat
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1943b, 1944.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1933* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14323* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4339* (SI)].

Oxypetalum filamentosum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6336* (G)].

Oxypetalum foliosum Mart.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 1100–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Grossmann, K. 535* (GOET, HBR)].

Oxypetalum fontellae S.A. Cáceres
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1993.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 937* (CTES)].

Oxypetalum glabrescens Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9592* (G)].

Oxypetalum glabrum (Decne.) Malme = **Oxypetalum insigne** (Decne.) Malme var. **glabrum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz

Oxypetalum gracile T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 2153* (LIL)].

[Oxypetalum guaraniticum (Malme) Malme]
Sin.: *Calostigma guaraniticum* Malme
Notas: Nombre dudoso.

Oxypetalum guilleminianum Decne. = **Oxypetalum wightianum** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum hasslerianum Chodat = **Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio

Oxypetalum hasslerianum Chodat var. *mirabile* Malme = **Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio
Referencias: Fontella Pereira, J., Farinaccio, M. A. & Araujo Schwarz, E., 1997.

Oxypetalum henschenii Malme = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum hilarianum E. Fourn.
Referencias: Malme, G. O. A., 1920; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b; Schulz, A. G., 1937.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3197* (BA, LIL, SI)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. s.n.* (P)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Rambo, 1958b).

Oxypetalum hirsutulum K. Schum. = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum hoehnei Malme
Sin.: *Calostigma dusenii* Hoehne
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6515* (MBM)].

Oxypetalum hookeri Decne. = **Tweedia andina** (Phil.) G.H. Rua

Oxypetalum humile (Morong) Hassl.
Sin.: *Ditassa humilis* Morong, *Gothofreda paraguayensis* (Schltr.) Kuntze, *Oxypetalum paraguayense* Schltr.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981b; Meyer, T., 1943b, 1944; Schulz, A. G., 1937.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); PRY(CEN, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2608* (BA, LIL, SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 9596* (SI)].

Oxypetalum incanum E. Fourn.
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1989.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Huidobro 4810* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 9591* (BM, G, MO)].
Notas: Su presencia es dudosa en Rio Grande do Sul, Brasil (Rambo, 1958a).

Oxypetalum insigne (Decne.) Malme var. **bresolinii** Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10635* (HBR)].

Oxypetalum insigne (Decne.) Malme var. **burchellii** (E. Fourn.) Fontella
Sin.: *Calostigma burchellii* E. Fourn., *Oxypetalum burchellii* (E. Fourn.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 400–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6023* (HBR)].

Oxypetalum insigne (Decne.) Malme var. **glabrum** (Decne.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Calostigma glabrum* Decne., *Oxypetalum glabrum* (Decne.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 49410* (PACA)].

Oxypetalum insigne (Decne.) Malme var. **insigne**
Sin.: *Calostigma insigne* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9581* (HBR)].

Oxypetalum integrilobum E. Fourn. = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum joergensenii T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. s.n.* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. 9790* (PACA)].

Oxypetalum kingii S. Moore = **Tweedia echegarayi** (Hieron.) Malme
Referencias: Meyer, T., 1943b, 1944; Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum kleinii Fontella & Marquete
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Endémica. 800–1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8216* (HBR)].

Oxypetalum kuntzei Schltr. = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum lineare Decne.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Rambo, B., 1958b.
Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3092* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6267* (SI)].

Oxypetalum luschnathii E. Fourn. = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Oxypetalum lynchianum T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4562* (LIL)].

Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne. var. **macrolepis**
Sin.: *Tweedia macrolepis* Hook. & Arn.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958a, b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, MIE, SPE); URY(CAS, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27778* (SI)]; BRA[*Tweedie, J. 226* (K)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3241* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8322* (MVFA)].

Oxypetalum macrolepis (Hook. & Arn.) Decne. var. **pilosum** Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1901.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3904* (G)].

Oxypetalum malmei Hoehne
Sin.: *Oxypetalum subcapitatum* Malme, nom. illeg.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Hoehne, F. C., 1916; Malme, G. O. A., 1905.
Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2564* (R, S)].

Oxypetalum marginatum Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Malme, G. O. A., 1901.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5282* (G)].

Oxypetalum maritimum Hook. & Arn. = **Oxypetalum banskii** Schult.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum martii E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Rambo, B., 1958b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 53007* (PACA)].

Oxypetalum megapotamicum Spreng. = **Ditassa megapotamica** (Spreng.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1944.

Oxypetalum microphyllum Hook. & Arn.
Sin.: *Oxypetalum multicaule* E. Fourn.
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); URY(ART, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 31029* (SI)]; URY[*Bonifacino, J. M. 872* (MVFA)].
Notas: Su presencia es dudosa en Rio Grande do Sul, Brasil (Rambo, 1958b).

Oxypetalum microstemma E. Fourn. = **Oxypetalum arnottianum** H. Buek
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum molle Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda mollis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda nigrescens* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda suaveolens* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum henschenii* Malme, *Oxypetalum hirsutulum* K. Schum., *Oxypetalum nigrescens* E. Fourn., *Oxypetalum oliganthum* Malme, *Oxypetalum suaveolens* E. Fourn.
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1989; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 644* (CTES, GH, K, LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 1151* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6021* (LIL)].

Oxypetalum morilloanum Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16541* (HBR)];

Oxypetalum mosenii (Malme) Malme = **Schistogyne mosenii** (Malme) T. Mey.

Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1950a.

Oxypetalum mucronatum E. Fourn. = **Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **tomentosum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum multicaule E. Fourn. = **Oxypetalum microphyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Meyer, T., 1943b.

Oxypetalum muticum E. Fourn.
Sin.: *Oxypetalum curtiflorum* Malme, *Oxypetalum curtiflorum* Malme var. *indutum* Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10568* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9492* (SI)].

Oxypetalum nanum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9493* (G, S)].

Oxypetalum nigrescens E. Fourn. = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1989; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum nitidum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14239* (*)].

Oxypetalum niveum Griseb. = **Philibertia nivea** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Oxypetalum oblanceolatum Farinaccio & Mello-Silva
Referencias: Farinaccio, M. A. & Mello-Silva, R., 2006.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24431* (MBM, SPF)].

Oxypetalum oblongifolium (Morong) Lillo = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum obtusifolium Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958a, b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7380* (SI)].
Notas: Es dudosa su presencia en Rio Grande do Sul, Brasil (Rambo, 1958b).

Oxypetalum oliganthum Malme = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1989; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum ophiuroideum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1901.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4983* (G)].

Oxypetalum ostenii Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1943b, 1944.
Enredadera. Endémica. 200–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Osten, C. 8083* (MVM)].

Oxypetalum pachyglossum auct. non Decne. = **Oxypetalum alpinum** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum pachyglossum Decne.
Sin.: *Cystostemma glandulosum* Silveira, *Gothofreda coriacea* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda densiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda luschnathii* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda pachyglossa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda paludosa* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda selloana* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum coriaceum* Decne., *Oxypetalum densiflorum* Decne., *Oxypetalum luschnathii* E. Fourn., *Oxypetalum paludosum* Decne., *Oxypetalum selloanum* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., 1987; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Harley, R. M. & Marquete Ferreira da Silva, N., 1989; Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4360* (MBM)].

Oxypetalum pachygynum Decne.
Sin.: *Oxypetalum vestitum* Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 100–1300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 579* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5850* (BM)].

Oxypetalum paludosum Decne. = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Oxypetalum pannosum Decne. var. **macranthum** Hoehne
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3330* (R)].

Oxypetalum pannosum Decne. var. **pannosum**
Sin.: *Gothofreda pannosa* (Decne.) Kuntze, *Oxypetalum uruguayense* Arechav.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA); URY(MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 21392* (CONC, CTES, G)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9146* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6224* (LIL)]; URY[*Felippone, F. 4803* (SI)].

Oxypetalum paraguayense auct. non Schltr. = **Oxypetalum brachystephanum** (Malme) Malme

Oxypetalum paraguayense Schltr. = **Oxypetalum humile** (Morong) Hassl.
Referencias: Meyer, T., 1943b.

Oxypetalum paranense Malme = **Oxypetalum chodatianum** Malme

Oxypetalum parviflorum (Decne.) Decne. var. **kuhlmannii** Hoehne
Referencias: Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8066* (SI)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 1161* (CTES)].

Oxypetalum parviflorum (Decne.) Decne. var. **parviflorum**
Sin.: *Schizostemma parviflorum* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b; Schulz, A. G., 1937.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CON); URY(CLA, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 185* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 7236* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4705* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 7740* (MVFA)].

Oxypetalum parvifolium E. Fourn. = **Oxypetalum tomentosum** Wight ex Hook. & Arn. var. **parvifolium** (E. Fourn.) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum pedicellatum Decne. = **Oxypetalum cordifolium** (Vent.) Schltr. subsp. **pedicellatum** (Decne.) Fontella & Goyder
Referencias: Fontella Pereira, J., Goyder, D. J. & da Silva Ferreira, N. M., 2005.

Oxypetalum pratense Griseb. = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum proboscideum E. Fourn. = **Oxypetalum capitatum** Mart. subsp. **mirabile** (Malme) Fontella & Farinaccio

Oxypetalum rariflorum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Enredadera. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20683* (MBM)].
Notas: Probablemente se trate de una variedad de *Oxypetalum insigne* (Fontella et al., 1985).

Oxypetalum reflexum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Nativa. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9900* (G)].

Oxypetalum reitzii Fontella & Marquete
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6108* (HBR)].

Oxypetalum rojasianum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1908.
Hierba. Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9851* (G)].

Oxypetalum saxatile Decne. = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Oxypetalum scalae Hicken = **Morrenia scalae** (Hicken) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2001.

Oxypetalum schulzii Malme
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR); URY(ART, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 4718* (C, CTES)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Oxypetalum selloanum E. Fourn. = **Oxypetalum pachyglossum** Decne.

Oxypetalum siliculae E. Fourn. = **Oxypetalum appendiculatum** Mart.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum solanoides Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda solanoides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum tenuiflorum* Griseb., *Schizostemma longifolium* Decne., *Tweedia floribunda* Decne.
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Fontana, J. L., 1998; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958a, b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MON, PAY, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 214* (LIL)]; BRA[*Santos, E. 3603* (R)]; URY[*Herter, W. G. F. 737* (SI)].

Oxypetalum spegazzinii Hauman ex Lillo = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum squamulatum E. Fourn. = **Oxypetalum wightianum** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum stenophyllum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Hierba. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8575* (MBM)].

[Oxypetalum stigmatosum E. Fourn.]
Referencias: Rambo, B., 1958a, b.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Oxypetalum stipatum Malme
Referencias: Meyer, T., 1943b, 1944; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14641* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 500* (NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6407* (LIL)].

Oxypetalum suaveolens E. Fourn. = **Oxypetalum molle** Hook. & Arn.
Referencias: Cáceres Moral, S. A., 1989; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Oxypetalum suaveolens Speg., hom. illeg. = **Oxypetalum crispum** Wight ex Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1983.

Oxypetalum subcapitatum Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1943b, 1944.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2611* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 5106* (G, S)].

Oxypetalum subcapitatum Malme, nom. illeg. = **Oxypetalum malmei** Hoehne
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Hoehne, F. C., 1916; Malme, G. O. A., 1905.

Oxypetalum sublanatum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Cáceres Moral, S. A., 1989; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1943b, 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 200–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 7194* (SI)].

Oxypetalum subopposítum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7294* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9522b* (G, MO)].

Oxypetalum tenuiflorum Griseb. = **Oxypetalum solanoides** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Oxypetalum tomentosum Wight ex Hook. & Arn. var. **parvifolium** (E. Fourn.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Gothofreda parvifolia* (E. Fourn.) Kuntze, *Oxypetalum parvifolium* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16763* (MBM)].

Oxypetalum tomentosum Wight ex Hook. & Arn. var. **tomentosum**
Sin.: *Gothofreda mucronata* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda tomentosa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum mucronatum* E. Fourn.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 36956* (CTES, MBM)]; URY[*Osten, C. 5486* (SI), *Tweedie, J. 212* (K)].

Oxypetalum tubatum Malme
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3202* (R, S)].

Oxypetalum umbellatum auct. non Gardner = **Oxypetalum alpinum** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne) Fontella & E.A. Schwarz

Oxypetalum umbellatum Gardner var. *pallidum* Hoehne = **Oxypetalum alpinum** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **pallidum** (Hoehne) Fontella & E.A. Schwarz
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Oxypetalum uruguayense Arechav. = **Oxypetalum pannosum** Decne. var. **pannosum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Oxypetalum variegatum Griseb. = **Morrenia variegata** (Griseb.) T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1977a.

Oxypetalum vestitum Malme = **Oxypetalum pachygynum** Decne.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.

Oxypetalum warmingii (E. Fourn.) Fontella & Marquete
Sin.: *Bustelina warmingii* E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., 2005; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.
Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5404* (MBM)].

Oxypetalum wightianum Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda guilleminiana* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda squamulata* (E. Fourn.) Kuntze, *Gothofreda wightiana* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum guilleminianum* Decne., *Oxypetalum squamulatum* E. Fourn.
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1901; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jönsson, G. 1157* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9597* (NY)].

Oxystelma gilliesii (Hook. & Arn.) K. Schum. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Oxystelma vaileae Rusby = **Philibertia picta** Schltr.
Referencias: Liede, S., 1996.

Oxystelma violacea (Phil.) K. Schum. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Parsonsia bracteata Hook. & Arn. = **Mandevilla pentlandiana** (A. DC.) Woodson
Referencias: Woodson, R. E., 1933.

Parsonsia leptocarpa Hook. & Arn. = **Forsteronia leptocarpa** (Hook. & Arn.) A. DC.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Peltastes Woodson
Número de especies: 2, 1 endémica

Peltastes macrocalyx (Müll. Arg.) Woodson
Sin.: *Echites macrocalyx* Müll. Arg., *Peltastes stemmadeniiflorus* Woodson
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Morales, J. F., 2005c; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 9838* (BAF, G)].

Peltastes malvaeflorus Woodson = **Peltastes peltatus** (Vell.) Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Peltastes peltatus (Vell.) Woodson
Sin.: *Echites peltata* Vell., *Peltastes malvaeflorus* Woodson
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1245* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10851* (SI), *Smith, L. B. 9665* (HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 14435* (BAF, LIL)].

Peltastes stemmadeniiflorus Woodson = **Peltastes macrocalyx** (Müll. Arg.) Woodson
Referencias: Morales, J. F., 2005c.

Peplonia Decne.
Número de especies: 2

Peplonia axillaris (Vell.) Fontella & Rapini
Sin.: *Asclepias axillaris* Vell., *Gonioanthela acuminata* (Decne.) Malme, *Gonioanthela axillaris* (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz, *Gonioanthela odorata* (Decne.) Malme, *Metastelma acuminata* Decne., *Metastelma odorata* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005[2004].

Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10808* (MBM)].

Peplonia hatschbachii (Fontella & De Lamare) Fontella & Rapini
Sin.: *Gonioanthela hatschbachii* Fontella & De Lamare
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Rapini, A., Fontella Pereira, J., Lamare, E. H. & Liede, S., 2005[2004].
Enredadera. Perenne. Nativa. 900–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15688* (MBM, RB)].

Periploca virgata Poir. = **Orthosia virgata** (Poir.) E. Fourn.

Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers = **Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Referencias: Leeuwenberg, A. J. M., 1994.

Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers var. *hilariana* (Müll. Arg.) L. Allorge = **Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Referencias: Leeuwenberg, A. J. M., 1994.

Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers = **Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Referencias: Markgraf, F., 1968.

Peschiera fuchsiaefolia (A. DC.) Miers = **Tabernaemontana fuchsiaefolia** A. DC.
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Peschiera hilariana (Müll. Arg.) Miers = **Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Referencias: Leeuwenberg, A. J. M., 1994.

Peschiera hystrix (Steud.) A. DC. = **Tabernaemontana hystrix** Steud.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.

Petalostelma E. Fourn.

Número de especies: 2, 1 endémica

Petalostelma robertii (S. Moore) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum robertii* (S. Moore) Malme, *Metastelma robertii* (S. Moore) Malme, *Vincetoxicum robertii* S. Moore
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1480* (S)].

Petalostelma sarcostemma (Lillo) Liede & Meve
Sin.: *Cynanchum sarcostemma* Lillo
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 3844* (LIL)].

Phaeostemma glaziovii E. Fourn. = **Matelea glaziovii** (E. Fourn.) Morillo
Referencias: Morillo, G., 1984.

Philibertia Kunth

Número de especies: 30, 14 endémicas

Philibertia affinis (Griseb.) Goyder
Sin.: *Mitostigma affine* Griseb.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Malme, G. O. A., 1904; Meyer, T., 1942, 1944.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 314* (LIL)].

Philibertia albiflora Lillo ex T. Mey. = **Philibertia picta** Schltr.
Referencias: Liede, S., 1996.

Philibertia barbata (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma barbatum* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Malme, G. O. A., 1904; Meyer, T., 1942, 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiner, E. J. 10846* (SI)].

Philibertia bicornuta (Griseb.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma bicornutum* (Griseb.) Malme, *Melinia bicornuta* Griseb.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6167* (LP)].

Philibertia boliviana (Baill.) Goyder
Sin.: *Amblystigma pilosum* Malme, *Amblystigma pilosum* Malme var. *catamarcense* T. Mey., *Amblystigma pilosum* Malme var. *laticaudiculatum* T. Mey., *Podandra boliviana* Baill., *Podandra pilosa* (Malme) Morillo
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944; Morillo, G., 1997; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 5013* (LIL)].

Philibertia boliviensis (Schltr.) Goyder
Sin.: *Mitostigma boliviense* Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1300–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 2370* (BM, GH, GOET, K, US)].

Philibertia bonariensis (Hook. & Arn.) Malme = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Philibertia campanulata (Lindl.) Nichols
Sin.: *Philibertia hypoleuca* Schltr., *Philibertia speciosa* Malme, *Philibertia splendens* Lillo, *Sarcostemma campanulatum* Lindl.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Holm, R. W., 1950; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 3076* (LP)].

Philibertia candolleana (Hook. & Arn.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma candolleanum* (Hook. & Arn.) Malme, *Astephanus cordifolius* Phil., *Astephanus fruticulosus* Speg., *Brachylepis candolleana* Hook. & Arn., *Melinia candolleana* (Hook. & Arn.) Decne., *Mitostigma cordifolium* (Phil.) E. Fourn.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TUC); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15589* (SI)]; CHL[*Vega s.n.* (CONC)].

Philibertia canescens Decne. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.

Philibertia castillonii (Lillo ex T. Mey.) Goyder
Sin.: *Amblystigma castillonii* Lillo ex T. Mey., *Mitostigma castilloni* (Lillo ex T. Mey.) T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 6653* (LIL)].

Philibertia cionophora (Griseb.) Goyder
Sin.: *Amblystigma cionophorum* (Griseb.) E. Fourn., *Mitostigma cionophorum* Griseb., *Podandra cionophora* (Griseb.) Morillo
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944; Morillo, G., 1994a, 1997; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 700–1300 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 820* (SI)].

Philibertia coalita (Lillo) Goyder
Sin.: *Mitostigma caudatum* Malme, *Mitostigma coalitum* Lillo, *Mitostigma lilloi* T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1942, 1944.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4603* (LIL, SI)].

Philibertia discolor (Schltr.) Goyder
Sin.: *Melinia discolor* Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 2600–2800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mello-Silva, R. 1887* (K)].

Philibertia exserta (Griseb.) Schltr. = **Funastrum gracile** (Decne.) Schltdl.
Referencias: Pontiroli, A., 1973, 1983a.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn.
Sin.: *Amblystigma pedunculare* Benth., *Oxystelma gilliesii* (Hook. & Arn.) K. Schum., *Oxystelma violacea* (Phil.) K. Schum., *Philibertia canescens* Decne., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *albida* Stuck., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *gracilis* (D. Don) T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *grandiflora* (Hook.) T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *mirabilis* T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *parvicoronata* T. Mey., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *pubescens* Speg., *Philibertia gilliesii* Hook. & Arn. var. *vestita* Malme, *Philibertia gracilis* D. Don, *Philibertia grandiflora* Hook., *Philibertia grandiflora* Hook. f. *albida* Malme, *Philibertia incana* (Decne.) Malme, *Philibertia schreiteri* T. Mey., *Philibertia violacea* (Phil.) Schltr., *Sarcostemma donianum* Decne., *Sarcostemma gilliesii* (Hook. & Arn.) Decne., *Sarcostemma grandiflorum* (Hook.) Decne., *Sarcostemma incanum* Decne., *Zosima violacea* Phil.
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Goyder, D. J., 2004b; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Holm, R. W., 1950; Meyer, T., 1943a; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1823* (SI), *Parodi, L. R. 2528* (BAA)].

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *albida* Stuck. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *gracilis* (D. Don) T. Mey. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *grandiflora* (Hook.) T. Mey. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *mirabilis* T. Mey. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *parvicoronata* T. Mey. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *pubescens* Speg. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia gilliesii Hook. & Arn. var. *vestita* Malme = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia gracilis D. Don = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Holm, R. W., 1950.

Philibertia grandiflora Hook. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia grandiflora Hook. f. *albida* Malme = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.

Philibertia hypoleuca Schltr. = **Philibertia campanulata** (Lindl.) Nichols
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Philibertia incana (Decne.) Malme = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.

Philibertia latiflora (Griseb.) Goyder
Sin.: *Mitostigma latiflorum* Griseb.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34860* (MU, SI), *Cabrera, A. L. 23381* (LP), *Cabrera, A. L. 30340* (SI)].

Philibertia longifolia Arechav. = **Funastrum flavum** (Decne.) Malme
Referencias: Holm, R. W., 1950; Meyer, T., 1943a.

Philibertia longistyla Goyder
Sin.: *Mitostigma grandiflorum* Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1300–1600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 2290* (BM, K, LIL, S)].

Philibertia lysimachioides (Wedd.) T. Mey.
Sin.: *Lugonia lysimachioides* Wedd., *Sarcostemma lysimachioides* (Wedd.) R.W. Holm
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Holm, R. W., 1950; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19017* (LP), *Kiesling, R. 1607* (SI)].

Philibertia micrantha (Malme) Goyder
Sin.: *Aphanostelma micranthum* (Malme) T. Mey., *Lugonia micrantha* Malme, *Melinia micrantha* (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Subarbusto. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18930* (LP, SI), *Cabrera, A. L. 27460* (SI)].

Philibertia mitophora (Griseb.) Goyder
Sin.: *Astephanus mitophorus* Griseb., *Mitostigma mitophorum* (Griseb.) T. Mey., *Mitostigma rhynchophorum* Griseb.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1947a, 1977a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 7384* (LIL), *Lorentz, P. G. s.n.* (SI)].

Philibertia multiflora (T. Mey.) Goyder
Sin.: *Astephanus multiflorus* T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 2300–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4616* (LIL)].

Philibertia nivea (Griseb.) Goyder
Sin.: *Mitostigma niveum* (Griseb.) Griseb., *Oxypetalum niveum* Griseb.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Malme, G. O. A., 1904; Meyer, T., 1942, 1944, 1977a.
Subarbusto. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 1418* (LIL, SI)].

Philibertia parviflora (Malme) Goyder
Sin.: *Aphanostelma parviflorum* (Malme) Malme, *Melinia campanulata* Schltr., *Melinia parviflora* (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres, *Mitostigma parviflorum* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Subarbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27404* (SI)].

Philibertia picta Schltr.
Sin.: *Oxystelma vaileae* Rusby, *Philibertia albiflora* Lillo ex T. Mey., *Philibertia vailiae* (Rusby) Liede, *Sarcostemma vaileae* (Rusby) R.W. Holm
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Hechem, V. & Ezcurra, C., 2006; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 9463* (LIL), *Saravia Toledo, C. 1203* (SI)].

Philibertia rahmeri (Phil.) Malme = **Philibertia solanoides** Kunth
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Philibertia riparia (Decne.) Benth. & Hook. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.

[Philibertia rotata Griseb.]
Notas: Nombre dudoso.

Philibertia schreiteri T. Mey. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Philibertia solanoides Kunth
Sin.: *Blepharodon rahmeri* Phil., *Philibertia rahmeri* (Phil.) Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Malme, G. O. A., 1936.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 199* (CONC)].

Philibertia speciosa Malme = **Philibertia campanulata** (Lindl.) Nichols
Referencias: Holm, R. W., 1950; Pontiroli, A., 1983a.

Philibertia speciosa (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma speciosum* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5444* (LP), *Guaglianone, E. R. 2053* (SI)].

Philibertia splendens Lillo = **Philibertia campanulata** (Lindl.) Nichols
Referencias: Holm, R. W., 1950; Pontiroli, A., 1983a.

Philibertia stellaris Griseb. = **Funastrum flavum** (Decne.) Malme
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Philibertia stipitata Lillo
Sin.: *Sarcostemma stipitatum* (Lillo) R.W. Holm
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Holm, R. W., 1950; Lillo, M., 1919a; Meyer, T., 1943a, 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1100–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20197* (LP), *Lillo, M. 2621* (LIL), *Venturi, S. 2812* (SI)].

Philibertia suberecta Goyder
Sin.: *Mitostigma fiebrigii* Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Subarbusto. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6277* (LP)].

Philibertia subnivea (Malme) Goyder
Sin.: *Mitostigma subniveum* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1944.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)].

Philibertia tomentosa (Decne.) Goyder
Sin.: *Mitostigma tomentosum* Decne.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1944, 1977a; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5145* (SI)].

Philibertia tubata (Malme) Goyder
Sin.: *Aphanostelma tubatum* (Malme) Malme, *Melinia tubata* (Malme) Krapov. & S.A. Cáceres, *Mitostigma tubatum* Malme
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1944, 1977a.
Subarbusto. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1097* (SI), *Lorentz, P. G. 712* (LIL)].

Philibertia tucumanensis (T. Mey.) Goyder
Sin.: *Mitostigma tucumanense* T. Mey.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b; Meyer, T., 1942, 1944, 1977a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 2033* (LIL)].

Philibertia vailiae (Rusby) Liede = **Philibertia picta** Schltr.
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Philibertia violacea (Phil.) Schltr. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Philibertia volcanensis (T. Mey.) Goyder
Sin.: *Aphanostelma volcanense* T. Mey., *Melinia volcanensis* (T. Mey.) Krapov. & S.A. Cáceres
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.
Subarbusto. Endémica. 1800–2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 2591* (LIL)].

Physianthus albens Hook., hom. illeg. = **Araujia sericifera** Brot.

Physianthus albens Mart. = **Araujia sericifera** Brot.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1944.

Physianthus angustifolius Hook. & Arn. = **Araujia angustifolia** (Hook. & Arn.) Decne.
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944.

Physianthus megapotamicus Spreng. = **Araujia megapotamica** (Spreng.) G. Don
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Plumeria L.

Número de especies: 1 introducida

Plumeria rubra L.
Referencias: Ezcurra, C., 2005; Markgraf, F., 1968.
Arbolito. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1434* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6225* (HBR)].

Podandra boliviana Baill. = **Philibertia boliviana** (Baill.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Podandra cionophora (Griseb.) Morillo = **Philibertia cionophora** (Griseb.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Podandra pilosa (Malme) Morillo = **Philibertia boliviana** (Baill.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2004b.

Prestonia R. Br.

Número de especies: 8

Prestonia acutifolia (Müll. Arg.) K. Schum. = **Prestonia quinquangularis** (Jacq.) Spreng.

Prestonia calycina Müll. Arg.
Sin.: *Prestonia hirsuta* Müll. Arg.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2114* (SI)]; PRY[*Woolston, A. 819* (SI)].

Prestonia coalita (Vell.) Woodson
Sin.: *Echites coalita* Vell., *Echites vauthieri* A. DC.
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 57* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2628* (HBR, Z)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4601* (BM, G)].

Prestonia dusenii (Malme) Woodson
Sin.: *Echites dusenii* Malme
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1936.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2385* (HBR, Z)].

Prestonia erecta (Malme) J.F. Morales = **Rhodocalyx rotundifolius** Müll. Arg.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.

Prestonia hassleri Woodson
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1936.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31381* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 5645* (B, C, HBR, L, MBM, U)]; PRY[*Woolston, A. L. 1156* (LIL)].

Prestonia hirsuta Müll. Arg. = **Prestonia calycina** Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Prestonia lanata Müll. Arg. = **Prestonia tomentosa** R. Br.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.

Prestonia lindmanii (Malme) Hoehne
Sin.: *Haemadictyon lindmanii* Malme
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4344* (BM, G)].

Prestonia lutescens Müll. Arg. = **Prestonia tomentosa** R. Br.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.

Prestonia quinquangularis (Jacq.) Spreng.
Sin.: *Echites quinquangularis* Jacq., *Haemadictyon acutifolium* Müll. Arg., *Prestonia acutifolia* (Müll. Arg.) K. Schum., *Temnadenia quinquangularis* (Jacq.) Miers
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Morales, J. F., 2005d; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS, SAL); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Porta, R. E. 165* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5009* (G, LIL)].

Prestonia riedelii (Müll. Arg.) Markgr.
Sin.: *Haemadictyon riedelii* Müll. Arg., *Temnadenia riedelii* (Müll. Arg.) Miers
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3021* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11624* (S, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4447* (BM, G, LIL)].

Prestonia sericocalyx Malme = **Prestonia tomentosa** R. Br.
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Prestonia tomentosa R. Br.
Sin.: *Prestonia lanata* Müll. Arg., *Prestonia lutescens* Müll. Arg., *Prestonia sericocalyx* Malme
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4692* (BM, G, LIL)].
Notas: Posiblemente crezca en Argentina (Ezcurra 1981, 2005; Ezcurra et al., 1992).

Pseudibatia australis Malme = **Matelea australis** (Malme) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Pseudibatia boliviensis Schltr. = **Matelea boliviensis** (Schltr.) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Pseudibatia foetida (Griseb.) Malme = **Gonolobus foetidus** Griseb.
Referencias: Meyer, T., 1944.

Pseudibatia friesii Malme = **Matelea friesii** (Malme) Goyder
Referencias: Goyder, D. J., 2006.

Pseudibatia hirta (Griseb.) Malme = **Matelea chacoensis** Goyder
Referencias: Meyer, T., 1944.

Pseudibatia lanata (Griseb.) Malme = **Matelea hispida** (Hook. & Arn.) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a.

Pseudibatia stuckertii Malme = **Matelea hispida** (Hook. & Arn.) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1996a.

Rauvolfia L.

Número de especies: 4

Rauvolfia boliviana Markgr. = **Rauvolfia schuelii** Speg.
Referencias: Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.

Rauvolfia divergens Markgr. = **Rauvolfia mollis** S. Moore
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.

Rauvolfia elliptica Malme = **Rauvolfia weddelliana** Müll. Arg.
Referencias: Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.

Rauvolfia glabra Cav. = **Vallesia glabra** (Cav.) Link
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Rauvolfia mollis S. Moore
Sin.: *Rauvolfia divergens* Markgr.
Referencias: Ezcurra, C., 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas, T. s.n.* (BAF)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4634* (G)].

Rauvolfia schuelii Speg.
Sin.: *Rauvolfia boliviana* Markgr.
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9634* (LIL, LP, SI)].

Rauvolfia sellowii Müll. Arg.
Sin.: *Aspidosperma pseudoquina* Hassl., *Aspidosperma spegazzinii* Molfino ex T. Mey.
Referencias: Ezcurra, C., 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 9119* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 35136* (SI)]; PRY[*Caballero Marmori, G. 875* (G)].

Rauvolfia weddelliana Müll. Arg.
Sin.: *Rauvolfia elliptica* Malme
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Rao, A. S., 1956; Xifreda, C. C., 1981.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bernardi, L. 18963* (G, NY), *Krapovickas, A. 45967* (CTES)].
Notas: Citado erróneamente para Argentina por Molfino (Ezcurra, 1981, 2005).

Rhabdadenia Müll. Arg.

Número de especies: 2

Rhabdadenia pohlii Müll. Arg.
Sin.: *Rhabdadenia pohlii* Müll. Arg. var. *suberecta* Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Markgraf, F., 1968; Woodson, R. E., 1936.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2545* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 8305* (HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 2090* (LIL, SI)].

Rhabdadenia pohlii Müll. Arg. var. *suberecta* Müll. Arg. = **Rhabdadenia pohlii** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Woodson, R. E., 1936.

Rhabdadenia ragonesei Woodson
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE); PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 3267* (LIL)]; PRY[*Krapovickas, A. 14298* (CTES)].

Rhodocalyx Müll. Arg.

Número de especies: 1

Rhodocalyx erectus Malme = **Rhodocalyx rotundifolius** Müll. Arg.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.

Rhodocalyx rotundifolius Müll. Arg.
Sin.: *Prestonia erecta* (Malme) J.F. Morales, *Rhodocalyx erectus* Malme
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Morales, J. F., 1999a; Woodson, R. E., 1936.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4356* (G)].

Rhyssostelma Decne.

Número de especies: 1 endémica

Rhyssostelma nigricans Decne.
Referencias: Lombardo, A., 1983.
Endémica. 0–500 m.
Países: URY(LAV, MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 845* (MVFA)].

Rojasia Malme

Número de especies: 1

Rojasia gracilis (Morong) Malme
Sin.: *Gothofreda gracilis* Morong
Referencias: Goyder, D. J., 2006; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20199* (SI), *Meyer, T. 1046* (LIL, LP)]; PRY[*Arenas, P. 1694* (SI), *Arenas, P. 473* (MO, SI)].

Roulinia acuta Decne. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia blanda Decne. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.

Roulinia connivens (Hook. & Arn.) Decne. = **Jobinia connivens** (Hook. & Arn.) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Roulinia convolvulacea Decne. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia cordata (Vell.) J.F. Macbr. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Sundell, E., 1981.

Roulinia ekmanii Malme = **Telminostelma ekmanii** (Malme) Fontella & E.A. Schwarz

Roulinia fluminensis Decne. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia mannii Rusby = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia modesta Decne. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia montevidensis (Spreng.) Malme = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia riedelii E. Fourn. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia selloana E. Fourn. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia tamifolia (Hook. & Arn.) Decne. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Roulinia versicolor Lem. = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001; Sundell, E., 1981.

Sarcostemma bonariense Hook. & Arn. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Sarcostemma campanulatum Lindl. = **Philibertia campanulata** (Lindl.) Nichols
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Sarcostemma carpophylloides Morong = **Funastrum gracile** (Decne.) Schltdl.
Referencias: Meyer, T., 1944.

Sarcostemma clausum (Jacq.) Roem. & Schult. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Sarcostemma donianum Decne. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Sarcostemma flavum Decne. = **Funastrum flavum** (Decne.) Malme
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Sarcostemma gilliesii (Hook. & Arn.) Decne. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Pontiroli, A., 1983a.

Sarcostemma gracile Decne. = **Funastrum gracile** (Decne.) Schltdl.
Referencias: Pontiroli, A., 1973, 1983a.

Sarcostemma grandiflorum (Hook.) Decne. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Sarcostemma incanum Decne. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950.

Sarcostemma lysimachioides (Wedd.) R.W. Holm = **Philibertia lysimachioides** (Wedd.) T. Mey.
Referencias: Liede, S., 1996; Meyer, T., 1944.

Sarcostemma riparium Decne. = **Funastrum clausum** (Jacq.) Schltr.

Sarcostemma stipitatum (Lillo) R.W. Holm = **Philibertia stipitata** Lillo
Referencias: Liede, S., 1996.

Sarcostemma vaileae (Rusby) R.W. Holm = **Philibertia picta** Schltr.
Referencias: Liede, S., 1996.

Schistogyne Hook. & Arn.

Número de especies: 7, 4 endémicas

Schistogyne berroi Arechav. = **Schistogyne sylvestris** Hook. & Arn.
Referencias: Meyer, T., 1944.

[Schistogyne boliviensis Schltr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Schistogyne decaisneana H. Karst.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944; Rambo, B., 1958b; Schulz, A. G., 1937.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 60* (LIL), *Venturi, S. 217* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 208* (MBM)].

Schistogyne fiebrigii Malme
Referencias: Meyer, T., 1970; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22179* (LP), *Guaglianone, E. R. 1831* (SI)].

Schistogyne longipedunculata Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944, 1977a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3780* (LIL), *Venturi, S. 5733* (SI)].

Schistogyne mosenii (Malme) T. Mey.
Sin.: *Calostigma mosenii* Malme, *Oxypetalum mosenii* (Malme) Malme
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Meyer, T., 1950a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 3888* (LIL)]; BRA[*Smith, L. B. 10700* (HBR, R, US)].

Schistogyne pubescens Malme
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944, 1970; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 200–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30339* (SI)].

Schistogyne sylvestris Hook. & Arn.
Sin.: *Schistogyne berroi* Arechav., *Schistogyne sylvestris* Hook. & Arn. var. *chacoensis* Malme
Referencias: Fabris, H. A., 1965a; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Rambo, B., 1958b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27046* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 3958* (PACA)]; URY[*Tweedie, J. 219* (K)].

Schistogyne sylvestris Hook. & Arn. var. *chacoensis* Malme = **Schistogyne sylvestris** Hook. & Arn.
Referencias: Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979.

Schistogyne tucumanensis T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 7180* (LP)].

Schizostemma longifolium Decne. = **Oxypetalum solanoides** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Schizostemma parviflorum Decne. = **Oxypetalum parviflorum** (Decne.) Decne. var. **parviflorum**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Schubertia Mart.

Número de especies: 2

Schubertia grandiflora Mart.
Sin.: *Araujia grandiflora* (Mart.) Morong
Referencias: Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1944; Schulz, A. G., 1937; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); PRY(AMA, COA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 25* (SI), *Seijo, G. J. 300* (MNES, SI)]; PRY[*Schinini, A. 3728* (SI), *Zardini, E. M. 35797* (MO, SI)].

Schubertia schreiteri Descole & T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1944; Pontiroli, A., 1983a.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 2736* (SI), *Cabrera, A. L. 21185* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 1946* (SI)].

Secondatia A. DC.

Número de especies: 1

Secondatia densiflora A. DC.
Sin.: *Secondatia densiflora* A. DC. var. *paraguariensis* Hassl.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Woodson, R. E., 1935.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11420* (BAF, BM, G, MO, NY)].

Secondatia densiflora A. DC. var. *paraguariensis* Hassl.
= **Secondatia densiflora** A. DC.
Referencias: Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Woodson, R. E., 1935.

Skytanthus Meyen

Número de especies: 1 endémica

Skytanthus acutus Meyen
Referencias: Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 11524* (SI)].

Tabernaemontana L.

Número de especies: 1

Tabernaemontana australis Müll. Arg.
= **Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Referencias: Leeuwenberg, A. J. M., 1994.

Tabernaemontana catharinensis A. DC.
Sin.: *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers, *Peschiera australis* (Müll. Arg.) Miers var. *hilariana* (Müll. Arg.) L. Allorge, *Peschiera catharinensis* (A. DC.) Miers, *Peschiera hilariana* (Müll. Arg.) Miers, *Tabernaemontana australis* Müll. Arg., *Tabernaemontana hilariana* Müll. Arg.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992; Kinoshita, L. S., 2005; Leeuwenberg, A. J. M., 1994; Markgraf, F., 1968; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28861* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 9196* (HBR, Z)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4929* (G)]; URY[*Berro, M. B. 5083* (MVFA)].

[Tabernaemontana fuchsiaefolia A. DC.]
Sin.: *Peschiera fuchsiaefolia* (A. DC.) Miers
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Leeuwenberg, A. J. M., 1994.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tabernaemontana hilariana Müll. Arg.
= **Tabernaemontana catharinensis** A. DC.
Referencias: Leeuwenberg, A. J. M., 1994.

[Tabernaemontana hystrix Steud.]
Sin.: *Peschiera hystrix* (Steud.) A. DC.
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tassadia Decne.

Número de especies: 3

Tassadia berteroana (Spreng.) W.D. Stevens
Sin.: *Metastelma berterianum* (Spreng.) Decne., *Oxypetalum berterianum* Spreng.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Stevens, W. D., 1988.
Enredadera. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, CEN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19070* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 485* (K, MO)].

Tassadia floribunda E. Fourn. = **Tassadia obovata** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Tassadia neovidensis E. Fourn. = **Tassadia obovata** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Tassadia obovata Decne.
Sin.: *Tassadia floribunda* E. Fourn., *Tassadia neovidensis* E. Fourn., *Tassadia poeppigiana* Decne., *Tassadia selloana* E. Fourn., *Tassadia turriformis* E. Fourn.

Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35624* (MBM)].

Tassadia poeppigiana Decne. = **Tassadia obovata** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Tassadia selloana E. Fourn. = **Tassadia obovata** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Tassadia subulata (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **florida** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Cynanchum aphyllum* auct. non Vell., *Cynanchum floridum* Vell.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 96* (CTES, G, MNES)]; BRA[*Klein, R. M. 7710* (HBR)]; PRY[*Schinini, A. 2937* (CTES)].
Notas: Nombre provisorio. Véase *Orthosia funalis*.

Tassadia subulata (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Sin.: *Amphistelma aphyllum* (Vell.) E. Fourn., *Amphistelma melanthum* (Decne.) E. Fourn., *Cynanchum aphyllum* Vell., *Cynanchum melanthum* (Decne.) T. Mey., *Cynanchum subulatum* Vell., *Metastelma aphyllum* (Vell.) Decne., *Metastelma melanthum* (Decne.) K. Schum., *Orthosia aphylla* (Vell.) Malme, *Orthosia melantha* (Decne.) Malme, *Vincetoxicum aphyllum* (Vell.) Kuntze, *Vincetoxicum melanthum* Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004; Malme, G. O. A., 1901; Meyer, T., 1944.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1242* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8149* (SI), *Hatschbach, G. 16717* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 3029* (S)].
Notas: Nombre provisorio. Véase *Orthosia funalis*.

Tassadia subulata (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **tomentosa** (E. Fourn.) Fontella
Sin.: *Amphistelma tomentosum* E. Fourn., *Orthosia tomentosa* (E. Fourn.) Malme, *Vincetoxicum tomentosum* (E. Fourn.) Kuntze
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16244* (HBR)].
Notas: Nombre provisorio. Véase *Orthosia funalis*.

Tassadia turriformis E. Fourn. = **Tassadia obovata** Decne.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Telminostelma E. Fourn.

Número de especies: 2, 1 endémica

Telminostelma ekmanii (Malme) Fontella & E.A. Schwarz
Sin.: *Cynanchum ekmanii* (Malme) Sundell, nom. illeg., *Roulinia ekmanii* Malme
Referencias: Fontella Pereira, J. & Araujo Schwarz, E., 1981a; Malme, G. O. A., 1933a; Meyer, T., 1950a; Rambo, B., 1958b; Sundell, E., 1981.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 406* (S)]; BRA[*Rambo, B. 49926* (PACA)].

Telminostelma foetidum (Cav.) Fontella & E.A. Schwarz = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Sundell, E., 1981.

Telminostelma roulinioides E. Fourn.
Sin.: *Cynanchum roulinioides* (E. Fourn.) Rapini
Referencias: Rapini, A., Mello-Silva, R. & Kawasaki, M. L., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Solomon, J. C. 7062* (MO)].

Temnadenia Miers

Número de especies: 2

Temnadenia meyeri C. Ezcurra = **Macropharynx meyeri** (C. Ezcurra) Xifreda
Referencias: Fernández, S., 1997; Xifreda, C. C., 1984b.

Temnadenia odorifera (Vell.) J.F. Morales
Sin.: *Echites odorifera* Vell., *Echites stellaris* Lindl., *Temnadenia stellaris* (Lindl.) Miers
Referencias: Kinoshita, L. S., 2005; Markgraf, F., 1968; Morales, J. F., 1999b, 2005b; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15580* (F, MBM, US)].

Temnadenia quinquangularis (Jacq.) Miers = **Prestonia quinquangularis** (Jacq.) Spreng.

Temnadenia riedelii (Müll. Arg.) Miers = **Prestonia riedelii** (Müll. Arg.) Markgr.
Referencias: Woodson, R. E., 1936.

Temnadenia stellaris (Lindl.) Miers = **Temnadenia odorifera** (Vell.) J.F. Morales
Referencias: Morales, J. F., 2005b.

Temnadenia violacea (Vell.) Miers
Sin.: *Echites violacea* Vell.

Referencias: Morales, J. F., 2005b; Woodson, R. E., 1936.
Liana. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11038* (BM, G, MO, NY, S, US)].

Thevetia L.

Número de especies: 2

Thevetia bicornuta Müll. Arg.
Sin.: *Cascabela bicornuta* (Müll. Arg.) Lippold, nom. illeg., *Thevetia paraguayensis* Britton
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1981, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, CEN, CON, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 468* (SI)]; PRY[*Morong, T. 381* (GH, MO, NY)].

Thevetia paraguayensis Britton = **Thevetia bicornuta** Müll. Arg.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.
Sin.: *Cascabela peruviana* (Pers.) Raf., *Cerbera peruviana* Pers.
Referencias: Bernardi, L., 1984.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3970* (G)].

Thyroma polyneura (Müll. Arg.) Miers = **Aspidosperma polyneuron** Müll. Arg.
Referencias: Woodson, R. E., 1951.

Thyrsanthus glabrescens (Müll. Arg.) Miers = **Forsteronia glabrescens** Müll. Arg.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Thyrsanthus leptocarpus (Hook. & Arn.) Griseb. = **Forsteronia leptocarpa** (Hook. & Arn.) A. DC.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Thyrsanthus leptocarpus (Hook. & Arn.) Griseb. var. *pubescens* (A. DC.) Griseb. = **Forsteronia pubescens** A. DC.
Referencias: Ezcurra, C., 1981; Hansen, B. F., 1985.

Thyrsanthus multinervius (A. DC.) Miers = **Forsteronia thyrsoidea** (Vell.) Müll. Arg. var. **thyrsoidea**
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Thyrsanthus myrianthus Miers = **Forsteronia refracta** Müll. Arg.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Thyrsanthus placidus Miers = **Forsteronia pubescens** A. DC.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Thyrsanthus pubescens (A. DC.) Miers = **Forsteronia pubescens** A. DC.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Thyrsanthus rufus (Müll. Arg.) Miers = **Forsteronia rufa** Müll. Arg.
Referencias: Hansen, B. F., 1985; Woodson, R. E., 1935.

Turrigera halophila Griseb. = **Tweedia brunonis** Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Turrigera inconspicua Decne. = **Tweedia brunonis** Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Tweedia Hook. & Arn.

Número de especies: 7, 6 endémicas

Tweedia andina (Phil.) G.H. Rua
Sin.: *Oxypetalum andinum* Phil., *Oxypetalum hookeri* Decne., *Tweedia hookeri* (Decne.) Malme
Referencias: Rua, G. H., 1989.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 1674* (CONC), *Werdermann, E. 532* (SI)].

Tweedia aucaensis G.H. Rua
Referencias: Ezcurra, C., 1999b; Rua, G. H., 1986, 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Valla, J. J. s.n.* (BAA)].

Tweedia australis (Malme) C. Ezcurra
Sin.: *Metastelma australe* Malme, *Tweedia odonellii* T. Mey.
Referencias: Ezcurra, C., 1995, 1999b; Meyer, T., 1950a; Rua, G. H., 1989.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, T. s.n.* (S), *Hicken, C. M. s.n.* (SI), *O'Donell, C. A. 3476* (LIL)].

Tweedia birostrata (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Sin.: *Cynanchum birostratum* Hook. & Arn., *Gonolobus obliquifolius* Colla, *Gonolobus voquicillo* Colla, *Gothofreda birostrata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Gothofreda brevipes* (Phil.) Kuntze, *Gothofreda confertiflora* (Decne.) Kuntze, *Gothofreda obliquifolia* (Colla) Kuntze, *Oxypetalum angustifolium* Phil., *Oxypetalum brevipes* Phil., *Oxypetalum confertiflorum* Decne., *Oxypetalum saxatile* Decne., *Tweedia brevipes* (Phil.) Malme, *Tweedia confertiflora* (Decne.) Malme, *Tweedia obliquifolia* (Colla) Malme
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Rua, G. H., 1989.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 32* (SI)].

Tweedia brevipes (Phil.) Malme = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Tweedia brunonis Hook. & Arn.
Sin.: *Gothofreda brunonis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Oxypetalum brunonis* (Hook. & Arn.) Decne., *Turrigera halophila* Griseb., *Turrigera inconspicua* Decne.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1999b; Meyer, T. & Bacigalupo, N. M., 1979; Meyer, T., 1944; Rua, G. H., 1989.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27345* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2695* (FCQ)].

Tweedia coerulea D. Don = **Oxypetalum coeruleum** (D. Don) Decne.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Tweedia confertiflora (Decne.) Malme = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Tweedia echegarayi (Hieron.) Malme
Sin.: *Oxypetalum echegarayi* Hieron., *Oxypetalum kingii* S. Moore
Referencias: Meyer, T., 1944; Rua, G. H., 1989.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*King, D. O. 347* (LIL)].

Tweedia floribunda Decne. = **Oxypetalum solanoides** Hook. & Arn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Tweedia hookeri (Decne.) Malme = **Tweedia andina** (Phil.) G.H. Rua
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Tweedia macrolepis Hook. & Arn. = **Oxypetalum macrolepis** (Hook. & Arn.) Decne. var. **macrolepis**
Referencias: Meyer, T., 1943b; Rua, G. H., 1989.

Tweedia obliquifolia (Colla) Malme = **Tweedia birostrata** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Tweedia odonellii T. Mey. = **Tweedia australis** (Malme) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1995.

Tweedia stipitata G.H. Rua & Liede
Referencias: Rua, G. H. & Liede, S., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 5730* (CONC)].

Tweedia versicolor Hook. = **Oxypetalum coeruleum** (D. Don) Decne.
Referencias: Rua, G. H., 1989.

Vallesia Ruiz & Pav.

Número de especies: 1

Vallesia cymbaefolia Ortega = **Vallesia glabra** (Cav.) Link
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Vallesia dichotoma Ruiz & Pav. = **Vallesia glabra** (Cav.) Link
Referencias: Ezcurra, C., 1981.

Vallesia glabra (Cav.) Link
Sin.: *Rauvolfia glabra* Cav., *Vallesia cymbaefolia* Ortega, *Vallesia dichotoma* Ruiz & Pav.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M., 1992.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31434* (SI)]; PRY[*Brunner, D. R. 1372* (MO), *Mereles, F. 5571* (SI)].

Vinca L.

Número de especies: 1 introducida

Vinca major L.
Referencias: Ezcurra, C., 1981, 1984a, 2005; Markgraf, F., 1968.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, NEU, RNE); BRA(SCA); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 874* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 13226* (HBR)]; CHL[*Matthei, O. R. 251* (CONC)]; URY[*Rodríguez, H. 8517* (MVFA)].

Vinca rosea L. = **Catharanthus roseus** (L.) G. Don
Referencias: Xifreda, C. C., 1984a.

Vincetoxicum aphyllum (Vell.) Kuntze = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Vincetoxicum bulligerum Speg. = **Cynanchum bulligerum** (Speg.) Lillo

Vincetoxicum chiloense (Decne.) Kuntze = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Vincetoxicum congestum (Vell.) Kuntze = **Orthosia urceolata** E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Vincetoxicum melanthum Decne. = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **subulata**
Referencias: Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985.

Vincetoxicum montevidense (Spreng.) Kuntze = **Cynanchum montevidense** Spreng.
Referencias: Sundell, E., 1981.

Vincetoxicum nemorosum (Phil.) Kuntze = **Cynanchum pachyphyllum** (Decne.) K. Schum.

Vincetoxicum patagonicum (Phil.) Kuntze = **Diplolepis nummulariifolia** (Hook. & Arn.) Liede & Rapini var. **nummulariifolia**

Vincetoxicum robertii S. Moore = **Petalostelma robertii** (S. Moore) Liede & Meve
Referencias: Liede, S. & Meve, U., 2001.

Vincetoxicum tomentosum (E. Fourn.) Kuntze = **Tassadia subulata** (Vell.) Fontella & E.A. Schwarz var. **tomentosa** (E. Fourn.) Fontella
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Vincetoxicum urceolatum (E. Fourn.) Kuntze = **Orthosia urceolata** E. Fourn.
Referencias: Fontella Pereira, J., Valente, M. C., Marquete Ferreira da Silva, N. & Falcão Ichaso, C. L., 2004.

Widgrenia Malme
Número de especies: 1

Widgrenia corymbosa Malme
Sin.: *Melinia corymbosa* (Malme) Fontella & Farinaccio, *Melinia iberae* J.L. Fontana
Referencias: Angely, J. A., 1959; Fontana, J. L., 1990; Fontella Pereira, J., Hatschbach, G. & Wolfart, H. R. W., 1985; Goyder, D. J., 2004b; Krapovickas, A. & Cáceres Moral, S. A., 1990; Meyer, T., 1947a.
Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 5438* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 2424* (R)]; PRY[*Hassler, E. 10742* (B, NY), *Hassler, E. 8127* (SI)].

Zosima violacea Phil. = **Philibertia gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Holm, R. W., 1950; Liede, S., 1996.

AQUIFOLIACEAE

Autor: Giberti, G.

1 género, 12 especies, 1 especie endémica.

Ilex L.
Número de especies: 12, 1 endémica

Ilex affinis Gardner
Referencias: Giberti, G. C., 1994a.
Arbusto o árbol. Nativa. 200–1500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 36196* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 5475* (A, G, LIL, MO, S)].

[Ilex amara (Vell.) Loes. f. humboldtiana (Bonpl. ex Miers) Loes.]
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.
Notas: Nombre dudoso.

Ilex amara (Vell.) Loes. f. *microphylla* Reissek = **Ilex dumosa** Reissek var. **dumosa**
Referencias: Giberti, G. C., 1988.

[Ilex amara (Vell.) Loes. f. ovalifolia (Bonpl. ex Miers) Loes.]
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.
Notas: Nombre dudoso.

[Ilex amara (Vell.) Loes. var. crepitans Loes.]
Referencias: Giberti, G. C., 1988.
Notas: Nombre dudoso.

Ilex argentina Lillo
Sin.: *Ilex tucumanensis* Speg., nom. nud.
Referencias: Giberti, G. C., 1979, 1994b; Juárez de Varela, F. C., 1993a.
Árbol. Nativa. 1000–2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4623* (BA, BAB, LP, SI)].

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes.
Sin.: *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *balansae* Loes., *Ilex brasiliensis* (Spreng.) Loes. f. *typica* Loes., nom. inval., *Ilex caaguazuensis* auct. non Loes., *Rhamnus brasiliensis* Spreng.
Referencias: Giberti, G. C., 1994a, 1998.
Arbusto o árbol. Nativa. 100–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Prat Kricun, S. D. 402* (BACP)]; BRA[*Silva, J. M. 511* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 4532* (A, BM, G, LIL, MO, NY, S)].

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. f. *balansae* Loes. = **Ilex brasiliensis** (Spreng.) Loes.
Referencias: Giberti, G. C., 1987.

Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. f. *typica* Loes., nom. inval. = **Ilex brasiliensis** (Spreng.) Loes.
Referencias: Giberti, G. C., 1987.

[Ilex brasiliensis (Spreng.) Loes. var. parvifolia (Reissek) Loes.]
Referencias: Giberti, G. C., 1987.
Notas: Nombre dudoso.

Ilex brevicuspis Reissek
Sin.: *Ilex caaguazuensis* Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *acrodonta* auct. non (Reissek) Loes.
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1979, 1994a, b; Loesener, L. E. T., 1901.
Árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, GUA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10632* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11440* (HBR)]; PRY[*Rojas, T. 4737* (BAF, SI)].

Ilex caaguazuensis auct. non Loes. = **Ilex brasiliensis** (Spreng.) Loes.
Referencias: Giberti, G. C., 1994a; Lendner, A., 1917.

Ilex caaguazuensis Loes. = **Ilex brevicuspis** Reissek
Referencias: Giberti, G. C., 1979, 1994a, b.

Ilex chamaedryfolia Reissek
Sin.: *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *mugiensis* Loes., *Ilex chamaedryfolia* Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8554* (HBR)].

Ilex chamaedryfolia Reissek var. *mugiensis* Loes. = **Ilex chamaedryfolia** Reissek
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex chamaedryfolia Reissek var. *typica* Loes., nom. inval. = **Ilex chamaedryfolia** Reissek
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex curitibensis Miers = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1994b.

Ilex curitibensis Miers var. *gardneriana* Miers = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex domestica Reissek var. *glabra* Reissek = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1994b.

Ilex domestica Reissek var. *pubescens* Reissek = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **vestita** (Reissek) Loes.
Referencias: Grondona, E. M., 1954; Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex dumosa Reissek f. *angustifolia* Chodat & Hassl. = **Ilex dumosa** Reissek var. **guaranina** Loes.
Referencias: Giberti, G. C., 1988, 1994a, b.

Ilex dumosa Reissek var. **dumosa**
Sin.: *Ilex amara* (Vell.) Loes. f. *microphylla* Reissek, *Ilex dumosa* Reissek var. *gomezii* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *montevidensis* Loes., *Ilex dumosa* Reissek var. *mosenii* Loes.
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1994a; Loesener, L. E. T., 1901.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, MIE, SPE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13321* (F, HBR, R, US)]; PRY[*Woolston, A. L. 651* (BACP, C, SI)]; URY[*Sellow, F. s.n.* (W)].

Ilex dumosa Reissek var. *gomezii* Loes. = **Ilex dumosa** Reissek var. **dumosa**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex dumosa Reissek var. **guaranina** Loes.
Sin.: *Ilex dumosa* Reissek f. *angustifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Giberti, G. C., 1979, 1994a, b; Loesener, L. E. T., 1901.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 11165* (CTES, SI)]; PRY[*Hassler, E. 5037* (A, BM, G, MO, NY)].

Ilex dumosa Reissek var. *montevidensis* Loes. = **Ilex dumosa** Reissek var. **dumosa**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex dumosa Reissek var. *mosenii* Loes. = **Ilex dumosa** Reissek var. **dumosa**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex gigantea Bonpl. = **Ilex theezans** Mart. ex Reissek
Referencias: Giberti, G. C., 1990b; Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex integerrima (Vell.) Reissek
Sin.: *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *ebenacea* (Reissek) Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *schenckiana* Loes., *Ilex integerrima* (Vell.) Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Giberti, G. 268* (BACP)].

Ilex integerrima (Vell.) Reissek var. *ebenacea* (Reissek) Loes. = **Ilex integerrima** (Vell.) Reissek
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex integerrima (Vell.) Reissek var. *schenckiana* Loes. = **Ilex integerrima** (Vell.) Reissek
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex integerrima (Vell.) Reissek var. *typica* Loes., nom. inval. = **Ilex integerrima** (Vell.) Reissek
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex kleinii Edwin = **Ilex taubertiana** Loes.
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex mate A. St.-Hil. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**

Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1994b.

Ilex microdonta Reissek
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1994b; Loesener, L. E. T., 1901.
Árbol. Endémica. 100–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2423* (HBR)].
Notas: probablemente se encuentre en el NE de Argentina (Giberti 1994b: 7).

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *confusa* Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Grondona, E. M., 1954.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *dasyprionata* Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *domestica* (Reissek) Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *glabra* Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *latifolia* Chodat = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Giberti, G. C., 1994a.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *parvifolia* Chodat = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Giberti, G. C., 1994a.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *puberula* Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **vestita** (Reissek) Loes.
Referencias: Grondona, E. M., 1954.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *pubescens* (Reissek) Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **vestita** (Reissek) Loes.
Referencias: Grondona, E. M., 1954.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. f. *sorbilis* (Reissek) Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. *genuina* Loes., nom. inval. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Sin.: *Ilex curitibensis* Miers, *Ilex curitibensis* Miers var. *gardneriana* Miers, *Ilex domestica* Reissek var. *glabra* Reissek, *Ilex mate* A. St.-Hil., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *confusa* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *dasyprionata* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *domestica* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *glabra* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *latifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *parvifolia* Chodat, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *sorbilis* (Reissek) Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *genuina* Loes., nom. inval., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. var. *ulei* Loes., *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *dentata* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *idonea* Miers, *Ilex paraguayensis* A. St.-Hil. var. *usitata* Miers, *Ilex sorbilis* Reissek, *Ilex theaezans* Bonpl. ex Miers
Referencias: Andrews, S., 1985; Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1979, 1994a, b; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, SPE); URY(MAL, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10621* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11503* (HBR, R, US)]; PRY[*Bertoni, M. S. 1112* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 83370* (SI)].

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. *ulei* Loes. = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguariensis A. St.-Hil. var. **vestita** (Reissek) Loes.
Sin.: *Ilex domestica* Reissek var. *pubescens* Reissek, *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *puberula* Loes., *Ilex paraguariensis* A. St.-Hil. f. *pubescens* (Reissek) Loes., *Ilex vestita* Reissek
Referencias: Grondona, E. M., 1954; Loesener, L. E. T., 1901.
Árbol. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Prat Kricun, S. D. 382* (BACP)].

Ilex paraguayensis A. St.-Hil. var. *dentata* Miers = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguayensis A. St.-Hil. var. *idonea* Miers = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex paraguayensis A. St.-Hil. var. *usitata* Miers = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex pedunculares Reissek = **Ilex pseudobuxus** Reissek
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex pseudobuxus Reissek
Sin.: *Ilex pedunculares* Reissek
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5248* (HBR, US)].

[Ilex pseudothea Reissek]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ilex sorbilis Reissek = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1994b.

Ilex taubertiana Loes.
Sin.: *Ilex kleinii* Edwin
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.
Arbusto o arbolito. Nativa. 800–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2521* (HBR)].

Ilex theaezans Bonpl. ex Miers = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **paraguariensis**
Referencias: Giberti, G. C., 1990a, 1994b.

Ilex theezans Mart. ex Reissek
Sin.: *Ilex gigantea* Bonpl., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *acrodonta* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *fertilis* (Reissek) Loes., *Ilex theezans* Mart. ex Reissek var. *typica* Loes., nom. inval.
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967; Giberti, G. C., 1990b, 1994a, b; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Prat Kricun, S. D. 54* (BACP, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11439* (HBR, R, US)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 1146* (BACP)].

Ilex theezans Mart. ex Reissek var. *acrodonta* (Reissek) Loes. = **Ilex theezans** Mart. ex Reissek
Referencias: Edwin, G. & Reitz, P. R., 1967.

Ilex theezans Mart. ex Reissek var. *acrodonta* auct. non (Reissek) Loes. = **Ilex brevicuspis** Reissek
Referencias: Giberti, G. C., 1979.

Ilex theezans Mart. ex Reissek var. *fertilis* (Reissek) Loes. = **Ilex theezans** Mart. ex Reissek
Referencias: Giberti, G. C., 1990b; Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex theezans Mart. ex Reissek var. *typica* Loes., nom. inval. = **Ilex theezans** Mart. ex Reissek
Referencias: Loesener, L. E. T., 1901.

Ilex tucumanensis Speg., nom. nud. = **Ilex argentina** Lillo
Referencias: Giberti, G. C., 1979, 1994b.

Ilex vestita Reissek = **Ilex paraguariensis** A. St.-Hil. var. **vestita** (Reissek) Loes.
Referencias: Grondona, E. M., 1954; Loesener, L. E. T., 1901.

Rhamnus brasiliensis Spreng. = **Ilex brasiliensis** (Spreng.) Loes.
Referencias: Giberti, G. C., 1994a, 1998.

ARALIACEAE

6 géneros, 13 especies, 2 especies endémicas, 1 especie introducida.

Aralia L.

Número de especies: 2

Aralia capitata Jacq. = **Oreopanax capitatus** (Jacq.) Decne. & Planch.
Referencias: Angely, J. A., 1965.

Aralia laetevirens Gay = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

Aralia monogynia Vell. = **Dendropanax monogynum** (Vell.) Seem.
Referencias: Angely, J. A., 1965.

Aralia paniculata Phil. = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

Aralia soratensis Marchal
Sin.: *Pentapanax angelicifolius* Griseb.
Referencias: Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Novara, L. J., 1993k; Pire, S. M., 1989; Ragonese, A. E., 1961.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1081* (SI)].

Aralia valdiviensis Gay = **Raukaua valdiviensis** (Gay) Frodin

Aralia warmingiana (Marchal) J. Wen
Sin.: *Coemansia warmingiana* Marchal, *Coudenbergia warmingiana* (Marchal) Marchal, *Pentapanax warmingianus* (Marchal) Marchal
Referencias: Angely, J. A., 1965; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Pire, S. M., 1989; Ragonese, A. E., 1961; Tortorelli, L., 1956; Wen, J., 1993.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3254* (SI)]; BRA[*Warming, J. E. B. s.n.* (C)]; PRY[*Hassler, E. 10387* (G)].

Cheirodendron laetevirens (Gay) Seem. = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Rossow, R. A., 1988a.

Coemansia warmingiana Marchal = **Aralia warmingiana** (Marchal) J. Wen
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Ragonese, A. E., 1961.

Coudenbergia warmingiana (Marchal) Marchal = **Aralia warmingiana** (Marchal) J. Wen

Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Ragonese, A. E., 1961.

Dendropanax Decne. & Planch.

Número de especies: 3

Dendropanax affinis (Marchal) Gamerro & Zuloaga
Sin.: *Gilibertia affinis* Marchal
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7010* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 31706* (G), *Schinini, A. 6745* (SI)].

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.
Sin.: *Gilibertia cuneata* (DC.) Marchal, *Hedera cuneata* DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Dimitri, M. J., 1974b; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Ragonese, A. E., 1961; Stutz, L. C., 1983; Tressens, S. G., 1981.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1618* (SI)]; BRA[*Ribas, O. S. 3194* (CTES)]; PRY[*Stutz, L. C. 879* (G)].

Dendropanax monogynum (Vell.) Seem.
Sin.: *Aralia monogynia* Vell., *Gilibertia monogyna* (Vell.) Marchal
Referencias: Angely, J. A., 1965.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1062* (NY)].

Didymopanax angustissimus Marchal = **Schefflera angustissima** (Marchal) Frodin

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. = **Schefflera morototoni** (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
Referencias: Frodin, D. G., 1975, 1989; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

Gilibertia affinis Marchal = **Dendropanax affinis** (Marchal) Gamerro & Zuloaga
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

Gilibertia cuneata (DC.) Marchal = **Dendropanax cuneatus** (DC.) Decne. & Planch.
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

Gilibertia monogyna (Vell.) Marchal = **Dendropanax monogynum** (Vell.) Seem.

Hedera L'Hér.

Número de especies: 1 introducida

Hedera cuneata DC. = **Dendropanax cuneatus** (DC.) Decne. & Planch.
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Tressens, S. G., 1981.

Hedera helix L.
Referencias: Fabris, H. A., 1966a; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Novara, L. J., 1993k.
Hierba, subarbusto o enredadera. Perenne. Introducida.
Países: ARG(BAI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27580* (SI)].

Oreopanax Decne. & Planch.

Número de especies: 3

Oreopanax capitatus (Jacq.) Decne. & Planch.
Sin.: *Aralia capitata* Jacq.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Frodin, D. G. & Govaerts, R., 2003.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gentry, A. H. 49811* (MO)].

Oreopanax fulvum Marchal
Referencias: Angely, J. A., 1965; Frodin, D. G. & Govaerts, R., 2003.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 49584* (SI)].

Oreopanax kuntzei Harms
Referencias: Frodin, D. G. & Govaerts, R., 2003; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Legname, P. R., 1978; Pire, S. M., 1989.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4640* (SI)].

Panax morototoni Aubl. = **Schefflera morototoni** (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

Pentapanax angelicifolius Griseb. = **Aralia soratensis** Marchal
Referencias: Wen, J., 1993.

Pentapanax warmingianus (Marchal) Marchal = **Aralia warmingiana** (Marchal) J. Wen

Pseudopanax laetevirens (Gay) Dusén, comb. superfl. = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin
Referencias: Rossow, R. A., 1988a.

Pseudopanax laetevirens (Gay) Franch. = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin

Pseudopanax racemiflorum (Miq.) Ball = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Rossow, R. A., 1988a.

Pseudopanax valdiviensis (Gay) Seem. ex Harms = **Raukaua valdiviensis** (Gay) Frodin

Raukaua Seem.

Número de especies: 2 endémicas

Raukaua laetevirens (Gay) Frodin
Sin.: *Aralia laetevirens* Gay, *Aralia paniculata* Phil., *Cheirodendron laetevirens* (Gay) Seem., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Dusén. comb. superfl., *Pseudopanax laetevirens* (Gay) Franch., *Pseudopanax racemiflorum* (Miq.) Ball, *Sciadophyllum racemiflorum* Miq.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Frodin, D. G. & Govaerts, R., 2003; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26508* (SI)]; CHL[*Gentry, A. H. 53471* (MO)].

Raukaua valdiviensis (Gay) Frodin
Sin.: *Aralia valdiviensis* Gay, *Pseudopanax valdiviensis* (Gay) Seem. ex Harms
Referencias: Frodin, D. G. & Govaerts, R., 2003; San Martín, J., 1995.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 1343* (CONC)].

Schefflera J.R. Forst. & G. Forst.

Número de especies: 2

Schefflera angustissima (Marchal) Frodin
Sin.: *Didymopanax angustissimus* Marchal
Referencias: Angely, J. A., 1965; Frodin, D. G. & Govaerts, R., 2003.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2516* (SI)].

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
Sin.: *Didymopanax morototoni* (Aubl.) Decne. & Planch., *Panax morototoni* Aubl.
Referencias: Dimitri, M. J., 1974b; Frodin, D. G., 1975; Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998; Pire, S. M., 1989; Tortorelli, L., 1956.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7023* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3161* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5592* (G)].

Sciadophyllum racemiflorum Miq. = **Raukaua laetevirens** (Gay) Frodin
Referencias: Gamerro, J. C. & Zuloaga, F. O., 1998.

ARISTOLOCHIACEAE

2 géneros, 36 especies, 17 especies endémicas.

Aristolochia Tourn. ex L.

Número de especies: 35, 17 endémicas

Aristolochia albertiana Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1972.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 4074* (SI)].
Notas: Posiblemente crezca en Santa Catarina y Rio Grande do Sul, Brasil (Ahumada, 1975).

Aristolochia angustifolia Cham.
Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *guaranitica* Ahumada, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *longifolia* Cham., *Aristolochia longifolia* (Cham.) Hauman, *Howardia longifolia* (Cham.) Klotzsch
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970; Bacigalupo, N. M., 1978; Hoehne, F. C., 1942a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CON, COA, PAI); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 260* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 12578* (G, GH, MO, US)]; URY[*Sellow, F. 1016* (P, R)].
Notas: Citada para el sur de Brasil sin mencionar ejemplar de referencia (Hoehne, 1942).

Aristolochia angustifolia Cham. var. *australis* Ahumada = **Aristolochia viperina** (Chodat & Hassl.) Chodat & Hassl.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.

Aristolochia angustifolia Cham. var. *brevifolia* Cham. = **Aristolochia brevifolia** (Cham.) Hauman
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia angustifolia Cham. var. *guaranitica* Ahumada = **Aristolochia angustifolia** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.

Aristolochia angustifolia Cham. var. *longifolia* Cham. = **Aristolochia angustifolia** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.

Aristolochia angustifolia Cham. var. *sessilifollia* Griseb. = **Aristolochia lingua** Malme var. **lingua**
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia angustifolia Cham. var. *viperina* Chodat & Hassl. = **Aristolochia viperina** (Chodat & Hassl.) Chodat & Hassl.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.

Aristolochia antihysterica Mart. ex Duch. = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia appendiculata Vell. = **Aristolochia macroura** Ortega
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

[Aristolochia arcuata Mast.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto. Citada para Paraná, Brasil, sin indicar localidad o material de referencia (Capellari Jr., 2002a).

Aristolochia argentina Griseb.
Sin.: *Aristolochia glaberrima* Hassl., *Aristolochia parviflora* Griseb.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Hauman, L. L., 1923b; Kiesling, R., 1994h; Toursarkissian, M., 1973a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 56* (CORD)]; PRY[*Rojas, T. 9731* (G)].

Aristolochia brasiliensis Mart. & Zucc. = **Aristolochia labiata** Willd.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.

Aristolochia brasiliensis Mart. & Zucc. var. *macrophylla* Duch. = **Aristolochia labiata** Willd.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.

Aristolochia brevifolia (Cham.) Hauman
Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *brevifolia* Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Bacigalupo, N. M., 1978; Hauman, L. L., 1923b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1603 p.p.* (F)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 338* (P)]; URY[*Herter, W. G. F. 1029* (F, G, GH, S, US)].

Aristolochia brevifolia (Cham.) Hauman var. *subcordata* Hauman = **Aristolochia sessilifolia** (Klotzsch) Malme

Aristolochia bridgesii (Klotzsch) Duch.
Sin.: *Aristolochia pearcei* Phil., *Howardia bridgesii* Klotzsch
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ruiz, E., 2001a.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1300 m.
Países: CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. s.n.* (B)].

Aristolochia burelae Herzog
Sin.: *Aristolochia peltibractea* Hoehne
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 28* (LIL)].

Aristolochia burkartii Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 4931* (SI)].

Aristolochia cardenasii Standl. = **Aristolochia prostrata** Duch.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia castellanosii Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1719* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 2330* (G)].

Aristolochia caudata Booth ex Lindl. = **Aristolochia macroura** Ortega
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia caudata D. Parodi, hom. illeg. = **Aristolochia macroura** Ortega
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia ceresensis Kuntze
Sin.: *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *joergensenii* (Hauman) Hoehne, *Aristolochia joergensenii* Hauman
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Toursarkissian, M., 1973a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SDE, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 979* (BA, LIL)]; PRY[*Laes 5228* (US), *Vanni, R. O. 1806* (CTES)].

Aristolochia ceresensis Kuntze var. *acuminata* Hoehne = **Aristolochia lingua** Malme var. **acuminata** (Hoehne) Ahumada

Aristolochia ceresensis Kuntze var. *joergensenii* (Hauman) Hoehne = **Aristolochia ceresensis** Kuntze
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia ceresensis Kuntze var. *lingua* (Malme) Hoehne = **Aristolochia lingua** Malme var. **lingua**
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia chamissonis (Klotzsch) Duch.
Sin.: *Howardia chamissonis* Klotzsch
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10034* (S)].

Aristolochia chilensis Bridges ex Lindl.
Sin.: *Aristolochia setigera* Klotzsch
Referencias: Hoehne, F. C., 1942a; Ruiz, E., 2001a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 966* (SGO), *Taylor, C. M. 10668* (MO)].

Aristolochia ciliata Hook. = **Aristolochia fimbriata** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia ciliosa Benth. = **Aristolochia fimbriata** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia cobra Chodat = **Aristolochia gibertii** Hook.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia curviflora Malme
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ibarrola, T. 2070* (LIL)]; BRA[*Malme, G. O. A. 916* (S)].

Aristolochia elegans Mast.
Sin.: *Aristolochia elegans* Mast. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Aristolochia hassleriana* Chodat, *Aristolochia littoralis* D. Parodi
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Bacigalupo, N. M., 1978; Hoehne, F. C., 1942a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 815* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 1906* (S, US)]; PRY[*Hassler, E. 1629* (S)].

Aristolochia elegans Mast. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl. = **Aristolochia elegans** Mast.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Aristolochia emarginata (Klotzsch) Duch. = **Aristolochia sessilifolia** (Klotzsch) Malme
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Aristolochia esperanzae Kuntze f. *minor* Hoehne, hom. illeg. = **Aristolochia esperanzae** Kuntze var. **esperanzae**
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia esperanzae Kuntze var. **esperanzae**
Sin.: *Aristolochia esperanzae* Kuntze f. *minor* Hoehne, hom. illeg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Toursarkissian, M., 1973a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 33100* (CTES), *Venturi, S. 7905* (GH, LIL, US)]; PRY[*Hassler, E. 2325* (BM, CORD, G, LIL)].

Aristolochia esperanzae Kuntze var. **longilabra** Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Juárez de Varela, F. C., 1992.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 765* (LIL), *Zuloaga, F. O. 7555* (SI)].

Aristolochia esperanzae Kuntze var. **major** Hassl.
Referencias: Hassler, E., 1913b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10506* (G)].

Aristolochia fimbriata Cham.
Sin.: *Aristolochia ciliata* Hook., *Aristolochia ciliosa* Benth., *Howardia fimbriata* (Cham.) Klotzsch
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Bacigalupo, N. M., 1978; Hauman, L. L., 1923b; Hoehne, F. C., 1942a; Toursarkissian, M., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, ITA, PAI); URY(ART, PAY, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6529* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 28213* (LIL)]; PRY[*Sparre, B. B. 37* (LIL)]; URY[*Morrone, O. 5222* (SI), *Rosengurtt, B. 3232b* (LIL)].

Aristolochia gibertii Hook. var. *cobra* (Chodat) Chodat = **Aristolochia gibertii** Hook.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia gibertii Hook.
Sin.: *Aristolochia cobra* Chodat, *Aristolochia gibertii* Hook. var. *cobra* (Chodat) Chodat, *Aristolochia ipemi* D. Parodi, *Aristolochia warmingii* Mast. var. *angustilaba* Hauman
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Hauman, L. L., 1923b; Hoehne, F. C., 1942a; Toursarkissian, M., 1973a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); PRY(APY, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 4980* (CTESN)]; PRY[*Zardini, E. M. 9936* (MO)].

[Aristolochia gibertii Hook. var. immaculata Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Aristolochia glaberrima Hassl. = **Aristolochia argentina** Griseb.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia glaziovii Mast. = **Aristolochia odoratissima** L.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia hassleriana Chodat = **Aristolochia elegans** Mast.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia hassleriana Chodat var. *guaranitica* Chodat = **Aristolochia odoratissima** L.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.

Aristolochia holostylis F. Gónzalez
Sin.: *Aristolochia reniformis* (Duch.) F. González, hom. illeg., *Duchartrella reniformis* (Duch.) F. González, *Holostylis reniformis* Duch., *Holostylis reniformis* Duch. f. *minor* Chodat & Hassl.
Referencias: González, F., 1999; Hoehne, F. C., 1942a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8061* (G, NY, RB, S, UC)].

Aristolochia ipemi D. Parodi = **Aristolochia gibertii** Hook.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia joergensenii Hauman = **Aristolochia ceresensis** Kuntze
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia labiata Willd.
Sin.: *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc., *Aristolochia brasiliensis* Mart. & Zucc. var. *macrophylla* Duch.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2407* (HBR)].

Aristolochia lindneri A. Berger
Referencias: Fernández Casas, F. J. & Molero Briones, J., 1982.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fernández Casas, F. J. 4408* (G)].

Aristolochia lingua Malme var. **acuminata** (Hoehne) Ahumada
Sin.: *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *acuminata* Hoehne
Referencias: Hoehne, F. C., 1942a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 4852* (CTESN)]; PRY[*Rojas, T. 7115* (AS)].

Aristolochia lingua Malme var. **lingua**
Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *sessilifollia* Griseb., *Aristolochia ceresensis* Kuntze var. *lingua* (Malme) Hoehne
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Toursarkissian, M., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 14161* (LIL), *Zuloaga, F. O. 7885* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4112* (FCQ)].

Aristolochia littoralis D. Parodi = **Aristolochia elegans** Mast.
Referencias: Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia longifolia (Cham.) Hauman = **Aristolochia angustifolia** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.

Aristolochia macroura Ortega
Sin.: *Aristolochia appendiculata* Vell., *Aristolochia caudata* Booth ex Lindl., *Aristolochia caudata* D. Parodi, hom. illeg., *Aristolochia trilobata* Lindl., hom. illeg., *Howardia macroura* (Ortega) Klotzsch
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Bacigalupo, N. M., 1978; Capellari Jr., L., 2002a, b; Hauman, L. L., 1923b; Hoehne, F. C., 1942a; Toursarkissian, M., 1973a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(sin localidad); URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 256* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 5786* (US)]; PRY[*Beetle, A. A. 2172* (US)]; URY[*Marchesi, E. 1237* (MVFA)].

Aristolochia melanoglossa Speg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Hauman, L. L., 1923b; Hoehne, F. C., 1942a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 1253* (LIL)].

Aristolochia melastoma Silva Manso ex Duch.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975; Capellari Jr., L., 2002a; Hoehne, F. C., 1942a; Schinini, A. & López, M. G., 1997.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3559* (CTES, MBM, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9511* (G, GH, S)].

[Aristolochia metriosa Rojas Acosta]
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.
Notas: Nombre dudoso.

Aristolochia odoratissima L.
Sin.: *Aristolochia glaziovii* Mast., *Aristolochia hassleriana* Chodat var. *guaranitica* Chodat, *Aristolochia odoratissima* L. f. *brasiliensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. f. *paraguariensis* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *genuina* Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *glaziovii* (Mast.) Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl., *Aristolochia odoratissima* L. var. *hastata* Hassl.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Capellari Jr., L., 2002a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5580* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 5599* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 6020* (BM)].

Aristolochia odoratissima L. f. *brasiliensis* Hassl. = **Aristolochia odoratissima** L.

Aristolochia odoratissima L. f. *paraguariensis* Hassl. = **Aristolochia odoratissima** L.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Aristolochia odoratissima L. var. *genuina* Hassl. = **Aristolochia odoratissima** L.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Aristolochia odoratissima L. var. *glaziovii* (Mast.) Hassl. = **Aristolochia odoratissima** L.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Aristolochia odoratissima L. var. *guaranitica* (Chodat) Hassl. = **Aristolochia odoratissima** L.

Aristolochia odoratissima L. var. *hastata* Hassl. = **Aristolochia odoratissima** L.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Aristolochia oranensis Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pierotti, A. 1174* (LIL)].

Aristolochia paraguariensis D. Parodi = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia parviflora Griseb. = **Aristolochia argentina** Griseb.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia paulistana Hoehne
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975; Capellari Jr., L., 2002a; Hoehne, F. C., 1942a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6291* (HBR, US)].

Aristolochia pearcei Phil. = **Aristolochia bridgesii** (Klotzsch) Duch.
Referencias: Ruiz, E., 2001a.

Aristolochia peltibractea Hoehne = **Aristolochia burelae** Herzog
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia prostrata Duch.
Sin.: *Aristolochia cardenasii* Standl., *Aristolochia trollii* O.C. Schmidt
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 4909* (LIL)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar material de referencia (Hoehne, 1942).

Aristolochia reniformis (Duch.) F. González, hom. illeg. = **Aristolochia holostylis** F. Gónzalez
Referencias: González, F., 1999.

Aristolochia robertii Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ahumada, L. Z. 4939* (SI)].

Aristolochia salpinx Mast. = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.

Aristolochia schreiteri Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3569* (LIL)].

Aristolochia schulzii Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Toursarkissian, M., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1197* (LIL)].

Aristolochia sellowiana (Klotzsch) Duch. = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia sessilifolia (Klotzsch) Malme
Sin.: *Aristolochia brevifolia* (Cham.) Hauman var. *subcordata* Hauman, *Aristolochia emarginata* (Klotzsch) Duch., *Howardia emarginata* Klotzsch, *Howardia sessilifolia* Klotzsch
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Angely, J. A., 1965; Hauman, L. L., 1923b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(ART, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 99* (LIL)]; BRA[*Malme, G. O. A. 805* (S)]; PRY[*Sparre, B. B. 1956* (LIL)]; URY[*Arechavaleta, J. 49* (MVM)].

[Aristolochia sessilifolia (Klotzsch) Malme var. uruguayensis Hauman]
Notas: Nombre dudoso.

Aristolochia setigera Klotzsch = **Aristolochia chilensis** Bridges ex Lindl.
Referencias: Ruiz, E., 2001a.

Aristolochia stuckertii Speg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Bacigalupo, N. M., 1978; Hauman, L. L., 1923b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); URY(ART, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 123* (LIL)]; URY[*Herter, W. G. F. 1179* (F, GH, LIL, NY)].

Aristolochia triangularis Cham.
Sin.: *Aristolochia antihysterica* Mart. ex Duch., *Aristolochia paraguariensis* D. Parodi, *Aristolochia salpinx* Mast., *Aristolochia sellowiana* (Klotzsch) Duch., *Aristolochia triangularis* Cham. var. *salpinx* (Mast.) Hauman, *Howardia sellowiana* Klotzsch, *Howardia triangularis* (Cham.) Klotzsch
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Bacigalupo, N. M., 1978; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Capellari Jr., L., 2002a; Hoehne, F. C., 1942a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CON, COA, PAI); URY(PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1809* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 1342* (G)]; PRY[*Basualdo, I. 1610* (FCQ)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (P)].

Aristolochia triangularis Cham. var. *salpinx* (Mast.) Hauman = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.

[Aristolochia trilobata L.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Aristolochia trilobata Lindl., hom. illeg. = **Aristolochia macroura** Ortega
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Aristolochia trollii O.C. Schmidt = **Aristolochia prostrata** Duch.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Aristolochia viperina (Chodat & Hassl.) Chodat & Hassl.
Sin.: *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *australis* Ahumada, *Aristolochia angustifolia* Cham. var. *viperina* Chodat & Hassl.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970; Bacigalupo, N. M., 1978; Toursarkissian, M., 1973a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR); PRY(CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26214* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2350* (G, MO, NY, P, S, UC)].

Aristolochia warmingii Mast. var. *angustilaba* Hauman = **Aristolochia gibertii** Hook.

Aristolochia wendeliana Hoehne
Hierba voluble. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40214* (MBM)].

Duchartrella reniformis (Duch.) F. González = **Aristolochia holostylis** F. Gónzalez

Euglypha Chodat & Hassl.
Número de especies: 1

Euglypha rojasiana Chodat & Hassl.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967; Hauman, L. L., 1923b; Hoehne, F. C., 1942a; Toursarkissian, M., 1973a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 155* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 2351* (CORD, G, GH, LIL)].

Holostylis reniformis Duch. = **Aristolochia holostylis** F. Gónzalez
Referencias: González, F., 1999.

Holostylis reniformis Duch. f. *minor* Chodat & Hassl. = **Aristolochia holostylis** F. Gónzalez
Referencias: González, F., 1999.

Howardia bridgesii Klotzsch = **Aristolochia bridgesii** (Klotzsch) Duch.
Referencias: Ruiz, E., 2001a.

Howardia chamissonis Klotzsch = **Aristolochia chamissonis** (Klotzsch) Duch.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975.

Howardia emarginata Klotzsch = **Aristolochia sessilifolia** (Klotzsch) Malme
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967.

Howardia fimbriata (Cham.) Klotzsch = **Aristolochia fimbriata** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Howardia longifolia (Cham.) Klotzsch = **Aristolochia angustifolia** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1970.

Howardia macroura (Ortega) Klotzsch = **Aristolochia macroura** Ortega
Referencias: Ahumada, L. Z., 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Howardia sellowiana Klotzsch = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

Howardia sessilifolia Klotzsch = **Aristolochia sessilifolia** (Klotzsch) Malme
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975.

Howardia triangularis (Cham.) Klotzsch = **Aristolochia triangularis** Cham.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1967, 1975; Hoehne, F. C., 1942a.

ASTERACEAE

Coordinador: Freire, S. E.
Autores: Bártoli, A. (Astereae), Baeza, C. M. (Lactuceae), Bayón, N. D. (Vernonieae), Bonifacino, J. M. (Astereae), Delucchi, G. (Anthemideae, Arctoteae, Calenduleae, Cardueae), Dematteis, M. (Vernonieae), Freire, S. E. (Eupatorieae, Inuleae, Mutisieae, Senecioneae), Giuliano, D. (Astereae), Gutiérrez, D. (Helenieae, Liabeae, Mutisieae), Iharlegui, L. (Inuleae), Katinas, L. (Mutisieae), Sáenz, A. A. (Heliantheae), Sancho, G. (Astereae, Mutisieae), Soria, N. (Asteraceae de Paraguay), Stuessy, T. F. (Lactuceae, Mutisieae), Tortosa, R. D. (Astereae), Tremetsberger, K. (Lactuceae) & Urtubey, E. (Lactuceae, Mutisieae)

275 géneros, 2492 especies, 1432 especies endémicas, 134 especies introducidas.

Abrotanella (Gaudich.) Cass.

Número de especies: 7 endémicas

Abrotanella diemii Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1971a; Heads, M. J., 1999; Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–1700 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 956* (LP, SI)].

Abrotanella emarginata (Cass. ex Gaudich.) Cass.
Sin.: *Oligosporus emarginatus* Cass. ex Gaudich.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 1921* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 324* (CONC)].

Abrotanella linearifolia A. Gray
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(X, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. s.n.* (BA)].

Abrotanella purpurea Swenson
Referencias: Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 6863* (CONC)].

Abrotanella submarginata A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barret, M. s.n.* (BAB)].

Abrotanella trichoachaenia Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1600 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 123* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 870064* (CONC)].

Abrotanella trilobata Swenson
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Swenson, U., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–800 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 1976* (K, LP)]; CHL[*Goodall, N. 3838* (BAB)].

Acanthophyllum axillare (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn. = **Nassauvia axillaris** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Acanthophyllum rosulatum Hook. & Arn. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Acanthospermum Schrank

Número de especies: 3, 1 endémica

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze
Sin.: *Acanthospermum brasilum* Schrank, *Acanthospermum hirsutum* DC., *Acanthospermum xanthioides* (Kunth) DC., *Centrospermum xanthioides* Kunth, *Melampodium australe* Loefl., *Orcya adhaerens* Vell.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Mondin, C. A., 2004a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1622* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16646* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 8912* (CTES, LP)]; URY[*Alonso Paz, E. 3714* (MVFQ)].

Acanthospermum brasilum Schrank = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Acanthospermum consobrinum S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1921; Stuessy, T. F., 1970.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 874a* (BM, GH)].

Acanthospermum hirsutum DC. = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Acanthospermum hispidum DC.
Sin.: *Acanthospermum humile* DC. var. *hispidum* (DC.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 977* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 3127* (PACA)]; PRY[*Mereles, F. 5214* (FCQ, MO, SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Ariza Espinar, 2000b).

Acanthospermum humile DC. var. *hispidum* (DC.) Kuntze = **Acanthospermum hispidum** DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Acanthospermum xanthioides (Kunth) DC. = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Acanthostyles buniifolius (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**

Acanthostyles saucechicoënse (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**

Acanthoxanthium spinosum (L.) E. Fourn. = **Xanthium spinosum** L. var. **spinosum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Achillea L.
Número de especies: 2 introducidas

Achillea lanulosa Nutt. = **Achillea millefolium** L.
Referencias: Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Achillea millefolium L.
Sin.: *Achillea lanulosa* Nutt., *Achillea sudetica* Opiz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1939a, 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, TDF, TUC); BRA(PAR, SCA); CHL(IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(CAS, FLA, MON, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 851* (LP)]; BRA[*Hertel, L. 21* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3163* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 817* (MVFA)].

Achillea ptarmica L.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (LP)].

Achillea sudetica Opiz = **Achillea millefolium** L.
Referencias: Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

[Achillea tomentosa L.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Achyrocline (Less.) DC.
Número de especies: 16, 5 endémicas

Achyrocline alata (Kunth) DC.
Sin.: *Achyrocline alata* (Kunth) DC. var. *vautheriana* (DC.) Baker, *Achyrocline argentina* O. Hoffm., *Achyrocline flavescens* Griseb., *Achyrocline pterocaula* DC., *Achyrocline vautheriana* DC., *Gnaphalium alatum* Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Freire, S. E., 1995, 1998; Giangualani, R. A., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA); URY(ART, CAS, CLA, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1225* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 28613* (LP)]; PRY[*Woolston, A. L. 685* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2177* (LP)].

Achyrocline alata (Kunth) DC. var. *vautheriana* (DC.) Baker = **Achyrocline alata** (Kunth) DC.
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Achyrocline anabelae Deble
Referencias: Deble, L. P., 2005a.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. s.n.* (ICN, MBM, PACA, SI)].

Achyrocline argentina O. Hoffm. = **Achyrocline alata** (Kunth) DC.
Referencias: Giangualani, R. A., 1976.

Achyrocline brittoniana Deble & Marchiori
Sin.: *Achyrocline ramosissima* (Sch. Bip.) Britton ex Rusby, nom. illeg., *Gnaphalium ramosissimum* Sch. Bip., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005a; Freire, S. E., 1995; Giangualani, R. A., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15211* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3329* (LP)].

Achyrocline citrina Griseb. = **Achyrocline flaccida** (Weinm.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrocline crassiuscula (Malme) Deble & Marchiori
Sin.: *Achyrocline satureioides* (Lam.) DC. var. *crassiuscula* Malme
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005a; Malme, G. O. A., 1931.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Regnell, A. F. 1550* (LP)].

Achyrocline flaccida (Weinm.) DC.
Sin.: *Achyrocline citrina* Griseb., *Gnaphalium flaccidum* Weinm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Freire, S. E., 1998; Giangualani, R. A., 1976; Marchesi, E., com. pers.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, COA, GUA, PAI); URY(ART, CAS, MAL, RNO, RIV, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16903* (LP)]; BRA[*Plaumann, F. 574* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 3900* (G)]; URY[*Lombardo, A. 18576* (MVFA)].

Achyrocline flavescens Griseb. = **Achyrocline alata** (Kunth) DC.
Referencias: Giangualani, R. A., 1976.

Achyrocline gardnerii (Baker) Deble & Marchiori
Sin.: *Achyrocline satureioides* Gardner, hom. illeg., *Stenocline gardneri* Baker, *Stenophalium gardneri* (Baker) D.J.N. Hind
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4838* (LP)].

Achyrocline gertiana Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 32634* (SI)].

Achyrocline glandulosa S.F. Blake
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005b.
Subarbusto. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(CHA, SAL); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 19052* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 345* (HBR)].

Achyrocline hyperchlora S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Giangualani, R. A., 1976.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 1439* (LP)].

Achyrocline luisiana Deble
Referencias: Deble, L. P., 2005b.
Subarbusto. Endémica. 200–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Fernandes, I. 637* (ICN)].

Achyrocline macella Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Subarbusto. Nativa. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tiepolo, G. 698* (MBM)].

Achyrocline marchiorii Deble
Referencias: Deble, L. P., 2005a.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. s.n.* (ICN, MBM, PACA, SI)].

[Achyrocline mathiolaeifolia DC.]
Notas: Nombre dudoso.

Achyrocline polycephala Rusby = **Achyrocline tomentosa** Rusby
Referencias: Giangualani, R. A., 1976.

Achyrocline pterocaula DC. = **Achyrocline alata** (Kunth) DC.
Referencias: Giangualani, R. A., 1976.

Achyrocline ramosissima (Sch. Bip.) Britton ex Rusby, nom. illeg. = **Achyrocline brittoniana** Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005a.

Achyrocline rupestris Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Subarbusto. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12134* (LP)].

Achyrocline satureioides Gardner, hom. illeg. = **Achyrocline gardnerii** (Baker) Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005b.

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.
Sin.: *Achyrocline vargasiana* DC., *Gnaphalium satureioides* Lam.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2002; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Freire, S. E., 1998; Giangualani, R. A., 1976; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, COA, GUA, PAI); URY(CAS, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4263* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 46144* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 3945* (LP)]; URY[*Stuessy, T. F. 12809* (LP)].

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. var. *crassiuscula* Malme = **Achyrocline crassiuscula** (Malme) Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005a.

Achyrocline tomentosa Rusby
Sin.: *Achyrocline polycephala* Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Giangualani, R. A., 1976; Marticorena, C., com. pers.; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 200–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SJU, TUC); BRA(RGS); CHL(I); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 2265* (LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 22881* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 158* (CONC)]; PRY[*Soria, N. 6196* (FCQ, MO)].

Achyrocline vargasiana DC. = **Achyrocline satureioides** (Lam.) DC.
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Achyrocline vautheriana DC. = **Achyrocline alata** (Kunth) DC.
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Achyrocline venosa Rusby
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Freire, S. E., 1998.
Subarbusto. Nativa. 100–3000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, TUC); BRA(SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25215* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 10445* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4155* (LP)].

Achyropappus maritimus Poepp. ex DC., nom. nud. = **Bahia ambrosioides** Lag.
Referencias: Ellison, W. L., 1964.

Achyropappus neo-mexicanus (A. Gray) Rydb. = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Achyropappus schkuhrioides D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Achyrophorus acaulis J. Remy = **Hypochaeris acaulis** (J. Remy) Britton
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus albiflorus Sch. Bip. = **Hypochaeris sessiliflora** Kunth

Achyrophorus andinus DC. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus apargioides (Hook. & Arn.) DC. = **Hypochaeris apargioides** Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].

Achyrophorus araucanus Phil. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus arenarius (Gaudich.) DC. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus barbatus Sch. Bip. = **Hypochaeris barbata** (Sch. Bip.) Reiche

Achyrophorus bipontinae Sch. Bip. = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Achyrophorus brasiliensis (Less.) Sch. Bip. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus brasiliensis Gardner, nom. illeg. = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Achyrophorus chilensis Sch. Bip. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus chillensis (Kunth) Sch. Bip. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus chondrilloides A. Gray = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus chrysanthus DC. = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Achyrophorus clarionoides J. Remy = **Hypochaeris clarionoides** (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Achyrophorus coronopifolius Sch. Bip. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus coronopifolius Sch. Bip. var. *integrifolius* Sch. Bip. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus deserticola Phil. = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus elatus Wedd. = **Hypochaeris elata** (Wedd.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus eriolaenus Sch. Bip. = **Hypochaeris eriolaena** (Sch. Bip.) Reiche

Achyrophorus foliosus Phil. = **Hypochaeris foliosa** (Phil.) Reiche

Achyrophorus gardneri Sch. Bip. = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Achyrophorus glaucus Phil. = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus graminifolius Phil., nom. nud. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **linearifolia** (DC.) Bortiri
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus grandidentatus Phil. = **Hypochaeris grandidentata** (Phil.) Reiche

Achyrophorus humboldtii Sch. Bip. = **Hypochaeris sessiliflora** Kunth

Achyrophorus humilis Phil. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus incanus (Hook. & Arn.) Sch. Bip. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus jusseui Sch. Bip. = **Hypochaeris jussieui** (Sch. Bip.) Reiche

Achyrophorus lechleri Sch. Bip., nom. inval. = **Hypochaeris tenerifolia** (J. Remy) Dusén
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus lessingii Sch. Bip. = **Hypochaeris lessingii** (Sch. Bip.) Reiche

Achyrophorus leucanthus Speg. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus meyenianus (Walp.) Walp. = **Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus meyenianus (Walp.) Walp. var. *ciliatus* Wedd. = **Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Griseb.

Achyrophorus microcephalus Sch. Bip. = **Hypochaeris microcephala** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Achyrophorus microphyllus J. Remy = **Hypochaeris clarionoides** (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Achyrophorus montanus Phil. = **Hypochaeris montana** (Phil.) Reiche var. **montana**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus odoratus (Poepp. & Endl.) Walp. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus palustris Phil. = **Hypochaeris palustris** (Phil.) De Wild.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus petiolaris (Hook. & Arn.) DC. = **Hypochaeris petiolaris** (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Achyrophorus psycrophilus Wedd. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus quitensis Sch. Bip., nom. illeg. = **Hypochaeris sessiliflora** Kunth

Achyrophorus sagittatus Phil. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus scorzonerae DC. = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **scorzonerae**

Achyrophorus scorzonerae DC. var. *glabrata* DC. = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche

Achyrophorus scorzonerae DC. var. *ramosa* DC. = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **ramosa** (DC.) Reiche

Achyrophorus selloi Sch. Bip. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.

Achyrophorus sessiliflorus (Kunth) DC. = **Hypochaeris sessiliflora** Kunth

Achyrophorus setosus Wedd. = **Hypochaeris echegarayi** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus spathulatus J. Remy = **Hypochaeris spathulata** (J. Remy) Reiche var. **spathulata**

Achyrophorus spathulatus J. Remy var. *chiloensis* J. Remy = **Hypochaeris spathulata** (J. Remy) Reiche var. **chiloensis** (J. Remy) Reiche

Achyrophorus spinuliger Phil. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus stenocephalus A. Gray ex Wedd., nom. inval. = **Hypochaeris taraxacoides** (Walp.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus taraxacoides Walp. = **Hypochaeris taraxacoides** (Walp.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Achyrophorus tenerifolius J. Remy = **Hypochaeris tenerifolia** (J. Remy) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus tenuifolius (Hook. & Arn.) DC. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus tenuifolius (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC. = **Hypochaeris gayana** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Achyrophorus tenuifolius (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **linearifolia** (DC.) Bortiri
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus tenuifolius (Hook. & Arn.) DC. var. *neoeanus* DC. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus trichocephalus Sch. Bip. = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Achyrophorus variegatus (Lam.) Sch. Bip. = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Achyrophorus volckmannii Phil. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Achyrophorus webbii Sch. Bip., nom. nud. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.

Acilepidopsis echitifolia (Mart. ex DC.) H. Rob. = **Vernonia echitifolia** Mart. ex DC.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Acmella Rich. ex Pers.

Número de especies: 12, 2 endémicas

Acmella alpestris (Griseb.) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes alpestris* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Jansen, R. K., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR); PRY(PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cerana, M. M. 383* (CORD)]; BRA[*Silva, J. M. 2136* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 15469* (MO, PY)].

Acmella bellidioides (Sm.) R.K. Jansen
Sin.: *Ceratocephalus arnicoides* (DC.) Kuntze, *Rudbeckia bellidioides* Sm., *Spilanthes arnicoides* DC., *Spilanthes arnicoides* DC. f. *setosa* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *intermedia* Chodat, *Spilanthes bellidioides* (Sm.) Cabrera, *Spilanthes blepharicarpa* DC., *Spilanthes doronicoides* DC., *Spilanthes grandis* DC., *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *intermedia* (Chodat) A.H. Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *micra* A.H. Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *setosa* (Chodat) A.H. Moore, *Spilanthes longifolia* DC., *Spilanthes sphaerocephala* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Jansen, R. K., 1985; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PHA, SPE); URY(MON, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1077* (SI)]; BRA[*Bresolin, A. 117* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 4475* (BM, G, GH), *Schinini, A. 30057* (CTES)]; URY[*Osten, C. 5630* (SI)].

Acmella brachyglossa Cass.
Sin.: *Ceratocephalus caespitosus* (DC.) Kuntze, *Spilanthes arrayana* Gardner, *Spilanthes caespitosa* DC., *Spilanthes eggersii* Hieron., *Spilanthes limonica* A.H. Moore, *Spilanthes ocymifolia* (Lam.) A.H. Moore f. *radiifera* A.H. Moore
Referencias: Jansen, R. K., 1985; Magenta, M. A. G., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 100–3000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. s.n.* (IAC)]; PRY[*Soria, N. 6982* (FCQ, MO)].

Acmella ciliata (Kunth) Cass.
Sin.: *Ceratocephalus ciliatus* (Kunth) Kuntze, *Ceratocephalus fimbriatus* (Kunth) Kuntze, *Ceratocephalus poeppigii* (DC.) Kuntze, *Spilanthes ciliata* Kunth, *Spilanthes fimbriata* Kunth, *Spilanthes melampodioides* Gardner, *Spilanthes poeppigii* DC., *Spilanthes popayanensis* Hieron.

Referencias: Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Jansen, R. K., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15831* (LP)].

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes affinis* Hook. & Arn., *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron. f. *ciliatifolia* A.H. Moore, *Spilanthes eurycarena* A.H. Moore, *Spilanthes micralloeophylla* A.H. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Jansen, R. K., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, RNE, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 211* (CTES, SI)].

Acmella decumbens (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Sin.: *Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze, *Ceratocephalus decumbens* (Sm.) Kuntze var. *macropoda* (DC.) Kuntze, *Rudbeckia decumbens* Sm., *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron. var. *stolonifera* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *macropoda* (DC.) Baker, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore var. *macropoda* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes helenioides* Hook. & Arn., *Spilanthes macropoda* DC., *Spilanthes stenophylla* Hook. & Arn., *Spilanthes stolonifera* DC.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY); URY(CAS, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5799* (CTES)]; BRA[*Malme, G. O. A. 320* (BM, UPS)]; PRY[*Vanni, R. O. 1990* (CTES)]; URY[*Alonso Paz, E. 3741* (MVFQ)].

Acmella glaberrima (Hassl.) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes glaberrima* Hassl.
Referencias: Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Jansen, R. K., 1985; Matthei, O. R. & Marticorena, C., 1990.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SDE, SFE); CHL(VII); PRY(AMA, CAA, CEN, CON, MIE, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6828* (CTES)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2381* (CONC)]; PRY[*Woolston, A. L. 736* (LP, SI)].

Acmella grisea (Chodat) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. f. *grisea* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *grisea* (Chodat) Chodat, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore
Referencias: Jansen, R. K., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3164* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45472* (NY)]; PRY[*Montes, J. E. 12584* (LP)].

Acmella hirta Lag. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Torres, A. M., 1968.

Acmella leptophylla (DC.) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes arnicoides* DC. f. *minor* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. f. *nervosa* Chodat, *Spilanthes arnicoides* DC. var. *leptophylla* (DC.) Baker, *Spilanthes decumbens* (Sm.) A.H. Moore var. *leptophylla* (DC.) A.H. Moore, *Spilanthes grisea* (Chodat) A.H. Moore var. *chodatana* A.H. Moore, *Spilanthes leptophylla* DC.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jansen, R. K., 1985; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAA, GUA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 529* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 34204* (CTES, SI)]; PRY[*Degen, R. 3242* (FCQ)].

Acmella mutisii (Kunth) Cass. = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Acmella occidentalis (Willd.) Rich. = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen
Sin.: *Acmella mutisii* (Kunth) Cass., *Acmella occidentalis* (Willd.) Rich., *Anthemis occidentalis* Willd., *Anthemis oppositifolia* Lam., *Ceratocephalus americanus* (L. f.) Kuntze, *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron., *Spilanthes mutisii* Kunth, *Spilanthes oppositifolia* (Lam.) D'Arcy
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Jansen, R. K., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4570* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 5713* (CTES, FCQ, MO)].

Acmella psilocarpa R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3977* (LP)]; BRA[*Mondin, C. A. 2500* (HASU)].

Acmella pusilla (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes americana* (L. f.) Hieron. f. *longiinternodiata* A.H. Moore, *Spilanthes pusilla* Hook. & Arn., *Spilanthes stolonifera* DC. var. *pusilla* (Hook. & Arn.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Jansen, R. K., 1985; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, PAI, PHA); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1893* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. s.n.* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 4068* (CTES, LP)]; URY[*Chebataroff, J. 1108* (LP)].

Acmella serratifolia R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA); URY(COL, RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Porta, R. E. 36* (SI), *Zuloaga, F. O. 692* (SI)]; BRA[*Oliveira, P. I. 340* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 40535* (AS, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 1769* (G)].

Acrisione cymosa (J. Remy) B. Nord. = **Senecio cymosus** J. Remy

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. *denticulata* = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **yegua**
Referencias: Nordenstam, B., 1985.

Acrisione denticulata (Hook. & Arn.) B. Nord. var. *pilota* (Phil.) B. Nord. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **pilotus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Nordenstam, B., 1985.

Acroptilon Cass.

Número de especies: 1 introducida

Acroptilon picris (Pall. ex Willd.) DC. = **Acroptilon repens** (L.) DC.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Acroptilon repens (L.) DC.
Sin.: *Acroptilon picris* (Pall. ex Willd.) DC., *Centaurea picris* Pall. ex Willd., *Centaurea repens* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Covas, G., 1965a; Dostál, J., 1976a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, LPA, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14872* (LP)].

Actinea alternifolia Spreng., nom. superfl. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea anthemoides (Juss.) Kuntze = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea conmutata Spreng. = **Calea pinnatifida** (R. Br.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a.

Actinea doniana (Hook. & Arn.) Kuntze = **Helenium donianum** (Hook. & Arn.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea haenkeana (DC.) Kuntze = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea heterophylla Juss. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea heterophylla Juss. f. *bicolor* Kuntze, nom. superfl. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea heterophylla Juss. f. *concolor* Kuntze = **Helenium argentinum** Ariza
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea heterophylla Juss. var. *dentata* Kuntze, nom. superfl. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea heterophylla Juss. var. *latifolia* Kuntze = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **megapotamica**
Referencias: Bierner, M. W., 1987.

Actinea heterophylla Juss. var. *linearifolia* Kuntze = **Helenium argentinum** Ariza
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea insularis (Phil.) Kuntze = **Helenium insulare** (Phil.) Cabrera
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Actinea radiata (Less.) Kuntze = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993a; Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinea tweediei (Hook. & Arn.) Kuntze = **Hymenoxys tweediei** Hook. & Arn.
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinella anthemidoides (Juss.) Malme, comb. superfl. = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinella anthemoides (Cass.) Herter, nom. illeg. = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Parker, K. F., 1962.

Actinella anthemoides (Juss.) A. Gray = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinella heterophylla (Juss.) Pers., comb. superfl. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Actinella tweediei (Hook. & Arn.) Malme = **Hymenoxys tweediei** Hook. & Arn.
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Parker, K. F., 1962.

Actinoseris (Endl.) Cabrera

Número de especies: 1

Actinoseris corymbosa (Less.) Cabrera = **Ianthopappus corymbosus** (Less.) Roque & D.J.N. Hind
Referencias: Roque, N. & Hind, D. J. N., 2001.

Actinoseris radiata (Vell.) Cabrera
Sin.: *Ingenhuzia radiata* Vell., *Onoseris brevifolia* D. Don, *Richterago radiata* (Vell.) Roque, *Seris denticulata* DC., *Trichocline radiata* (Vell.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b; Freire, S. E., Katinas, L. & Sancho, G., 2002; Roque, N. & Pirani, J. R., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 690* (LP)].

Adenocaulon Hook.

Número de especies: 1 endémica

Adenocaulon chilense Less.
Sin.: *Adenocaulon lechleri* Sch. Bip.
Referencias: Bittmann, M., 1990; Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 2000; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11234* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 5825* (LP)].

Adenocaulon lechleri Sch. Bip. = **Adenocaulon chilense** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Adenospermum tuberculatum Hook. & Arn. = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner

Adenostemma J.R. Forst. & G. Forst.

Número de especies: 2

Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass.
Sin.: *Adenostemma brasilianum* (Pers.) Cass. var. *triangulare* (DC.) Malme, *Adenostemma triangularis* DC., *Adenostemma viscosum* auct. non R.E. Fr., *Adenostemma viscosum* J.R. Forst. var. *brasilianum* (Pers.) Benth., *Adenostemma viscosum* J.R. Forst. var. *triangulare* (DC.) Benth., *Verbesina brasiliana* Pers.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978, 1991[1989], 1996d; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Malme, G. O. A., 1931, 1933b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, GUA, PAI); URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14277* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 974* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 10259* (G)]; URY[*Chebataroff, J. 1269* (LP)].

Adenostemma brasilianum (Pers.) Cass. var. *triangulare* (DC.) Malme = **Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.

Adenostemma swartzii Cass. = **Adenostemma verbesina** (L.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Adenostemma triangularis DC. = **Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Adenostemma verbesina (L.) Kuntze
Sin.: *Adenostemma swartzii* Cass., *Cotula verbesina* L., *Lavenia decumbens* Sw.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978, 1991[1989], 1996d; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1383* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14777* (LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6284* (SI)].

Adenostemma viscosum auct. non R.E. Fr. = **Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Adenostemma viscosum J.R. Forst. var. *brasilianum* (Pers.) Benth. = **Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Adenostemma viscosum J.R. Forst. var. *triangulare* (DC.) Benth. = **Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Adenotrichia amplexicaulis Lindl. = **Senecio adenotrichius** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Adventina ciliata Raf. = **Galinsoga quadriradiata** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Adventina parviflora Raf. = **Galinsoga parviflora** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Aequatorium fabrisii (Cabrera) C. Jeffrey = **Gynoxys fabrisii** Cabrera

Ageratina azangaroense (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium azangaroënse** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Ageratina fastigiata (Kunth) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium fastigiatum** Kunth

Ageratina glechnophylla (Less.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium glechonophyllum** Less.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001.

Ageratina lorentzii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lorentzii** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Ageratina remyana (Phil.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium glechonophyllum** Less.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.

Ageratina tenuis (R.E. Fr.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tenue** R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Ageratum L.

Número de especies: 1

Ageratum conyzoides L.
Sin.: *Ageratum hirsutum* Poir., *Ageratum hirtum* Lam., *Carelia conyzoides* (L.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978, 1991[1989], 1996e; Marchesi, E., com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4125* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 520* (HBR, LP)]; PRY[*Chodat, R. H. 381* (G), *Zardini, E. M. 14071* (FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 15208* (MVFA)].
Notas: Citada para Chile por sin mencionar material de referencia (C. Marticorena & Quesada, 1985).

Ageratum hirsutum Poir. = **Ageratum conyzoides** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Ageratum hirtum Lam. = **Ageratum conyzoides** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Aglaodendron cheiranthifolium J. Remy = **Plazia cheiranthifolia** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Agoseris Raf.

Número de especies: 2 endémicas

Agoseris australis (Phil.) Macloskie = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Agoseris chilensis (Less.) Greene
Sin.: *Macrorhynchus chilensis* Less.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 7470* (LP)].

Agoseris coronopifolia (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Sin.: *Agoseris australis* (Phil.) Macloskie, *Agoseris poeppigii* (DC.) Greene, *Agoseris pumila* (Gaudich.) Macloskie, *Macrorhynchus australis* Phil., *Macrorhynchus elatus* Phil., *Macrorhynchus poeppigii* DC., *Macrorhynchus pumilum* (Gaudich.) DC., *Taraxacum coronopifolium* d'Urv., *Taraxacum pumilum* Gaudich., *Troximon coronopifolius* (d'Urv.) Cabrera, *Troximon poepigii* (DC.) De Wild., *Troximon pumilum* (Gaudich.) De Wild.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Chichi, A. 901* (LP)]; CHL[*Moore, D. M. 2193* (LP)].

Agoseris poeppigii (DC.) Greene = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1971a.

Agoseris pumila (Gaudich.) Macloskie = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Aldunantea chilensis J. Remy = **Chaetanthera pusilla** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Aldunantea gnaphalioides J. Remy = **Chaetanthera gnaphalioides** (J. Remy) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Aldunantea lycopodioides J. Remy = **Chaetanthera lycopodioides** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Alomia spilanthoides Hook. & Arn. = **Gymnocoronis spilanthoides** (Hook. & Arn.) DC. var. **spilanthoides**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996a.

Alomia tenuifolia (Phil.) Benth. & Hook. f. ex Reiche = **Lycapsus tenuifolius** Phil.
Referencias: Robinson, B. L., 1913.

Amblyopappus Hook. & Arn.

Número de especies: 1

Amblyopappus mendocinus Phil. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Amblyopappus neo-mexicanus (A. Gray) A. Gray = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Amblyopappus pauciflorus Phil. = **Amblyopappus pusillus** Hook. & Arn. var. **pauciflorus** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Amblyopappus pusillus Hook. & Arn. var. **pauciflorus** (Phil.) Reiche
Sin.: *Amblyopappus pauciflorus* Phil.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Amblyopappus pusillus Hook. & Arn. var. **pusillus**
Sin.: *Aroma tenuifolia* Nutt., *Infantea chilensis* J. Remy
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Anual. Nativa. 0–200 m.
Países: CHL(II, III, IV, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12673* (LP)].

Ambrosia L.

Número de especies: 8, 1 endémica, 2 introducidas

Ambrosia arborescens Mill.
Sin.: *Franseria conwayi* Rusby
Arbusto. Nativa. 2000–3500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rosas, S. 1412* (CONC)].

Ambrosia artemisiifolia L. = **Ambrosia elatior** L.
Referencias: Giscafré, L. & Ragonese, A. E., 1942.

Ambrosia artemisiifolia L. var. *elatior* (L.) Descourt. = **Ambrosia elatior** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. ex Meyen
Sin.: *Franseria fruticosa* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Nativa. 1700–4600 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4773* (CONC)].

Ambrosia chamissonis (Less.) Greene
Sin.: *Franseria bipinnatifida* Nutt. var. *insularis* Reiche, *Franseria chamissonis* Less.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 296* (CONC)].

Ambrosia chilensis Hook. & Arn. = **Ambrosia elatior** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Payne, N. W., 1964.

Ambrosia elatior L.
Sin.: *Ambrosia artemisiifolia* L., *Ambrosia artemisiifolia* L. var. *elatior* (L.) Descourt., *Ambrosia chilensis* Hook. & Arn., *Ambrosia peruviana* Cabrera, hom. illeg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Payne, N. W., 1964.
Hierba. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII); PRY(CAA, COA, PHA); URY(ART, CAS, FLA, MON, PAY, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1603* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9731* (LP)]; PRY[*Krapovickas, A. 19713* (CTES, LP)]; URY[*Berro, M. B. 1559* (MVFA)].

Ambrosia paniculata Michx. var. *peruviana* (Willd.) O.E. Schulz = **Ambrosia peruviana** Willd.

Ambrosia peruviana Cabrera, hom. illeg. = **Ambrosia elatior** L.
Referencias: Giscafré, L. & Ragonese, A. E., 1942.

Ambrosia peruviana Willd.
Sin.: *Ambrosia paniculata* Michx. var. *peruviana* (Willd.) O.E. Schulz
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 413* (CONC)].

Ambrosia polystachya DC.
Referencias: Mondin, C. A., 2004a.
Arbusto. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 2859* (HUCS)].

Ambrosia scabra Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scala, A. C. 455* (LP)]; BRA[*Mattos, J. R. 5764* (PACA)].

Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Cabrera, 1974a).

Ambrosia tenuifolia Spreng.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, PHA); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAL, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 732* (CORD)]; BRA[*Mondin, C. A. 2561* (PACA)]; PRY[*Mereles, F. 5263* (CTES, FCQ)]; URY[*Alonso Paz, E. 3600* (MVFQ)].

Ameghinoa Speg.
Número de especies: 1 endémica

Ameghinoa patagonica Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Spegazzini, C. L., 1897.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, P. 681* (LP)].

Amellus diffusus G. Forst. = **Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Foster, G., 1787.

Amellus pedunculatus Ortega ex Willd. = **Tridax procumbens** L.
Referencias: Powell, A. M., 1965.

Ampherephis aristata Kunth = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Ampherephis intermedia Link = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Ampherephis mutica Kunth = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Ampherephis pilosa Cass. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Ampherephis pulchella Cass. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Amphibecis violacea Schrank = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Anactinia hookeri J. Remy = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Anacyclus australis Sieber ex Spreng. = **Cotula australis** (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978.

Anaphalis DC.
Número de especies: 1 endémica

Anaphalis chilensis Reiche
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–800 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barrientos, R. 2042* (CONC)].

Andromachia alternifolia Kuntze = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Angelianthus humilis (Cabrera) H. Rob. & Brettell = **Microliabum humile** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Angelphytum G.M. Barroso
Número de especies: 13, 5 endémicas

Angelphytum apense (Chodat) Pruski, comb. superfl. = **Angelphytum apensis** (Chodat) A.A. Sáenz

Angelphytum apensis (Chodat) A.A. Sáenz
Sin.: *Angelphytum apense* (Chodat) Pruski, comb. superfl., *Aspilia apensis* Chodat, *Wedelia apensis* (Chodat) B.L. Turner, *Zexmenia apensis* (Chodat) Hassl.
Referencias: Sáenz, A. A., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 27596* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 7096* (BM)].

Angelphytum arnottii (Baker) H. Rob.
Sin.: *Verbesina arnottii* Baker, *Zexmenia arnottii* (Baker) Hassl.
Referencias: Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Mondin, C. A., 2004a; Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY (RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1593* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2983* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 30053* (CTES)]; URY [*Berro, M. B. 2499* (MVFA)].

Angelphytum aspilioides (Griseb.) H. Rob.
Sin.: *Verbesina aspilioides* Griseb., *Zexmenia aspilioides* (Griseb.) Hassl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Endémica. 200–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SLU, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 12187* (CORD)]; BRA[*Ribas, O. S. 1645* (MBM)]; PRY[*Krapovickas, A. 44285* (CTES)].

Angelphytum grisebachii (Baker) H. Rob.
Sin.: *Verbesina grisebachii* Baker, *Zexmenia grisebachii* (Baker) Hassl.
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Robinson, H. E., 1984a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, PAI, PHA); URY (ART, PAY, RIV, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 963* (SI)]; BRA[*Ribas, O. S. 1869* (MBM)]; PRY[*Krapovickas, A. 44345* (CTES)]; [*Marchesi, E. 14279* (MVFA)].

Angelphytum hatschbachii H. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 8245* (BAB)].

Angelphytum hieronymi (Hassl.) H. Rob.
Sin.: *Zexmenia hieronymi* Hassl.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1384* (B, BAF)].

Angelphytum indutum (Chodat) H. Rob.
Sin.: *Aspilia induta* Chodat, *Zexmenia induta* (Chodat) Hassl.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: PRY(CAU, CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 27026* (FCQ, MO)].

Angelphytum myrtifolium (Chodat) H. Rob.
Sin.: *Verbesina myrtifolia* Chodat, *Zexmenia myrtifolia* (Chodat) Hassl.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ribas, O. S. 1269* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 50618* (AS, MO)].

Angelphytum oppositifolium (A.A. Sáenz) H. Rob.
Sin.: *Zexmenia oppositifolia* A.A. Sáenz
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CAU); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 23360* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13009* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9211* (BM)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1105* (MVFA)].

Angelphytum paraguariense (Chodat) H. Rob.
Sin.: *Verbesina paraguariensis* Chodat, *Zexmenia paraguariensis* (Chodat) S.F. Blake
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Endémica. 0 500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7017* (G)].

Angelphytum pseudosilphioides (Hassl.) H. Rob.
Sin.: *Zexmenia pseudosilphioides* Hassl.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: PRY(CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 23972* (AS, MO)].

Angelphytum reitzii H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26491* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 33442* (CTES, SI)].

Angelphytum tenuifolium (Hassl.) H. Rob.
Sin.: *Zexmenia tenuifolia* Hassl.
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Robinson, H. E., 1984a.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(RGS); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22197* (LP)]; BRA[*Mondin, C. A. 2940* (PACA)]; PRY[*Zardini, E. M. 46024* (AS, MO)].

Antennaria Gaertn.

Número de especies: 2 endémicas

Antennaria chilensis J. Remy var. **chilensis**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bayer, R. J. & Stebbins, G. L., 1982; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23128* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 902* (CONC)].

Antennaria chilensis J. Remy var. **magellanica** (Sch. Bip.) Reiche
Sin.: *Antennaria magellanica* Sch. Bip., *Gnaphalium affine* d'Urv. var. *parvulum* Speg.
Referencias: Bayer, R. J. & Stebbins, G. L., 1982; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 291* (LP)]; CHL[*Domínguez, E. 217* (CONC)].

Antennaria magellanica Sch. Bip. = **Antennaria chilensis** J. Remy var. **magellanica** (Sch. Bip.) Reiche
Referencias: Bayer, R. J. & Stebbins, G. L., 1982; Cabrera, A. L., 1971a.

Antennaria sleumeri Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957c, 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2100 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3891* (LP)].

Anthemis L.

Número de especies: 2 introducidas

Anthemis arvensis L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X); URY(MON).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 990* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 225* (LP)].

Anthemis cotula L.
Sin.: *Chamaemelum cotula* (L.) All., *Maruta cotula* (L.) DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1938a, 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(CEN, ITA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 590* (LP)]; BRA[*Pereira, E. 8331* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3448* (LP)]; PRY[*sin colector s.n.* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3195* (LP)].

Anthemis mixta L. = **Chamaemelum mixtum** (L.) All.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Anthemis occidentalis Willd. = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Anthemis oppositifolia Lam. = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Apalus anthemifolius (Bertero ex Colla) DC. = **Blennosperma chilense** Less.

Apargia chillensis Kunth = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Apargia variegata Willd. = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Aphyllocladus Wedd.

Número de especies: 5, 4 endémicas

Aphyllocladus decussatus Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b; Freire, S. E., 1996.
Arbusto. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 831* (B)].

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy) Cabrera var. **calvus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Jobaphes virgatus* Phil. var. *calvus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.
Arbusto. Endémica. 2500–2800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 38* (LP)].

Aphyllocladus denticulatus (J. Remy) Cabrera var. **denticulatus**
Sin.: *Cyclolepis denticulata* J. Remy, *Jobaphes virgatus* Phil., *Plazia virgata* (Phil.) O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.
Arbusto. Endémica. 700–2700 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, N. s.n.* (LP)].

Aphyllocladus ephedroides Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b; Freire, S. E., 1996.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12593* (LP)].

Aphyllocladus san-martinianus Molfino
Referencias: Freire, S. E., 1996; Molfino, J. F., 1953.
Arbusto. Endémica. 2000–2700 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24290* (LP)].

Aphyllocladus spartioides Wedd.
Sin.: *Hyalis spartioides* (Wedd.) Griseb., *Plazia spartioides* (Wedd.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b, 1978; Freire, S. E., 1996.
Arbusto. Nativa. 2400–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Escalante, M. G. 85* (LP)].

Aplophyllum decurrens (Cav.) Cass. = **Mutisia decurrens** Cav. var. **decurrens**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Aplophyllum ilicifolium (Cav.) Cass. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Aplophyllum linearifolium (Cav.) Cass. = **Mutisia linearifolia** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Apopyros G.L. Nesom

Número de especies: 1 endémica

Apopyros corymbosus (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster setosus* Baker, *Aster tuberosus* Less. ex Baker, *Conyza blanchetii* Baker, *Conyza setosa* (Baker) Malme, *Diplopappus corymbosus* Hook. & Arn., *Erigeron blanchetii* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1959a; Malme, G. O. A., 1933b; Nesom, G. L., 1994a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1057* (LP)]; BRA[*Pereira, E. 8128* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 9222* (MO)].

Arctium L.

Número de especies: 1 introducida

Arctium minus (Hill) Bernh.
Sin.: *Lappa glabra* Lam., *Lappa minor* Hill
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Conticello, L. & Bustamante, A., 1999[2000].
Hierba. Bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VI, VII, X, RME); URY(CAS, FLA, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 149* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 6687* (LP)]; CHL[*Looser, G. 2022* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 668* (LP)].

Arctotheca J.C.Wendl.

Número de especies: 1 introducida

Arctotheca calendula (L.) Levyns
Sin.: *Arctotis calendula* L., *Arctotis calendulacea* Willd., *Cryptostemma calendula* (L.) Druce, *Cryptostemma calendulaceum* (L.) R. Br.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a; Cabrera, A. L., 1963a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Webb, C. J., Sykes, W. R. & Garnock-Jones, P. J., 1988.
Hierba. Anual o perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 952* (LP)]; CHL[*Barros, E. 247* (LP)].

Arctotis L.

Número de especies: 1 introducida

Arctotis calendula L. = **Arctotheca calendula** (L.) Levyns
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Arctotis calendulacea Willd. = **Arctotheca calendula** (L.) Levyns
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Arctotis decumbens Thunb. = **Arctotis stoechadifolia** P.J. Bergius
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Arctotis grandis Thunb. = **Arctotis stoechadifolia** P.J. Bergius
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Arctotis stoechadifolia P.J. Bergius
Sin.: *Arctotis decumbens* Thunb., *Arctotis grandis* Thunb.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a; Cabrera, A. L., 1974a; Webb, C. J., Sykes, W. R. & Garnock-Jones, P. J., 1988.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI); BRA(RGS); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigo Trigo, A. P. 993* (LP)]; BRA[*Palacios, M. A. 386* (LP)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Argyranthemum Webb ex Sch. Bip.

Número de especies: 1 introducida

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
Sin.: *Chrysanthemum frutescens* L., *Pyrethrum frutescens* (L.) Willd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., 1963a; Humphries, C. J., 1976.
Subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4701* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 1147* (LP)].

Argyrochaeta bipinnatifida Cav. = **Parthenium hysterophorus** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Aristeguietia salvia (Colla) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium salvium** Colla

Arnica L.

Número de especies: 1 introducida

Arnica alpina (L.) Olin, hom. illeg. = **Arnica angustifolia** J. Vahl
Referencias: Cabrera, A. L., 1980b.

Arnica angustifolia J. Vahl
Sin.: *Arnica alpina* (L.) Olin, hom. illeg., *Arnica montana* L. var. *alpina* L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1980b; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Introducida. 1500–1700 m.
Países: ARG(NEU); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. 693* (SI)].

Notas: Citada para Chile sin mencionar ejemplar de referencia (Reiche, 1905).

Arnica incana (Lam.) Pers. = **Trichocline incana** (Lam.) Cass.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Arnica montana L. var. *alpina* L. = **Arnica angustifolia** J. Vahl
Referencias: Cabrera, A. L., 1980b.

Aroma tenuifolia Nutt. = **Amblyopappus pusillus** Hook. & Arn. var. **pusillus**
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Arrhenachne juncea Cass. = **Baccharis juncea** (Lehm.) Desf.
Referencias: Giuliano, D., A. 2000.

Artemisia L.

Número de especies: 9, 4 endémicas, 5 introducidas

Artemisia abrotanum L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997a; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1939a, 1971a; Moore, D. M., 1983.
Arbusto o subarbusto. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SFE, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5113* (LP)].

Artemisia absinthium L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997a; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983.
Subarbusto. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(RGS); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2639* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 6440* (LP)]; CHL[*Burkart, A. 9480* (LP)].

Artemisia annua L.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Novara, L. J., 1994c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, NEU, SAL, SFE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24274* (LP)].

Artemisia copa Phil. var. **copa**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto o arbolito. Endémica. 3100–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU); CHL(I, II, III, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8894* (LP)]; CHL[*Martin, H. C. 484* (LP)].

Artemisia copa Phil. var. **trifida** Acevedo
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 2400 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bohne, L. s.n.* (LP)].

Artemisia douglasiana Besser
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967a, 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Velázquez, C. 22* (CORD, IZAC)].

Artemisia echegarayi Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Hieronymus, G. H. E. W., 1881; Roig, F. A., 1982.
Subarbusto. Endémica. 2000–2600 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 5568* (CORD)].

Artemisia magellanica Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2410* (LP)]; CHL[*Goodall, N. 2083* (LP)].

Artemisia matricarioides Less. = **Matricaria matricarioides** (Less.) Porter
Referencias: Amat, A. G., 1985; Cabrera, A. L., 1971a.

Artemisia mendozana DC. var. **mendozana**
Sin.: *Seriphidium mendozanum* (DC.) Bremer & Humphries
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Roig, F. A. & Ambrosetti, A., 1989.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15238* (SI)].

Artemisia mendozana DC. var. **paramilloënsis** F.A. Roig & Ambrosetti
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Roig, F. A. & Ambrosetti, A., 1989.
Subarbusto. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 10925* (CORD)].

Artemisia verlotiorum Lamotte
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Novara, L. J., 1994c.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, FLA, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 866* (LP)]; BRA[*Ferreira, L. F. 160* (LP)]; URY[*Rosa- Mato, F. 414* (LP)].

Aspilia Thouars

Número de especies: 16, 3 endémicas

Aspilia apensis Chodat = **Angelphytum apensis** (Chodat) A.A. Sáenz

Aspilia arillata (DC.) Griseb. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Aspilia attenuata (Gardner) Baker
Sin.: *Viguiera attenuata* Gardner, *Wedelia attenuata* (Gardner) B.L. Turner
Referencias: Baker, J. G., 1882.
Subarbusto. Nativa. 700–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7919* (MBM)].

Aspilia aurantiaca Griseb. var. **aurantiaca**
Sin.: *Wedelia aurantiaca* (Griseb.) B.L. Turner
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 33* (SI)].

Aspilia aurantiaca Griseb. var. **vulcanica** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solbrig, O. T. 16895* (LP)].

Aspilia buphthalmiflora (DC.) Griseb. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Aspilia burchellii Sch. Bip. ex Baker = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia calendulacea (DC.) Griseb. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Aspilia callosa Chodat = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Aspilia camporum Chodat
Sin.: *Wedelia camporum* (Chodat) B.L. Turner
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3693* (CTES, FCQ, SI), *Soria, N. 5604* (FCQ, MO)].

Aspilia clausseniana Baker
Referencias: Santos, J. U. M., 2001; Sáenz, A. A., 1999.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 17032* (CTES, LP)]; BRA[*Lorenzi, H. s.n.* (RB)]; PRY[*Hassler, E. 6646* (BM)].

Aspilia cuyabensis Malme = **Aspilia latissima** Malme

Aspilia ecliptaefolia (DC.) Baker = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Aspilia elegans (Gardner) Benth. & Hook. f. = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia floribunda (Gardner) Baker
Sin.: *Aspilia gracilis* (Gardner) Baker, *Aspilia pseudoviguiera* H. Rob., *Viguiera floribunda* Gardner, *Viguiera gracilis* Gardner, *Viguiera ramosissima* Gardner
Referencias: Santos, J. U. M., 2001.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12148* (RB)].

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker
Sin.: *Aspilia burchellii* Sch. Bip. ex Baker, *Aspilia elegans* (Gardner) Benth. & Hook. f., *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *angustifolia* (Gardner) Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *hirsuta* (Gardner) Baker, *Aspilia foliacea* (Spreng.) Baker var. *oblonga* Baker, *Aspilia glabra* (Gardner) Benth. & Hook. f., *Aspilia hirsuta* (Gardner) B.D. Jacks. & Hook. f., *Aspilia pusilla* Baker, *Viguiera elegans* Gardner, *Viguiera foliacea* Spreng., *Viguiera glabra* Gardner, *Viguiera hirsuta* Gardner, *Viguiera pusilla* Less. ex Baker, *Wedelia burchellii* (Baker) B.L. Turner, *Wedelia glabra* (Gardner) B.L. Turner, *Wedelia hirsuta* (Gardner) B.L. Turner
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Santos, J. U. M., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22708* (MBM)]; PRY[*Balansa, B. 846* (G)].

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker var. *angustifolia* (Gardner) Baker = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker var. *hirsuta* (Gardner) Baker = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia foliacea (Spreng.) Baker var. *oblonga* Baker = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia glabra (Gardner) Benth. & Hook. f. = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia gracilis (Gardner) Baker = **Aspilia floribunda** (Gardner) Baker

Aspilia hassleriana Chodat
Sin.: *Aspilia hassleriana* Chodat var. *scaberrima* Chodat, *Wedelia hassleriana* (Chodat) B.L. Turner
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 30219* (CTES)].

Aspilia hassleriana Chodat var. *scaberrima* Chodat
= **Aspilia hassleriana** Chodat

Aspilia hirsuta (Gardner) B.D. Jacks. & Hook. f.
= **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia induta Chodat = **Angelphytum indutum** (Chodat) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Aspilia latissima Malme
Sin.: *Aspilia cuyabensis* Malme
Referencias: Santos, J. U. M., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*sin colector s.n.* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 37809* (AS, MO)].

Aspilia leucanthema Chodat
Sin.: *Wedelia leucanthema* (Chodat) B.L. Turner
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Endémica. 300–600 m.
Países: PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 33438* (CTES, SI)].

Aspilia linearifolia Baker, nom. illeg. = **Aspilia linearis** S.F. Blake

Aspilia linearis S.F. Blake
Sin.: *Aspilia linearifolia* Baker, nom. illeg.
Referencias: Freire, S. E., et al., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 834* (SI)].

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Sin.: *Aspilia arillata* (DC.) Griseb., *Aspilia buphthalmiflora* (DC.) Griseb., *Aspilia calendulacea* (DC.) Griseb., *Leighia arillata* DC., *Leighia buphthalmiflora* DC., *Leighia calendulacea* DC., *Verbesina montevidensis* Spreng., *Wedelia montevidensis* (Spreng.) B.L. Turner
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Santos, J. U. M., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY (ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAL, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1708* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 33911* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27864* (CTES)]; URY [*Berro, M. B. 826* (MVFA)].

Aspilia montevidensis (Spreng.) Kuntze var. **setosa** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Aspilia setosa* Griseb.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., 1974a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29361* (SI)]; BRA[*Imaguire, N. 22* (MBM)]; PRY[*Honfi, A. I. 1160* (MNES)]; URY[*Alonso Paz, E. 3609* (MVFQ)].

Aspilia paranensis Malme = **Viguiera paranensis** (Malme) J.U. Santos
Referencias: Santos, J. U. M., 1992.

Aspilia pascalioides Griseb.
Sin.: *Wedelia pascalioides* (Griseb.) B.L. Turner
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, COA, GUA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CLA, RNO, RIV, SAO, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6844* (CTES)]; BRA[*Mondin, C. A. 2903* (HASU)]; PRY[*Zardini, E. M. 55380* (MO)]; URY[*Berro, M. B. 5139* (MVFA)].

Aspilia phyllostachya Baker
Sin.: *Wedelia phyllostachya* (Baker) B.L. Turner
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Palacios, R. A. 1931* (MO)].

Aspilia pseudoviguiera H. Rob. = **Aspilia floribunda** (Gardner) Baker

Aspilia pusilla Baker = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Aspilia reflexa (Sch. Bip. ex Baker) Baker
Sin.: *Aspilia setosa* Griseb. var. *reflexa* (Sch. Bip. ex Baker) Chodat, *Viguiera reflexa* Sch. Bip. ex Baker, *Wedelia reflexa* (Baker) B.L. Turner, *Wedelia sessilifolia* Mart. ex Baker
Referencias: Santos, J. U. M., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43416* (RB)]; PRY[*Balansa, B. 853* (G)].

Aspilia riedelli Baker
Sin.: *Wedelia riedelii* (Baker) B.L. Turner
Hierba. Anual. Nativa. 200–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 30183* (CTES)].

Aspilia setosa Griseb. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **setosa** (Griseb.) Cabrera

Aspilia setosa Griseb. var. *reflexa* (Sch. Bip. ex Baker) Chodat = **Aspilia reflexa** (Sch. Bip. ex Baker) Baker

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Gymnopsis helianthoides* DC., *Leighia silphioides* Hook. & Arn., *Wedelia silphioides* (Hook. & Arn.) B.L. Turner

Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR); PRY(AMA, CEN, COA, PHA); URY(MON, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 27532* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 13031* (MBM)]; PRY[*Krapovickas, A. 45652* (CTES, SI)]; URY[*Berro, M. B. 6044* (MVFA)].

Aspilia silphioides (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. f. *parvifolia* Chodat = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Aster acaulis Wedd. = **Noticastrum marginatum** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster adalbertii Kuntze = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Aster adscendens (DC.) Reiche = **Noticastrum adscendens** DC.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster albertii Phil. = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster albus (Phil.) Kuntze = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster albus (Phil.) Reiche = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster andicola Hauman = **Erigeron andicola** DC.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster andinus Kuntze = **Haplopappus pinnatifidus** Nutt.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Aster anethifolius (Phil.) Kuntze = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 2003b.

Aster anthylloides (Meyen & Walp.) Kuntze = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster antucensis (Phil.) Kuntze = **Noticastrum antucense** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster argentinensis Cabrera = **Noticastrum argentinense** (Cabrera) Cuatrec.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster asteroides (Colla) Rusby = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster atacamensis Kuntze = **Haplopappus rigidus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster atenes Kuntze = **Haplopappus angustifolius** (DC.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.

Aster baylahuen (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus baylahuen** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1934; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster bellidiastrum Nees, hom. illeg. = **Erigeron andicola** DC.
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster berteroi Kuntze = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster bezanillanus Kuntze = **Haplopappus bezanillanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster breviflorus Phil. = **Erigeron fasciculatus** Colla
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Aster cabrerae Ariza = **Symphyotrichum graminifolium** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster calendulaceus (Griseb.) Kuntze = **Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster calvatus (Baker) Herter = **Noticastrum calvatum** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster cerberoanus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster chebataroffii Herter = **Noticastrum chebataroffii** (Herter) Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster chryseus Kuntze = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoides** Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Aster cuneifolius (Nutt.) Kuntze = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster decumbens auct. non Baker = **Noticastrum chebataroffii** (Herter) Zardini
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster decumbens Baker = **Noticastrum decumbens** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster densifolius (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972.

Aster denticulatus (Phil.) Kuntze = **Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster diplopappus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster divaricatus Baker, hom. illeg. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster divaricatus Baker var. *graminifolius* (Spreng.) Baker = **Symphyotrichum graminifolium** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster erectus (J. Remy) Kuntze = **Noticastrum erectum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster erectus (J. Remy) Reiche = **Noticastrum erectum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster erectus (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche = **Noticastrum antucense** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster eriophorus (J. Remy) Kuntze = **Noticastrum eriophorum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster eriophorus (J. Remy) Reiche = **Noticastrum eriophorum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster exilis Elliott var. *australis* A. Gray = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster foliosus (DC.) Kuntze = **Haplopappus foliosus** DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster gayanus DC. = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster gilliesii Hook. & Arn. = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster glabrifolius (DC.) Reiche = **Symphyotrichum glabrifolium** (DC.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster glutinosus (Less.) Kuntze = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster glutinosus Cav. = **Grindelia glutinosa** (Cav.) Mart.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.

Aster gnaphalioides (Baker) Hassl. = **Noticastrum gnaphalioides** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster grindelioides (Less.) Kuntze = **Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster griseus Kuntze = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster haplopappus (J. Remy) Kuntze = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster haplopappus (J. Remy) Reiche = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster hirtellus (Phil.) Kuntze = **Haplopappus hirtellus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster ilicifolius (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster illinitus (Phil.) Kuntze = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster lastarrianus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus baylahuen** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1934; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster leucopappus (Phil.) Reiche = **Noticastrum eriophorum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster linifolius Griseb., hom. illeg. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster linoides (Phil.) Kuntze = **Haplopappus linifolius** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster litoralis Phil. = **Erigeron fasciculatus** Colla
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Aster longipes Gardner = **Inulopsis scaposa** (DC.) O. Hoffm.
Referencias: Nesom, G. L., 1994e.

Aster macraeanus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus macraeanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster macrocephalus (Baker) Hassl. = **Noticastrum macrocephalum** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster macrocephalus (Poepp. ex Less.) Kuntze = **Haplopappus macrocephalus** (Poepp. ex Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster macrocephalus (Baker) Hassl. var. *pseudognaphalioides* Hassl. = **Noticastrum macrocephalum** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster magellanicus Lam. = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Aster magellanicus Spreng., hom. illeg. = **Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.) Kuntze
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster marginalis (Phil.) Kuntze = **Haplopappus marginalis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster marginatus Kunth = **Noticastrum marginatum** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster marginatus Kunth var. *argenteus* Wedd. = **Noticastrum argenteum** Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster marginatus Kunth var. *tomentosus* Wedd. = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster maximum (D. Don) Less. = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002.

Aster moelleri (Phil.) Reiche = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster montevidensis (Spreng.) Griseb. = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster multifolius (Phil. ex Reiche) Kuntze = **Haplopappus multifolius** Phil. ex Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster nardophyllum Kuntze = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Aster nitens Kuntze = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster notosericeus Griseb. = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster nudicaulis Comm. ex Lam. = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Aster oligodontus Kuntze = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster parvifolius (DC.) Kuntze = **Haplopappus parvifolius** (DC.) Gay
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster patagonicus Cabrera = **Symphyotrichum patagonicum** (Cabrera) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster pectinatus (Phil.) Kuntze = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 2003b.

Aster pedunculosus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus pedunculosus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster perezii Cuatrec. = **Noticastrum marginatum** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster peteroanus Phil. = **Symphyotrichum peteroanum** (Phil.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster philippii Kuntze = **Haplopappus philippii** (Kuntze) H.M. Hall
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster pineus (Phil.) Kuntze = **Haplopappus pinea** (Phil.) Reiche
Referencias: Teillier A., S., 1997.

Aster plantagineus Poepp. ex DC. = **Senecio arnicoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Aster polyphyllus (Phil.) Kuntze = **Haplopappus foliosus** DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster pradensis Phil. = **Noticastrum adscendens** DC.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster pristiphyllus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus pristiphyllus** (J. Remy) H.M. Hall
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster prostratus Phil. = **Erigeron othonnifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Aster prunelloides (Poepp. ex Less.) Kuntze = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Aster psammophilus (Malme) Herter = **Noticastrum malmei** Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster psammophilus (Malme) I.L. Teodoro = **Noticastrum malmei** Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster psammophilus Klatt = **Noticastrum psammophilum** (Klatt) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Aster radicans (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster regnellii Baker = **Symphyotrichum regnellii** (Baker) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster remyanus (Wedd.) Kuntze = **Haplopappus remyanus** Wedd.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster rengifoanus (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus rengifoanus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster reversus Kuntze = **Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster saxatilis (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus saxatilis** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster schumannii Kuntze = **Haplopappus schumannii** (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Aster scrobiculatus (Nees) Kuntze = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster senebierifolius Kuntze = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Aster sericeus (Less.) Nees = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster setiger (Phil.) Kuntze = **Haplopappus pinnatifidus** Nutt.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Aster setosus Baker = **Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994a.

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. var. *graminifolius* (Spreng.) Hieron. = **Symphyotrichum graminifolium** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster stelliger (J. Remy) Kuntze = **Haplopappus stelliger** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster stewardensis Kuntze = **Haplopappus angustifolius** (DC.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.

Aster subtropicus Morong = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster trianthus Vell. = **Calea triantha** (Vell.) Pruski

Aster tuberosus Less. ex Baker = **Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994a.

Aster uncinatus (Phil.) Kuntze = **Haplopappus uncinatus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster vahlii (Gaudich.) Hook. & Arn. = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **vahlii**
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster vahlii (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche = **Symphyotrichum glabrifolium** (DC.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster vahlii (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera = **Symphyotrichum peteroanum** (Phil.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster vahlii (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *robusta* De Wild. = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **vahlii**
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Aster vahlii (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **tenuifolium** (Phil.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Aster valparaisanus Kuntze = **Haplopappus pulchellus** DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster venosus Kuntze = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster villiger Kuntze = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Aster zosterifolius Reiche = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **tenuifolium** (Phil.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Asteropsis Less.

Número de especies: 1 endémica

Asteropsis macrocephala Less.
Sin.: *Neja macrocephala* DC., *Podocoma macrocephala* (Less.) Herter, *Podopappus tomentosus* Hook. & Arn.
Referencias: Nesom, G. L., 1994f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ávila de Araujo, A. 28* (LP)]; URY[*Sancho, G. 99* (LP)].

Astradelphus chilensis J. Remy = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Austrobrickellia arnottii (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium arnottii** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Austrobrickellia patens (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium patens** D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Austroeupatorium apense (Chodat) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium apense** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Austroeupatorium entreriense (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Austroeupatorium laetevirens (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium laetevirens** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Austroeupatorium picturatum (Malme) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium picturatum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Austroeupatorium rosmarinaceum (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium rosmarinaceum** Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Austroeupatorium tweedieanum (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tweedieanum** Hook. & Arn. var. **tweedieanum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Austroliabum candidum (Griseb.) H. Rob. & Brettell = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Austroliabum eremophilum (Cabrera) H. Rob. & Brettell = **Microliabum eremophilum** (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Austroliabum polymniodes (R.E. Fr.) H. Rob. & Brettell = **Microliabum polymnioides** (R.E. Fr.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium amygdalinum** Lam. var. **amygdalinum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Ayapanopsis esperanzae (Hassl.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium esperanzae** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Ayapanopsis tucumanensis (Lillo & B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tucumanense** Lillo & B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Aylacophora Cabrera

Número de especies: 1 endémica

Aylacophora deserticola Cabrera
Sin.: *Nardophyllum deserticolum* (Cabrera) G.L. Nesom
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2001; Cabrera, A. L., 1953d, 1971a; Nesom, G. L., 1993b.
Arbusto. Endémica. 500–700 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11053* (LP)].

Baccarodes holtonii (Baker) Kuntze = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Baccarodes muticum (Kunth) Kuntze = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Baccarodes punctatum (Cass.) Kuntze = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Baccarodes violaceum (Schrank) Kuntze = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Baccharidastrum argutum (Less.) Cabrera = **Baccharis breviseta** DC.

Baccharidastrum myriocephala Baker, hom. illeg. = **Baccharis pseudomyriocephala** I.L. Teodoro
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharidastrum notobellidiastrum (Griseb.) Herter = **Podocoma notobellidiastrum** (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Baccharidastrum rivulare (Gardner) Herter = **Podocoma rivularis** (Gardner) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Baccharidastrum triplinervium (Less.) Cabrera = **Baccharis vulneraria** Baker
Referencias: Giuliano, D., A. 2000.

Baccharis L.

Número de especies: 189, 81 endémicas

Baccharis abietina Kuntze = **Baccharis grisebachii** Hieron.
Referencias: Giuliano, D., A. 2000.

Baccharis absinthioides Hook. & Arn. = **Tessaria absinthioides** (Hook. & Arn.) DC.
Referencias: Freire, S. E., 1998.

Baccharis acaulis (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera
Sin.: *Heterothalamus acaulis* Wedd. ex R.E. Fr., *Pseudobaccharis acaulis* (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera, *Psila caespitosa* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D., A., 2000, 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 3300–3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10612* (LP), *Ruthsatz, B. 157* (LP)]; CHL[*Teillier A., S. 4225* (CONC)].

Baccharis adscendens Pers. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis affinis DC. = **Baccharis tridentata** Vahl
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis alamanii DC. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis albida Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15643* (LP), *Schulz, A. G. 248* (LP)].

Baccharis aliena (Spreng.) Joch.Müll. = **Heterothalamus alienus** (Spreng.) Kuntze

Baccharis alnifolia Meyen & Walp.
Referencias: Hellwig, F. H., 1988.
Arbusto. Nativa. 3000–3800 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 1794* (M)].

Baccharis alpina auct. non Kunth = **Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **nummuloides** (Heering) Cuatrec.
Referencias: Giuliano, D., A. 2000.

[Baccharis alpina Kunth]
Sin.: *Baccharis alpina* Kunth f. *macrocephala* Hieron., *Baccharis caespitosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *alpina* (Kunth) Cuatrec., *Baccharis humifusa* Kunth
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Baccharis alpina Kunth f. *macrocephala* Hieron.
= **Baccharis alpina** Kunth

Baccharis alpina Kunth var. *nivalis* Wedd. = **Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **caespitosa**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis alpina Kunth var. *nummuloides* Heering = **Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **nummuloides** (Heering) Cuatrec.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis alpina Kunth var. *serpyllifolia* Wedd. = **Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **caespitosa**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis amambayensis Zardini & Soria
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1991, 1995.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10285a* (G)].

Baccharis amygdalina Griseb. = **Baccharis punctulata** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis angulata Griseb. = **Baccharis darwinii** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis angulata Griseb. var. *andina* Hieron. = **Baccharis darwinii** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis angusticeps Dusén ex Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 1100–2000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15075* (LP)].

Baccharis angustifolia Desf., hom. illeg. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis anomala DC.
Sin.: *Pingraea anomala* (DC.) F.H. Hellwig
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, GUA); URY(ART, DUR, RIV, RNO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz 2188* (LP), *Schwindt, E. 3997* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14860* (LP), *Smith, L. B. 11487* (HBR, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 10114* (LP), *Rojas, T. 4715* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 3762b* (LP)].

Baccharis aphylla (Vell.) DC.
Sin.: *Baccharis nuda* (Vell.) DC., *Chrysocoma aphylla* Vell., *Chrysocoma nuda* Vell.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15719* (LP), *Hatschbach, G. 20058* (LP)].

Baccharis aracatubensis I.L. Teodoro & Hatschbach
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 700–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6836* (LP), *Reitz, P. R. 10345* (LP)].

Baccharis araucana Phil. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis arctostaphylloides Baker = **Baccharis reticularia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis arenaria Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19347* (LP), *Cabrera, A. L. 3834* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 3084* (HBR, RB), *Maria, E. 10677* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3834* (LP)].

Baccharis argentina Heering = **Baccharis vernicosa** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis artemisioides Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4363* (CORD)].

Baccharis articulata (Lam.) Pers.
Sin.: *Conyza articulata* Lam., *Molina articulata* (Lam.) Less., *Pingraea articulata* (Lam.) F.H. Hellwig

Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 929* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 3037* (LP), *Reitz, P. R. 16196* (HAS, HBR, RB)]; PRY[*Zardini, E. M. 5759* (MO)]; URY[*Krapovickas, A. 16127* (LP)].

Baccharis articulata (Lam.) Pers. var. *gaudichaudiana* (DC.) Baker = **Baccharis gaudichaudiana** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis asteroides Colla = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom

Baccharis attenuata Don ex Hook. & Arn. = **Baccharis spicata** (Lam.) Baill.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis axillaris DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18444* (LP), *Smith, L. B. 12076* (HBR, RB, US)].

Baccharis axillaris DC. var. *acutiloba* DC. = **Baccharis incisa** Hook. & Arn.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis axillaris DC. var. *dentata* DC. = **Baccharis incisa** Hook. & Arn.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis bahiensis Baker = **Baccharis reticularia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis bakeri Heering = **Baccharis patens** Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis baldwinii Hook. & Arn. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis barrosoana Mattos = **Baccharis nummularia** Heering ex Malme
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis bezanilleana J. Remy = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis bezanilleana J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl. = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis boliviensis (Wedd.) Malag., comb. superfl. = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Sin.: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Malag., comb. superfl., *Heterothalamus boliviensis* Wedd., *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera, *Pseudobaccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera, *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 1500–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7639* (LP), *Fabris, H. A. 7697* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 1746* (LP)].

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Malag., comb. superfl. = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **latifolia** (R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera var. **latifolia** (R.E. Fr.) Cabrera
Sin.: *Baccharis boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Malag., comb. superfl., *Heterothalamus boliviensis* Wedd. var. *latifolia* R.E. Fr., *Psila boliviensis* (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Nativa. 3300–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22457* (LP), *Cabrera, A. L. 8312* (LP)].

Baccharis brachylaenoides DC. var. **brachylaenoides**
Sin.: *Baccharis meridensis* Steyerm., *Baccharis oblanceolata* Rusby, *Baccharis venulosa* DC., *Psila brachylaenoides* (DC.) Aristeg.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cuatrecasas, J., 1967; Giuliano, D. A., 1999, 2000, 2001; Müller, J., 2006; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005a.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28900* (LP, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4166* (LP), *Reitz, P. R. 9630* (HAS, HBR, RB)].

Baccharis brachylaenoides DC. var. *polycephala* (I.L. Teodoro) Govaerts, comb. superfl. = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso

Baccharis brachylaenoides DC. var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis brachylaenoides* DC. var. *polycephala* (I.L. Teodoro) Govaerts, comb. superfl., *Baccharis brachylaenoides* DC. var. *rufidula* (Sch. Bip.) A.S. Oliveira & Deble, nom. illeg., *Baccharis polycephala* Sch. Bip., nom. nud., *Pseudobaccharis polycephala* I.L. Teodoro
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005a.
Arbusto. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6078* (CTES)]; BRA[*Klein, R. M. 2500* (LP)].

Baccharis brachylaenoides DC. var. *rufidula* (Sch. Bip.) A.S. Oliveira & Deble, nom. illeg. = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso

Baccharis brachystachys (Baker) I.L. Teodoro & J.E. Vidal
Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *brachystachys* Baker, *Baccharis sagittalis* (Less.) DC. var. *montevidensis* Baker
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 36253* (LP)]; URY[*Arechavaleta, J. 4089* (K, LP)].

Baccharis bracteata Hook. & Arn. = **Baccharis dracunculifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis brasiliana L. = **Vernonia brasiliana** (L.) Druce
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Baccharis brevifolia DC.
Sin.: *Baccharis myrsinoides* Hook. & Arn., *Baccharis xerophila* Mart.
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 153* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 759* (LP)].

[Baccharis brevifolia DC. f. tridentata Heering]
Notas: Nombre dudoso.

[Baccharis brevifolia DC. var. tucumanensis Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis breviseta DC.
Sin.: *Baccharidastrum argutum* (Less.) Cabrera, *Conyza arguta* Less.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CON, COA, GUA, ITA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, RNO, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 858* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 10979* (RB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4425* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1220* (LP)].

Baccharis bryoides (Lam.) Pers. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Baccharis cabrerae Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973b; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 2600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1268* (LP), *Rodríguez, F. M. 1276* (LP)].

Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. var. *alpina* (Kunth) Cuatrec. = **Baccharis alpina** Kunth

Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. var. **caespitosa**
Sin.: *Baccharis alpina* Kunth var. *nivalis* Wedd., *Baccharis alpina* Kunth var. *serpyllifolia* Wedd., *Molina caespitosa* Ruiz & Pav.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1969a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 6908* (US), *Venturi, S. 8630* (US)]; CHL[*Marticorena, C. 112* (CONC)].

Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. var. **nummuloides** (Heering) Cuatrec.
Sin.: *Baccharis alpina* auct. non Kunth, *Baccharis alpina* Kunth var. *nummuloides* Heering
Referencias: Cuatrecasas, J., 1969a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Balls, E. K. 6020* (US), *Cabrera, A. L. 20655* (LP), *Fabris, H. A. 5824* (LP)].

Baccharis calliprinos Griseb. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis callistemoides Walp. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis calvescens DC.
Sin.: *Baccharis oleifolia* Gardner
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 793* (LP), *Klein, R. M. 7377* (FLOR, HBR)].

Baccharis camporum DC. f. **camporum**
Sin.: *Baccharis cephalotes* DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Heering, W. C. A., 1914; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1294* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 14939* (HBR, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 42760* (MO, PY)].

Baccharis camporum DC. f. **parvifolia** Heering
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.
Subarbusto. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12221* (HAS, HBR, RB, US)].

Baccharis camporum DC. var. *glaucescens* Chodat & Hassl. = **Baccharis glaucescens** (Chodat & Hassl.) Soria & Zardini
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1991.

[Baccharis canescens Spreng.]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis capitalensis Heering
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21118* (LP)].

Baccharis caprariifolia DC.
Sin.: *Baccharis grisea* Baker, *Baccharis recurvata* Gardner
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE); URY(RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28618* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2812* (HAS, LP, MBM)]; PRY[*Montes, J. E. 12505* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 781* (MVFA)].

Baccharis cassiniifolia auct. non DC. = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.

[Baccharis cassiniifolia DC.]
Sin.: *Baccharis coriacea* Glaz., *Baccharis riedelli* Sch. Bip., nom. nud.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Baccharis cephalotes DC. = **Baccharis camporum** DC. f. **camporum**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis chilquilla DC. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis chubutensis Speg. = **Baccharis sagittalis** (Less.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis cinerea DC. = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis clausseni Baker = **Baccharis reticularia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis coerulescens DC. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis cognata DC.
Sin.: *Baccharis hoehneana* I.L. Teodoro
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 697* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11566* (HBR, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 4662* (FCQ, MO)].

Baccharis concava (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *intermedia* Heering, *Molina concava* Ruiz & Pav.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ruiz, L. s.n.* (LP)].

Baccharis concava (Ruiz & Pav.) Pers. var. *floribunda* Heering = **Baccharis vernalis** F.H. Hellwig
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis confertifolia Colla var. **confertifolia**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 300–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 3288* (LP), *Kausel, E. M. L. 3637* (LP)].

[Baccharis confertifolia Bertero ex Colla var. latifolia Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis conyzoides (Less.) DC.
Sin.: *Molina conyzoides* Less., *Pingraea conyzoides* (Less.) F.H. Hellwig
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2667* (LP), *Reitz, P. R. 6683* (HAS, HBR, RB), *Reitz, P. R. 9186* (LP)].

Baccharis cordobensis Heering = **Baccharis sessiliflora** Vahl
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis coriacea Glaz. = **Baccharis cassiniifolia** DC.

Baccharis coridifolia DC.
Sin.: *Eupatorium montevidense* Spreng.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(MIE); URY(ART, CAS, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7161* (LP), *Hunziker, A. T. 6690* (CORD)]; BRA[*Klein, R. M. 12212* (LP), *Palacios, M. A. 1822* (LP), *Reitz, P. R. 8665* (HBR, RB)]; PRY[*Harasymowiz s.n.* (FCQ)]; URY[*Bartlett, H. H. 21308* (LP), *Rosa- Mato, F. 335* (LP)].

Baccharis coronata Giuliano
Referencias: Giuliano, D. A., 2006.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2422* (LP)].

Baccharis crenulata Spreng. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Baccharis crispa Spreng.
Sin.: *Baccharis cylindrica* (Less.) DC., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. subsp. *crispa* (Spreng.) Joch.Müll., *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *crispa* (Spreng.) Baker, *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *cylindrica* (Less.) Baker, *Baccharis perplexa* I.L. Teodoro & J.E. Vidal, *Molina crispa* (Spreng.) Less., *Molina cylindrica* Less., *Pingraea crispa* (Spreng.) F.H. Hellwig
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, PAI); URY(LAV, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5157* (LP), *Clos, E. C. 3488* (LP), *Di Fulvio, T. E. 1123* (CORD)]; BRA[*Reitz, P. R. 401* (HAS, HBR, RB)]; PRY[*Hassler, E. 11655* (G)]; URY[*Clos, E. C. 4976* (LP)].

Baccharis cuervii Phil. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis cultrata Baker
Sin.: *Baccharis delicata* I.L. Teodoro & Hatschbach, nom. nud.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 48871* (LP), *Smith Jr., C. E. 13876* (HBR, RB, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 8476* (LP)].

Baccharis cuneifolia (Lam.) DC., hom. illeg. = **Baccharis patagonica** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis cupressiformis (Lam.) Pers. = **Lepidophyllum cupressiforme** (Lam.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Baccharis curitybensis Heering
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 900–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17322* (LP), *Reitz, P. R. 10034* (HBR, RB), *Reitz, P. R. 7800* (LP)].

Baccharis curtifolia S. Moore = **Baccharis notosergila** Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis curvifolia Gardner = **Baccharis leptocephala** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis cylindrica (Less.) DC. = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis cymosa Phil.
Sin.: *Pingraea cymosa* (Phil.) F.H. Hellwig
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

Arbusto. Endémica. 1000–1300 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Baccharis czermakii Hochr. = **Heterothalamus psiadioides** Less.
Referencias: Deble, L. P., Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005b.

Baccharis daphnoides Hook. & Arn. = **Baccharis singularis** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis darwinii Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis angulata* Griseb., *Baccharis angulata* Griseb. var. *andina* Hieron., *Baccharis grossedentata* Heering, *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *subintegrifolia* Kuntze, *Neomolina darwinii* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, nom. illeg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Subarbusto. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(X); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10675* (LP)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)]; URY[*Marchesi, E. 26881* (MVFA)].

Baccharis deblei A.S. Oliveira & Marchiori
Referencias: Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005b.
Arbusto. Endémica. 1000–1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. s.n.* (ICN, MBM, PACA, SI)].

Baccharis delicata I.L. Teodoro & Hatschbach, nom. nud. = **Baccharis cultrata** Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis deltoidea Baker
Sin.: *Baccharis tridentata* Vahl var. *deltoidea* (Baker) Heering
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 27273* (LP), *Rambo, B. 44502* (LP)].

Baccharis densiflora Wedd. subsp. *perulata* (Kuntze) Joch.Müll. = **Baccharis perulata** Kuntze

Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis fuchsiifolia* Gardner, *Baccharis macrodonta* DC., *Baccharis orgyalis* DC., *Chrysocoma dentata* Vell., *Chrysocoma maritima* Vell.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Heering, W. C. A., 1914; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castiglioni, J. A. 2755* (LP)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 436* (RB), *Klein, R. M. 4096* (LP]; PRY[*Hassler, E. 11306* (G)].

Baccharis denticulata D. Don ex DC. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis dentosa Mart., nom. nud. = **Baccharis tridentata** Vahl

Baccharis discolor Baker = **Baccharis uncinella** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis divaricata Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14908* (LP), *Cabrera, A. L. 19563* (LP), *Eskuche, U. G. 0120* (LP)].

Baccharis dracunculifolia DC.
Sin.: *Baccharis bracteata* Hook. & Arn., *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *spectabilis* Heering, *Baccharis dracunculifolia* DC. f. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis leptospermoides* DC., *Baccharis paucidentata* Sch. Bip., nom. nud., *Conyza linearifolia* Spreng., nom. nud.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1974a, 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, PAY, RIV, RNO, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 8435* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 10896* (LP), *Smith, L. B. 11698* (HBR, RB, US)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10353* (LP), *Soria, N. 6170* (FCQ, MO)]; URY[*Rosa- Mato 537* (LP), *Rosengurtt, B. 2108b* (LP)].

Baccharis dracunculifolia DC. f. *spectabilis* Heering = **Baccharis dracunculifolia** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis dracunculifolia DC. f. *subviscosa* Kuntze = **Baccharis dracunculifolia** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis dusenii O. Hoffm. = **Baccharis melanopotamica** Speg.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis effusa Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 900–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7877* (LP), *Cantino, P. D. 620* (CORD), *Fabris, H. A. 4456* (LP)].

Baccharis elaeagnoides Steud. ex Baker
Sin.: *Baccharis semiserrata* DC. var. *elaeagnoides* (Steud. ex Baker) Barroso
Referencias: Baker, J. G., 1882; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1555* (SI), *Rodriguez 394a* (SI), *Zardini, E. M. 812* (SI), *Zuloaga, F. O. 6667* (SI)]; BRA[*Cabrera, A. L. 2356* (LP), *Reitz, P. R. 9074* (HAS, HBR, RB), *Smith, L. B. 11718* (LP)]; PRY[*Pedersen, T. M. 15017* (SI), *Rojas, T. 4740* (LP), *Schinini, A. 31450* (CTES)].

Baccharis elaeoides J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Seibert, P. 271* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 4835* (LP), *Montero, G. 3375* (LP)].

Baccharis elliptica Gardner
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18742* (LP)].

Baccharis erigeroides DC. var. **dusenii** Heering
Sin.: *Baccharis puberula* DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15014* (LP), *Hatschbach, G. 5118* (HAS, HBR, RB)].

Baccharis erigeroides DC. var. **erigeroides**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22259* (MVM), *Smith, L. B. 12207* (HBR, US)].

Baccharis erioclada DC.
Sin.: *Baccharis subintegrifolia* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 200–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12229* (LP), *Reitz, P. R. 13085* (HBR, RB)]; PRY[*Hassler, E. 10067* (G)].

Baccharis erioptera Benth. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Baccharis eupatorioides Hook. & Arn. = **Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis exyngioides Larrañaga]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis famatinensis Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973c, 2005; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 2100 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 13434* (CORD)].

Baccharis farinosa Spreng. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis fastigiata Phil. ex Reiche = **Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.

Baccharis fevillei DC. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis flabellata Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 200–2500 m.
Países: ARG(COR, LPA, LRI, SDE, SJU, SLU); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20615a* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 10018* (MVFA)].

Baccharis flabellata Hook. & Arn. var. *argentina* (Heering) Ariza = **Baccharis vernicosa** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis flexuosa Baker
Sin.: *Baccharis mattogrossensis* Heering ex Malme, *Baccharis pendula* Heering, *Pingraea flexuosa* (Baker) F.H. Hellwig
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23973* (LP), *Cabrera, A. L. 25494* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 8899* (LP)].

Baccharis floribunda Kunth = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis floribunda Phil., hom. illeg. = **Baccharis paniculata** DC.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis fluminensis Glaz. ex I.L. Teodoro, nom. nud. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**

Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis foliosa Hook. & Arn. = **Baccharis obovata** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis frenguellii Cabrera
Sin.: *Baccharis hassleriana* I.L. Teodoro
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24290* (LP), *Burkart, A. 25541* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 1795* (G)].

Baccharis fuchsiifolia Gardner = **Baccharis dentata** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis gaudichaudiana DC.
Sin.: *Baccharis articulata* (Lam.) Pers. var. *gaudichaudiana* (DC.) Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SDE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15940* (LP), *Krapovickas, A. 26207* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 10535* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 3635* (LP)].

Baccharis gayana Phil. = **Baccharis intermedia** DC.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

[Baccharis genistelloides (Lam.) Pers.]
Sin.: *Conyza genistelloides* Lam.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. var. *brachystachys* Baker = **Baccharis brachystachys** (Baker) I.L. Teodoro & J.E. Vidal
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. var. *crispa* (Spreng.) Baker = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. var. *cylindrica* (Less.) Baker = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. var. *milleflora* (Less.) Baker = **Baccharis milleflora** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. var. *trimera* (Less.) Baker = **Baccharis trimera** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A. , 2000.

Baccharis genistelloides (Lam.) Pers. subsp. *crispa* (Spreng.) Joch.Müll. = **Baccharis crispa** Spreng.

Baccharis genistifolia DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1963a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, SFE); URY(CAS, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1289* (LP), *Fortuna 23* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 1340* (LP), *Rosa- Mato 1439* (LP)].

Baccharis genistifolia DC. var. *β* Hook. & Arn. = **Baccharis notosergila** Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis gibertii Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Maria, E. 22* (LP, SP), *Maria, E. 23* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3701* (LP), *Rosengurtt, B. 5047b* (LP)].

Baccharis gilliesii A. Gray
Sin.: *Baccharis icma* Stuck. ex Heering, *Baccharis involucrata* (Phil.) O. Hoffm., *Baccharis nana* D. Don ex Baker, *Icma involucrata* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4115* (CORD), *Pedersen, T. M. 15307* (CORD)].

[Baccharis glabra Spreng.]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis glaucescens (Chodat & Hassl.) Soria & Zardini
Sin.: *Baccharis camporum* DC. var. *glaucescens* Chodat & Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1991, 1995.
Subarbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8306* (G)].

Baccharis glaziovii Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 543* (SP)].

Baccharis glutinosa Pers. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis glutinosa Pers. var. *incisa* Heering = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis gnaphalioides Spreng.
Sin.: *Baccharis radicans* DC.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MAL, MON, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 3435* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 8801* (FLOR, HBR, RB)]; URY[*Alonso Paz, E. 3603* (MVFQ), *Cabrera, A. L. 7136* (LP), *Rosengurtt, B. 157b* (LP)].

Baccharis gracilis DC.
Sin.: *Neomolina gracilis* (DC.) F.H. Hellwig
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 50834* (SI), *Reitz, P. R. 5258* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4695* (MO)].

Baccharis gracillima Heering ex Dusén = **Baccharis pentodonta** Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis grandimucronata I.L. Teodoro
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Nativa. 400–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6389* (CTES)]; BRA[*Cabrera, A. L. 12304* (LP)].

Baccharis grisea Baker = **Baccharis caprariifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis grisebachii Hieron.
Sin.: *Baccharis abietina* Kuntze, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *andicola* Hauman
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 2000–3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17700* (LP), *Cabrera, A. L. 8330* (LP), *Krapovickas, A. 47725* (CTES)].

Baccharis grossedentata Heering = **Baccharis darwinii** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis guianensis M.R. Schomb. = **Baccharis leptocephala** DC.
Referencias: Giuliano, D., 2000.

Baccharis halimimorpha DC. = **Baccharis salzmannii** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis hassleriana I.L. Teodoro = **Baccharis frenguellii** Cabrera
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.

Baccharis heeringeana I.L. Teodoro = **Baccharis usterii** Heering
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis helichrysoides DC.
Sin.: *Baccharis leucolepis* Sch. Bip., *Baccharis polyantha* Spreng., hom. illeg.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001, 2005; Heering, W. C. A., 1914; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6732* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 13876* (LP), *Smith, L. B. 11848* (HBR, US)]; PRY[*Soria, N. 3063* (FCQ)].

Baccharis helichrysoides DC. var. *leucopappa* (DC.) Baker = **Baccharis leucopappa** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis hirta DC.
Sin.: *Baccharis prenanthoides* Baker, p.p.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(MAL, MON, RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 34888* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3660* (LP)].

Baccharis hoehneana I.L. Teodoro = **Baccharis cognata** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis holmbergii Hicken = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis hookeriana DC. = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Baccharis humifusa Kunth = **Baccharis alpina** Kunth

Baccharis humilis Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 120* (FLOR, HBR), *Klein, R. M. 9279* (LP)].

Baccharis huydobriana J. Remy, p.p. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis huydobriana J. Remy, p.p. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis hypericifolia Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 35088* (LP)].

Baccharis ibitiensis J.M. Toledo & Barboza = **Baccharis tarchonanthoides** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis icma Stuck. ex Heering = **Baccharis gilliesii** A. Gray
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis illinita DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbolito. Nativa. 700–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 34390* (RB), *Smith, L. B. 11581* (LP), *Smith, L. B. 12168* (HBR, RB, US)]; PRY[*Balansa, B. 970* (LP), *Rojas, T. 6705* (LP)].

Baccharis illinitoides Malag.
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10392a* (G), *Soria, N. 7606* (FCQ)].

Baccharis incarum (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl. = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Baccharis incarum (Wedd.) Heering, comb. superfl. = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Baccharis incarum (Wedd.) Perkins = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Baccharis incarum (Wedd.) Perkins var. *lejia* (Phil.) Cabrera = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis incisa Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis axillaris* DC. var. *acutiloba* DC., *Baccharis axillaris* DC. var. *dentata* DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5538* (HBR, RB), *Reitz, P. R. 16192* (LP)]; URY[*Sellow, F. 3152* (SP)].

Baccharis intermedia DC.
Sin.: *Baccharis gayana* Phil., *Baccharis volckmannii* Phil.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kuschel, G. s.n.* (SGO), *Zöllner, O. 3789* (LP)].

Baccharis intermixta Gardner
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 908* (LP), *Klein, R. M. 2501* (HAS, HBR, RB), *Klein, R. M. 3090* (LP)].

Baccharis involucrata (Phil.) O. Hoffm. = **Baccharis gilliesii** A. Gray
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis involucrata Phil. = **Baccharis rhomboidalis** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis iresinoides Kunth = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis isabelae Soria & Zardini
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1991, 1995.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Soria, N. 4247* (CTES, FCQ, G, LP)].

Baccharis juncea (Lehm.) Desf.
Sin.: *Arrhenachne juncea* Cass., *Baccharis juncea* (Lehm.) Desf. subsp. *clavata* Joch.Müll., *Baccharis subulata* Don ex Hook. & Arn., *Stephananthus junceus* Lehm.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VII, X, RME); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 687* (CORD), *Burkart, A. 22367* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 2098* (LP)]; CHL[*Martin 460* (LP), *Ricardi, M. 3682* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 7776b* (LP)].

Baccharis juncea (Lehm.) Desf. subsp. *clavata* Joch.Müll. = **Baccharis juncea** (Lehm.) Desf.

Baccharis kraussei Heering = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

Baccharis kurtziana Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971b, 1973a, 2005; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 1700–2100 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 2874* (CTES), *Cabrera, A. L. 18054* (LP), *Hunziker, A. T. 22600* (CORD)].

Baccharis lanceolata Kunth = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis lateralis Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M.. 1976.
Arbusto. Nativa. 900–2200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5780* (FLOR, HBR), *Rambo, B. 54494* (LP), *Smith, L. B. 7690* (LP)].

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis floribunda* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth, *Baccharis polyantha* Kunth f. *genuina* Hieron., nom. inval. , *Baccharis polyantha* Kunth var. *macrophylla* Hieron., *Baccharis riparia* Kunth, *Molina latifolia* Ruiz & Pav., *Pingraea latifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Pluchea glabra* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Cuatrecasas, J., 1967, 1969a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto o arbolito. Nativa. 800–2400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8203* (SI), *Cabrera, A. L. 16092* (LP), *Zardini, E. M. 1418* (LP)].

Baccharis laxa Gardner = **Baccharis trinervis** Pers.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis lejia Phil. = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis leptocephala Phil., hom. illeg. = **Baccharis paniculata** DC.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis leptocephala DC.
Sin.: *Baccharis curvifolia* Gardner, *Baccharis guianensis* M.R. Schomb., *Baccharis rufescens* Spreng. var. *leptocephala* (DC.) Baker, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *varians* (Gardner) Baker, *Baccharis varians* Gardner, p.p.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15462* (SI), *Cabrera, A. L. 29156* (LP, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11426* (HBR)]; PRY[*Soria, N. 5810* (FCQ, MO)].

Baccharis leptophylla DC.
Sin.: *Baccharis pseudotenuifolia* I.L. Teodoro var. *leptophylla* (DC.) Giuliano, *Baccharis rufescens* Spreng. var. *ventanicola* auct. non Cabrera, *Baccharis tenuifolia* DC. var. *leptophylla* (DC.) Malme, nom. inval.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Candolle, A. P. de, 1836; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Malme, G. O. A., 1933a; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, PAI, PHA, SPE); URY(COL, MON, PAY, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 78* (LP, SI)]; BRA[*Pires 9461* (LP)]; PRY[*Jiménez, B. 2031* (BM, CTES, G, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 9988* (MVFA)].

Baccharis leptospermoides DC. = **Baccharis dracunculifolia** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis lessingiana DC. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Baccharis leucocephala Dusén
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Moure, P. J. 150* (LP), *Smith, L. B. 8355* (HBR, RB, US)].

Baccharis leucolepis Sch. Bip. = **Baccharis helichrysoides** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis leucopappa DC.
Sin.: *Baccharis helichrysoides* DC. var. *leucopappa* (DC.) Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 800–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9360* (FLOR, HBR, RB), *Matzenbacher, N. I. s.n.* (RB), *Pereira 6678* (RB)].

[Baccharis ligustrina DC.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Baccharis lilloi Heering
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 2000–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14010* (LP), *Hunziker, A. T. 19166* (CORD), *Venturi, S. 4159* (LP)].

Baccharis linearifolia auct. non Pers. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Sin.: *Baccharis callistemoides* Walp., *Baccharis holmbergii* Hicken, *Baccharis lingulata* Kunze ex Less., *Baccharis linifolia* Meyen, *Baccharis montteana* Phil., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn., *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *callistemoides* (Walp.) Heering ex Reiche, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering, *Baccharis rosmarinifolia* Hook. & Arn. var. *subsinuata* DC., *Baccharis subandina* Phil., *Molina linearis* Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5065* (LP), *Cabrera, A. L. 5828* (LP), *Cabrera, A. L. 6124* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 9964* (CONC)].

Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **pycnocephala** F.H. Hellwig
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 6180* (SGO)].

Baccharis lingulata Kunze ex Less. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis linifolia DC., hom. illeg. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis linifolia Meyen = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis linifolia Phil., hom. illeg. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis litoralis Phil. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis longifolia DC. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis longipes Kunze ex DC. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis longipes Kunze ex DC. var. angustissima Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis lucida Meyen = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Baccharis lycioides J. Remy
Sin.: *Baccharis negeri* Heering, *Baccharis valdiviana* Phil.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Debandi 103* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 812* (LP), *Kausel, E. M. L. 4879* (LP)].

Baccharis lymannii G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7418* (HBR, US), *Smith, L. B. 7461* (LP)].

Baccharis macraei Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis macraei* Hook. & Arn. var. *lucida* Heering
Referencias: Hellwig, F. H., 1990; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 5021* (LP), *Mahu, M. 469* (LP)].

Baccharis macraei Hook. & Arn. var. *intermedia* Heering = **Baccharis concava** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis macraei Hook. & Arn. var. *lucida* Heering = **Baccharis macraei** Hook. & Arn.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis macrodonta DC. = **Baccharis dentata** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis magellanica (Lam.) Pers.
Sin.: *Baccharis tricuneata* (L. f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec., *Conyza magellanica* Lam.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a; Cuatrecasas, J., 1969a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. 842* (SI), *Giussani, L. M. 272* (SI), *Iglesias 55* (LP), *Romero 7* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92359* (CONC), *Arroyo, M. T. K. 996348* (CONC, SGO), *Hollermayer, A. 838* (LP), *Maldonado-Bruzzone, R. 58* (LP)].

Baccharis magellanica (Lam.) Pers. var. *subviscosa* Kuntze = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Baccharis magellanica (Lam.) Pers. var. *viscosissima* Kuntze = **Baccharis tola** Phil. subsp. **altiplanicola** F.H. Hellwig
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis marginalis DC. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis marginalis DC. var. *araucana* (Phil.) Heering = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

[Baccharis marginalis DC. var. caerulescens Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis marginalis DC. var. *linifolia* Heering = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

Baccharis marginalis DC. var. *longipes* (DC.) Heering ex Reiche = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis marginalis DC. var. viminea Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis maritima Baker = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**

Baccharis mattogrossensis Heering ex Malme = **Baccharis flexuosa** Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis medullosa DC. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis medullosa DC. f. gracilis Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis medullosa DC. var. *latifolia* Hieron. ex Heering = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis megapotamica Spreng. var. **megapotamica**
Sin.: *Baccharis pyramidalis* Gardner
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, GUA); URY(RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15725* (LP), *Schwarz, G. J. 7663* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 32458* (LP), *Reitz, P. R. 12250* (HBR, RB), *Reitz, P. R. 12359* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 5802* (LP), *Schinini, A. 27948* (CTES), *Schinini, A. 9140* (LP)]; URY[*Del Puerto, O. 11075* (LP)].

Baccharis megapotamica Spreng. var. **weirii** (Baker) G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis weirii* Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 700–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 388* (LP), *Reitz, P. R. 13390* (LP), *Smith, L. B. 13639* (HBR, US)].

Baccharis melanopotamica Speg.
Sin.: *Baccharis dusenii* O. Hoffm.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10802* (LP), *Hunziker, A. T. 13152* (CORD), *Schwabe, H. 2100* (LP)].

Baccharis melastomifolia Hook. & Arn. = **Baccharis punctulata** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis mendes-magalhaensis Barreto, nom. nud. = **Baccharis microcephala** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis meridensis Steyerm. = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **brachylaenoides**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis meridionalis Heering & Dusén = **Baccharis microdonta** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis mesoneura DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.
Arbusto. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9190* (HBR, RB)].

Baccharis microcephala (Less.) DC.
Sin.: *Baccharis mendes-magalhaensis* Barreto, nom. nud., *Baccharis microptera* Baker, *Molina microcephala* Less.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Huidobro 4667* (LP), *Schinini, A. 9795* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 3701* (LP), *Reitz, P. R. 12338* (HBR, RB)]; PRY[*Balansa, B. 828* (LP), *Rojas, T. 9583* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 13611* (LP)].

Baccharis microdonta DC.
Sin.: *Baccharis meridionalis* Heering & Dusén, *Baccharis refracta* Burch. ex Baker, *Baccharis sebastianopolitana* Baker
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 4210* (LP), *Zuloaga, F. O. 6665* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14587* (LP), *Reitz, P. R. 14802* (HAS, HBR, RB)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1224* (LP)].

Baccharis microphylla Kunth var. *incarum* Wedd. = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Baccharis micropoda Baker = **Baccharis reticularia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis microptera Baker = **Baccharis microcephala** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis microthamna Sch. Bip. ex Baker = **Baccharis selloi** Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis milleflora (Less.) DC.
Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *milleflora* (Less.) Baker, *Molina milleflora* Less.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10151* (LP), *Reitz, P. R. 7285* (HAS, HBR, RB), *Tessmann, G. s.n.* (LP)].

Baccharis minutiflora Mart. ex Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1059* (HBR)].

Baccharis mirabilis Heering = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis montana Sch. Bip., nom. nud. = **Baccharis schultzii** Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis montevidensis Spreng. = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Baccharis montteana Phil. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis mucronata Hook. & Arn., hom. illeg. = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.

Baccharis muelleri Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5897* (LP), *Reitz, P. R. 758* (HBR, RB)].

Baccharis multiflosculosa Heering = **Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis multifolia A.S. Oliveira, Deble & Marchiori
Referencias: Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 5580* (MBM)].

Baccharis mylodontis F.H. Hellwig
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 7791* (SGO)].

Baccharis myricifolia DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 10941* (LP), *Smith, L. B. 8490* (HBR, RB, US)].

Baccharis myriocephala DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10984* (HBR, RB)]; PRY[*Zardini, E. M. 3028* (FCQ)]; URY[*Bacle s.n.* (G)].

Baccharis myrsinoides Hook. & Arn. = **Baccharis brevifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis myrtilloides Griseb. = **Baccharis tucumanensis** Hook. & Arn. var. **myrtilloides** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis myrtilloides Griseb. f. *angustifolia* Heering = **Baccharis tucumanensis** Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Heering) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis nana D. Don ex Baker = **Baccharis gilliesii** A. Gray
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis neaei auct. non DC., p.p. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis neaei auct. non DC., p.p. = **Baccharis vernicosa** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis neaei DC.
Sin.: *Baccharis bezanilleana* J. Remy, *Baccharis bezanilleana* J. Remy var. *solisii* (Phil.) Reiche, *Baccharis rhetinodes* Meyen & Walp., *Baccharis solieri* J. Remy, *Baccharis solieri* J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering, *Baccharis solisii* Phil., *Baccharis talcareguensis* Heering ex Reiche, *Baccharis williamsii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14205* (LP, SI), *Ruiz Leal, R. A. 7485* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 19666* (LP), *Ricardi, M. 1022* (LP)].

Baccharis nebulae Malag. & Hatschbach ex A.S. Oliveira & Marchiori
Referencias: Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005a.
Arbusto. Endémica. 1000–1900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17311* (MBM)].

Baccharis negeri Heering = **Baccharis lycioides** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis nemorosa Phil. = **Baccharis rhomboidalis** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis niederleinii Heering var. **niederleinii**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1971b, 1973a; Giuliano, D. A., 2000, 2001, 2003.
Arbusto. Endémica. 1200–1300 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dalmasso, A. D. 1193* (MERL), *Kurtz, F. 15299* (CORD)].

Baccharis niederleinii Heering var. **potrerillana** Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Giuliano, D., 2000, 2001, 2003.
Arbusto. Endémica. 2200–2500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dalmasso, A. D. 1120* (MERL), *Márquez, J. 264* (LP)].

Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis cassiniifolia* auct. non DC., *Baccharis nitida* (Ruiz & Pav.) Pers. f. *angustifolia* Cuatrec., *Baccharis oronocensis* DC., *Baccharis oronocensis* DC. var. *perua* Cuatrec., *Baccharis popayanensis* Hieron., *Baccharis prinoides* Kunth, *Molina nitida* Ruiz & Pav.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967, 1969a.
Arbusto. Nativa. 900–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16226* (LP), *Reitz, P. R. 9708* (HBR, RB)].

Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers. f. *angustifolia* Cuatrec. = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967.

Baccharis nivalis (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.
Sin.: *Heterothalamus nivalis* Wedd., *Lucilia dioica* Phil., *Palenia delfinii* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10458* (LP, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92143* (CONC, SGO), *Barros, E. 7365* (LP)].

Baccharis notosergila Griseb.
Sin.: *Baccharis curtifolia* S. Moore, *Baccharis genistifolia* DC. var. *β* Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); BRA(RGS); PRY(CAU, CEN, COA, PHA); URY(CAS, FLA, FLO, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 769* (LP), *Quarín, C. L. 2311* (CTES, LP)]; BRA[*Dobereiner 838* (RB)]; PRY[*Rojas, T. 5100* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1881* (LP)].

Baccharis nuda (Vell.) DC. = **Baccharis aphylla** (Vell.) DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis nummularia Heering ex Malme
Sin.: *Baccharis barrosoana* Mattos
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbolito. Endémica. 900–2200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 385* (LP), *Reitz, P. R. 7679* (HAS, HBR, PACA, RB), *Smith, L. B. 10137* (LP)].

Baccharis oblanceolata Rusby = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **brachylaenoides**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. var. glabriuscula DC.]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis obovata Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis foliosa* Hook. & Arn., *Baccharis obovata* Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig, *Baccharis umbelliformis* DC., *Baccharis umbelliformis* DC. f. *frigida* Heering, *Baccharis umbelliformis* DC. var. *typica* Heering, nom. inval., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *vulgaris* Heering
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 3618* (LP), *Cabrera, A. L. 20467* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 5465* (LP)].

Baccharis obovata Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera = **Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **poeppigiana**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis obovata Hook. & Arn. subsp. *umbelliformis* (DC.) F.H. Hellwig = **Baccharis obovata** Hook. & Arn.

Baccharis ocellata Phil. = **Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **ocellata** (Phil.) F.H. Hellwig
Referencias: Giuliano, D. A., 1999.

Baccharis ochracea Spreng.
Sin.: *Baccharis velutina* DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*sin colector s.n.* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 46572* (LP), *Smith, L. B. 11379* (HBR, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 5079b* (LP)].

Baccharis oleifolia Gardner = **Baccharis calvescens** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis organensis Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbolito. Nativa. 800–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15081* (LP), *Reitz, P. R. 10335* (HBR, RB), *Reitz, P. R. 7829* (LP)].

Baccharis orgyalis DC. = **Baccharis dentata** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis oronocensis DC. = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967.

Baccharis oronocensis DC. var. *perua* Cuatrec. = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967.

Baccharis oxyodonta DC.
Sin.: *Baccharis triplinervia* DC., *Pingraea oxyodonta* (DC.) F.H. Hellwig
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Heering, W. C. A., 1914.
Arbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN, GUA, PAI); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2564* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 14607* (LP), *Reitz, P. R. 4530* (HBR, PACA, RB)]; PRY[*Rojas, T. 3898* (LP)]; URY[*García Zorrón, N. 272* (LP)].

Baccharis oxyodonta DC. var. *punctulata* (DC.) Baker = **Baccharis punctulata** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis palenae Phil. = **Baccharis patagonica** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pallida Heering = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

Baccharis palustris Heering
Referencias: Heering, W. C. A., 1904.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 52024* (LP)].

Baccharis paniculata DC.
Sin.: *Baccharis floribunda* Phil., hom. illeg., *Baccharis leptocephala* Phil., hom. illeg., *Baccharis philippii* Heering, *Nardophyllum paniculatum* Phil., *Neomolina paniculata* (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Crisci, J. V. 385* (LP), *Jiles P., G. 2728* (LP)].

Baccharis paranaensis Heering & Dusén
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14394* (LP), *Reitz, P. R. 6771* (HBR, RB)].

Baccharis parviflora (Ruiz & Pav.) Pers. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis patagonica Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis cuneifolia* (Lam.) DC., hom. illeg., *Baccharis palenae* Phil., *Baccharis patagonica* Hook. & Arn. subsp. *palenae* (Phil.) F.H. Hellwig, *Baccharis patagonica* Hook. & Arn. var. *palenae* (Phil.) Reiche, *Chrysocoma cuneifolia* Jacq., *Conyza cuneifolia* Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 1622* (LP), *Hicken, C. M. 7990* (LP, SI)]; CHL[*Alboff, N. 120* (LP)].

Baccharis patagonica Hook. & Arn. var. *palenae* (Phil.) Reiche = **Baccharis patagonica** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis patagonica Hook. & Arn. subsp. *palenae* (Phil.) F.H. Hellwig = **Baccharis patagonica** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis patens Baker
Sin.: *Baccharis bakeri* Heering, *Baccharis squarrosa* Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(LAV, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 48809* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3604* (LP), *Rosengurtt, B. 162b* (LP)].

Baccharis paucidentata DC. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis paucidentata Sch. Bip., nom. nud. = **Baccharis dracunculifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis paucifloscula DC.
Sin.: *Baccharis subincisa* Heering & Dusén
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5499* (HBR), *Smith, L. B. 12041* (LP)].

Baccharis pauciflosculosa DC. var. *puncticulata* DC. = **Baccharis tridentata** Vahl
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pedersenii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Fontana, J. L., 1998; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE); PRY(COA, GUA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 3826* (LP), *Schinini, A. 8303* (LP), *Vanni, R. O. 1491* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 14585* (CTES)].

Baccharis pedicellata DC. = **Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **poeppigiana**
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis pendula Heering = **Baccharis flexuosa** Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis penningtonii Heering
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE); URY(CAS, COL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1508* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3924* (LP), *Legrand, C. M. D. H. 115* (LP)].

Baccharis pentlandii DC. subsp. *sculpta* (Griseb.) Joch.Müll. = **Baccharis sculpta** Griseb.

Baccharis pentodonta Malme
Sin.: *Baccharis gracillima* Heering ex Dusén, *Baccharis pluridentata* Heering
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18808* (LP), *Smith, L. B. 12101* (HAS, HBR, RB, US)]; PRY[*Balansa, B. 977* (G)].

Baccharis pentziifolia Sch. Bip. ex Baker var. **minor** G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pereira 5460* (RB), *Rambo, B. 48697* (HBR)].

Baccharis pentziifolia Sch. Bip. ex Baker var. **pentziifolia**
Sin.: *Baccharis praemorsa* Heering, nom. nud., *Baccharis sphenophylla* Dusén ex Malme, *Baccharis subumbelliformis* Heering ex Malme
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brade, A. C. 12179* (R), *Hatschbach, G. 29230* (MVM)].

Baccharis perplexa I.L. Teodoro & J.E. Vidal = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis perulata Kuntze
Sin.: *Baccharis densiflora* Wedd. subsp. *perulata* (Kuntze) Joch.Müll.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Nativa. 1200–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21019* (LP), *Cabrera, A. L. 24217* (LP)].

Baccharis petiolata DC. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis petiolata DC. var. *rotundifolia* Phil. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Hellwig, F. H., 1988.

Baccharis petraea Heering
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Giuliano, D. A., 2000; Heering, W. C. A., 1904; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI); URY(FLA, FLO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15446* (SI), *Roig, F. A. 4134* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 9575* (LP), *Weddell, H. A. 2192* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 2873* (LP), *Soria, N. 2325* (FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 1524b* (LP)].

Baccharis petrophila R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 3300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22452* (LP), *Sleumer, H. O. 3297* (SI)].

Baccharis philippii Heering = **Baccharis paniculata** DC.

Baccharis phylicifolia DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5908* (FLOR, HBR, RB)].

Baccharis phyliciformis Meyen = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Baccharis phyteuma Heering
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1636* (LP), *Hunziker, A. T. 900* (CORD), *Lanfranchi, A. E. 755* (LP)].

Baccharis phyteumoides (Less.) DC.
Sin.: *Molina phyteumoides* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Lombardo, A., 1983; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(ÑEE); URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10515* (LP)]; BRA[*Maria, E. s.n.* (SP)]; PRY[*Bonpland, A. J. A. s.n.* (LP)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (LP)].

Baccharis pilcensis F.H. Hellwig
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 1600–2200 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 10219* (SGO)].

Baccharis pingraea DC. f. *latifolia* DC. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pingraea DC. var. **angustissima** DC.
Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering, p.p.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SFE, SJU, SLU); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, CLA, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 383* (CORD, LP)]; CHL[*Barros, E. 3849* (LP)]; URY[*Rosa-Mato 423* (LP), *Rosengurtt, B. 1225b* (LP)].

Baccharis pingraea DC. var. **pingraea**
Sin.: *Baccharis angustifolia* Desf., hom. illeg., *Baccharis huydobriana* J. Remy, p.p., *Baccharis litoralis* Phil., *Baccharis medullosa* DC., *Baccharis medullosa* DC. var. *latifolia* Hieron. ex Heering, *Baccharis pingraea* DC. f. *latifolia* DC., *Baccharis prenanthoides* Baker, p.p., *Baccharis serrulata* (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker, *Baccharis subpingraea* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering f. *crassifolia* Heering, p.p., *Conyza montevidensis* Spreng., *Pingraea angustifolia* Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Haene, H. 1960* (LP, SI)]; BRA[*Rambo, B. 2340* (LP), *Rambo, B. 49959* (HAS, HBR, RB)]; CHL[*Barros, E. 1747* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 4238* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 3865* (LP)].

Baccharis pinnatifida Klatt = **Baccharis ulicina** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Baccharis platensis Spreng. = **Baccharis spicata** (Lam.) Baill.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis plucheiformis Kuntze = **Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pluridentata Heering = **Baccharis pentodonta** Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis poeppigiana DC. subsp. **austropedicellata** F.H. Hellwig
Referencias: Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6205* (LP), *Cabrera, A. L. 6206* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 3681* (LP)].

Baccharis poeppigiana DC. subsp. **ocellata** (Phil.) F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis ocellata* Phil., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10886* (SI)]; CHL[*Barros, E. 204* (LP), *Cabrera, A. L. 3588* (LP)].

Baccharis poeppigiana DC. subsp. **poeppigiana**
Sin.: *Baccharis obovata* Hook. & Arn. var. *poeppigiana* (DC.) Cabrera, *Baccharis pedicellata* DC., *Baccharis umbelliformis* DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 4476* (LP)].

Baccharis polifolia Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Apochian, C. 267* (SI), *Cabrera, A. L. 12144* (LP), *Reales, A. 1769* (LP)].

Baccharis polyantha Kunth = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis polyantha Spreng., hom. illeg. = **Baccharis helichrysoides** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis polyantha Kunth f. *genuina* Hieron., nom. inval. = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis polyantha Kunth var. *macrophylla* Hieron. = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis polycephala auct. non Wedd. = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis polycephala Sch. Bip., nom. nud. = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis polygama Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 2200–3400 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1231* (LP, SI), *Rodríguez, F. M. 1232* (LIL)].

Baccharis polyptera DC. = **Pterocaulon polypterum** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Baccharis popayanensis Hieron. = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967.

Baccharis praemorsa Heering, nom. nud. = **Baccharis pentziifolia** Sch. Bip. ex Baker var. **pentziifolia**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis prenanthoides Baker, p.p. = **Baccharis hirta** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis prenanthoides Baker, p.p. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis prinoides Kunth = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967.

Baccharis psammophila Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 41007* (LP), *Reitz, P. R. 635* (LP)].

Baccharis pseudomyriocephala I.L. Teodoro
Sin.: *Baccharidastrum myriocephala* Baker, hom. illeg.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18753* (LP), *Klein, R. M. 5909* (FLOR, HBR, RB)].

Baccharis pseudoserrulata I.L. Teodoro = **Baccharis vulneraria** Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pseudotenuifolia I.L. Teodoro
Sin.: *Baccharis rufescens* Spreng. var. *tenuifolia* (DC.) Baker, nom. inval., *Baccharis tenuifolia* DC., hom. illeg.
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Huidobro, A. M. 4790* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 12111* (HBR, US)]; PRY[*Soria, N. 6204* (FCQ, MO)].

Baccharis pseudotenuifolia I.L. Teodoro var. *leptophylla* (DC.) Giuliano = **Baccharis leptophylla** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pseudotridentata Heering = **Baccharis vernicosa** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pseudovillosa I.L. Teodoro
Sin.: *Baccharis villosa* Heering, hom. illeg.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 500–1900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 36249* (LP), *Smith, L. B. 10491* (HBR, US)].

Baccharis psiadioides (Less.) Joch.Müll. = **Heterothalamus psiadioides** Less.

Baccharis puberula DC. = **Baccharis erigeroides** DC. var. **dusenii** Heering
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis pulchella Sch. Bip. ex Griseb.
Sin.: *Baccharis multiflosculosa* Heering, *Baccharis plucheiformis* Kuntze, *Baccharis pulchella* Sch. Bip. ex Griseb. var. *grisea* Heering, *Baccharis subsculpta* Hochr., *Neomolina pulchella* (Sch. Bip. ex Griseb.) Hellwig
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Heering, W. C. A., 1914; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 100–3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 341* (CORD), *Cabrera, A. L. 24075* (LP)].

Baccharis pulchella Sch. Bip. ex Griseb. var. *grisea* Heering = **Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis punctulata DC.
Sin.: *Baccharis amygdalina* Griseb., *Baccharis melastomifolia* Hook. & Arn., *Baccharis oxyodonta* DC. var. *punctulata* (DC.) Baker, *Pingraea punctulata* (DC.) Hellwig
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(ART, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 5896* (LP)]; BRA[*Palacios, M. A. 1123* (LP), *Smith, L. B. 11317* (HBR, RB, US), *Smith, L. B. 11979* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4151* (LP), *Soria, N. 7672* (FCQ, MO)]; URY[*Cabrera, A. L. 32363* (LP)].

Baccharis purpurascens Heering = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis pycnantha Phil.
Sin.: *Pingraea pycnantha* (Phil.) F.H. Hellwig
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP)].

Baccharis pyramidalis Gardner = **Baccharis megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis quadrangularis Meyen = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC.
Sin.: *Baccharis eupatorioides* Hook. & Arn., *Baccharis fastigiata* Phil. ex Reiche, *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. superfl., *Baccharis racemosa* (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Molina racemosa* Ruiz & Pav., *Neomolina racemosa* (Ruiz & Pav.) Hellwig

Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6558* (LP)]; CHL[*de la Sota, E. R. 2229* (LP), *Gunckel, L. H. 15562* (LP)].

[Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. angolensis Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Heering ex Reiche, comb. superfl. = **Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. *eupatorioides* (Hook. & Arn.) Kuntze = **Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.

[Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. integerrima Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

[Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. obtusifolia Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

[Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. riparia Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

[Baccharis racemosa (Ruiz & Pav.) DC. var. urvillei Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis radicans DC. = **Baccharis gnaphalioides** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Baccharis radin Phil. = **Baccharis sphaerocephala** Hook. & Arn.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis recurvata Gardner = **Baccharis caprariifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis refracta Burch. ex Baker = **Baccharis microdonta** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis retamoides Phil.
Sin.: *Pseudobaccharis retamoides* (Phil.) Cabrera, *Psila retamoides* (Phil.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1944a, 1955c; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 900–3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1180* (LP), *Hunziker, J. H. 1786* (LP)].

Baccharis reticularia DC.
Sin.: *Baccharis arctostaphylloides* Baker, *Baccharis bahiensis* Baker, *Baccharis clausseni* Baker, *Baccharis micropoda* Baker, *Baccharis vauthieri* DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Arbolito. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6308* (LP), *Reitz, P. R. 10930* (HBR, RB), *Reitz, P. R. 1276* (LP)].

Baccharis retusa DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbolito. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 29602* (LP), *Smith, L. B. 11286* (HBR, RB, US)]; PRY[*Hassler, E. 356a* (G)].

Baccharis rhetinodes Meyen & Walp. = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rhexioides Kunth
Sin.: *Baccharis cinerea* DC., *Baccharis rhexioides* Kunth var. *parvifolia* Hieron., *Baccharis trichoclada* DC., *Baccharis trinervis* Pers. var. *rhexioides* (Kunth) Baker, *Baccharis venusta* Kunth, *Conyza trinervia* Mill., *Pingraea rhexioides* (Kunth) F.H. Hellwig, *Pseudobaccharis rhexioides* (Kunth) V.M. Badillo
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1978; Cuatrecasas, J., 1967; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13831* (LP), *Fabris, H. A. 7241* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 5430* (FCQ, MO)].

Baccharis rhexioides Kunth var. *parvifolia* Hieron. = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rhomboidalis J. Remy
Sin.: *Baccharis involucrata* Phil., *Baccharis nemorosa* Phil., *Baccharis rhomboidalis* J. Remy subsp. *truncata* (Phil.) F.H. Hellwig, *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche, *Baccharis rhomboidalis* J. Remy var. *truncata* (Phil.) Heering, *Baccharis truncata* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990.

Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(III, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 3321* (BAB, LP), *Stuessy, T. F. 6776* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1752* (LP)].

Baccharis rhomboidalis J. Remy var. *nemorosa* (Phil.) Heering ex Reiche = **Baccharis rhomboidalis** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rhomboidalis J. Remy var. *truncata* (Phil.) Heering = **Baccharis rhomboidalis** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rhomboidalis J. Remy subsp. *truncata* (Phil.) F.H. Hellwig = **Baccharis rhomboidalis** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis riedelli Sch. Bip., nom. nud. = **Baccharis cassiniifolia** DC.

Baccharis riograndensis I.L. Teodoro & J.E. Vidal
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Irmão Teodoro Luis s.n.* (SI)].

Baccharis riparia Kunth = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rodriguezii Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973b; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4143* (LP)].

Baccharis rosmarinifolia Hook. & Arn. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rosmarinifolia Hook. & Arn. var. *andicola* Hauman = **Baccharis grisebachii** Hieron.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rosmarinifolia Hook. & Arn. var. *callistemoides* (Walp.) Heering ex Reiche = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rosmarinifolia Hook. & Arn. var. *subandina* (Phil.) Heering = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rosmarinifolia Hook. & Arn. var. *subsinuata* DC. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rotundifolia Spreng. = **Baccharis sessiliflora** Vahl
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rotundifolia Spreng. var. *stuckertii* Heering = **Baccharis sessiliflora** Vahl
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rufescens Spreng. var. *leptocephala* (DC.) Baker = **Baccharis leptocephala** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rufescens Spreng. var. **rufescens**
Sin.: *Baccharis baldwinii* Hook. & Arn., *Baccharis denticulata* D. Don ex DC., *Baccharis fluminensis* Glaz. ex I.L. Teodoro, nom. nud., *Baccharis linearifolia* auct. non Pers., *Baccharis maritima* Baker, *Baccharis neaei* auct. non DC., p.p., *Baccharis paucidentata* DC., *Baccharis polycephala* auct. non Wedd., *Baccharis rufescens* Spreng. var. *subrufescens* (Heering) Ariza, *Baccharis santiaguensis* Heering, *Baccharis subrufescens* Heering
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Lombardo, A., 1983; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CEN, COA, PAI); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21847* (LP)]; BRA[*Bresolin, A. 201* (LP), *Smith, L. B. 11426* (HBR, RB, US)]; PRY[*Schinini, A. 1220* (LP)]; URY[*Alonso Paz, E. 3629* (MVFQ), *Cabrera, A. L. 7117* (LP)].

Baccharis rufescens Spreng. var. *subrufescens* (Heering) Ariza = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rufescens Spreng. var. *tenuifolia* (DC.) Baker, nom. inval. = **Baccharis pseudotenuifolia** I.L. Teodoro
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rufescens Spreng. var. *varians* (Gardner) Baker = **Baccharis leptocephala** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis rufescens Spreng. var. *ventanicola* auct. non Cabrera = **Baccharis leptophylla** DC.

Baccharis rufescens Spreng. var. **ventanicola** Cabrera
Sin.: *Baccharis ventanicola* (Cabrera) Soria & Zardini
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pertusi, L. 316* (LP)].

Baccharis rupestris Heering
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14056* (LP)].

Baccharis sagittalis (Less.) DC.
Sin.: *Baccharis chubutensis* Speg., *Molina sagittalis* Less., *Pingraea sagittalis* (Less.) F.H. Hellwig
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–2400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6472* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1868* (LP)].

Baccharis sagittalis (Less.) DC. var. *montevidensis* Baker = **Baccharis brachystachys** (Baker) I.L. Teodoro & J.E. Vidal
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis alamanii* DC., *Baccharis araucana* Phil., *Baccharis chilquilla* DC., *Baccharis coerulescens* DC., *Baccharis cuervii* Phil., *Baccharis farinosa* Spreng., *Baccharis glutinosa* Pers., *Baccharis glutinosa* Pers. var. *incisa* Heering, *Baccharis huydobriana* J. Remy, p.p., *Baccharis iresinoides* Kunth, *Baccharis kraussei* Heering, *Baccharis lanceolata* Kunth, *Baccharis linifolia* DC., hom. illeg., *Baccharis linifolia* Phil., hom. illeg., *Baccharis longifolia* DC., *Baccharis longipes* Kunze ex DC., *Baccharis marginalis* DC., *Baccharis marginalis* DC. var. *araucana* (Phil.) Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *linifolia* Heering, *Baccharis marginalis* DC. var. *longipes* (DC.) Heering ex Reiche, *Baccharis pallida* Heering, *Baccharis parviflora* (Ruiz & Pav.) Pers., *Baccharis purpurascens* Heering, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Baccharis viscosa* (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze, *Molina parviflora* Ruiz & Pav., *Molina salicifolia* Ruiz & Pav., *Molina striata* Ruiz & Pav., *Molina viscosa* Ruiz & Pav., *Pingraea marginalis* (DC.) F.H. Hellwig, *Pingraea salicifolia* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig, *Pingraea viscosa* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Cuatrecasas, J., 1969a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, CEN, PHA); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 20647* (LP), *Vanni, R. O. 3584* (CTES)]; CHL[*Mahu, M. 5628* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 5124* (CTES, FCQ, MO), *Schinini, A. 16507* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3767* (LP)].

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.) Joch.Müll. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.

Baccharis saltensis Baker = **Baccharis subopposita** DC.

Baccharis salzmannii DC.
Sin.: *Baccharis halimimorpha* DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 51371* (LP)].

Baccharis samensis Joch.Müll.
Referencias: Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 3400–3800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 6728* (G)].

Baccharis santelicis Phil. subsp. **chrysophylla** F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis tola* Phil. var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch.Müll.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 3000–4600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 7957* (M)].

Baccharis santelicis Phil. subsp. **santelicis**
Sin.: *Baccharis tola* Phil. subsp. *santelicis* (Phil.) Joch.Müll.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 1900–4800 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 2682* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1723* (LP), *Levi Heins 56* (LP)].

Baccharis santiaguensis Heering = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis sarophora Phil. = **Baccharis spartioides** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis scandens (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Baccharis adscendens* Pers., *Baccharis calliprinos* Griseb., *Baccharis fevillei* DC., *Baccharis mirabilis* Heering, *Baccharis petiolata* DC., *Baccharis petiolata* DC. var. *rotundifolia* Phil., *Baccharis salicifolia* (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. *calliprinos* (Griseb.) Joch.Müll., *Molina scandens* Ruiz & Pav., *Pingraea scandens* (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1988.
Arbusto. Nativa. 1400–3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, TUC); CHL(I, II).

Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 12744* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 1941* (LP), *Ricardi, M. 317* (LP)].

Baccharis schultzii Baker
Sin.: *Baccharis montana* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 700–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9753* (FLOR, HBR)].

Baccharis sculpta Griseb.
Sin.: *Baccharis pentlandii* DC. subsp. *sculpta* (Griseb.) Joch.Müll., *Pluchea montana* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 1800–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12947* (LP)].

Baccharis sebastianopolitana Baker = **Baccharis microdonta** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis selloi Baker
Sin.: *Baccharis microthamna* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 54505* (LP), *Smith, L. B. 13045* (HBR, RB, US)].

Baccharis semiserrata DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1776* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 161* (LP), *Klein, R. M. 339* (HAS, HBR, RB), *Reitz, P. R. 13558* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12698* (LP), *Montes, J. E. 12996* (LP)].

Baccharis semiserrata DC. var. *elaeagnoides* (Steud. ex Baker) Barroso = **Baccharis elaeagnoides** Steud. ex Baker
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis senicola Mart. = **Baccharis singularis** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis serrulata DC., hom. illeg. = **Baccharis vulneraria** Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis serrulata (Lam.) Pers. var. linearis Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis serrulata (Lam.) Pers. var. *pingraea* (DC.) Baker = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis serrulata (Lam.) Pers. var. subscandens Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis sessiliflora Vahl
Sin.: *Baccharis cordobensis* Heering, *Baccharis rotundifolia* Spreng., *Baccharis rotundifolia* Spreng. var. *stuckertii* Heering, *Baccharis sessiliflora* Vahl var. *stuckertii* (Heering) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAU, CEN, PHA); URY(MAL, PAY, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz 221* (LP)]; BRA[*Irmão Teodoro Luis 3189* (LP), *Smith, L. B. 12227* (HBR, RB, US)]; PRY[*Rojas, T. 2986* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 4665b* (LP)].

Baccharis sessiliflora Vahl var. *stuckertii* (Heering) Cabrera = **Baccharis sessiliflora** Vahl
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis sessilifolia DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1960.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1828* (LP), *Barros, E. 1846* (LP)].

[Baccharis sessilifolia DC. var. hebeclada DC.]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis singularis (Vell.) G.M. Barroso
Sin.: *Baccharis daphnoides* Hook. & Arn., *Baccharis senicola* Mart., *Chrysocoma purpurea* Vell., *Chrysocoma singularis* Vell.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1566* (LP), *Reitz, P. R. 501* (HAS, HBR, PACA, RB), *Stellfeld, C. 1303* (SP)].

Baccharis solieri J. Remy = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis solieri J. Remy var. *williamsii* (Phil.) Heering = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis solisii Phil. = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
Sin.: *Baccharis sarophora* Phil., *Heterothalamus spartioides* Hook. & Arn. ex DC., *Pseudobaccharis spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera, *Psila spartioides* (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1955c, 1963a, 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1825* (CORD), *Hunziker, A. T. 4205* (CORD), *Piccinini, B. 2109* (BAB)]; CHL[*Zöllner, O. 2996* (LP)].

Baccharis sphaerocephala Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis radin* Phil., *Pingraea sphaerocephala* (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig
Referencias: Heering, W. C. A., 1902.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hollermayer, A. 517b* (LP), *Kausel, E. M. L. 4796* (LP)].

Baccharis sphenophylla Dusén ex Malme = **Baccharis pentziifolia** Sch. Bip. ex Baker var. **pentziifolia**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis spicata (Lam.) Baill.
Sin.: *Baccharis attenuata* Don ex Hook. & Arn., *Baccharis platensis* Spreng., *Eupatorium spicatum* Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI, PHA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 6382* (LP)]; BRA[*Irmão Ligorio Alfonso s.n.* (LP), *Rambo, B. 539* (HAS, HBR, RB, SP), *Reitz, P. R. 9553* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 740* (LP)]; URY[*Clos, E. C. 5012* (LP), *Fruchard, M. s.n.* (LP)].

Baccharis squarrosa Baker = **Baccharis patens** Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis stenocephala Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6396* (LP), *Smith, L. B. 12102* (HBR, RB, US)].

Baccharis stenophylla Ariza
Sin.: *Baccharis subpingraea* Heering f. *nana* Heering, *Baccharis subpingraea* Heering f. *pseudoulicina* Heering
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Troiani, H. O., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, SFE, SLU); URY(COL, FLO, FLA, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigo 2282* (LP)]; URY[*Pedersen, T. M. 8024* (LP)].

Baccharis strobeliana Ces. = **Baccharis ulicina** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Baccharis subandina Phil. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis subcapitata Gardner = **Baccharis subdentata** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis subdentata DC.
Sin.: *Baccharis subcapitata* Gardner
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18860* (LP), *Smith, L. B. 12213* (HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 5173* (AS)].

Baccharis subincisa Heering & Dusén = **Baccharis paucifloscula** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis subintegrifolia Sch. Bip., nom. nud. = **Baccharis erioclada** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Baccharis subopposita DC.
Sin.: *Baccharis saltensis* Baker, *Baccharis tridentata* Vahl var. *subopposita* (DC.) Cabrera, *Baccharis tweediei* Hook. & Arn., p.p.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, CON, MIE); URY(MAL, MON, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frangi, J. L. 380* (LP), *Montes, J. E. 1739* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 18466* (LP), *Smith, L. B. 11943* (LP)]; PRY[*Bridarolli, A. J. 3734* (LP), Montes, J. E. 11072 (LP)]; URY[*Berro, M. B. 8015* (MVFA)].

Baccharis subopposita DC. var. *affinis* (DC.) Baker = **Baccharis tridentata** Vahl
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis subpingraea Heering = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis subpingraea Heering f. borealis Heering]
Notas: Nombre dudoso.

[Baccharis subpingraea Heering f. ciliatodentata Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis subpingraea Heering f. *crassifolia* Heering, p.p. = **Baccharis pingraea** DC. var. **angustissima** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis subpingraea Heering f. *crassifolia* Heering, p.p. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis subpingraea Heering f. crassinervis Heering]
Notas: Nombre dudoso.

[Baccharis subpingraea Heering f. montevidensis Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis subpingraea Heering f. *nana* Heering = **Baccharis stenophylla** Ariza
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis subpingraea Heering f. *pseudoulicina* Heering = **Baccharis stenophylla** Ariza
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

[Baccharis subpingraea Heering f. punctulata Heering]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis subrufescens Heering = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **rufescens**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis subsculpta Hochr. = **Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.
Referencias: Granda Paucar, A. & Giuliano, D. A., 2004.

Baccharis subulata Don ex Hook. & Arn. = **Baccharis juncea** (Lehm.) Desf.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis subumbelliformis Heering ex Malme = **Baccharis pentziifolia** Sch. Bip. ex Baker var. **pentziifolia**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis tafiensis Heering = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**
Referencias: Müller, J., 2006.

Baccharis talcareguensis Heering ex Reiche = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis taltalensis I.M. Johnst.
Sin.: *Neomolina taltalensis* (I.M. Johnst.) F.H. Hellwig, nom. illeg.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 300–900 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1728* (LP), *Cabrera, A. L. 11344* (LP)].

Baccharis tandilensis Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20784* (LP), *Torres, M. A. 1113* (LP)].

Baccharis tarchonanthoides DC.
Sin.: *Baccharis ibitiensis* J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11656* (LP), *Hatschbach, G. 17582* (LP)].

Baccharis tenella Hook. & Arn.
Sin.: *Heterothalamus tenellus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Pseudobaccharis tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Psila tenella* (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1955c, 1963a, 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18644* (LP), *Hunziker, A. T. 4251* (CORD), *Ruíz Leal, R. A. 24054* (LP)].

Baccharis tenuifolia DC., hom. illeg. = **Baccharis pseudotenuifolia** I.L. Teodoro
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis tenuifolia DC. var. *leptophylla* (DC.) Malme, nom. inval. = **Baccharis leptophylla** DC.

Baccharis thymifolia Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000, 2001; Heering, W. C. A., 1914; Ruíz Leal, R. A. & Roig, F. A., 1965.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19643* (LP), *Cuezzo, A. R. 1956* (LP)].

Baccharis tola Phil. var. *chrysophylla* (F.H. Hellwig) Joch.Müll. = **Baccharis santelicis** Phil. subsp. **chrysophylla** F.H. Hellwig

Baccharis tola Phil. var. *incarum* (Wedd.) Joch.Müll. = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**

Baccharis tola Phil. var. *lejia* (Phil.) Reiche = **Baccharis tola** Phil. subsp. **tola**
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis tola Phil. var. *viscosissima* (Kuntze) Joch.Müll. = **Baccharis tola** Phil. subsp. **altiplanicola** F.H. Hellwig

Baccharis tola Phil. subsp. **altiplanicola** F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *viscosissima* Kuntze, *Baccharis tola* Phil. var. *viscosissima* (Kuntze) Joch.Müll.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Hellwig, F. H., 1990; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 3100–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 5660* (M)].

Baccharis tola Phil. subsp. **fimbriata** Joch.Müll.
Referencias: Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 2700–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15429* (LP)].

Baccharis tola Phil. subsp. *santelicis* (Phil.) Joch.Müll. = **Baccharis santelicis** Phil. subsp. **santelicis**

Baccharis tola Phil. subsp. **tola**
Sin.: *Baccharis incarum* (Wedd.) Cuatrec., comb. superfl., *Baccharis incarum* (Wedd.) Heering, comb. superfl., *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins, *Baccharis incarum* (Wedd.) Perkins var. *lejia* (Phil.) Cabrera, *Baccharis lejia* Phil., *Baccharis magellanica* (Lam.) Pers. var. *subviscosa* Kuntze, *Baccharis microphylla* Kunth var. *incarum* Wedd., *Baccharis tafiensis* Heering, *Baccharis tola* Phil. var. *incarum* (Wedd.) Joch.Müll., *Baccharis tola* Phil. var. *lejia* (Phil.) Reiche
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Hellwig, F. H., 1990; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 2200–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7818* (LP), *Haene, H. 1626* (LP, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 1395* (LP)].

Baccharis tomentosa Thunb. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

[Baccharis toxicaria Rojas Acosta]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis triangularis Hauman
Sin.: *Baccharis trimera* (Less.) DC. var. *viscosissima* Speg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 4067* (CORD), *Cabrera, A. L. 25406* (LP), *Villamil, C. B. 5643* (LP)].

Baccharis trichoclada DC. = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis tricuneata (L. f.) Pers. var. *magellanica* (Lam.) Cuatrec. = **Baccharis magellanica** (Lam.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis tridentata Vahl
Sin.: *Baccharis affinis* DC., *Baccharis dentosa* Mart., nom. nud., *Baccharis paucifloscula* DC. var. *puncticulata* DC., *Baccharis subopposita* DC. var. *affinis* (DC.) Baker, *Baccharis tweediei* Hook. & Arn., p.p.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a; Giuliano, D. A., 2000, 2001, 2005; Müller, J., 2006.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, MIE); URY(CAS, LAV, MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24944* (LP), *Cabrera, A. L. 6568* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 802* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 971a* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 4027* (LP)].

Baccharis tridentata Vahl var. *deltoidea* (Baker) Heering = **Baccharis deltoidea** Baker

Baccharis tridentata Vahl var. *subopposita* (DC.) Cabrera = **Baccharis subopposita** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis trilobata A.S. Oliveira & Marchiori
Referencias: Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2006.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Baccharis trimera (Less.) DC.
Sin.: *Baccharis genistelloides* (Lam.) Pers. var. *trimera* (Less.) Baker, *Molina trimera* Less.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Cuatrecasas, J., 1967; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Mereles, F., 2001; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1693* (LP), *Montes, J. E. 3869* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 6950* (HBR), *Palacios, M. A. 692* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 5982* (LP), *Schinini, A. 27794* (CTES)]; URY[*Alonso Paz, E. 3605* (MVFQ), *Cabrera, A. L. 7135* (LP)].

Baccharis trimera (Less.) DC. var. *viscosissima* Speg. = **Baccharis triangularis** Hauman
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis trimeroides Malme
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 700–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13364* (LP), *Reitz, P. R. 14180* (LP)].

Baccharis trinervis Pers.
Sin.: *Baccharis laxa* Gardner, *Conyza trinervis* Lam., hom. illeg., *Heterothalamus trinervis* (Pers.) Hook. & Arn., *Pseudobaccharis trinervis* (Pers.) I.L. Teodoro, comb. superfl., *Pseudobaccharis trinervis* (Pers.) V.M. Badillo, *Psila trinervis* (Lam.) Cabrera
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1978; Cuatrecasas, J., 1967; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 17759* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 10960* (LP), *Klein, R. M. 9401* (FLOR, HBR, RB)]; PRY[*Mereles, F. 4632* (CTES, FCQ), *Rojas, T. 6102* (LP)].

Baccharis trinervis Pers. var. *rhexioides* (Kunth) Baker = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis trineura Soria & Zardini
Sin.: *Baccharis triplinervia* (Spreng.) Baker, hom. illeg., *Polypappus triplinervis* (Spreng.) Less., *Vernonia triplinervia* Spreng.
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995, 2001.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hahn, S. 1562* (PY)].

Baccharis triplinervia (Spreng.) Baker, hom. illeg. = **Baccharis trineura** Soria & Zardini
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 2001.

Baccharis triplinervia DC. = **Baccharis oxyodonta** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis truncata Phil. = **Baccharis rhomboidalis** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis tucumanensis Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Heering) Cabrera
Sin.: *Baccharis myrtilloides* Griseb. f. *angustifolia* Heering
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 1000–4000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6910* (LP), *Hunziker, A. T. 9029* (CORD)].

Baccharis tucumanensis Hook. & Arn. var. **myrtilloides** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Baccharis myrtilloides* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 100–3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1328* (LP), *Hunziker, A. T. 1886* (CORD)].

Baccharis tucumanensis Hook. & Arn. var. **tucumanensis**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Giuliano, D. A., 2000, 2001; Müller, J., 2006.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25123* (LP), *Hunziker, A. T. 1885* (CORD), *Rodrigo 2033* (LP)].

Baccharis tweediei Hook. & Arn., p.p. = **Baccharis subopposita** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis tweediei Hook. & Arn., p.p. = **Baccharis tridentata** Vahl
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis uleana Malag.
Referencias: Malagarriga Heras, T. L. R. P., 1977.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1510* (P)].

Baccharis ulicina Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis pinnatifida* Klatt, *Baccharis strobeliana* Ces., *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *humilis* Hook. & Arn., nom. nud., *Baccharis ulicina* Hook. & Arn. var. *multifida* (Griseb.) Kuntze, *Neomolina ulicina* (Hook. & Arn.) Hellwig, *Vittadinia multifida* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973a, 2005; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Giuliano, D. A., 2001; Müller, J., 2006.
Subarbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado 1077* (LP), *Novara, L. J. 9380* (CORD, MCNS)].

Baccharis ulicina Hook. & Arn. var. *humilis* Hook. & Arn., nom. nud. = **Baccharis ulicina** Hook. & Arn.

Baccharis ulicina Hook. & Arn. var. *multifida* (Griseb.) Kuntze = **Baccharis ulicina** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Baccharis ulicina Hook. & Arn. var. *subintegrifolia* Kuntze = **Baccharis darwinii** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis umbelliformis DC. = **Baccharis obovata** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis umbelliformis DC. f. *frigida* Heering = **Baccharis obovata** Hook. & Arn.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis umbelliformis DC. var. *ocellata* (Phil.) Heering ex Reiche = **Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **ocellata** (Phil.) F.H. Hellwig
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis umbelliformis DC. var. *poeppigiana* (DC.) Heering ex Reiche = **Baccharis poeppigiana** DC. subsp. **poeppigiana**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis umbelliformis DC. var. *typica* Heering, nom. inval. = **Baccharis obovata** Hook. & Arn.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis umbelliformis DC. var. *vulgaris* Heering = **Baccharis obovata** Hook. & Arn.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis uncinella DC.
Sin.: *Baccharis discolor* Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 0–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4147* (LP), *Reitz, P. R. 5363* (LP), *Smith, L. B. 13427* (HBR, US)].

[Baccharis urvilleana Brongn.]
Notas: Nombre dudoso.

Baccharis usterii Heering
Sin.: *Baccharis heeringeana* I.L. Teodoro
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gomes, J. C. 159* (LP), *Klein, R. M. 6027* (LP), *Smith, L. B. 9079* (HBR, US)].

Baccharis valdiviana Phil. = **Baccharis lycioides** J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis varians Gardner, p.p. = **Baccharis leptocephala** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis vauthieri DC. = **Baccharis reticularia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis velutina DC. = **Baccharis ochracea** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis venosa (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Molina venosa* Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1960.
Subarbusto. Nativa. 3900 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 264* (LP)].

Baccharis ventanicola (Cabrera) Soria & Zardini = **Baccharis rufescens** Spreng. var. **ventanicola** Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis venulosa DC. = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **brachylaenoides**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis venusta Kunth = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis vernalis F.H. Hellwig
Sin.: *Baccharis concava* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *floribunda* Heering
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 140* (LP), *Barros, E. 89* (LP)].

Baccharis vernicosa Hook. & Arn.
Sin.: *Baccharis argentina* Heering, *Baccharis flabellata* Hook. & Arn. var. *argentina* (Heering) Ariza, *Baccharis neaei* auct. non DC., p.p., *Baccharis pseudotridentata* Heering
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Giuliano, D. A., 2000, 2001.
Arbusto. Endémica. 0–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(CEN, COA, PAI); URY(LAV, MAL, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Luna Risso, J. 878* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 37513* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 1199* (LP), *Schinini, A. 6643* (LP)]; URY[*Fabris, H. A. 7904* (LP), *Rosengurtt, B. 1100* (LP)].

Baccharis villosa Heering, hom. illeg. = **Baccharis pseudovillosa** I.L. Teodoro
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis vincifolia Baker
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.
Arbolito. Endémica. 0–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13478* (HBR, RB, US)]; URY[*Sello 3173* (B, LP), *Sello 453* (B, LP)].

Baccharis viscosa (Ruiz & Pav.) Kuntze = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis viscosa (Ruiz & Pav.) Kuntze var. *nigricans* Kuntze = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Baccharis vismioides DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976; Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005a.
Arbusto. Nativa. 700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5986* (MBM)].

Baccharis volckmannii Phil. = **Baccharis intermedia** DC.

Baccharis vulneraria Baker
Sin.: *Baccharidastrum triplinervium* (Less.) Cabrera, *Baccharis pseudoserrulata* I.L. Teodoro, *Baccharis serrulata* DC., hom. illeg., *Conyza triplinervia* Less.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Giuliano, D. A., 2000; Lombardo, A., 1983; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(CAU, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 6526* (CORD)]; BRA[*Reitz, P. R. 3941* (HAS, HBR, RB)]; PRY[*Rojas, T. 9479* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 2801* (LP)].

Baccharis weirii Baker = **Baccharis megapotamica** Spreng. var. **weirii** (Baker) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Baccharis williamsii Phil. = **Baccharis neaei** DC.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Baccharis xerophila Mart. = **Baccharis brevifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig subsp. **minor** F.H. Hellwig
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 800–1400 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hellwig, F. H. 4718* (SGO)].

Baccharis zoellneri F.H. Hellwig subsp. **zoellneri**
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.
Arbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Darwin, C. R. 322* (K)]; CHL[*Hellwig, F. H. 7220* (SGO)].

Baccharoides brachylepis (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Baccharoides punctatum (Cass.) Kuntze = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Bahia Lag.

Número de especies: 1 endémica

Bahia ambrosioides Lag.
Sin.: *Achyropappus maritimus* Poepp. ex DC., nom. nud., *Eriophyllum ambrosioides* (Lag.) Kuntze, *Stylesia ambrosioides* (Lag.) Nutt., *Stylesia puberula* Nutt.
Referencias: Ellison, W. L., 1964; Reiche, C. F., 1905.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2031* (LP)].

Bahia gilliesii A. Gray = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Bahia neo-mexicana (A. Gray) A. Gray = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Balbisia berteroi DC. = **Robinsonia berteroi** (DC.) R.W. Sanders, Stuessy & Martic.

Balbisia canescens Pers. = **Tridax procumbens** L.

Balbisia divaricata Cass. = **Tridax procumbens** L.

Balbisia elongata Willd. = **Tridax procumbens** L.

Balbisia pedunculata Ortega ex Hoffmanns. = **Tridax procumbens** L.

Balsamita major Desf. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a.

Baltimora L.

Número de especies: 1

Baltimora geminata (Brandegee) Stuessy
Sin.: *Baltimora ovata* Rusby, *Melampodium bonairensis* Bold., *Melampodium geminatum* Brandegee
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998; Stuessy, T. F., 1973.
Hierba. Anual. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 5017* (FCQ, MO)].

Baltimora ovata Rusby = **Baltimora geminata** (Brandegee) Stuessy
Referencias: Stuessy, T. F., 1973.

Barkhausia setosa DC. = **Crepis setosa** Hallier f.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Barnadesia Mutis ex L.

Número de especies: 1

Barnadesia divaricata Griseb. = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Barnadesia flavescens Meyen = **Chuquiraga oppositifolia** D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Barnadesia inermis Rusby = **Dasyphyllum inerme** (Rusby) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Barnadesia lanata Meyen = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Barnadesia odorata Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Urtubey, E., 1999.
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 27* (LP)].

Barnadesia ulicina Hook. & Arn. = **Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **ulicina**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Barrosoa betonicaeformis (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium betonicaeforme** (DC.) Baker var. **betonicaeforme**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Barrosoa cabrerae (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium cabrerae** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Barrosoa candolleana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium candolleanum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Barrosoa ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium ramboi** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Baucis lavandulifolia Phil. = **Brachyclados lycioides** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Bejaranoa balansae (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium balansae** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Bellardia pusilla Colla = **Microseris pygmaea** D. Don

Bellis L.

Número de especies: 1 introducida

Bellis magellanica DC. = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Bellis perennis L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, TDF); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado-Bruzzone, R. 180* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2531* (LP)].

Belloa J. Remy

Número de especies: 6, 1 endémica

Belloa argentea (Wedd.) Cabrera = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Belloa burkartii (Cabrera) Cabrera = **Lucilioclinе burkartii** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Belloa catamarcensis Cabrera = **Lucilioclinе catamarcense** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Belloa cerrateae (Ferreyra) Sagást. & M.O. Dillon = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1991.

Belloa chilensis (Hook. & Arn.) J. Remy
Sin.: *Chevreulia nivea* Phil., *Gnaphalium andicola* Kuntze, hom. illeg., *Gnaphalium frigidum* Poepp., nom. inval., *Lucilia araucana* Phil., *Lucilia chilensis* Hook. & Arn., *Lucilia chilensis* Poepp. & Endl., hom. illeg., *Lucilia frigida* Reiche, *Lucilia nivea* (Phil.) Cabrera
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1958, 1971a; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(I, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5921* (LP)]; CHL[*Barros, E. 7337* (LP)].

Belloa erythractis (Wedd.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta erythractis* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium erythractis* (Wedd.) Griseb., *Merope erythractis* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b, 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11864* (LP, SI)].

Belloa kunthiana (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Conyza kunthiana* DC., *Conyza pusilla* Kunth, hom. illeg., *Gnaphalium kunthianum* Kuntze, *Lucilia affinis*

Wedd., *Lucilia conoidea* Wedd., *Lucilia kunthiana* (DC.) Zardini, *Lucilia pusilla* (Kunth) Hieron., *Lucilia venezuelensis* Steyerm., *Lucilia violacea* Wedd., *Merope kunthiana* (DC.) Wedd.
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995; Zardini, E. M., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–5000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9294* (BAB)].

Belloa lopezmirandae Cabrera = **Luciliocline lopezmirandae** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Cabrera, A. L., 1958.

Belloa pickeringii (A. Gray) Sagást. & M.O. Dillon
Sin.: *Lucilia pickeringii* A. Gray, *Lucilia pickeringii* A. Gray var. *minor* A. Gray
Referencias: Freire, S. E., 1995; Sagástegui A., A. & Dillon, M. O., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–5000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pierotti, A. 1335 p.p.* (GH)].

Belloa piptolepis (Wedd.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium evacoides* Klatt, *Gnaphalium piptolepis* (Wedd.) Griseb., *Lucilia piptolepis* Wedd., *Luciliocline piptolepis* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., *Merope piptolepis* Wedd.
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Cabrera, A. L., 1958, 1978; Dillon, M. O., 2003; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18999* (LP)]; CHL[*Villagrán, C. 2533* (SI)].

Belloa punae (Cabrera) Cabrera = **Luciliocline subspicata** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Belloa santanica (Cabrera) Cabrera = **Luciliocline santanica** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Belloa schultzii (Wedd.) Cabrera
Sin.: *Belloa argentea* (Wedd.) Cabrera, *Belloa cerrateae* (Ferreyra) Sagást. & M.O. Dillon, *Belloa virescens* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium schultzii* (Wedd.) Cabrera, *Gnaphalium viridescens* Cabrera, *Lucilia schultzii* (Wedd.) A. Gray, *Luciliocline schultzii* (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást., *Merope argentea* Wedd., *Merope caespititia* Wedd., *Merope schultzii* Wedd., *Merope virescens* Wedd., *Mniodes cerratei* Ferreyra
Referencias: Ariza Espinar, L., 1989a; Cabrera, A. L., 1957a, 1978; Dillon, M. O., 2003; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 902* (LP)]; CHL[*Villagrán, C. 2528* (SI)].

Belloa subspicata (Cabrera) Cabrera = **Luciliocline subspicata** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Belloa turneri Sagást. & M.O. Dillon = **Luciliocline lopezmirandae** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Belloa virescens (Wedd.) Cabrera = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Benzanilla chilensis J. Remy = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Berroa Beauverd

Número de especies: 1

Berroa gnaphalioides (Less.) Beauverd
Sin.: *Gnaphalium gnaphalioides* (Less.) Kuntze, *Lucilia argentea* Hook. & Arn., *Lucilia gnaphalioides* Less., *Lucilia nitens* Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA); URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3184* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2717* (LP)].

Bichenia aurea D. Don = **Trichocline aurea** (D. Don) Reiche
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Bichenia auriculata Wedd. = **Trichocline auriculata** (Wedd.) Hieron. var. **auriculata**
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Bichenia cineraria D. Don = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Bichenia crenata (J. Remy) Wedd. = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Bichenia reptans Wedd. = **Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Zardini, E. M., 1975.

Bichenia sinuata D. Don = **Trichocline sinuata** (D. Don) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Bidens L.

Número de especies: 17, 2 endémicas, 3 introducidas

Bidens acaulis Baker = **Isostigma acaule** (Baker) Chodat

Bidens affinis Klotzsch & Otto = **Bidens triplinervia** Kunth var. **triplinervia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens alausensis Kunth = **Bidens pilosa** L. var. **alausensis** (Kunth) Sherff

Bidens alba (L.) DC.
Sin.: *Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch. Bip., *Coreopsis alba* L.
Referencias: Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS); CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mondin, C. A. 2971* (HASU)].

Bidens andicola Kunth var. **andicola**
Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *heterophylla* Kuntze, *Bidens andicola* Kunth var. *normalis* Kuntze, *Bidens cosmantha* Griseb. var. *diversifolia* Griseb., *Bidens fruticulosa* Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2749* (SI)].

Bidens andicola Kunth var. **cosmantha** (Griseb.) Sherff
Sin.: *Bidens cosmantha* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D. A., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solís Neffa, V. 855* (CTES)].

Bidens andicola Kunth var. **decomposita** Kuntze
Sin.: *Bidens grandiflora* Balb. var. *breviloba* Kuntze, *Bidens macrantha* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D. A., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, SAL, SLU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9027* (CORD)]; CHL[*Ricardi, M. 133* (CONC)].

Bidens andicola Kunth var. *heterophylla* Kuntze = **Bidens andicola** Kunth var. **andicola**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens andicola Kunth var. *mandonii* Sherff = **Bidens mandonii** (Sherff) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens andicola Kunth var. *normalis* Kuntze = **Bidens andicola** Kunth var. **andicola**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens antiguensis Coult. = **Bidens squarrosa** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1971b, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens aurea (Aiton) Sherff
Sin.: *Coreopsis aurea* Aiton
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Matthei, O. R. & Marticorena, C., 1990; Montes, L., Cerono, J. C. & Nuciari, M., 1993; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, RME); URY (CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, L. 983* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 1061* (CONC), *Matthei, O. R. 183* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 5518* (MVJB)].

Bidens bipinnata L.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 31315* (PACA)].

Bidens californica DC. = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens chilensis DC. = **Bidens pilosa** L. var. **alausensis** (Kunth) Sherff

Bidens chilensis DC. var. *apiifolia* DC. = **Bidens pilosa** L. var. **apiifolia** (DC.) Sherff

Bidens chodatii Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 4885* (FCQ, MO)].

Bidens chrysanthemoides Michx. = **Bidens laevis** (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens cosmantha Griseb. = **Bidens andicola** Kunth var. **cosmantha** (Griseb.) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens cosmantha Griseb. var. *diversifolia* Griseb. = **Bidens andicola** Kunth var. **andicola**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens exigua Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 15304* (CORD)].

Bidens fruticulosa Meyen & Walp. = **Bidens andicola** Kunth var. **andicola**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens gardneri Baker
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAA, CAN, CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 33246* (CTES, SI)].

Bidens gracilis Torr. = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens grandiflora Balb. var. *breviloba* Kuntze = **Bidens andicola** Kunth var. **decomposita** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens hassleriana (Chodat) A.A. Sáenz
Sin.: *Bidens riedelii* Baker f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bidens riedelii* Baker var. *hassleriana* Chodat, *Bidens riedelii* Baker var. *hirsuta* Hassl.
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998; Sáenz, A. A., 1999.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4924* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5708* (BM), *Soria, N. 7858* (FCQ)].

Bidens helianthoides Kunth = **Bidens laevis** (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens hirsuta Nutt. = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens hispida Kunth = **Bidens pilosa** L. var. **minor** (Blume) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens humilis Wedd. var. *macrantha* Wedd. = **Bidens triplinervia** Kunth var. **macrantha** (Wedd.) Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens involucrata Phil. = **Heterosperma nanum** (Nutt.) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Bidens laevis (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Sin.: *Bidens chrysanthemoides* Michx., *Bidens helianthoides* Kunth, *Helianthus laevis* L.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Ariza Espinar, L., 2000b; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SJU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 11967* (CORD)]; BRA[*Kozera, C. 462* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 37783* (AS, MO)]; URY[*Alonso Paz, E. 2155* (MVFQ)].

Bidens leucantha Willd. f. *discoidea* Sch. Bip. = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens leucantha Willd. var. *pilosa* (L.) Griseb. = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens leucantha Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk. = **Bidens pilosa** L. var. **minor** (Blume) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens leyboldii Phil. = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens macrantha Griseb. = **Bidens andicola** Kunth var. **decomposita** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens mandonii (Sherff) Cabrera
Sin.: *Bidens andicola* Kunth var. *mandonii* Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16880* (LP)].

Bidens megapotamica Spreng. = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens montaubanii Phil. = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens paradoxa Don ex Hook. & Arn. = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1971a, 1974a.

Bidens pedunculata Phil. = **Bidens triplinervia** Kunth var. **triplinervia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens peucedanifolius (Wedd.) Kuntze = **Cosmos peucedanifolius** Wedd. var. **peucedanifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Bidens peucedanifolius (Wedd.) Kuntze var. *tiraquensis* Kuntze = **Cosmos peucedanifolius** Wedd. var. **tiraquensis** (Kuntze) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Bidens pilosa L. var. **alausensis** (Kunth) Sherff
Sin.: *Bidens alausensis* Kunth, *Bidens chilensis* DC., *Bidens valparadisiaca* Colla
Referencias: Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2800 m.
Países: CHL(I, IV, V, VI, VIII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2467* (CONC)].

Bidens pilosa L. var. **apiifolia** (DC.) Sherff
Sin.: *Bidens chilensis* DC. var. *apiifolia* DC.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1300 m.

Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 156* (CONC)].

Bidens pilosa L. var. *brevifoliata* Hieron. = **Bidens pilosa** L. var. **minor** (Blume) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens pilosa L. var. *discoidea* Sch. Bip. = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens pilosa L. var. *dubia* (Cass.) O.E. Schulz = **Bidens pilosa** L. var. **minor** (Blume) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens pilosa L. var. **minor** (Blume) Sherff
Sin.: *Bidens hispida* Kunth, *Bidens leucantha* Willd. var. *sundaica* (Blume) Hassk., *Bidens pilosa* L. var. *brevifoliata* Hieron., *Bidens pilosa* L. var. *dubia* (Cass.) O.E. Schulz, *Bidens sundaica* Blume, *Bidens sundaica* Blume var. *minor* Blume
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, MEN, MIS, SDE, TUC); BRA(SCA); CHL(IV, RME); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14282* (LP)]; BRA[*Ule, E. H. G. 835* (B)]; CHL[*Hastings, G. T. 570* (UC)]; PRY[*Soria, N. 6617* (FCQ, MO)].

Bidens pilosa L. var. **pilosa**
Sin.: *Bidens californica* DC., *Bidens hirsuta* Nutt., *Bidens leucantha* Willd. f. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens leucantha* Willd. var. *pilosa* (L.) Griseb., *Bidens montaubanii* Phil., *Bidens pilosa* L. var. *discoidea* Sch. Bip., *Bidens reflexa* Link
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Lombardo, A., 1983; Matthei, O. R. & Marticorena, C., 1990; Sherff, E. E., 1937; Sáenz, A. A., 1996.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IJF); PRY(CAU, CEN, COA, GUA, PAI); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MON, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2848* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3854* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 22818* (AS, MO)]; URY[*Berro, M. B. 7907* (MVFA)].

Bidens pilosa L. var. *radiata* Sch. Bip. = **Bidens alba** (L.) DC.

Bidens platensis Manganaro = **Bidens subalternans** DC. var. **subalternans**
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens pseudocosmos Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Matthei, O. R. & Marticorena, C., 1990; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC); CHL(II, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11659* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 92* (CONC)].

Bidens quadrangularis DC. = **Bidens subalternans** DC. var. **subalternans**
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens reflexa Link = **Bidens pilosa** L. var. **pilosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sherff, E. E., 1937.

Bidens rhombifolia Sch. Bip. = **Heterosperma ovatifolium** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Bidens riedelii Baker
Referencias: Freire, S. E., et al., 2006; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 2862* (CTESN)]; PRY[*Zardini, E. M. 44301* (AS, MO)].

Bidens riedelii Baker f. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Bidens hassleriana** (Chodat) A.A. Sáenz

Bidens riedelii Baker var. *hassleriana* Chodat = **Bidens hassleriana** (Chodat) A.A. Sáenz

Bidens riedelii Baker var. *hirsuta* Hassl. = **Bidens hassleriana** (Chodat) A.A. Sáenz

Bidens scandens L. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Bidens squarrosa Kunth
Sin.: *Bidens antiguensis* Coult., *Bidens tereticaulis* DC., *Bidens trifoliata* Bertol., *Coreopsis trifoliata* Bertol.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971b, 1978; Freire, S. E., et al., 2006; Sherff, E. E., 1937.
Subarbusto. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23654* (LP)].

Bidens subalternans DC. var. **simulans** Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cantino, P. D. 699* (CORD)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9432* (NY)].

Bidens subalternans DC. var. **subalternans**
Sin.: *Bidens platensis* Manganaro, *Bidens quadrangularis* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Matthei, O. R. & Marticorena, C., 1990; Mondin, C. A., 2004a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI), URY (ART, CAS, CLA, COL, MON, PAY, RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 16458* (CORD)]; BRA[*Mondin, C. A. 2893* (PACA)]; CHL[*Matthei, O. R. 347* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 1871* (CTES)]; [*Berro, M. 5821* (MVFA)].

Bidens subalternans DC. var. **unipinnata** Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Sherff, E. E., 1937.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cerana, M. M. 781* (CORD)]; PRY[*Hassler, E. 11558* (G, GH)].

Bidens sulphurea Sch. Bip. = **Cosmos sulphureus** Cav.

Bidens sundaica Blume = **Bidens pilosa** L. var. **minor** (Blume) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens sundaica Blume var. *minor* Blume = **Bidens pilosa** L. var. **minor** (Blume) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens tenera O.E. Schulz
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D. A., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Sherff, E. E., 1937; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8024* (LP)]; PRY[*Soria, N. 5785* (FCQ, MO)].

Bidens tereticaulis DC. = **Bidens squarrosa** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens trifoliata Bertol. = **Bidens squarrosa** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sherff, E. E., 1937.

Bidens triplinervia Kunth var. **macrantha** (Wedd.) Sherff
Sin.: *Bidens humilis* Wedd. var. *macrantha* Wedd.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SJU, SLU); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9470* (SI)].

Bidens triplinervia Kunth var. **triplinervia**
Sin.: *Bidens affinis* Klotzsch & Otto, *Bidens pedunculata* Phil.
Referencias: Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16884* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 311* (CONC)].

Bidens valparadisiaca Colla = **Bidens pilosa** L. var. **alausensis** (Kunth) Sherff

Bishovia mikaniifolia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium mikaniifolium** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Blainvillea biaristata DC. = **Calyptocarpus biaristatus** (DC.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978b.

Blennosperma Less.

Número de especies: 1 endémica

Blennosperma chilense Less.
Sin.: *Apalus anthemifolius* (Bertero ex Colla) DC., *Soliva radiata* Poepp. ex Less., *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Colla, *Unxia anthemidifolia* Bertero ex Less.
Referencias: Ornduff, R., 1964.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(V, VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 726* (BM, GH, K, P)].

Boebera chrysanthemoides Willd., nom. superfl. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Boebera ciliosa Rydb. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Boebera glandulosa (Cav.) Pers., nom. illeg. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Boebera papposa (Vent.) Rydb. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Boebera roseata Rydb. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Brachyandra macrogyne Phil. = **Helogyne macrogyne** (Phil.) B.L. Rob.

Brachyclados Gillies ex D. Don

Número de especies: 3 endémicas

Brachyclados caespitosus (Phil.) Speg.
Sin.: *Brachyclados obtusifolius* Kuntze, *Brachyclados pygmaeus* Kuntze, *Lavidia caespitosa* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1996a.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23227* (LP)].

Brachyclados involutus Kuntze = **Brachyclados lycioides** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Brachyclados lycioides D. Don
Sin.: *Baucis lavandulifolia* Phil., *Brachyclados involutus* Kuntze, *Brachyclados lycioides* D. Don var. *microcephala* Hieron., *Brachyclados macrocephalus* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 67* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 51346* (CONC)].

Brachyclados lycioides D. Don var. *macrocephala* Hieron. = **Brachyclados megalanthus** Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Brachyclados lycioides D. Don var. *microcephala* Hieron. = **Brachyclados lycioides** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Brachyclados macrocephalus Kuntze = **Brachyclados lycioides** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Brachyclados megalanthus Speg.
Sin.: *Brachyclados lycioides* D. Don var. *macrocephala* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14881* (LP)].

Brachyclados obtusifolius Kuntze = **Brachyclados caespitosus** (Phil.) Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Brachyclados pygmaeus Kuntze = **Brachyclados caespitosus** (Phil.) Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Brachyclados stuckertii Speg. = **Trichocline plicata** Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Brachypappus candicans (Vahl) Sch. Bip. = **Senecio candidans** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Brachypappus smithii (DC.) Sch. Bip. = **Senecio smithii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Brachyris floribunda Phil. = **Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Brachyris gayana (J. Remy) J. Remy = **Gutierrezia gayana** (J. Remy) Reiche
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Brachyris isernii Phil. = **Gutierrezia isernii** (Phil.) Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.

Brachyris mandonii Sch. Bip. = **Gutierrezia mandonii** (Sch. Bip.) Solbrig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.

Brachyris neaeana DC. = **Gutierrezia neaeana** (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Brachyris paniculata DC. = **Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Brachyris spathulata Phil. = **Gutierrezia spathulata** (Phil.) Kurtz
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Brickellia Elliott

Número de especies: 2, 1 endémica

Brickellia diffusa (Vahl) Gray
Sin.: *Eupatorium diffusum* Vahl
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 1047* (CORD)].

Brickellia gentianoides B.L. Rob.
Sin.: *Chromolaena gentianoides* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1980b; Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 768* (P)].

Bulbostylis ramosissima Gardner = **Eupatorium vauthierianum** DC. var. **ramosissimum** (Gardner) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b.

Buphthalmum mediterraneum Vell. = **Calea mediterranea** (Vell.) Pruski

Burkartia Crisci

Número de especies: 1 endémica

Burkartia lanigera (Hook. & Arn.) Crisci
Sin.: *Perezia lanigera* Hook. & Arn., *Perezia sessiliflora* Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976a; Katinas, L., 1995.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 14690* (LP)].

Cacalia argentea (Less.) Kuntze = **Vernonia argentea** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Cacalia asteriflora (Mart. ex DC.) Kuntze = **Vernonia asteriflora** Mart. ex DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Cacalia aurantica Blume = **Gynura aurantiaca** (Blume) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Cacalia auriculata (Griseb.) Kuntze = **Vernonia auriculata** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a.

Cacalia baccharidifolia Poepp. ex DC. = **Senecio baccharidifolius** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cacalia bardanoides (Less.) Kuntze = **Vernonia bardanoides** Less.

Cacalia brevifolia (Less.) Kuntze = **Vernonia brevifolia** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia candicans Poepp. ex DC. = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cacalia candicans Vahl = **Senecio candidans** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Cacalia canescens Poepp. ex DC., nom. inval. = **Senecio neaei** DC. var. **neaei**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cacalia chamaedrys (Less.) Kuntze = **Vernonia chamaedrys** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Cacalia chamissonis (Less.) Kuntze = **Vernonia chamissonis** Less.

Cacalia cincta (Griseb.) Kuntze = **Vernonia cincta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia cognata (Less.) Kuntze = **Vernonia cognata** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia cordifolia L. f. = **Mikania cordifolia** (L. f.) Willd.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Cacalia denticulata Hook. & Arn. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **yegua**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cacalia desertorum (Mart. ex DC.) Kuntze = **Vernonia desertorum** Mart. ex DC.

Cacalia eriolepis (Gardner) Kuntze = **Vernonia eriolepis** Gardner

Cacalia ferruginea (Less.) Kuntze = **Vernonia ferruginea** Less.

Cacalia flexuosa (Sims) Kuntze = **Vernonia flexuosa** Sims var. **flexuosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia fulta (Griseb.) Kuntze = **Vernonia fulta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia glabrata (Less.) Kuntze = **Vernonia glabrata** Less. var. **glabrata**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia glandulosa Salisb. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Cacalia graminifolia (Gardner) Kuntze = **Vernonia psilophylla** DC.

Cacalia heterophylla Poepp. ex DC. = **Senecio pilquensis** H. Buek
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cacalia hypochaeris (DC.) Kuntze = **Vernonia hypochaeris** DC.

Cacalia incana (Less.) Kuntze = **Vernonia incana** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Cacalia intermedia (DC.) Kuntze = **Vernonia intermedia** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a.

Cacalia kuntzei (Hieron.) Kuntze = **Vernonia asteriflora** Mart. ex DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Cacalia lappoides (Baker) Kuntze = **Vernonia bardanoides** Less.

Cacalia linaria Cav. var. *pumila* (Hook. & Arn.) Poir. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Cacalia linifolia Ard. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Cacalia lucida (Less.) Kuntze = **Vernonia lucida** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia macrophylla (Less.) Kuntze = **Vernonia macrophylla** Less.

Cacalia mollissima (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Vernonia mollissima** D. Don ex Hook. & Arn. var. **mollisima**
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a.

Cacalia montevidensis (Spreng.) Kuntze = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia nivea Kuntze ex DC. = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cacalia nudiflora (Less.) Kuntze = **Vernonia nudiflora** Less. f. **nudiflora**
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Cacalia obovata (Less.) Kuntze = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby

Cacalia obsoleta Vell. = **Mikania obsoleta** (Vell.) G.M. Barroso

Cacalia oligactoides (Less.) Kuntze = **Vernonia oligactoides** Less.

Cacalia oligolepis (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze = **Vernonia oligolepis** Sch. Bip. ex Baker

Cacalia oligophylla (Vell.) Kunth = **Vernonia hypochlora** Malme

Cacalia plantaginoides (Less.) Kuntze = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia platensis (Spreng.) Kuntze = **Vernonia platensis** (Spreng.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia porophyllum L. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Cacalia praecox Kuntze = **Vernonia squamulosa** Hook. & Arn.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia praestans Baker, nom. illeg. = **Trixis praestans** (Vell.) Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Cacalia prenanthoides Kunth = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Cacalia psilophylla (DC.) Kuntze = **Vernonia psilophylla** DC.

Cacalia pumilla (Vell.) Kuntze = **Vernonia pumilla** (Vell.) Cabrera

Cacalia radula (Mart. ex DC.) Kuntze = **Vernonia glabrata** Less. var. **glabrata**

Cacalia rigiophylla (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze = **Vernonia elsieae** Stutts

Cacalia rubricaulis (Humb. & Bonpl.) Kuntze = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia rubricaulis (Humb. & Bonpl.) Kuntze var. *pseudoincana* (Hieron.) Kuntze = **Vernonia pseudoincana** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia ruderalis (Jacq.) Sw. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Johnson, R. R., 1969.

Cacalia scabra Vahl = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Cacalia scorpioides (Lam.) Kuntze = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.

Cacalia scorpioides (Lam.) Kuntze var. *sororia* (DC.) Kuntze = **Vernonia sororia** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1987.

Cacalia sellowii (Less.) Kuntze = **Vernonia sellowii** Less.

Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia septemnata Vell. = **Mikania ternata** (Vell.) B.L. Rob.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1989, 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Cacalia squamulosa (Hook. & Arn.) Kuntze = **Vernonia squamulosa** Hook. & Arn.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia suffruticosa L. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Cacalia tarijensis (Griseb.) Kuntze = **Vernonia tarijensis** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cacalia ternata Vell. = **Mikania ternata** (Vell.) B.L. Rob.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Cacalia trilobata Vell. = **Mikania glomerata** Spreng.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Cacalia verbascifolia (Less.) Kuntze = **Vernonia verbascifolia** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Calea L.

Número de especies: 26, 10 endémicas

Calea acaulis Baker
Referencias: Magenta, M. A. G., 1998; Malme, G. O. A., 1933b; Pruski, J. F., 1998a.
Subarbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14358* (S)]; PRY[*Balansa, B. 807* (G)].

Calea amellus L. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Calea annua Hassl.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 12632* (G)].

Calea asclepiaefolia Hassl.
Referencias: Pruski, J. F., 1998a; Sáenz, A. A., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 2778* (CTESN, SI)]; PRY[*Hassler, E. 10626* (BM)].

Calea bakeriana Chodat
Sin.: *Calea bakeriana* Chodat var. *dentata* Chodat, *Calea bakeriana* Chodat var. *volubilis* Chodat
Referencias: Pruski, J. F., 1998a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7075* (B)].

Calea bakeriana Chodat var. *dentata* Chodat = **Calea bakeriana** Chodat
Referencias: Pruski, J. F., 1998a.

Calea bakeriana Chodat var. *volubilis* Chodat = **Calea bakeriana** Chodat
Referencias: Pruski, J. F., 1998a.

Calea catalaonensis Krasch. = **Calea verticillata** (Klatt) Pruski

Calea chodatii Hassl.
Sin.: *Calea nitida* Chodat, hom. illeg.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11094* (B)].

Calea clausseniana Baker var. *balansae* Baker = **Calea verticillata** (Klatt) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1998a.

Calea clematidea Baker
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1932c; Mondin, C. A., 2004a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2220* (SI)]; BRA[*Mentz, L. A. s.n.* (ICN)]; PRY[*Soria, N. 7620* (FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 3656* (MVFA)].

Calea crenata Chodat
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7923* (G)].

Calea cuneifolia DC.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Oliveira, P. I. 962* (CORD, MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 1640* (BM, CTES, G, MO, PY), *Schinini, A. 30113* (CTES)].

Calea cymosa Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a, 1974a; Malme, G. O. A., 1933b; Mondin, C. A., 2004a; Pruski, J. F., 1998a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CON, ITA, MIE); URY(ART, CLA, FLA, LAV, PAY, RIV, RNO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1812* (SI)]; BRA[*Oliveira, P. I. 964* (CORD, MBM)]; PRY[*Schinini, A. 30166* (CTES)]; [*Berro, M. 2000* (MVFA)].

Calea formosa Chodat
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4943* (BM)].

Calea hassleriana Chodat
Sin.: *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker var. *mollis* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU, CAA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1697* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 30152* (CTES)].

Calea hispida (DC.) Baker = **Calea triantha** (Vell.) Pruski

Calea ilienii Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Endémica. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 141a* (G, NY, PH, S)].

Calea kristiniae Pruski
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Pruski, J. F., 2005c.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 37485* (LIL)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Pruski, 2005c).

Calea longifolia (DC.) Baker
Sin.: *Meyeria longifolia* DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4248* (S)].

Calea marginata S.F. Blake
Referencias: Pruski, J. F., 2005c.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bassani, G. 7* (NY)].

Calea mediterranea (Vell.) Pruski
Sin.: *Buphthalmum mediterraneum* Vell., *Calea platylepis* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Malme, G. O. A., 1933b; Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CAN, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 4115* (LP, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 18127* (S)]; PRY[*Hassler, E. 4349* (BM, G)].

Calea monocephala Dusén
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 7599* (NY, S)].

Calea multijuga Krasch. = **Calea verticillata** (Klatt) Pruski

Calea myrtifolia (DC.) Baker
Sin.: *Meyeria myrtifolia* DC.
Referencias: Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Glaziou, A. F. M. 11054* (*)].

Calea nitida Chodat, hom. illeg. = **Calea chodatii** Hassl.

Calea parvifolia (DC.) Baker
Sin.: *Meyeria parvifolia* DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Nativa. 1100–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6864* (S)].

Calea pedunculosa DC. = **Calea uniflora** Less. var. **discoidea** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a.

Calea phyllolepis Baker
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Pruski, J. F., 2005c.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. s.n.* (ICN)].

Calea pinnatifida (R. Br.) Less.
Sin.: *Actinea conmutata* Spreng., *Caleacte pinnatifida* R. Br., *Mikania dentata* Spreng., *Mocinna brasiliensis* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Mondin, C. A., 2004a; Pruski, J. F., 2005c.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 391* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 6910* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 3247* (AS, LP, MO)].

Calea platylepis Sch. Bip. ex Baker = **Calea mediterranea** (Vell.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 2005c.

Calea platylepis Sch. Bip. ex Baker var. *mollis* Chodat = **Calea hassleriana** Chodat

Calea rojasiana Chodat
Hierba. Perenne. Endémica. 100–400 m.
Países: PRY(CAA, CON, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 5449* (AS, LP)].

Calea rupicola Chodat
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 53887* (AS)].

Calea triantha (Vell.) Pruski
Sin.: *Aster trianthus* Vell., *Calea hispida* (DC.) Baker, *Meyeria hispida* DC.

Referencias: Magenta, M. A. G., 1998; Pruski, J. F., 2005c; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gentry, A. H. 49892* (MO)]; PRY[*Soria, N. 5807* (FCQ, MO)].

Calea uniflora Less. var. **discoidea** Baker
Sin.: *Calea pedunculosa* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a, 1974a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 17542* (CTES, LP)].

Calea uniflora Less. var. **uniflora**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a, 1974a; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY (CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6629* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 60595* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 33354* (CTES, SI)]; URY[*Berro, M. B. 3118* (MVFA)].

Calea verticillata (Klatt) Pruski
Sin.: *Calea catalaonensis* Krasch., *Calea clausseniana* Baker var. *balansae* Baker, *Calea multijuga* Krasch., *Tridax verticillata* Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Malme, G. O. A., 1933b; Pruski, J. F., 1998a.
Subarbusto. Nativa. 100–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1591* (SI)]; BRA[*Riedel, J. 215* (LE, NY, OXF)]; PRY[*Balansa, B. 812a* (K, US)].

Caleacte pinnatifida R. Br. = **Calea pinnatifida** (R. Br.) Less.

Calendula L.

Número de especies: 3 introducidas

Calendula arvensis L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Delucchi, G. & Ariza Espinar, L., 1997; Hauman, L. L., 1925a; Hicken, C. M., 1910; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Meikle, R. B., 1976.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE); CHL(IV, V, VIII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4534* (LP)]; CHL[*Garaventa, A. 1960* (CONC)]; URY[*Hicken, C. M. 209* (SI)].

Calendula magellanica Willd. = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Calendula officinalis L.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1971a; Delucchi, G. & Ariza Espinar, L., 1997; Hicken, C. M., 1910; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Meikle, R. B., 1976; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, LPA, NEU, RNE); CHL(IV, V, VIII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 1507* (LP)]; CHL[*Barros, E. 211* (LP)].

Calendula pusilla Thouars = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Calendula tripterocarpa Rupr.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 800–1200 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 5665* (CONC)].

Calliopsis tinctoria (Nutt.) DC. = **Coreopsis tinctoria** Nutt.

Calopappus Meyen

Número de especies: 1 endémica

Calopappus acanthifolius J. Remy = **Calopappus acerosus** Meyen
Referencias: Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1986.

Calopappus acerosus Meyen
Sin.: *Calopappus acanthifolius* J. Remy, *Nassauvia acanthifolia* (J. Remy) G.F. Grandjot, *Nassauvia acerosa* (Meyen) Wedd., *Nassauvia remyana* Wedd.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–3200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 1406* (CONC)].

Caloptilion lagascae (D. Don) Hook. & Arn. = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Caloptilion lagascae (D. Don) Hook. & Arn. var. *lanata* Phil. = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Calyptocarpus Less.

Número de especies: 1

Calyptocarpus biaristatus (DC.) H. Rob.
Sin.: *Blainvillea biaristata* DC., *Calyptocarpus megapotamica* Sch. Bip., *Oligogyne megapotamica* DC., *Oligogyne synedrelloides* Hook. & Arn.

Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Muruaga, N. B., del Valle Bulacio, E. & Stanis, A. C., 1995; Robinson, H. E., 1978b; Sáenz, A. A., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, ITA, PAI); URY(ART, COL, FLO, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28788* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44010* (CTES)]; PRY[*Jörgensen, P. 3506* (SI)]; URY[*Herter, G. 388* (SI)].

Calyptocarpus megapotamica Sch. Bip. = **Calyptocarpus biaristatus** (DC.) H. Rob.

Campovassouria bupleurifolia (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Campovassouria cruciata (Vell.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Campuloclinium burchellii (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium burchellii** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Campuloclinium chlorolepis (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium chlorolepis** Baker

Campuloclinium hickenii (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium hickenii** Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Campuloclinium kleinioides (Kunth) DC. = **Eupatorium kleinioides** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Campuloclinium macrocephalum (Less.) DC. var. *strigosum* DC. = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Campuloclinium megacephalum (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium megacephalum** Baker

Campuloclinium purpurascens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium purpurascens** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Campuloclinium riedelii (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium riedelii** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Campuloclinium tubaraoense (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tubaraoense** Hieron.

Carduus L.

Número de especies: 5 introducidas

Carduus acanthoides L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Del Aguila, J., 1964; Novara, L. J., 1993h; Parodi, L. R., 1926b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, SAL, SFE); URY(CAS, COL, MON, PAY, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 174* (LP)]; URY[*Lombardo, A. 3943* (LP)].

Carduus lanceolatus L. = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus leiophyllus Petrovic = **Carduus thoermeri** Weinm.
Referencias: Amaral Franco, J. M. A., 1976a; Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus marianus L. = **Silybum marianum** (L.) Gaertn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus nutans L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Bianual. Introducida. 600–1000 m.
Países: CHL(V, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 443* (CONC)].

Carduus nutans auct. non L. var. *macrocephalus* auct. non (Desf.) Fiori & Bég. = **Carduus thoermeri** Weinm.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus nutans L. subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj = **Carduus thoermeri** Weinm.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus nutans L. subsp. *macrolepis* auct. non (Peterm.) Kazmi = **Carduus thoermeri** Weinm.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus pycnocephalus L.
Sin.: *Carduus tenuiflorus* Curtis var. *pycnocephalus* (L.) DC.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Parodi, L. R., 1926b.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23859* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2680* (LP)]; URY[*sin colector s.n.* (LP)].

Carduus pycnocephalus L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Ball = **Carduus tenuiflorus** Curtis
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus pycnocephalus L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori & Bég., comb. superfl. = **Carduus tenuiflorus** Curtis
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus tenuiflorus Curtis
Sin.: *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Ball, *Carduus pycnocephalus* L. var. *tenuiflorus* (Curtis) Fiori & Bég., comb. superfl.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Novara, L. J., 1993h.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR); URY(CAS, FLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 105* (LP)]; URY[*Felippone, F. 2569* (SI)].

Carduus tenuiflorus Curtis var. *pycnocephalus* (L.) DC. = **Carduus pycnocephalus** L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carduus thoermeri Weinm.
Sin.: *Carduus leiophyllus* Petrovic, *Carduus nutans* auct. non L. var. *macrocephalus* auct. non (Desf.) Fiori & Bég., *Carduus nutans* L. subsp. *leiophyllus* (Petrovic) Stoj, *Carduus nutans* L. subsp. *macrolepis* auct. non (Peterm.) Kazmi
Referencias: Amaral Franco, J. M. A., 1976a; Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Kazmi, S. M. A., 1964; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(SCA); CHL(RME); URY(PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Apochian, C. 101* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11892* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 2308* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 915* (LP)].

Carduus vulgaris Savi = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Carelia Fabr.

Número de especies: 3 endémicas

Carelia berroi Hutch.
Sin.: *Radlkoferotoma berroi* (Hutch.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957d; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Buckup, L. s.n.* (LP, PACA)]; URY[*Berro, M. B. 4554* (P)].

Carelia cistifolia Less.
Sin.: *Radlkoferotoma cistifolium* (Less.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1957d; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 3091* (B)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 756* (LP)].

Carelia conyzoides (L.) Kuntze = **Ageratum conyzoides** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Carelia ramboi Cabrera
Sin.: *Radlkoferotoma ramboi* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957d; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 37932* (LIL, LP, SI)].

Carmelita formosa Gay ex DC. = **Chaetanthera villosa** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Carmelita spathulata Phil. = **Chaetanthera spathulifolia** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Carphobolus notatus (Less.) Sch. Bip. = **Piptocarpha notata** (Less.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Carphobolus oblongus (Gardner) Sch. Bip. = **Piptocarpha oblonga** (Gardner) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Carphobolus regnellii Sch. Bip. = **Piptocarpha regnellii** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Carphobolus sellowii Sch. Bip. = **Piptocarpha sellowii** (Sch. Bip.) Baker var. **sellowii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Carthamus L.

Número de especies: 2 introducidas

Carthamus fluminensis Vell. = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Carthamus lanatus L.
Sin.: *Kentrophyllum lanatum* (L.) DC. ex Duby
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Lombardo, A., 1983; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ruíz Leal, R. A. & Roig, F. A., 1961; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SDE, SFE, SLU); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, IJF, RME); URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 102* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 26174* (LP)]; CHL[*Schwabe, H. 2155* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 444* (LP)].

Carthamus tinctorius L.
Referencias: Delucchi, G., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, SAL); CHL(IV, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8278* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 44689* (CONC)].

Castra illustris Vell. = **Holocheilus illustris** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Castra nobilis Vell. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Castra praestans Vell. = **Trixis praestans** (Vell.) Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Castra regia Vell. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Centaurea L.

Número de especies: 19, 8 endémicas, 11 introducidas

Centaurea atacamensis (Reiche) Ravenna, comb. superfl. = **Centaurea atacamensis** (Reiche) I.M. Johnst.

Centaurea atacamensis (Reiche) I.M. Johnst.
Sin.: *Centaurea atacamensis* (Reiche) Ravenna, comb. superfl., *Centaurea floccosa* Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1929a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(II, III, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 4448* (SI)].

Centaurea benedicta (L.) L.
Sin.: *Cnicus benedictus* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Ariza Espinar, L., 1967a; Bremer, K., 1994; Cabrera, A. L., 1971a; Covas, G., 1966a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ruíz Leal, R. A. & Roig, F. A., 1966[1964].
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, COR, COS, LPA, MEN, NEU); BRA(SCA); CHL(V, VII, RME); URY(ART, CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 12413* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 532* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 18235* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 6641* (LP)].

Centaurea bulbosa Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1851* (LP)].

Centaurea cachinalensis Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–2800 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2040* (SI)].

Centaurea calcitrapa L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Crosa, O. & Bancheva, S., 2006; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU); CHL(V, RME); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 124* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1856* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 443* (LP)].

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **breviloba** DC.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 267* (SI)].

Centaurea chilensis Hook. & Arn. var. **stenolepis** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 4795* (GH)].

Centaurea cyanus L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a; Covas, G., 1964; Del Aguila, J., 1964; Parodi, L. R., 1956b; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, NEU, RNE); CHL(XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6528* (LP)]; CHL[*Maldonado-Bruzzone, R. 78* (LP)].

Centaurea debeauxii Gren. & Gordon
Referencias: Crosa, O. & Bancheva, S., 2006.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Crosa, O. s.n.* (MVFA)].

Centaurea diffusa Lam.
Sin.: *Centaurea parviflora* auct. non Delile, *Centaurea parviflora* Sibth. & Sm. non Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L. & Fabris, H. A., 1958; Cabrera, A. L., 1963a; Dostál, J., 1976b; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Abbiatti, D. 4073* (LP)].

Centaurea dubia Suter subsp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchb.) Hayek ex Hegi = **Centaurea nigrescens** Willd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Centaurea floccosa Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–2900 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2041* (LP)].

Centaurea floccosa Hook. & Arn. var. *atacamensis* Reiche = **Centaurea atacamensis** (Reiche) I.M. Johnst.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

[Centaurea formosa Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2006b.
Notas: Nombre dudoso.

Centaurea gayana J. Remy
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

[Centaurea huascoënsis Ravenna]
Referencias: Ravenna, P. F., 2006b.
Notas: Nombre dudoso.

Centaurea iberica Trevir.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a; Dostál, J., 1976b; Parodi, L. R., 1956b.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15411* (BAA)].

Centaurea jacea L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7404* (LP)]; CHL[*Burkart, A. 9433* (LP)].

Centaurea melitensis L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a, 1974a; Crosa, O. & Bancheva, S., 2006; Del Aguila, J., 1964; Hicken, C. M., 1910; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Parodi, L. R., 1956b; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 534* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 1862* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 3876* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 2600* (LP)].

Centaurea monocephala J. Remy
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Centaurea nigra L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 900–1000 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 128* (CONC)].

Centaurea nigrescens Willd.
Sin.: *Centaurea dubia* Suter subsp. *vochinensis* (Bernh. ex Rchb.) Hayek ex Hegi, *Centaurea vochinensis* Bernh. ex Rchb.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., 1939a; Dostál, J., 1976b; Moore, R. J. & Frankton, C., 1974.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8833* (BAA)].

Centaurea parviflora auct. non Delile = **Centaurea diffusa** Lam.
Referencias: Dostál, J., 1976b.

Centaurea parviflora Sibth. & Sm. non Lam. = **Centaurea diffusa** Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Centaurea picris Pall. ex Willd. = **Acroptilon repens** (L.) DC.
Referencias: Dostál, J., 1976a.

Centaurea repens L. = **Acroptilon repens** (L.) DC.
Referencias: Dostál, J., 1976a.

Centaurea solstitialis L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Crosa, O. & Bancheva, S., 2006; Del Aguila, J., 1964; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Parodi, L. R., 1956b; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.

Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SLU); CHL(RME); URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 653* (LP)]; CHL[*Looser, G. 4807* (LP)]; URY[*Davies, P. s.n.* (MVFA)].

Centaurea tweediei Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Crosa, O. & Bancheva, S., 2006.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(GUA); URY(ART, CLA, FLA, RIV, RNO, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4147* (LP)]; BRA[*Burkart, A. 25197* (SI)]; PRY[*Meyer, T. 16041* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 794* (LP)].

Centaurea vochinensis Bernh. ex Rchb. = **Centaurea nigrescens** Willd.
Referencias: Dostál, J., 1976b.

Centaurodendron Johow

Número de especies: 2 endémicas

Centaurodendron dracaenoides Johow
Sin.: *Plectocephalus dracaenoides* (Johow) F.H. Hellwig
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 11170* (CONC)].

Centaurodendron palmiforme Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sparre, B. B. 301* (CONC)].

Centipeda Lour.

Número de especies: 1 endémica

Centipeda elatinoides (Less.) Benth. & Hook. f. ex O. Hoffm.
Sin.: *Myriogyne elatinoides* Less.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2498* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 15565* (LP)].

Centratherum Cass.

Número de especies: 2, 1 endémica

Centratherum aristatum auct. non Cass. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum brachylepis Sch. Bip. ex Baker = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum brevispinum Cass. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum camporum (Hassl.) Malme = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum camporum (Hassl.) Malme var. *albicans* (Hassl.) Malme = **Centratherum confertum** K. Kirkman
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum camporum (Hassl.) Malme var. *longipes* (Hassl.) Malme = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum confertum K. Kirkman
Sin.: *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme var. *albicans* (Hassl.) Malme, *Centratherum punctatum* Cass. var. *albicans* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1593* (SI), *Palacios, R. A. 378* (SI)]; BRA[*Pereira, E. 8585* (K, LP, M, RB)]; PRY[*Hassler, E. 9572* (K)].

Centratherum holtonii Baker = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum intermedium (Link) Less. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum longispinum Cass. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum muticum (Kunth) Less. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum pulchellum (Cass.) Steud. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum punctatum Cass.
Sin.: *Ampherephis aristata* Kunth, *Ampherephis intermedia* Link, *Ampherephis mutica* Kunth, *Ampherephis pilosa* Cass., *Ampherephis pulchella* Cass., *Amphibecis violacea* Schrank, *Baccarodes holtonii* (Baker) Kuntze, *Baccarodes muticum* (Kunth) Kuntze, *Baccarodes punctatum* (Cass.) Kuntze, *Baccarodes violaceum* (Schrank) Kuntze, *Baccharoides brachylepis* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Baccharoides punctatum* (Cass.) Kuntze, *Centratherum aristatum* auct. non Cass., *Centratherum brachylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Centratherum brevispinum* Cass., *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme, *Centratherum camporum* (Hassl.) Malme var. *longipes* (Hassl.) Malme, *Centratherum holtonii* Baker, *Centratherum intermedium* (Link) Less., *Centratherum longispinum* Cass., *Centratherum muticum* (Kunth) Less., *Centratherum pulchellum* (Cass.) Steud., *Centratherum punctatum* Cass. f. *brachyphyllum* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. f. *foliosum* (Chodat) Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. subsp. *camporum* Hassl., *Centratherum punctatum* Cass. var. *foliosa* Chodat, *Centratherum punctatum* Cass. var. *parviflorum* Baker, *Centratherum violaceum* (Schrank) Gleason, *Crantzia ovata* Vell., *Spixia violacea* Schrank
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2490* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 4993* (NY, UC, US)]; PRY[*Hassler, E. 8892* (G, GH, MO, NY, S, UC)].

Centratherum punctatum Cass. f. *brachyphyllum* Hassl. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum punctatum Cass. f. *foliosum* (Chodat) Hassl. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum punctatum Cass. var. *albicans* Hassl. = **Centratherum confertum** K. Kirkman
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum punctatum Cass. var. *foliosa* Chodat = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum punctatum Cass. var. *parviflorum* Baker = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum punctatum Cass. subsp. *camporum* Hassl. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centratherum violaceum (Schrank) Gleason = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Kirkman, L. K., 1981.

Centrospermum xanthioides Kunth = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Cephalobembix neo-mexicana (A. Gray) Rydb. = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Cephalophora aromatica (Hook.) Schrad. = **Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora berteroana Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora borchersii Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora collina Phil. = **Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora doniana Hook. & Arn. = **Helenium donianum** (Hook. & Arn.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1978; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Cephalophora foliosa Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora glauca Cav. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora gracilis Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora heterophylla (Juss.) Less. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora insularis Phil. = **Helenium insulare** (Phil.) Cabrera

Cephalophora lanceolata Phil. = **Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora leguiffei Phil. = **Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **leguiffei** (Phil.) Bierner
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora litoralis Phil. = **Helenium atacamense** Cabrera
Referencias: Bierner, M. W., 1978; Cabrera, A. L., 1944b.

Cephalophora peraltae Phil. = **Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **leguiffei** (Phil.) Bierner
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora plantaginea DC. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora plantaginea DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora punctata Klatt = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora radiata Less. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987.

Cephalophora rigida Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora robusta Rusby = **Hymenoxys robusta** (Rusby) K.L. Parker
Referencias: Parker, K. F., 1962.

Cephalophora setigera Phil. = **Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **urmenetae**
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora spathulata F. Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora stolpii Phil. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora tenera Cass. = **Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora tinctoria (Molina) Gunckel = **Helenium tinctorium** (Molina) J.F. Macbr.
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Cephalophora urmenatae Phil. = **Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **urmenetae**

Cephalophora vallenariense Phil. = **Helenium vallenariense** (Phil.) Bierner
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Ceratocephalus americanus (L. f.) Kuntze = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus arnicoides (DC.) Kuntze = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus caespitosus (DC.) Kuntze = **Acmella brachyglossa** Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus ciliatus (Kunth) Kuntze = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus decumbens (Sm.) Kuntze = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus decumbens (Sm.) Kuntze var. *macropoda* (DC.) Kuntze = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus fimbriatus (Kunth) Kuntze = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Ceratocephalus leiocarpus (DC.) Kuntze = **Spilanthes leiocarpa** DC.
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Ceratocephalus poeppigii (DC.) Kuntze = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Cercostylos brasiliensis (Less.) Less. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **megapotamica**
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Cercostylos scabiosoides Arn. ex DC. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **scabiosoides** (Arn. ex DC.) Baker
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Chabraea abbreviata Bertero ex Colla = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea barrasiana J. Remy = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea berteroniana Steud. = **Leucheria tenuis** Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea candidissima (D. Don) DC. = **Leucheria candidissima** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea canescens Phil. = **Leucheria congesta** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea cinerea (D. Don) DC. = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea concinna Phil. = **Leucheria landbeckii** (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea coquimbana Phil. = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea daucifolia (D. Don) Wedd. = **Leucheria daucifolia** (D. Don) Crisci

Chabraea elongata Bertero ex Colla = **Leucheria glandulosa** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea fragans Phil. = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea gayana J. Remy = **Leucheria gayana** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea glabra DC. = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea glabriuscula Phil. = **Leucheria glabriuscula** (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea glacialis (Poepp. ex Less.) DC. = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea glandulosa (D. Don) DC. = **Leucheria glandulosa** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea integrifolia Phil. = **Leucheria lithospermifolia** (Less.) Reiche subsp. **integrifolia** (Phil.) Grau & Zinnecker
Referencias: Grau, J., 1987.

Chabraea integrifolia Phil., hom. illeg. = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea laciniata Wedd. = **Leucheria daucifolia** (D. Don) Crisci

Chabraea landbeckii Phil. = **Leucheria landbeckii** (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea lithospermifolia (Less.) DC. = **Leucheria lithospermifolia** (Less.) Reiche subsp. **lithospermifolia**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea modesta Phil. = **Leucheria cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea multifida DC. = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea nutans J. Remy = **Leucheria nutans** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea oligocephala Phil. = **Leucheria landbeckii** (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea poeppigii Phil. = **Leucheria nutans** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea polyclados J. Remy = **Leucheria polyclados** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea pulchella Phil. = **Leucheria bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea purpurea (Vahl) DC. = **Leucheria purpurea** (Vahl) Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea rosea (Less.) DC. = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea runcinata (D. Don) Hook. = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea salina J. Remy = **Leucheria salina** (J. Remy) Hieron. subsp. **salina**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea salinasi Phil. var. *bipinnatifida* Phil. = **Leucheria salina** (J. Remy) Hieron. subsp. **salina**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea scrobiculata (D. Don) DC. = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea scrobiculata (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil. = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea suaveolens (d'Urv.) DC. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea tenerifolia Phil. = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea tenuior Bertero ex Colla = **Leucheria tenuis** Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea thermarum Phil. = **Leucheria thermarum** (Phil.) Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea tomentosa (Less.) DC. = **Leucheria tomentosa** (Less.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea viscida Bertero ex Colla = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chabraea viscosa Bertero ex DC. = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Chacoa pseudoprasiifolia (Hassl.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium pseudoprasiifolium** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Chaenocephalus alatus Lillo = **Verbesina lilloi** S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Chaenocephalus heterophyllus Griseb. = **Verbesina suncho** (Griseb.) S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Chaenocephalus macrophyllus Griseb. = **Verbesina suncho** (Griseb.) S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Chaenocephalus suncho Griseb. = **Verbesina suncho** (Griseb.) S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Chaetanthera Ruiz & Pav.

Número de especies: 40, 37 endémicas

Chaetanthera acerosa auct. non (J. Remy) Bonpl. & Humb. = **Chaetanthera pulvinata** (Phil.) Hauman var. **polymalla** (Phil.) Hicken
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera acerosa (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Sin.: *Chaetanthera pallida* (Phil.) Hauman, *Egania acerosa* J. Remy, *Egania pallida* Phil., *Egania racemosa* Pritz., *Oriastrum incanum* Phil., *Oriastrum parviflorum* Phil., *Oriastrum uncinatum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 147* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3525* (LP)].

Chaetanthera acerosa (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **dasycarpa** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burmeister, C. s.n.* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3561* (LP)].

Chaetanthera acheno-hirsuta (Tombesi) Arroyo, A.M.R. Davies & Till-Bottraud
Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acheno-hirsuta* Tombesi
Referencias: Arroyo, M. T. K., Davies, A. M. R. & Till-Bottraud, I., 2004; Tombesi, T. S., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 3400–4000 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8217* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 81612* (CONC)].

Chaetanthera andina Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera andina Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera apiculata (J. Remy) F. Meigen
Sin.: *Chaetanthera lanigera* Phil., *Egania apiculata* J. Remy, *Oriastrum albicaule* Phil. var. *albicaule* , *Oriastrum albicaule* Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche, *Oriastrum nivale* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–3300 m.
Países: ARG(SJU); CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Manceñido, M. 5* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 627* (LP)].

Chaetanthera araucana Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera argentea D. Don, p.p. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera argentea D. Don, p.p. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **tenuifolia** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera argentea Phil., hom. illeg. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera australis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19739* (LP)].

Chaetanthera aymarae Martic. & Quezada = **Chaetanthera perpusilla** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire

Chaetanthera berteriana Colla, hom. illeg. = **Chaetanthera tenella** Less. var. **tenella**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera berteriana Less. = **Trichocline aurea** (D. Don) Reiche
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Chaetanthera brachylepis Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 7443* (LP)].

Chaetanthera chilensis Hook. & Arn., hom. illeg. = **Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera argentea* Phil., hom. illeg., *Chaetanthera nana* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera sublignosa* Kuntze, *Chaetanthera volckmanni* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 507* (LP)].

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. **chilensis**
Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera sericea* Lag., *Chaetanthera serrata* auct. non Ruiz & Pav., *Perdicium chilense* Willd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2409* (LP)].

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. **involucrata** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera collina* Phil., *Chaetanthera involucrata* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 832* (CONC)].

Chaetanthera chilensis (Willd.) DC. var. **tenuifolia** (D. Don) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera argentea* D. Don, p.p., *Chaetanthera tenuifolia* D. Don
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 1596* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 4579* (LP)].

Chaetanthera ciliata Ruiz & Pav.
Sin.: *Chaetanthera multicaulis* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Borchers, A. 1071-c* (LP)].

Chaetanthera collina Phil. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **involucrata** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera comata Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera crenata (Phil.) F. Meigen, nom. illeg. = **Chaetanthera renifolia** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera crenata J. Remy = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Chaetanthera dealbata Hook. & Arn. = **Trichocline dealbata** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Chaetanthera debilis Meyen & Walp. = **Chaetanthera euphrasioides** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

[Chaetanthera delicatula Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Notas: Nombre dudoso.

Chaetanthera dioica (J. Remy) B.L. Rob.
Sin.: *Egania dioica* J. Remy, *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(II, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 7883* (LP)]; CHL[*Gay, C. 744* (LP)].

Chaetanthera elata Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **elegans**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera elegans Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera elegans Phil. var. **elegans**
Sin.: *Chaetanthera elata* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 1592* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 5371* (CONC)].

Chaetanthera elegans Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera andina* Phil., *Chaetanthera andina* Phil. var. *pratensis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera araucana* Phil., *Chaetanthera comata* Phil., *Chaetanthera elegans* Phil. var. *andina* (Phil.) Cabrera, *Chaetanthera foliosa* Phil., *Chaetanthera montana* Phil., *Chaetanthera pratensis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b, 1971a; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5127* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2415* (LP)].

Chaetanthera elegans Phil. var. **pulchra** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2408* (LP)].

[Chaetanthera eryngioides D. Don]
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Notas: Nombre dudoso.

Chaetanthera euphrasioides Reiche, hom. illeg. = **Chaetanthera flabellata** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera euphrasioides (DC.) F. Meigen
Sin.: *Chaetanthera debilis* Meyen & Walp., *Elachia euphrasioides* DC., *Tylloma euphrasioides* (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 1400–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2380* (LP)].

Chaetanthera euphrasioides Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera flabellata** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera flabellata D. Don
Sin.: *Chaetanthera euphrasioides* Reiche var. *spinulosa* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera euphrasioides* Reiche, hom. illeg., *Chaetanthera multicaulis* DC. var. *prostata* DC., *Chaetanthera prostrata* D. Don, *Elachia euphrasioides* Deless. non DC., hom. illeg., *Elachia spinulosa* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–3500 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 660* (LP)].

Chaetanthera flabellifolia Cabrera
Sin.: *Pachylaena elegans* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 189* (LP)].

Chaetanthera foliosa Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera glabrata (DC.) F. Meigen
Sin.: *Tylloma brachylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC., *Tylloma glabratum* DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *microphyllum* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche, *Tylloma glabratum* DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche, *Tylloma rotundifolium* Phil., *Tylloma stolpi* Phil., *Tylloma strictum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(II, III, IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 4389* (LP)].

Chaetanthera glandulosa J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1937b.
Subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1237* (LP)].

Chaetanthera gnaphalioides (J. Remy) I.M. Johnst.
Sin.: *Aldunantea gnaphalioides* J. Remy, *Chondrochilus parvifolius* Phil., *Oriastrum albiflorum* (Phil.) Reiche, *Oriastrum gnaphalioides* (J. Remy) Wedd., *Oriastrum leucocephalum* Phil., *Tylloma albiflorum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bodenbender, W. s.n.* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3529* (LP)].

[Chaetanthera grandiflora Steud.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Notas: Nombre dudoso.

Chaetanthera humilis Phil. = **Chaetanthera serrata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera incana Poepp. ex Less.
Sin.: *Chaetanthera chilensis* Hook. & Arn., hom. illeg., *Chaetanthera incana* Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC., *Chaetanthera obtusata* Phil., *Chaetanthera scariosa* D. Don, *Chaetanthera spathulata* Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2326* (LP)].

Chaetanthera incana Poepp. ex Less. var. *spathulata* DC. = **Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera involucrata Phil. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **involucrata** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera kalinae A.M.R. Davies
Referencias: Davies, A. M. R., 2006.
Hierba. Anual. Endémica. 2300–3100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 25090* (CONC)].

Chaetanthera kunthiana Less. = **Chaetanthera tenella** Less. var. **tenella**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera lanata (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Chaetanthera philippii* Rob., *Chondrochilus grandiflorus* Phil., *Chondrochilus involucratus* Phil., *Chondrochilus lanatus* Phil., *Tylloma involucratum* Phil., *Tylloma lanatum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3800 m.
Países: ARG(LRI, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 225a* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3550* (LP)].

Chaetanthera lanigera Phil. = **Chaetanthera apiculata** (J. Remy) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera leptocephala Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 1200–2000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 2192* (LP)].

Chaetanthera limbata (D. Don) Less.
Sin.: *Chaetanthera schroederi* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Tylloma ciliatum* Phil., *Tylloma eurylepis* Phil., *Tylloma glabratum* DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Tylloma limbatum* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Tombesi, T. S., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 1900–3000 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7504* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2402* (LP)].

Chaetanthera linearis Poepp. ex Less. var. **albiflora** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12699* (LP)].

Chaetanthera linearis Poepp. ex Less. var. **linearis**
Sin.: *Euthrixia affinis* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 5214* (LP)].

Chaetanthera linearis Poepp. ex Less. var. **taltalensis** I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5144* (GH)].

Chaetanthera linifolia (Bertero) Less. = **Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn. var. **microphylla**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera linifolia (Bertero) Less. var. *albiflora* Phil. = **Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn. var. **albiflora** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera linifolia (Bertero) Less. var. *depauperata* DC. = **Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn. var. **microphylla**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera lycopodioides (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Aldunantea lycopodioides* J. Remy, *Oriastrum gayi* Phil., *Oriastrum glabriusculum* Phil., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd., *Oriastrum lycopodioides* (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers; Tombesi, T. S., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–3900 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, A. 2067* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 2468* (LP)].

Chaetanthera magellanica (Lam.) Spreng. = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Chaetanthera microphylla (Cass.) Hook. & Arn. var. **albiflora** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera linifolia* (Bertero) Less. var. *albiflora* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3499* (LP)].

Chaetanthera microphylla (Cass.) Hook. & Arn. var. **microphylla**
Sin.: *Chaetanthera linifolia* (Bertero) Less., *Chaetanthera linifolia* (Bertero) Less. var. *depauperata* DC., *Chaetanthera salsoloides* (D. Don) Kuntze, *Cherina microphylla* Cass., *Euthrixia salsoloides* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11120* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3477* (LP)].

Chaetanthera minuta (Phil.) Cabrera
Sin.: *Oriastrum gossypinum* Phil., *Tylloma gnaphalioides* Phil., *Tylloma minutum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 2400–4100 m.
Países: ARG(MEN, SAL, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, A. 7186* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 1564* (LP)].

Chaetanthera moenchioides Less.
Sin.: *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *pauciflora* F. Meigen, *Chaetanthera moenchioides* Less. var. *sulphurea* F. Meigen, *Chaetanthera tenuifolia* Deless., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mahu, M. 5618* (LP)].

Chaetanthera moenchioides Less. var. *pauciflora* F. Meigen = **Chaetanthera moenchioides** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera moenchioides Less. var. *sulphurea* F. Meigen = **Chaetanthera moenchioides** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera montana Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera multicaulis DC. = **Chaetanthera ciliata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera multicaulis DC. var. *prostata* DC. = **Chaetanthera flabellata** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera multiflora Humb. & Bonpl. = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Chaetanthera nana Phil. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera obtusata Phil. = **Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera pallida (Phil.) Hauman = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera parviflora Phil. = **Trichocline dealbata** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Chaetanthera pentacaenoides (Phil.) Hauman
Sin.: *Oriastrum pentacaenoides* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9797* (LP)].

[Chaetanthera pentapetala Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Notas: Nombre dudoso.

Chaetanthera perpusilla (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Chaetanthera aymarae* Martic. & Quezada, *Luciliopsis perpusilla* Wedd.
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.
Hierba. Anual. Nativa. 2500–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 585* (CONC)].

Chaetanthera philippii Rob. = **Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera planiseta Cabrera
Sin.: *Oriastrum pusillum* Poepp. & Endl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 9849* (LP)].

Chaetanthera pratensis Phil. = **Chaetanthera elegans** Phil. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chaetanthera prostrata D. Don = **Chaetanthera flabellata** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera pulvinata (Phil.) Hauman var. *acheno-hirsuta* Tombesi = **Chaetanthera acheno-hirsuta** (Tombesi) Arroyo, A.M.R. Davies & Till-Bottraud
Referencias: Arroyo, M. T. K., Davies, A. M. R. & Till-Bottraud, I., 2004.

Chaetanthera pulvinata (Phil.) Hauman var. *acuminati-bracteata* Hauman = **Chaetanthera sphaeroidalis** (Reiche) Hicken
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera pulvinata (Phil.) Hauman var. **polymalla** (Phil.) Hicken
Sin.: *Chaetanthera acerosa* auct. non (J. Remy) Bonpl. & Humb., *Oriastrum polymallum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 687* (LP)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Chaetanthera pulvinata (Phil.) Hauman var. **pulvinata**
Sin.: *Oriastrum pulvinatum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU, TUC); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. s.n.* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 1651* (CONC)].

Chaetanthera pusilla (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Aldunantea chilensis* J. Remy, *Oriastrum chilense* Wedd., *Oriastrum pusillum* Reiche var. *uncinatum* Reiche, *Oriastrum pusillum* Reiche, hom. illeg., *Tylloma pusillum* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 2102* (LP)]; CHL[*Montero, G. 1039* (LP)].

Chaetanthera ramosissima D. Don = **Chaetanthera tenella** Less. var. **tenella**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera recurvata (Vahl) Spreng. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Chaetanthera renifolia (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Chaetanthera crenata* (Phil.) F. Meigen, nom. illeg., *Chondrochilus crenatus* Phil., *Elachia renifolia* J. Remy, *Tylloma renifolium* (J. Remy) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, O. s.n.* (LP)].

Chaetanthera revoluta (Phil.) Cabrera
Sin.: *Egania appressa* Phil., *Egania revoluta* Phil., *Oriastrum dioicum* (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Tombesi, T. S., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 3100–4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1325* (LP)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Chaetanthera salsoloides (D. Don) Kuntze = **Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn. var. **microphylla**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera scariosa D. Don = **Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera schroederi G.F. Grandjot & K. Grandjot = **Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera sericea Lag. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera serrata auct. non Ruiz & Pav. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera serrata Ruiz & Pav.
Sin.: *Chaetanthera humilis* Phil., *Chaetanthera serrata* Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Chaetanthera spinulosa* Cass., *Proselia serrata* (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 1282* (LP)].

Chaetanthera serrata Ruiz & Pav. var. *argentea* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera serrata Ruiz & Pav. var. *humilis* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera serrata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera serrata Ruiz & Pav. var. *nana* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera spathulata (Phil.) Hauman, nom. illeg. = **Chaetanthera spathulifolia** Cabrera

Chaetanthera spathulata Poepp. ex Less. = **Chaetanthera incana** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera spathulifolia Cabrera
Sin.: *Carmelita spathulata* Phil., *Chaetanthera spathulata* (Phil.) Hauman, nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 5354* (CONC)].

Chaetanthera sphaeroidalis (Reiche) Hicken
Sin.: *Chaetanthera pulvinata* (Phil.) Hauman var. *acuminati-bracteata* Hauman, *Oriastrum sphaeroidale* Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Nativa. 3700–4700 m.
Países: ARG(LRI, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5848* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 253* (LP)].

Chaetanthera spinulosa Cass. = **Chaetanthera serrata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera splendens (J. Remy) B.L. Rob.
Sin.: *Elachia splendens* J. Remy, *Tylloma splendens* (J. Remy) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 2300–3500 m.
Países: ARG(SJU); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Volponi, C. R. 181* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 1567* (LP)].

Chaetanthera stuebelii Hieron. var. **abbreviata** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)].

Chaetanthera stuebelii Hieron. var. **argentina** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Anual. Endémica. 3500–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 3263* (LP)].

Chaetanthera sublignosa Kuntze = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera tenella Less. var. **taltalensis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 815* (LP)].

Chaetanthera tenella Less. var. **tenella**
Sin.: *Chaetanthera berteriana* Colla, hom. illeg., *Chaetanthera kunthiana* Less., *Chaetanthera ramosissima* D. Don, *Minythodes umbellata* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 658* (LP)].

Chaetanthera tenuifolia D. Don = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **tenuifolia** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera tenuifolia Deless., hom. illeg. = **Chaetanthera moenchioides** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetanthera valdiviana Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 178* (LP)].

Chaetanthera villosa D. Don
Sin.: *Carmelita formosa* Gay ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Hosseus, C. C. 435* (LP)].

Chaetanthera volckmanni Phil. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **argentea** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chaetospira funckii (Turcz.) S.F. Blake = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Chaetospira spiralis (Less.) Aspl. & S.F. Blake = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Chamaemelum Mill.

Número de especies: 1 introducida

Chamaemelum cotula (L.) All. = **Anthemis cotula** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Chamaemelum mixtum (L.) All.
Sin.: *Anthemis mixta* L., *Ormenis mixta* (L.) Dumort.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI); BRA(RGS); CHL(V, VIII); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, FLO, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 942* (LP)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6487* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 2195* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 370* (LP)].

Chamomilla inodora (L.) Gilib. = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Chamomilla recutita (L.) Rauscher = **Matricaria recutita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Xifreda, C. C., 1985.

Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. = **Matricaria matricarioides** (Less.) Porter
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Chaptalia Vent.

Número de especies: 13, 2 endémicas

Chaptalia arechavaletae Arechav.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5369* (LP)]; BRA[*Girardi-Deiro, A. M. s.n.* (CNPO)]; URY[*Rosengurtt, B. 142* (LP)].

Chaptalia cordifolia (Baker) Cabrera
Sin.: *Trichocline cordifolia* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6754* (LP)].

Chaptalia ebracteata (Kuntze) K. Schum. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var. **chilensis** (DC.) Burkart
Sin.: *Gerbera chilensis* (DC.) Sch. Bip., *Loxodon chilensis* DC., *Thyrsanthema chilensis* (DC.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1944a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2008* (LP)].

Chaptalia exscapa (Pers.) Baker var. **exscapa**
Sin.: *Gerbera brevipes* Sch. Bip., *Leria exscapa* DC., *Loxodon brevipes* Cass., *Tussilago exscapa* Pers.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, FLO, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 2191* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 10483* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1910* (LP)].

Chaptalia graminifolia (Dusén) Cabrera
Sin.: *Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker var. *graminifolia* Dusén, *Chaptalia runcinata* Kunth var. *graminifolia* (Dusén) Cabrera
Referencias: Burkart, A., 1944a; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2100 m.
Países: BRA(PAR, SCA); URY(FLA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9760* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 5041* (LP)].

Chaptalia heterophylla (Spreng.) D. Don = **Trichocline heterophylla** (Spreng.) Less.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Chaptalia ignota Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); URY(ART, CLA, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 2830* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4129* (LP)].

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart
Sin.: *Chaptalia integrifolia* (Cass.) Baker, hom. illeg., *Chaptalia microdonta* Greene, *Leria integrifolia* Cass., *Leria lutescens* Sch. Bip., nom. illeg., *Leria nutans* (L.) DC. var. *integrifolia* (Cass.) Less., *Tussilago integerrima* Vell.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Marchesi, E., com. pers.; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI); URY(CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7339* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 5335* (LP)]; PRY[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 10569* (LP)].

Chaptalia integrifolia (Cass.) Baker, hom. illeg. = **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Chaptalia majuscula Greene = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Chaptalia mandonii Sch. Bip. ex Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a; Marchesi, E., com. pers.; Mondin, C. A. & Matzenbacher, N. I., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24945* (LP)]; BRA[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 18214* (MVFA)].

Chaptalia microdonta Greene = **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Chaptalia modesta Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4670* (LP)].

Chaptalia nutans (L.) Hemsl., comb. superfl. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Chaptalia nutans (L.) Pol.
Sin.: *Chaptalia ebracteata* (Kuntze) K. Schum., *Chaptalia majuscula* Greene, *Chaptalia nutans* (L.) Hemsl., comb. superfl., *Chaptalia subcordata* Greene, *Gerbera nutans* (L.) Sch. Bip., *Leria lyrata* Cass., *Leria nutans* (L.) DC., *Thyrsanthema ebracteata* Kuntze, *Thyrsanthema nutans* (L.) Kuntze, *Tussilago lyrata* Pers., *Tussilago nutans* L., *Tussilago vaccina* Vell.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(ART, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2964* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 29176* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 9825* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 7076* (LP)].

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker
Sin.: *Chaptalia piloselloides* (Vahl) Baker subsp. *bracteata* (Cass.) Burkart, *Gerbera bracteata* (Cass.) Sch. Bip., *Lieberkuhna bracteata* Cass., *Perdicium piloselloides* Vahl, *Tussilago sinuata* Pers.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Matzenbacher, N. I., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS); BRA(RGS); PRY(COA, PAI); URY(CAS, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 2208* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 511* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 2519* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 1504* (LP)].

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker var. *graminifolia* Dusén = **Chaptalia graminifolia** (Dusén) Cabrera
Referencias: Burkart, A., 1944a; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973.

Chaptalia piloselloides (Vahl) Baker subsp. *bracteata* (Cass.) Burkart = **Chaptalia piloselloides** (Vahl) Baker
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Chaptalia runcinata Kunth
Sin.: *Loxodon longipes* Cass., *Oxydon bicolor* Less.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, GUA, PAI, SPE); URY(FLA, MON, RNO, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 907* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37426* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 9684* (LP)]; URY[*Felippone, F. 3287* (SI)].

Chaptalia runcinata Kunth var. *graminifolia* (Dusén) Cabrera = **Chaptalia graminifolia** (Dusén) Cabrera
Referencias: Burkart, A., 1944a; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973.

Chaptalia similis R.E. Fr.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 778* (LP)].

Chaptalia sinuata (Less.) Baker
Sin.: *Leria nutans* (L.) DC. var. *sinuata* Less., *Leria sinuata* (Less.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1944a; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI); URY(COL, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13266* (SI)]; BRA[*Rauh, W. 83* (LP)]; PRY[*Osten, C. 8774* (G)]; URY[*Gibert, J. E. 822* (K)].

Chaptalia subcordata Greene = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Cherina microphylla Cass. = **Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn. var. **microphylla**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chersodoma Phil.

Número de especies: 5, 2 endémicas

[Chersodoma antennaria (Wedd.) Cabrera]
Sin.: *Chersodoma diclina* (Wedd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1946b; Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].
Sin.: *Senecio antennaria* Wedd., *Senecio diclinus* Wedd.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chersodoma arequipensis (Cuatrec.) Cuatrec.
Sin.: *Chersodoma longipedicellata* Ricardi & Martic., *Senecio arequipensis* Cuatrec.
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].
Subarbusto. Nativa. 3200–3700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 2451* (CONC)].

Chersodoma argentina Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].
Arbusto. Endémica. 2000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7755* (GH)].

Chersodoma candida Phil.
Sin.: *Senecio chersodomus* Reiche, *Senecio oxyodon* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].
Arbusto. Nativa. 3600–4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabezas, V. s.n.* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 85-332* (CONC)].

Chersodoma diclina (Wedd.) Cabrera = **Chersodoma antennaria** (Wedd.) Cabrera

Chersodoma diclina (Wedd.) Cabrera var. *glabriuscula* (Cabrera) Cabrera = **Chersodoma glabriuscula** (Cabrera) M.O. Dillon & Sagást.
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].

Chersodoma glabriuscula (Cabrera) M.O. Dillon & Sagást.
Sin.: *Chersodoma diclina* (Wedd.) Cabrera var. *glabriuscula* (Cabrera) Cabrera, *Senecio diclinus* Wedd. var. *glabriusculus* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].
Arbusto. Endémica. 3200–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11797* (SI)].

Chersodoma jodopappa (Sch. Bip. ex Wedd.) Cabrera
Sin.: *Senecio jodopappus* Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].
Arbusto. Nativa. 3200–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17543* (CONC, LP)]; CHL[*Marticorena, C. 67* (CONC)].

Chersodoma longipedicellata Ricardi & Martic. = **Chersodoma arequipensis** (Cuatrec.) Cuatrec.
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].

Chevreulia Cass.

Número de especies: 5, 3 endémicas

Chevreulia acuminata Less.
Sin.: *Chevreulia filiformis* Hook. & Arn., *Chevreulia longipes* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Freire, S. E., 1995, 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8446* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 17669* (LP)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10099* (LP)]; URY[*Gallinal, J. P. 1883* (LP)].

Chevreulia diemii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 59* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 5700* (CONC)].

Chevreulia filiformis Hook. & Arn. = **Chevreulia acuminata** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978.

Chevreulia lanceolata J. Remy = **Chevreulia pusilla** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chevreulia longipes Wedd. = **Chevreulia acuminata** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1978.

Chevreulia lycopodioides (d'Urv.) DC.
Sin.: *Gnaphalium lycopodioides* d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Muñoz-Schick, M., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Skottsberg, C. J. F. 112* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 7891* (LP)].

Chevreulia nivea Phil. = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chevreulia pusilla DC.
Sin.: *Chevreulia lanceolata* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19928* (LP)]; CHL[*Philippi, F. 1087a* (LP)].

Chevreulia sarmentosa (Pers.) S.F. Blake
Sin.: *Chevreulia stolonifera* Cass., *Chevreulia thouarsii* J. Remy, *Gnaphalium calycinum* Poir., *Leria cespitosa* Spreng., *Tussilago sarmentosa* Pers., *Xeranthemum caespitosum* Thouars
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Freire, S. E., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(VIII, IX, X); PRY(GUA, ITA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5372* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 29046* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3211* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4434* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 317* (LP)].

Chevreulia stolonifera Cass. = **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978.

Chevreulia thouarsii J. Remy = **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1978.

Chiliophyllum Phil.

Número de especies: 3 endémicas

Chiliophyllum andinum Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1959c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 18960* (LP)].

Chiliophyllum densifolium Phil.
Sin.: *Phyllochilium densifolium* (Phil.) Cabrera
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Cabrera, A. L., 1937a; Philippi, R. A., 1862b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 23774* (CORD)].

Chiliophyllum fuegianum O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Moore, D. M., 1983; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 338* (LP)]; CHL[*Magens, O. s.n.* (SGO)].

Chiliotrichiopsis Cabrera

Número de especies: 3, 2 endémicas

Chiliotrichiopsis keidelii Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1937a, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Nativa. 2200–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keidel, J. s.n.* (LP)].

Chiliotrichiopsis ledifolia (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Gutierrezia ledifolia* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1944b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 2300–3300 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 610* (CORD)].

Chiliotrichiopsis mendocina Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 2200–2600 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*King 333* (LP)].

Chiliotrichum Cass.

Número de especies: 2 endémicas

Chiliotrichum amelloideum Cass. = **Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum amelloideum Cass. var. *lanceolatum* Nees = **Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum amelloideum Cass. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees = **Chiliotrichum rosmarinifolium** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum darwinii Hook. f. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Chiliotrichum diffusum (G. Forst.) Kuntze
Sin.: *Amellus diffusus* G. Forst., *Aster magellanicus* Spreng., hom. illeg., *Chiliotrichum amelloideum* Cass., *Chiliotrichum amelloideum* Cass. var. *lanceolatum* Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *media* Speg., *Chiliotrichum virgatum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Kuntze, C. E. O., 1898; Pichi Sermolli, R. E. G. & Bizarri, M. P., 1978.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 7119* (BAA)]; CHL[*Pisano, E. 8837* (CONC)].

Chiliotrichum diffusum (G. Forst.) Kuntze var. *angustifolium* Speg. = **Chiliotrichum rosmarinifolium** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum diffusum (G. Forst.) Kuntze var. *media* Speg. = **Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum humile Hook. f. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum kingii Hook. f. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Chiliotrichum longifolium Phil. = **Chiliotrichum rosmarinifolium** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chiliotrichum rosmarinifolium Less.
Sin.: *Chiliotrichum amelloideum* Cass. var. *rosmarinifolium* (Less.) Nees, *Chiliotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze var. *angustifolium* Speg., *Chiliotrichum longifolium* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Lessing, C. F., 1831; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 500–2700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32893* (LP, SI)]; CHL[*Marticorena, C. 886* (CONC)].

Chiliotrichum virgatum Phil. = **Chiliotrichum diffusum** (G. Forst.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chionoptera gayophyta DC. = **Pachylaena atriplicifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Chlaenobolus alopecuroides (Lam.) Cass. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Chlaenobolus rugosus (Vahl) Cass. = **Pterocaulon rugosum** (Vahl) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Chlaenobolus virgatus (L.) Cass. = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Chondrilla L.

Número de especies: 1 introducida

Chondrilla juncea L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Tortosa, R. D. & Medan, D., 1977.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niven s.n.* (BAA, LP)].

[Chondrilla uniflora Larrañaga]
Notas: Nombre dudoso.

Chondrochilus crenatus Phil. = **Chaetanthera renifolia** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chondrochilus grandiflorus Phil. = **Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chondrochilus involucratus Phil. = **Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chondrochilus lanatus Phil. = **Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chondrochilus parvifolius Phil. = **Chaetanthera gnaphalioides** (J. Remy) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Chresta Vell. ex DC.

Número de especies: 2

Chresta plantaginifolia (Less.) Gardner
Sin.: *Eremanthus plantaginifolius* (Less.) Baker, *Vernonia plantaginifolia* Less.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16766a* (S)].

Chresta sphaerocephala DC.
Sin.: *Eremanthus sphaerocephalus* (DC.) Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10080* (S)].

Chroilema subcanescens Bernh. = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Chromolaena angusticeps (Malme) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium angusticeps** Malme

Chromolaena arnottiana (Griseb.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium arnottianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Chromolaena ascendens (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena asperrima (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium asperrimum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena barbacensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium barbacense** Hieron.

Chromolaena caaguazuensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium caaguazuense** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena christieana (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium christieanum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1978, 1996f.

Chromolaena congesta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena connivens (Rusby) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium connivens** Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Chromolaena densiflora (Morong) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium orbignyanum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1932c.

Chromolaena elliptica (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium ellipticum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena ferruginea R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium charpinii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena foliata (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Chromolaena gentianoides (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Brickellia gentianoides** B.L. Rob.

Chromolaena hirsuta (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium hirsutum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena hookeriana (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium hookerianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Chromolaena ivifolia (L.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Chromolaena jujuiense (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium hookerianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Chromolaena kleinii (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium kleinii** Cabrera

Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium laevigatum** Lam. var. **laevigatum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Chromolaena margaritensis (Hassl.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium margaritense** (Hassl.) Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium odoratum** L. var. **odoratum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978, 1996f.

Chromolaena oinopolepis (Malme) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium oinopolepis** (Malme) Cabrera

Chromolaena orbignyana (Klatt) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium orbignyanum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena oxylepis (DC.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium oxylepis** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena palmaris (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium palmare** Sch. Bip. ex Baker

Chromolaena paraguariensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Chromolaena pedunculosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena polyantha (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium polyanthum** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Chromolaena pratensis Gardner = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Chromolaena punctulata (DC.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium punctulatum** DC.

Chromolaena rhinanthacea (DC.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium rhinanthaceum** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena rojasii (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium rojasii** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena sanctopaulensis (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium sanctopaulense** B.L. Rob.

Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob.
= **Eupatorium squalidum** DC. var. **squalidum**

Chromolaena squarroso-ramosa (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium squarroso-ramosum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Chromolaena squarrulosa (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Chromolaena stachyophylla (Spreng.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium stachyophyllum** Spreng.

Chromolaena toldensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium toldense** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Chromolaena tunariensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tunariense** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Chromolaena ulei (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium ulei** Hieron.

Chromolaena umbelliformis (Dusén) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium umbelliforme** Dusén

Chromolaena verbenacea (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium verbenaceum** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Chromolaena xylorhyza (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium xylorhizum** Sch. Bip. ex Baker

Chrysanthellum Rich.

Número de especies: 1

Chrysanthellum argentinum Ariza & Cerana = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner

Chrysanthellum boliviense Sch. Bip., nom. nud. = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner
Referencias: Turner, B. L., 1988.

Chrysanthellum indicum DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner
Sin.: *Adenospermum tuberculatum* Hook. & Arn., *Chrysanthellum argentinum* Ariza & Cerana, *Chrysanthellum boliviense* Sch. Bip., nom. nud., *Chrysanthellum tuberculatum* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Chrysanthellum weberbaueri* I.C. Chung, *Hinterhubera kotschyi* Sch. Bip. ex Hochst., *Plagiocheilus erectus* Rusby
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20145* (LP, SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Ariza Espinar, 2000b).

Chrysanthellum tuberculatum (Hook. & Arn.) Cabrera = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner

Chrysanthellum weberbaueri I.C. Chung = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner

Chrysanthemoides Fabr.

Número de especies: 1 introducida

Chrysanthemoides monilifera (L.) Norl.
Sin.: *Osteospermum moniliferum* L.
Referencias: Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Arbusto. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4594* (CONC)].

Chrysanthemum L.

Número de especies: 2 introducidas

[Chrysanthemum anethifolium Brouss. ex Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chrysanthemum balsamita L., hom. illeg. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Chrysanthemum balsamitoides Nábelek = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Chrysanthemum coronarium L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(LPA); CHL(III, IV, V, VII, VIII, IJF); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 10884* (SRFA)]; CHL[*Boelcke, O. 3943* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1405* (LP)].

Chrysanthemum frutescens L. = **Argyranthemum frutescens** (L.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Chrysanthemum inodorum (L.) L. = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1971a; Moore, D. M., 1983.

Chrysanthemum leucanthemum L. = **Leucanthemum vulgare** Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Chrysanthemum myconis L. = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh. = **Tanacetum parthenium** (L.) Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Chrysanthemum segetum L.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: CHL(X).
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena, com. pers.).

Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. = **Tanacetum vulgare** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a.

Chrysocoma aphylla Vell. = **Baccharis aphylla** (Vell.) DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Chrysocoma arborea Vell. = **Vernonia tweedieana** Baker
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Chrysocoma crassa Vell. = **Vernonia crassa** (Vell.) Ekman ex Malme

Chrysocoma cruciata Vell. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**

Chrysocoma cuneifolia Jacq. = **Baccharis patagonica** Hook. & Arn.
Referencias: Hellwig, F. H., 1990.

Chrysocoma dentata Vell. = **Baccharis dentata** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Chrysocoma herbacea Vell. = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby

Chrysocoma maritima Vell. = **Baccharis dentata** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Chrysocoma nuda Vell. = **Baccharis aphylla** (Vell.) DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Chrysocoma oligophylla Vell. = **Vernonia hypochlora** Malme

Chrysocoma pumilla Vell. = **Vernonia pumilla** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.

Chrysocoma purpurea Vell. = **Baccharis singularis** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Chrysocoma quadrangularis Vell. = **Piptocarpha quadrangularis** (Vell.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Chrysocoma repanda Vell. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Chrysocoma singularis Vell. = **Baccharis singularis** (Vell.) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Chrysogonum peruvianum L. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Chrysolaena flexuosa (Sims) H. Rob. = **Vernonia flexuosa** Sims var. **flexuosa**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988b.

Chrysolaena herbacea (Vell.) H. Rob. = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby

Chrysolaena lithospermifolia (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia lithospermifolia** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988b.

Chrysolaena platensis (Spreng.) H. Rob. = **Vernonia platensis** (Spreng.) Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988b.

Chrysolaena propinqua (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia propinqua** Hieron. var. **propinqua**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Chrysolaena verbascifolia (Less.) H. Rob. = **Vernonia verbascifolia** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1988b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Chrysopsis andicola Phil. = **Hysterionica jasionoides** Willd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Chuquiraga Juss.

Número de especies: 17, 12 endémicas

Chuquiraga acanthophylla Wedd.
Sin.: *Chuquiraga punensis* Gaspar
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9468* (LP)].

Chuquiraga acicularis D. Don = **Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **acicularis** (D. Don) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga alpina Poepp. ex Less. = **Chuquiraga oppositifolia** D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga anomala D. Don = **Doniophyton anomalum** (D. Don) Kurtz
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997.

Chuquiraga argentea (Speg.) Speg., nom. illeg. = **Chuquiraga morenonis** (Kuntze) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga argentea (Speg.) Speg. var. *dusenii* (O. Hoffm.) Speg. = **Chuquiraga avellanedae** Lorentz
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga armata J. Kost. = **Dasyphyllum armatum** (J. Kost.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga atacamensis Kuntze
Sin.: *Chuquiraga glabra* Phil., nom. illeg.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8288* (LP)]; CHL[*Navas Bustamante, L. E. 2054* (SI)].

Chuquiraga aurea Skottsb.
Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don f. *pulvinata* Cabrera
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Birabén, M. 501* (LP)].

Chuquiraga avellanedae Lorentz
Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg. var. *dusenii* (O. Hoffm.) Speg., *Chuquiraga avellanedae* Lorentz var. *dusenii* (O. Hoffm.) Hosseus, *Chuquiraga dusenii* O. Hoffm., *Chuquiraga kingii* Ball
Referencias: Ezcurra, C., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33197* (LP)].

Chuquiraga avellanedae Lorentz var. *dusenii* (O. Hoffm.) Hosseus = **Chuquiraga avellanedae** Lorentz
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga brasiliensis (Spreng.) Kuntze = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga brasiliesis (Spreng.) Kuntze var. *divaricata* (Griseb.) Kuntze = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga calchaquina Cabrera
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 2300–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 1057* (LP)].

Chuquiraga chapadensis S. Moore = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga chrysantha Field & Gardner = **Chuquiraga oppositifolia** D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga chrysantha Field & Gardner var. *longiflora* Griseb. = **Chuquiraga longiflora** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga dusenii O. Hoffm. = **Chuquiraga avellanedae** Lorentz
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga echegarayi Hieron.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 13026* (LP)].

Chuquiraga erinacea D. Don f. *pulvinata* Cabrera = **Chuquiraga aurea** Skottsb.
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga erinacea D. Don var. *mollior* Lorentz = **Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **erinacea**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga erinacea D. Don var. *unguis-cati* (Ces.) Hauman = **Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **erinacea**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. **erinacea**
Sin.: *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *mollior* Lorentz, *Chuquiraga erinacea* D. Don var. *unguis-cati* (Ces.) Hauman, *Chuquiraga junipera* Decne., *Chuquiraga junipera* Phil., nom. illeg., *Chuquiraga ungui-cati* Ces.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 12984* (LP)].

Chuquiraga erinacea D. Don subsp. **hystrix** (Don) C. Ezcurra
Sin.: *Chuquiraga hystrix* D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 500–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 3491* (LP)].

Chuquiraga excelsa D. Don = **Dasyphyllum excelsum** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga floribunda (Gardner) Baker = **Dasyphyllum floribundum** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga glabra (Spreng.) Baker = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga glabra Phil., nom. illeg. = **Chuquiraga atacamensis** Kuntze
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga glabra (Spreng.) Baker var. *hassleriana* (Chodat) Chodat = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Chuquiraga glabra (Spreng.) Baker var. *multiflora* Baker = **Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.) Cabrera var. **multiflorum** (Baker) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga glabra (Spreng.) Baker var. *rectispina* Chodat = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Chuquiraga glabra (Spreng.) Baker var. *varians* (Gardner) Baker = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera

Chuquiraga hassleriana Chodat = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Chuquiraga hystrix D. Don = **Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **hystrix** (Don) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga incana D. Don = **Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **ulicina**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga incana Phil., nom. illeg. = **Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **ulicina**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga junipera Decne. = **Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **erinacea**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga junipera Phil., nom. illeg. = **Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **erinacea**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga kingii Ball = **Chuquiraga avellanedae** Lorentz
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga kingii Speg., hom. illeg. = **Chuquiraga morenonis** (Kuntze) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga kuschelii Acevedo
Referencias: Ezcurra, C., 1985.
Arbusto. Endémica. 2900–3900 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 19310* (LP)].

Chuquiraga latifolia (Gardner) Baker = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga leucoxylon Poepp. ex Less. = **Dasyphyllum diacanthoides** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga longiflora (Griseb.) Hieron.
Sin.: *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner var. *longiflora* Griseb., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrocephala* Wedd.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22055* (LP)].

Chuquiraga mattogrosensis Malme = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga morenonis (Kuntze) C. Ezcurra
Sin.: *Chuquiraga argentea* (Speg.) Speg., nom. illeg., *Chuquiraga kingii* Speg., hom. illeg., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *morenonis* Kuntze, *Doniophyton argenteum* Speg.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 2043* (LP)].

Chuquiraga oppositifolia D. Don
Sin.: *Barnadesia flavescens* Meyen, *Chuquiraga alpina* Poepp. ex Less., *Chuquiraga chrysantha* Field & Gardner, *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *angustifolia* Ces., *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *macrantha* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13863* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3928* (LP)].

Chuquiraga oppositifolia D. Don var. *angustifolia* Ces. = **Chuquiraga oppositifolia** D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga oppositifolia D. Don var. *macrantha* J. Remy = **Chuquiraga oppositifolia** D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga oppositifolia D. Don var. *macrocephala* Wedd. = **Chuquiraga longiflora** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga oppositifolia D. Don var. *microcephala* Wedd. = **Chuquiraga parviflora** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga paniculata DC. = **Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.) Cabrera var. **tomentosum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga parviflora (Griseb.) Hieron.
Sin.: *Chuquiraga oppositifolia* D. Don var. *microcephala* Wedd., *Chuquiraga spinosa* Less. var. *parviflora* Griseb.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25528* (LP)].

Chuquiraga patagonica Phil. = **Doniophyton anomalum** (D. Don) Kurtz
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997.

Chuquiraga punensis Gaspar = **Chuquiraga acanthophylla** Wedd.
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga racemosa Baker = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga regnelli Baker = **Dasyphyllum flagellare** (Casar.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga revoluta Fielding & Gardner = **Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **acicularis** (D. Don) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga rosulata Gaspar
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 400–2000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19421* (LP)].

Chuquiraga rotundifolia Wedd. = **Chuquiraga spinosa** Less. subsp. **rotundifolia** (Wedd.) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga ruscifolia D. Don
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30131* (LP)].

Chuquiraga spinescens (Less.) Baker = **Dasyphyllum spinescens** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga spinosa Less. var. *morenonis* Kuntze = **Chuquiraga morenonis** (Kuntze) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga spinosa Less. var. *parviflora* Griseb. = **Chuquiraga parviflora** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga spinosa Less. subsp. **australis** C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 24037* (LP)]; CHL[*Martin, H. C. 456* (LP)].

Chuquiraga spinosa Less. subsp. **rotundifolia** (Wedd.) C. Ezcurra
Sin.: *Chuquiraga rotundifolia* Wedd.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 248* (CONC), *Zoellner, O. 3033* (LP)].

Chuquiraga sprengeliana (Gardner) Baker f. *mattogrosensis* (Malme) Hassl. = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga sprengeliana (Gardner) Baker f. *paraguariensis* Hassl. = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga sprengeliana (Gardner) Baker f. *subinermis* Hassl. = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga sprengeliana (Gardner) Baker var. *chapadensis* (S. Moore) Hassl. = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga straminea Sandwith
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5143* (LP)].

Chuquiraga synacantha Baker = **Dasyphyllum synacanthum** (Baker) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga tomentosa (Spreng.) Baker = **Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.) Cabrera var. **tomentosum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst. = **Chuquiraga ulicina** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **ulicina**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **acicularis** (D. Don) C. Ezcurra
Sin.: *Chuquiraga acicularis* D. Don, *Chuquiraga revoluta* Fielding & Gardner
Referencias: Ezcurra, C., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3495* (LP)].

Chuquiraga ulicina (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. subsp. **ulicina**
Sin.: *Barnadesia ulicina* Hook. & Arn., *Chuquiraga incana* D. Don, *Chuquiraga incana* Phil., nom. illeg., *Chuquiraga ulicina* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. var. *incana* (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Ezcurra, C., 1985, 1996; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12674* (LP)].

Chuquiraga ungui-cati Ces. = **Chuquiraga erinacea** D. Don subsp. **erinacea**
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Chuquiraga vagans (Gardner) Baker = **Dasyphyllum vagans** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Chuquiraga varians (Gardner) Rusby = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1997a.

Cichorium L.

Número de especies: 1 introducida

Cichorium intybus L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, TUC); BRA(SCA); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(ART, CAS, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 154* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 17000* (LP)]; CHL[*Maldonado 82* (LP)]; URY[*Felippone, F. 2796* (SI)].

Cineraria brasiliensis Spreng. = **Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **brasiliensis**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria crassiflora Poir. = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a.

Cineraria gigantea Sm. = **Senecio smithii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria humilis Poepp. = **Senecio viscosissimus** Colla
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Cineraria leucantha Banks & Sol. ex Walp. = **Senecio smithii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria megapotamica Spreng., p.p. = **Senecio leptolobus** DC.

Cineraria megapotamica Spreng., p.p. = **Senecio pinnatus** Poir. var. **pinnatus**

Cineraria montevidensis Spreng. = **Senecio montevidensis** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria phylicifolia Poepp. ex DC. = **Senecio phylicifolius** Poepp. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Cineraria selloi Spreng. = **Senecio selloi** (Spreng.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria tillandsiaefolia Poepp. ex DC. = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria trifurcata Spreng. = **Senecio trifurcatus** (G. Forst.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cineraria vestita Spreng. = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Cirsium Mill.

Número de especies: 2 introducidas

Cirsium arvense (L.) Scop.
Sin.: *Serratula arvensis* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983; Moore, R. J. & Frankton, C., 1974.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(V, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 3654* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 651* (CONC)].

Cirsium lanceolatum (L.) Scop. = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Cirsium vulgare (Savi) Airy Shaw, comb. superfl. = **Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Sin.: *Carduus lanceolatus* L., *Carduus vulgaris* Savi, *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop., *Cirsium vulgare* (Savi) Airy Shaw, comb. superfl.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Lombardo, A., 1983; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983; Novara, L. J., 1993h; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 140* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 73732* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 157* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 835* (LP)].

Clarionea affinis Phil. = **Perezia fonkii** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea atacamensis Phil. = **Perezia purpurata** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea carthamoides D. Don = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea carthamoides D. Don var. *crispa* (Meyen) Phil. = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea caulescens Phil. = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea ciliaris (Hook. & Arn.) DC. = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea ciliosa Phil. = **Perezia ciliosa** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea comosa Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea elegans Phil. = **Perezia magellanica** (L. f.) Lag.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea fonkii Phil. = **Perezia fonkii** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea glaberrima Cass., nom. illeg. = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea humilis Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea laciniata Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea lactucoides (Vahl) D. Don = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea lechleri Sch. Bip. = **Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea magellanica (L. f.) DC. = **Perezia magellanica** (L. f.) Lag.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea multicapitata J. Remy = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea nana Phil. = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea parvifolia Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea pilifera D. Don = **Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea pinnata Phil. = **Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea polycephala Cass., nom. illeg. = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea recurvata (Vahl) D. Don = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea spathulata Lag. ex D. Don = **Perezia spathulata** (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea spectabilis Phil. = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea variabilis Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionea volkmanii Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionema virens (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil. = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Clarionia virens D. Don = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Cleanthes brasiliensis (L.) D. Don = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Cleanthes hieracioides D. Don = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Cleanthes hieracioides D. Don var. *thrincioides* Griseb. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Cleanthes ochroleuca (Cass.) Parodi = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Cleanthes othonoides (Less.) Griseb. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Clibadium L.

Número de especies: 2

Clibadium armanii (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz
Sin.: *Clibadium rotundifolium* DC., *Eupatorium armanii* Balb.
Referencias: Arriagada, J. E., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25957* (UC)]; PRY[*Krapovickas, A. 14274* (CTES, SI)].

Clibadium heterotrichum S.F. Blake = **Clibadium peruvianum** Poepp. ex DC.
Referencias: Arriagada, J. E., 1995.

Clibadium peruvianum Poepp. ex DC.
Sin.: *Clibadium heterotrichum* S.F. Blake, *Clibadium psilogynum* S.F. Blake, *Clibadium remotiflorum* O.E. Schulz, *Clibadium vargasianum* H. Rob.
Referencias: Arriagada, J. E., 2003; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Nativa. 100–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2787* (LP, SI)].

Clibadium psilogynum S.F. Blake = **Clibadium peruvianum** Poepp. ex DC.
Referencias: Arriagada, J. E., 1995.

Clibadium remotiflorum O.E. Schulz = **Clibadium peruvianum** Poepp. ex DC.
Referencias: Arriagada, J. E., 1995.

Clibadium rotundifolium DC. = **Clibadium armanii** (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz

Clibadium vargasianum H. Rob. = **Clibadium peruvianum** Poepp. ex DC.
Referencias: Arriagada, J. E., 1995.

Closia anthemoides Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia brachypetala Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia chilensis Regel & Körn. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia cotula J. Remy = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia cotula J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Powell, A. M., 1974.

Closia digitata Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia discoidea Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Powell, A. M., 1974.

Closia elata Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Powell, A. M., 1974.

Closia elata Phil. var. *nana* Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia foliosa Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia pusilla Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Closia viridis Phil. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Johnston, I. M., 1929a.

Clybatis volkmanii Phil. = **Leucheria nutans** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Cnicothamnus Griseb.

Número de especies: 2

Cnicothamnus azafran (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Cnicothamnus lorentzii* Griseb. var. *azafran* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978, 1998.
Arbusto o arbolito. Nativa. 300–2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26287* (LP)]; PRY[*Ramella, L. 2864* (G)].

Cnicothamnus lorentzii Griseb.
Sin.: *Lefrovia rhaponticoides* Franch.

Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Katinas, L. & Sancho, G., 2002.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26522* (LP)].

Cnicothamnus lorentzii Griseb. var. *azafran* Cabrera = **Cnicothamnus azafran** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Cnicus benedictus L. = **Centaurea benedicta** (L.) L.
Referencias: Bremer, K., 1994.

Coleostephus Cass.

Número de especies: 1 introducida

Coleostephus myconis (L.) Rchb. f., comb. superfl. = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Coleostephus myconis (L.) Cass.
Sin.: *Chrysanthemum myconis* L., *Coleostephus myconis* (L.) Rchb. f., comb. superfl., *Kremeria myconys* (L.) Maire, *Leucanthemum myconis* (L.) Giraud, *Matricaria myconis* (L.) Desr., *Myconella myconis* (L.) Sprague, *Myconia myconis* (L.) Briq. & Cavill., *Pyrethrum myconis* (L.) Moench
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., 1963a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); CHL(VII, IX); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 7537* (LP)]; BRA[*Palacios 712* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 1144* (CONC)]; URY[*Cabrera, A. L. 21874* (LP)].

Complaya trilobata (L.) Strother = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Conoclinium betonicaeforme DC. = **Eupatorium betonicaeforme** (DC.) Baker var. **betonicaeforme**
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Conyza Less.

Número de especies: 42, 32 endémicas

Conyza albida Willd. ex Spreng. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza alopecuroides Lam. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Conyza altissima Naudin ex A. Gray = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza altoandina Cabrera = **Laennecia altoandina** (Cabrera) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1990b.

Conyza andicola Phil. = **Laennecia artemisiifolia** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1990b.

Conyza andina J. Remy
Sin.: *Conyza arvensis* Phil., *Conyza dumetorum* Phil., *Conyza hirtella* (DC.) Martic., nom. illeg., *Erigeron hirtellus* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 762* (S)].

Conyza apurensis Kunth = **Conyza laevigata** (Rich.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1998b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza arabidifolia J. Remy
Sin.: *Conyza asperula* Phil., *Conyza coxi* Phil., *Conyza paulsenii* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Zardini, E. M., 1976a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 10551* (LP)].

Conyza araucana Phil. = **Conyza gayana** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza arguta Less. = **Baccharis breviseta** DC.
Referencias: Nesom, G. L., 1988.

Conyza armeriifolia Phil. = **Conyza stenophylla** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Conyza artemisiifolia Meyen & Walp. = **Laennecia artemisiifolia** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1990b.

Conyza articulata Lam. = **Baccharis articulata** (Lam.) Pers.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2001.

Conyza arvensis Phil. = **Conyza andina** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Conyza asperula Phil. = **Conyza arabidifolia** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza berteroana Phil. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Conyza bilbaoana J. Remy = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Conyza blakei (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Erigeron blakei* Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *filifolia* Chodat, *Erigeron montevidensis* Baker
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., 1953a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MIS, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN); URY(CAS, CLA, COL, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6374* (LP)]; BRA[*Pedersen, T. M. 12989* (LP)]; PRY[*Soria, N. 5974* (FCQ, MO)]; URY[*Lombardo, A. 2442* (LP)].

Conyza blanchetii Baker = **Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza boelckei Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13696* (LP, SI)].

Conyza bonariensis (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Erigeron bonariensis* L. var. *angustifolius* Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1953a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS, SCA); CHL(V); PRY(CEN); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8087* (LP)]; BRA[*Ávila de Araujo, A. 21* (LP)]; CHL[*Kause, I. 5380* (LP)]; PRY[*Krapovickas, A. 12157* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 372* (LP)].

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. **bonariensis**
Sin.: *Conyza hispida* Kunth, *Conyza linearis* DC., *Conyza plebeja* Phil., *Erigeron bonariensis* L., *Erigeron bonariensis* L. f. *grisea* Chodat
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jofré, G. M. & Rosati, V. R., 2000[1999]; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1279* (LP)]; BRA[*Rau 85* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3429* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 4026* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 439* (LP)].

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Pruski, J. F. & Sancho, G., 2006.

Conyza bonariensis (L.) Cronquist var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza bryoides Lam. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005; Cabrera, A. L., 1971a.

Conyza burkartii Zardini
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1976a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 23475* (LP)].

Conyza bustillosiana J. Remy
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (*)].

[Conyza canadensis (L.) Cronquist]
Sin.: *Erigeron canadense* L.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Conyza canescens Phil. = **Conyza gayana** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza catharinensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959e; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 151-51* (LP, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6156a* (LP)].

Conyza chilensis Spreng. = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza chilensis Spreng. var. *auriculata* Griseb. = **Conyza cordata** Kuntze
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza chilensis Spreng. var. *carnea* Chodat & Hassl. = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza chilensis Spreng. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza chingoyo Kunth = **Pluchea chingoyo** (Kunth) DC.

Conyza colinensis Phil. = **Conyza spiculosa** (Hook. & Arn.) Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza conglomerata Phil. = **Conyza larrainiana** J. Remy
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza consanguinea Phil. = **Conyza gayana** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza copiapina Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 200–1500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Serrazzi, M. s.n.* (SGO)].

Conyza cordata Kuntze
Sin.: *Conyza chilensis* Spreng. var. *auriculata* Griseb., *Erigeron cordatus* (Kunth) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993b, 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 1000–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 17699* (LP)].

Conyza coronopifolia Kunth
Sin.: *Conyza obtusa* Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1502* (LP, SI)].

Conyza coulteri A. Gray var. *tenuisecta* A. Gray = **Laennecia sophiifolia** (Kunth) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza coxi Phil. = **Conyza arabidifolia** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza cuneifolia Lam. = **Baccharis patagonica** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Conyza cupressiformis Lam. = **Lepidophyllum cupressiforme** (Lam.) Cass.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza depilis Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Fernández Peña, C. s.n.* (CONC)].

Conyza deserticola Phil.
Sin.: *Conyza punensis* Cabrera, *Erigeron cinarescens* Wedd.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26362* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 3103* (LP)].

Conyza dumetorum Phil. = **Conyza andina** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Conyza elata Kunth & Bouché = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Pruski, J. F. & Sancho, G., 2006.

Conyza erigeroides DC. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza floribunda Kunth = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Pruski, J. F. & Sancho, G., 2006; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza floribunda Kunth var. *laciniata* Cabrera = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Pruski, J. F. & Sancho, G., 2006.

Conyza floribunda Kunth var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J.B. Marshall = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza foliosa Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Conyza gayana Phil.
Sin.: *Conyza araucana* Phil., *Conyza canescens* Phil., *Conyza consanguinea* Phil., *Conyza monticola* Phil., *Conyza vulgaris* Phil., hom. illeg., *Erigeron consanguineus* (Phil.) Cabrera, *Erigeron stenophyllus* Hook. & Arn.

Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Zardini, E. M., 1976a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 15526* (LP)].

Conyza genistelloides Lam. = **Baccharis genistelloides** (Lam.) Pers.

Conyza glabrata Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Conyza glandulitecta Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1972, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(SCA); PRY(CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 9641* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11646* (LP)]; PRY[*Jorgensen, P. 4427* (LP)].

Conyza graminifolia Spreng. = **Symphyotrichum graminifolium** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Conyza hirtella (DC.) Martic., nom. illeg. = **Conyza andina** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Conyza hispida Kunth = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **bonariensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza kunthiana DC. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1986a.

Conyza laevigata (Rich.) Pruski
Sin.: *Conyza apurensis* Kunth, *Conyza subspathulata* Cronquist, *Erigeron apurensis* (Kunth) Griseb., *Erigeron laevigatus* Rich., *Erigeron spathulatus* Vahl, *Marsea spathulata* (Vahl) V.M. Badillo
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1971a; Pruski, J. F., 1998b; Roig, F. A., 1971; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 26269* (LP)].

Conyza larrainiana J. Remy
Sin.: *Conyza conglomerata* Phil., *Conyza pratensis* Phil., *Erigeron larrainianus* (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19838* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 4288* (CONC)].

Conyza lateralis Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–600 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Romo s.n.* (CONC)].

Conyza lechleri (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Erigeron lechleri* Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 500–2100 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1103* (LP)]; CHL[*Alboff, N. 1136* (LP)].

Conyza linearifolia Spreng., nom. nud. = **Baccharis dracunculifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Conyza linearis DC. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **bonariensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza linifolia Phil., hom. illeg. = **Conyza stenophylla** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Conyza lorentzii Griseb.
Sin.: *Erigeron lorentzii* (Griseb.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1974a; Marchesi, E., com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Roig, F. A., 1971; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 2328* (LP)]; URY[*Marchesi, E. 21308* (MVFA)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Augusto, 1946).

Conyza macrophylla Spreng.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MAL, MON, PAY, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7917* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 916* (LP)].

Conyza magellanica Lam. = **Baccharis magellanica** (Lam.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Conyza magnimontana Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 1451* (BAB, LP)].

Conyza megapotamica Spreng. = **Stenachaenium megapotamicum** (Spreng.) Baker var. **megapotamicum**
Referencias: Baker, J. G., 1882.

[Conyza minutiflora Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

[Conyza modesta Phil., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

[Conyza monocephala Phil., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Conyza monorchis (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Erigeron monorchis* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, LPA, SFE); URY(CAS, CLA, COL, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 687* (LP)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2506* (LP)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Augusto, 1946).

Conyza montevidensis Spreng. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Conyza monticola Phil. = **Conyza gayana** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza myosotifolia Kunth = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza myriocephala J. Remy = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Conyza notobellidiastrum Griseb. = **Podocoma notobellidiastrum** (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza notobellidiastrum Griseb. var. *oblongifolia* Griseb. = **Podocoma notobellidiastrum** (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza oblongifolia Spreng. = **Eupatorium oblongifolium** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Conyza obtusa Kunth = **Conyza coronopifolia** Kunth
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza oligantha Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14407* (LP)].

Conyza pampeana (Parodi) Cabrera
Sin.: *Erigeron pampeanus* Parodi
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993b, 2005; Cabrera, A. L., 1953a, 1974a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SFE); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, FLO, LAV, PAY, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20921* (SI), *Nicora, E. G. 5444* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 170* (LP)].

Conyza patens Phil. = **Conyza spiculosa** (Hook. & Arn.) Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza paulsenii Phil. = **Conyza arabidifolia** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Conyza pencana Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Conyza platensis Spreng. = **Vernonia platensis** (Spreng.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Conyza plebeja Phil. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **bonariensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza pratensis Phil. = **Conyza larrainiana** J. Remy
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza primulifolia (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Sin.: *Conyza chilensis* Spreng., *Conyza chilensis* Spreng. var. *carnea* Chodat & Hassl., *Conyza chilensis* Spreng. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Conyza myosotifolia* Kunth, *Conyza scabiosaefolia* J. Remy, *Conyza yungasensis* Rusby, *Erigeron chilensis* (Spreng.) D. Don ex G. Don, *Inula primulifolia* Lam., *Marsea chilensis* (Spreng.) Kuntze, *Marsea chilensis* (Spreng.) V.M. Badillo, nom. illeg.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1971a, 1978; Lourteig, A. & Cuatrecasas, J., 1985; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hierba. Bianual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, IX, X); PRY(APY, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2885* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 15662* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 612* (LP)]; PRY[*Meyer, T. 16040* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 517* (LP)].

Conyza pulchella Kunth = **Laennecia sophiifolia** (Kunth) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza punctata Willd. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Conyza punensis Cabrera = **Conyza deserticola** Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza pusilla Kunth, hom. illeg. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.

Conyza reitziana Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959e.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10421* (LP)].

Conyza retirensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959e.
Hierba. Anual. Endémica. 1600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10431* (LP)].

Conyza rivularis Gardner = **Podocoma rivularis** (Gardner) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza rugosa Vahl = **Pterocaulon rugosum** (Vahl) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Conyza sagittalis Lam. = **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949c.

Conyza saltensis Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1972, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22067* (LP)].

Conyza scabiosaefolia J. Remy = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza scorpioides Lam. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Conyza senecioides (Wedd.) Cabrera = **Laennecia artemisiifolia** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1990b.

Conyza serpentaria Griseb. = **Laennecia sophiifolia** (Kunth) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyza serrana Cabrera
Sin.: *Erigeron platensis* Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1600 m.
Países: ARG(BAI, COS, JUJ, SAL); BRA(PAR); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frangi, J. L. 450* (LP)]; BRA[*Dusén, N. P. 15638* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 1703* (LP)].

Conyza setosa (Baker) Malme = **Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

[Conyza setulosa F. Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Conyza sophiaefolia Kunth = **Laennecia sophiifolia** (Kunth) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1990b.

[Conyza spicata Phil., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Conyza spiciformis (Griseb.) Zardini
Sin.: *Erigeron spiciformis* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1976a.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 17697* (LP)].

Conyza spiculosa (Hook. & Arn.) Zardini
Sin.: *Conyza colinensis* Phil., *Conyza patens* Phil., *Erigeron colinensis* Phil., *Erigeron spiculosus* Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3960* (LP)].

Conyza spinulosa Spreng. = **Sommerfeltia spinulosa** (Spreng.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Nesom, G. L., 1994f.

Conyza squamata Spreng. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Conyza stenophylla Phil.
Sin.: *Conyza armeriifolia* Phil., *Conyza linifolia* Phil., hom. illeg., *Erigeron flagellifolius* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Conyza straminea Chodat = **Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1939b, 1974a, 1978; Freire, S. E., 1998.

Conyza subspathulata Cronquist = **Conyza laevigata** (Rich.) Pruski
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

[Conyza subspicata Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Conyza suffruticosa Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (*)].

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Pruski, J. F. & Sancho, G., 2006.

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Sin.: *Conyza bilbaoana* J. Remy, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *leiotheca* (S.F. Blake) Cuatrec., *Conyza elata* Kunth & Bouché, *Conyza floribunda* Kunth, *Conyza floribunda* Kunth var. *laciniata* Cabrera, *Conyza myriocephala* J. Remy, *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker var. *floribunda* (Kunth) J.B. Marshall, *Erigeron bilbaoanus* (J. Remy) Cabrera, *Erigeron bonariensis* L. f. *glabrata* Speg., *Erigeron bonariensis* L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec., *Erigeron bonariensis* L. var. *leiothecus* S.F. Blake, *Erigeron floribundus* (Kunth) Sch. Bip., *Marsea bonariensis* (L.) V.M. Badillo var. *leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1971a, 1978; Pruski, J. F. & Sancho, G., 2006; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Amat, A. G. 1063* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 2795* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2506* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 10891* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1087* (LP)].

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Sin.: *Conyza albida* Willd. ex Spreng., *Conyza altissima* Naudin ex A. Gray, *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec., *Conyza bonariensis* (L.) Cronquist var. *microcephala* (Cabrera) Cabrera, *Conyza erigeroides* DC., *Conyza floribunda* Kunth var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J.B. Marshall, *Erigeron albidum* (Willd.) Gray, *Erigeron albidus* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Erigeron bonariensis* L. var. *microcephalus* Cabrera, *Erigeron sumatrensis* Retz.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1982a; Cabrera, A. L., 1978; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA); URY(MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Torres Robles, S. 411* (LP)]; BRA[*Capparelli, P. N. 457* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 13945a* (LP)]; URY[*Lombardi, J. A. 2570* (LP)].

Conyza tenera Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Conyza thermarum Phil.
Sin.: *Erigeron thermarum* (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3637* (LP)].

Conyza trinervia Mill. = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Conyza trinervis Lam., hom. illeg. = **Baccharis trinervis** Pers.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Conyza triplinervia Less. = **Baccharis vulneraria** Baker
Referencias: Nesom, G. L., 1988.

Conyza tunariensis (Kuntze) Zardini
Sin.: *Erigeron tunariensis* Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1976a.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 22073* (LP)].

Conyza valdiviana Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuervo, D. s.n.* (SGO)].

Conyza virgata (L.) L. = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Conyza vulgaris Phil., hom. illeg. = **Conyza gayana** Phil.

Conyza yungasensis Rusby = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Conyzanthus graminifolius (Spreng.) Tamamsch. = **Symphyotrichum graminifolium** (Spreng.) G.L. Nesom

Conyzanthus squamatus (Spreng.) Tamamsch. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Coreopsis L.

Número de especies: 3, 1 endémica, 2 introducidas

Coreopsis alba L. = **Bidens alba** (L.) DC.

Coreopsis artemisiaefolia Jacq. = **Cosmos sulphureus** Cav.

Coreopsis artemisifolia Sessé & Moç. = **Cosmos sulphureus** Cav.

Coreopsis aurea Aiton = **Bidens aurea** (Aiton) Sherff
Referencias: Sherff, E. E., 1937.

Coreopsis baccata L. f. = **Tilesia baccata** (L. f.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Coreopsis lanceolata L.
Sin.: *Coreopsoides lanceolata* (L.) Moench
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Muñoz, J. D., 1995; Sáenz, A. A., 1981.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, LPA, MIS); BRA(RGS); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28633* (SI)]; BRA[*Mondin, C. A. 2108* (HASU)]; URY[*Del Puerto, O. 5385* (MVFA)].

Coreopsis suaveolens Sherff
Referencias: Sherff, E. E., 1936.
Subarbusto. Endémica. 3400–3800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1114* (GH)].

Coreopsis tinctoria Nutt.
Sin.: *Calliopsis tinctoria* (Nutt.) DC., *Diplosastera tinctoria* (Nutt.) Tausch
Referencias: Freire, S. E., et al., 2006.
Hierba. Anual. Introducida. 200–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, M. 425* (CTES, MNES)].

Coreopsis trifoliata Bertol. = **Bidens squarrosa** Kunth
Referencias: Sherff, E. E., 1937.

Coreopsoides lanceolata (L.) Moench = **Coreopsis lanceolata** L.

Cosmea sulphurea Willd. = **Cosmos sulphureus** Cav.

Cosmos Cav.

Número de especies: 3, 1 introducida

Cosmos aurantiacus Klatt = **Cosmos sulphureus** Cav.

Cosmos bipinnatus Cav.
Sin.: *Cosmos bipinnatus* Cav. var. *exaristaus* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LPA, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 23108* (CORD)].

Cosmos bipinnatus Cav. var. *exaristaus* DC. = **Cosmos bipinnatus** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Cosmos gracilis Sherff = **Cosmos sulphureus** Cav.

Cosmos marginatus Klatt = **Cosmos peucedanifolius** Wedd. var. **peucedanifolius**

Cosmos peucedanifolius Wedd. var. **peucedanifolius**
Sin.: *Bidens peucedanifolius* (Wedd.) Kuntze, *Cosmos marginatus* Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11310* (LP, SI)].

Cosmos peucedanifolius Wedd. var. **tiraquensis** (Kuntze) Sherff
Sin.: *Bidens peucedanifolius* (Wedd.) Kuntze var. *tiraquensis* Kuntze, *Cosmos subpubescens* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6152* (LP)].

Cosmos subpubescens Wedd. = **Cosmos peucedanifolius** Wedd. var. **tiraquensis** (Kuntze) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Cosmos sulphureus Cav.
Sin.: *Bidens sulphurea* Sch. Bip., *Coreopsis artemisiaefolia* Jacq., *Coreopsis artemisifolia* Sessé & Moç., *Cosmea sulphurea* Willd., *Cosmos aurantiacus* Klatt, *Cosmos gracilis* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *exaristatus* Sherff, *Cosmos sulphureus* Cav. var. *hirsuticaulis* Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MIS, SDE); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1873* (CORD)]; PRY[*Schinini, A. 36065* (PY)].

Cosmos sulphureus Cav. var. *exaristatus* Sherff = **Cosmos sulphureus** Cav.

Cosmos sulphureus Cav. var. *hirsuticaulis* Sherff = **Cosmos sulphureus** Cav.

Cotula L.

Número de especies: 3, 2 introducidas

Cotula acaenoides (Hook. & Arn.) Alb. = **Leptinella scariosa** Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1971a.

Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Sin.: *Anacyclus australis* Sieber ex Spreng., *Lancisia australis* (Sieber ex Spreng.) Rydb., *Soliva tenella* A. Cunn., *Strongylosperma australe* (Sieber ex Spreng.) Less.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Caro, J. A., 1961b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Novara, L. J., 1994c.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, IDE, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, MON, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 11199* (LP)]; CHL[*Barros, E. 7408* (LP)]; URY[*Osten, C. 21736* (LP)].

Cotula cabrerae Caro = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1978.

Cotula coronopifolia L.
Sin.: *Cotula montevidensis* Spreng., *Lancisia coronipifolia* (L.) Rydb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Caro, J. A., 1961c; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU); BRA(RGS); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 296* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 146* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 105* (LP)].

Cotula hombronii Franch. = **Leptinella scariosa** Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1971a.

Cotula mexicana (DC.) Cabrera
Sin.: *Cotula cabrerae* Caro, *Cotula minuta* (L. f.) Schinz, *Cotula pedicellata* (Ruiz & Pav.) Cabrera, *Cotula pygmaea* (Kunth) Benth. & Hook. ex Hemsl., *Gymnostyles minuta* (L. f.) Spreng., *Gymnostyles peruviana* Spreng., *Hippia minuta* L. f., *Lancisia minuta* (L. f.) Rydb., *Soliva mexicana* DC., *Soliva minuta* (L. f.) Sweet, *Soliva pedicellata* Ruiz & Pav., *Soliva pedunculata* Ruiz & Pav. ex Steud., *Soliva pygmaea* Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960, 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11691* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 219* (CONC)].

Cotula minuta (L. f.) Schinz = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960, 1978.

Cotula montevidensis Spreng. = **Cotula coronopifolia** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1941a, 1963a; Caro, J. A., 1961b.

Cotula pedicellata (Ruiz & Pav.) Cabrera = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1949a, 1960, 1978.

Cotula pygmaea (Kunth) Benth. & Hook. ex Hemsl. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1960, 1978.

Cotula scariosa (Cass.) Franch. = **Leptinella scariosa** Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1971a.

Cotula verbesina L. = **Adenostemma verbesina** (L.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996d.

Cotula viscosa L. = **Egletes viscosa** (L.) Less.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879.

Crantzia ovata Vell. = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Crassina peruviana (L.) Kuntze = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Crassocephalum valerianifolium (Wolf) Less. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Crepis L.

Número de especies: 5 introducidas

Crepis barbata L. = **Tolpis barbata** (L.) Gaertn.

Crepis capillaris (L.) Wallr.
Sin.: *Crepis virens* L., *Lapsana capillaris* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1963a; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9941* (LP)]; CHL[*Looser, G. 4810* (LP)].

Crepis foetida L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Covas, G., 1967.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 2899* (CORD)].

Crepis geisseana Phil. = **Malacothrix clevelandii** A. Gray

Crepis nudicaulis auct. non L. = **Leontodon taraxacoides** (Vill.) Mérat
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Crepis pulchra L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Ariza Espinar, L., 1967a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(COR); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 11648* (CORD, LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 1196* (CONC)].

Crepis setosa Hallier f.
Sin.: *Barkhausia setosa* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Marchesi, E., com. pers.; Marticorena, C., com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, LPA, RNE, SFE); BRA(RGS); CHL(IX); URY(COL, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Proyecto Ventania 141* (LP)]; BRA[*Palacios, M. A. 849* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 392* (CONC)]; URY[*Marchesi, E. 6284* (MVFA)].

Crepis taraxacifolia Thuill. = **Crepis vesicaria** L. subsp. **taraxacifolia** (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller

Crepis vesicaria L. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P.D. Sell = **Crepis vesicaria** L. subsp. **taraxacifolia** (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller
Referencias: Villamil, C. B. & Long, M. A., 1999.

Crepis vesicaria L. subsp. **taraxacifolia** (Thuill.) Thell. ex Schinz & R. Keller
Sin.: *Crepis taraxacifolia* Thuill., *Crepis vesicaria* L. subsp. *haenseleri* (Boiss. ex DC.) P.D. Sell
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Villamil, C. B. & Long, M. A., 1999.
Hierba. Anual o perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 8852* (LP)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 181* (CONC)].

Crepis virens L. = **Crepis capillaris** (L.) Wallr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Criscia Katinas

Número de especies: 1

Criscia stricta (Spreng.) Katinas
Sin.: *Onoseris stricta* Spreng., *Perezia pampeana* Speg., *Trichocline heterophylla* Griseb., hom. illeg., *Trixis stricta* (Spreng.) Less.
Referencias: Katinas, L., 1994, 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 545* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 27314* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1861* (MVFA)].

Critonia arachnoidea (Legname) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium arachnoideum** Legname
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Critonia megaphylla (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium megaphyllum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Critoniopsis quinqueflora (Less.) H. Rob. = **Vernonia quinqueflora** Less.

Cryptopetalum ciliare Cass. = **Pectis sessiliflora** (Less.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Cryptostemma calendula (L.) Druce = **Arctotheca calendula** (L.) Levyns
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a.

Cryptostemma calendulaceum (L.) R. Br. = **Arctotheca calendula** (L.) Levyns
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998a; Webb, C. J., Sykes, W. R. & Garnock-Jones, P. J., 1988.

Cuatrecasasiella H. Rob.

Número de especies: 1

Cuatrecasasiella argentina (Cabrera) H. Rob.
Sin.: *Luciliopsis argentina* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Robinson, H. E., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9239* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3583* (CONC, LP)].

Culcitium candidum Don ex Hook. & Arn. = **Senecio poeppigii** Hook. & Arn. var. **poeppigii**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium dasyphyllum Gand. = **Senecio vaginifolius** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium dentatum Don ex Hook. & Arn. = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium depressum Don ex Hook. & Arn. = **Senecio depressus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium gayanum J. Remy = **Senecio candidans** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium gilliesii (Hook. & Arn.) Speg. = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium glaciale Meyen & Walp. = **Senecio candollii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium haenkei Wedd., hom. illeg. = **Senecio haenkeanus** Cuatrec.

Culcitium humile DC. = **Senecio candollii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium magellanicum Hombr. & Jacq. = **Senecio magellanicus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium magellanicum Hombr. & Jacq. f. *angustifolia* Skottsb. = **Senecio magellanicus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium magellanicum Hombr. & Jacq. f. *latifolia* Skottsb. = **Senecio vaginifolius** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium magellanicum Hombr. & Jacq. f. *typica* Skottsb., nom. inval. = **Senecio magellanicus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium oligocephalum Cabrera = **Senecio keshua** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium poeppigii DC. = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium serratifolium Meyen & Walp. = **Senecio serratifolius** (Meyen & Walp.) Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium sessile Speg. = **Senecio culcitenellus** Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Culcitium tenellum Dusén = **Senecio culcitenellus** Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Cyclolepis Gillies ex D. Don

Número de especies: 1 endémica

Cyclolepis denticulata J. Remy = **Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy) Cabrera var. **denticulatus**

Cyclolepis genistoides D. Don
Sin.: *Gochnatia genistoides* (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a, 1978, 1998; Freire, S. E., 1996.
Arbusto. Endémica. 600–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16512* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 7104* (LP)].

Cynara L.

Número de especies: 1 introducida

Cynara cardunculus L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a; Del Aguila, J., 1964; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, SFE); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IJF, RME); URY(CAS, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 139* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 565* (CONC)]; URY [*Berro, M. B. 667* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar ejemplar de referencia (Augusto, 1946).

Cyrtocymura cincta (Griseb.) H. Rob. = **Vernonia cincta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Dahlia Cav.
Número de especies: 1 introducida

Dahlia pinnata Cav.
Sin.: *Dahlia pinnata* Cav. var. *nana* Jacks., *Dahlia pinnata* Cav. var. *variabilis* (Willd.) Voss, *Dahlia sambucifolia* Salisb., *Dahlia superflua* (DC.) W.T. Aiton, *Dahlia variabilis* (Willd.) Desf., *Georgina superflua* DC., *Georgina variabilis* Willd.
Referencias: Sorensen, P. D., 1969; Sáenz, A. A., 1999.
Hierba. Perenne. Introducida. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11500* (CORD, MCNS)].

Dahlia pinnata Cav. var. *nana* Jacks. = **Dahlia pinnata** Cav.

Dahlia pinnata Cav. var. *variabilis* (Willd.) Voss = **Dahlia pinnata** Cav.

Dahlia sambucifolia Salisb. = **Dahlia pinnata** Cav.

Dahlia superflua (DC.) W.T. Aiton = **Dahlia pinnata** Cav.

Dahlia variabilis (Willd.) Desf. = **Dahlia pinnata** Cav.

Danaa yegua Colla = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **yegua**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Dasyanthina palustris (Gardner) H. Rob. = **Vernonia palustris** Gardner
Referencias: Robinson, H. E., 1993.

Dasyphyllum Kunth
Número de especies: 14, 3 endémicas

Dasyphyllum armatum (J. Kost.) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga armata* J. Kost., *Flotovia armata* (J. Kost.) Tovar
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d; Urtubey, E., 1996.
Arbusto. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Sin.: *Carthamus fluminensis* Vell., *Chuquiraga brasiliensis* (Spreng.) Kuntze, *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker, *Chuquiraga racemosa* Baker, *Flotovia brasiliensis* (Spreng.) Cabrera ex Tovar, *Flotovia glabra* Spreng., *Ioannea brasiliensis* Spreng., *Johannia brasiliensis* Spreng.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1959d, 1998; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Urtubey, E., 1996, 1999.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 393* (LP)]; BRA[*Kuhlmann, M. 886* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 11258* (LP)].

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Barnadesia divaricata* Griseb., *Chuquiraga brasiliesis* (Spreng.) Kuntze var. *divaricata* (Griseb.) Kuntze, *Flotovia divaricata* (Griseb.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d; Urtubey, E., 1996.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4166* (LP)].

Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera var. *varians* Cabrera = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Dasyphyllum diacanthoides (Less.) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga leucoxylon* Poepp. ex Less., *Flotovia diacanthoides* Less., *Flotovia stiffioides* Speg., *Piptocarpha diacanthoides* Hook. & Arn.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1959d; Urtubey, E., 1996, 1999.
Árbol. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11495* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 6353* (LP)].

Dasyphyllum excelsum (D. Don) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga excelsa* D. Don, *Flotovia excelsa* (D. Don) DC., *Piptocarpha excelsa* (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.
Árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4146* (LP)].

Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga regnelli* Baker, *Flotovia flagellaris* Casar., *Flotovia regnellii* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.
Arbusto. Nativa. 700–2100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jonsson, G. 446a* (LP)].

Dasyphyllum floribundum (Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga floribunda* (Gardner) Baker, *Flotovia floribunda* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11251* (BAF, G, LP)].

Dasyphyllum inerme (Rusby) Cabrera
Sin.: *Barnadesia inermis* Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d; Urtubey, E., 1996.
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tolaba, J. A. 1844* (LP)].

Dasyphyllum latifolium (Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga chapadensis* S. Moore, *Chuquiraga latifolia* (Gardner) Baker, *Chuquiraga mattogrosensis* Malme, *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *mattogrosensis* (Malme) Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *paraguariensis* Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker f. *subinermis* Hassl., *Chuquiraga sprengeliana* (Gardner) Baker var. *chapadensis* (S. Moore) Hassl., *Flotovia latifolia* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10484* (G, LP)].

Dasyphyllum maria-lianae Zardini & Soria
Referencias: Zardini, E. M. & Soria Rey, N., 1994.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 32470* (FCQ, MO)].

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga spinescens* (Less.) Baker, *Flotovia spinescens* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.
Árbol. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11007* (LP)].

Dasyphyllum synacanthum (Baker) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga synacantha* Baker, *Flotovia synacantha* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 45445* (LP)].

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera var. **multiflorum** (Baker) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var. *multiflora* Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d; Freire, S. E., et al., 2006; Urtubey, E., 1996, 1999.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1076* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 55845* (LP)].

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera var. **tomentosum**
Sin.: *Chuquiraga paniculata* DC., *Chuquiraga tomentosa* (Spreng.) Baker, *Flotovia paniculata* (D. Don) DC., *Flotovia tomentosa* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Urtubey, E., 1996, 1999.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2080* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 554* (LP)].

Dasyphyllum vagans (Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga vagans* (Gardner) Baker, *Flotovia vagans* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.
Arbusto. Nativa. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11641* (LP)].

Dasyphyllum varians (Gardner) Cabrera
Sin.: *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var. *hassleriana* (Chodat) Chodat, *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var. *rectispina* Chodat, *Chuquiraga glabra* (Spreng.) Baker var. *varians* (Gardner) Baker, *Chuquiraga hassleriana* Chodat, *Chuquiraga varians* (Gardner) Rusby, *Dasyphyllum brasiliense* (Spreng.) Cabrera var. *varians* Cabrera, *Flotovia varians* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1997a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 342* (LP)].

Delilia Spreng.

Número de especies: 1

Delilia berterii Spreng. = **Delilia biflora** (L.) Kuntze
Referencias: Delprete, P. G., 1995.

Delilia biflora (L.) Kuntze
Sin.: *Delilia berterii* Spreng., *Elvira biflora* (L.) DC., *Elvira martyni* Cass., *Meratia sprengelii* Cass., nom. superfl., *Milleria biflora* L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Delprete, P. G., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14090* (LP)].

Dendrophorbium bomanii (R.E. Fr.) C. Jeffrey = **Senecio bomanii** R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Dendrophorbium missionum (Cabrera) C. Jeffrey
= **Senecio pluricephalus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Dendrophorbium peregrinum (Griseb.) C. Jeffrey
= **Senecio peregrinus** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Dendrophorbium pluricephalum (Cabrera) C. Jeffrey
= **Senecio pluricephalus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Dendroseris D. Don

Número de especies: 11 endémicas

Dendroseris berteroana (Decne.) Hook. & Arn.
Sin.: *Dendroseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow, *Phoenicoseris berteriana* (Decne.) Skottsb., *Rea beteriana* Decne., *Rea pinnata* Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1910a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 11888* (CONC, OS)].

Dendroseris gigantea Johow
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Notas: No se ha podido localizar material de herbario de esta especie.

Dendroseris lacerata (Phil.) Hemsley = **Thamnoseris lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **lacerata**

Dendroseris litoralis Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 342* (B)].

Dendroseris macrantha (Bertero ex Decne.) Skottsb.
Sin.: *Rea macrantha* Bertero ex Decne.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5149* (CONC)].

Dendroseris macrophylla D. Don
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1910a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Weber s.n.* (CONC)].

Dendroseris macrophylla D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow = **Dendroseris marginata** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.

Dendroseris marginata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Sin.: *Dendroseris macrophylla* D. Don var. *marginata* (Bertero ex Decne.) Johow, *Rea marginata* Bertero ex Decne.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1910a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solbrig, O. T. 3804* (LP)].

Dendroseris micrantha (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Sin.: *Rea longifolia* Phil. ex Reiche, *Rea micrantha* Bertero ex Decne.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1910a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solbrig, O. T. 3818* (LP)].

Dendroseris micrantha (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow = **Dendroseris pruinata** (Johow) Skottsb.

Dendroseris neriifolia (Decne.) Hook. & Arn.
Sin.: *Rea leucantha* Bertero, *Rea neriifolia* Decne.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1910a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 6307* (CONC, OS)].

Dendroseris pinnata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Sin.: *Phoenicoseris pinnata* (Bertero ex Decne.) Skottsb., *Rea pinnata* Bertero ex Decne.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 12086* (CONC, OS)].

Dendroseris pinnata (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *insignis* (Bertero) Johow = **Dendroseris berteroana** (Decne.) Hook. & Arn.

Dendroseris pruinata (Johow) Skottsb.
Sin.: *Dendroseris micrantha* (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn. var. *pruinata* Johow, *Rea pruinata* (Johow) Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solbrig, O. T. 3869* (LP)].

Dendroseris regia Skottsb.
Referencias: Skottsberg, C. J. F., 1921.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 570* (B)].

Diaphoranthus fuscus Meyen = **Polyachyrus fuscus** (Meyen) Walp.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Dichropappus adenanthus Sch. Bip. ex Krasch. = **Stenachaenium adenanthum** (Sch. Bip. ex Krasch.) Krasch.

Diglossus variabilis Cass. = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Dimerostemma Cass.

Número de especies: 1 endémica

Dimerostemma annuum (Hassl.) H. Rob.
Sin.: *Oyedaea annua* Hassl.
Referencias: Robinson, H. E., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11030* (BAF, G)].

Dimorpholepis multifida (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium multifidum** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Dimorpholepis serrata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium serratum** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Dinoseris Griseb.

Número de especies: 1

Dinoseris salicifolia Griseb.
Sin.: *Dinoseris salicifolia* Griseb. var. *normalis* Kuntze, *Hyaloseris salicifolia* (Griseb.) Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d; Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3739* (LP)].

Dinoseris salicifolia Griseb. var. *normalis* Kuntze = **Dinoseris salicifolia** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Diomedea thurifera (Molina) Bertero ex Colla = **Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Diplopappus bellidifolius Hook. & Arn. = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972.

Diplopappus canescens Hook. & Arn. = **Haplopappus uncinatus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus chamissonis Less. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Diplopappus chrysanthemifolius Less. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus coquimbensis Hook. & Arn. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus coronopifolius Less., nom. illeg. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Diplopappus corymbosus Hook. & Arn. = **Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Diplopappus cuneatus Hook. & Arn. = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Diplopappus diffusus (Pers.) Hook. & Arn. = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Diplopappus donianus Hook. & Arn. = **Haplopappus donianus** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus foliolosus Hook. & Arn. = **Haplopappus rotundifolius** H.M. Hall
Referencias: Cabrera, A. L., 1934; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Diplopappus foliosus Hook. & Arn. = **Haplopappus foliosus** DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus glutinosus Less. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Diplopappus grindelioides Less. = **Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus hispidus Gillies ex Hook. & Arn. = **Hysterionica jasionoides** Willd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Diplopappus ilicifolius Hook. & Arn. = **Haplopappus rotundifolius** H.M. Hall
Referencias: Cabrera, A. L., 1934; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Diplopappus integerrimus Hook. & Arn. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus inuloies Hook. & Arn. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus macrocephalus Poepp. ex Less. = **Haplopappus macrocephalus** (Poepp. ex Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus mucronatus Hook. & Arn. = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus pinifolius Hook. & Arn. = **Hysterionica pinifolia** (Poir.) Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Diplopappus pinnatifidus Hook. & Arn. = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 2003b.

Diplopappus prunelloides Poepp. ex Less. = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Diplopappus punctatus Less. ex DC. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Diplopappus scrobiculatus Nees = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Diplopappus sericeus Less. = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Diplopappus sericeus Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn. = **Noticastrum adscendens** DC.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Diplopappus setiger Hook. & Arn. = **Haplopappus pinnatifidus** Nutt.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Diplopappus spinulosus Hook. & Arn. = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Diplopappus stenophyllus Hook. & Arn. = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Diplopappus villosus Hook. & Arn. = **Hysterionica montevidensis** Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Diplosastera tinctoria (Nutt.) Tausch = **Coreopsis tinctoria** Nutt.

Diplostephium Kunth

Número de especies: 2

Diplostephium cinereum Cuatrec.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Nativa. 3800–4400 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bonifacino, J. M. 1410* (SGO)].

Diplostephium meyenii Wedd.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Nativa. 3000–3900 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3415* (CONC)].

[Diplostephium tacorense Hieron.]
Notas: Nombre dudoso.

Diplostephium tovari Cuatrec. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Dissothrix hassleriana Chodat = **Stevia entreriensis** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996fb.

Distoecha taraxacoides Phil. = **Hypochaeris eremophila** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Distreptus spiralis Less. = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Disynaphia achillea (Chodat) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium multicrenulatum** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Disynaphia albissima (Hassl.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium spathulatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Disynaphia calyculata (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium calyculatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Disynaphia ericoides (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium ericoides** DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.

Disynaphia filifolia (Hassl.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium filifolium** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Disynaphia ligulaefolia (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium ligulaefolium** Hook. & Arn.

Disynaphia littoralis (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium littorale** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Disynaphia montevidensis DC. = **Eupatorium calyculatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Disynaphia multicrenulata (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium multicrenulatum** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Disynaphia radula (Chodat) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium radula** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Disynaphia spathulata (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium spathulatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Disynaphia tacuarembensis (Hieron. & Arechav.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tacuarembense** Hieron. & Arechav.

Dolichlasium Lag.

Número de especies: 1 endémica

Dolichlasium glanduliferum Lag. ex Hook. & Arn. = **Dolichlasium lagascae** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1936a, 1971a.

Dolichlasium lagascae D. Don
Sin.: *Dolichlasium glanduliferum* Lag. ex Hook. & Arn., *Trixis glandulifera* (Lag.) Benth. & Hook. f. ex Hieron., nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(LPA, LRI, MEN, NEU, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mácola, T. s.n.* (LP)].

Dolichogyne acaulis Benth. & Hook. f. = **Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990.

Dolichogyne armata Wedd. = **Nardophyllum armatum** (Wedd.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Dolichogyne candollei J. Remy, nom. superfl. = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Dolichogyne chiliotrichioides J. Remy = **Nardophyllum chiliotrichioides** (J. Remy) A. Gray
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005; Cabrera, A. L., 1954b.

Dolichogyne genistoides Phil. = **Nardophyllum genistoides** (Phil.) A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Dolichogyne glabra Phil. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Dolichogyne gnaphalioides DC. = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Dolichogyne lepidophylla Wedd. = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Dolichogyne rigida Wedd. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Dolichogyne rupestris Webb = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Dolichogyne staehelinoides DC. = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Doniophyton Wedd.

Número de especies: 2 endémicas

Doniophyton andicolum Wedd. = **Doniophyton anomalum** (D. Don) Kurtz
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997.

Doniophyton anomalum (D. Don) Kurtz
Sin.: *Chuquiraga anomala* D. Don, *Chuquiraga patagonica* Phil., *Doniophyton andicolum* Wedd., *Doniophyton flavescens* Suess., *Doniophyton patagonicum* (Phil.) Hieron.
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997; Urtubey, E., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU); CHL(IX).

Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 12930* (LP, OS)]; CHL[*Cañulaf 16882* (LP)].

Doniophyton argenteum Speg. = **Chuquiraga morenonis** (Kuntze) C. Ezcurra
Referencias: Ezcurra, C., 1985.

Doniophyton flavescens Suess. = **Doniophyton anomalum** (D. Don) Kurtz
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997.

Doniophyton patagonicum (Phil.) Hieron. = **Doniophyton anomalum** (D. Don) Kurtz
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997.

Doniophyton weddellii Katinas & Stuessy
Referencias: Katinas, L. & Stuessy, T. F., 1997; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU); CHL(II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 24362* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 759* (LP)].

Doronicum incanum Lam. = **Trichocline incana** (Lam.) Cass.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Dusenia patagonica O. Hoffm. = **Duseniella patagonica** (O. Hoffm.) K. Schum.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Duseniella K. Schum.

Número de especies: 1 endémica

Duseniella bicolor Suess. = **Duseniella patagonica** (O. Hoffm.) K. Schum.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Duseniella patagonica (O. Hoffm.) K. Schum.
Sin.: *Dusenia patagonica* O. Hoffm., *Duseniella bicolor* Suess.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Urtubey, E., 1996, 1999.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 24349* (LP)].

Dyssodia Cav.

Número de especies: 1 introducida

Dyssodia belenidium (DC.) Macloskie = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia belenidium (DC.) O. Hoffm. = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Dyssodia chrysanthemifolia Steud., nom. superfl. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia chrysanthemoides (Willd.) Lag. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia ciliosa (Rydb.) Standl. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia cupulata A. Nelson = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia fastigiata DC. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia gracilis (Rydb.) Cory = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia papposa (Vent.) Hitchc.
Sin.: *Boebera chrysanthemoides* Willd., nom. superfl., *Boebera ciliosa* Rydb., *Boebera glandulosa* (Cav.) Pers., nom. illeg., *Boebera papposa* (Vent.) Rydb., *Boebera roseata* Rydb., *Dyssodia chrysanthemifolia* Steud., nom. superfl., *Dyssodia chrysanthemoides* (Willd.) Lag., *Dyssodia ciliosa* (Rydb.) Standl., *Dyssodia fastigiata* DC., *Dyssodia roseata* (Rydb.) Gentry, *Tagetes papposa* Vent., *Tagetes pumila* Willd., nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Strother, J. L., 1969, 1986.
Hierba. Anual. Introducida. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14341* (LP)].

Dyssodia pentachaeta (DC.) B.L. Rob. var. *belenidium* (DC.) Strother = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia roseata (Rydb.) Gentry = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Dyssodia thurberi (A. Gray) B.L. Rob. = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Echetrosis pentasperma Phil. = **Parthenium hysterophorus** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1974a, 1978.

Echinocephalum angustifolium Gardner = **Melanthera latifolia** (Gardner) Cabrera

Echinocephalum lanceolatum Gardner = **Melanthera latifolia** (Gardner) Cabrera

Echinocephalum latifolium Gardner = **Melanthera latifolia** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Eclipta L.
Número de especies: 3

Eclipta alba (L.) Hassk. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Eclipta bellidioides (Spreng.) Sch. Bip. ex S.F. Blake = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Eclipta elliptica DC.
Sin.: *Spilanthes wedelioides* Hook. & Arn., *Wollastonia prostrata* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 3535* (CORD)]; BRA[*Klein, R. M. 8830* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 5274* (MVFA)].

Eclipta erecta L. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Eclipta lanceolata DC. = **Eclipta megapotamica** (Spreng.) Sch. Bip. ex S.F. Blake

Eclipta megapotamica (Spreng.) Sch. Bip. ex S.F. Blake
Sin.: *Eclipta lanceolata* DC., *Verbesina megapotamica* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS); URY (CLA, FLA, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT.
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 3539* (CORD)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13830* (CORD)]; URY [*Berro, M. B. 4575* (MVFA)].

Eclipta prostrata (L.) L.
Sin.: *Eclipta alba* (L.) Hassk., *Eclipta erecta* L., *Galinsoga oblongifolia* (Hook.) DC., *Polygyne inconspicua* Phil., *Verbesina alba* L., *Verbesina conyzoides* Trew, *Verbesina prostrata* L., *Wiborgia oblongifolia* Hook.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Matthei, O. R. & Marticorena, C., 1990; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1996.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VII, RME); PRY(APY, AMA, CAN, COA, PHA); URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28823* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6956* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 1415* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 6379* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4426* (MVFA)].

Eclipta sessilis Sw. = **Enydra sessilis** (Sw.) DC.

Egania acerosa J. Remy = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egania apiculata J. Remy = **Chaetanthera apiculata** (J. Remy) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egania appressa Phil. = **Chaetanthera revoluta** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egania dioica J. Remy = **Chaetanthera dioica** (J. Remy) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egania pallida Phil. = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egania racemosa Pritz. = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egania revoluta Phil. = **Chaetanthera revoluta** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Egletes Cass.
Número de especies: 1

Egletes viscosa (L.) Less.
Sin.: *Cotula viscosa* L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 1095* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 17030* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 7035* (LP)].

Eizaguirrea candollei J. Remy = **Leucheria floribunda** DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Eizaguirrea cirsioides Phil. = **Leucheria floribunda** DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Eizaguirrea sonchifolia Turcz. = **Leucheria floribunda** DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Elachia euphrasioides DC. = **Chaetanthera euphrasioides** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Elachia euphrasioides Deless. non DC., hom. illeg. = **Chaetanthera flabellata** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Elachia renifolia J. Remy = **Chaetanthera renifolia** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Elachia spinulosa Phil. = **Chaetanthera flabellata** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Elachia splendens J. Remy = **Chaetanthera splendens** (J. Remy) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Elephantopus L.

Número de especies: 3

Elephantopus angustifolius Sw. = **Orthopappus angustifolius** (Sw.) Gleason
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus cernuus Vell. = **Elephantopus mollis** Kunth
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus hypomalacus S.F. Blake = **Elephantopus mollis** Kunth
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus martii auct. non Graham, Niederl. = **Elephantopus mollis** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus micropappus Less.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9601* (NY)].

Elephantopus mollis Kunth
Sin.: *Elephantopus cernuus* Vell., *Elephantopus hypomalacus* S.F. Blake, *Elephantopus martii* auct. non Graham, Niederl., *Elephantopus pilosus* Philipson, *Elephantopus scaber* auct. non L., *Elephantopus scaber* L. var. *tomentosus* (L.) Sch. Bip. ex Baker, *Elephantopus tomentosus* L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 649* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 2677* (SI)]; PRY[*Basualdo, I. 4481* (FCQ), *Morrone, O. 214* (SI)]; URY[*Sancho, G. 86* (LP)].

Elephantopus nudiflorus Willd. = **Orthopappus angustifolius** (Sw.) Gleason
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Elephantopus palustris Gardner
Sin.: *Elephantopus vaginatus* Gardner
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 46033* (CTES)].

Elephantopus pilosus Philipson = **Elephantopus mollis** Kunth
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus scaber auct. non L. = **Elephantopus mollis** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus scaber L. var. *tomentosus* (L.) Sch. Bip. ex Baker = **Elephantopus mollis** Kunth

Elephantopus spicatus auct. non Juss. = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus tomentosus L. = **Elephantopus mollis** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elephantopus vaginatus Gardner = **Elephantopus palustris** Gardner

Elephantosis angustifolia (Sw.) DC. = **Orthopappus angustifolius** (Sw.) Gleason
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Elvira biflora (L.) DC. = **Delilia biflora** (L.) Kuntze
Referencias: Delprete, P. G., 1995.

Elvira martyni Cass. = **Delilia biflora** (L.) Kuntze
Referencias: Delprete, P. G., 1995.

Emilia (Cass.) Cass.

Número de especies: 1 introducida

Emilia fosbergii Nicolson
Sin.: *Emilia javanica* auct. non (Burm.) C.B. Rob., *Emilia sagittata* auct. non (Vahl) DC.

Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Nicolson, D. H., 1975; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAN, CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 481* (CORD, CTES, SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1367* (CTES)].

Emilia javanica auct. non (Burm.) C.B. Rob. = **Emilia fosbergii** Nicolson
Referencias: Nicolson, D. H., 1975.

Emilia sagittata auct. non (Vahl) DC. = **Emilia fosbergii** Nicolson
Referencias: Nicolson, D. H., 1975.

Encelia Adans.

Número de especies: 1

Encelia canescens Lam. var. **canescens**
Referencias: Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3848* (CONC)].

Encelia canescens Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst. = **Encelia canescens** Lam. var. **parvifolia** (Kunth) Ball

Encelia canescens Lam. var. **oblongifolia** (DC.) S.F. Blake
Sin.: *Encelia oblongifolia* DC.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–2700 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9807* (CONC)].

Encelia canescens Lam. var. **parvifolia** (Kunth) Ball
Sin.: *Encelia canescens* Lam. var. *lanuginosa* I.M. Johnst., *Encelia canescens* Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball, *Encelia parvifolia* Kunth
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4706* (CONC)].

Encelia canescens Lam. var. *tomentosa* (Walp.) Ball = **Encelia canescens** Lam. var. **parvifolia** (Kunth) Ball

Encelia hirsuta Kuntze = **Simsia dombeyana** DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Encelia hirsuta Kuntze f. *radiata* Kuntze = **Simsia dombeyana** DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Encelia oblongifolia DC. = **Encelia canescens** Lam. var. **oblongifolia** (DC.) S.F. Blake

Encelia parvifolia Kunth = **Encelia canescens** Lam. var. **parvifolia** (Kunth) Ball

Encelia suffrutescens R.E. Fr. = **Flourensia suffrutescens** (R.E. Fr.) S.F. Blake
Referencias: Dillon, M. O., 1984.

Enydra Lour.

Número de especies: 2

Enydra anagallis Gardner
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI, PHA); URY(CAS, CLA, COL, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 6834* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 2541* (MBM, SI)]; PRY[*Basualdo, I. 1353* (FCQ, MO)]; URY[*Alonso Paz, E. 2161* (MVFQ)].

Enydra sessilis (Sw.) DC.
Sin.: *Eclipta sessilis* Sw.
Referencias: Paiva Lima, L. F., Schneider, A. A. & Matzenbacher, N. I., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 5441* (ICN)]; BRA[*Matzenbacher, N. I. s.n.* (ICN)]; URY [*Berro 3803* (MVFA)].

Epaltes brasiliensis DC. = **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Erechtites Raf.

Número de especies: 6, 2 endémicas, 1 introducida

Erechtites agrestis (Sw.) Standl. & Steyerm. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites ambiguus DC. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites cacalioides (Fisch. ex Spreng.) Less. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites carduifolius (Cass.) DC. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites carduifolius (Cass.) DC. var. *latifolius* Klatt = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites gardnerianus Cabrera = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites goyazensis (Gardner) Cabrera
Sin.: *Erechtites missionis* Malme var. *lanceolatus* Chodat & Hassl., *Senecio goyazensis* Gardner
Referencias: Belcher, R. O., 1956.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8362* (BM, S)].

Erechtites hieraciifolius Walp. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. f. *minor* Waisb. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. f. *pubescens* Kuntze = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Sin.: *Erechtites agrestis* (Sw.) Standl. & Steyerm., *Erechtites cacalioides* (Fisch. ex Spreng.) Less., *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC., *Erechtites carduifolius* (Cass.) DC. var. *latifolius* Klatt, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *pubescens* Kuntze, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *carduifolius* (Cass.) Griseb., *Erechtites hieraciifolius* Walp., *Erechtites sulcatus* Gardner, *Gynura aspera* Ridl., *Gynura malasica* (Ridl.) Ridl., *Gynura zeylanica* Trin. var. *malasica* Ridl., *Neoceis carduifolia* Cass., *Senecio cacalioides* Fisch. ex Spreng., *Senecio carduifolius* (Cass.) Desf., *Senecio fischeri* Sch. Bip., *Sonchus agrestis* Sw., *Sonchus brasiliensis* Meyen & Walp., *Sonchus occidentalis* Spreng.
Referencias: Belcher, R. O., 1956; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, GUA, PHA, SPE); URY(CAS, COL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1106* (F, S)]; BRA[*Dusén, N. P. s.n.* (S)]; PRY[*Hassler, E. 8886* (K, S)]; URY[*Cabrera, A. L. 3319* (S)].

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. *carduifolius* (Cass.) Griseb. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. *glabrescens* Kuntze = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Sin.: *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. f. *minor* Waisb., *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *glabrescens* Kuntze, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *intermedius* Fernald, *Erechtites hieraciifolius* (L.) Raf. ex DC. var. *praealtus* (Raf.) Fernald, *Erechtites praealtus* Raf., *Neoceis hieraciifolius* (L.) Cass., *Neoceis rigidula* Cass., *Senecio hieraciifolius* L., *Senecio hieraciifolius* L. var. *giganteus* Raf., *Senecio seminudus* Bory, *Senecio sonchoides* Vuk., *Senecio vukotinovici* Schloss., *Sonchus laevis* Sloane
Referencias: Belcher, R. O., 1956; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Soria, N. 4382* (FCQ, MO)].

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. *intermedius* Fernald = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. var. *praealtus* (Raf.) Fernald = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites ignobilis Baker
Sin.: *Senecio ignobilis* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.
Subarbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9698* (S)]; PRY[*Hassler, E. 9255* (G, K)].

Erechtites leptanthus (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio leptanthus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 825* (K)].

Erechtites missionis Malme
Referencias: Belcher, R. O., 1956; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Malme, G. O. A., 1931, 1933a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1104* (S)]; BRA[*Malme, G. O. A. 744* (S)]; PRY[*Balansa, B. s.n.* (G)].

Erechtites missionis Malme var. *lanceolatus* Chodat & Hassl. = **Erechtites goyazensis** (Gardner) Cabrera

Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites organensis Gardner = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **organensis** (Gardner) Belcher
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites petiolatus Benth. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites praealtus Raf. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites prenanthoides (Kunth) Greenm., hom. illeg. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.

Erechtites sulcatus Gardner = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. f. **organensis** (Gardner) Belcher
Sin.: *Erechtites organensis* Gardner, *Erechtites valerianifolius* (Wolf) DC. var. *organensis* (Gardner) Baker
Referencias: Belcher, R. O., 1956.
Hierba. Anual. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)].

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.
Sin.: *Cacalia prenanthoides* Kunth, *Erechtites ambiguus* DC., *Erechtites petiolatus* Benth., *Erechtites prenanthoides* (Kunth) Greenm., hom. illeg., *Senecio albiflorus* Sch. Bip., *Senecio lactucoides* Klatt
Referencias: Belcher, R. O., 1956.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9349* (S)].

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. f. **reductus** Belcher
Referencias: Belcher, R. O., 1956.
Hierba. Anual. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14156* (S)].

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Sin.: *Crassocephalum valerianifolium* (Wolf) Less., *Erechtites gardnerianus* Cabrera, *Gynura rosea* Ridl., *Senecio valerianifolius* Desf., *Senecio valerianifolius* Gardner, *Senecio valerianifolius* Wolf, *Sonchus erythropappus* Meyen & Walp. ex Walp.
Referencias: Belcher, R. O., 1956; Cabrera, A. L., 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marchesi, E., com. pers.; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI); URY(RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1103* (F, S)]; BRA[*Malme, G. O. A. 298* (S)]; PRY[*Zardini, E. M. 4143* (FCQ, MO)]; URY[*Berro, M. B. 1975* (MVFA)].

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC. var. *organensis* (Gardner) Baker = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **organensis** (Gardner) Belcher
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Eremanthus plantaginifolius (Less.) Baker = **Chresta plantaginifolia** (Less.) Gardner

Eremanthus sphaerocephalus (DC.) Malme = **Chresta sphaerocephala** DC.

Eriachaenium Sch. Bip.

Número de especies: 1 endémica

Eriachaenium magellanicum Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 908* (LP)]; CHL[*Moore, D. M. 2109* (LP)].

Erigeron L.

Número de especies: 25, 22 endémicas, 1 introducida

Erigeron albidum (Willd.) Gray = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron albidus (Spreng.) Herter, comb. superfl. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron alpestris Gardner = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron andicola DC.
Sin.: *Aster andicola* Hauman, *Aster bellidiastrum* Nees, hom. illeg., *Erigeron andicola* DC. f. *humilior* Vierh., *Erigeron araucanus* Phil., *Erigeron cabrerae* Solbrig, *Erigeron ciliaris* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 11951* (LP)]; CHL[*Pfister, A. 7741* (LP)].

Erigeron andicola DC. f. *humilior* Vierh. = **Erigeron andicola** DC.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron andicola DC. f. *pleiocephalus* Vierh. = **Erigeron cinereus** Hook. & Arn.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron apurensis (Kunth) Griseb. = **Conyza laevigata** (Rich.) Pruski
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron araucanus Phil. = **Erigeron andicola** DC.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron artemisiifolius (Meyen & Walp.) Sch. Bip. = **Laennecia artemisiifolia** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1990b.

Erigeron australis Phil. = **Symphyotrichum glabrifolium** (DC.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Erigeron berterianus DC. = **Erigeron fasciculatus** Colla
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron bilbaoanus (J. Remy) Cabrera = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Erigeron blakei Cabrera = **Conyza blakei** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron blanchetii Sch. Bip. ex Baker = **Apopyros corymbosus** (Hook. & Arn.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron bonariensis L. = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **bonariensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron bonariensis L. f. *filifolia* Chodat = **Conyza blakei** (Cabrera) Cabrera

Erigeron bonariensis L. f. *glabrata* Speg. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron bonariensis L. f. *grisea* Chodat = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **bonariensis**
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Erigeron bonariensis L. var. *angustifolius* Cabrera = **Conyza bonariensis** (L.) Cronquist var. **angustifolia** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron bonariensis L. var. *floribundum* (Kunth) Cuatrec. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron bonariensis L. var. *leiothecus* S.F. Blake = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron bonariensis L. var. *microcephalus* Cabrera = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron brittonianum Rusby = **Erigeron rosulatus** Wedd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron cabrerae Solbrig = **Erigeron andicola** DC.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron campanensis Valdeb., Lowrey & Stuessy
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Valdebenito, H. A., Lowrey, T. K. & Stuessy, T. F., 1986.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 17153* (CONC, GH, UC)].

Erigeron canadense L. = **Conyza canadensis** (L.) Cronquist

Erigeron catharinensis Cabrera = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron chilensis (Spreng.) D. Don ex G. Don = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron ciliaris Phil. = **Erigeron andicola** DC.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron cinarescens Wedd. = **Conyza deserticola** Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron cinereus Hook. & Arn.
Sin.: *Erigeron andicola* DC. f. *pleiocephalus* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *purpurascens* Vierh., *Erigeron dusenii* Vierh. f. *viridis* Vierh., *Erigeron poeppigii* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2601* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 1298* (CONC)].

Erigeron colinensis Phil. = **Conyza spiculosa** (Hook. & Arn.) Zardini

Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Erigeron consanguineus (Phil.) Cabrera = **Conyza gayana** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1976a.

Erigeron cordatus (Kunth) Cabrera = **Conyza cordata** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a.

Erigeron depilis Phil. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom

Erigeron dianthifolius Griseb. = **Hysterionica dianthifolia** (Griseb.) Cabrera var. **dianthifolia**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron diffusus Pers. = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Erigeron dusenii Vierh. = **Erigeron cinereus** Hook. & Arn.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron dusenii Vierh. f. *purpurascens* Vierh. = **Erigeron cinereus** Hook. & Arn.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron dusenii Vierh. f. *viridis* Vierh. = **Erigeron cinereus** Hook. & Arn.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron erianthus Speg. = **Erigeron leptopetalus** Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron fasciculatus Colla
Sin.: *Aster breviflorus* Phil., *Aster litoralis* Phil., *Erigeron berterianus* DC., *Erigeron subandinus* Phil., *Haplopappus hispidulus* DC.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1948* (LP)].

Erigeron fernandezianus (Colla) Solbrig, nom. illeg. = **Erigeron fernandezius** (Colla) Harling

Erigeron fernandezii Phil. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron fernandezius (Colla) Harling
Sin.: *Erigeron fernandezianus* (Colla) Solbrig, nom. illeg., *Erigeron fruticosum* DC., *Terranea fernandezia* Colla
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Solbrig, O. T., 1962.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solbrig, O. T. 3645* (LP)].

Erigeron filiformis Spreng. = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron flagellifolius Cabrera = **Conyza stenophylla** Phil.

Erigeron floribundus (Kunth) Sch. Bip. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron fruticosum DC. = **Erigeron fernandezius** (Colla) Harling
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron gardneri Cabrera = **Podocoma rivularis** (Gardner) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron gayanus J. Remy var. *leptophyllus* Speg. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron gilliesii (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Aster albertii* Phil., *Aster gayanus* DC., *Aster gilliesii* Hook. & Arn., *Astradelphus chilensis* J. Remy, *Erigeron pratensis* Phil., *Erigeron remyanus* Wedd., *Gusmania chilensis* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scolnik, R. 240* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6125* (LP)].

Erigeron glabrifolius DC. = **Symphyotrichum glabrifolium** (DC.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Erigeron glaucifolius Kuntze = **Hysterionica glaucifolia** (Kuntze) Solbrig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron graminifolius Phil. = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **vahlii**
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Erigeron hieraciifolium Poir. = **Podocoma hieraciifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron hirtellus DC. = **Conyza andina** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Erigeron ibari Phil. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron illapelinus Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV).

Ejemplares de referencia: ARG[*King, D. O. 346* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 4781* (CONC)].
Notas: Especie de identidad dudosa, muy semejante a *Erigeron gillesii*.

Erigeron imbricatus Vierh.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2192* (LP)].

Erigeron incertus (d'Urv.) Skottsb.
Sin.: *Erigeron sullivanii* Hook. f., *Hieracium incertum* d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallentin, E. F. 3* (BM)].

Erigeron ingae Skottsb.
Sin.: *Erigeron ingae* Skottsb. var. *innocentium* Skottsb., *Erigeron turricola* Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Solbrig, O. T., 1962.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9544* (CONC)].

Erigeron ingae Skottsb. var. *innocentium* Skottsb. = **Erigeron ingae** Skottsb.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron karwinskianus DC.
Sin.: *Erigeron karwinskianus* DC. var. *mucronatus* Hieron., *Erigeron mucronatus* DC., *Erigeron trilobus* Sond.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: CHL(V, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 1090* (LP)].

Erigeron karwinskianus DC. var. *mucronatus* Hieron. = **Erigeron karwinskianus** DC.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron lacarensis Phil. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron laevigatus Rich. = **Conyza laevigata** (Rich.) Pruski
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron lanceolatus Wedd.
Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *subacaulis* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1962.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zardini, E. M. 287* (LP)].

Erigeron lanceolatus Wedd. var. *lorentzianus* Griseb. = **Hysterionica pulchella** Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron lanceolatus Wedd. var. *subacaulis* Wedd. = **Erigeron lanceolatus** Wedd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron larrainianus (J. Remy) Cabrera = **Conyza larrainiana** J. Remy
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron lechleri Sch. Bip. = **Conyza lechleri** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron leiolepis Solbrig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lagiglia, H.A. 1778* (LP)].

Erigeron leptopetalus Phil.
Sin.: *Erigeron erianthus* Speg., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *skottsbergii* Vierh.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1955, 1962.
Subarbusto. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(III, IV, VII, VIII, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6285* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 240* (LP)].

Erigeron litoralis (Phil.) Skottsb. var. *luxurians* Skottsb. = **Erigeron luxurians** (Skottsb.) Solbrig
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron lorentzii (Griseb.) Cabrera = **Conyza lorentzii** Griseb.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron luteoviridis Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Solbrig, O. T., 1962.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9337* (CONC)].

Erigeron luxurians (Skottsb.) Solbrig
Sin.: *Erigeron litoralis* (Phil.) Skottsb. var. *luxurians* Skottsb.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 822* (LP)].

Erigeron maximus (D. Don) DC. = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron maximus (D. Don) DC. var. *minor* Baker = **Leptostelma maxima** D. Don

Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron maximus (D. Don) DC. var. *palustris* (Gardner) Baker = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron mendocinum Greene = **Hysterionica jasionoides** Willd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron meyeri Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959c, 1974a; Marchesi, E., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1962.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI); URY(PAY, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Baez, J. R. 48* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 7167* (MVFA)].

Erigeron monorchis Griseb. = **Conyza monorchis** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron montevidensis Baker = **Conyza blakei** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron mucronatus DC. = **Erigeron karwinskianus** DC.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron myosotis Pers.
Sin.: *Erigeron fernandezii* Phil., *Erigeron gayanus* J. Remy var. *leptophyllus* Speg., *Erigeron ibari* Phil., *Erigeron lacarensis* Phil., *Erigeron myosotis* Pers. f. *pluriceps* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. f. *spithameus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *fuegiae* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *magellanicus* (Sch. Bip.) Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh., *Erigeron myosotis* Pers. var. *elongatum* Sch. Bip., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *densehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *sparsehirsutus* Vierh., *Erigeron philippii* Sch. Bip. ex Wedd. f. *tragopogonoides* Skottsb. ex Vierh., *Erigeron platylepis* Vierh., *Erigeron sullivanii* Hook. f. var. *magellanicum* Sch. Bip.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 215* (LP)]; CHL[*Rentzell, I. 6192* (LP)].

Erigeron myosotis Pers. f. *pluriceps* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. f. *spithameus* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. var. *elongatum* Sch. Bip. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. subsp. *fuegiae* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. subsp. *magellanicus* (Sch. Bip.) Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. subsp. *polymorphoides* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. subsp. *pseudomagellanicus* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron myosotis Pers. subsp. *skottsbergii* Vierh. = **Erigeron leptopetalus** Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron notobellidiastrum (Griseb.) S.F. Blake = **Podocoma notobellidiastrum** (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron othonnifolius Hook. & Arn.
Sin.: *Aster prostratus* Phil., *Erigeron vidali* Phil.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(V, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3586* (LP)].

Erigeron palustris Gardner = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron pampeanus Parodi = **Conyza pampeana** (Parodi) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron patagonicus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR, TDF); CHL(VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 582* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6145* (LP)].

Erigeron pauciflorus Less., nom. nud. = **Podocoma notobellidiastrum** (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron philippii Sch. Bip. ex Wedd. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron philippii Sch. Bip. ex Wedd. f. *densehirsutus* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron philippii Sch. Bip. ex Wedd. f. *sparsehirsutus* Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron philippii Sch. Bip. ex Wedd. f. *tragopogonoides* Skottsb. ex Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron pinifolium Poir. = **Hysterionica pinifolia** (Poir.) Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron platensis Speg. = **Conyza serrana** Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron platylepis Vierh. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron poeppigii DC. = **Erigeron cinereus** Hook. & Arn.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron pratensis Phil. = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron primulifolium Juss. ex Cass. = **Podocoma hieraciifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron pugae Phil. = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **tenuifolium** (Phil.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron pulcher Phil.
Referencias: Hauman, L. L., 1918; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–3200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9813* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 6263* (LP)].

Erigeron pulvinatus Wedd. = **Erigeron rosulatus** Wedd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron regnelli Sch. Bip., nom. nud. = **Symphyotrichum regnellii** (Baker) G.L. Nesom

Erigeron remyanus Wedd. = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron rosulatus Wedd.
Sin.: *Erigeron brittonianum* Rusby, *Erigeron pulvinatus* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17558* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 214* (CONC)].

Erigeron rupicola Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Solbrig, O. T., 1962.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Baeza, C. M. 11445* (CONC)].

Erigeron scaberrimus Gardner = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron schnackii Solbrig
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5895* (LP)].

Erigeron schuchtii Sch. Bip., nom. nud. = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron scorzoneraefolium J. Remy = **Symphyotrichum glabrifolium** (DC.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Erigeron semiamplexicaule Meyen = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Erigeron seneciiformis S.F. Blake = **Leptostelma tweediei** (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002.

Erigeron senecioides Wedd. = **Laennecia artemisiifolia** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1990b.

Erigeron spathulatus Vahl = **Conyza laevigata** (Rich.) Pruski
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron spiciformis Griseb. = **Conyza spiciformis** (Griseb.) Zardini
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron spiculosus Hook. & Arn. = **Conyza spiculosa** (Hook. & Arn.) Zardini

Erigeron stenophyllus Hook. & Arn. = **Conyza gayana** Phil.

Erigeron subandinus Phil. = **Erigeron fasciculatus** Colla
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron sulcatum DC. = **Leptostelma maxima** D. Don
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron sullivanii Hook. f. = **Erigeron incertus** (d'Urv.) Skottsb.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron sullivanii Hook. f. var. *magellanicum* Sch. Bip. = **Erigeron myosotis** Pers.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron sumatrensis Retz. = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **sumatrensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

[Erigeron sylvaticus Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Erigeron thermarum (Phil.) Cabrera = **Conyza thermarum** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1936c.

Erigeron tridactylum DC. = **Microgyne trifurcata** Less.
Referencias: Sancho, G., Bonifacino, J. M. & Pruski, J. F., 2006.

Erigeron trilobus Sond. = **Erigeron karwinskianus** DC.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron tucumanensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1962.
Hierba. Anual. Endémica. 2400–2600 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4745* (LP)].

Erigeron tunariensis Kuntze = **Conyza tunariensis** (Kuntze) Zardini
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Erigeron turricola Skottsb. = **Erigeron ingae** Skottsb.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Erigeron tweediei Hook. & Arn. = **Leptostelma tweediei** (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002.

Erigeron vahlii Gaudich. = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **vahlii**
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Erigeron vahlii Gaudich. var. *robusta* Albov = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **vahlii**
Referencias: Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Erigeron vidali Phil. = **Erigeron othonnifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Eriophyllum ambrosioides (Lag.) Kuntze = **Bahia ambrosioides** Lag.

Eschenbachia tenuisecta (A. Gray) Wooton & Standl. = **Laennecia sophiifolia** (Kunth) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Ethulia bidentis L. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Powell, A. M., 1978.

Ethulia repanda Nees ex DC., nom. nud. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz

Ethulia sparganophora L. = **Struchium sparganophorum** (L.) Kuntze

Eupatorium L.

Número de especies: 156, 71 endémicas

Eupatorium achillea Chodat = **Eupatorium multicrenulatum** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium acuminatum Hook. & Arn. = **Eupatorium serrulatum** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.

Eupatorium affine Hook. & Arn., p.p. = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium agrigaudium Cabrera
Sin.: *Heterocondylus reitzii* R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4785* (HBR, US)].

Eupatorium albissimum Hassl. = **Eupatorium spathulatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alpestre Gardner
Sin.: *Eupatorium serratum* Spreng. var. *alpestris* (Gardner) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996f.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14471* (HBR, LP)].

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **longicuneatum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker f. *paraguayensis* Chodat = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **deltoideum** (Chodat) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker var. *asperum* Hassl. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker var. *aureoviride* (Chodat) Hassl. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **aureoviride** (Chodat) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker var. *deltoideum* Chodat = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **deltoideum** (Chodat) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker var. *hispidulum* Hassl. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker var. *oppositifolium* Baker = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **oppositifolium** (Baker) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium alternifolium Sch. Bip. ex Baker var. *vernoniopsis* Hassl. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium amambayense Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1993d, 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10089* (G)].

Eupatorium amphidictyum DC.
Sin.: *Heterocondylus amphidictyus* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16013* (S)].

Eupatorium amygdalinum Lam. var. **amygdalinum**
Sin.: *Ayapana amygdalina* (Lam.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10985a* (G)].

Eupatorium amygdalinum Lam. var. **ocychlaenum** (DC.) Baker
Sin.: *Eupatorium hasslerianum* Chodat, *Eupatorium oxychlaenum* DC., *Eupatorium oxychlaenum* DC. f. *hasslerianum* (Chodat) Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5279* (G)].

Eupatorium anethifolium DC. = **Mikania anethifolia** (DC.) Matzenb.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.

Eupatorium angusticeps Malme
Sin.: *Chromolaena angusticeps* (Malme) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Regnell, A. F. s.n.* (S)].

Eupatorium apense Chodat
Sin.: *Austroeupatorium apense* (Chodat) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7972* (G)].

Eupatorium arachnoideum Legname
Sin.: *Critonia arachnoidea* (Legname) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971a.
Árbol. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 8584* (LP)].

Eupatorium arechavaletae Baker = **Vernonia echioides** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Eupatorium areniscophilum Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1993c, 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Molas, L. 968* (PY)].

Eupatorium argentinum Ariza
Sin.: *Eupatorium prasiifolium* Griseb., *Fleischmannia prasiifolia* (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970b.
Subarbusto. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SLU, TUC); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4062* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 9069* (G)].

Eupatorium armanii Balb. = **Clibadium armanii** (Balb.) Sch. Bip. ex O.E. Schulz

Eupatorium arnottianum Griseb.
Sin.: *Chromolaena arnottiana* (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Subarbusto. Nativa. 100–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5523* (LP)].

Eupatorium arnottii Baker
Sin.: *Austrobrickellia arnottii* (Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium tenuiflorum* (Griseb.) Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *beta* Hook. & Arn., *Mikania tenuiflora* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14567* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 7257* (LP)].

Eupatorium artemisiifolium Griseb.
Sin.: *Gyptis artemisiifolia* (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971d.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Báez, J. R. 9* (LP)].

Eupatorium ascendens Sch. Bip. ex Baker = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium ascendens Sch. Bip. ex Baker var. *parcisetosum* B.L. Rob. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium asclepiadeum DC. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium asperrimum Baker
Sin.: *Chromolaena asperrima* (Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium asperrimum* Baker f. *pauciflorum* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11226* (G)].

Eupatorium asperrimum Baker f. *pauciflorum* Hassl. = **Eupatorium asperrimum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium aureoviride Chodat = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **aureoviride** (Chodat) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium axilliflorum Griseb. = **Ophryosporus axilliflorus** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium azangaroënse Sch. Bip. ex Wedd.
Sin.: *Ageratina azangaroense* (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium prasiifolium* Griseb. var. *glanduliferum* R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970a.
Subarbusto. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15277* (LP)].

Eupatorium bacleanum DC. = **Eupatorium commersonii** (Cass.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium balansae Hieron.
Sin.: *Bejaranoa balansae* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium balansae* Hieron. f. *foliosum* Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. var. *menthoides* Chodat, *Eupatorium balansae* Hieron. var. *reticulatum* (Chodat) Chodat, *Eupatorium bracteanum* Gardner var. *reticulatum* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; Degen, R. & Mereles, F., 1996; King, R. M. & Robinson, H. E., 1978a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SAL); PRY(APY, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 46408* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 7537* (G)].

Eupatorium balansae Hieron. f. *foliosum* Chodat = **Eupatorium balansae** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium balansae Hieron. var. *menthoides* Chodat = **Eupatorium balansae** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium balansae Hieron. var. *reticulatum* (Chodat) Chodat = **Eupatorium balansae** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium barbacense Hieron.
Sin.: *Chromolaena barbacensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Morrone, O. 484* (FCQ, SI)].

Eupatorium bartisiifolium DC. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium bartisiifolium DC. var. *trichophorum* (DC.) Baker = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.

Eupatorium benjamin-lincolnii Steyerm. var. *vernicosum* (Baker) Steyerm. = **Eupatorium reitzii** Cabrera

Eupatorium betonicaeforme (DC.) Baker f. *alternifolium* Hicken = **Eupatorium hickenii** Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium betonicaeforme (DC.) Baker var. **ascendens** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8475* (FLOR, HBR, LP)].

Eupatorium betonicaeforme (DC.) Baker var. **betonicaeforme**
Sin.: *Barrosoa betonicaeformis* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Conoclinium betonicaeforme* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971g; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, FOR, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1364c* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 7115* (LP)].

Eupatorium betonicaeforme (DC.) Baker var. **hastatum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1049c* (HBR, LP)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Cabrera & Klein, 1989).

Eupatorium blumenavii Hieron.
Sin.: *Macropodina blumenavii* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1127* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 5174* (HBR, LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6103* (G, LP, SI)].

Eupatorium bracteanum Gardner var. *reticulatum* Chodat = **Eupatorium balansae** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium brevipetiolatum (Sch. Bip.) Baker ex Hieron., hom. illeg. = **Eupatorium hieronymi** S.E. Freire

Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. var. *bakerii* Kuntze = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Sin.: *Acanthostyles buniifolius* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Acanthostyles saucechicoënse* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *bakerii* Kuntze, *Eupatorium buniifolium* Hook. & Arn. var. *hieronymi* Kuntze, *Eupatorium crithmifolium* Griseb., *Eupatorium pinnatifidum* DC., *Eupatorium pinnatifidum* DC. var. *virgata* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium virgatum* D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971c; Malme, G. O. A., 1931; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21725* (LP)]; BRA[*Sellow, F. 2050* (S)]; URY[*Davies, P. s.n.* (MVFA)].

Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. var. *hieronymi* Kuntze = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium buniifolium Hook. & Arn. var. **saucechicoënse** (Hieron.) Ariza
Sin.: *Eupatorium saucechicoënse* Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1963a; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971c.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 2043* (CORD)].

Eupatorium bupleurifolium DC. var. *asclepiadeum* (DC.) Baker = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium bupleurifolium DC. var. **bupleurifolium**
Sin.: *Campovassouria bupleurifolia* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Campovassouria cruciata* (Vell.) R.M. King & H. Rob., *Chrysocoma cruciata* Vell., *Eupatorium asclepiadeum* DC., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *asclepiadeum* (DC.) Baker, *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *ensifolium* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium bupleurifolium* DC. var. *linifolium* (DC.) Baker, *Eupatorium cruciatum* (Vell.) Ariza, *Eupatorium ensifolium* Griseb., *Eupatorium graminifolium* Chodat, *Eupatorium linifolium* DC.

Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971e; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, LAV, RIV, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17315* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 10204* (HBR, LP, US)]; PRY[*Hassler, E. 1643* (G), *Pedersen, T. M. 8508* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 10428* (LP)].

Eupatorium bupleurifolium DC. var. *ensifolium* (Griseb.) Hieron. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium bupleurifolium DC. var. *linifolium* (DC.) Baker = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium bupleurifolium DC. var. **microcephalum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8902* (LP)].

Eupatorium burchellii Baker
Sin.: *Campuloclinium burchellii* (Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972e; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25358* (LP)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16525* (S)]; PRY[*Hassler, E. 8355* (G)].

Eupatorium caaguazuense Hieron.
Sin.: *Chromolaena caaguazuensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *crassifolium* Chodat, *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *hirsutum* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1931.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigue, F. M. 56* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 528* (S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4551* (G)]; URY[*Chebataroff, J. 10141* (LP)].

Eupatorium caaguazuense Hieron. var. *crassifolium* Chodat = **Eupatorium caaguazuense** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium caaguazuense Hieron. var. *hirsutum* Hassl. = **Eupatorium caaguazuense** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium caaguazuense Hieron. var. *nervosum* Chodat = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium cabrerae B.L. Rob.
Sin.: *Barrosoa cabrerae* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971g.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4556* (LP)].

Eupatorium callilepis Baker var. *oligocephalum* Griseb. = **Eupatorium paucicapitulatum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium calycinum Sch. Bip. ex Baker = **Eupatorium calyculatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium calyculatum Hook. & Arn.
Sin.: *Disynaphia calyculata* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Disynaphia montevidensis* DC., *Eupatorium calycinum* Sch. Bip. ex Baker, *Stevia calycina* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1974a; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971f; Malme, G. O. A., 1931, 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MON, RIV, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 540* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 1067c* (HBR, LP)]; URY[*Sellow, F. 641* (S)].

Eupatorium candolleanum Hook. & Arn.
Sin.: *Barrosoa candolleana* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *lancifolium* Baker, *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *paranaensis* Baker, *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *guaraniticum* Chodat, hom. illeg., *Eupatorium palustre* (DC.) Baker var. *verbenaceum* Chodat
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971g; Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14534* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11402* (HBR, LP, US)]; PRY[*Woolston, A. L. 409* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Cabrera & Klein, 1989).

Eupatorium candolleanum Hook. & Arn. var. *curitybanum* Dusén ex Malme = **Eupatorium trichobasis** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium candolleanum Hook. & Arn. var. *lancifolium* Baker = **Eupatorium candolleanum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium candolleanum Hook. & Arn. var. *paranaensis* Baker = **Eupatorium candolleanum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium casarettoi (B.L. Rob.) Steyerm.
Sin.: *Symphipappus casarettoi* B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1371c* (HBR, LP)].

Eupatorium catarium Veldkamp
Sin.: *Eupatorium clematideum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium pauciflorum* auct. non Kunth, *Eupatorium urticifolium* auct. non L., *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *clematideum* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium urticifolium* L. f. var. *nanum* Hieron., *Praxelis clematidea* (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Veldkamp, J., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5258* (LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4475* (G)].

Eupatorium catharinense Cabrera
Sin.: *Neocabreria catharinensis* (Cabrera) R.M. King & H. Rob., *Symphipappus catharinensis* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Endémica. 1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10458* (HBR, LP, US)].

Eupatorium ceratophyllum Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, ERI, SFE); URY (ART, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 17772* (LP)], URY[*Del Puerto, O. 5843* (MVFA)].

Eupatorium charpinii Cabrera
Sin.: *Chromolaena ferruginea* R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ferrugineum* Gardner, *Eupatorium ferrugineum* Gardner var. *paraguariense* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993c, 1996f
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4414* (G)].

Eupatorium chilense Molina = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Powell, A. M., 1978.

Eupatorium chlorolepis Baker
Sin.: *Campuloclinium chlorolepis* (Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9704* (S)].

Eupatorium chodatii Hassl. = **Trichogonia chodatii** (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Eupatorium christieanum Baker
Sin.: *Chromolaena christieana* (Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium laevigatulum* B.L. Rob.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21665* (LP)]; PRY[*Brunner, D. R. 1756* (G)].

Eupatorium ciliatum Hook. & Arn., hom. illeg. = **Eupatorium hookerianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium claussenii Gardner = **Eupatorium stachyophyllum** Spreng.
Referencias: Baker, J. G., 1876b.

Eupatorium clavatum Griseb. = **Ophryosporus piquerioides** (DC.) Benth. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium clematideum Griseb., hom. illeg. = **Eupatorium catarium** Veldkamp
Referencias: Veldkamp, J., 1999.

Eupatorium cochabambense Hieron. = **Eupatorium connivens** Rusby
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium commersonii (Cass.) Hieron.
Sin.: *Eupatorium bacleanum* DC., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *dentata* Speg., *Eupatorium commersonii* (Cass.) Hieron. var. *pinnata* Speg., *Gyptis commersonii* Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971d; Marchesi, E., com. pers.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SDE, SFE); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21946* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 8492* (MVFA)].

Eupatorium commersonii (Cass.) Hieron. var. *dentata* Speg. = **Eupatorium commersonii** (Cass.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium commersonii (Cass.) Hieron. var. *pinnata* Speg. = **Eupatorium commersonii** (Cass.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium compressum Gardner
Sin.: *Symphyopappus compressum* (Gardner) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6451* (HBR, LP)].

Eupatorium comptoniifolium DC. = **Eupatorium serratum** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium concinnum DC.
Sin.: *Neocabreria concinna* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1931, 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 3171* (S)].

Eupatorium confertum Gardner = **Eupatorium serratum** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium congestum Hook. & Arn. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium congestum Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Cabrera = **Eupatorium hirsutum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium congestum Hook. & Arn. var. *truncatum* Hassl. = **Eupatorium hirsutum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium connivens Rusby
Sin.: *Chromolaena connivens* (Rusby) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium cochabambense* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21590* (LP)].

[Eupatorium conoclinanthium Hieron.]
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium conyzoides Mill. = **Eupatorium odoratum** L. var. **odoratum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium conyzoides Vahl = **Eupatorium odoratum** L. var. **odoratum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *affine* (Hook. & Arn.) Baker = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *ciliatum* (Hook. & Arn.) Hieron. = **Eupatorium hookerianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

[Eupatorium conyzoides Vahl var. extensum Gardner ex Griseb.]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *foliatum* Sch. Bip. ex Baker = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

[Eupatorium conyzoides Vahl var. maximiliani Baker]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Nombre dudoso.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *paucidentatum* Baker = **Eupatorium odoratum** L. var. **odoratum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *pauciflora* Baker = **Eupatorium odoratum** L. var. **pauciflorum** (Baker) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *scaberulum* Hassl. = **Eupatorium odoratum** L. var. **odoratum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium conyzoides Vahl var. *tunariense* Hieron. = **Eupatorium tunariense** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium conyzoides Vahl subsp. *margaritense* Hassl. = **Eupatorium margaritense** (Hassl.) Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium crassipes Hieron. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **crassipes** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium crenulatum (Spreng.) Hieron., hom. illeg. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium crenulatum (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *tucumanense* Hieron. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium crenulatum (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *xylophylloides* (DC.) Hicken = **Eupatorium tremulum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium crithmifolium Griseb. = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium cruciatum (Vell.) Ariza = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium cuneatum DC.
Sin.: *Symphyopappus cuneatus* (DC.) Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6587* (HBR, LP)].

Eupatorium debeauxii B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2210* (HBR, LP)].

Eupatorium dejetum B.L. Rob. = **Eupatorium tacaquirense** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium dendroides Spreng. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium dendroides Spreng. var. *xylophylloides* (DC.) Baker = **Eupatorium tremulum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium densiflorum Morong = **Eupatorium orbignyanum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium denudatum Chodat = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Eupatorium dichotomum Sch. Bip. ex Miq. = **Eupatorium squalidum** DC. var. **subvelutinum** (DC.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.

Eupatorium didymum Klatt var. **glandulitectum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24080* (LP)].

Eupatorium diffusum Vahl = **Brickellia diffusa** (Vahl) A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium discolor Spreng. = **Vernonia discolor** (Spreng.) Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Eupatorium dispalatum Gardner
Sin.: *Steyermarkia dispalata* (Gardner) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2134* (HBR, LP)].

Eupatorium dissolvens Baker
Sin.: *Fleischmannia dissolvens* (Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6487* (LP)]; PRY[*Degen, R. 3127* (FCQ, MO)].

Eupatorium dodoneifolium Hook. & Arn. = **Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1939b, 1974a, 1978; Freire, S. E., 1998.

Eupatorium donianum Hook. & Arn. = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium dusenii Malme
Sin.: *Steyermarkia dusenii* (Malme) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7319* (HBR, LP)].

Eupatorium ellipticum Hook. & Arn.
Sin.: *Chromolaena elliptica* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium latisquamulosum* (Hieron.) Malme, *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var. *latisquamulosum* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, ERI, MIS); BRA(PAR); PRY(CAU, CAA, CAN, COA, ITA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 13707* (LP)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14329* (S)]; PRY[*Hassler, E. 7101* (G)].

Eupatorium elongatum Hook. & Arn. = **Eupatorium oblongifolium** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium ensifolium Griseb. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium entreriense Hieron. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium ericoides DC.
Sin.: *Disynaphia ericoides* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1931, 1933b; Marchesi, E., com. pers.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 3124* (S)]; URY[*Marchesi, E. 27309* (MVFA)].

Eupatorium erigeroides DC. = **Eupatorium tweedieanum** Hook. & Arn. var. **tweedieanum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium erodiifolium DC. = **Eupatorium tanacetifolium** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium erodiifolium DC. var. *obtusilobum* Hieron. = **Eupatorium tanacetifolium** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium esperanzae Hassl.
Sin.: *Ayapanopsis esperanzae* (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Endémica.
Países: PRY(AMA, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Chodat, R. H. 236* (G)].

Eupatorium esperanzae Hassl. var. *schininii* (Cabrera) Cabrera = **Eupatorium schininii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium estrellense Hassl. = **Eupatorium lysimachioides** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

[Eupatorium fastigiatum Kunth]
Sin.: *Ageratina fastigiata* (Kunth) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium ferrugineum Gardner = **Eupatorium charpinii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium ferrugineum Gardner var. *paraguariense* Hassl. = **Eupatorium charpinii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium ferruigineum Gardner f. *parvifolium* Hack. = **Eupatorium oxylepis** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium fiebrigii Hassl. = **Eupatorium pseudoprasiifolium** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium fiebrigii Hassl. var. *acuminata* Hassl. = **Eupatorium pseudoprasiifolium** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium filicaule Sch. Bip. ex A. Gray = **Eupatorium solidaginoides** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium filifolium Hassl.
Sin.: *Disynaphia filifolia* (Hassl.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium filifolium* Hassl. var. *longifolium* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1128* (LP)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 3938* (S)]; PRY[*Balansa, B. 954* (G)].

Eupatorium filifolium Hassl. var. *longifolium* Hassl. = **Eupatorium filifolium** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium foliatum (Sch. Bip. ex Baker) Hieron. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium foliatum (Sch. Bip. ex Baker) Hieron. var. *incanum* Hieron. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium fulvum Hook. & Arn. = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Eupatorium gaudichaudianum DC. f. **lobatum** Dusén ex Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15063* (S)].

Eupatorium gaudichaudianum DC. var. **bipinnatum** Dusén ex Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16384* (S)].

Eupatorium gaudichaudianum DC. var. **gaudichaudianum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8425* (HBR, LP, US)].

Eupatorium gaudichaudianum DC. var. **leucodon** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10550* (HBR, LP, US)].

Eupatorium gaudichaudianum DC. var. **macrodon** Dusén ex Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9499* (S)].

Eupatorium gaudichaudianum DC. var. **oppositifolium** Dusén ex Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14501* (S)].

Eupatorium glaziouii Baker = **Eupatorium purpurascens** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium glaziouii Baker var. *molle* Hassl. = **Eupatorium purpurascens** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium glechonophyllum Less.
Sin.: *Ageratina glechnophylla* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Ageratina remyana* (Phil.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium remyanum* Phil.
Referencias: Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4566* (CONC)].

[Eupatorium glechonophyllum Less. var. minor]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium gnaphalloides Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1993c, 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4105b* (LIL)].

Eupatorium gnidioides DC. = **Eupatorium ligulaefolium** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium graminifolium Chodat = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium grande Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Heterocondylus grandis* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972b; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1305* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 16582* (HBR, LP)]; PRY[*Balansa, B. 4683* (G)].

Eupatorium griseopubescens Dusén ex Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4260* (S)].

Eupatorium halimifolium DC. = **Eupatorium spathulatum** Hook. & Arn.
Referencias: Malme, G. O. A., 1931.

Eupatorium hasslerianum Chodat = **Eupatorium amygdalinum** Lam. var. **ocychlaenum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium hecatanthum (DC.) Baker
Sin.: *Eupatorium populifolium* Hook. & Arn., hom. illeg., *Hebeclinium hecatanthum* DC., *Hebeclinium urolepis* DC., *Urolepis hecatantha* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971h; Malme, G. O. A., 1933b; Marchesi, E., com. pers.; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11403* (LP, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11509* (US)]; PRY[*Rojas, T. 2239* (LP, SI)]; URY[*Berro, M. B. 14* (MVFA)].

Eupatorium hexanthum DC. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hickenii Cabrera & Vittet
Sin.: *Campuloclinium hickenii* (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium betonicaeforme* (DC.) Baker f. *alternifolium* Hicken

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972e.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vattuone, I. C. 79* (SI)].

Eupatorium hiemale Lillo = **Eupatorium lasiophthalmum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hieronymi S.E. Freire
Sin.: *Eupatorium brevipetiolatum* (Sch. Bip.) Baker ex Hieron., hom. illeg., *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker var. *brevipetiolata* Sch. Bip., *Grazielia brevipetiolata* R.M. King & H. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(FLA, LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 3588* (MVFA)].

Eupatorium hirsutum Hook. & Arn.
Sin.: *Chromolaena hirsuta* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium congestum* Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn. var. *truncatum* Hassl., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *triseriale* Hassl., *Eupatorium tozziifolium* DC. var. *subpetiolatum* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, MIS, SFE); BRA(SCA); PRY(AMA, CAA, COA, ÑEE, PAI); URY (CAS, DUR, FLA, PAY, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 69* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 12120* (HBR, LP, US)]; PRY[*Hassler, E. 12543b* (BAF, G)]; URY [*Rosengurtt, B. 5194* (MVFA)].

Eupatorium hirsutum Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn. = **Eupatorium hirsutum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hirsutum Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hirsutum Hook. & Arn. var. *triseriale* (Griseb.) Hieron. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hirsutum Hook. & Arn. var. *triseriale* Hassl. = **Eupatorium hirsutum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hirtum Less., nom. nud. = **Mikania hirsutissima** DC. var. **hirsutissima**
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Eupatorium hookerianum Griseb.
Sin.: *Chromolaena hookeriana* (Griseb.) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena jujuiense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ciliatum* Hook. & Arn., hom. illeg., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *ciliatum* (Hook. & Arn.) Hieron., *Eupatorium hookerianum* Griseb. var. *jujuiense* (Hieron.) Cabrera, *Eupatorium jujuiense* Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Arbusto. Nativa. 400–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14304* (LP)].

Eupatorium hookerianum Griseb. var. *jujuiense* (Hieron.) Cabrera = **Eupatorium hookerianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium hunzigeri Hieron. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **crassipes** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium intermedium DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b; Marchesi, E., com. pers.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10918* (HBR, LP, US)]; URY[*Berro, M. B. 4562* (MVFA)].

Eupatorium intermedium DC. var. *agustifolium* Hieron. = **Eupatorium serratum** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium inulifolium Kunth
Sin.: *Austroeupatorium entreriense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Austroeupatorium inulifolium* (Kunth) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium entreriense* Hieron., *Eupatorium inulifolium* Kunth var. *suaveolenns* (Kunth) Hieron., *Eupatorium molle* Kunth, *Eupatorium pallescens* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *bonariense* DC., *Eupatorium pallescens* DC. var. *hirsuta* DC., *Eupatorium pallidum* Hook. & Arn., *Eupatorium paranense* Hook. & Arn., *Eupatorium suaveolens* Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970d; Malme, G. O. A., 1933b; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR).

Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 5026* (LIL, LP)]; BRA[*Klein, R. M. 469* (HBR, LP)]; PRY[*Woolston, A. L. 284* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 3279* (LP)].

Eupatorium inulifolium Kunth var. *suaveolenns* (Kunth) Hieron. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium itatiayense Hieron.
Sin.: *Symphipappus itatayensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Symphipappus polystachyus* Baker var. *microcephala* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3448* (HBR, LP)].

Eupatorium ivifolium L.
Sin.: *Chromolaena ivifolia* (L.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium affine* Hook. & Arn., p.p., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *affine* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium ivifolium* L. var. *genuinum* Hassl., *Eupatorium ivifolium* L. var. *hirsutum* Hassl., *Eupatorium ivifolium* L. var. *perturbinatum* B.L. Rob., *Eupatorium ivifolium* L. var. *pilcomayense* Hassl., *Eupatorium luquense* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1931; Marchesi, E., com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23361* (LP), *Klein, R. M. 12472* (HBR, LP)]; BRA[*Klein, R. M. 12472* (HBR, LP)]; PRY[*Hassler, E. 7270* (G)]; URY[*Berro, M. B. 4236* (MVFA)].

Eupatorium ivifolium L. var. *foliosum* Chodat = **Eupatorium squarroso-ramosum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium ivifolium L. var. *genuinum* Hassl. = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium ivifolium L. var. *hirsutum* Hassl. = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium ivifolium L. var. *perturbinatum* B.L. Rob. = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium ivifolium L. var. *pilcomayense* Hassl. = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium jujuiense Hieron. = **Eupatorium hookerianum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.

Eupatorium kingii Cabrera
Sin.: *Macropodina reitzii* R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10501* (HBR, LP, US)].

Eupatorium kleinii Cabrera
Sin.: *Chromolaena kleinii* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6047* (HBR, LP)].

Eupatorium kleinioides Kunth
Sin.: *Campuloclinium kleinioides* (Kunth) DC., *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *microcephalum* Chodat, *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *subglabratum* Hieron., *Eupatorium sanctopaulense* B.L. Rob. var. *subglabratum* (Hieron.) Malme, *Eupatorium subglabratum* (Hieron.) Cabrera & Vittet, *Praxelis kleinioides* (Kunth) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970e, 1972e; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 4395* (LP)]; BRA[*Niederlein, G. 1384* (*)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4674* (G)].

Eupatorium kleinioides Kunth var. *hecantha* Baker = **Eupatorium missionum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium kleinioides Kunth var. *latifolium* Chodat = **Eupatorium variegatum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium kleinioides Kunth var. *microcephalum* Chodat = **Eupatorium kleinioides** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium kleinioides Kunth var. *subglabratum* Hieron. = **Eupatorium kleinioides** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laetevirens Hook. & Arn.
Sin.: *Austroeupatorium laetevirens* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *laetevirens* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *salicinum* Chodat

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970d; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 259* (LP)]; BRA[*Sellow, F. 2524* (LP)]; PRY[*Arenas, P. 279* (CTES)].

Eupatorium laeve DC. = **Eupatorium simillimum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laeve Griseb. = **Ophryosporus lorentzii** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laeve DC. var. *latifolia* Sch. Bip. ex Hieron. = **Eupatorium simillimum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laeve DC. var. *macrophyllum* Chodat = **Eupatorium simillimum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium laeve DC. var. *pubens* B.L. Rob. = **Eupatorium simillimum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium laevigatulum B.L. Rob. = **Eupatorium christieanum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laevigatum Griseb., hom. illeg. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laevigatum Lam. var. **arenarium** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); URY(CLA, COL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 6407* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3318* (LP)].

Eupatorium laevigatum Lam. var. **laevigatum**
Sin.: *Chromolaena laevigata* (Lam.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *longepetiolatum* Hassl., *Eupatorium laevigatum* Lam. var. *psidifolia* (DC.) Hassl., *Eupatorium psidifolium* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(CLA, COL, PAY, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13730* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11491* (HBR, LP, US)]; PRY[*Woolston, A. L. 476* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 1980* (LP)].

Eupatorium laevigatum Lam. var. *longepetiolatum* Hassl. = **Eupatorium laevigatum** Lam. var. **laevigatum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Eupatorium laevigatum Lam. var. *psidifolia* (DC.) Hassl. = **Eupatorium laevigatum** Lam. var. **laevigatum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium laevigatum Lam. var. **submembranaceum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Arbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 325* (B)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **aureoviride** (Chodat) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *aureoviride* (Chodat) Hassl., *Eupatorium aureoviride* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5870* (G)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **crassipes** (Hieron.) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium crassipes* Hieron., *Eupatorium hunzigeri* Hieron., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., p.p., *Gyptis crassipes* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Robinson, B. L., 1933.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE); URY (ART, COL, MON, PAY, RIV, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25519* (SI)]; URY [*Berro, M. B. 8085* (MVFA)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **deltoideum** (Chodat) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker f. *paraguayensis* Chodat, *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *deltoideum* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Marchesi, E., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, GUA); URY(RIV).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1558* (LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4757* (G)]; URY[*Del Puerto, O. 1830* (MVFA)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *asperum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *hispidulum* Hassl., *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *vernoniopsis* Hassl., *Eupatorium lanigerum* Hook. & Arn. var. *typicum* B.L. Rob., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *hirsutum* Chodat, *Eupatorium vernoniopsis* Sch. Bip. ex Baker, *Gyptis lanigera* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Gyptis vernoniopsis* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971d; Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, GUA, MIE, PAI); URY(ART, COL, MON, PAY, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 238* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14662* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4640* (G)]; URY[*Chebataroff, J. 11178* (LP)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **lasiolepis** (B.L. Rob.) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium lasiolepis* B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Robinson, B. L., 1931, 1933.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1170* (LP)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 950* (P)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (King & Robinson, 1987).

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **longicuneatum** B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; Robinson, B. L., 1933.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1337* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 961* (G)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., p.p. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **crassipes** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **minus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2651* (LP)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. **oppositifolium** (Baker) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium alternifolium* Sch. Bip. ex Baker var. *oppositifolium* Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 28320* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 6612* (LP)].

Eupatorium lanigerum Hook. & Arn. var. *typicum* B.L. Rob. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium lasiolepis B.L. Rob. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lasiolepis** (B.L. Rob.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium lasiophthalmum Griseb.
Sin.: *Eupatorium hiemale* Lillo, *Kaunia lasiophthalma* (Griseb.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1980a.
Arbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15724* (LP)].

Eupatorium latisquamulosum (Hieron.) Malme = **Eupatorium ellipticum** Hook. & Arn.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.

Eupatorium laxicephalum Cabrera
Sin.: *Fleischmannia laxicephala* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12341* (HBR, LP, US)].

[Eupatorium leptolepis Baker]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium leptophlebium (B.L. Rob.) Steyerm.
Sin.: *Raulinoreitzia leptophlebia* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob., *Symphipappus leptophlebius* B.L. Rob.
Referencias: Robinson, B. L., 1931.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 49518* (CORD, MBM)].

Eupatorium liatridium DC. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium ligulaefolium Hook. & Arn.
Sin.: *Disynaphia ligulaefolia* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium gnidioides* DC.

Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6467* (HBR, LP, US)].

Eupatorium lilloi B.L. Rob.
Sin.: *Idiothamnus lilloi* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1975c.
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21635* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 7202* (LP)].

Eupatorium linifolium DC. = **Eupatorium bupleurifolium** DC. var. **bupleurifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium littorale Cabrera
Sin.: *Disynaphia littoralis* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1023c* (HBR, LP)].

Eupatorium lobatifolium Cabrera
Sin.: *Koanophyllon lobatifolia* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6672* (LP)].

Eupatorium lorentzii Hieron.
Sin.: *Ageratina lorentzii* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8241* (LP)].

Eupatorium luquense Chodat = **Eupatorium ivifolium** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium lymansmithii (B.L. Rob.) Steyerm.
Sin.: *Symphipappus lymansmithii* B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9930* (HBR, LP, US)].

Eupatorium lysimachioides Chodat
Sin.: *Eupatorium estrellense* Hassl., *Eupatorium lysimachioides* Chodat var. *estrellense* (Hassl.) Hassl., *Heterocondylus lysimachioides* (Chodat) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 810* (G, K)].

Eupatorium lysimachioides Chodat var. *estrellense* (Hassl.) Hassl. = **Eupatorium lysimachioides** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium macrocephalum Less.
Sin.: *Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC., *Campuloclinium macrocephalum* (Less.) DC. var. *strigosum* DC., *Chromolaena pratensis* Gardner, *Eupatorium denudatum* Chodat, *Eupatorium donianum* Hook. & Arn., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *angustifolium* Baker, *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *stigmatosum* (Chodat) Hassl., *Eupatorium macrocephalum* Less. var. *strigosum* Baker, *Eupatorium stigmatosum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *subcalvatum* Chodat, *Eupatorium stigmatosum* Chodat var. *violaceum* Chodat
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954, 1963; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f; Degen, R. & Mereles, F., 1996; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1933b; Marchesi, E., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8226* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11402a* (HBR, LP, US)]; PRY[*Lurvey 461* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 5372pe* (LP)].

Eupatorium macrocephalum Less. var. *angustifolium* Baker = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium macrocephalum Less. var. *stigmatosum* (Chodat) Hassl. = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium macrocephalum Less. var. *strigosum* Baker = **Eupatorium macrocephalum** Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium macrophyllum L.
Sin.: *Hebeclinium macrophyllum* (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3228* (SI)]; BRA[*Ule, E. H. G. 654* (US)]; PRY[*Chodat, R. H. 382* (G)].

Eupatorium malachophyllum Klatt
Sin.: *Eupatorium niederleinii* Hieron., *Eupatorium niederleinii* Hieron. var. *latifolia* Hieron., *Neocabreria malacophylla* (Klatt) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972g.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 468* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4244* (HBR, LP)]; PRY[*Brunner, D. R. 844* (G, PY), *Schinini, A. 31399* (CTES)].

Eupatorium maracayuense Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15864* (S)]; PRY[*Hassler, E. 9516* (G, LIL)].

Eupatorium margaritense (Hassl.) Hassl.
Sin.: *Chromolaena margaritensis* (Hassl.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Vahl subsp. *margaritense* Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1996f.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4832* (G, SI)].

Eupatorium megacephalum Baker
Sin.: *Campuloclinium megacephalum* (Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18788* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4912* (SI)].

Eupatorium megaphyllum Baker
Sin.: *Critonia megaphylla* (Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium morifolium* Mill.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978, 1996f; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20800* (LP)]; BRA[*Matzenbacher, N. I. s.n.* (ICN)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 26* (G)].

Eupatorium mikaniifolium B.L. Rob.
Sin.: *Bishovia mikaniifolia* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; King, R. M. & Robinson, H. E., 1978b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 237* (LP)].

Eupatorium militare B.L. Rob.
Sin.: *Gyptidium militare* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 66* (LP)].

Eupatorium missionum Malme
Sin.: *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *hecantha* Baker, *Praxelis missionum* (Malme) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, GUA, ITA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1191* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11530* (HBR, LP, US)]; PRY[*Montes, J. E. 12434* (LP)].

Eupatorium molle Kunth = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

[Eupatorium monardifolium Kunth]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium montevidense Spreng. = **Baccharis coridifolia** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Giuliano, D. A., 2000.

Eupatorium morifolium Mill. = **Eupatorium megaphyllum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium multicrenulatum Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Disynaphia achillea* (Chodat) R.M. King & H. Rob., *Disynaphia multicrenulata* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium achillea* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971f; Malme, G. O. A., 1933b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1904* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 8581a* (HBR, LP, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 11164* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 7075* (LP)].

Eupatorium multifidum DC.
Sin.: *Dimorpholepis multifida* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Grazielia multifida* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 13728* (CTES)].

Eupatorium niederleinii Hieron. = **Eupatorium malachophyllum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium niederleinii Hieron. var. *latifolia* Hieron. = **Eupatorium malachophyllum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium nummularia Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1931.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 2533* (S)].

Eupatorium oblongifolium (Spreng.) Baker
Sin.: *Conyza oblongifolia* Spreng., *Eupatorium elongatum* Hook. & Arn., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *elongatum* (Hook. & Arn.) Baker, *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *oxyodontum* B.L. Rob., *Eupatorium oblongifolium* (Spreng.) Baker var. *tucumanense* Baker, *Stomatanthes oblongifolius* (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, MIE); URY(MAL, PAY, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27420* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 18879* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 9161* (G, LIL)]; URY[*Chebataroff, J. 3835* (LP)].

Eupatorium oblongifolium (Spreng.) Baker var. *elongatum* (Hook. & Arn.) Baker = **Eupatorium oblongifolium** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium oblongifolium (Spreng.) Baker var. *hirsutum* Chodat = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium oblongifolium (Spreng.) Baker var. *oxyodontum* B.L. Rob. = **Eupatorium oblongifolium** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium oblongifolium (Spreng.) Baker var. *tucumanense* Baker = **Eupatorium oblongifolium** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium odoratum L. var. **odoratum**
Sin.: *Chromolaena odorata* (L.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Mill., *Eupatorium conyzoides* Vahl, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *paucidentatum* Baker, *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *scaberulum* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14522* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 723* (LP)]; PRY[*Woolston, A. L. 269* (SI)].

Eupatorium odoratum L. var. **pauciflorum** (Baker) Hieron.
Sin.: *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *pauciflora* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1274* (HBR, LP)].

Eupatorium oinopolepis (Malme) Cabrera
Sin.: *Chromolaena oinopolepis* (Malme) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium rhinanthaceum* DC. var. *oinolepis* Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11965* (US)].

Eupatorium orbiculatum DC.
Sin.: *Vittetia orbiculata* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4880* (HBR, LP)].

Eupatorium orbignyanum Klatt
Sin.: *Chromolaena densiflora* (Morong) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena orbignyana* (Klatt) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium densiflorum* Morong, *Eupatorium oxylepis* DC. var. *densiflorum* (Morong) Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 1263* (LP)]; PRY[*Hahn, W. J. 1373* (CTES, G)].

Eupatorium origanoides Meyen & Walp. = **Ophryosporus origanoides** (Meyen & Walp.) Hieron.

Eupatorium ostenii B.L. Rob.
Sin.: *Praxelis ostenii* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970e; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 1119* (CTES, SI)]; PRY[*Rojas, T. 2951* (LIL, LP, SI)].

Eupatorium oxychlaenum DC. = **Eupatorium amygdalinum** Lam. var. **ocychlaenum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium oxychlaenum DC. f. *hasslerianum* (Chodat) Hassl. = **Eupatorium amygdalinum** Lam. var. **ocychlaenum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium oxylepis DC.
Sin.: *Chromolaena oxylepis* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ferruigineum* Gardner f. *parvifolium* Hack.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Arbusto. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10007* (BAF, G)].

Eupatorium oxylepis DC. var. *densiflorum* (Morong) Hassl. = **Eupatorium orbignyanum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium oxylepis DC. subsp. *paraguariense* (Hieron.) Hassl. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium oyadense Hieron. = **Eupatorium squarroso-ramosum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium oyadense Hieron. var. *paraguayense* Hieron. = **Eupatorium squarroso-ramosum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium pallescens DC. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium pallescens DC. var. *bonariense* DC. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium pallescens DC. var. *hirsuta* DC. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium pallidum Hook. & Arn. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium palmare Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Chromolaena palmaris* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6077* (HBR, LP)].

[Eupatorium palustre (DC.) Baker]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium palustre (DC.) Baker var. *guaraniticum* Chodat, hom. illeg. = **Eupatorium candolleanum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium palustre (DC.) Baker var. *verbenaceum* Chodat = **Eupatorium candolleanum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium paradoxus Hook. & Arn. = **Ophryosporus paradoxus** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.

Eupatorium paraguariense Hieron. = **Eupatorium pedunculosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Eupatorium paranense Hook. & Arn. = **Eupatorium inulifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium patagonicum Klatt = **Eupatorium patens** D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium patens Phil., hom. illeg. = **Eupatorium patens** D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium patens D. Don ex Hook. & Arn. var. *glacilior* Lorentz = **Eupatorium patens** D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium patens D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Sin.: *Austrobrickellia patens* (D. Don ex Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium patagonicum* Klatt, *Eupatorium patens* D. Don ex Hook. & Arn. var. *glacilior* Lorentz, *Eupatorium patens* Phil., hom. illeg., *Eupatorium vattuonei* Hicken, *Eupatorium xerolepis* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1971a, 1974a, 1978, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972i.
Arbusto. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Baéz 38* (BA)]; PRY[*Rojas, T. 338* (G)].

Eupatorium patens D. Don ex Hook. & Arn. var. **rhodolaenum** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7640* (LP)].

Eupatorium patens D. Don ex Hook. & Arn. var. **tomentosum** Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978, 1996f.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20810* (LP)]; PRY[*Schemeda, G. 123* (CTES, G)].

Eupatorium paucicapitulatum Hieron.
Sin.: *Eupatorium callilepis* Baker var. *oligocephalum* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a; Marchesi, E., com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, SFE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6374* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2099* (MVFA)].

Eupatorium pauciflorum auct. non Kunth = **Eupatorium catarium** Veldkamp
Referencias: Veldkamp, J., 1999.

Eupatorium pedunculosum Hook. & Arn.
Sin.: *Chromolaena foliata* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena paraguariensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena pedunculosa* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *foliatum* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron., *Eupatorium foliatum* (Sch. Bip. ex Baker) Hieron. var. *incanum* Hieron., *Eupatorium oxylepis* DC. subsp. *paraguariense* (Hieron.) Hassl., *Eupatorium paraguariense* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25540* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 4848* (HBR, LP)]; PRY[*Hassler, E. 3771* (G)].

Eupatorium pentanthum Sch. Bip. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium phlebodes B.L. Rob. = **Trichogonia phlebodes** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Eupatorium piauhiense Gardner = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium picturatum Malme
Sin.: *Austroeupatorium picturatum* (Malme) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970d.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14670* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3194* (HBR, LP)].

Eupatorium pinnatifidum DC. = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium pinnatifidum DC. var. *virgata* (Hook. & Arn.) Baker = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium piquerioides DC. = **Ophryosporus piquerioides** (DC.) Benth. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium polyanthum Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Chromolaena polyantha* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1931, 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(PAR, RGS); PRY(CON, PAI); URY(ART, CLA, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21978* (SI)]; BRA[*Palacios 1907* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 7506* (G)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 476d* (LP)].

Eupatorium polycladum Dusén
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 18010* (S)].

Eupatorium polystachyum DC. var. **polystachyum**
Sin.: *Baccharis crenulata* Spreng., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron., hom. illeg., *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *tucumanense* Hieron., *Eupatorium dendroides* Spreng., *Eupatorium laevigatum* Griseb., hom. illeg., *Eupatorium pentanthum* Sch. Bip., *Eupatorium piauhiense* Gardner, *Eupatorium tremulum* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Raulinoreitzia crenulata* (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1963a, 1996f; Malme, G. O. A., 1933b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 8475* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14776* (HBR, LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4997* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4631b* (LP)].

Eupatorium polystachyum DC. var. **subcordatum** Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12224* (HBR, LP, US)].

Eupatorium populifolium Hook. & Arn., hom. illeg. = **Eupatorium hecatanthum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium prasiifolium Griseb. = **Eupatorium argentinum** Ariza
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium prasiifolium Griseb. var. *glanduliferum* R.E. Fr. = **Eupatorium azangaroënse** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium pseudoprasiifolium Hassl.
Sin.: *Chacoa pseudoprasiifolia* (Hassl.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium fiebrigii* Hassl., *Eupatorium fiebrigii* Hassl. var. *acuminata* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; King, R. M. & Robinson, H. E., 1975b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(SCA); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2995* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 5691* (HBR, LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4199* (G)].

Eupatorium psidifolium DC. = **Eupatorium laevigatum** Lam. var. **laevigatum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium pulchrum Gardner = **Eupatorium stachyophyllum** Spreng.
Referencias: Baker, J. G., 1876b.

Eupatorium punctulatum DC.
Sin.: *Chromolaena punctulata* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17068* (S)].

Eupatorium purpurascens Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Campuloclinium purpurascens* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium glaziouii* Baker, *Eupatorium glaziouii* Baker var. *molle* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978, 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25230* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 18771* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 3955* (G)].

Eupatorium pyrifolium DC.
Sin.: *Steyermarkia pyrifolia* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8957* (HBR, LP)].

Eupatorium radula Chodat
Sin.: *Disynaphia radula* (Chodat) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium radula* Chodat var. *obtusifolium* Chodat, *Eupatorium radula* Chodat var. *serratum* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 21290* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 34591* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 5888* (G)].

Eupatorium radula Chodat var. *obtusifolium* Chodat = **Eupatorium radula** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium radula Chodat var. *serratum* Chodat = **Eupatorium radula** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium ramboi Cabrera
Sin.: *Barrosoa ramboi* (Cabrera) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11864* (LP)].

Eupatorium ramosissimum Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 9041* (CTES, G, LIL)].

Eupatorium rebaudianum Bertoni = **Stevia rebaudiana** (Bertoni) Bertoni
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.

Eupatorium regnellii Sch. Bip. = **Ophryosporus regnellii** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Eupatorium reitzii Cabrera
Sin.: *Eupatorium benjamin-lincolnii* Steyerm. var. *vernicosum* (Baker) Steyerm., *Symphipappus reticulatus* Baker var. *vernicosus* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6056* (HBR, LP)].

Eupatorium remyanum Phil. = **Eupatorium glechonophyllum** Less.

Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.

Eupatorium rhinanthaceum DC.
Sin.: *Chromolaena rhinanthacea* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1931.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 28176* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 5615* (G)].

Eupatorium rhinanthaceum DC. var. *latisquamulosum* Hieron. = **Eupatorium ellipticum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium rhinanthaceum DC. var. *oinolepis* Malme = **Eupatorium oinopolepis** (Malme) Cabrera

Eupatorium rhodolepis Chodat = **Eupatorium verbenaceum** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium riedelii Baker
Sin.: *Campuloclinium riedelii* (Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10674* (G, LIL)].

Eupatorium rojasii Hassl.
Sin.: *Chromolaena rojasii* (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10103* (G, K, LIL)].

Eupatorium rosengurttii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bergalli 3472pe* (LP)].

Eupatorium rosmarinaceum Cabrera & Vittet
Sin.: *Austroeupatorium rosmarinaceum* (Cabrera & Vittet) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *rosmarinifolia* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8829* (HBR, LP, US)].

Eupatorium rufescens DC. var. **glabratum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CON, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1148c* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 29339* (CTES, SI)].

[Eupatorium rufidium Hook. & Arn.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Eupatorium saltense Hieron.
Sin.: *Kaunia saltensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1980a.
Arbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5154* (LP)].

Eupatorium salvium Colla
Sin.: *Aristeguietia salvia* (Colla) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4563* (CONC)].

Eupatorium sanctopaulense B.L. Rob.
Sin.: *Chromolaena sanctopaulensis* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14898* (HBR, LP)].

Eupatorium sanctopaulense B.L. Rob. var. *subglabratum* (Hieron.) Malme = **Eupatorium kleinioides** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium satureiifolium Lam. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium saucechicoënse Hieron. = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **saucechicoënse** (Hieron.) Ariza
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium scaberrimum Walp. = **Eupatorium stachyophyllum** Spreng.

Eupatorium scandens Link = **Mikania thapsoides** DC.
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.

Eupatorium schickendantzii Hieron.
Sin.: *Fleischmannia schickendantzii* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970b.
Arbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15893* (LP)].

Eupatorium schininii Cabrera
Sin.: *Eupatorium esperanzae* Hassl. var. *schininii* (Cabrera) Cabrera

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 5604* (CTES)]; PRY[*Jörgensen, P. 4421* (LIL, LP, SI)].

Eupatorium serratum Spreng.
Sin.: *Dimorpholepis serrata* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium comptoniifolium* DC., *Eupatorium confertum* Gardner, *Eupatorium intermedium* DC. var. *agustifolium* Hieron., *Eupatorium serratum* Spreng. var. *confertum* (Gardner) Baker, *Grazielia serrata* (Spreng.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA); URY(CAS, CLA, MAL, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Birabén, M. 5294* (LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 33687* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 14322* (LIL)]; URY[*Clos, E. C. 4967* (LP)].

Eupatorium serratum Spreng. var. *alpestris* (Gardner) Baker = **Eupatorium alpestre** Gardner

Eupatorium serratum Spreng. var. *confertum* (Gardner) Baker = **Eupatorium serratum** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium serrulatum DC.
Sin.: *Eupatorium acuminatum* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 11691* (HBR, LP)]; PRY[*Montes, J. E. 11136* (CTES)].

Eupatorium simillimum B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium laeve* DC., *Eupatorium laeve* DC. var. *latifolia* Sch. Bip. ex Hieron., *Eupatorium laeve* DC. var. *macrophyllum* Chodat, *Eupatorium laeve* DC. var. *pubens* B.L. Rob., *Koanophyllon simillimum* (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 9306* (CTES)]; BRA[*Klein, R. M. 8282* (FLOR, HBR, LP)]; PRY[*Hahn, W. J. 2443* (PY)].

Eupatorium solidaginoides Kunth
Sin.: *Eupatorium filicaule* Sch. Bip. ex A. Gray, *Eupatorium stipuliferum* Rusby, *Koanophyllon solidaginoides* (Kunth) R.M. King & H. Rob., *Koanophyllon stipuliferum* (Rusby) R.M. King & H. Rob., *Ophryosporus solidaginoides* (Kunth) Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978, 1996f.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14548* (LP)]; PRY[*Charpin, A. 21655* (G)].

Eupatorium spathulatum Hook. & Arn.
Sin.: *Disynaphia albissima* (Hassl.) R.M. King & H. Rob., *Disynaphia spathulata* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium albissimum* Hassl., *Eupatorium halimifolium* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11479* (HBR, LP, US)]; PRY[*Hassler, E. 9274* (G, K, LIL)].

Eupatorium spicatum Lam. = **Baccharis spicata** (Lam.) Baill.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Giuliano, D. A., 2000.

Eupatorium squalidum DC. var. **squalidum**
Sin.: *Chromolaena squalida* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9596* (S)].

Eupatorium squalidum DC. var. **subvelutinum** (DC.) Baker
Sin.: *Eupatorium dichotomum* Sch. Bip. ex Miq., *Eupatorium subvelutinum* DC.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14450* (S)].

Eupatorium squarroso-ramosum Hieron.
Sin.: *Chromolaena squarroso-ramosa* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ivifolium* L. var. *foliosum* Chodat, *Eupatorium oyadense* Hieron., *Eupatorium oyadense* Hieron. var. *paraguayense* Hieron., *Eupatorium squarrulosum* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f; Degen, R. & Mereles, F., 1996; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4088* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2989* (LP, SI)].

Eupatorium squarrulosum Griseb., hom. illeg. = **Eupatorium squarroso-ramosum** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium squarrulosum Hook. & Arn.
Sin.: *Chromolaena ascendens* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena congesta* (Hook. &

Arn.) R.M. King & H. Rob., *Chromolaena squarrulosa* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker, *Eupatorium ascendens* Sch. Bip. ex Baker var. *parcisetosum* B.L. Rob., *Eupatorium caaguazuense* Hieron. var. *nervosum* Chodat, *Eupatorium congestum* Hook. & Arn., *Eupatorium liatridium* DC., *Eupatorium tozziifolium* DC.

Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1933b.

Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.

Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1002* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 13734* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4592* (G)].

Eupatorium stachyophyllum Spreng.

Sin.: *Chromolaena stachyophylla* (Spreng.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium claussenii* Gardner, *Eupatorium pulchrum* Gardner, *Eupatorium scaberrimum* Walp., *Eupatorium subalternifolium* DC.

Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.

Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10710* (S)].

Eupatorium steviifolium DC. var. *angustius* DC. = **Eupatorium tweedieanum** Hook. & Arn. var. **angustius** (DC.) Malme

Eupatorium steviifolium DC. var. *erigeroides* (DC.) Baker = **Eupatorium tweedieanum** Hook. & Arn. var. **tweedieanum**

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium steviifolium DC. var. *laetevirens* (Hook. & Arn.) Baker = **Eupatorium laetevirens** Hook. & Arn.

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium steviifolium DC. var. *rosmarinifolia* Baker = **Eupatorium rosmarinaceum** Cabrera & Vittet

Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.

Eupatorium steviifolium DC. var. *salicinum* Chodat = **Eupatorium laetevirens** Hook. & Arn.

Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium steviifolium DC. var. *viscosum* Chodat = **Eupatorium tweedieanum** Hook. & Arn. var. **tweedieanum**

Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium stigmatosum Chodat = **Eupatorium macrocephalum** Less.

Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium stigmatosum Chodat var. *subcalvatum* Chodat = **Eupatorium macrocephalum** Less.

Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium stigmatosum Chodat var. *violaceum* Chodat = **Eupatorium macrocephalum** Less.

Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium stipuliferum Rusby = **Eupatorium solidaginoides** Kunth

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium suaveolens Kunth = **Eupatorium inulifolium** Kunth

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium subalternifolium DC. = **Eupatorium stachyophyllum** Spreng.

Referencias: Baker, J. G., 1876b.

Eupatorium subcapitatum Malme

Sin.: *Stomatanthes subcapitatus* (Malme) H. Rob.

Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.

Subarbusto. Endémica.

Países: BRA(PAR); PRY(AMA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10734* (S)]; PRY[*Rojas, T. 3948* (LP)].

Eupatorium subglabratum (Hieron.) Cabrera & Vittet = **Eupatorium kleinioides** Kunth

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium subhastatum Hook. & Arn.

Sin.: *Eupatorium bartisiifolium* DC., *Eupatorium bartisiifolium* DC. var. *trichophorum* (DC.) Baker, *Eupatorium hexanthum* DC., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Eupatorium hirsutum* Hook. & Arn. var. *triseriale* (Griseb.) Hieron., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *hexanthum* (DC.) Malme, *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Griseb., *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *trichophorum* (DC.) Malme, *Eupatorium subhastatum* Hook. & Arn. var. *triseriale* Griseb., *Eupatorium trichophorus* DC.

Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1963; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.

Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24299* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 4872* (HBR, LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4489* (G)]; URY[*Gibert, J. E. 197* (LP)].

Eupatorium subhastatum Hook. & Arn. var. *hexanthum* (DC.) Malme = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium subhastatum Hook. & Arn. var. *hirsutum* (Hook. & Arn.) Griseb. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium subhastatum Hook. & Arn. var. *trichophorum* (DC.) Malme = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.

Eupatorium subhastatum Hook. & Arn. var. *triseriale* Griseb. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium subintegerrimum Malme var. **aliciae** Cabrera
Sin.: *Malmeanthus catharinensis* R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Árbol. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2198* (LP, US)].

Eupatorium subintegerrimum Malme var. **subintegerrimum**
Sin.: *Malmeanthus subintegerrimus* (Malme) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996f.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, ITA); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1249* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 1986c* (HBR, LP)]; PRY[*Montes, J. E. 3234* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 10138* (LP)].

Eupatorium subvelutinum DC. = **Eupatorium squalidum** DC. var. **subvelutinum** (DC.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b.

Eupatorium sulcatum Hook. & Arn. = **Mikania sulcata** (Hook. & Arn.) B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Eupatorium tacaquirense (Hieron.) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium dejetum* B.L. Rob., *Helogyne tacaquirensis* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Nativa. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18520* (LP)].

Eupatorium tacuarembense Hieron. & Arechav.
Sin.: *Disynaphia tacuarembensis* (Hieron. & Arechav.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Arechavaleta, J., 1904.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: URY(TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Hieronymus, G. H. E. W. s.n.* (MVM)].

Eupatorium tanacetifolium Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Eupatorium erodiifolium* DC., *Eupatorium erodiifolium* DC. var. *obtusilobum* Hieron., *Gyptis pinnatifida* Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1963; Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SDE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA, PAI); URY(CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4754* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4320* (HBR, LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12701* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 4470* (LP)].

Eupatorium tenue R.E. Fr.
Sin.: *Ageratina tenuis* (R.E. Fr.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970a.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22625* (LP)].

Eupatorium tenuiflorum (Griseb.) Hieron. = **Eupatorium arnottii** Baker
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium thapsoides DC. ex Niederl. = **Mikania thapsoides** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Eupatorium toldense Hieron.
Sin.: *Chromolaena toldensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11497b* (LP)].

Eupatorium tozziifolium DC. = **Eupatorium squarrulosum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium tozziifolium DC. var. *subpetiolatum* Chodat = **Eupatorium hirsutum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium tremulum Hook. & Arn.
Sin.: *Eupatorium crenulatum* (Spreng.) Hieron., hom. illeg. var. *xylophylloides* (DC.) Hicken, *Eupatorium dendroides* Spreng. var. *xylophylloides* (DC.) Baker, *Eupatorium xylophylloides* DC., *Raulinoreitzia tremula* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a; King, R. M. & Robinson, H. E., 1971b; Malme, G. O. A., 1933b; Marchesi, E., com. pers.

Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MAL, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8299* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14785* (HBR, LP)]; URY[*Berro, M. B. 3811* (MVFA)].

Eupatorium tremulum Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium trichobasis Baker
Sin.: *Eupatorium candolleanum* Hook. & Arn. var. *curitybanum* Dusén ex Malme, *Gyptidium trichobasis* (Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4692a* (HBR, LP)].

Eupatorium trichophorus DC. = **Eupatorium subhastatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium tubaraoense Hieron.
Sin.: *Campuloclinium tubaraoense* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Trichogonia scabra* Klatt
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5986* (FLOR, LP)].

Eupatorium tucumanense Lillo & B.L. Rob.
Sin.: *Ayapanopsis tucumanensis* (Lillo & B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1972d.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20788* (LP)].

Eupatorium tunariense (Hieron.) B.L. Rob.
Sin.: *Chromolaena tunariensis* (Hieron.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium conyzoides* Vahl var. *tunariense* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c.
Subarbusto. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5191* (LP)].

Eupatorium tweedieanum Hook. & Arn. var. **angustius** (DC.) Malme
Sin.: *Eupatorium steviifolium* DC. var. *angustius* DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1931.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 1186* (S)].

Eupatorium tweedieanum Hook. & Arn. var. **tweedieanum**
Sin.: *Austroeupatorium tweedieanum* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium erigeroides* DC., *Eupatorium steviifolium* DC. var. *erigeroides* (DC.) Baker, *Eupatorium steviifolium* DC. var. *viscosum* Chodat, *Hatschbachiella tweedieana* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1974a, 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970d, 1972c; Malme, G. O. A., 1931, 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8266* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 4877* (HBR, LP)]; PRY[*Woolston, A. L. 815* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 3971* (LP)].

Eupatorium ulei Hieron.
Sin.: *Chromolaena ulei* (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6591* (LP)].

Eupatorium umbelliforme Dusén
Sin.: *Chromolaena umbelliformis* (Dusén) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17828* (S)].

Eupatorium urticifolium auct. non L. = **Eupatorium catarium** Veldkamp
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Veldkamp, J., 1999.

Eupatorium urticifolium L. f. var. *clematideum* (Griseb.) Hieron. = **Eupatorium catarium** Veldkamp
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Veldkamp, J., 1999.

Eupatorium urticifolium L. f. var. *nanum* Hieron. = **Eupatorium catarium** Veldkamp
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; Veldkamp, J., 1999.

Eupatorium variegatum Malme
Sin.: *Eupatorium kleinioides* Kunth var. *latifolium* Chodat, *Ooclinium grandiflorum* DC., *Praxelis grandiflora* (DC.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Malme, G. O. A., 1933b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 809* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 5844* (G)].

Eupatorium variolatum B.L. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 18027* (S)].

Eupatorium vattuonei Hicken = **Eupatorium patens** D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium vauthierianum DC. var. **campestre** Dusén ex Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2916* (HBR, LP)].

Eupatorium vauthierianum DC. var. **ramosissimum** (Gardner) Baker
Sin.: *Bulbostylis ramosissima* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 8946* (HBR, LP)].

Eupatorium vauthierianum DC. var. **trichotomum** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. s.n.* (CTES)].

Eupatorium verbenaceum DC.
Sin.: *Chromolaena verbenacea* (DC.) R.M. King & H. Rob., *Eupatorium rhodolepis* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; King, R. M. & Robinson, H. E., 1970c; Malme, G. O. A., 1933b; Marchesi, E., com. pers.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 8353* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 12211* (HBR, LP, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4650* (G)]; URY[*Del Puerto, O. 1827* (MVFA)].

Eupatorium vernoniopsis Sch. Bip. ex Baker = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium vernoniopsis Sch. Bip. ex Baker var. *brevipetiolata* Sch. Bip. = **Eupatorium hieronymi** S.E. Freire

Eupatorium virgatum D. Don ex Hook. & Arn. = **Eupatorium buniifolium** Hook. & Arn. var. **buniifolium**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium viscidum Hook. & Arn.
Sin.: *Eupatorium viscidum* Hook. & Arn. var. *protractum* Griseb., *Lorentzianthus viscidus* (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; King, R. M. & Robinson, H. E., 1975a.
Arbusto. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14345* (LP)].

Eupatorium viscidum Hook. & Arn. var. *protractum* Griseb. = **Eupatorium viscidum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium vitalbae DC.
Sin.: *Eupatorium vitalbae* DC. var. *serratifolium* Chodat, *Heterocondylus vitalbae* (DC.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAU, CAN, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 1155* (CTES)]; BRA[*Beetle, A. A. 2046* (LP)]; PRY[*Jiménez, B. 1378* (BM, CTES, MO, PY)].

Eupatorium vitalbae DC. var. *serratifolium* Chodat = **Eupatorium vitalbae** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Eupatorium xerolepis Sch. Bip. ex Baker = **Eupatorium patens** D. Don ex Hook. & Arn. var. **patens**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium xylophylloides DC. = **Eupatorium tremulum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Eupatorium xylorhizum Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Chromolaena xylorhyza* (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Nativa. 1000–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11378* (HBR, LP, US)].

Euthrixia affinis D. Don = **Chaetanthera linearis** Poepp. ex Less. var. **linearis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Euthrixia salsoloides D. Don = **Chaetanthera microphylla** (Cass.) Hook. & Arn. var. **microphylla**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Evax spathulata Pers. = **Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a., 1974a.

Facelis Cass.

Número de especies: 3

Facelis apiculata Cass. = **Facelis retusa** (Lam.) Sch. Bip. subsp. **retusa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.

Facelis capillaris Rusby = **Facelis lasiocarpa** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Facelis lasiocarpa (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Facelis capillaris* Rusby, *Facelis schultziana* Beauverd, *Filago lasiocarpa* Griseb., *Lucilia erecta* Benoist
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15365* (LP)].

Facelis plumosa (Wedd.) Sch. Bip.
Sin.: *Facelis weddelliana* Beauverd, *Lucilia plumosa* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4155* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 195* (CONC)].

[Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip. var. andicola (Nees) Beauverd]
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

[Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip. var. chilensis (Fisch. & C.A. Mey.) Baker ex Beauverd]
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip. subsp. **patula** Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5348* (LP)].

Facelis retusa (Lam.) Sch. Bip. subsp. **retusa**
Sin.: *Facelis apiculata* Cass., *Gnaphalium retusum* Lam., *Helichrysum retusum* Spreng., *Leptalea apiculata* Hook. & Arn.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Freire, S. E., 1995, 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME); PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8567* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 963* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3177* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3842* (LP)].

Facelis schultziana Beauverd = **Facelis lasiocarpa** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Facelis weddelliana Beauverd = **Facelis plumosa** (Wedd.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Fichtea poeppigii Sch. Bip. = **Microseris pygmaea** D. Don

Filago dasycarpa Griseb. = **Micropsis dasycarpa** (Griseb.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Freire, S. E., 1998.

Filago gallica L. = **Logfia gallica** (L.) Coss. & Germ.

Filago lasiocarpa Griseb. = **Facelis lasiocarpa** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Flaveria Juss.

Número de especies: 2, 1 endémica

Flaveria bidentis (L.) B.L. Rob., comb. superfl. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Flaveria bidentis (L.) Kuntze
Sin.: *Ethulia bidentis* L., *Eupatorium chilense* Molina, *Flaveria bidentis* (L.) B.L. Rob., comb. superfl., *Flaveria bonariensis* DC., *Flaveria capitata* Juss., *Flaveria chilensis* Juss., *Flaveria contrayerba* (Cav.) Pers., *Milleria chiloensis* Juss., *Milleria contrayerba* Cav., *Vermifuga corymbosa* Ruiz & Pav.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Powell, A. M., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, RME); PRY(APY, CON, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigo Trigo, A. P. 2990* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 38* (LP)]; PRY[*Hahn, W. J. 1440* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2920* (LP)].

Flaveria bidentis (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze = **Flaveria haumanii** Dimitri & Orfila
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Flaveria bonariensis DC. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Powell, A. M., 1978.

Flaveria capitata Juss. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Powell, A. M., 1978.

Flaveria chilensis Juss. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Powell, A. M., 1978.

Flaveria contrayerba (Cav.) Pers. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Powell, A. M., 1978.

Flaveria haumanii Dimitri & Orfila
Sin.: *Flaveria bidentis* (L.) Kuntze var. *angustifolia* Kuntze
Referencias: Dimitri, M. J. & Orfila, E. N., 1985, 1986; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 3406* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 4098* (LP)].

Fleischmannia dissolvens (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium dissolvens** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Fleischmannia laxicephala (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium laxicephalum** Cabrera

Fleischmannia prasiifolia (Griseb.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium argentinum** Ariza
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Fleischmannia schickendantzii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium schickendantzii** Hieron.

Flotovia armata (J. Kost.) Tovar = **Dasyphyllum armatum** (J. Kost.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia brasiliensis (Spreng.) Cabrera ex Tovar = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia diacanthoides Less. = **Dasyphyllum diacanthoides** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia divaricata (Griseb.) Hieron. = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **divaricatum** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia excelsa (D. Don) DC. = **Dasyphyllum excelsum** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia flagellaris Casar. = **Dasyphyllum flagellare** (Casar.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia floribunda Gardner = **Dasyphyllum floribundum** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia glabra Spreng. = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia latifolia Gardner = **Dasyphyllum latifolium** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia paniculata (D. Don) DC. = **Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.) Cabrera var. **tomentosum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia regnellii Sch. Bip., nom. nud. = **Dasyphyllum flagellare** (Casar.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia spinescens Less. = **Dasyphyllum spinescens** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia stiffioides Speg. = **Dasyphyllum diacanthoides** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia synacantha Sch. Bip., nom. nud. = **Dasyphyllum synacanthum** (Baker) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia tomentosa Spreng. = **Dasyphyllum tomentosum** (Spreng.) Cabrera var. **tomentosum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia vagans Gardner = **Dasyphyllum vagans** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Flotovia varians Gardner = **Dasyphyllum varians** (Gardner) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Flourensia DC.

Número de especies: 13, 12 endémicas

Flourensia atacamensis (Phil.) Reiche = **Viguiera pazensis** Rusby
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Flourensia besseriana Hook. & Arn. = **Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Flourensia blakeana M.O. Dillon
Referencias: Dillon, M. O., 1984.

Arbusto. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20763* (LP)].

Flourensia campestris Griseb.
Sin.: *Helianthus campestris* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 200–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cantino, P. D. 588* (CORD)].

Flourensia corymbosa DC. = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Flourensia corymbosa DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Flourensia corymbosa DC. var. *lanceolata* (Meyen) Reiche = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Flourensia fiebrigii S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11244* (CORD, MCNS)].

Flourensia grindelioides S. Moore = **Flourensia oolepis** S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Flourensia hirta S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 1500–2700 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 692* (CORD, SI)].

Flourensia hirtissima S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Dillon, M. O., 1984.
Subarbusto. Endémica. 200–400 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cano, E. 5003* (LP, SI)].

Flourensia hispida Phil. = **Viguiera gilliesii** (Hook. & Arn.) Hieron.
Referencias: Blake, S. F., 1918; Sáenz, A. A., 1979.

Flourensia leptopoda S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9472* (SI)].

Flourensia macroligulata Seeligm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Dillon, M. O., 1984; Seeligmann, P., 1960.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 2663* (LIL)].

Flourensia niederleinii S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 3553* (CORD, IZAC)].

Flourensia oolepis S.F. Blake
Sin.: *Flourensia grindelioides* S. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cantino, P. D. 670* (CORD)].

Flourensia riparia Griseb.
Sin.: *Helianthus riparia* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11223* (CORD, MCNS)].

Flourensia suffrutescens (R.E. Fr.) S.F. Blake
Sin.: *Encelia suffrutescens* R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Dillon, M. O., 1984.
Subarbusto. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 252* (SI)].

Flourensia thurifera (Molina) DC.
Sin.: *Diomedea thurifera* (Molina) Bertero ex Colla, *Flourensia besseriana* Hook. & Arn., *Flourensia thurifera* (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy, *Helianthus besserianus* (Meyen & Walp.) Benth. & Hook., *Helianthus glutinosus* Hook. & Arn., *Helianthus thurifera* Molina
Referencias: Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 400–1000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12516* (LP)].

Flourensia thurifera (Molina) DC. var. *lanceolata* J. Remy = **Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Flourensia tortuosa Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Dillon, M. O., 1984.
Arbusto. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cerana, M. M. 962* (CORD)].

Fornicaria scandens (L.) Raf. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Franseria bipinnatifida Nutt. var. *insularis* Reiche = **Ambrosia chamissonis** (Less.) Greene
Referencias: Payne, N. W., 1964.

Franseria chamissonis Less. = **Ambrosia chamissonis** (Less.) Greene

Franseria conwayi Rusby = **Ambrosia arborescens** Mill.

Franseria fruticosa Phil. = **Ambrosia artemisioides** Meyen & Walp. ex Meyen

Gaillardia Foug.

Número de especies: 4, 2 endémicas, 1 introducida

Gaillardia aristata Pursh
Sin.: *Gaillardia aristata* Pursh var. *foliosa* Lunell, *Gaillardia bracteosa* Standl., *Gaillardia hallii* Rydb., *Gaillardia perennis* Loisel., *Gaillardia richardsonii* Hort, *Gaillardia roezlii* Regel, *Gaillardia rustica* Cass., *Polatherus scaber* Raf., *Virgilia grandiflora* Nutt.
Referencias: Biddulph, S. F., 1944; Cabrera, A. L., 1963a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(SCA); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1341* (LP)]; BRA [*Bresolin, A. 587* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3183* (LP)].

Gaillardia aristata Pursh var. *foliosa* Lunell = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia bracteosa Standl. = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia cabrerae Covas
Referencias: Covas, G., 1969b; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19438* (LP)].

Gaillardia doniana (Hook. & Arn.) Griseb. = **Helenium donianum** (Hook. & Arn.) Seckt
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993a; Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Gaillardia doniana (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **megapotamica**
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia glauca (Cav.) Baill. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Gaillardia hallii Rydb. = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var. **megapotamica**
Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. var. *latifolia* Kuntze, *Cercostylos brasiliensis* (Less.) Less., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb., *Guntheria megapotamica* Spreng., *Polypteris brasiliensis* Less.
Referencias: Biddulph, S. F., 1944; Bierner, M. W., 1987; Cabrera, A. L., 1974a; Malme, G. O. A., 1931; Marchesi, E., com. pers.; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SFE, SLU); BRA(RGS); URY(RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10229* (SI, WS)]; BRA[*Sellow, F. s.n.* (B)]; URY[*Berro, M. B. 3053* (MVFA)].

Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var. **radiata** (Griseb.) Baker
Sin.: *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f. var. *radiata* Griseb.
Referencias: Biddulph, S. F., 1944; Cabrera, A. L., 1974a; Marchesi, E., com. pers.; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 2140* (LP)]; URY[*Felippone, F. 3240* (SI)].

Gaillardia megapotamica (Spreng.) Baker var. **scabiosoides** (Arn. ex DC.) Baker
Sin.: *Cercostylos scabiosoides* Arn. ex DC., *Gaillardia scabiosoides* (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Biddulph, S. F., 1944; Cabrera, A. L., 1974a; Marchesi, E., com. pers.; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 14646* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 82871* (SI)].

Gaillardia perennis Loisel. = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia richardsonii Hort = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia roezlii Regel = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia rustica Cass. = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Gaillardia scabiosoides (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **scabiosoides** (Arn. ex DC.) Baker
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Gaillardia scabiosoides (Arn. ex DC.) Benth. & Hook. f. var. *radiata* Griseb. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **radiata** (Griseb.) Baker
Referencias: Biddulph, S. F., 1944; Cabrera, A. L., 1974a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Gaillardia tontalensis Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1938a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 11114* (LP)].

Galinsoga Ruiz & Pav.

Número de especies: 6, 1 endémicas

Galinsoga aristulata Bricknell = **Galinsoga quadriradiata** Ruiz & Pav.

Galinsoga calva Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19871* (LP)].

Galinsoga caracasana (DC.) Sch. Bip.
Sin.: *Vargasia caracasana* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8156* (SI)].

Galinsoga ciliata (Raf.) S.F. Blake = **Galinsoga quadriradiata** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Galinsoga mandonii Sch. Bip.
Sin.: *Galinsoga unxioides* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 6137* (CORD)].

Galinsoga oblongifolia (Hook.) DC. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Galinsoga parviflora Cav.
Sin.: *Adventina parviflora* Raf., *Galinsoga quinqueradiata* Ruiz & Pav., *Wiborgia acmella* Roth, *Wiborgia parviflora* (Cav.) Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1978; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(CEN, GUA), URY (CAS, CLA, COL, LAV, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29229* (SI), *Zuloaga, F. O. 721* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1606* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 439* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 13594* (FCQ, MO)]; URY [*Berro, M. B. 3601* (MVFA)].

Galinsoga parviflora Cav. var. *hispida* DC. = **Galinsoga quadriradiata** Ruiz & Pav.

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.
Sin.: *Adventina ciliata* Raf., *Galinsoga aristulata* Bricknell, *Galinsoga ciliata* (Raf.) S.F. Blake, *Galinsoga parviflora* Cav. var. *hispida* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Anual. Nativa. 900–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14283* (LP)]; BRA[*Mondin, C. A. 2998* (HASU)].

Galinsoga quinqueradiata Ruiz & Pav. = **Galinsoga parviflora** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Galinsoga resinosa Hook. & Arn. = **Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Galinsoga unxioides Griseb. = **Galinsoga mandonii** Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Galinsoga urticifolia (Kunth) Benth.
Sin.: *Stemmatella urticifolia* (Kunth) O. Hoffm., *Wiborgia urticaefolia* Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 2984* (LP, SI)].

Gamochaeta Wedd.

Número de especies: 42, 30 endémicas

Gamochaeta affinis (d'Urv.) Cabrera = **Gamochaeta malvinensis** (H. Koyama) T.R. Dudley
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaeta aliena (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium alienum* Hook. & Arn., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3298* (LP)].

Gamochaeta ambatesis Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1989b; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 19113* (CORD)].

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.
Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *alpina* Wedd., *Gamochaeta guatemalensis* (Gand.) Cabrera, *Gnaphalium americanum* Mill., *Gnaphalium consanguineum* Gaudich., *Gnaphalium guatemalense* Gand., *Gnaphalium purpureum* L. var. *americaum* (Mill.) Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995, 1998; Nesom, G. L., 1990a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VI, VIII, X, XI, XII); PRY(APA, CEN, COA); URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boffa, P. 3111* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 7682* (LP)]; CHL[*Barros, E. 192* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 653* (G)]; URY[*Lombardo, A. 2101* (LP)].

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. var. *alpina* Wedd. = **Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. var. *linearifolia* Wedd. = **Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1978.

Gamochaeta andina (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium andinum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–2700 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck, L. s.n.* (LP)].

Gamochaeta antarctica (Hook. f.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium antarcticum* Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hooker, J. D. s.n.* (K)].

Gamochaeta argentina Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, MEN, SFE, SLU); URY(LAV, MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2908* (LP)]; URY[*Lombardo, A. 2107* (LP)].

Gamochaeta axillaris (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium axillare* J. Remy, *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *axillare* (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mahu, M. 9899* (LP)].

Gamochaeta berteriana (DC.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium bellidifolium* Phil., *Gnaphalium berterianum* DC., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *berterianum* (DC.) Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2278* (LP)].

Gamochaeta calviceps (Fernald) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium calviceps* Fernald
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a, 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995, 1998; Kiesling, R., 2003.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–2900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SFE, SJU, SLU); BRA(SCA); PRY(APY, CEN, COA, PAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3990* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 1218-c* (LP)]; PRY[*Lurvey 194* (MO)]; URY[*Rosa- Mato, F. 1440* (LP)].

Gamochaeta camaquaensis Deble
Referencias: Deble, L. P., Marchiori, J. N. C. & Oliveira, A. S., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 6354* (SI)].

Gamochaeta capitata Wedd. = **Stuckertiella capitata** (Wedd.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Gamochaeta chamissonis (DC.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta fernandeziana* (Phil.) Anderb., *Gamochaeta julietii* (Phil.) Anderb., *Gamochaeta serranoi* (Phil.) Cabrera, *Gnaphalium agreste* Phil., *Gnaphalium chamissonis* DC., *Gnaphalium fernandezianum* Phil., *Gnaphalium julietii* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *chamissonis* (DC.) Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var. *julietii* (Phil.) Reiche, *Gnaphalium serranoi* Phil.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VIII, IX, X, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 1314* (LP)]; CHL[*Barros, E. 32* (LP)].

Gamochaeta chilensis Deble
Sin.: *Gamochaeta foliosa* (Phil.) Anderb., nom. illeg., *Gnaphalium foliosum* Phil., hom. illeg.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Deble, L. P., 2006; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck, L. s.n.* (LP)].

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen
Sin.: *Gamochaeta spicata* (Lam.) Cabrera, *Gnaphalium coarctatum* Willd., *Gnaphalium purpureum* L. var. *spicatum* (Lam.) Baker, *Gnaphalium spicatum* Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a, 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VIII); PRY(APA, CAA, CEN, COA, ITA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 81* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 30693* (LP)]; CHL[*Junge, C. 1227* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 224* (G)]; URY[*Cabrera, A. L. 3894* (G)].

Gamochaeta depilata (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium depilatum* Phil., *Gnaphalium obscurum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6202* (LP)]; CHL[*Barros, E. 13* (LP)].

Gamochaeta deserticola Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 290/11* (LP)]; CHL[*Levi, U. 240* (LP)].

Gamochaeta diffusa Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P., Marchiori, J. N. C. & Oliveira, A. S., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 6348* (SI)].

Gamochaeta erecta Deble
Referencias: Deble, L. P., Marchiori, J. N. C. & Oliveira, A. S., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 6350* (SI)].

Gamochaeta erythractis (Wedd.) Cabrera = **Belloa erythractis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Gamochaeta falcata (Lam.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta stagnalis* (I.M. Johnst.) Anderb., *Gnaphalium falcatum* Lam., *Gnaphalium heteroides* Klatt, *Gnaphalium purpureum* L. var. *falcatum* (Lam.) Torr. & Gray, *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *falcatum* (Lam.) Klatt, *Gnaphalium stagnale* I.M. Johnst.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995, 1998; Nesom, G. L., 1990a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, SAL, SFE); BRA(SCA); PRY(CAN, PAI); URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6625* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 40387* (LP)]; PRY[*Morong, T. 602* (MO)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1236* (LP)].

Gamochaeta fernandeziana (Phil.) Anderb. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaeta filaginea (DC.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium filagineum* DC.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995; Kiesling, R., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); URY(FLA, FLO, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 22335* (LP)]; BRA[*Capanema s.n.* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 76291* (LP)].

Gamochaeta foliosa (Phil.) Anderb., nom. illeg. = **Gamochaeta chilensis** Deble
Referencias: Deble, L. P., 2006.

Gamochaeta girardiana Deble & A.S. Oliveira
Referencias: Deble, L. P., Marchiori, J. N. C. & Oliveira, A. S., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 6356* (SI)].

Gamochaeta guatemalensis (Gand.) Cabrera = **Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gamochaeta humilis Wedd.
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Novas s.n.* (LP)].

Gamochaeta julietii (Phil.) Anderb. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaeta longipedicellata Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. s.n.* (LP)].

Gamochaeta malvinensis (H. Koyama) T.R. Dudley
Sin.: *Gamochaeta affinis* (d'Urv.) Cabrera, *Gnaphalium affine* d'Urv., hom. illeg., *Gnaphalium malvinense* H. Koyama
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Dudley, T. R., 1981; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Koyama, T. M., 1978a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 547* (LP)].

Gamochaeta monticola (Phil. ex Reiche) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium monticola* Phil. ex Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11059* (LP)]; CHL[*Barros, E. 7370* (LP)].

Gamochaeta munnozii Cabrera, nom. superfl.
= **Gamochaeta serpyllifolia** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gamochaeta neuquensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5875* (LP)]; CHL[*Dollenz, O. 1424* (CONC)].

Gamochaeta nigrevestis Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P., Marchiori, J. N. C. & Oliveira, A. S., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 6352* (SI)].

Gamochaeta nivalis Cabrera
Sin.: *Gamochaeta spiciformis* (Sch. Bip.) Cabrera var. *subaffinis* Cabrera, *Gnaphalium affine* d'Urv. f. *pusillum* Speg., *Gnaphalium nivale* Phil., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, TDF); CHL(VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19167* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3299* (LP)].

Gamochaeta oligantha (Phil.) L.E. Navas
Sin.: *Gnaphalium oliganthum* Phil.
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium pensylvanicum* Willd., *Gnaphalium peregrinum* Fernald, *Gnaphalium purpureum* L. var. *spathulatum* (Lam.) Baker, *Gnaphalium spathulatum* Lam., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SFE, SJU, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, COL, FLO, MON, PAY, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2218* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 1219-c* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 14881* (MO)]; URY[*Cabrera, A. L. 4623* (LP)].

Gamochaeta peteroana (Phil.) Anderb. = **Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaeta platensis (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium platense* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, LAV, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6582* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 1577* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1393* (LP)].

Gamochaeta polybotrya (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium polybotryum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*sin colector s.n.* (LPS)]; CHL[*sin colector s.n.* (LP)].

Gamochaeta procumbens (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium procumbens* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3648* (LP)].

Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium purpureum* L.
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(CAU, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9616* (G)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 229p.p.* (LP)].
Notas: Citada para Brasil sin mencionar localidad o ejemplar de referencia (Freire & Iharlegui, 1997).

Gamochaeta serpyllifolia Wedd.
Sin.: *Gamochaeta munnozii* Cabrera, nom. superfl., *Gnaphalium serpyllifolium* J. Remy, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995; Pruski, J. F., 2005b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4185* (LP)]; CHL[*Barros, E. 7310* (LP)].

Gamochaeta serranoi (Phil.) Cabrera = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gamochaeta simplicicaulis (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium purpureum* L. var. *simplicicaule* (Willd. ex Spreng.) Klatt, *Gnaphalium simplicicaule* Willd. ex Spreng.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, VIII, X); PRY(APA, AMA); URY(CAS, CLA, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4949* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 20930* (LP)]; CHL[*Barros, E. 72* (LP)]; PRY[*Bertoni, M. S. 978* (G)]; URY[*Herter, W. G. F. 89039* (LP)].

Gamochaeta sphacelata (Kunth) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta americana* (Mill.) Wedd. var. *linearifolia* Wedd., *Gnaphalium pedunculosum* I.M. Johnst., *Gnaphalium purpureum* L. var. *sphacelatum* (Kunth) Speg., *Gnaphalium sphacelatum* Kunth, *Gnaphalium sphacelatum* Kunth var. *legitimum* DC., nom. inval., *Gnaphalium stachydifolium* Lam. var. *sphacelatum* (Kunth) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1978; Freire, S. E., 1995; Nesom, G. L., 1990a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16943* (LP)].

Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera = **Gamochaeta coarctata** (Willd.) Kerguélen
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaeta spiciformis (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Gamochaeta peteroana* (Phil.) Anderb., *Gnaphalium affine* d'Urv. f. *medium* Speg., *Gnaphalium mucronatum* Phil., *Gnaphalium peteroanum* Phil., *Gnaphalium purpureum* L. var. *mucronatum* (Phil.) Skottsb., *Gnaphalium spiciforme* Sch. Bip.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1961, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 587* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6079* (LP)].

Gamochaeta spiciformis (Sch. Bip.) Cabrera var. *subaffinis* Cabrera = **Gamochaeta nivalis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gamochaeta stachydifolia (Lam.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium purpureum* L. var. *stachydifolium* (Lam.) Baker, *Gnaphalium stachydifolium* Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Marticorena, C., com. pers.; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, SCR, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V, IJF); URY(CAS, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4706* (LP)]; BRA[*Pedersen, T. M. 6665* (LP)]; CHL[*Luebert B., F. 1898* (SGO)]; URY[*Pedersen, T. M. 3640* (LP)].

Gamochaeta stagnalis (I.M. Johnst.) Anderb. = **Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium subfalcatum* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1974a, 1978; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997; Freire, S. E., 1995; Kiesling, R., 2003; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); PRY(COA); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6525* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 27147* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 1213* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1237* (LP)].

Gamochaeta suffruticosa (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium suffruticosum* Phil.
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Subarbusto. Endémica. 200–400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck, L. s.n.* (LP, SGO)].

Gamochaeta valparadisea (Phil.) Anderb.
Sin.: *Gnaphalium valparadiseum* Phil.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Gamochaeta villaroelii (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gnaphalium villaroelii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica.

Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villaroel s.n.* (LP, SGO)].

Gamochaeta weddelliana (Rusby) Anderb.
= **Stuckertiella capitata** (Wedd.) Beauverd
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gamochaetopsis Anderb. & S.E. Freire

Número de especies: 1 endémica

Gamochaetopsis alpina (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Laennecia alpina* Poepp. & Endl., *Lucilia alpina* (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1986b, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6157* (LP)]; CHL[*Montero, O. 8717* (LP)].

Gazania Gaertn.

Número de especies: 1 introducida

Gazania rigens (L.) Gaertn.
Sin.: *Gorteria rigens* L.
Referencias: Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 8535* (LP)].

Georgina superflua DC. = **Dahlia pinnata** Cav.

Georgina variabilis Willd. = **Dahlia pinnata** Cav.

Gerbera bracteata (Cass.) Sch. Bip. = **Chaptalia piloselloides** (Vahl) Baker
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Gerbera brevipes Sch. Bip. = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **exscapa**
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Gerbera chilensis (DC.) Sch. Bip. = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **chilensis** (DC.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Gerbera cineraria (D. Don) Kuntze = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera incana (Lam.) Kuntze = **Trichocline incana** (Lam.) Cass.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera incana (Lam.) Kuntze f. *aurantiaca* Kuntze
= **Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera incana (Lam.) Kuntze f. *pallida* Kuntze
= **Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera incana (Lam.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze
= **Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera incana (Lam.) Kuntze var. *reptans* (Wedd.) Kuntze = **Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera nutans (L.) Sch. Bip. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Gerbera plicata (Hook. & Arn.) Kuntze = **Trichocline plicata** Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gerbera pulvinata Kuntze = **Trichocline dealbata** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Gnaphalium L.

Número de especies: 37, 25 endémicas

Gnaphalium acutifolium Phil. = **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a.

Gnaphalium affine d'Urv., hom. illeg. = **Gamochaeta malvinensis** (H. Koyama) T.R. Dudley
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium affine d'Urv. f. *medium* Speg.
= **Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium affine d'Urv. f. *pusillum* Speg.
= **Gamochaeta nivalis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium affine d'Urv. var. *parvulum* Speg.
= **Antennaria chilensis** J. Remy var. **magellanica** (Sch. Bip.) Reiche
Referencias: Bayer, R. J. & Stebbins, G. L., 1982; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.

Gnaphalium agreste Phil. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gnaphalium alatum Kunth = **Achyrocline alata** (Kunth) DC.
Referencias: Giangualani, R. A., 1976.

Gnaphalium aldunateoides J. Remy
Sin.: *Gnaphalium insulare* Klatt, *Gnaphalium rivulare* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Anual. Endémica. 500–3700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, IX, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11410* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2258* (LP)].

Gnaphalium alienum Hook. & Arn. = **Gamochaeta aliena** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium americanum Mill. = **Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium americanum Mill. var. *discolor* Griseb. = **Luciliocline lopezmirandae** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Gnaphalium andicola Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14819* (SI)]; CHL[*Barros, E. 9* (LP)].

Gnaphalium andicola Kuntze, hom. illeg. = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Gnaphalium andinum Phil. = **Gamochaeta andina** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium antarcticum Hook. f. = **Gamochaeta antarctica** (Hook. f.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium araucanum Phil. = **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a, 1963a, 1978.

Gnaphalium argyrolepis Phil. = **Gnaphalium lacteum** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Gnaphalium axillare J. Remy = **Gamochaeta axillaris** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium badium Wedd.
Sin.: *Pseudognaphalium badium* (Wedd.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19773* (LP)].

Gnaphalium bellidifolium Phil. = **Gamochaeta berteriana** (DC.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium berterianum DC. = **Gamochaeta berteriana** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium bracteatum Willd. = **Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.

Gnaphalium burkartii Cabrera = **Luciliocline burkartii** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Gnaphalium cabrerae S.E. Freire
Sin.: *Gnaphalium fastigiatum* Phil., hom. illeg., *Gnaphalium philippii* Cabrera, hom. illeg., *Pseudognaphalium cabrerae* (S.E. Freire) Deble
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a, 1963a; Deble, L. P., 2006; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, MEN, RNE, SFE, SLU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5189* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Gnaphalium calviceps Fernald = **Gamochaeta calviceps** (Fernald) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium calycinum Poir. = **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1978.

Gnaphalium canum Phil., hom. illeg. = **Gnaphalium moelleri** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium capitatum (Wedd.) Griseb., hom. illeg. = **Stuckertiella capitata** (Wedd.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Gnaphalium chamissonis DC. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium cheiranthifolium Bertero, hom. illeg. = **Gnaphalium cymathoides** Kunze ex DC.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium cheiranthifolium Lam.
Sin.: *Gnaphalium acutifolium* Phil., *Gnaphalium araucanum* Phil., *Gnaphalium citrinum* Hook. & Arn., *Gnaphalium paniculatum* Colla, *Gnaphalium valdivianum* Phil., *Pseudognaphalium cheiranthifolium* (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1941a, 1963a, 1974a, 1978; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SFE, SLU); BRA(PAR, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 43* (LP)]; BRA[*Pereira, E. 5406* (LP)]; CHL[*Barros, E. 12* (LP)]; URY[*Bartlett, H. H. 21401* (LP)].

Gnaphalium chilense Spreng. = **Gnaphalium montevidense** Spreng.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium citrinum Hook. & Arn. = **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a, 1963a, 1978.

Gnaphalium coarctatum Willd. = **Gamochaeta coarctata** (Willd.) Kerguélen
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium commersonii Spreng. = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Gnaphalium consanguineum Gaudich. = **Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium coquimbense Phil.
Sin.: *Pseudognaphalium coquimbense* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–3100 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2301* (LP)].

Gnaphalium cymathoides Kunze ex DC.
Sin.: *Gnaphalium cheiranthifolium* Bertero, hom. illeg., *Gnaphalium cymathoides* Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp., *Gnaphalium indicum* L., *Gnaphalium ulophyllum* Hook. & Arn., *Pseudognaphalium cymatoides* (Kunze ex DC.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Anual. Endémica. 0–4000 m.
Países: CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Gnaphalium cymathoides Kunze ex DC. var. *glabrum* Walp. = **Gnaphalium cymathoides** Kunze ex DC.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium depilatum Phil. = **Gamochaeta depilata** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium diminutivum Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 500–3000 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teillier A., S. 5316* (CONC)].

Gnaphalium erythractis (Wedd.) Griseb. = **Belloa erythractis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Gnaphalium evacoides Klatt = **Belloa piptolepis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Dillon, M. O., 2003; Freire, S. E., 1995.

Gnaphalium falcatum Lam. = **Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium fastigiatum Phil., hom. illeg. = **Gnaphalium cabrerae** S.E. Freire

Gnaphalium fernandezianum Phil. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gnaphalium filagineum DC. = **Gamochaeta filaginea** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1963a, 1978.

Gnaphalium flaccidum Weinm. = **Achyrocline flaccida** (Weinm.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1998; Giangualani, R. A., 1976.

Gnaphalium foliosum Phil., hom. illeg. = **Gamochaeta chilensis** Deble
Referencias: Anderberg, A. A., 1991.

Gnaphalium frigidum Poepp., nom. inval. = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium frigidum Wedd.
Sin.: *Pseudognaphalium frigidum* (Wedd.) Anderb.

Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C., Matthei, O. R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Rodríguez Ríos, R., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4800 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 947* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 97069* (CONC)].

Gnaphalium gaudichaudianum DC.
Sin.: *Gnaphalium mendocinum* Phil., *Pseudognaphalium austrobrasilicum* Deble & Marchiori, *Pseudognaphalium gaudichaudianum* (DC.) Anderb.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Deble, L. P., 2006; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, PHA); URY(ART, CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14305* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 2950* (LP)]; PRY[*Morong, T. 793* (MO)]; URY[*Alonso Paz, E. 3641* (MVFQ)].

Gnaphalium gayanum J. Remy
Sin.: *Pseudognaphalium gayanum* (J. Remy) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(I, II, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Gnaphalium glanduliferum Griseb.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879.
Subarbusto. Endémica. 4500–5500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 146* (CORD)].

Gnaphalium glandulosum Klatt
Sin.: *Pseudognaphalium glandulosum* (Klatt) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5790* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3535* (CONC)].

Gnaphalium gnaphalioides (Less.) Kuntze = **Berroa gnaphalioides** (Less.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Gnaphalium graveolens Kunth
Sin.: *Pseudognaphalium graveolens* (Kunth) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24171* (LP)].

Gnaphalium guatemalense Gand. = **Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium helichrysoides Wedd. = **Gnaphalium luteoalbum** L.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991.

Gnaphalium heteroides Klatt = **Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium heterophyllum Phil., hom. illeg. = **Gnaphalium heterotrichum** Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium heterotrichum Phil.
Sin.: *Gnaphalium heterophyllum* Phil., hom. illeg., *Hypelichrysum heterotrichum* (Phil.) Kirp., *Pseudognaphalium heterotrichum* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1991; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3846* (LP)].

Gnaphalium illapelinum Phil. var. **illapelinum**
Sin.: *Pseudognaphalium illapelinum* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.; Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck s.n.* (SGO)].

Gnaphalium illapelinum Phil. var. **lanatum** Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (*)].

Gnaphalium indicum L. = **Gnaphalium cymathoides** Kunze ex DC.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium insulare Klatt = **Gnaphalium aldunateoides** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium involucratum Lam., hom. illeg. = **Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.

Gnaphalium jamesonii (Baker) Kuntze = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986a.

Gnaphalium jujuyense Cabrera
Sin.: *Pseudognaphalium jujuyense* (Cabrera) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15258* (LP)].

Gnaphalium julietii Phil. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium kunthianum Kuntze = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Gnaphalium lacteum Meyen & Walp.
Sin.: *Gnaphalium argyrolepis* Phil., *Pseudognaphalium lacteum* (Meyen & Walp.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 8862* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1092* (LP)].

Gnaphalium landbeckii Phil.
Sin.: *Pseudognaphalium landbeckii* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2273* (LP)].

Gnaphalium leucocephalum Phil., nom. illeg. = **Gnaphalium pseudohelichrysum** Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium leucopeplum Cabrera
Sin.: *Pseudognaphalium leucopeplum* (Cabrera) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1961, 1971a, 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 2556* (LP), *Kiesling, R. 5041* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 28220* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 81603* (LP)].

Gnaphalium longifolium Phil. = **Gnaphalium pratense** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium luteoalbum L.
Sin.: *Gnaphalium helichrysoides* Wedd., *Gnaphalium nanum* Humb., Bonpl. & Kunth, hom. illeg., *Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & B.L. Burtt
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(TDF); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rial Alberti, F. s.n.* (LP)].
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Gnaphalium lycopodioides d'Urv. = **Chevreulia lycopodioides** (d'Urv.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium malvinense H. Koyama = **Gamochaeta malvinensis** (H. Koyama) T.R. Dudley
Referencias: Dudley, T. R., 1981.

Gnaphalium melanosphaeroides Wedd.
Sin.: *Pseudognaphalium melanosphaeroides* (Wedd.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 1838* (LP)].

Gnaphalium mendocinum Phil. = **Gnaphalium gaudichaudianum** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978.

Gnaphalium moelleri Phil.
Sin.: *Gnaphalium canum* Phil., hom. illeg., *Pseudognaphalium moelleri* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, R. 718* (LP)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Gnaphalium montevidense Spreng.
Sin.: *Gnaphalium chilense* Spreng., *Gnaphalium sprengelii* Hook. & Arn., *Gnaphalium subnudum* Phil., *Gnaphalium viravira* Less., hom. illeg., *Pseudognaphalium montevidense* (Spreng.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanzin, R. 10* (SI), *Sleumer, H. O. 1243* (LP)]; CHL[*Elvebakk, A. 32* (CONC)].

Gnaphalium monticola Phil. ex Reiche = **Gamochaeta monticola** (Phil. ex Reiche) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium mucronatum Phil. = **Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gnaphalium multicaule Willd. = **Gnaphalium polycaulon** Pers.
Referencias: Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium nanum Humb., Bonpl. & Kunth, hom. illeg. = **Gnaphalium luteoalbum** L.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991.

Gnaphalium nivale Phil., hom. illeg. = **Gamochaeta nivalis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium obscurum Phil. = **Gamochaeta depilata** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium oliganthum Phil. = **Gamochaeta oligantha** (Phil.) L.E. Navas
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium paniculatum Colla = **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a, 1963a, 1978.

[Gnaphalium pedunculatum (Poepp.) Benth. & Hook. ex Klatt]
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1991.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Gnaphalium pedunculosum I.M. Johnst. = **Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium pensylvanicum Willd. = **Gamochaeta pensylvanica** (Willd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium peregrinum Fernald = **Gamochaeta pensylvanica** (Willd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium perpusillum Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 2424* (LP)].

Gnaphalium peteroanum Phil. = **Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium phaeolepis Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Gnaphalium philippii Cabrera, hom. illeg. = **Gnaphalium cabrerae** S.E. Freire

Gnaphalium piptolepis (Wedd.) Griseb. = **Belloa piptolepis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Gnaphalium platense Cabrera = **Gamochaeta platensis** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium polybotryum Phil. = **Gamochaeta polybotrya** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Gnaphalium polycaulon Pers.
Sin.: *Gnaphalium multicaule* Willd.
Referencias: Freire, S. E., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 629* (G)].

Gnaphalium pratense Phil.
Sin.: *Gnaphalium longifolium* Phil., *Pseudognaphalium pratense* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C. & Muñoz-Schick, M., 1990; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6004* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6076* (LP)].

Gnaphalium procumbens Phil. = **Gamochaeta procumbens** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium pseudohelichrysum Reiche
Sin.: *Gnaphalium leucocephalum* Phil., nom. illeg.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1000 m.
Países: CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 1138* (LP)].

Gnaphalium psilophyllum Meyen & Walp.
Sin.: *Pseudognaphalium psilophyllum* (Meyen & Walp.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1971a; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5091* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 978* (LP)].

Gnaphalium puberulum DC.
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1991; Rémy, E. J., 1847.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4500 m.

Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 299* (G)].

Gnaphalium punae Cabrera = **Luciliocline subspicata** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Gnaphalium purpureum L. = **Gamochaeta purpurea** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium purpureum L. var. *americaum* (Mill.) Klatt = **Gamochaeta americana** (Mill.) Wedd.
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium purpureum L. var. *chamissonis* (DC.) Klatt = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium purpureum L. var. *falcatum* (Lam.) Torr. & Gray = **Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium purpureum L. var. *julietii* (Phil.) Reiche = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gnaphalium purpureum L. var. *mucronatum* (Phil.) Skottsb. = **Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gnaphalium purpureum L. var. *simplicicaule* (Willd. ex Spreng.) Klatt = **Gamochaeta simplicicaulis** (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium purpureum L. var. *spathulatum* (Lam.) Baker = **Gamochaeta pensylvanica** (Willd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium purpureum L. var. *sphacelatum* (Kunth) Speg. = **Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium purpureum L. var. *spicatum* (Lam.) Baker = **Gamochaeta coarctata** (Willd.) Kerguélen
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium purpureum L. var. *stachydifolium* (Lam.) Baker = **Gamochaeta stachydifolia** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium ramosissimum Sch. Bip., hom. illeg. = **Achyrocline brittoniana** Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005a.

[Gnaphalium ramosum Phil., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Gnaphalium remyanum Phil.
Sin.: *Pseudognaphalium remyanum* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (CONC)].

[Gnaphalium resedifolium Tausch]
Sin.: *Pseudognaphalium resedifolium* (Tausch) Anderb.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Gnaphalium retusum Lam. = **Facelis retusa** (Lam.) Sch. Bip. subsp. **retusa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Freire, S. E., 1998.

[Gnaphalium rhodarum S.F. Blake]
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1991.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Gnaphalium rivulare Kuntze = **Gnaphalium aldunateoides** J. Remy
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium robustum Phil.
Sin.: *Pseudognaphalium robustum* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–4500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, K. s.n.* (CONC)].

Gnaphalium santanicum Cabrera = **Luciliocline santanica** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Gnaphalium sarmentosum Klatt = **Luciliocline santanica** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Gnaphalium satureioides Lam. = **Achyrocline satureioides** (Lam.) DC.
Referencias: Giangualani, R. A., 1976.

Gnaphalium schultzii (Wedd.) Cabrera = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b.

Gnaphalium serpyllifolium J. Remy, hom. illeg. = **Gamochaeta serpyllifolia** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium serranoi Phil. = **Gamochaeta chamissonis** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961, 1971a.

Gnaphalium simplicicaule Willd. ex Spreng. = **Gamochaeta simplicicaulis** (Willd. ex Spreng.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium spathulatum Lam., hom. illeg. = **Gamochaeta pensylvanica** (Willd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium sphacelatum Kunth = **Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium sphacelatum Kunth var. *legitimum* DC., nom. inval. = **Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium spicatum Lam. = **Gamochaeta coarctata** (Willd.) Kerguélen
Referencias: Freire, S. E. & Iharlegui, L., 1997.

Gnaphalium spiciforme Sch. Bip. = **Gamochaeta spiciformis** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium sprengelii Hook. & Arn. = **Gnaphalium montevidense** Spreng.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium stachydifolium Lam. = **Gamochaeta stachydifolia** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium stachydifolium Lam. var. *alienum* (Hook. & Arn.) Reiche = **Gamochaeta aliena** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium stachydifolium Lam. var. *axillare* (J. Remy) Reiche = **Gamochaeta axillaris** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium stachydifolium Lam. var. *berterianum* (DC.) Klatt = **Gamochaeta berteriana** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium stachydifolium Lam. var. *falcatum* (Lam.) Klatt = **Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium stachydifolium Lam. var. *sphacelatum* (Kunth) Reiche = **Gamochaeta sphacelata** (Kunth) Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium stagnale I.M. Johnst. = **Gamochaeta falcata** (Lam.) Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1990a.

Gnaphalium suaveolens Vell. = **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949c.

Gnaphalium subfalcatum Cabrera = **Gamochaeta subfalcata** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium subnudum Phil. = **Gnaphalium montevidense** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a.

Gnaphalium suffruticosum Phil. = **Gamochaeta suffruticosa** (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991.

Gnaphalium tarapacanum Phil.
Sin.: *Pseudognaphalium tarapacanum* (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4180* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 4481* (LP)].

Gnaphalium tunariense Kuntze = **Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990.

Gnaphalium ulophyllum Hook. & Arn. = **Gnaphalium cymathoides** Kunze ex DC.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991.

Gnaphalium valdivianum Phil. = **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a.

Gnaphalium valparadiseum Phil. = **Gamochaeta valparadisea** (Phil.) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991.

Gnaphalium versatile Rusby
Sin.: *Pseudognaphalium versatile* (Rusby) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18309* (LP)].

Gnaphalium villaroelii Phil. = **Gamochaeta villaroelii** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1961.

Gnaphalium viravira Less., hom. illeg. = **Gnaphalium montevidense** Spreng.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Gnaphalium viravira Molina
Sin.: *Pseudognaphalium viravira* (Molina) Anderb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3867* (LP)].

Gnaphalium virescens (Less.) Kuntze = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986a.

Gnaphalium virgatum L. = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Gnaphalium viridescens Cabrera = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Gnaphalium weddellianum Rusby = **Stuckertiella capitata** (Wedd.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Gnaphalium yalaense Cabrera
Sin.: *Pseudognaphalium yalaense* (Cabrera) Anderb.
Referencias: Anderberg, A. A., 1991; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20606* (LP)].

Gochnatia Kunth

Número de especies: 18, 6 endémicas

Gochnatia argentina (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Moquinia argentina* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 703* (LP)]; PRY[*Arenas, P. s.n.* (BACP, CTES)].

Gochnatia argyrea (Dusén ex Malme) Cabrera
Sin.: *Moquinia argyrea* Dusén ex Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9578* (LP)].

Gochnatia australis Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia barrosii Cabrera
Sin.: *Gochnatia paraguariensis* Cabrera, *Moquinia velutina* Bong. var. *cordata* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mathes, L. 3* (IAC, LP)]; PRY[*Soria, N. 7247* (FCQ, LP)].

Gochnatia berteroana Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Sancho, G., 2000.

Gochnatia cardenasii S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L. & Botta, S. M., 1992; Cabrera, A. L., 1971a.
Arbusto. Nativa. 4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cordo, H. 88-b-17* (SI)].

Gochnatia cinerea (Hook.) Cabrera, nom. illeg. = **Gochnatia orbiculata** (Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Gochnatia cinerea Griseb. = **Hyaloseris cinerea** (Griseb.) Griseb. var. **cinerea**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d.

Gochnatia cordata Less. var. **cordata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Sancho, G., 1996.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23169* (LP, SI)]; BRA[*Rambo, B. 545* (LP)].

Gochnatia cordata Less. var. **mollisima** Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 41025* (PACA)]; PRY[*Rojas, T. 5063* (LP)].

Gochnatia corymbosa Less. = **Ianthopappus corymbosus** (Less.) Roque & D.J.N. Hind
Referencias: Roque, N. & Hind, D. J. N., 2001.

Gochnatia curviflora (Griseb.) O. Hoffm.
Sin.: *Moquinia curviflora* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G., 1996.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3495* (LP)].

Gochnatia cuspidata Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia fascicularis (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **fascicularis** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **fascicularis** (D. Don) Cabrera
Sin.: *Gochnatia fascicularis* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia multiflora* F. Phil., *Pentaphorus fascicularis* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1788* (LP)].

Gochnatia foliolosa (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Sin.: *Gochnatia australis* Phil., *Gochnatia berteroana* Phil., *Gochnatia cuspidata* Phil., *Gochnatia integerrima* Phil., *Gochnatia laxiflora* Phil., *Gochnatia litoralis* Phil., *Gochnatia pyrifolia* (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn., *Gochnatia racemosa* Phil., *Gochnatia rigida* D. Don ex Hook. & Arn., *Pentaphorus foliolosus* D. Don, *Pentaphorus pyrifolius* D. Don
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971c.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Burkart, A. 9333* (LP, SI)].

Gochnatia genistoides (D. Don) Hook. & Arn. = **Cyclolepis genistoides** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *media* Kuntze, *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *puberula* Kuntze, *Gochnatia glutinosa* (D. Don) Hook. & Arn. var. *viscosissima* Kuntze, *Gochnatia viscosissima* (Kuntze) S.F. Blake, *Pentaphorus glutinosus* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G., 1996; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Arbusto. Endémica. 500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3442* (LP)].

Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn. var. *media* Kuntze = **Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn. var. *puberula* Kuntze = **Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia glutinosa (D. Don) Hook. & Arn. var. *viscosissima* Kuntze = **Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia haumaniana Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6575* (LP)].

Gochnatia integerrima Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia lanuginosa (Baker) Cabrera = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Gochnatia laxiflora Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia litoralis Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia malmei Cabrera = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Gochnatia mollisima (Malme) Cabrera
Sin.: *Moquinia mollisima* Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 1261* (LP)].

Gochnatia multiflora F. Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **fascicularis** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia orbiculata (Malme) Cabrera
Sin.: *Gochnatia cinerea* (Hook.) Cabrera, nom. illeg., *Moquinia cinerea* (Hook.) DC., *Moquinia orbiculata* Malme, *Moquinia orbiculata* Malme f. *ovata* Malme, *Spadonia cinerea* Hook.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Sancho, G., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21238* (LP)].

Gochnatia palosanto Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 1996.
Arbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21157* (LP)]; PRY[*Fortunato, R. H. 3660* (G)].

Gochnatia paniculata (Less.) Cabrera
Sin.: *Gochnatia lanuginosa* (Baker) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *lanuginosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia paniculata* (Less.) Cabrera var. *polycephala* (Gardner) Cabrera, *Moquinia congesta* Gardner, *Moquinia desertorum* Gardner, *Moquinia lanuginosa* Baker, *Moquinia paniculata* (Less.) DC., *Moquinia polycephala* Gardner, *Moquinia tomentosa* Bong., *Spadonia paniculata* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20057* (LP)].

Gochnatia paniculata (Less.) Cabrera var. *lanuginosa* (Less.) Cabrera = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Gochnatia paniculata (Less.) Cabrera var. *polycephala* (Gardner) Cabrera = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Gochnatia paraguariensis Cabrera = **Gochnatia barrosii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Sin.: *Gochnatia malmei* Cabrera, *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *ceanothifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *eleagnifolia* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *obtusifolia* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less. var. *ceanothifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *elaeagnifolia* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *obtusifolia* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, GUA, ITA, MIE, SPE); URY(ART, CLA, LAV, MON, PAY, RIV, RNO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 17957* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 30715* (LP)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10863* (LP)]; URY[*Gibert, J. E. s.n.* (LP)].

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera subsp. **floccosa** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Sancho, G., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15437* (LP)].

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Sin.: *Baccharis lessingiana* DC., *Baccharis tomentosa* Thunb., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC., *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *populifolia* (Less.) DC., *Spadonia polymorpha* Less., *Spadonia polymorpha* Less. var. *populifolia* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 5821* (LP)].

Gochnatia pulchra Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c, 1998; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Nativa. 500–1100 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6876* (LP)].

Gochnatia pyrifolia (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia racemosa Phil. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia ramboi Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Sancho, G., 2000.
Subarbusto. Nativa. 500–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11492* (LP)].

Gochnatia revoluta D. Don ex Hook. & Arn. = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera

Gochnatia rigida D. Don ex Hook. & Arn. = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia sordida (Less.) Cabrera
Sin.: *Moquinia polymorpha* (Less.) DC. var. *sordida* (Less.) DC., *Moquinia sordida* (Less.) Malme, *Spadonia polymorpha* Less. var. *sordida* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 4891* (LP)].

Gochnatia tarapacana Phil. = **Lophopappus tarapacanus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gochnatia velutina (Bong.) Cabrera
Sin.: *Moquinia velutina* Bong.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.
Arbusto. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 14885* (LP)].

Gochnatia viscosissima (Kuntze) S.F. Blake = **Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Gorteria rigens L. = **Gazania rigens** (L.) Gaertn.
Referencias: Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.

Graemia aromatica Hook. = **Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Graphistylis serranus (Zardini) D. J. N. Hind = **Senecio serranus** Zardini

Grazielia brevipetiolata R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium hieronymi** S.E. Freire

Grazielia multifida (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium multifidum** DC.

Grazielia serrata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium serratum** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Grindelia Willd.

Número de especies: 26, 23 endémicas

Grindelia acerosa Bertero ex Phil., nom. nud.
= **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Grindelia aegialitis Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931, 1932c.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 126* (SI)].

[Grindelia andina (Phil.) Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1931.
Notas: Nombre dudoso.

Grindelia anethifolia (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Aster anethifolius* (Phil.) Kuntze, *Aster pectinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus pinnatifidus* Hook. & Arn., *Haplopappus anethifolius* Phil., *Haplopappus araucanus* Phil., *Haplopappus moyanoi* Speg., *Haplopappus pectinatus* Phil., *Haplopappus pectinatus* Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1971a.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 22/95* (BAA)]; CHL[*Marticorena, C. 1092* (CONC)].

Grindelia anomala DC. = **Grindelia pulchella** Dunal var. **discoidea** (Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia bergii (Hieron.) Cabrera = **Grindelia brachystephana** Griseb.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia boliviana Rusby
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giberti, G. C. 173* (SI)].

Grindelia brachystephana Griseb.
Sin.: *Grindelia bergii* (Hieron.) Cabrera, *Grindelia brachystephana* Griseb. var. *bergii* Hieron., *Grindelia tehuelches* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus patagonicus* Speg., *Haplopappus tehuelches* Speg., nom. illeg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, RNE, SCR, SDE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11899* (SI)].

Grindelia brachystephana Griseb. var. *bergii* Hieron. = **Grindelia brachystephana** Griseb.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia buphthalmoides DC.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931, 1963a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10132* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 4276* (NY)].

Grindelia cabrerae Ariza var. **alatocarpa** Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1989b, 2005; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 16897* (CORD)].

Grindelia cabrerae Ariza var. **cabrerae**
Sin.: *Grindelia pulchella* Dunal var. *serratifolia* Kuntze, *Grindelia pulchella* Dunal var. *sublinearis* Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 1976, 2005; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 1868* (BAA)].

Grindelia canescens Bertero = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Grindelia chacoënsis A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. var. *microcephala* Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, b, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12463* (SI)].

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera
Sin.: *Grindelia foliosa* D. Don ex Hook. & Arn., *Grindelia resinosa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia speciosa* Gillies ex Hook. & Arn., *Grindelia speciosa* Gillies ex Hook. & Arn. var. *integrifolia* Speg., *Grindelia speciosa* Lindl. & Paxton, *Grindelia volkensii* Kuntze, *Grindelia volkensii* Kuntze var. *latifolia* Kuntze, *Haplopappus hoorebekia* DC., nom. illeg., *Hoorebekia chiloense* Cornel.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a.
Subarbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 80* (SRFA)]; CHL[*Gillies, J. s.n.* (K)].

Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera var. *pampeana* Covas = **Grindelia covasii** A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1994, 1999a, 2003b.

Grindelia coronensis A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003a.
Arbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: ARG(RNE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 39/02* (BAA, NY, SI)].

Grindelia covasii A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia chiloensis* (Cornel.) Cabrera var. *pampeana* Covas
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1994, 1999a, 2003b.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 16/93b* (BAA)].

Grindelia diffusa Gillies & Hook. ex Hook. = **Grindelia pulchella** Dunal var. **pulchella**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia discoidea Hook. & Arn. = **Grindelia pulchella** Dunal var. **discoidea** (Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia foliosa D. Don ex Hook. & Arn. = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia globularifolia Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931.
Subarbusto. Endémica. 2000–2200 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 322* (BA, CORD)].

Grindelia glutinosa (Cav.) Dunal, nom. illeg. = **Grindelia glutinosa** (Cav.) Mart.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.

Grindelia glutinosa Bertero = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Grindelia glutinosa (Cav.) Mart.
Sin.: *Aster glutinosus* Cav., *Grindelia glutinosa* (Cav.) Dunal, nom. illeg., *Grindelia montana* Phil., *Grindelia peruviana* Sch. Bip.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.
Subarbusto. Nativa. 500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 310* (CONC, CTES)].

Grindelia linearifolia A. Bartoli, Tortosa & Marchesi
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a; Bartoli, A., Tortosa, R. D. & Marchesi, E., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(SOR, PAY).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 11693* (BAA, MVFA)].

Grindelia mendocina A. Bartoli & Tortosa var. **mendocina**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998b, 1999a, 2003b.
Arbusto. Endémica. 2400–2900 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 16a/97* (BAA)].

Grindelia mendocina A. Bartoli & Tortosa var. **radiata** A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.
Arbusto. Endémica. 2700–2900 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Marqués, N. N. 47* (SI)].

Grindelia montana Phil. = **Grindelia glutinosa** (Cav.) Mart.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.

Grindelia obovata Rusby = **Grindelia tarapacana** Phil.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.

Grindelia orientalis A. Bartoli, Tortosa & G.H. Rua
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a; Bartoli, A., Tortosa, R. D. & Rua, G. H., 1995.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: URY[*Del Puerto, O. 5303* (BAA, MVFA)].

Grindelia patagonica A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1994, 1999a, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 12/91* (BAA)].

Grindelia pectinata Baker = **Grindelia scorzonerifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia peruviana Sch. Bip. = **Grindelia glutinosa** (Cav.) Mart.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.

Grindelia prostrata A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 1000–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6368* (SI), *sin colector s.n.* (US)].

Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoides** Tortosa & A. Bartoli
Sin.: *Aster chryseus* Kuntze, *Haplopappus chryseus* (Kuntze) Cabrera, *Haplopappus chrysocephalus* Reiche, *Pyrrocoma aurea* Phil.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b; Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.
Subarbusto. Endémica. 2300–2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10396* (BAB)].

Grindelia prunelloides (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Sin.: *Aster prunelloides* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus prunelloides* Poepp. ex Less., *Haplopappus ameghinoi* Speg., *Haplopappus illinii*

Speg., *Haplopappus mustersii* Speg., *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC., *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *lanatus* Cabrera, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *mustersii* (Speg.) Cabrera, *Haplopappus prunelloides* (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus* Reiche
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, b, 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 500–1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 22/98* (BAA)]; CHL[*Hollermayer, A. 739* (LP)].

Grindelia puberula Hook. & Arn.
Sin.: *Grindelia puberula* Hook. & Arn. f. *angustifolia* Malme
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1519* (BA)]; BRA[*Rambo, B. 48869* (SI)]; PRY[*Daguerre, J. B. 1928* (BA, LP)].

Grindelia puberula Hook. & Arn. f. *angustifolia* Malme = **Grindelia puberula** Hook. & Arn.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia puberula Hook. & Arn. var. *microcephala* Cabrera = **Grindelia chacoënsis** A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia pulchella Bertero = **Haplopappus pulchellus** DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Grindelia pulchella Dunal var. **discoidea** (Hook. & Arn.) A. Bartoli & Tortosa
Sin.: *Grindelia anomala* DC., *Grindelia discoidea* Hook. & Arn.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(CAS, FLA, LAV, MON, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11098* (SI)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1031* (P)]; URY[*Legrand, D. 856* (MVFA)].

Grindelia pulchella Dunal var. *normalis* Kuntze = **Grindelia pulchella** Dunal var. **pulchella**
Referencias: Cabrera, A. L., 1931.

Grindelia pulchella Dunal var. **pulchella**
Sin.: *Grindelia diffusa* Gillies & Hook. ex Hook., *Grindelia pulchella* Dunal var. *normalis* Kuntze
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1963a.
Subarbusto. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(LAV, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15631* (CTES)]; BRA[*Palacios 2657* (BAB)]; URY[*Legrand, D. 2267* (MVFA)].

Grindelia pulchella Dunal var. *serratifolia* Kuntze = **Grindelia cabrerae** Ariza var. **cabrerae**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia pulchella Dunal var. *sublinearis* Kuntze = **Grindelia cabrerae** Ariza var. **cabrerae**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia pygmaea Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999b, 2003b, 2004; Cabrera, A. L., 1971a.
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 54/02* (BAA)].

Grindelia ragonesei Cabrera
Sin.: *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *spathulata* Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1954a.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 42* (BA, BAF, CORD, SI)].

Grindelia resinosa Gillies ex Hook. & Arn. = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia rupestris A. Bartoli, Tortosa & Marchesi
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a; Bartoli, A., Tortosa, R. D. & Marchesi, E., 1996; Silveira de Oliveira, A., Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, M. s.n.* (ICN)]; URY[*Bayce, D. s.n.* (BAA, MVFA)].

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Grindelia pectinata* Baker, *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *pectinata* (Baker) Hassl., *Grindelia scorzonerifolia* Hook. & Arn. var. *subintegra* Hassl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1974a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(PHA); URY(DUR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6609* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 231* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 2984* (LP)]; URY[*Legrand, D. 3529* (MVFA)].

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn. var. *pectinata* (Baker) Hassl. = **Grindelia scorzonerifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn. var. *spathulata* Cabrera = **Grindelia ragonesei** Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia scorzonerifolia Hook. & Arn. var. *subintegra* Hassl. = **Grindelia scorzonerifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia speciosa Gillies ex Hook. & Arn. = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia speciosa Lindl. & Paxton = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b.

Grindelia speciosa Gillies ex Hook. & Arn. var. *integrifolia* Speg. = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia tarapacana Phil.
Sin.: *Grindelia obovata* Rusby
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a.
Arbusto. Nativa. 2500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2196* (SI)].

Grindelia tehuelches (Speg.) Cabrera = **Grindelia brachystephana** Griseb.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Grindelia ventanensis A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1994, 1999a, 2003b.
Subarbusto. Endémica. 500–600 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 6/92* (BAA)].

Grindelia volkensii Kuntze = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a; Cabrera, A. L., 1931.

[Grindelia volkensii Kuntze var. angustifolia Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Grindelia volkensii Kuntze var. *latifolia* Kuntze = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931.

Guariruma inflexum (Cav.) Cass. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **subulata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Guariruma retrorsum (Cav.) Cass. = **Mutisia retrorsa** Cav.
Referencias: Hind, N. & Hall, T., 2003a.

Guariruma sinuatum (Cav.) Cass. = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Guariruma subspinosum (Cav.) Cass. = **Mutisia subspinosa** Cav.
Referencias: Hind, N. & Hall, T., 2003b.

Guntheria megapotamica Spreng. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **megapotamica**
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Gusmania chilensis J. Remy = **Erigeron gilliesii** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Gutierrezia Lag.

Número de especies: 13, 12 endémicas

Gutierrezia ameghinoi Speg. = **Gutierrezia spathulata** (Phil.) Kurtz
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia baccharoides Sch. Bip.
Sin.: *Gutierrezia baccharoides* Sch. Bip. var. *hoffmannii* (Kuntze) Hauman, *Gutierrezia hoffmannii* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.
Subarbusto. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Neumeyer, J. J. 384* (LP)]; CHL[*Spegazzini, C. 104* (LP)].

Gutierrezia baccharoides Sch. Bip. var. *hoffmannii* (Kuntze) Hauman = **Gutierrezia baccharoides** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia brachyris Macloskie var. *patagonica* (Speg.) Macloskie = **Gutierrezia spathulata** (Phil.) Kurtz
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia compacta Phil. = **Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia copiapina Phil. = **Gutierrezia taltalensis** Phil.
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia cupressiformis (Lam.) Sch. Bip. = **Lepidophyllum cupressiforme** (Lam.) Cass.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Gutierrezia espinosae Acevedo
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 70* (LP)].

Gutierrezia gayana (J. Remy) Reiche
Sin.: *Brachyris gayana* (J. Remy) J. Remy, *Odontocarpha gayana* J. Remy
Referencias: Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2226* (LP)].

Gutierrezia gilliesii Griseb.
Sin.: *Gutierrezia leucantha* Cabrera, *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig, *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *gilliesii* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4258* (CORD, LP)].

Gutierrezia gilliesii Griseb. var. *scabriuscula* Griseb. = **Gutierrezia mandonii** (Sch. Bip.) Solbrig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia hoffmannii Kuntze = **Gutierrezia baccharoides** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia isernii (Phil.) Phil.
Sin.: *Brachyris isernii* Phil., *Gutierrezia mandonii* (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *isernii* (Phil.) Solbrig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 1125* (LP)].

Gutierrezia laricifolia D. Don = **Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia ledifolia Griseb. = **Chiliotrichiopsis ledifolia** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Grisebach, A. H. R., 1874.

Gutierrezia leucantha Cabrera = **Gutierrezia gilliesii** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig
Sin.: *Brachyris mandonii* Sch. Bip., *Gutierrezia gilliesii* Griseb. var. *scabriuscula* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 7160* (LP)].

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *gilliesii* (Griseb.) Solbrig = **Gutierrezia gilliesii** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia mandonii (Sch. Bip.) Solbrig subsp. *isernii* (Phil.) Solbrig = **Gutierrezia isernii** (Phil.) Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia neaeana (DC.) Sch. Bip. ex S.F. Blake
Sin.: *Brachyris neaeana* DC.
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 2500–4000 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 6000* (GH)].

Gutierrezia paniculata (DC.) Phil. var. *patagonica* Speg. = **Gutierrezia spathulata** (Phil.) Kurtz
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia pulviniformis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1940; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Endémica. 2400–2500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15913* (LP)].

Gutierrezia repens Griseb.
Sin.: *Gutierrezia ruizlealii* Solbrig
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Gutierrezia resinosa (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Sin.: *Brachyris floribunda* Phil., *Brachyris paniculata* DC., *Galinsoga resinosa* Hook. & Arn., *Gutierrezia compacta* Phil., *Gutierrezia laricifolia* D. Don, *Odontocarpha poeppigii* DC.
Referencias: Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1713* (LP)].

Gutierrezia ruizlealii Solbrig = **Gutierrezia repens** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Gutierrezia solbrigii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18614* (LP)].

Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz
Sin.: *Brachyris spathulata* Phil., *Gutierrezia ameghinoi* Speg., *Gutierrezia brachyris* Macloskie var. *patagonica* (Speg.) Macloskie, *Gutierrezia paniculata* (DC.) Phil. var. *patagonica* Speg., *Gutierrezia spathulata* (Phil.) Kurtz var. *ochroleuca* Kurtz
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 7569* (LP)].

Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz var. *gilliesii* (Griseb.) Kuntze = **Gutierrezia gilliesii** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia spathulata (Phil.) Kurtz var. *ochroleuca* Kurtz = **Gutierrezia spathulata** (Phil.) Kurtz
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Solbrig, O. T., 1966.

Gutierrezia taltalensis Phil.
Sin.: *Gutierrezia copiapina* Phil.
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. 1885* (LP)].

Guynesomia Bonifacino & Sancho

Número de especies: 1 endémica

Guynesomia scoparia (Phil.) Bonifacino & Sancho
Sin.: *Hinterhubera scoparia* (Phil.) Cabrera, *Nardophyllum scoparium* Phil.
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2004; Cabrera, A. L., 1954b.
Arbusto. Endémica. 1400–3000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1961* (CONC)].

Gymnocoronis DC.

Número de especies: 1

Gymnocoronis attenuata DC. = **Gymnocoronis spilanthoides** (Hook. & Arn.) DC. var. **spilanthoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996a.

Gymnocoronis spilanthoides (Hook. & Arn.) DC. var. *attenuata* (DC.) Baker = **Gymnocoronis spilanthoides** (Hook. & Arn.) DC. var. **spilanthoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996a.

Gymnocoronis spilanthoides (Hook. & Arn.) DC. var. **spilanthoides**
Sin.: *Alomia spilanthoides* Hook. & Arn., *Gymnocoronis attenuata* DC., *Gymnocoronis spilanthoides* (Hook. & Arn.) DC. var. *attenuata* (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MEN, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAA, CEN, CON, COA, ITA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, DUR, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 11933* (LP)]; BRA[*Sellow, F. 2358* (S)]; PRY[*Brunner, D. R. 1723* (G)]; URY[*Legrand, D. 640* (LP)].

Gymnocoronis spilanthoides (Hook. & Arn.) DC. var. **subcordata** (DC.) Baker
Sin.: *Gymnocoronis subcordata* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996a; Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA); URY(COL, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigo Trigo, A. P. 2694* (LP)]; BRA[*Sellow, F. 3365* (S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 811* (G)]; URY[*Legrand, D. 132* (LP)].

Gymnocoronis subcordata DC. = **Gymnocoronis spilanthoides** (Hook. & Arn.) DC. var. **subcordata** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Gymnolomia connata Spreng. = **Smallanthus connatus** (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Gymnopsis helianthoides DC. = **Aspilia silphioides** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.

Gymnostyles alata Spreng. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Gymnostyles anthemifolia Juss. = **Soliva anthemifolia** (Juss.) R. Br. ex Less.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a, 1974a.

Gymnostyles barclayana (DC.) Steud. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Gymnostyles lusitanica Spreng. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a.

Gymnostyles minuta (L. f.) Spreng. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960.

Gymnostyles nasturtiifolia Juss. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a.

Gymnostyles peruviana Spreng. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960.

Gymnostyles pterosperma Juss. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Gymnostyles stolonifera (Brot.) R. Br. ex G. Don = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a.

Gynheteria incana Spreng., p.p. = **Tessaria absinthioides** (Hook. & Arn.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1939b.

Gynheteria incana Spreng., p.p. = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **integrifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1939b.

Gynoxys Cass.

Número de especies: 1 endémica

Gynoxys fabrisii Cabrera
Sin.: *Aequatorium fabrisii* (Cabrera) C. Jeffrey, *Nordenstamia fabrisii* (Cabrera) B. Nord.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Nordenstam, B., 2006.
Arbusto. Endémica. 1600–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5717* (LP)].

Gynura Cass.

Número de especies: 1 introducida

Gynura aspera Ridl. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Gynura aurantiaca (Blume) DC.
Sin.: *Cacalia aurantica* Blume
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Introducida. 300–2400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rial Alberti, F. s.n.* (BAB)].

Gynura malasica (Ridl.) Ridl. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Gynura rosea Ridl. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Gynura zeylanica Trin. var. *malasica* Ridl. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Gypothamnium Phil.

Número de especies: 1 endémica

Gypothamnium pinifolium Phil.
Sin.: *Plazia pinnifolia* (Phil.) O. Hoffm.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1044* (LP)].

Gyptidium militare (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium militare** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Gyptidium trichobasis (Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium trichobasis** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Gyptis artemisiifolia (Griseb.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium artemisiifolium** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Gyptis commersonii Cass. = **Eupatorium commersonii** (Cass.) Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1974a.

Gyptis crassipes (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **crassipes** (Hieron.) B.L. Rob.

Gyptis lanigera (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Gyptis pinnatifida Cass. = **Eupatorium tanacetifolium** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1996f.

Gyptis vernoniopsis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lanigerum** Hook. & Arn. var. **lanigerum**

Haplodiscus densifolius Phil. = **Haplopappus phyllophorus** Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus elatus Phil. = **Haplopappus elatus** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus exserens Phil. = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus fallax Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus graveolens Phil. = **Haplopappus graveolens** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.

Haplodiscus humilis Phil. = **Haplopappus humilis** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.

Haplodiscus ischnos Phil. = **Haplopappus ischnos** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus kingii Phil. = **Haplopappus kingii** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus landbecki Phil. = **Haplopappus ischnos** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus latifolius Phil. = **Haplopappus latifolius** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.

Haplodiscus longiscapus Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplodiscus pachyphyllus Phil. = **Haplopappus rengifoanus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus sphacelatus Phil. = **Haplopappus saxatilis** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus tenuifolius Phil. = **Haplopappus donianus** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplodiscus vernicosus Phil. var. *geissei* Phil. = **Haplopappus latifolius** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902a

Haplodiscus zañartui Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.

Haplopappus Cass.

Número de especies: 60, 59 endémicas

Haplopappus acanthodon Phil. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus acerosus (Bertero) Phil. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus acuminatus DC. = **Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Haplopappus ameghinoi Speg. = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2001; 2003b.

Haplopappus anethifolius Phil. = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1971a.

Haplopappus angustifolius (DC.) Reiche
Sin.: *Aster atenes* Kuntze, *Aster stewardensis* Kuntze, *Haplopappus durus* Reiche, *Pyrrocoma angustifolia* DC., *Pyrrocoma rigida* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 799* (CONC)].

Haplopappus anthylloides Meyen & Walp.
Sin.: *Aster anthylloides* (Meyen & Walp.) Kuntze, *Aster radicans* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glandulosa* Hicken, *Haplopappus bellidifolius* Phil. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus brachylepis* Phil., *Haplopappus radicans* J. Remy, *Haplopappus villosus* Phil.
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 1900–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33387* (SI)]; CHL[*Urzua, A. 90–2* (SGO)].

Haplopappus araucanus Phil. = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa

Haplopappus arbutoides J. Remy = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus arbutoides J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus arbutoides J. Remy var. *glandulosa* Hicken = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus argenteus Steud. = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus armerioides Phil. = **Haplopappus schumannii** (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus australis Phil. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

[Haplopappus axilliflorus Phil.]
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.
Notas: Nombre dudoso.

Haplopappus baccharidifolius Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus baylahuen J. Remy
Sin.: *Aster baylahuen* (J. Remy) Kuntze, *Aster lastarrianus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus domeykoi* Phil., *Haplopappus fluehmannii* Phil., *Haplopappus lastarrianus* J. Remy, *Haplopappus medicinalis* Phil.

Referencias: Cabrera, A. L., 1934; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 2700–3500 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pujalte, J. C. 209* (LP, SI)]; CHL[*Ureta, E. s.n.* (SGO)].

[Haplopappus bellidifolius Phil.]
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.
Notas: Nombre dudoso.

Haplopappus bellidifolius Phil. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus berteri DC. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus berteri DC. var. *lanceolatus* DC. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus bezanillanus (J. Remy) Reiche
Sin.: *Aster bezanillanus* Kuntze, *Pyrrocoma bezanillana* J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica. 700–2800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 38* (CONC)].

Haplopappus boelckei Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, b, 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–2700 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10134* (BAA)].

Haplopappus brachylepis Phil. = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

[Haplopappus breviradiatus Reiche]
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Notas: Nombre dudoso.

Haplopappus bustillosianus J. Remy = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus caespitosus Nutt. = **Haplopappus macrocephalus** (Poepp. ex Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus calendulaceus Griseb. = **Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Haplopappus candolei Phil. = **Haplopappus uncinatus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus canescens (Phil.) Reiche
Sin.: *Aster griseus* Kuntze, *Chroilema subcanescens* Bernh., *Grindelia canescens* Bertero, *Haplodiscus exserens* Phil., *Haplopappus argenteus* Steud., *Haplopappus canescens* (Phil.) Reiche var. *exserens* Reiche, *Haplopappus polycladus* Phil., *Pyrrocoma canescens* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Haplopappus canescens (Phil.) Reiche var. *exserens* Reiche = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus cerberoanus (J. Remy) Reiche
Sin.: *Aster cerberoanus* (J. Remy) Kuntze, *Aster denticulatus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus denticulatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma cerberoana* J. Remy, *Pyrrocoma denticulata* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 3034* (LP)].

Haplopappus chamissonis (Less.) DC. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus chrysanthemifolius (Less.) DC.
Sin.: *Andromachia alternifolia* Kuntze, *Aster berteroi* Kuntze, *Diplopappus chrysanthemifolius* Less., *Diplopappus coquimbensis* Hook. & Arn., *Diplopappus inuloies* Hook. & Arn., *Grindelia glutinosa* Bertero, *Haplopappus acanthodon* Phil., *Haplopappus berteri* DC., *Haplopappus berteri* DC. var. *lanceolatus* DC., *Haplopappus formosus* Phil., *Haplopappus hirsutus* Phil., *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus leucanthemifolius* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3820* (BAA)].

Haplopappus chryseus (Kuntze) Cabrera = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoides** Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2001; 2003b.

Haplopappus chrysocephalus Reiche = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoides** Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2001; 2003b.

Haplopappus corniculatus Phil. = **Haplopappus marginalis** Phil.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus coronopifolius (Less.) DC. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus coronopifolius (Less.) DC. var. *laxus* Phil. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002, a, 2003.

Haplopappus corymbosus (Phil.) Reiche = **Haplopappus pedunculosus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus cuneifolius Nutt. = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus decurrens J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2332* (LP)].

Haplopappus densifolius J. Remy = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus denticulatus (Phil.) Reiche = **Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus deserticolus Phil.
Sin.: *Haplopappus involucratus* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 25385* (LP)].

Haplopappus diffusus (Pers.) DC. = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Haplopappus diplopappus J. Remy
Sin.: *Aster diplopappus* (J. Remy) Kuntze, *Aster venosus* Kuntze, *Aster villiger* Kuntze, *Diplopappus spinulosus* Hook. & Arn., *Haplopappus pallidus* Phil., *Haplopappus pteroanus* Phil., *Haplopappus reticulatus* Phil., *Pyrrocoma reticulata* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica. 1000–3000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 591* (LP)].

Haplopappus diplopappus J. Remy var. *struthionum* (Speg.) Cabrera = **Haplopappus struthionum** Speg.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus doellianus Phil. = **Haplopappus rigidus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus domeykoi Phil. = **Haplopappus baylahuen** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus donianus (Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Diplopappus donianus* Hook. & Arn., *Haplodiscus tenuifolius* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(V, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3137* (LP)].

Haplopappus durus Reiche = **Haplopappus angustifolius** (DC.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.

Haplopappus elatus (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus elatus* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2147* (LP)].

Haplopappus fallax Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus fluehmannii Phil. = **Haplopappus baylahuen** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus foliosus DC.
Sin.: *Aster foliosus* (DC.) Kuntze, *Aster polyphyllus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus foliosus* Hook. & Arn., *Haplopappus polyphyllus* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3938* (BAA)].

Haplopappus fonckii Phil. = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus formosus Phil. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus glabratus Phil. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus glutinosus (Less.) DC., hom. illeg. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus glutinosus Cass.
Sin.: *Aster glutinosus* (Less.) Kuntze, *Aster oligodontus* Kuntze, *Aster senebierifolius* Kuntze, *Diplopappus coronopifolius* Less., nom. illeg., *Diplopappus glutinosus* Less., *Haplopappus arbutoides* J. Remy, *Haplopappus arbutoides* J. Remy var. *glabratus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus australis* Phil., *Haplopappus bustillosianus* J. Remy, *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC., *Haplopappus coronopifolius* (Less.) DC.

var. *laxus* Phil., *Haplopappus glabratus* Phil., *Haplopappus glutinosus* (Less.) DC., hom. illeg., *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera, *Haplopappus glutinosus* Cass. f. *spathulatus* Cabrera, *Haplopappus patagonicus* Phil., *Haplopappus paucidentatus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartoli, A. 20/98* (BAA)]; CHL[*Muñoz-Schick, M. 1611* (SGO)].

Haplopappus glutinosus Cass. f. *patagonicus* (Phil.) Cabrera = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus glutinosus Cass. f. *spathulatus* Cabrera = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus glutinosus Cass. var. *illinitus* (Phil.) Reiche = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus graveolens (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus graveolens* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cox, G. s.n.* (SGO)].

Haplopappus grindelioides (Less.) DC.
Sin.: *Aster grindelioides* (Less.) Kuntze, *Aster reversus* Kuntze, *Diplopappus grindelioides* Less., *Haplopappus reflexus* Phil., *Haplopappus tiltilensis* (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica. 0–2200 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 2412* (LP)].

Haplopappus heterocomus Phil. = **Haplopappus marginalis** Phil.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus heterophysus Phil. = **Haplopappus marginalis** Phil.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus hirsutus Phil. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus hirtellus Phil.
Sin.: *Aster hirtellus* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus hirtellus* Phil. var. *limarensis* Reiche, *Haplopappus limarensis* Phil., *Haplopappus vidali* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1680* (LP)].

Haplopappus hirtellus Phil. var. *hirsutus* (Phil.) Reiche = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus hirtellus Phil. var. *limarensis* Reiche = **Haplopappus hirtellus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus hispidulus DC. = **Erigeron fasciculatus** Colla
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Haplopappus hookerianus DC. = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus hoorebekia DC., nom. illeg. = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Cabrera, A. L., 1931.

Haplopappus humilis (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus humilis* Phil.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982; Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. 22* (SGO)].

Haplopappus ilicifolius J. Remy = **Haplopappus mucronatus** (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus ilicifolius J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche = **Haplopappus platylepis** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus illinii Speg. = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2001; 2003b.

Haplopappus illinitus Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus integerrimus (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
Sin.: *Diplopappus integerrimus* Hook. & Arn., *Grindelia acerosa* Bertero ex Phil., nom. nud., *Haplopappus acerosus* (Bertero) Phil., *Haplopappus pulchellus* DC. var. *elongaus* J. Remy, *Steriphe acerosa* (Bertero ex Phil.) Phil.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982; Hall, H. M., 1928; Teiller A., S. & Tomé, A., 2004.
Arbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2113* (LP)].

Haplopappus integerrimus (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Sin.: *Aster adalbertii* Kuntze, *Conyza punctata* Willd., *Diplopappus chamissonis* Less., *Diplopappus punctatus* Less. ex DC., *Haplopappus chamissonis* (Less.) DC., *Haplopappus punctatus* (Willd.) H.M. Hall
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (UC)].

Haplopappus involucratus Phil. = **Haplopappus deserticolus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus ischnos (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus ischnos* Phil., *Haplodiscus landbecki* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 203* (CONC)].

Haplopappus kingii (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus kingii* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*King, D. O. s.n.* (SGO)].

Haplopappus lastarrianus J. Remy = **Haplopappus baylahuen** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus latifolius (Phil.) Reiche
Sin.: *Haplodiscus latifolius* Phil., *Haplodiscus vernicosus* Phil. var. *geissei* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.
Arbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1246* (LP)].

Haplopappus leucanthemifolius Phil. = **Haplopappus chrysanthemifolius** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus limarensis Phil. = **Haplopappus hirtellus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus linifolius (Phil.) Reiche
Sin.: *Aster linoides* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma linifolia* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 1800–2200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1233* (LP)].

Haplopappus litoralis Phil. = **Haplopappus platylepis** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus longipes (Phil.) Reiche = **Haplopappus velutinus** J. Remy

Haplopappus longiscapus Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus macraeanus (J. Remy) Reiche
Sin.: *Aster macraeanus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma macraeana* J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 90* (LP)].

Haplopappus macrocephalus (Poepp. ex Less.) DC.
Sin.: *Aster macrocephalus* (Poepp. ex Less.) Kuntze, *Diplopappus macrocephalus* Poepp. ex Less., *Haplopappus caespitosus* Nutt.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica. 700–1500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kause, I. 4034* (LP)].

Haplopappus marginalis Phil.
Sin.: *Aster marginalis* (Phil.) Kuntze, *Haplopappus corniculatus* Phil., *Haplopappus heterocomus* Phil., *Haplopappus heterophysus* Phil., *Haplopappus marginalis* Phil. var. *heterophysus* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 600–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13758* (BAA)]; CHL[*Vidal, M. s.n.* (SGO)].

Haplopappus marginalis Phil. var. *heterophysus* (Phil.) Reiche = **Haplopappus marginalis** Phil.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus medicinalis Phil. = **Haplopappus baylahuen** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus mendocinus Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, b, 2003.
Arbusto. Endémica. 1100–1600 m.
Países: ARG(LPA, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanzin, R. 3557* (MERL)].

Haplopappus meyenii Walp.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 381* (P)].

Haplopappus moyanoi Speg. = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 1999a, 2003b.

Haplopappus mucronatus (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. ex B.D. Jacks.
Sin.: *Aster ilicifolius* (J. Remy) Kuntze, *Baccharis hookeriana* DC., *Baccharis mucronata* Hook. & Arn.,

hom. illeg., *Diplopappus mucronatus* Hook. & Arn., *Haplopappus fonckii* Phil., *Haplopappus hookerianus* DC., *Haplopappus ilicifolius* J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2730* (LP)].

Haplopappus multifolius Phil. ex Reiche
Sin.: *Aster multifolius* (Phil. ex Reiche) Kuntze, *Pyrrocoma foliosa* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 700–3200 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teiller, S. s.n.* (BAA)].

Haplopappus mustersii Speg. = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Haplopappus nahuelbutae Klingenb.
Referencias: Klingenberg, L., 1997.
Subarbusto. Endémica. 100–200 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, J. s.n.* (MSB)].

[Haplopappus obovatus Phil.]
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Notas: Nombre dudoso.

Haplopappus ochagavianus Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 100–2000 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 3100* (LP)].

Haplopappus pallidus Phil. = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus paniculatus Phil. = **Haplopappus philippii** (Kuntze) H.M. Hall
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus parvifolius (DC.) Gay
Sin.: *Aster parvifolius* (DC.) Kuntze, *Pyrrocoma parvifolia* DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, V. 36235* (LP)].

Haplopappus patagonicus Phil. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus patagonicus Speg. = **Grindelia brachystephana** Griseb.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Haplopappus paucidentatus Phil. = **Haplopappus glutinosus** Cass.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus pectinatus Phil. = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 1999a, 2003b.

Haplopappus pectinatus Phil. var. *anethifolius* (Phil.) Reiche = **Grindelia anethifolia** (Phil.) A. Bartoli & Tortosa
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1998a, 1999a, 2003b.

Haplopappus pedunculosus J. Remy
Sin.: *Aster pedunculosus* (J. Remy) Kuntze, *Haplopappus corymbosus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus rosmarinifolius* Reiche, *Steriphe corymbosa* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 747* (CONC)].

Haplopappus philippii (Kuntze) H.M. Hall
Sin.: *Aster philippii* Kuntze, *Haplopappus paniculatus* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 608* (CONC)].

Haplopappus phyllophorus Reiche
Sin.: *Haplodiscus densifolius* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Santa Cruz, A. s.n.* (SGO)].

Haplopappus pinea (Phil.) Reiche
Sin.: *Aster pineus* (Phil.) Kuntze, *Pyrrocoma pinea* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902a; Teillier A., S., 1997.
Arbusto. Endémica. 2000–2400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mahu, M. 4561* (LP)].

Haplopappus pinnatifidus Nutt.
Sin.: *Aster andinus* Kuntze, *Aster setiger* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus setiger* Hook. & Arn., *Haplopappus setigerus* (Phil.) Meigen, *Pyrrocoma nuttalli* J. Remy, nom. superfl., *Pyrrocoma setigera* Phil.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.
Arbusto. Endémica. 800–1200 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 193* (CONC)].

Haplopappus platylepis Phil.
Sin.: *Haplopappus ilicifolius* J. Remy var. *platylepis* (Phil.) Reiche, *Haplopappus litoralis* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica. 200–900 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1650* (LP)].

Haplopappus poeppigianus (Hook. & Arn.) A. Gray
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 700–1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2669* (CONC)].

Haplopappus poeppigianus (Hook. & Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray = **Haplopappus schumannii** (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus polycladus Phil. = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus polyphyllus Phil. = **Haplopappus foliosus** DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus prinophyllus Phil. = **Haplopappus remyanus** Wedd.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus pristiphyllus (J. Remy) H.M. Hall
Sin.: *Aster pristiphyllus* (J. Remy) Kuntze, *Pyrrocoma pristiphylla* J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(sin localidad).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Haplopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) DC. = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Haplopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) DC. var. *lanatus* Cabrera = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Haplopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) DC. var. *mustersii* (Speg.) Cabrera = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Haplopappus prunelloides (Poepp. ex Less.) DC. var. *sphaerocephalus* Reiche = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **prunelloides**
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2001.

Haplopappus pteroanus Phil. = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus pulchellus DC.
Sin.: *Aster valparaisanus* Kuntze, *Grindelia pulchella* Bertero
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 300–1300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1397* (LP)].

Haplopappus pulchellus DC. var. *elongaus* J. Remy = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982; Hall, H. M., 1928.

Haplopappus punctatus (Willd.) H.M. Hall = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **punctatus** (Willd.) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus radicans J. Remy = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus reflexus Phil. = **Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus reicheanus H.M. Hall
Sin.: *Haplopappus vernicosus* Phil. ex Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 700–2200 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Haplopappus remyanus Wedd.
Sin.: *Aster remyanus* (Wedd.) Kuntze, *Haplopappus prinophyllus* Phil., *Pyrrocoma ilicifolia* J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 300–2400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2729* (LP)].

Haplopappus rengifoanus J. Remy
Sin.: *Aster rengifoanus* (J. Remy) Kuntze, *Haplodiscus pachyphyllus* Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 100–700 m.
Países: CHL(IV, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Fonk, F. s.n.* (SGO)].

Haplopappus reticulatus Phil. = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus rigidus Phil.
Sin.: *Aster atacamensis* Kuntze, *Haplopappus doellianus* Phil., *Haplopappus villanuevae* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1978; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Arbusto. Endémica. 3400–4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Charpin, A. 20795* (SI)]; CHL[*Villanueva, G. s.n.* (SGO)].

Haplopappus rosmarinifolius Reiche = **Haplopappus pedunculosus** J. Remy
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus rosulatus H.M. Hall
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5815* (CONC, LP)].

Haplopappus rotundifolius H.M. Hall
Sin.: *Diplopappus foliolosus* Hook. & Arn., *Diplopappus ilicifolius* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a.
Arbusto. Nativa. 1000–3000 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 4683* (LP)].

Haplopappus saxatilis (J. Remy) Reiche
Sin.: *Aster saxatilis* (J. Remy) Kuntze, *Haplodiscus sphacelatus* Phil., *Haplopappus sphacelatus* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma saxatilis* J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 400–1700 m.
Países: CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1674* (CONC, LP)].

Haplopappus scaposus J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 653* (LP)].

Haplopappus scaposus DC. = **Inulopsis scaposa** (DC.) O. Hoffm.
Referencias: Nesom, G. L., 1994e.

Haplopappus schumannii (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Sin.: *Aster schumannii* Kuntze, *Haplopappus armerioides* Phil., *Haplopappus poeppigianus* (Hook. & Arn.) A. Gray var. *radiatus* A. Gray, *Haplopappus sericeus* Phil., *Steriphe navarri* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 5438* (CONC)].

Haplopappus scrobiculatus (Nees) DC.
Sin.: *Aster cuneifolius* (Nutt.) Kuntze, *Aster densifolius* (J. Remy) Kuntze, *Aster scrobiculatus* (Nees) Kuntze, *Diplopappus bellidifolius* Hook. & Arn., *Diplopappus cuneatus* Hook. & Arn., *Diplopappus scrobiculatus* Nees, *Haplopappus cuneifolius* Nutt., *Haplopappus densifolius* J. Remy, *Perezia spathulata* Phil., hom. illeg.
Referencias: Hall, H. M., 1928; Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 2600–3700 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Carretero, E. 1273* (MERL)]; CHL[*Zoellner, O. 3772* (CONC)].

Haplopappus sericeus (Less.) DC. = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.

Haplopappus sericeus Phil. = **Haplopappus schumannii** (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus serrulatus Reiche
Sin.: *Haplopappus spinulosus* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Izquierdo, V. s.n.* (SGO)].

Haplopappus setigerus (Phil.) Meigen = **Haplopappus pinnatifidus** Nutt.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Haplopappus sphacelatus (Phil.) Reiche = **Haplopappus saxatilis** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus spinulosus Phil. = **Haplopappus serrulatus** Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.

Haplopappus stelliger J. Remy
Sin.: *Aster stelliger* (J. Remy) Kuntze
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Haplopappus stenophyllus Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002, a, 2003.

Haplopappus stolpii Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2117* (LP)].

Haplopappus struthionum Speg.
Sin.: *Haplopappus diplopappus* J. Remy var. *struthionum* (Speg.) Cabrera

Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 6464* (BAB)].

Haplopappus subandinus Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus taeda Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(V, VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Vidal s.n.* (SGO)].

Haplopappus tehuelches Speg., nom. illeg. = **Grindelia brachystephana** Griseb.
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a, 2003b.

Haplopappus tiltilensis (Phil.) Reiche = **Haplopappus grindelioides** (Less.) DC.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus tweediei (Hook. & Arn.) Malme = **Leptostelma tweediei** (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1976a; Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002.

Haplopappus uncinatus Phil.
Sin.: *Aster uncinatus* (Phil.) Kuntze, *Diplopappus canescens* Hook. & Arn., *Haplopappus candolei* Phil., *Haplopappus uncinatus* Phil. var. *candolei* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Hall, H. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mahu, M. 5643* (LP)].

Haplopappus uncinatus Phil. var. *candolei* (Phil.) Reiche = **Haplopappus uncinatus** Phil.

Haplopappus velutinus J. Remy
Sin.: *Aster illinitus* (Phil.) Kuntze, *Haplodiscus fallax* Phil., *Haplodiscus longiscapus* Phil., *Haplodiscus zañartui* Phil., *Haplopappus baccharidifolius* Phil., *Haplopappus fallax* Phil., *Haplopappus glutinosus* Cass. var. *illinitus* (Phil.) Reiche, *Haplopappus illinitus* Phil., *Haplopappus longipes* (Phil.) Reiche, *Haplopappus longiscapus* Phil., *Haplopappus stenophyllus* Phil., *Haplopappus subandinus* Phil., *Haplopappus virgatus* Phil., *Haplopappus zañartui* (Phil.) Reiche, *Pyrrocoma longipes* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902a; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.
Arbusto. Endémica. 1700–2200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossi 473* (LIL, LP)]; CHL[*Burkart, A. 9335* (LP)].

Haplopappus vernicosus Phil. ex Reiche = **Haplopappus reicheanus** H.M. Hall
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus vidali Phil. = **Haplopappus hirtellus** Phil.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplopappus villanuevae Phil. = **Haplopappus rigidus** Phil.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus villosus Phil. = **Haplopappus anthylloides** Meyen & Walp.
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus virgatus Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2002a, 2003.

Haplopappus zañartui (Phil.) Reiche = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Haplostichia stolonifera Phil. = **Senecio zosterifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Hatschbachiella tweedieana (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tweedieanum** Hook. & Arn. var. **tweedieanum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Hebeclinium hecatanthum DC. = **Eupatorium hecatanthum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. = **Eupatorium macrophyllum** L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Hebeclinium urolepis DC. = **Eupatorium hecatanthum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996f.

Hedypnois Mill.

Número de especies: 1 introducida

Hedypnois cretica (L.) Willd., comb. superfl. = **Hedypnois cretica** (L.) Dum. Cours.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Hedypnois cretica (L.) Dum. Cours.
Sin.: *Hedypnois cretica* (L.) Willd., comb. superfl., *Hedypnois polymorpha* DC., *Hyoseris cretica* L.

Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA); CHL(IV, V, VII, VIII, IX); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9793* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1869* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 1170* (LP)].

Hedypnois polymorpha DC. = **Hedypnois cretica** (L.) Dum. Cours.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Heleniastrum glaucum (Cav.) Kuntze = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Heleniastrum tinctorium (Molina) Kuntze = **Helenium tinctorium** (Molina) J.F. Macbr.
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium L.

Número de especies: 10, 8 endémicas

Helenium alternifolium (Spreng.) Cabrera = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Helenium argentinum Ariza
Sin.: *Actinea heterophylla* Juss. f. *concolor* Kuntze, *Actinea heterophylla* Juss. var. *linearifolia* Kuntze, *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Seckt var. *linearifolium* (Kuntze) Bierner
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1000 m.
Países: ARG(COR, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, R. 963* (LP)].

Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey
Sin.: *Cephalophora aromatica* (Hook.) Schrad., *Cephalophora collina* Phil., *Cephalophora lanceolata* Phil., *Cephalophora tenera* Cass., *Graemia aromatica* Hook., *Helenium collinum* (Phil.) F. Meigen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bierner, M. W., 1978.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 540* (CONC)].

Helenium atacamense Cabrera
Sin.: *Cephalophora litoralis* Phil.
Referencias: Bierner, M. W., 1978; Cabrera, A. L., 1944b; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12659* (LP)].

Helenium borchersii (Phil.) Cabrera = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium collinum (Phil.) F. Meigen = **Helenium aromaticum** (Hook.) L.H. Bailey
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium donianum (Hook. & Arn.) Cabrera, comb. superfl. = **Helenium donianum** (Hook. & Arn.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987.

Helenium donianum (Hook. & Arn.) Seckt
Sin.: *Actinea doniana* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Cephalophora doniana* Hook. & Arn., *Gaillardia doniana* (Hook. & Arn.) Griseb., *Helenium donianum* (Hook. & Arn.) Cabrera, comb. superfl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993a; Bierner, M. W., 1987; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Seckt, H. K. F. H., 1929–1930.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21194* (LP)].

Helenium donianum (Hook. & Arn.) Seckt var. *linearifolium* (Kuntze) Bierner = **Helenium argentinum** Ariza
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Helenium foliosum (Phil.) Cabrera = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium glaucum (Cav.) Stuntz
Sin.: *Cephalophora berteroana* Phil., *Cephalophora borchersii* Phil., *Cephalophora foliosa* Phil., *Cephalophora glauca* Cav., *Cephalophora gracilis* Phil., *Cephalophora plantaginea* DC., *Cephalophora plantaginea* DC. var. *spathulata* (F. Phil.) Reiche, *Cephalophora punctata* Klatt, *Cephalophora rigida* Phil., *Cephalophora spathulata* F. Phil., *Cephalophora stolpii* Phil., *Ethulia repanda* Nees ex DC., nom. nud., *Gaillardia glauca* (Cav.) Baill., *Heleniastrum glaucum* (Cav.) Kuntze, *Helenium borchersii* (Phil.) Cabrera, *Helenium foliosum* (Phil.) Cabrera, *Helenium gracile* (Phil.) Cabrera, *Helenium plantagineum* (DC.) J.F. Macbr., *Hymenopappus glaucus* (Cav.) Spreng.
Referencias: Bierner, M. W., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Krause s.n.* (SGO)].

Helenium gracile (Phil.) Cabrera = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium heterophyllum (Juss.) Malme = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987.

Helenium insulare (Phil.) Cabrera
Sin.: *Actinea insularis* (Phil.) Kuntze, *Cephalophora insularis* Phil.
Referencias: Bierner, M. W., 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Bianual. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volkmann, H. s.n.* (SGO)].

Helenium leguiffei (Phil.) J.F. Macbr. = **Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **leguiffei** (Phil.) Bierner
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium longiaristatum (Phil.) Cabrera = **Helenium urmenetae** (Phil.) Cabrera var. **urmenetae**
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Helenium mattfeldianum Herter, nom. superfl. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Helenium ovallense Bierner
Referencias: Bierner, M. W., 1978.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 200–400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bierner, M. W. 52399* (NY, US)].

Helenium plantagineum (DC.) J.F. Macbr. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz

Helenium radiatum (Less.) Bierner, comb. superfl. = **Helenium radiatum** (Less.) Seckt
Referencias: Bierner, M. W., 1987.

Helenium radiatum (Less.) Seckt
Sin.: *Actinea alternifolia* Spreng., nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss., *Actinea heterophylla* Juss. f. *bicolor* Kuntze, nom. superfl., *Actinea heterophylla* Juss. var. *dentata* Kuntze, nom. superfl., *Actinea radiata* (Less.) Kuntze, *Actinella heterophylla* (Juss.) Pers., comb. superfl., *Cephalophora heterophylla* (Juss.) Less., *Cephalophora radiata* Less., *Helenium alternifolium* (Spreng.) Cabrera, *Helenium heterophyllum* (Juss.) Malme, *Helenium mattfeldianum* Herter, nom. superfl., *Helenium radiatum* (Less.) Bierner, comb. superfl.
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Cabrera, A. L., et al., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI, SFE); URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bayer, R. J. 2006* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2527* (LP)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Augusto, 1946).

[Helenium tinctorium (Molina) J.F. Macbr.]
Sin.: *Cephalophora tinctoria* (Molina) Gunckel
Referencias: Bierner, M. W., 1978.
Notas: Nombre dudoso.

[Helenium tinctorium (Molina) J.F. Macbr.]
Sin.: *Heleniastrum tinctorium* (Molina) Kuntze, *Santolina tinctoria* Molina

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var. **leguiffei** (Phil.) Bierner
Sin.: *Cephalophora leguiffei* Phil., *Cephalophora peraltae* Phil., *Helenium leguiffei* (Phil.) J.F. Macbr.
Referencias: Bierner, M. W., 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 300–1300 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3408* (LP)].

Helenium urmenetae (Phil.) Cabrera var. **urmenetae**
Sin.: *Cephalophora setigera* Phil., *Cephalophora urmenatae* Phil., *Helenium longiaristatum* (Phil.) Cabrera
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bierner, M. W., 1978.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 3768* (LP)].

Helenium vallenariense (Phil.) Bierner
Sin.: *Cephalophora vallenariense* Phil.
Referencias: Bierner, M. W., 1978.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 400–1200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rojas, G. s.n.* (SGO)].

Helianthopsis mollis (Griseb.) Sala & Echarte = **Viguiera mollis** Griseb.

Helianthus L.

Número de especies: 4 introducidas

Helianthus annuus L.
Sin.: *Helianthus aridus* Rydb., *Helianthus erythrocarpus* Barth, *Helianthus indicus* L., *Helianthus lenticularis* Douglas, *Helianthus macrocarpus* DC., *Helianthus multiflorus* Hook., *Helianthus ovatus* Lehm., *Helianthus platycephalus* Cass., *Helianthus tubaeformis* Nutt.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, LPA, SDE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 21470* (CORD)].

Helianthus araucanus Phil. = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Helianthus argentinus A.A. Sáenz = **Viguiera mollis** Griseb.
Referencias: Panero, J. L., 1992.

Helianthus aridus Rydb. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus atacamensis Phil. = **Viguiera pazensis** Rusby
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

[Helianthus australis Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Helianthus besserianus (Meyen & Walp.) Benth. & Hook. = **Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Helianthus campestris (Griseb.) Kuntze = **Flourensia campestris** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Helianthus copiapinus Phil. = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Helianthus erythrocarpus Barth = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus esculentus Warsz. = **Helianthus tuberosus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus glutinosus Hook. & Arn. = **Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Helianthus heteropappus Gillies ex Hook. & Arn. = **Viguiera gilliesii** (Hook. & Arn.) Hieron.
Referencias: Blake, S. F., 1918; Sáenz, A. A., 1979.

Helianthus indicus L. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus integrifolius Nutt. = **Helianthus petiolaris** Nutt.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus integrifolius Nutt. var. *gracilis* Nutt. = **Helianthus petiolaris** Nutt.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus laetiflorus Pers.
Sin.: *Helianthus laetiflorus* Pers. var. *tricuspis* Torr. & A. Gray, *Helianthus scaberrimus* Elliott, *Helianthus tricuspis* Elliott
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Sala, C. A., Echarte, A. M. & Rodríguez, R., 1990.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Echarte, A. M. 135* (BAL)].

Helianthus laetiflorus Pers. var. *tricuspis* Torr. & A. Gray = **Helianthus laetiflorus** Pers.
Referencias: Sala, C. A., Echarte, A. M. & Rodríguez, R., 1990.

Helianthus laevis L. = **Bidens laevis** (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Helianthus lanceolatus Meyen = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Helianthus lenticularis Douglas = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus macrocarpus DC. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus multiflorus Hook. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus ovatus Lehm. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus patens Lehm. = **Helianthus petiolaris** Nutt.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus petiolaris Nutt.
Sin.: *Helianthus integrifolius* Nutt., *Helianthus integrifolius* Nutt. var. *gracilis* Nutt., *Helianthus patens* Lehm., *Helianthus petiolaris* Nutt. var. *patens* Rydb., *Helianthus praecox* Engelm. & A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 3164* (CORD)].

Helianthus petiolaris Nutt. var. *patens* Rydb. = **Helianthus petiolaris** Nutt.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus platycephalus Cass. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus praecox Engelm. & A. Gray = **Helianthus petiolaris** Nutt.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus procumbens Pers. = **Viguiera procumbens** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Helianthus revolutus Meyen = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Helianthus riparia (Griseb.) Kuntze = **Flourensia riparia** Griseb.
Referencias: Dillon, M. O., 1984.

Helianthus scaberrimus Elliott = **Helianthus laetiflorus** Pers.
Referencias: Sala, C. A., Echarte, A. M. & Rodríguez, R., 1990.

Helianthus serotinus Tausch = **Helianthus tuberosus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus thurifera Molina = **Flourensia thurifera** (Molina) DC.

Helianthus tricuspis Elliott = **Helianthus laetiflorus** Pers.
Referencias: Sala, C. A., Echarte, A. M. & Rodríguez, R., 1990.

Helianthus tubaeformis Jacq. = **Tithonia tubaeformis** (Jacq.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; La Duke, J. C., 1982; Zardini, E. M., 1974.

Helianthus tubaeformis Nutt. = **Helianthus annuus** L.
Referencias: Watson, E. E., 1929.

Helianthus tuberosus L.
Sin.: *Helianthus esculentus* Warsz., *Helianthus serotinus* Tausch
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Watson, E. E., 1929.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sáenz, A. A. 1539* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1411* (MVFA)].

Helichrysum montevidense Spreng. = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Helichrysum retusum Spreng. = **Facelis retusa** (Lam.) Sch. Bip. subsp. **retusa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.

Helminthia echioides (L.) Gaertn. = **Picris echioides** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Helminthia echioides (L.) Holub = **Picris echioides** L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Helminthotheca echioides (L.) Holub = **Picris echioides** L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Helogyne Nutt.

Número de especies: 2, 1 endémica

Helogyne apaloidea Nutt.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Nativa. 700–3200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 97* (CONC)].

Helogyne macrogyne (Phil.) B.L. Rob.
Sin.: *Brachyandra macrogyne* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 2000–3800 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Helogyne tacaquirensis Hieron. = **Eupatorium tacaquirense** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.

Heterochaeta hispida DC. = **Hysterionica jasionoides** Willd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Heterocondylus amphidictyus (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium amphidictyum** DC.

Heterocondylus grandis (Sch. Bip. ex Baker) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium grande** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Heterocondylus lysimachioides (Chodat) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lysimachioides** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Heterocondylus reitzii R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium agrigaudium** Cabrera

Heterocondylus vitalbae (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium vitalbae** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Heterolepis conyzoides Bertero ex DC. = **Senecio adenotrichius** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Heterosperma Cav.

Número de especies: 4

Heterosperma diversifolium Kunth
Sin.: *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *depressum* (Griseb.) Kuntze, *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *diversifolia* (Kunth) Kuntze, *Heterospermum depressum* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11237* (CORD, MCNS)].

Heterosperma diversifolium Kunth var. *tenuisectum* Griseb. = **Heterosperma tenuisectum** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Heterosperma involucratum (Phil.) Reiche = **Heterosperma nanum** (Nutt.) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma nanum (Nutt.) Sherff
Sin.: *Bidens involucrata* Phil., *Heterosperma involucratum* (Phil.) Reiche, *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *involucratum* Kuntze, *Microdonta nana* Nutt.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hierba. Anual. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6024* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 118* (CONC)].

Heterosperma ovatifolium Cav.
Sin.: *Bidens rhombifolia* Sch. Bip., *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *maritimum* (Kunth) Kuntze, *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *ovatifolium* (Cav.) Kuntze, *Heterosperma rhombifolium* (Sch. Bip.) Griseb., *Heterospermum maritimum* Kunth, *Heterospermum ovatum* Willd.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Covas, G., 1984a.
Hierba. Anual. Nativa. 500–3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 190* (CORD)]; CHL[*Ricardi, M. 385* (CONC)].

Heterosperma pinnatum Kunth var. *biternatum* Kuntze = **Heterosperma tenuisectum** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma pinnatum Kunth var. *depressum* (Griseb.) Kuntze = **Heterosperma diversifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma pinnatum Kunth var. *diversifolia* (Kunth) Kuntze = **Heterosperma diversifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma pinnatum Kunth var. *involucratum* Kuntze = **Heterosperma nanum** (Nutt.) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma pinnatum Kunth var. *maritimum* (Kunth) Kuntze = **Heterosperma ovatifolium** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma pinnatum Kunth var. *ovatifolium* (Cav.) Kuntze = **Heterosperma ovatifolium** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978.

Heterosperma rhombifolium (Sch. Bip.) Griseb. = **Heterosperma ovatifolium** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Heterosperma tenuisectum (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Heterosperma diversifolium* Kunth var. *tenuisectum* Griseb., *Heterosperma pinnatum* Kunth var. *biternatum* Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 2441* (CORD)].

Heterospermum depressum Griseb. = **Heterosperma diversifolium** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterospermum maritimum Kunth = **Heterosperma ovatifolium** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Heterospermum ovatum Willd. = **Heterosperma ovatifolium** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978.

Heterothalamulopsis Deble, A.S. Oliveira & Marchiori

Número de especies: 1 endémica

Heterothalamulopsis wagenitzii (F.H. Hellwig) Deble, A.S. Oliveira & Marchiori
Sin.: *Heterothalamus wagenitzii* F.H. Hellwig
Referencias: Deble, L. P., Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005b.
Subarbusto. Endémica. 1000–1900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 54522* (B), *Reitz, P. R. 2632* (LP)].

Heterothalamus Less.

Número de especies: 3 endémicas

Heterothalamus acaulis Wedd. ex R.E. Fr. = **Baccharis acaulis** (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Heterothalamus alienus (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Baccharis aliena* (Spreng.) Joch.Müll., *Heterothalamus brunioides* Less., *Marshallia aliena* Spreng.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Deble, L. P., Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005b; Giuliano, D. A., 2000; Malme, G. O. A., 1933b; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(COR, LRI, SLU); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 105* (LP)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6430* (LP), *Reitz, P. R. 7821* (HAS, HBR, RB)]; URY[*Fabris, H. A. 7898* (LP), *Pedersen, T. M. 3580* (LP)].

Heterothalamus boliviensis Wedd. = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Heterothalamus boliviensis Wedd. var. *latifolia* R.E. Fr. = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **latifolia** (R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Heterothalamus brunioides Less. = **Heterothalamus alienus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Giuliano, D. A., 2000.

Heterothalamus nivalis Wedd. = **Baccharis nivalis** (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Heterothalamus psiadioides Less.
Sin.: *Baccharis czermakii* Hochr., *Baccharis psiadioides* (Less.) Joch.Müll.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976; Deble, L. P., Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 1980* (SI), *Deble, L. P. 1983* (SI), *Klein, R. M. 9226* (FLOR, HBR, RB), *Rambo, B. 27093* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 5340* (LP), *Rosengurtt, B. 4838b* (LP)].

Heterothalamus rupestris Deble, A.S. Oliveira & Marchiori
Referencias: Deble, L. P., Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2003, 2005b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Deble, L. P. 505* (SI)].

Heterothalamus spartioides Hook. & Arn. ex DC. = **Baccharis spartioides** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Heterothalamus tenellus (Hook. & Arn.) Kuntze = **Baccharis tenella** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Heterothalamus trinervis (Pers.) Hook. & Arn. = **Baccharis trinervis** Pers.

Heterothalamus wagenitzii F.H. Hellwig = **Heterothalamulopsis wagenitzii** (F.H. Hellwig) Deble, A.S. Oliveira & Marchiori

Heterotheca Cass.

Número de especies: 1 introducida

Heterotheca deltoidea Klatt = **Munnozia hastifolia** (Poepp.) H. Rob. & Brettell
Referencias: Robinson, H. E., 1983.

Heterotheca latifolia Buckley = **Heterotheca subaxillaris** (Lam.) Britton & Rusby
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby
Sin.: *Heterotheca latifolia* Buckley, *Inula subaxillaris* Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 3165* (CORD)].

Hieracium L.

Número de especies: 47, 29 endémicas, 4 introducidas

Hieracium achalense Sleumer
Sin.: *Hieracium champaquiense* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2200 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 8407* (LP)].

Hieracium adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Sin.: *Hieracium chilense* Less. var. *adenocephalum* (Sch. Bip.) Griseb., *Hieracium mandonii* Britton, hom. illeg., *Pilosella adenocephala* Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Ruggiero, A., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18233* (LP)].

Hieracium adenocephalum (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *subsetulosa* Zahn = **Hieracium streptochaetum** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium andinum Phil. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium antarcticum d'Urv.
Sin.: *Hieracium andinum* Phil., *Hieracium antarcticum* d'Urv. var. *fueguiensis* Speg., *Hieracium antarcticum* d'Urv. var. *myostidifolium* (Sch. Bip.) Sleumer, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *andinum* (Phil.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *antarcticum* (d'Urv.) Zahn, *Hieracium gracile* Hook. subsp. *myosotidifolium* (Sch. Bip.) Zahn, *Hieracium magellanicum* Sch. Bip., *Hieracium myostidifolium* Sch. Bip., nom. nud., *Hieracium philippii* Alb., *Hieracium triste* Macloskie, hom. illeg., *Pilosella magellanica* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella myosotidifolia* (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1148* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6123* (LP)].

Hieracium antarcticum d'Urv. var. *fueguiensis* Speg. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium antarcticum d'Urv. var. *myostidifolium* (Sch. Bip.) Sleumer = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium argentinense Zahn
Sin.: *Hieracium argentinense* Zahn var. *sublorentzianum* Sleumer, *Hieracium frigidum* Wedd., *Hieracium subargentinense* Zahn var. *rufocomatulum* Sleumer, *Hieracium subargentinense* Zahn var. *subargentinense*
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956; Zahn, K. H., 1921–1923.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 3903* (LP)].

Hieracium argentinense Zahn var. *sublorentzianum* Sleumer = **Hieracium argentinense** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium astroadenium Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 5227* (LP)].

Hieracium aurantiacum L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 538* (LP), *Ulibarri, E. A. 1231* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 5333* (CONC)].

Hieracium austroamericanum Dahlst. = **Hieracium patagonicum** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium bangii Rusby = **Hieracium microcephalum** Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium bangii Rusby var. *siambonicum* Zahn = **Hieracium microcephalum** Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium bangii Rusby subsp. *austroboliviense* Zahn = **Hieracium microcephalum** Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium bangii Rusby subsp. *niederleinii* Zahn = **Hieracium niederleinii** (Zahn) Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium boliviense (Wedd.) Sch. Bip. var. *setosopilosum* Kuntze = **Hieracium tucumanicum** (Zahn) Sleumer var. **tucumanicum**
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium boliviense (Wedd.) Sch. Bip. var. *stachyoideum* (Arv.-Touv.) Zahn = **Hieracium stachyoideum** Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium boliviense (Wedd.) Sch. Bip. subsp. *tucumanicum* Zahn = **Hieracium tucumanicum** (Zahn) Sleumer var. **tucumanicum**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hieracium burkartii Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4722* (LP, SI)].

Hieracium catamarcense Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3489* (LIL)].

Hieracium chacoënse (Zahn) Sleumer
Sin.: *Hieracium paraguayense* Arv.-Touv. var. *chacoënse* Zahn
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Proyecto Ventania 425* (LP)].

Hieracium champaquiense Sleumer = **Hieracium achalense** Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium chiclense Ball = **Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium chilense Ball = **Hieracium glaucifolium** Poepp. ex Froel.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium chilense Skottsb., hom. illeg. = **Hieracium glaucifolium** Poepp. ex Froel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium chilense Less.
Sin.: *Hieracium gayanum* Arv.-Touv., *Hieracium orthotrichum* R.E. Fr., *Pilosella chilensis* (Less.) F.W. Schultz & Sch. Bip., *Pilosella orthotricha* (R.E. Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5137* (LP)]; CHL[*Philippi, O. s.n.* (G, S, US), *Ricardi, M. 5739* (CONC)].

Hieracium chilense Less. var. *adenocephalum* (Sch. Bip.) Griseb. = **Hieracium adenocephalum** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hieracium chilense Less. var. *navarinum* Zahn
= **Hieracium patagonicum** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium chubutense Speg. = **Hieracium glaucifolium** Poepp. ex Froel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium cienegae Zahn
Referencias: Sleumer, H. O., 1956; Zahn, K. H., 1921–1923.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2061* (LP)].

Hieracium commersonii Monnier var. **commersonii**
Sin.: *Hieracium polygonatum* Zahn, *Hieracium semiglabratum* Comm., hom. illeg., *Hieracium semiglabratum* Vahl ex Froel., *Hieracium uruguayense* Arv.-Touv., *Pilosella semiglabrata* (Comm.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1279* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 2309* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 4998* (LP)].

Hieracium commersonii Monnier var. *lorentzii* Malme
= **Hieracium commersonii** Monnier var. **megapotanicum**

Hieracium commersonii Monnier var. **megapotanicum**
Sin.: *Hieracium commersonii* Monnier var. *lorentzii* Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 584* (S)].

Hieracium cordobense Sleumer
Sin.: *Hieracium cordobense* Sleumer var. *mollisetum* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 6440* (LP)].

Hieracium cordobense Sleumer var. *mollisetum* Sleumer
= **Hieracium cordobense** Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium criniceps Sleumer
Sin.: *Hieracium petrophyes* Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 8239* (CORD)].

Hieracium dasychaetocomum Zahn
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Zahn, K. H., 1921–1923.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4715 p.p.* (LP)].

Hieracium eriadenium Sleumer
Sin.: *Hieracium eriadenium* Sleumer var. *subadenocephalum* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3024a* (LP)].

Hieracium eriadenium Sleumer var. *subadenocephalum* Sleumer = **Hieracium eriadenium** Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.

Hieracium eriosphaerophorum Zahn = **Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium fiebrigianum Zahn = **Hieracium fulvipes** Wedd.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium flagellare Willd.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Petrak, F. s.n.* (LIL)].

Hieracium frigidum Wedd. = **Hieracium argentinense** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium frigidum Wedd. var. *elatius* Griseb.
= **Hieracium niederleinii** (Zahn) Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium fulvipes Wedd.
Sin.: *Hieracium fiebrigianum* Zahn, *Hieracium fulvipes* Wedd. var. *nigerrimum* Sleumer, *Hieracium lagopus* Soest non Don, *Pilosella fulvipes* (Wedd.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23690* (LP)].

Hieracium fulvipes Wedd. var. *nigerrimum* Sleumer
= **Hieracium fulvipes** Wedd.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium gayanum Arv.-Touv. = **Hieracium chilense** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium giganteum Sleumer
Sin.: *Hieracium giganteum* Sleumer var. *canofloccosum* Sleumer, *Hieracium giganteum* Sleumer var. *setulosum* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10487* (LP)].

Hieracium giganteum Sleumer var. *setulosum* Sleumer = **Hieracium giganteum** Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium gilliesianum Sleumer
Sin.: *Hieracium sordidum* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud.
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6372* (LP)].

Hieracium glaucifolium Poepp. ex Froel.
Sin.: *Hieracium chilense* Ball, *Hieracium chilense* Skottsb., hom. illeg., *Hieracium chubutense* Speg., *Pilosella glaucifolia* (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2135* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2422* (LP)].

Hieracium gracile Hook. subsp. *andinum* (Phil.) Zahn = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium gracile Hook. subsp. *antarcticum* (d'Urv.) Zahn = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium gracile Hook. subsp. *myosotidifolium* (Sch. Bip.) Zahn = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium ignatianum Baker
Hierba. Perenne. Endémica. 400–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10390* (LP)].

Hieracium ignatianum Baker var. *paraguense* (Baker) Zahn = **Hieracium paraguayense** Arv.-Touv.
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.

Hieracium incertum d'Urv. = **Erigeron incertus** (d'Urv.) Skottsb.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium jaretanum (Zahn) Sleumer
Sin.: *Hieracium streptochaetum* Zahn subsp. *jaretanum* Zahn
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 801* (CORD)].

Hieracium kieslingii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1486* (SI)].

Hieracium lagopus Soest non Don = **Hieracium fulvipes** Wedd.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium lorentzianum Zahn
Sin.: *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *pilosissimum* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956; Zahn, K. H., 1921–1923.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2030* (LIL, M, S)].

Hieracium lorentzianum Zahn var. *pilosissimum* Sleumer = **Hieracium lorentzianum** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium lorentzianum Zahn var. *subtucumanicum* Zahn = **Hieracium niederleinii** (Zahn) Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium luteomontanum Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Ruggiero, A., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1485* (SI)].

Hieracium magellanicum Sch. Bip. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium mandonii Britton, hom. illeg. = **Hieracium adenocephalum** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hieracium mandonii (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Sin.: *Hieracium chiclense* Ball, *Hieracium eriosphaerophorum* Zahn, *Hieracium mandonii* (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *pseudargentinense* (Sleumer) Cabrera, *Hieracium pseudargentinense* Sleumer, *Hieracium sanctae-victoriae* Sleumer, *Pilosella mandonii* Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16929* (LP)].

Hieracium mandonii (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *pseudargentinense* (Sleumer) Cabrera = **Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

[Hieracium megalochaetum Zahn]
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hieracium mendocinum Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Melis 78* (LIL)].

Hieracium microcephalum Sch. Bip.
Sin.: *Hieracium bangii* Rusby, *Hieracium bangii* Rusby subsp. *austroboliviense* Zahn, *Hieracium bangii* Rusby var. *siambonicum* Zahn, *Hieracium microcephalum* Sch. Bip. var. *subglandulosum* Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Ruggiero, A., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12010* (LIL, LP, SI)].

Hieracium microcephalum Sch. Bip. var. *subglandulosum* Sleumer = **Hieracium microcephalum** Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium mosenii Malme
Sin.: *Hieracium warmingii* Baker var. *lechleri* Zahn
Referencias: Malme, G. O. A., 1931; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 4615* (LIL)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 3262* (S)].

Hieracium murorum L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 454* (LP)].

Hieracium myostidifolium Sch. Bip., nom. nud. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium neofurcatum Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Ruggiero, A., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 269* (LP)].

Hieracium niederleinii (Zahn) Sleumer
Sin.: *Hieracium bangii* Rusby subsp. *niederleinii* Zahn, *Hieracium frigidum* Wedd. var. *elatius* Griseb., *Hieracium lorentzianum* Zahn var. *subtucumanicum* Zahn, *Hieracium niederleinii* (Zahn) Sleumer var. *subcatamarcense* Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3973* (LIL)].

Hieracium niederleinii (Zahn) Sleumer var. *subcatamarcense* Sleumer = **Hieracium niederleinii** (Zahn) Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium orthotrichum R.E. Fr. = **Hieracium chilense** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium padcayense Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 535* (LP)].

Hieracium palezieuxii Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, LPA, SFE); BRA(RGS); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 38775* (LIL)]; URY[*Cabrera, A. L. 3205* (LP)].

Hieracium paraguayense Arv.-Touv.
Sin.: *Hieracium ignatianum* Baker var. *paraguense* (Baker) Zahn, *Hieracium paraguense* Baker
Referencias: Ruggiero, A., 1999; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 2002* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 10390* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 6623* (LP)].

Hieracium paraguayense Arv.-Touv. var. *chacoënse* Zahn = **Hieracium chacoënse** (Zahn) Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Hieracium paraguense Baker = **Hieracium paraguayense** Arv.-Touv.
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.

Hieracium patagonicum Hook. f.
Sin.: *Hieracium austroamericanum* Dahlst., *Hieracium chilense* Less. var. *navarinum* Zahn, *Hieracium poeppigianum* Zahn, *Pilosella patagonica* (Hook. f.) F.W. Schultz & Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16386* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 5799* (LP)].

Hieracium petrophyes Sleumer = **Hieracium criniceps** Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium philippii Alb. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium pilosella L. subsp. **euronotum** Nägeli & Peter
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Moore, D. M. 148* (SI)].

Hieracium poeppigianum Zahn = **Hieracium patagonicum** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium polygonatum Zahn = **Hieracium commersonii** Monnier var. **commersonii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Ruggiero, A., 1999.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 2952* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 505* (CONC)].

Hieracium pseudargentinense Sleumer = **Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium sanctae-victoriae Sleumer = **Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium schreiteri Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–5000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5684* (LIL)].

Hieracium semiglabratum Comm., hom. illeg. = **Hieracium commersonii** Monnier var. **commersonii**
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.

Hieracium semiglabratum Vahl ex Froel. = **Hieracium commersonii** Monnier var. **commersonii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Hieracium sordidum Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud. = **Hieracium gilliesianum** Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium sordidum Griseb.
Sin.: *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subglandulosum* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003; Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3497* (LIL)].

Hieracium sordidum Griseb. var. *subfrigidum* Griseb. = **Hieracium streptochaetum** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium sordidum Griseb. var. *subglandulosum* Sleumer = **Hieracium sordidum** Griseb.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium stachyoideum Arv.-Touv.
Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *stachyoideum* (Arv.-Touv.) Zahn, *Mandonia pilosella* Sch. Bip.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 4045* (LIL)].

Hieracium streptochaetum Zahn
Sin.: *Hieracium adenocephalum* (Sch. Bip.) Arv.-Touv. var. *subsetulosa* Zahn, *Hieracium sordidum* Griseb. var. *subfrigidum* Griseb., *Hieracium streptochaetum* Zahn f. *floccosius* Sleumer, *Hieracium streptochaetum* Zahn var. *epilosum* Sleumer
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25160* (LP)].

Hieracium streptochaetum Zahn f. *floccosius* Sleumer = **Hieracium streptochaetum** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium streptochaetum Zahn var. *epilosum* Sleumer = **Hieracium streptochaetum** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium streptochaetum Zahn subsp. *jaretanum* Zahn = **Hieracium jaretanum** (Zahn) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.

Hieracium subargentinense Zahn var. *rufocomatulum* Sleumer = **Hieracium argentinense** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium subargentinense Zahn var. *subargentinense* = **Hieracium argentinense** Zahn
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hieracium tandilense Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Job, M. M. 1286* (LP)].

Hieracium triste Macloskie, hom. illeg. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hieracium tucumanicum (Zahn) Sleumer var. **esetosum** Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2050* (LIL)].

Hieracium tucumanicum (Zahn) Sleumer var. **tucumanicum**
Sin.: *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. subsp. *tucumanicum* Zahn, *Hieracium boliviense* (Wedd.) Sch. Bip. var. *setosopilosum* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4715 p.p.* (LP)].

Hieracium uruguayense Arv.-Touv. = **Hieracium commersonii** Monnier var. **commersonii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Hieracium urvillei Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11607* (LP)].

Hieracium variegatum Lam. = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hieracium vervoorstii Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–2500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3492* (LIL)].

Hieracium warmingii Baker var. *lechleri* Zahn = **Hieracium mosenii** Malme
Referencias: Sleumer, H. O., 1956.

Hinterhubera kotschyi Sch. Bip. ex Hochst. = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner

Hinterhubera scoparia (Phil.) Cabrera = **Guynesomia scoparia** (Phil.) Bonifacino & Sancho
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2004.

Hippia minuta L. f. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960, 1978.

Hippia stolonifera Brot. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Holocheilus Cass.

Número de especies: 7, 5 endémicas

Holocheilus brasiliensis (L.) Cabrera
Sin.: *Cacalia scabra* Vahl, *Cleanthes brasiliensis* (L.) D. Don, *Cleanthes ochroleuca* (Cass.) Parodi, *Cleanthes othonoides* (Less.) Griseb., *Holocheilus ochroleucus* Cass., *Leuceria echioides* D. Don, *Perdicium brasiliense* L., *Perezia ochroleuca* (Cass.) Less., *Platycheilus ochroleucus* Cass., *Trixis brasiliensis* (L.) DC., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Trixis brasiliensis* (L.) DC. var. *sellowii* (Less.) Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn., *Trixis othonoides* Less., *Trixis sellowii* Less. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1968; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schiller, W. s.n.* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 27132* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 4518* (CTES, FCQ)]; URY[*Cabrera, A. L. 3888* (LP)].

Holocheilus fabrisii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2960* (LP)].

Holocheilus hieracioides (D. Don) Cabrera
Sin.: *Cleanthes hieracioides* D. Don, *Cleanthes hieracioides* D. Don var. *thrincioides* Griseb., *Leuceria conyzoides* D. Don, *Leuceria thrincioides* Griseb., *Trixis hieracioides* (D. Don) DC., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *incisa* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *pusilla* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *robusta* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. f. *subintegra* Hassl., *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *hieracioides* (D. Don) Kuntze, *Trixis ochroleuca* (Cass.) Hook. & Arn. var. *thrincioides* (Griseb.) Kuntze, *Trixis ochroleuca* Baker, hom. illeg., *Trixis sonchoides* Chodat, *Trixis thrincioides* (Griseb.) Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, ITA, PHA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, FLO, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13655* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 8414* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3191* (LP)].

Holocheilus illustris (Vell.) Cabrera
Sin.: *Castra illustris* Vell., *Trixis denticulata* Dusén ex Malme, *Trixis hieronymi* Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1968; Herter, W. G. F., 1930; Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(PAY, RIV, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Torres, M. A. 94* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 8140* (LP)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Holocheilus monocephalus C.A. Mondin
Referencias: Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Mondin, C. A., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mondin, C. A. 982* (ICN)].

Holocheilus ochroleucus Cass. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Holocheilus pinnatifidus (Less.) Cabrera
Sin.: *Trixis pinnatifida* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1968; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18192* (LP)].

Holocheilus schulzii (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Trixis schulzii* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1353* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 15181* (LP)]; PRY[*Woolston, A. L. 854* (SI)].

Homanthis multiflorus (Humb. & Bonpl.) Kunth = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus bellidifolius Phil. = **Perezia bellidifolia** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus brevicaulis Phil. = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus calophyllus Phil. = **Perezia calophylla** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus capito Phil. = **Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus humilis Phil. = **Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus nivalis Phil. = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus remyanus Phil. = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus rigidus Phil. = **Perezia linearis** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus triceps Phil. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoeanthus variabilis Phil. = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus ambiguus Cass. = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus cubataensis (Less.) DC. = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus donianus (Less.) J. Remy = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus echinulatus Cass. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus gayanus J. Remy = **Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus inermis Meyen & Walp., nom. illeg. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus laevis (Less.) DC. = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus linearis (Less.) DC. = **Perezia linearis** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus lyratus J. Remy = **Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus magellanicus (Lam.) DC. = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus magellanicus (Lam.) DC. var. *lactucoides* (Vahl) Hook. = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**

Homoianthus multiflorus (Humb. & Bonpl.) DC. = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus palustris Phil. = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **palustris** (Phil.) Vuilleum.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus patagonicus Gand. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus pectinatus Phil. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus pectinellus Gand. = **Perezia linearis** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus pristiphyllus J. Remy = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus squarrosus (Vahl) DC. = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Homoianthus viscosus (Less.) DC. = **Perezia spathulata** (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hoorebekia chiloense Cornel. = **Grindelia chiloensis** (Cornel.) Cabrera
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 1999a; Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b; Cabrera, A. L., 1931.

Huarpea Cabrera

Número de especies: 1 endémica

Huarpea andina Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1951a; Urtubey, E., 1996.
Subarbusto. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8573* (LP)].

Hyalis D. Don ex Hook. & Arn.

Número de especies: 2, 1 endémica

Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. **argentea**
Sin.: *Plazia argentea* (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b; Freire, S. E., 1996.
Subarbusto. Endémica. 700–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 3701* (LP)].

Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. **latisquama** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b, 1963a, 1971a; Freire, S. E., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 3579* (LP)].

Hyalis argentea D. Don ex Hook. & Arn. var. **macrosperma** F.A. Roig
Referencias: Freire, S. E., 1996; Roig, F. A., 1971.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 6371* (MERL)].

Hyalis lancifolia Baker
Sin.: *Hyalis lorentzii* Hieron., *Plazia acaciifolia* J. Kost.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E., 1996.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4083* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2867* (LP)].

Hyalis lorentzii Hieron. = **Hyalis lancifolia** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hyalis spartioides (Wedd.) Griseb. = **Aphyllocladus spartioides** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Hyaloseris Griseb.

Número de especies: 4, 3 endémicas

Hyaloseris andrade-limae Cristóbal & Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Delucchi, G. 2053* (LP)].

Hyaloseris camataquiensis Kosterm.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cárdenas, H. M. 11* (LP)].

Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. **cinerea**
Sin.: *Gochnatia cinerea* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 300–2400 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 1771* (LP)].

Hyaloseris cinerea (Griseb.) Griseb. var. **tomentella** Griseb.
Sin.: *Hyaloseris tomentella* (Griseb.) Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 700–1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 9335* (LP)].

Hyaloseris rubicunda Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 1300–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)].

Hyaloseris salicifolia (Griseb.) Hieron. = **Dinoseris salicifolia** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d; Cabrera, A. L., 1978.

Hyaloseris tomentella (Griseb.) Hieron. = **Hyaloseris cinerea** (Griseb.) Griseb. var. **tomentella** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973d.

Hymenatherum belenidium DC. = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969, 1986.

Hymenatherum candolleanum Hook. & Arn. = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Strother, J. L., 1969.

Hymenatherum kunthii Less. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Hymenatherum thurberi A. Gray = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Hymenopappus anthemoides Juss. = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Parker, K. F., 1962.

Hymenopappus glaucus (Cav.) Spreng. = **Helenium glaucum** (Cav.) Stuntz
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Hymenopholis imbricata Gardner = **Lucilia lycopodioides** (Less.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1989.

Hymenostephium Benth.

Número de especies: 1

Hymenostephium debile (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Viguiera cabrerae* H. Rob., *Viguiera debilis* (Cabrera) Ariza, *Wulffia debilis* Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11029* (CORD, MCNS)].

Hymenoxys Cass.

Número de especies: 4, 1 endémica

Hymenoxys anthemoides (Juss.) Cass.
Sin.: *Actinea anthemoides* (Juss.) Kuntze, *Actinea haenkeana* (DC.) Kuntze, *Actinella anthemidoides* (Juss.) Malme, comb. superfl., *Actinella anthemoides* (Cass.) Herter, nom. illeg., *Actinella anthemoides* (Juss.) A. Gray, *Hymenopappus anthemoides* Juss., *Hymenoxys haenkeana* DC., *Hymenoxys parodii* Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gutiérrez, D. G. & Katinas, L., 2003; Parker, K. F., 1962.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(PHA); URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Haene, E. 863* (LP)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2250* (P)]; PRY[*Degen, R. 3390* (FCQ)]; URY[*Chebataroff, J. 300* (LP)].

Hymenoxys cabrerae K.L. Parker
Referencias: Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Parker, K. F., 1962.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6663* (LP)].

Hymenoxys haenkeana DC. = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Hymenoxys parodii Johnst. = **Hymenoxys anthemoides** (Juss.) Cass.
Referencias: Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Hymenoxys robusta (Rusby) K.L. Parker
Sin.: *Cephalophora robusta* Rusby
Referencias: Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15031* (LP)].

Hymenoxys tweediei Hook. & Arn.
Sin.: *Actinea tweediei* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Actinella tweediei* (Hook. & Arn.) Malme
Referencias: Bierner, M. W., 1987; Parker, K. F., 1962; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(FLO, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12444* (LP)]; BRA[*Tweedie, J. s.n.* (K)]; URY[*Arechavaleta, J. 47* (K)].

Hyoseris cretica L. = **Hedypnois cretica** (L.) Dum. Cours.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Hyoseris taraxacoides Vill. = **Leontodon taraxacoides** (Vill.) Mérat
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Hyoseris tenella Poepp. = **Microseris pygmaea** D. Don
Referencias: Reiche, C. F., 1910a.

Hypelichrysum heterotrichum (Phil.) Kirp.
= **Gnaphalium heterotrichum** Phil.
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1991.

Hypochaeris L.

Número de especies: 52, 38 endémicas, 2 introducidas

Hypochaeris acaulis (J. Remy) Britton
Sin.: *Achyrophorus acaulis* J. Remy
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(IV, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10379* (LP, SI)]; CHL[*Stuessy, T. F. 15703* (CONC, WU)].

Hypochaeris alba Cabrera
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1937a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 157* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 55459* (K)].

Hypochaeris albiflora (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Sin.: *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *albiflora* Kuntze, *Hypochaeris microcephala* (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005; Marchesi, E., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA, MIE, SPE); URY(LAV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 135* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 702* (RB)]; PRY[*Lourteig, A. 1905* (LP)]; URY[*Pedersen, T. M. 3614* (LP)].

Hypochaeris andina (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris apargioides Hook. & Arn.
Sin.: *Achyrophorus apargioides* (Hook. & Arn.) DC., *Hypochaeris berteri* Colla
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 15576* (CONC)].

Hypochaeris arenaria Gaudich.
Sin.: *Achyrophorus andinus* DC., *Achyrophorus arenarius* (Gaudich.) DC., *Achyrophorus humilis* Phil., *Achyrophorus psycrophilus* Wedd., *Achyrophorus webbii* Sch. Bip., nom. nud., *Hypochaeris andina* (DC.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera, *Hypochaeris humilis* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris psychrophila* (Wedd.) Reiche, *Hypochaeris pygmaea* Phil., *Hypochaeris ushuaiae* Skottsb., *Leontodon arenarius* (Gaudich.) Albov, *Seriola andina* DC., nom. nud.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25975* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2541* (LP)].

Hypochaeris arenaria Gaudich. var. *andina* (DC.) Cabrera = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris arenaria Gaudich. var. *coronopifolia* (Sch. Bip.) Speg. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris arenaria Gaudich. var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Speg. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris argentina Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2700 m.
Países: ARG(COR, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 142* (LP)].

[Hypochaeris barbata (Sch. Bip.) Reiche]
Sin.: *Achyrophorus barbatus* Sch. Bip.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hypochaeris berteri Colla = **Hypochaeris apargioides** Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *albiflora* Kuntze = **Hypochaeris albiflora** (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *chacoënsis* Hassl. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *microcephala* (Sch. Bip.) Baker = **Hypochaeris microcephala** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *sulfurea* Kuntze = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris brasiliensis (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *tweediei* (Hook. & Arn.) Baker = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris caespitosa Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 138* (LP)].

Hypochaeris catharinensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8695* (LP, US)].

Hypochaeris chilensis (Sch. Bip.) Britton = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1976b, 1978.

Hypochaeris chillensis (Kunth) Hieron.
Sin.: *Achyrophorus brasiliensis* (Less.) Sch. Bip., *Achyrophorus chilensis* Sch. Bip., *Achyrophorus chillensis* (Kunth) Sch. Bip., *Achyrophorus sagittatus* Phil., *Achyrophorus selloi* Sch. Bip., *Apargia chillensis* Kunth, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *chacoënsis* Hassl., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *sulfurea* Kuntze, *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *tweediei* (Hook. & Arn.) Baker, *Hypochaeris chilensis* (Sch. Bip.) Britton, *Hypochaeris tweediei* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Leontodon chilense* DC., *Porcellites brasiliensis* Less., *Seriola brasiliensis* Less., *Seriola tweediei* Hook. & Arn.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1976b, 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, GUA, MIE, PAI); URY(CAS, CLA, COL, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 137* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 2304* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 13021* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3188* (LP)].

Hypochaeris chondrilloides (A. Gray) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus chondrilloides* A. Gray, *Achyrophorus deserticola* Phil., *Achyrophorus glaucus* Phil., *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris glauca* (Phil.) Reiche f. *halofila* Hauman, *Hypochaeris halophila* (Hauman) Cabrera, *Oreophila chondrilloides* D. Don ex A. Gray, *Oreophila chondrilloides* Hook. & Arn., nom. nud.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 18072* (LP)]; CHL[*Eggli, U. 2622* (CONC), *Navas Bustamante, L. E. 2042* (LP)].

Hypochaeris chubutensis Bortiri
Referencias: Bortiri, E., 1997, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerling, G. F. 48* (SI)].

Hypochaeris clarionoides (J. Remy) Reiche
Sin.: *Achyrophorus clarionoides* J. Remy, *Achyrophorus microphyllus* J. Remy, *Hypochaeris clarionoides* (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera, *Hypochaeris microphylla* (J. Remy) Reiche, *Hypochaeris nanna* Phil., *Hypochaeris tenuifolia* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bortiri, E., 1997, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3400 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 9769* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 2500* (LP)].

Hypochaeris clarionoides (J. Remy) Reiche var. *microphylla* (J. Remy) Cabrera = **Hypochaeris clarionoides** (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris coronopifolia (Sch. Bip.) Franch. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris crysantha Poepp. ex DC. = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris cupressorum F. Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1894.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris deserticola Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Larrañaga, A. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris echegarayi Hieron.
Sin.: *Achyrophorus setosus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Griseb. var. *leucantha* Cabrera, *Hypochaeris ornata* J. Kost., *Hypochaeris setosa* (Wedd.) Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Hieronymus, G. H. E. W., 1881.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15393* (LP, NY)].

Hypochaeris elata (Wedd.) Griseb.
Sin.: *Achyrophorus elatus* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 18070* (LP, WU)].

Hypochaeris eremophila Cabrera
Sin.: *Distoecha taraxacoides* Phil.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 18064* (LP, WU)]; CHL[*Pisano, E. 1726* (LP)].

[Hypochaeris eriolaena (Sch. Bip.) Reiche]
Sin.: *Achyrophorus eriolaenus* Sch. Bip.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hypochaeris eurylepis Phil. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1978.

Hypochaeris foliosa (Phil.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus foliosus* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris gardneri (Sch. Bip.) Baker = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris gayana (DC.) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *gayanus* DC., *Hypochaeris philippii* Kuntze var. *glabrescens* Kuntze, *Hypochaeris tenerifolia* (J. Remy) Dusén var. *glabrescens* (Kuntze) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2116* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2550* (LP)].

Hypochaeris glabra L.
Sin.: *Hypochaeris minima* Willd. ex d'Urv., *Hypochaeris pumila* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Marchesi, E., com. pers.; Marticorena, C., com. pers.; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VII, VIII, IJF, RME); URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 123* (LP)]; BRA[*Bueno, R. s.n.* (ICN)]; CHL[*Marticorena, C. 39* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 3189* (MVFA)].

Hypochaeris glabrata Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Flühmann s.n.* (SGO)].

Hypochaeris glauca (Phil.) Reiche = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris glauca (Phil.) Reiche f. *halofila* Hauman = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris graminifolia Phil. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **linearifolia** (DC.) Bortiri
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris grandidentata (Phil.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus grandidentatus* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Hypochaeris grandiflora Phil. = **Hypochaeris toltensis** Reiche

Hypochaeris grisebachii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); URY(CAS, CLA, FLA, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6875* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 389* (LP)].

Hypochaeris halophila (Hauman) Cabrera = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris hirta Phil. = **Hypochaeris pilosa** Reiche

Hypochaeris hispidula Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1894.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris hookeri Phil. = **Hypochaeris montana** (Phil.) Reiche var. **hookeri** (Phil.) Bortiri
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris humilis (Phil.) Reiche = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris ibari Phil. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris incana (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Sin.: *Achyrophorus incanus* (Hook. & Arn.) Sch. Bip., *Achyrophorus leucanthus* Speg., *Hypochaeris incana* (Hook. & Arn.) Macloskie var. *leucantha* (Speg.) Cabrera, *Hypochaeris lanata* Dusén, *Hypochaeris leucantha* (Speg.) Speg., *Seriola incana* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 1163* (LP)]; CHL[*Rentzell, I. 6180* (LP)].

Hypochaeris incana (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip., *Achyrophorus coronopifolius* Sch. Bip. var. *integrifolius* Sch. Bip., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *coronopifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris arenaria* Gaudich. var. *integrifolia* (Sch. Bip.) Speg., *Hypochaeris coronopifolia* (Sch. Bip.) Franch., *Hypochaeris ibari* Phil., *Leontodon coronopifolium* (Sch. Bip.) Comm. ex Albov
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 8234* (CORD, LP)].

Hypochaeris incana (Hook. & Arn.) Macloskie var. *leucantha* (Speg.) Cabrera = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

[Hypochaeris jussieui (Sch. Bip.) Reiche]
Sin.: *Achyrophorus jusseui* Sch. Bip.
Notas: Nombre dudoso.

Hypochaeris laciniosa Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1894.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris lanata Dusén = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris lessingii (Sch. Bip.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus lessingii* Sch. Bip.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 2197* (LP)].

Hypochaeris leucantha (Speg.) Speg. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris lutea (Vell.) Britton
Sin.: *Achyrophorus bipontinae* Sch. Bip., *Achyrophorus brasiliensis* Gardner, nom. illeg., *Achyrophorus gardneri* Sch. Bip., *Achyrophorus trichocephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris gardneri* (Sch. Bip.) Baker, *Hypochaeris lutea* (Vell.) Britton var. *trichocephala* (Sch. Bip.) Cabrera, *Hypochaeris rosengurtii* Cabrera, *Prenanthes lutea* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b; Marchesi, E., com. pers.; Urtubey, E. & Stuessy, T. F., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA); URY(CLA, FLA, SJO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cabrera, A. L. 12290* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 27070* (CTES, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5754* (MVFA)].

Hypochaeris lutea (Vell.) Britton var. *trichocephala* (Sch. Bip.) Cabrera = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Hypochaeris megapotamica Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 134* (LP)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 20772* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 1062* (LP)].

Hypochaeris melanolepis Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1894.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Borchers, A. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb.
Sin.: *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp., *Achyrophorus meyenianus* (Walp.) Walp. var. *ciliatus* Wedd., *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Griseb. var. *brachylepis* Cabrera, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Griseb. var. *ciliata* (Wedd.) Perkins, *Hypochaeris meyeniana* (Walp.) Griseb. var. *eriolaenoides* Cabrera, *Oreophila meyeniana* Walp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 21107* (LP)].

Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb. var. *brachylepis* Cabrera = **Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Griseb.
Referencias: Urtubey, E., Stuessy, T. F. & Tremetsberger, K., inéd.

Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb. var. *ciliata* (Wedd.) Perkins = **Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Griseb.
Referencias: Urtubey, E., Stuessy, T. F. & Tremetsberger, K., inéd.

Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb. var. *eriolaenoides* Cabrera = **Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Griseb.
Referencias: Urtubey, E., Stuessy, T. F. & Tremetsberger, K., inéd.

Hypochaeris meyeniana (Walp.) Griseb. var. *leucantha* Cabrera = **Hypochaeris echegarayi** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus microcephalus* Sch. Bip., *Hypochaeris brasiliensis* (Less.) Benth. & Hook. ex Griseb. var. *microcephala* (Sch. Bip.) Baker, *Seriola brasiliensis* Less. var. *parviflora* Hook. & Arn.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., et al., 2000; Urtubey, E. & Stuessy, T. F., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SFE); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 136* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 1474* (LP)].

Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera var. *albiflora* (Kuntze) Cabrera = **Hypochaeris albiflora** (Kuntze) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Hypochaeris microphylla (J. Remy) Reiche = **Hypochaeris clarionoides** (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris minima Willd. ex d'Urv. = **Hypochaeris glabra** L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].

Hypochaeris montana (Phil.) Reiche var. **hookeri** (Phil.) Bortiri
Sin.: *Hypochaeris hookeri* Phil., *Hypochaeris stenophylla* Dusén
Referencias: Bortiri, E., 1997, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 18019* (LP, WU)].

Hypochaeris montana (Phil.) Reiche var. **montana**
Sin.: *Achyrophorus montanus* Phil., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *laciniata* Hicken
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SCR, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11270* (LP)]; CHL[*Villagrán, C. 8474* (SGO)].

Hypochaeris nahuelvutae Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Philippi, R. A., 1894.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris nanna Phil. = **Hypochaeris clarionoides** (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris odorata (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. ex Jacks. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris odorata (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. ex Jacks. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris ornata J. Kost. = **Hypochaeris echegarayi** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris palustris (Phil.) De Wild.
Sin.: *Achyrophorus palustris* Phil.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 260* (LP)]; CHL[*Stuessy, T. F. 15630* (CONC)].

Hypochaeris pampasica Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 121* (LP)].

Hypochaeris parodii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 18059* (LP, WU)].

Hypochaeris patagonica Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1900 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1447* (LP)].

Hypochaeris petiolaris (Hook. & Arn.) Griseb.
Sin.: *Achyrophorus petiolaris* (Hook. & Arn.) DC., *Seriola petiolaris* Hook. & Arn.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1963a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU, TUC); URY(CAS, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 122* (LP)]; URY[*Gallinal, J. P. 2243* (LP)].

Hypochaeris philippii Kuntze = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Hypochaeris philippii Kuntze var. *glabrescens* Kuntze = **Hypochaeris gayana** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris pilosa Reiche
Sin.: *Hypochaeris hirta* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris pinnatifida (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Sin.: *Hypochaeris rosengurttii* Cabrera var. *pinnatifida* (Speg.) Cabrera, *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *acutibracteata* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *pinnatifida* Speg.
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tremetsberger 1006* (LP, WU)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6507* (LP)].

Hypochaeris psychrophila (Wedd.) Reiche = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris pumila Phil. = **Hypochaeris glabra** L.
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Hypochaeris pygmaea Phil. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris radicata L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., et al., 2000; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF); BRA(PAR, SCA); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF); URY(CAS, COL, FLO, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 141* (LP)]; BRA[*Lorenzi, H. 780* (RB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996042* (CONC)]; URY[*Mato 326* (LP)].

Hypochaeris rosengurtii Cabrera = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Hypochaeris rosengurttii Cabrera var. *pinnatifida* (Speg.) Cabrera = **Hypochaeris pinnatifida** (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus chrysanthus* DC., *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *glabrata* DC., *Hypochaeris crysantha* Poepp. ex DC., *Oreophila taraxacoides* Don, *Seriola taraxacoides* (Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1672* (CONC)].

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. **ramosa** (DC.) Reiche
Sin.: *Achyrophorus scorzonerae* DC. var. *ramosa* DC.
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V).

Hypochaeris scorzonerae (DC.) F. Muell. var. **scorzonerae**
Sin.: *Achyrophorus scorzonerae* DC., *Hypochaeris sonchoides* Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 211* (CONC)].

[Hypochaeris sessiliflora Kunth]
Sin.: *Achyrophorus albiflorus* Sch. Bip., *Achyrophorus humboldtii* Sch. Bip., *Achyrophorus quitensis* Sch. Bip., nom. illeg., *Achyrophorus sessiliflorus* (Kunth) DC., *Oreophila sessiliflora* (Kunth) D. Don
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hypochaeris setosa (Wedd.) Rusby = **Hypochaeris echegarayi** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris sonchoides Kunth = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **scorzonerae**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris spathulata (J. Remy) Reiche var. **chiloensis** (J. Remy) Reiche
Sin.: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy var. *chiloensis* J. Remy
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VI, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 295* (LP, SI)].

Hypochaeris spathulata (J. Remy) Reiche var. **spathulata**
Sin.: *Achyrophorus spathulatus* J. Remy
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Finot, V. L. 86* (CONC)].

Hypochaeris spinuligera (Phil.) Reiche = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris stenocephala (A. Gray ex Wedd.) Kuntze, nom. illeg. = **Hypochaeris taraxacoides** (Walp.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris stenocephala (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *taraxacoides* Kuntze = **Hypochaeris taraxacoides** (Walp.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris stenophylla Dusén = **Hypochaeris montana** (Phil.) Reiche var. **hookeri** (Phil.) Bortiri
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris stenophylla Dusén var. *integrifolia* Kuntze = **Hypochaeris taraxacoides** (Walp.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris stenophylla Dusén var. *laciniata* Hicken = **Hypochaeris montana** (Phil.) Reiche var. **montana**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hypochaeris taraxacoides (Walp.) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Achyrophorus stenocephalus* A. Gray ex Wedd., nom. inval., *Achyrophorus taraxacoides* Walp., *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze var. *taraxacoides* Kuntze, *Hypochaeris stenocephala* (A. Gray ex Wedd.) Kuntze, nom. illeg., *Hypochaeris stenophylla* Dusén var. *integrifolia* Kuntze, *Oreophila taraxacifolia* Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2700–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuessy, T. F. 18089* (LP, WU)]; CHL[*Marticorena, C. 171* (CONC)].

Hypochaeris tenerifolia (J. Remy) Dusén
Sin.: *Achyrophorus lechleri* Sch. Bip., nom. inval., *Achyrophorus tenerifolius* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, TDF); CHL(VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5140* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2586* (LP, SI)].

Hypochaeris tenerifolia (J. Remy) Dusén var. *glabrescens* (Kuntze) Cabrera = **Hypochaeris gayana** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. *clarionoides* (J. Remy) Bortiri = **Hypochaeris clarionoides** (J. Remy) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Achyrophorus araucanus* Phil., *Achyrophorus odoratus* (Poepp. & Endl.) Walp., *Hypochaeris eurylepis* Phil., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. ex Jacks., *Hypochaeris odorata* (Poepp. & Endl.) Benth. & Hook. ex Jacks. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche, *Oreophila odorata* Poepp. & Endl.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 24540* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 593* (LP)].

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. **linearifolia** (DC.) Bortiri
Sin.: *Achyrophorus graminifolius* Phil., nom. nud., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *linearifolius* DC., *Hypochaeris graminifolia* Phil.
Referencias: Bortiri, E., 1997, 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9741* (BAB, SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris tenuifolia (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Sin.: *Achyrophorus spinuliger* Phil., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC., *Achyrophorus tenuifolius* (Hook. & Arn.) DC. var. *neoeanus* DC., *Achyrophorus volckmannii* Phil., *Hypochaeris spinuligera* (Phil.) Reiche, *Hypochaeris volckmannii* (Phil.) Phil., *Oreophila tenuifolia* Hook. & Arn., nom. nud., *Seriola tenuifolia* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 16788* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3880* (LP)].

Hypochaeris thermarum Phil.
Referencias: Philippi, R. A., 1894.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3400 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Vidal, M. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris thrincioides (J. Remy) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 996251* (CONC, SGO)].

Hypochaeris toltensis Reiche
Sin.: *Hypochaeris grandiflora* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Hypochaeris tropicalis Cabrera var. **australis** Cabrera
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1963b, 1974a; Urtubey, E. & Stuessy, T. F., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI); PRY(MIE); URY(ART, CLA, FLA, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11949* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 5729* (LP)]; URY[*Gallinal, J. P. 773* (LP)].

Hypochaeris tropicalis Cabrera var. **tropicalis**
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2004; Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1963a: Urtubey, E. & Stuessy, T. F., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 10273* (LP)]; BRA[*Bueno, O. L. 2109* (HAS)]; PRY[*Montes, J. E. 12557* (LP)].

Hypochaeris tweediei (Hook. & Arn.) Cabrera = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Hypochaeris ushuaiae Skottsb. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker
Sin.: *Achyrophorus variegatus* (Lam.) Sch. Bip., *Apargia variegata* Willd., *Hieracium variegatum* Lam., *Hypochaeris philippii* Kuntze, *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *glaucescens* Speg., *Hypochaeris variegata* (Lam.) Baker var. *nana* Speg., *Leontodon variegatum* Willd. ex Poir.
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1963a; Urtubey, E. & Stuessy, T. F., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA, MIS); BRA(RGS); URY(COL, LAV, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Urtubey, E. 117* (LP)]; BRA[*Matzenbacher, N. I. 2265* (ICN)]; URY[*Cabrera, A. L. 3883* (LP)].

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker var. *acutibracteata* Speg. = **Hypochaeris pinnatifida** (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker var. *glaucescens* Speg. = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker var. *nana* Speg. = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Hypochaeris variegata (Lam.) Baker var. *pinnatifida* Speg. = **Hypochaeris pinnatifida** (Speg.) C.F. Azevêdo-Gonçalves & Matzenb.
Referencias: Azevêdo-Gonçalves, C. F. & Matzenbacher, N. I., 2005.

Hypochaeris volckmannii (Phil.) Phil. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Hysterionica Willd.

Número de especies: 12, 7 endémicas

Hysterionica aberrans (Cabrera) Cabrera var. **aberrans**
Sin.: *Hysterionica bakeri* Hicken var. *aberrans* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1946a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 17721* (LP)].

Hysterionica aberrans (Cabrera) Cabrera var. **hunzikeri** Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980a, 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23494* (LP)].

Hysterionica bakeri Hicken
Sin.: *Hysterionica caurina* Johnst., *Hysterionica grisebachi* Hieron., nom. nud.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980a, 2005; Cabrera, A. L., 1946a, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 100–2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20117* (LP)].

Hysterionica bakeri Hicken f. *decumbens* Hicken = **Hysterionica pulchella** Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica bakeri Hicken var. *aberrans* Cabrera = **Hysterionica aberrans** (Cabrera) Cabrera var. **aberrans**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica cabrerae Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980a, 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 20161* (LP)].

Hysterionica caurina Johnst. = **Hysterionica bakeri** Hicken
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica dianthifolia (Griseb.) Cabrera var. **dianthifolia**
Sin.: *Erigeron dianthifolius* Griseb., *Neja dianthifolia* (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980a, 2005; Cabrera, A. L., 1946a; Nesom, G. L., 1994d.
Subarbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9649* (CORD, LP)].

Hysterionica dianthifolia (Griseb.) Cabrera var. **pulvinata** (Cabrera) Ariza
Sin.: *Hysterionica pulvinata* Cabrera, *Neja pulvinata* (Cabrera) G.L. Nesom
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980a, 2005; Nesom, G. L., 1994d; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 1395* (LP)].

Hysterionica famatinense Hieron., nom. nud. = **Hysterionica pulchella** Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica filiformis (Spreng.) Cabrera
Sin.: *Diplopappus stenophyllus* Hook. & Arn., *Erigeron filiformis* Spreng., *Hysterionica gracilis* (D. Don ex Sweet) Benth. & Hook., *Hysterionica setuligera* Gand., *Neja ciliaris* DC., *Neja filiformis* (Spreng.) Nees, *Neja gracilis* D. Don ex Sweet, *Neja tenuifolia* DC., *Polyactidium sprengelii* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1946a, 1974a; Nesom, G. L., 1994d; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CLA, COL, LAV, RIV, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Feldman, I. 275* (LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 34198* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1020* (LP)].

Hysterionica glaucifolia (Kuntze) Solbrig
Sin.: *Erigeron glaucifolius* Kuntze
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15789* (BAB, LP)].

Hysterionica grisebachi Hieron., nom. nud. = **Hysterionica bakeri** Hicken
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica intermedia Hieron., nom. nud. = **Hysterionica jasionoides** Willd.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica jasionoides Willd.
Sin.: *Chrysopsis andicola* Phil., *Diplopappus hispidus* Gillies ex Hook. & Arn., *Erigeron mendocinum* Greene, *Heterochaeta hispida* DC., *Hysterionica intermedia* Hieron., nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L., 1946a, 1963a, 1971a, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 220* (CORD), *Ruíz Leal, R. A. 19717* (LP)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Cabrera, 1946, 1963a; G. Sancho & Ariza Espinar, 2003).

Hysterionica montevidensis Baker
Sin.: *Diplopappus villosus* Hook. & Arn., *Hysterionica villosa* (Hook. & Arn.) Cabrera, nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1946a, 1974a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(CEN, ITA); URY(ART, PAY, RIV, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 5370* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 2346* (LP)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10870* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 4580* (LP)].

Hysterionica pinifolia (Poir.) Baker
Sin.: *Diplopappus pinifolius* Hook. & Arn., *Erigeron pinifolium* Poir., *Neja pinifolia* (Poir.) G.L. Nesom
Referencias: Cabrera, A. L., 1946a, 1963a; Nesom, G. L., 1994d; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Abbiatti, D. 4375* (LP)]; BRA[*Irmão, T. L. 74* (LP)]; URY[*Sancho, G. 72* (LP)].

Hysterionica pinnatiloba Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Sobral, M., 1996.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS). 0–600 m.
Ejemplares de referencia: BRA[*Larocca, J. 95/17* (ICN, MBM, RB)].

Hysterionica pinnatisecta Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Sobral, M., 1996.
Subarbusto. Endémica. 1000–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, M. 7712* (MO)].

Hysterionica pulchella Cabrera
Sin.: *Erigeron lanceolatus* Wedd. var. *lorentzianus* Griseb., *Hysterionica bakeri* Hicken f. *decumbens* Hicken, *Hysterionica famatinense* Hieron., nom. nud.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980a, 2005; Cabrera, A. L., 1946a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2601* (LP)].

Hysterionica pulvinata Cabrera = **Hysterionica dianthifolia** (Griseb.) Cabrera var. **pulvinata** (Cabrera) Ariza
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica setuligera Gand. = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Hysterionica villosa (Hook. & Arn.) Cabrera, nom. illeg. = **Hysterionica montevidensis** Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Ianthopappus Roque & D.J.N. Hind
Número de especies: 1 endémica

Ianthopappus corymbosus (Less.) Roque & D.J.N. Hind
Sin.: *Actinoseris corymbosa* (Less.) Cabrera, *Gochnatia corymbosa* Less., *Onoseris corymbosa* (Less.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Roque, N. & Hind, D. J. N., 2001.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palacios, M. A. 2304* (LP)]; BRA[*Sellow, F. 1308* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3015* (LP)].

Ichthyothere Mart.
Número de especies: 1

Ichthyothere agrestis Baker
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 10627* (S)].

Icma involucrata Phil. = **Baccharis gilliesii** A. Gray
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Idiothamnus lilloi (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lilloi** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Infantea chilensis J. Remy = **Amblyopappus pusillus** Hook. & Arn. var. **pusillus**
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Ingenhuzia radiata Vell. = **Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b.

Inula primulifolia Lam. = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Inula subaxillaris Lam. = **Heterotheca subaxillaris** (Lam.) Britton & Rusby
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Inulopsis (DC.) O. Hoffm.
Número de especies: 2, 1 endémica

Inulopsis scaposa (DC.) O. Hoffm.
Sin.: *Aster longipes* Gardner, *Haplopappus scaposus* DC., *Leucopsis scaposa* (DC.) Baker
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Nesom, G. L., 1994e; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, CAU, CAA, ITA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jonsson, G. 144a* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5933* (SI)].

Inulopsis stenophylla Dusén
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Nesom, G. L., 1994e.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14610* (NY)].

Ioannea brasiliensis Spreng. = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Iocenes acanthifolius (Hombr. & Jacq.) Nord. = **Senecio acanthifolius** Hombr. & Jacq. subsp. **acanthifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Iocenes acanthifolius (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) Nord. = **Senecio acanthifolius** Hombr. & Jacquinot subsp. **virens** (Phil.) Cabrera & Zardini
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Isostigma Less.
Número de especies: 10, 6 endémicas

Isostigma acaule (Baker) Chodat
Sin.: *Bidens acaulis* Baker, *Isostigma vailianum* Britton
Referencias: Peter, G., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 4714* (CTES, G)].

Isostigma cordobense Cabrera
Sin.: *Isostigma crithmifolium* Less. var. *nanum* Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 1969, 2000b; Cabrera, A. L., 1959c.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 2882* (CORD)].

Isostigma crithmifolium Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Peter, G., 2004, 2005b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(ITA, MIE); URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1869* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 26022* (LP)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4271* (GH, LP, NY, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 3210* (LP)].

Isostigma crithmifolium Less. var. *nanum* Sherff = **Isostigma cordobense** Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Isostigma dissitifolium Baker
Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. var. *dissitifolium* (Baker) Hassl.
Referencias: Peter, G., 2004, 2005b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (F)]; PRY[*Balansa, B. 907* (F, G, K)].

Isostigma herzogii Hassl.
Referencias: Peter, G., 2004, 2005b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 5094* (CTES)].

Isostigma hoffmannii Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 1969; Cabrera, A. L., 1974a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Peter, G., 2005b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 548* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 5886* (FCQ)].

Isostigma megapotamicum (Spreng.) Sherff = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Isostigma molfinianum Sherff
Referencias: Ariza Espinar, L., 1969; Peter, G., 2005b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 1400–4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 13369* (CORD)].

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less.
Sin.: *Tragoceras peucedanifolium* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Peter, G., 2005a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(ITA, MIE); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15300* (SI), *Zuloaga, F. O. 5748* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14923* (LP, NY, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 46834* (US)]; URY[*Seijo, G. J. 2408* (CTES)].

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less. f. *discoidea* Hassl. = **Isostigma speciosum** Less.

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less. f. *radiata* Hassl. = **Isostigma speciosum** Less.

Isostigma peucedanifolium (Spreng.) Less. var. *dissitifolium* (Baker) Hassl. = **Isostigma dissitifolium** Baker

Isostigma riedelii (Baker) Chodat
Sin.: *Isostigma speciosum* Less. var. *riedelii* Baker
Referencias: Chodat, R. H., 1902; Peter, G., 2005b.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Riedel, L. 602* (P)]; PRY[*Schinini, A. 33796* (CTES, SI)].

Isostigma speciosum Less.
Sin.: *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. f. *discoidea* Hassl., *Isostigma peucedanifolium* (Spreng.) Less. f. *radiata* Hassl.
Referencias: Peter, G., 2004, 2005b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14903* (LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 40922* (CTES, F, GH)]; PRY[*Hassler, E. 5586* (G)].

Isostigma speciosum Less. var. *riedelii* Baker = **Isostigma riedelii** (Baker) Chodat

Isostigma vailianum Britton = **Isostigma acaule** (Baker) Chodat
Referencias: Peter, G., 2005b.

Jaegeria Kunth
Número de especies: 1

Jaegeria bellidioides Spreng. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Jaegeria discoidea Klatt = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Jaegeria hirta (Lag.) Less.
Sin.: *Acmella hirta* Lag., *Eclipta bellidioides* (Spreng.) Sch. Bip. ex S.F. Blake, *Jaegeria bellidioides* Spreng., *Jaegeria discoidea* Klatt, *Jaegeria hirta* (Lag.) Less. var. *glabra* Baker, *Jaegeria mnioides* Kunth, *Jaegeria parviflora* DC., *Jaegeria repens* DC., *Spilanthes ecliptoides* Gardner, *Spilanthes karvinskiana* DC., *Spilanthes mariannae* DC., *Spilanthes sessilifolia* Hemsl.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a, 1978; Mondin, C. A., 2004a; Torres, A. M., 1968.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, CEN, COA); URY(CLA, COL, RIV, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10790* (SI), *Zardini, E. M. 920* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 26229* (LP, PACA)]; PRY[*Hassler, E. 12594* (BM)]; URY[*Alonso Paz, E. 3607* (MVFQ)].

Jaegeria hirta (Lag.) Less. var. *glabra* Baker = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Jaegeria mnioides Kunth = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Jaegeria parviflora DC. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Jaegeria repens DC. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Jaumea Pers.
Número de especies: 1

Jaumea linearifolia (Juss.) DC.
Sin.: *Jaumea linearis* Pers., *Kleinia linearifolia* Juss.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS, MAL, MON, ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 654* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 963* (LP)].

Jaumea linearis Pers. = **Jaumea linearifolia** (Juss.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Jobaphes virgatus Phil. = **Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy) Cabrera var. **denticulatus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Jobaphes virgatus Phil. var. *calvus* Phil. = **Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy) Cabrera var. **calvus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Johannia brasiliensis Spreng. = **Dasyphyllum brasiliense** (Spreng.) Cabrera var. **brasiliense**
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Jungia L. f.

Número de especies: 5

Jungia affinis Gardner = **Jungia floribunda** Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia dentata (D. Don) Reiche = **Pleocarphus revolutus** D. Don

Jungia divaricata Rusby = **Jungia polita** Griseb.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia floribunda Less.
Sin.: *Jungia affinis* Gardner, *Jungia floribunda* Less. var. *affinis* (Gardner) Baker, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *floribunda* (Less.) Kuntze, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *tomentosa* Kuntze, *Jungia pyramidalis* D. Don, *Jungia tomentosa* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Cerrate Valenzuela, E., 1951; Harling, G. W., 1995; Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 400–1500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1669* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 21161* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4172* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 11125* (LP)].

Jungia floribunda Less. var. *affinis* (Gardner) Baker = **Jungia floribunda** Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia herzogiana P. Beauv. ex J. Kost. = **Jungia pauciflora** Rusby
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia mandonii Sch. Bip. = **Jungia pauciflora** Rusby
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia orbicularis Rusby = **Jungia pauciflora** Rusby
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia pauciflora Rusby
Sin.: *Jungia herzogiana* P. Beauv. ex J. Kost., *Jungia mandonii* Sch. Bip., *Jungia orbicularis* Rusby, *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *boliviensis* Kuntze
Referencias: Harling, G. W., 1995; Katinas, L., 1995.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 1200–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26051* (LP)].

Jungia polita Griseb.
Sin.: *Jungia divaricata* Rusby, *Jungia polita* Griseb. var. *divaricata* (Rusby) Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var. *glabra* Kuntze, *Jungia polita* Griseb. var. *tomentosa* Kuntze
Referencias: Harling, G. W., 1995; Katinas, L., 1995.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Katinas, L. 94* (LP)]; CHL[*Shepard, K. S. s.n.* (GH, NY, US)].

Jungia polita Griseb. var. *divaricata* (Rusby) Kuntze = **Jungia polita** Griseb.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia polita Griseb. var. *glabra* Kuntze = **Jungia polita** Griseb.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia polita Griseb. var. *tomentosa* Kuntze = **Jungia polita** Griseb.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia pubescens (Lag.) Kuntze var. *boliviensis* Kuntze = **Jungia pauciflora** Rusby
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia pubescens (Lag.) Kuntze var. *floribunda* (Less.) Kuntze = **Jungia floribunda** Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia pubescens (Lag.) Kuntze var. *grandistipulata* Kuntze = **Jungia sordida** J. Kost.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia pubescens (Lag.) Kuntze var. *tomentosa* Kuntze = **Jungia floribunda** Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia pyramidalis D. Don = **Jungia floribunda** Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Jungia revoluta (D. Don) Reiche = **Pleocarphus revolutus** D. Don

Jungia revoluta (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche = **Pleocarphus revolutus** D. Don

Jungia sellowii Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995; Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1400 m.

Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Reitz, P. R. 10958* (LP)].

Jungia sordida J. Kost.
Sin.: *Jungia pubescens* (Lag.) Kuntze var. *grandistipulata* Kuntze
Referencias: Harling, G. W., 1995; Katinas, L., 1995.
Subarbusto. Nativa. 900–3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18492* (LP)].

Jungia tomentosa Sch. Bip. ex Baker = **Jungia floribunda** Less.
Referencias: Harling, G. W., 1995.

Kanimia oblongifolia (DC.) Baker = **Mikania oblongifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cerana, M. M., 1997.

Kanimia thapsoides (DC.) Hieron. = **Mikania thapsoides** DC.
Referencias: Cerana, M. M., 1997.

Kaunia lasiophthalma (Griseb.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lasiophthalmum** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Kaunia saltensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium saltense** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Kentrophyllum lanatum (L.) DC. ex Duby = **Carthamus lanatus** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Kleinia filifolia Hook. & Arn., nom. illeg. = **Porophyllum angustissimum** Gardner

Kleinia filifolia Spreng. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Kleinia linearifolia Juss. = **Jaumea linearifolia** (Juss.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Kleinia linifolia Hook. & Arn. = **Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Kleinia obscura Spreng. = **Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Kleinia porophyllum (L.) Willd. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Kleinia pumila Hook. & Arn. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Kleinia ruderalis Jacq. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Kleinia selloi Spreng. = **Stevia selloi** (Spreng.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996b.

Kleinia suffruticosa (L.) Willd. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Koanophyllon lobatifolia (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium lobatifolium** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Koanophyllon simillimum (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium simillimum** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Koanophyllon solidaginoides (Kunth) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium solidaginoides** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1978, 1996f.

Koanophyllon stipuliferum (Rusby) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium solidaginoides** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994.

Kremeria myconys (L.) Maire = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Krigia chilensis Bertero = **Microseris pygmaea** D. Don
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Krigia chilensis Nees = **Microseris pygmaea** D. Don
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Krigia pinnatifida Bertero ex DC. = **Microseris pygmaea** D. Don
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Krigia pusilla Hort ex DC. = **Microseris pygmaea** D. Don
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Lactuca L.

Número de especies: 4 introducidas

[Lactuca muralis (L.) Fresen.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Lactuca saligna L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, DFE, LPA, MEN, NEU, SLU); URY(FLA, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 95* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 1066* (LP)].

Lactuca sativa L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR); CHL(I, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9904* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3353* (LP)].

Lactuca scariola L. = **Lactuca serriola** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Lactuca serriola L.
Sin.: *Lactuca scariola* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., et al., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS, SCA); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME); PRY(PAI); URY(ART, COL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2722* (LP), *Guaglianone, E. R. 1723* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8329* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 15488* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 13027* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3610* (LP)].

Lactuca virosa L.
Referencias: Macaya, J., Faúndez, L. & Serra, M. T. V., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–2000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Macaya, J. 389* (CONC)].

Laennecia Cass.
Número de especies: 3, 1 endémica

Laennecia alpina Poepp. & Endl. = **Gamochaetopsis alpina** (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.

Laennecia altoandina (Cabrera) G.L. Nesom
Sin.: *Conyza altoandina* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1990b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 3900–4200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4132* (LP)].

Laennecia artemisiifolia (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Sin.: *Conyza andicola* Phil., *Conyza artemisiifolia* Meyen & Walp., *Conyza senecioides* (Wedd.) Cabrera, *Erigeron artemisiifolius* (Meyen & Walp.) Sch. Bip., *Erigeron senecioides* Wedd., *Marsea artemisiaefolia* (Meyen & Walp.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1990b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 2208* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1093* (LP)].

Laennecia sophiifolia (Kunth) G.L. Nesom
Sin.: *Conyza coulteri* A. Gray var. *tenuisecta* A. Gray, *Conyza pulchella* Kunth, *Conyza serpentaria* Griseb., *Conyza sophiaefolia* Kunth, *Eschenbachia tenuisecta* (A. Gray) Wooton & Standl., *Marsea sophiifolia* (Kunth) Kuntze, *Marsea sophiifolia* (Kunth) V.M. Badillo, nom. illeg.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1990b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Anual. Nativa. 200–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, R. 924* (LP)].

Lagascea Cav., nom. cons.
Número de especies: 1

Lagascea campestris Gardner = **Lagascea mollis** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Lagascea kunthiana Gardner = **Lagascea mollis** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Lagascea mollis Cav.
Sin.: *Lagascea campestris* Gardner, *Lagascea kunthiana* Gardner, *Lagascea parvifolia* Klatt, *Nocca mollis* (Cav.) Jacq.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Stuessy, T. F., 1978.
Hierba. Anual. Nativa. 100–1300 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 2733* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 4061* (CTES)].

Lagascea parvifolia Klatt = **Lagascea mollis** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Lagenifera hariotii (Franch.) T.R. Dudley = **Lagenophora hariotii** Franch.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lagenifera nudicaulis (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lagenophora Cass.
Número de especies: 3, 2 endémicas

Lagenophora commersonii Cass. = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lagenophora commersonii Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook. f. = **Lagenophora hirsuta** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lagenophora hariotii Franch.
Sin.: *Lagenifera hariotii* (Franch.) T.R. Dudley, *Lagenophora hirsuta* auct. non Less., *Lagenophora hirsuta* Poepp. ex Less. var. *gracilis* Albov
Referencias: Cabrera, A. L., 1966a, 1971a; Dudley, T. R., 1981; Moore, D. M., 1983; Muñoz-Schick, M., 1980; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5658* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 2285* (LP)].

Lagenophora hirsuta auct. non Less. = **Lagenophora hariotii** Franch.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lagenophora hirsuta Poepp. ex Less.
Sin.: *Lagenophora commersonii* Cass. var. *hirsuta* (Poepp. ex Less.) Hook. f., *Lagenophora hirsuta* Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1966a, 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 195* (LP)]; CHL[*Barros, E. 501* (LP)].

Lagenophora hirsuta Poepp. ex Less. var. *gracilis* Albov = **Lagenophora hariotii** Franch.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lagenophora nudicaulis (Comm. ex Lam.) Dusén
Sin.: *Aster nudicaulis* Comm. ex Lam., *Bellis magellanica* DC., *Calendula magellanica* Willd., *Calendula pusilla* Thouars, *Lagenifera nudicaulis* (Comm. ex Lam.) T.R. Dudley, *Lagenophora commersonii* Cass., *Lagenophora purpurascens* Phil.
Referencias: Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000; Cabrera, A. L., 1971a; Moore, D. M., 1983; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 12988* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 825* (LP)].

Lagenophora purpurascens Phil. = **Lagenophora nudicaulis** (Comm. ex Lam.) Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lancisia australis (Sieber ex Spreng.) Rydb. = **Cotula australis** (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a.

Lancisia coronipifolia (L.) Rydb. = **Cotula coronopifolia** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Caro, J. A., 1961b.

Lancisia minuta (L. f.) Rydb. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960.

Laphamia emoryi (Torr.) Benth. & Hook. f. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Everly, M. L., 1947; Powell, A. M., 1974.

Laphamia nuda (Torr.) Benth. & Hook. f. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Everly, M. L., 1947.

Lappa glabra Lam. = **Arctium minus** (Hill) Bernh.
Referencias: Moore, R. J. & Frankton, C., 1974.

Lappa minor Hill = **Arctium minus** (Hill) Bernh.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Lapsana L.

Número de especies: 1 introducida

Lapsana capillaris L. = **Crepis capillaris** (L.) Wallr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Lapsana communis L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 168* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 818* (LP)].

Lasiophyton pusillum Hook. & Arn. = **Micropsis nana** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a.

Lasiorhiza acanthoides (D. Don) Kuntze = **Leucheria hieracioides** Cass.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza achillaefolia (Hook. & Arn.) Macloskie = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza anthemidifolia (Phil.) Kuntze = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza candidissima (D. Don) Macloskie = **Leucheria candidissima** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza ceterachifolia Cass. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza cinerea (D. Don) Less. = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza floribunda (DC.) Kuntze = **Leucheria floribunda** DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza foliosa (Phil.) Kuntze = **Marticorenia foliosa** (Phil.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1974a.

Lasiorhiza fragans (Phil.) Kuntze = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza fueguiana (Phil.) Kuntze = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza glabra (DC.) Kuntze = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza glacialis Poepp. ex Less. = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza glandulosa (D. Don) DC. = **Leucheria glandulosa** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza glomerulata Kuntze = **Leucheria congesta** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza gossypina (Hook. & Arn.) Macloskie = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza gracilis (Albov) Macloskie = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza hahnii (Franch.) Macloskie = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza hieracioides (Cass.) Kuntze = **Leucheria hieracioides** Cass.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza hoffmannii (Dusén) Macloskie = **Leucheria leontopodioides** (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza ibari (Phil.) Macloskie = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza lanata (Albov) Macloskie = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza lanigera (O. Hoffm.) Macloskie = **Leucheria leontopodioides** (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza leontopodioides Kuntze = **Leucheria leontopodioides** (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza lithospermifolia Less. = **Leucheria lithospermifolia** (Less.) Reiche subsp. **lithospermifolia**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza multifida (DC.) Kuntze = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza nutans (J. Remy) Kuntze = **Leucheria nutans** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza patagonica (Speg.) Macloskie = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza philippiana Kuntze = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza pulchella (D. Don) Steud. = **Leucheria tomentosa** (Less.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza pulchella (Phil.) Kuntze, nom. illeg. = **Leucheria bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza purpurea (Vahl) Less. = **Leucheria purpurea** (Vahl) Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza rosea Less. = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza rosea Less. var. *albiflora* Kuntze = **Leucheria rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza rosea Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze = **Leucheria rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza salina (J. Remy) Kuntze = **Leucheria salina** (J. Remy) Hieron. subsp. **salina**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza scrobiculata (D. Don) Kuntze = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza senecioides (Hook. & Arn.) Kuntze = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza stricta (Phil.) Macloskie = **Leucheria magna** Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza suaveolens (d'Urv.) Macloskie = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza tomentosa Less. = **Leucheria tomentosa** (Less.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasiorhiza viscosa Cass. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Lasthenia Cass.

Número de especies: 1 endémica

Lasthenia bridgesii (Poepp. & Endl.) Steud. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Lasthenia chilensis Steud. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Lasthenia kunthii (Less.) Hook. & Arn.
Sin.: *Hymenatherum kunthii* Less., *Lasthenia bridgesii* (Poepp. & Endl.) Steud., *Lasthenia chilensis* Steud., *Lasthenia obtusifolia* Cass., *Lasthenia obtusifolia* Cass. var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC., *Rancagua bridgesii* Poepp. & Endl., *Rancagua feuillei* (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl., *Tagetes feuillei* Bertero ex Colla
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1995a; Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ornduff, R., 1966.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 10043* (SI)]; CHL[*Looser, G. 2034* (LP)].

Lasthenia obtusifolia Cass. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Lasthenia obtusifolia Cass. var. *bridgesii* (Poepp. & Endl.) DC. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Lavenia decumbens Sw. = **Adenostemma verbesina** (L.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.

Lavidia caespitosa Phil. = **Brachyclados caespitosus** (Phil.) Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Lefrovia rhaponticoides Franch. = **Cnicothamnus lorentzii** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Leighia anchusaefolia DC. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **anchusaefolia**
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia arillata DC. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Leighia baldwiniana Nutt. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **anchusaefolia**
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia buphthalmiflora DC. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Leighia calendulacea DC. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Leighia dissitifolia DC. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **anchusaefolia**
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia ecliptifolia DC. = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Leighia gilliesii Hook. & Arn. = **Viguiera gilliesii** (Hook. & Arn.) Hieron.
Referencias: Blake, S. F., 1918; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia inmarginata DC. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **inmarginata** (DC.) Baker
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia lomatoneura DC. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **anchusaefolia**
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia silphioides Hook. & Arn. = **Aspilia silphioides** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Leighia stenophylla Hook. & Arn. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **inmarginata** (DC.) Baker
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Sáenz, A. A., 1979.

Leighia tucumanensis Hook. & Arn. = **Viguiera tucumanensis** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tucumanensis**
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Leontodon L.

Número de especies: 4 introducidas

Leontodon arenarius (Gaudich.) Albov = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Leontodon autumnalis L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1980a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(V, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Méndez, E. 894* (LP)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (LP)].

Leontodon chilense DC. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Leontodon coronopifolium (Sch. Bip.) Comm. ex Albov = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **integrifolia** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Leontodon hirtus L.
Sin.: *Thrincia hirta* Roth
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: CHL(V, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 655* (CONC)].

Leontodon laevigatus Willd. = **Taraxacum laevigatum** (Willd.) DC.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Leontodon nudicaulis auct. non (L.) Banks = **Leontodon taraxacoides** (Vill.) Mérat
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Leontodon saxatilis Lam.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 754* (CONC)].

Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat
Sin.: *Crepis nudicaulis* auct. non L., *Hyoseris taraxacoides* Vill., *Leontodon nudicaulis* auct. non (L.) Banks
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR); CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10094* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2535* (LP)].

Leontodon taraxacum L. = **Taraxacum officinale** G. Weber ex F.H. Wigg.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Leontodon variegatum Willd. ex Poir. = **Hypochaeris variegata** (Lam.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Leontodon vulgare Lam. = **Taraxacum officinale** G. Weber ex F.H. Wigg.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Lepidaploa Cass.

Número de especies: 1

Lepidaploa amambaia H. Rob. = **Vernonia amambaia** (H. Rob.) Dematteis
Referencias: Dematteis, M., 2002b.

Lepidaploa balansae (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia balansae** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1999.

Lepidaploa chamissonis (Less.) H. Rob. = **Vernonia chamissonis** Less.

Lepidaploa decumbens (Gardner) H. Rob. = **Vernonia decumbens** Gardner

Lepidaploa eriolepis (Gardner) H. Rob. = **Vernonia eriolepis** Gardner

Lepidaploa grisea (Baker) H. Rob. = **Vernonia grisea** Baker

Lepidaploa pseudomuricata H. Rob.
Sin.: *Vernonia muricata* auct. non DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1995.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hagelund, K. 12244* (ICN)].

Lepidaploa psilostachya (DC.) H. Rob. = **Vernonia oxylepis** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.

Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob. = **Vernonia remotiflora** Rich.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1990b.

Lepidaploa rufogrisea (A. St.-Hil.) H. Rob. = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Lepidaploa salzmanii (DC.) H. Rob. = **Vernonia salzmannii** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.

Lepidaploa scorpioides (Lam.) Cass. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Lepidaploa sororia (DC.) H. Rob. = **Vernonia sororia** DC.

Lepidaploa tarijensis (Griseb.) H. Rob. = **Vernonia tarijensis** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1990b.

Lepidonema chilense Fisch. & C.A. Mey. = **Microseris pygmaea** D. Don

Lepidophyllum Cass.

Número de especies: 1 endémica

Lepidophyllum abietinum (Phil.) Reiche = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum acaule Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks. = **Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990.

Lepidophyllum cupressiforme (Lam.) Cass.
Sin.: *Baccharis cupressiformis* (Lam.) Pers., *Conyza cupressiformis* Lam., *Gutierrezia cupressiformis* (Lam.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1945, 1971a; Moore, D. M., 1983; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, N. 1789* (LP)]; CHL[*Moore, D. M. 1058* (SGO)].

Lepidophyllum cupressinum (Phil.) Kuntze = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum lucidum (Meyen) Cabrera = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum meyenii A. Gray = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum phyliciforme (Meyen) Hieron. ex R.E. Fr. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum phyliciforme (Meyen) Hieron. ex R.E. Fr. var. *resinosum* (Walp.) S.F. Blake = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Benth. & Hook. = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum rigidum (Wedd.) Benth. & Hook. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Lepidophyllum teretiusculum Kuntze = **Parastrephia teretiuscula** (Kuntze) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Lepidophyllum tola Cabrera = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Leptalea apiculata Hook. & Arn. = **Facelis retusa** (Lam.) Sch. Bip. subsp. **retusa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., 1974a.

Leptinella Cass.

Número de especies: 1 endémica

Leptinella acaenoides Hook. & Arn. = **Leptinella scariosa** Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1971a.

Leptinella scariosa Cass.
Sin.: *Cotula acaenoides* (Hook. & Arn.) Alb., *Cotula hombronii* Franch., *Cotula scariosa* (Cass.) Franch., *Leptinella acaenoides* Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1939a, 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 278* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1866* (LP)].

Leptocarpha DC.

Número de especies: 1 endémica

Leptocarpha rivularis DC.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1111* (CONC)].

Leptostelma D. Don

Número de especies: 2

Leptostelma maxima D. Don

Sin.: *Aster maximum* (D. Don) Less., *Erigeron alpestris* Gardner, *Erigeron catharinensis* Cabrera, *Erigeron maximus* (D. Don) DC., *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *minor* Baker, *Erigeron maximus* (D. Don) DC. var. *palustris* (Gardner) Baker, *Erigeron palustris* Gardner, *Erigeron scaberrimus* Gardner, *Erigeron schuchtii* Sch. Bip., nom. nud., *Erigeron sulcatum* DC.

Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1962.

Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, GUA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1155* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2161* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 4778* (LP)].

Leptostelma tweediei (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom

Sin.: *Erigeron seneciiformis* S.F. Blake, *Erigeron tweediei* Hook. & Arn., *Haplopappus tweediei* (Hook. & Arn.) Malme, *Leucopsis tweediei* (Hook. & Arn.) Baker

Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Solbrig, O. T., 1962; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.

Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI); URY(CAS, CLA, MAL, MON, RIV, RNO, SJO, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1053* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 36353* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 8130* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2020* (LP)].

Leria cespitosa Spreng. = **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake

Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., 1974a, 1978.

Leria exscapa DC. = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **exscapa**

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria integrifolia Cass. = **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria lutescens Sch. Bip., nom. illeg. = **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria lyrata Cass. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria nutans (L.) DC. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria nutans (L.) DC. var. *integrifolia* (Cass.) Less. = **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria nutans (L.) DC. var. *sinuata* Less. = **Chaptalia sinuata** (Less.) Baker

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Leria sinuata (Less.) DC. = **Chaptalia sinuata** (Less.) Baker

Referencias: Burkart, A., 1944a.

Lessingianthus arachniolepis (Ekman ex Dusén) H. Rob. = **Vernonia arachniolepis** Ekman ex Dusén

Lessingianthus argenteus (Less.) H. Rob. = **Vernonia argentea** Less.

Lessingianthus asteriflorus (Mart. ex DC.) H. Rob. = **Vernonia asteriflora** Mart. ex DC.

Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Lessingianthus bardanoides (Less.) H. Rob. = **Vernonia bardanoides** Less.

Referencias: Robinson, H. E., 1988a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Lessingianthus brevifolius (Less.) H. Rob. = **Vernonia brevifolia** Less.

Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a.

Lessingianthus cataractum (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia cataractarum** Hieron.

Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a.

Lessingianthus desertorum (Mart. ex DC.) H. Rob. = **Vernonia desertorum** Mart. ex DC.

Lessingianthus dorsiventralis (Chodat) H. Rob. = **Vernonia balansae** Hieron.

Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Lessingianthus exiguus (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia exigua** Cabrera

Lessingianthus glabratus (Less.) H. Rob. = **Vernonia glabrata** Less. var. **glabrata**

Referencias: Cabrera, A. L., 1995b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a.

Lessingianthus grandiflorus (Less.) H. Rob. = **Vernonia pumilla** (Vell.) Cabrera

Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.

Lessingianthus hypochaeris (DC.) H. Rob. = **Vernonia hypochaeris** DC.

Lessingianthus lorentzii (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia lorentzii** Hieron.

Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Lessingianthus macrocephalus (Less.) H. Rob. = **Vernonia macrocephala** Less.

Lessingianthus macrophyllus (Less.) H. Rob. = **Vernonia macrophylla** Less.

Lessingianthus magnificus Deble, Dematteis & Marchiori = **Vernonia magnifica** (Deble, Dematteis & Marchiori) Dematteis

Lessingianthus mollissimus (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob. = **Vernonia mollissima** D. Don ex Hook. & Arn. var. **mollisima**

Lessingianthus niederleinii (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia niederleinii** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Lessingianthus parvifolius (Chodat) H. Rob. = **Vernonia parvifolia** (Chodat) Cabrera

Lessingianthus plantaginodes (Less.) H. Rob. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a.

Lessingianthus platyphyllus (Chodat) H. Rob. = **Vernonia platyphylla** Chodat

Lessingianthus polyphyllus (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob. = **Vernonia polyphylla** Sch. Bip. ex Baker

Lessingianthus psilophyllus (DC.) H. Rob. = **Vernonia psilophylla** DC.

Lessingianthus pumillus (Vell.) H. Rob. = **Vernonia pumilla** (Vell.) Cabrera

Lessingianthus ramellae (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia ramellae** Cabrera

Lessingianthus reitzianus (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia reitziana** Cabrera

Lessingianthus rubricaulis (Humb. & Bonpl.) H. Rob. = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Lessingianthus saltensis (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia saltensis** Hieron.

Lessingianthus sellowii (Less.) H. Rob. = **Vernonia sellowii** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Lessingianthus simplex (Less.) H. Rob. = **Vernonia simplex** Less.

Lessingianthus ulei (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia ulei** Hieron.

Lessingianthus westermanii (Ekman & Dusén ex Malme) H. Rob. = **Vernonia westermanii** Ekman & Dusén ex Malme

Leucanthemum Mill.

Número de especies: 1 introducida

Leucanthemum balsamita (L.) Over = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Leucanthemum leucanthemum (L.) Rydb. = **Leucanthemum vulgare** Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Leucanthemum myconis (L.) Giraud = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978].

Leucanthemum parthenium (L.) Gren. & Godr. = **Tanacetum parthenium** (L.) Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Leucanthemum vulgare Lam.
Sin.: *Chrysanthemum leucanthemum* L., *Leucanthemum leucanthemum* (L.) Rydb., *Tanacetum leucanthemum* (L.) Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a, 1974a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, NEU, RNE, SCR, SFE, TDF); BRA(RGS); CHL(IV, VII, VIII, IX, X, XII, RME); URY(CAS, COL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1841* (LP)]; BRA[*Palacios, M. A. 855* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6164* (LP)]; URY[*sin colector s.n.* (LP)].

Leuceria abbreviata (Bertero) Steud. = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria acanthoides D. Don = **Leucheria hieracioides** Cass.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria andryaloides DC. = **Leucheria rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria anthemidifolia Phil. = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria araucana Phil. = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria aurita Phil. = **Leucheria coerulescens** J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria barrasiana (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl. = **Leucheria runcinata** D. Don

Leuceria barrasiana (J. Remy) Reiche = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria barrasiana (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria candidissima D. Don f. *subintegra* Skottsb. = **Leucheria candidissima** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria canescens (Phil.) Reiche = **Leucheria congesta** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria chillanensis Reiche = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria cinerea D. Don = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria concinna (Phil.) Reiche = **Leucheria landbeckii** (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria contrayerba Kurtz = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Leuceria conyzoides D. Don = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Leuceria coquimbana (Phil.) Reiche = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria debilis Phil. = **Leucheria cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria discolor Phil. = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria divaricata D. Don = **Leucheria hieracioides** Cass.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria echioides D. Don = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Leuceria eriochlaena J. Remy = **Leucheria tomentosa** (Less.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria foliosa Phil. = **Marticorenia foliosa** (Phil.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1974a.

Leuceria fuegiana Phil. = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria glabrata Phil. = **Leucheria cerberoana** J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria glacialis (Poepp. ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria glandulosa Phil., nom. illeg. = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria glomerulata (Kuntze) K. Schum. = **Leucheria congesta** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria gossypina Hook. & Arn. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria gossypina Hook. & Arn. var. *integrifolia* Sch. Bip. = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria gossypina Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip. = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria gracilis Albov = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria hahnii Franch. var. *lanata* (Albov) Cabrera = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria hieracioides D. Don, hom. illeg. = **Leucheria gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria hoffmannii Dusén = **Leucheria leontopodioides** (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria ibari Phil. = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria ibari Phil. var. *glabrata* Speg. = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria ibari Phil. var. *glandulosa* Speg. = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria integrifolia (Phil.) Reiche ex Rob. = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria laciniata Hook. & Arn. = **Leucheria candidissima** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria lanata Albov = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria lanata Albov f. *virescens* Albov = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria lanigera O. Hoffm. = **Leucheria leontopodioides** (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria lepida Phil. = **Leucheria rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria leucomalla Phil. = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria longifolia Phil. = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria meyeniana Walp. = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria microcephala Reiche = **Leucheria bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria modesta (Phil.) Reiche = **Leucheria cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria multifida (DC.) S. Moore = **Leucheria achillaeifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria neaei DC. = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria nivea Phil. = **Leucheria gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria nudicaulis Phil. = **Leucheria gayana** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria patagonica Speg. = **Leucheria hahnii** Franch.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria paucicapitata Reiche = **Leucheria landbeckii** (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria pauciflora Phil. = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria peduncularis J. Remy = **Leucheria glandulosa** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria popetana Phil. = **Leucheria gayana** (J. Remy) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria pulchella D. Don = **Leucheria tomentosa** (Less.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria purpurea (Vahl) S. Moore ex Rendle = **Leucheria purpurea** (Vahl) Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria racemosa Phil. = **Leucheria floribunda** DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria rosea (Less.) Reiche = **Leucheria viscida** (Bertero ex Colla) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria salina (J. Remy) Dusén, comb. superfl. = **Leucheria salina** (J. Remy) Hieron. subsp. **salina**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria salina (J. Remy) Reiche = **Leucheria salina** (J. Remy) Hieron. subsp. **salina**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria scrobiculata D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria senecioides Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC. = **Leucheria senecioides** Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria sonchifolia (Turcz.) Reiche = **Leucheria floribunda** DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria sonchoides Phil. = **Leucheria congesta** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria stricta Phil. = **Leucheria magna** Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria suaveolens (d'Urv.) Druce, comb. superfl. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria suaveolens (d'Urv.) Skottsb. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria tenerifolia Phil. = **Leucheria runcinata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria thermarum (Phil.) Reiche = **Leucheria thermarum** (Phil.) Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria thermarum (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche = **Leucheria glacialis** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leuceria thrincioides Griseb. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Leuchaeria volcanica Hook. & Arn. = **Leucheria lithospermifolia** (Less.) Reiche subsp. **lithospermifolia**
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leucheria Lag.

Número de especies: 45, 43 endémicas

Leucheria achillaeifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Chabraea fragans* Phil., *Chabraea multifida* DC., *Lasiorhiza achillaefolia* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorhiza anthemidifolia* (Phil.) Kuntze, *Lasiorhiza fragans* (Phil.) Kuntze, *Lasiorhiza ibari* (Phil.) Macloskie, *Lasiorhiza multifida* (DC.) Kuntze, *Leuceria anthemidifolia* Phil., *Leuceria ibari* Phil., *Leuceria ibari* Phil. var. *glabrata* Speg., *Leuceria ibari* Phil. var. *glandulosa* Speg., *Leuceria multifida* (DC.) S. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(VII, VIII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14414* (LP, SI)]; CHL[*Pfister, A. 8030* (LP)].

Leucheria amoena Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11152* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 4575* (CONC)].

Leucheria apiifolia Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 892* (CONC)].

Leucheria bridgesii Hook. & Arn.
Sin.: *Chabraea pulchella* Phil., *Lasiorhiza pulchella* (Phil.) Kuntze, nom. illeg., *Leuceria microcephala* Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2877* (LP)].

Leucheria candidissima D. Don
Sin.: *Chabraea candidissima* (D. Don) DC., *Lasiorhiza candidissima* (D. Don) Macloskie, *Leuceria candidissima* D. Don f. *subintegra* Skottsb., *Leuceria laciniata* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11411* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 4965* (LP)].

Leucheria cerberoana J. Remy
Sin.: *Leuceria glabrata* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1437* (LP)].

Leucheria coerulescens J. Remy
Sin.: *Leuceria aurita* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 164* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 732* (LP)].

Leucheria congesta D. Don
Sin.: *Chabraea canescens* Phil., *Lasiorhiza glomerulata* Kuntze, *Leuceria canescens* (Phil.) Reiche, *Leuceria glomerulata* (Kuntze) K. Schum., *Leuceria sonchoides* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3100 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 2339* (LP)]; CHL[*Crisci, J. V. 460* (LP)].

Leucheria cumingii Hook. & Arn.
Sin.: *Chabraea modesta* Phil., *Leuceria debilis* Phil., *Leuceria modesta* (Phil.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. 8571* (LP)].

Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci
Sin.: *Chabraea daucifolia* (D. Don) Wedd., *Chabraea laciniata* Wedd., *Ptilurus daucifolius* D. Don
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 2600–4800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 845* (CONC)].

Leucheria diemii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2100 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, W. 3602* (LP)].

Leucheria eriocephala Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)].

Leucheria floribunda DC.
Sin.: *Eizaguirrea candollei* J. Remy, *Eizaguirrea cirsioides* Phil., *Eizaguirrea sonchifolia* Turcz., *Lasiorhiza floribunda* (DC.) Kuntze, *Leuceria racemosa* Phil., *Leuceria sonchifolia* (Turcz.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, A. 15615* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 3784* (LP)].

Leucheria garciana J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 887* (LP)].

Leucheria gayana (J. Remy) Reiche
Sin.: *Chabraea gayana* J. Remy, *Leuceria nudicaulis* Phil., *Leuceria popetana* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8508* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 724* (LP)].

Leucheria gilliesii Hook. & Arn.
Sin.: *Leuceria hieracioides* D. Don, hom. illeg., *Leuceria nivea* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13914* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. 2246* (LP)].

Leucheria glabriuscula (Phil.) Reiche
Sin.: *Chabraea glabriuscula* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Anual. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (LP)].

Leucheria glacialis (Poepp. ex Less.) Reiche
Sin.: *Chabraea glacialis* (Poepp. ex Less.) DC., *Lasiorhiza glacialis* Poepp. ex Less., *Leuceria araucana* Phil., *Leuceria discolor* Phil., *Leuceria glacialis* (Poepp. ex Less.) Reiche var. *longifolia* (Phil.) Cabrera, *Leuceria longifolia* Phil., *Leuceria pauciflora* Phil., *Leuceria thermarum* (Phil.) Reiche var. *araucana* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10368* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3649* (LP)].

Leucheria glandulosa D. Don
Sin.: *Chabraea elongata* Bertero ex Colla, *Chabraea glandulosa* (D. Don) DC., *Lasiorhiza glandulosa* (D. Don) DC., *Leuceria pedunculares* J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 1145* (LP)].

Leucheria hahnii Franch.
Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil., hom. illeg., *Lasiorhiza fueguiana* (Phil.) Kuntze, *Lasiorhiza gracilis* (Albov) Macloskie, *Lasiorhiza hahnii* (Franch.) Macloskie, *Lasiorhiza lanata* (Albov) Macloskie, *Lasiorhiza patagonica* (Speg.) Macloskie, *Leuceria fuegiana* Phil., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn. var. *integrifolia* Sch. Bip., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn. var. *pinnatifida* Sch. Bip., *Leuceria gracilis* Albov, *Leuceria hahnii* Franch. var. *lanata* (Albov) Cabrera, *Leuceria integrifolia* (Phil.) Reiche ex Rob., *Leuceria lanata* Albov, *Leuceria lanata* Albov f. *virescens* Albov, *Leuceria patagonica* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 7977* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 2791* (LP)].

Leucheria hieracioides Cass.
Sin.: *Lasiorhiza acanthoides* (D. Don) Kuntze, *Lasiorhiza hieracioides* (Cass.) Kuntze, *Leuceria acanthoides* D. Don, *Leuceria divaricata* D. Don
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, G. 4626* (LP)].

Leucheria integrifolia (Phil.) Crisci = **Leucheria lithospermifolia** (Less.) Reiche subsp. **integrifolia** (Phil.) Grau & Zinnecker
Referencias: Grau, J., 1987.

Leucheria landbeckii (Phil.) Reiche
Sin.: *Chabraea concinna* Phil., *Chabraea landbeckii* Phil., *Chabraea oligocephala* Phil., *Leuceria concinna* (Phil.) Reiche, *Leuceria paucicapitata* Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 7154* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 1391* (LP)].

Leucheria leontopodioides (Kuntze) K. Schum.
Sin.: *Lasiorhiza hoffmannii* (Dusén) Macloskie, *Lasiorhiza lanigera* (O. Hoffm.) Macloskie, *Lasiorhiza leontopodioides* Kuntze, *Leuceria hoffmannii* Dusén, *Leuceria lanigera* O. Hoffm.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1374* (LP)]; CHL[*Donat, A. 411* (LP)].

Leucheria lithospermifolia (Less.) Reiche subsp. **integrifolia** (Phil.) Grau & Zinnecker
Sin.: *Chabraea integrifolia* Phil., *Leucheria integrifolia* (Phil.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Grau, J., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 5549* (LP)].

Leucheria lithospermifolia (Less.) Reiche subsp. **lithospermifolia**
Sin.: *Chabraea lithospermifolia* (Less.) DC., *Lasiorhiza lithospermifolia* Less., *Leuchaeria volcanica* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frenguelli, J. 509* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 733* (LP)].

Leucheria magna Phil.
Sin.: *Lasiorhiza stricta* (Phil.) Macloskie, *Leuceria stricta* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(IX, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21957* (LP)]; CHL[*Maldonado-Bruzzone, R. 65* (LP)].

Leucheria menana J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 1051* (LP)].

Leucheria millefolium Dusén & Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 519* (LP)]; CHL[*Vergara, Z. 2357* (LP)].

Leucheria multiflora Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 1365* (LP)].

Leucheria nutans (J. Remy) Reiche
Sin.: *Chabraea nutans* J. Remy, *Chabraea poeppigii* Phil., *Clybatis volkmanii* Phil., *Lasiorhiza nutans* (J. Remy) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Neumeyer, J. J. 479* (LP)]; CHL[*Pfister, A. 7381* (LP)].

Leucheria oligocephala J. Remy
Sin.: *Trixis senecioides* Hook.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mahu, M. 997* (LP)].

Leucheria paniculata Poepp. ex Less.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2800 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 218* (NY)].

Leucheria papillosa Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11556* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 7731* (LP)].

Leucheria polyclados (J. Remy) Reiche
Sin.: *Chabraea polyclados* J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3100 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Krapovickas, A. 5792* (LP)].

Leucheria pteropogon (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Senecio pteropogon* Griseb.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–5100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6997* (LP)]; CHL[*Navas, E. 2144* (LP)].

Leucheria purpurea (Vahl) Hook. & Arn.
Sin.: *Chabraea purpurea* (Vahl) DC., *Lasiorhiza purpurea* (Vahl) Less., *Leuceria purpurea* (Vahl) S. Moore ex Rendle, *Perdicium purpureum* Vahl
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, R. N. P. 147* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6169* (LP)].

Leucheria rosea Poepp. ex Less.
Sin.: *Lasiorhiza rosea* Less. var. *albiflora* Kuntze, *Lasiorhiza rosea* Less. var. *andryaloides* (DC.) Kuntze, *Leuceria andryaloides* DC., *Leuceria lepida* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 1118* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3445* (LP)].

Leucheria runcinata D. Don
Sin.: *Chabraea barrasiana* J. Remy, *Chabraea coquimbana* Phil., *Chabraea runcinata* (D. Don) Hook., *Chabraea tenerifolia* Phil., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche, *Leuceria barrasiana* (J. Remy) Reiche var. *tenerifolia* (Phil.) Reiche, *Leuceria coquimbana* (Phil.) Reiche, *Leuceria meyeniana* Walp., *Leuceria tenerifolia* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–3800 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1254* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 5720* (LP)].

Leucheria salina (J. Remy) Hieron. subsp. **salina**
Sin.: *Chabraea salina* J. Remy, *Chabraea salinasi* Phil. var. *bipinnatifida* Phil., *Lasiorhiza salina* (J. Remy) Kuntze, *Leuceria salina* (J. Remy) Dusén, comb. superfl., *Leuceria salina* (J. Remy) Reiche
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 162* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 2546* (LP)].

Leucheria salina (J. Remy) Hieron. subsp. **zöllneri** Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 7171* (LP)]; CHL[*Behn, F. s.n.* (CONC)].

Leucheria scrobiculata D. Don
Sin.: *Chabraea glabra* DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC., *Chabraea scrobiculata* (D. Don) DC. var. *pentacephala* Phil., *Lasiorhiza glabra* (DC.) Kuntze, *Lasiorhiza scrobiculata* (D. Don) Kuntze, *Leuceria scrobiculata* D. Don var. *glabra* (DC.) Hauman, *Mimela pedicularifolia* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4200 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 23561* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 1392* (LP)].

Leucheria senecioides Hook. & Arn.
Sin.: *Chabraea abbreviata* Bertero ex Colla, *Chabraea cinerea* (D. Don) DC., *Lasiorhiza cinerea* (D. Don) Less., *Lasiorhiza senecioides* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Leuceria abbreviata* (Bertero) Steud., *Leuceria cinerea* D. Don, *Leuceria senecioides* Hook. & Arn. var. *purpurescens* DC.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2637* (LP)].

Leucheria suaveolens (d'Urv.) Rob., comb. superfl.
= **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Leucheria suaveolens (d'Urv.) Speg.
Sin.: *Chabraea suaveolens* (d'Urv.) DC., *Lasiorhiza ceterachifolia* Cass., *Lasiorhiza gossypina* (Hook. & Arn.) Macloskie, *Lasiorhiza suaveolens* (d'Urv.) Macloskie, *Lasiorhiza viscosa* Cass., *Leuceria gossypina* Hook. & Arn., *Leuceria suaveolens* (d'Urv.) Druce, comb. superfl., *Leuceria suaveolens* (d'Urv.) Skottsb., *Leucheria suaveolens* (d'Urv.) Rob., comb. superfl., *Perdicium suaveolens* d'Urv., *Picris macloviana* d'Urv. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 519* (LP)].

Leucheria tenuis Less.
Sin.: *Chabraea berteroniana* Steud., *Chabraea tenuior* Bertero ex Colla
Referencias: Crisci, J. V., 1976b; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(V, VI, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 26116* (LP)].

Leucheria thermarum (Phil.) Phil.
Sin.: *Chabraea thermarum* Phil., *Leuceria thermarum* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Crisci, J. V., 1976b; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 533* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3623* (LP)].

Leucheria tomentosa (Less.) Crisci
Sin.: *Chabraea tomentosa* (Less.) DC., *Lasiorhiza pulchella* (D. Don) Steud., *Lasiorhiza tomentosa* Less., *Leuceria eriochlaena* J. Remy, *Leuceria pulchella* D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4240* (CONC, LP)].

Leucheria viscida (Bertero ex Colla) Crisci
Sin.: *Chabraea rosea* (Less.) DC., *Chabraea viscida* Bertero ex Colla, *Chabraea viscosa* Bertero ex DC., *Lasiorhiza philippiana* Kuntze, *Lasiorhiza rosea* Less., *Leuceria chillanensis* Reiche, *Leuceria glandulosa* Phil., nom. illeg., *Leuceria leucomalla* Phil., *Leuceria neaei* DC., *Leuceria rosea* (Less.) Reiche
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 7118* (LP)]; CHL[*Ruiz, L. F. 15* (LP)].

Leucopsis acuminata (DC.) Malme = **Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis calendulacea (Griseb.) Baker = **Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis calvata Baker = **Noticastrum calvatum** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis diffusa (Pers.) Baker = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis gnaphalioides Baker = **Noticastrum gnaphalioides** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis harveyi Baker = **Noticastrum eriophorum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis macrocephala Baker = **Noticastrum macrocephalum** (Baker) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis psammophila Malme = **Noticastrum malmei** Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis psammophila Malme var. *calvescens* Malme = **Noticastrum malmei** Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis scaposa (DC.) Baker = **Inulopsis scaposa** (DC.) O. Hoffm.
Referencias: Nesom, G. L., 1994e.

Leucopsis sericea (Less.) Baker = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Leucopsis sericea (Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy) Baker = **Noticastrum eriophorum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Leucopsis tweediei (Hook. & Arn.) Baker = **Leptostelma tweediei** (Hook. & Arn.) D. J. N. Hind & G.L. Nesom
Referencias: Hind, D. J. N. & Nesom, G. L., 2002.

Leunisia Phil.

Número de especies: 1 endémica

Leunisia laeta Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Reiche, C. F., 1905.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volckmann, G. s.n.* (LP)].

Liabellum humile Cabrera = **Microliabum humile** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1955a.

Liabum Adans.

Número de especies: 1

Liabum acuminatum Rusby
Referencias: Gutiérrez, D. G., 2003; Rusby, H. H., 1927.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Palací, C. A. 738* (SI)].

Liabum asperifolium Muschl. = **Paranephelius asperifolius** (Muschl.) H. Rob. & Brettell
Referencias: Robinson, H. E. & Brettell, R. D., 1974.

Liabum auriculatum Griseb. = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Liabum candidum Griseb. = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Liabum candidum Griseb. var. *glanduliferum* Cabrera = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Liabum candidum Griseb. var. *subcirrhosum* (S.F. Blake) Cabrera = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Liabum eremophilum Cabrera = **Microliabum eremophilum** (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Liabum hastifolium Poepp. = **Munnozia hastifolia** (Poepp.) H. Rob. & Brettell
Referencias: Robinson, H. E. & Brettell, R. D., 1974.

Liabum laticiferum V.M. Badillo = **Munnozia hastifolia** (Poepp.) H. Rob. & Brettell
Referencias: Robinson, H. E., 1983.

Liabum polymnioides R.E. Fr. = **Microliabum polymnioides** (R.E. Fr.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Liabum subcirrhosum S.F. Blake = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990a.

Lieberkuhna bracteata Cass. = **Chaptalia piloselloides** (Vahl) Baker
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Logfia Cass.

Número de especies: 1 introducida

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.
Sin.: *Filago gallica* L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 351* (CONC)].

Lophopappus Rusby

Número de especies: 3, 1 endémica

Lophopappus cuneatus R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1953b, 1978; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Nativa. 3400–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21480* (LP)].

Lophopappus foliosus Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1953b, 1978; Faúndez, L. & Macaya, J., 1998; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17638* (LP)]; CHL[*Faúndez, L. 257101* (AGUCH)].

Lophopappus tarapacanus (Phil.) Cabrera
Sin.: *Gochnatia tarapacana* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.
Arbusto. Endémica. 2800–4300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3521* (CONC)].

Lorentea cryptopetala DC. = **Pectis sessiliflora** (Less.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Lorentea sessiliflora Less. = **Pectis sessiliflora** (Less.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Lorentzia pascaloides Griseb. = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Lorentzianthus viscidus (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium viscidum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Loxodon brevipes Cass. = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **exscapa**
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Loxodon chilensis DC. = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **chilensis** (DC.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Loxodon longipes Cass. = **Chaptalia runcinata** Kunth
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Lucilia Cass.

Número de especies: 7, 1 endémica

Lucilia acutifolia (Poir.) Cass.
Sin.: *Gnaphalium commersonii* Spreng., *Gnaphalium jamesonii* (Baker) Kuntze, *Gnaphalium virescens* (Less.) Kuntze, *Helichrysum montevidense* Spreng., *Lucilia acutifolia* (Poir.) Cass. f. *virescens* Less., *Lucilia jamesonii* Baker, *Lucilia lundii* Baker, *Lucilia microphylla* Cass., *Pachyrhynchus xeranthemoides* DC., *Serratula acutifolia* Poir.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Freire, S. E., 1986b, 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, PAI); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4484* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4037* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 6086* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2016* (LP)].

Lucilia acutifolia (Poir.) Cass. f. *virescens* Less. = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Lucilia affinis Wedd. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia alpina (Poepp. & Endl.) Cabrera = **Gamochaetopsis alpina** (Poepp. & Endl.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.

Lucilia araucana Phil. = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Lucilia argentea Hook. & Arn. = **Berroa gnaphalioides** (Less.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Lucilia burkartii (Cabrera) S.E. Freire = **Luciliocline burkartii** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia catamarcensis (Cabrera) S.E. Freire = **Luciliocline catamarcense** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia chilensis Hook. & Arn. = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia chilensis Poepp. & Endl., hom. illeg. = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia conoidea Wedd. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia dioica Phil. = **Baccharis nivalis** (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Lucilia erecta Benoist = **Facelis lasiocarpa** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia eriophora J. Remy
Referencias: Freire, S. E., 1986b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(V, VI, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 27* (LP)].

Lucilia flagelliformis Wedd. = **Lucilia lycopodioides** (Less.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1989.

Lucilia frigida Reiche = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia glomerata Baker = **Lucilia lycopodioides** (Less.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1989.

Lucilia gnaphalioides Less. = **Berroa gnaphalioides** (Less.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Lucilia jamesonii Baker = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Lucilia kunthiana (DC.) Zardini = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia linearifolia Baker
Referencias: Freire, S. E., 1986b, 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3929* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 14775* (LP)].

Lucilia lopezmirandae (Cabrera) S.E. Freire = **Luciliocline lopezmirandae** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia lundii Baker = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Lucilia lycopodioides (Less.) S.E. Freire
Sin.: *Hymenopholis imbricata* Gardner, *Lucilia flagelliformis* Wedd., *Lucilia glomerata* Baker, *Oligandra lucilioides* Less., *Oligandra lycopodioides* Less.
Referencias: Freire, S. E., 1986b, 1989, 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24951* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4504* (LP)].

Lucilia microphylla Cass. = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Lucilia nitens Less.
Referencias: Freire, S. E., 1986b, 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14439* (LP, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 741* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 13603* (LP)].

Lucilia nitens Baker = **Berroa gnaphalioides** (Less.) Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Lucilia nivea (Phil.) Cabrera = **Belloa chilensis** (Hook. & Arn.) J. Remy
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia pickeringii A. Gray = **Belloa pickeringii** (A. Gray) Sagást. & M.O. Dillon
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia pickeringii A. Gray var. *minor* A. Gray = **Belloa pickeringii** (A. Gray) Sagást. & M.O. Dillon
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia piptolepis Wedd. = **Belloa piptolepis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia plumosa Wedd. = **Facelis plumosa** (Wedd.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Lucilia pusilla (Kunth) Hieron. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Lucilia recurva Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1986b, 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 4009* (LP)].

Lucilia santanica (Cabrera) S.E. Freire = **Luciliocline santanica** (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia schultzii (Wedd.) A. Gray = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Cabrera, A. L., 1957b.

Lucilia squarrosa Baker = **Lucilia tomentosa** Wedd.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Lucilia subspicata (Wedd.) Hieron. = **Luciliocline subspicata** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991.

Lucilia tomentosa Wedd.
Sin.: *Lucilia squarrosa* Baker
Referencias: Freire, S. E., 1986b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5089* (LP)].

Lucilia tunariensis (Kuntze) K. Schum. = **Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990.

Lucilia venezuelensis Steyerm. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.

Lucilia violacea Wedd. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Luciliocline Anderb. & S.E. Freire

Número de especies: 5, 2 endémicas

Luciliocline burkartii (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Belloa burkartii* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium burkartii* Cabrera, *Lucilia burkartii* (Cabrera) S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14015* (LP)].

Luciliocline catamarcense (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Belloa catamarcensis* Cabrera, *Lucilia catamarcensis* (Cabrera) S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1878* (LP)].

Luciliocline lopezmirandae (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Belloa lopezmirandae* Cabrera, *Belloa turneri* Sagást. & M.O. Dillon, *Gnaphalium americanum* Mill. var. *discolor* Griseb., *Lucilia lopezmirandae* (Cabrera) S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14062* (LP)].

Luciliocline piptolepis (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást. = **Belloa piptolepis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Cabrera, A. L., 1958; Dillon, M. O., 2003.

Luciliocline santanica (Cabrera) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Belloa santanica* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium santanicum* Cabrera, *Gnaphalium sarmentosum* Klatt, *Lucilia santanica* (Cabrera) S.E. Freire
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18317* (LP)].

Luciliocline schultzii (Wedd.) M.O. Dillon & Sagást. = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Dillon, M. O., 2003.

Luciliocline subspicata (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire
Sin.: *Belloa punae* (Cabrera) Cabrera, *Belloa subspicata* (Cabrera) Cabrera, *Gnaphalium punae* Cabrera, *Lucilia subspicata* (Wedd.) Hieron.
Referencias: Anderberg, A. A. & Freire, S. E., 1991; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7357* (SI)].

Luciliopsis argentina Cabrera = **Cuatrecasasiella argentina** (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1985.

Luciliopsis perpusilla Wedd. = **Chaetanthera perpusilla** (Wedd.) Anderb. & S.E. Freire

Lulia Zardini

Número de especies: 1

Lulia nervosa (Less.) Zardini
Sin.: *Trichocline nervosa* Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Zardini, E. M., 1975, 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5500* (LP)].

Lycapsus Phil.

Número de especies: 1 endémica

Lycapsus tenuifolius Phil.
Sin.: *Alomia tenuifolia* (Phil.) Benth. & Hook. f. ex Reiche
Referencias: Bremer, K., 1994; Johnston, I. M., 1935b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Robinson, B. L., 1913; Skottsberg, C. J. F., 1951a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Simpson s.n.* (SGO)].

Macrachaenium Hook. f.

Número de especies: 1 endémica

Macrachaenium foliosum Albov = **Macrachaenium gracile** Hook. f. var. **gracile**
Referencias: Katinas, L., 1995.

Macrachaenium gracile Hook. f. var. **gracile**
Sin.: *Macrachaenium foliosum* Albov
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 107* (LP)].

Macrachaenium gracile Hook. f. var. **radiatum** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6048* (LP)].

Macropodina blumenavii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium blumenavii** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Macropodina reitzii R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium kingii** Cabrera

Macrorhynchus australis Phil. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Macrorhynchus chilensis Less. = **Agoseris chilensis** (Less.) Greene

Macrorhynchus elatus Phil. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Macrorhynchus poeppigii DC. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1971a.

Macrorhynchus pumilum (Gaudich.) DC. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Madariopsis chilensis Nutt. = **Madia chilensis** (Nutt.) Reiche

Madia Molina

Número de especies: 2, 1 endémica

Madia chilensis (Nutt.) Reiche
Sin.: *Madariopsis chilensis* Nutt.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1810* (CONC)].

Madia sativa Molina
Sin.: *Madia viscosa* Cav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, TDF); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2382* (CORD, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996113* (CONC)].

Madia viscosa Cav. = **Madia sativa** Molina
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Malacothrix DC.

Número de especies: 2, 1 introducida

Malacothrix clevelandii A. Gray
Sin.: *Crepis geisseana* Phil., *Malacothrix senecioides* Reiche
Referencias: Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1100 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1453* (CONC)].

Malacothrix coulteri A. Gray
Sin.: *Zollicoferia elquiensis* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Anual. Introducida. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 213* (LP)].

Malacothrix senecioides Reiche = **Malacothrix clevelandii** A. Gray

Malmeanthus catharinensis R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium subintegerrimum** Malme var. **aliciae** Cabrera

Malmeanthus subintegerrimus (Malme) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium subintegerrimum** Malme var. **subintegerrimum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Mandonia pilosella Sch. Bip. = **Hieracium stachyoideum** Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marsea artemisiaefolia (Meyen & Walp.) Kuntze = **Laennecia artemisiifolia** (Meyen & Walp.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1990b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marsea bonariensis (L.) V.M. Badillo var. *leiotheca* (S.F. Blake) V.M. Badillo = **Conyza sumatrensis** (Retz.) E. Walker var. **leiotheca** (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marsea chilensis (Spreng.) Kuntze = **Conyza primulifolia** (Lam.) Cuatrec. & Lourteig
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marsea notobellidiastrum (Griseb.) Kuntze = **Podocoma notobellidiastrum** (Griseb.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marsea sophiifolia (Kunth) Kuntze = **Laennecia sophiifolia** (Kunth) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marsea spathulata (Vahl) V.M. Badillo = **Conyza laevigata** (Rich.) Pruski
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Marshallia aliena Spreng. = **Heterothalamus alienus** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Marticorenia Crisci

Número de especies: 1 endémica

Marticorenia foliosa (Phil.) Crisci
Sin.: *Lasiorhiza foliosa* (Phil.) Kuntze, *Leuceria foliosa* Phil.
Referencias: Crisci, J. V., 1974a.
Arbusto. Endémica. 2700–3300 m.
Países: CHL(III, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 2994* (LP)].

Maruta cotula (L.) DC. = **Anthemis cotula** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Mastigophorus gaudichaudi Cass. = **Nassauvia gaudichaudii** (Cass.) Cass. ex Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Matricaria L.

Número de especies: 2 introducidas

Matricaria balsamita (L.) Desr. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Matricaria chamomilla L. = **Matricaria recutita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Xifreda, C. C., 1985.

Matricaria chamomilla L. var. *recutita* (L.) Grierson = **Matricaria recutita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Matricaria discoidea DC. = **Matricaria matricarioides** (Less.) Porter
Referencias: Amat, A. G., 1985; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1971a.

Matricaria inodora L. = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Amat, A. G., 1985; Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1971a.

Matricaria matricarioides (Less.) Porter
Sin.: *Artemisia matricarioides* Less., *Chamomilla suaveolens* (Pursh) Rydb., *Matricaria discoidea* DC., *Santolina suaveolens* Pursh, hom. illeg.
Referencias: Amat, A. G., 1985; Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Amat, A. G. 145* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6157* (LP)].

Matricaria myconis (L.) Desr. = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Matricaria parthenium L. = **Tanacetum parthenium** (L.) Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979.

Matricaria perforata Mérat = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Matricaria recutita L.
Sin.: *Chamomilla recutita* (L.) Rauscher, *Matricaria chamomilla* L., *Matricaria chamomilla* L. var. *recutita* (L.) Grierson
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a, 1974a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(II, IV, V, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(CAA); URY(CAS, DUR, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 161* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 2615* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3914* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12874* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1296* (LP)].

Melalema humifusa Hook. f. = **Senecio humifusus** (Hook. f.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Melampodium australe Loefl. = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Melampodium bonairensis Bold. = **Baltimora geminata** (Brandegee) Stuessy
Referencias: Stuessy, T. F., 1973.

Melampodium geminatum Brandegee = **Baltimora geminata** (Brandegee) Stuessy
Referencias: Stuessy, T. F., 1973.

Melanthera Rohr

Número de especies: 1

Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera
Sin.: *Echinocephalum angustifolium* Gardner, *Echinocephalum lanceolatum* Gardner, *Echinocephalum latifolium* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998; Sáenz, A. A., 1999.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CEN); URY(ART, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15666* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5167* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 31481* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 5109* (MVFA)].

Merope argentea Wedd. = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Merope caespititia Wedd. = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Merope erythractis Wedd. = **Belloa erythractis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Merope kunthiana (DC.) Wedd. = **Belloa kunthiana** (DC.) Anderb. & S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Merope piptolepis Wedd. = **Belloa piptolepis** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Merope schultzii Wedd. = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b.

Merope virescens Wedd. = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Mesanthophora brunneri H. Rob. = **Vernonia brunneri** (H. Rob.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999.

Mesanthophora rojasii (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia rojasii** Cabrera

Metazanthus cacalioides Meyen = **Senecio coronopodiphyllus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Metazanthus grandiflorus Meyen, hom. illeg. = **Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Meyeria hispida DC. = **Calea triantha** (Vell.) Pruski

Meyeria longifolia DC. = **Calea longifolia** (DC.) Baker

Meyeria myrtifolia DC. = **Calea myrtifolia** (DC.) Baker

Meyeria parvifolia DC. = **Calea parvifolia** (DC.) Baker

Microchaete humilis (Hook. f.) Sch. Bip. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Microdonta nana Nutt. = **Heterosperma nanum** (Nutt.) Sherff
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Microgyne Less.

Número de especies: 2 endémicas

Microgyne marchesiana Bonifacino & Sancho
Referencias: Sancho, G., Bonifacino, J. M. & Pruski, J. F., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Bonifacino, J. M. 1178* (LP, MO, MVFA)].

Microgyne trifurcata Less.
Sin.: *Erigeron tridactylum* DC., *Microgynella trifurcata* (Less.) Grau, *Vittadinia trifurcata* (Less.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Grau, H. R. J., 1975; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Sancho, G., Bonifacino, J. M. & Pruski, J. F., 2006.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE, SLU); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Friedman, M. 398* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 4459* (LP)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Augusto, 1943).

Microgynella trifurcata (Less.) Grau = **Microgyne trifurcata** Less.
Referencias: Sancho, G., Bonifacino, J. M. & Pruski, J. F., 2006.

Microliabum Cabrera

Número de especies: 4, 3 endémicas

Microliabum candidum (Griseb.) H. Rob.
Sin.: *Austroliabum candidum* (Griseb.) H. Rob. & Brettell, *Liabum auriculatum* Griseb., *Liabum candidum* Griseb., *Liabum candidum* Griseb. var. *glanduliferum* Cabrera, *Liabum candidum* Griseb. var. *subcirrhosum* (S.F. Blake) Cabrera, *Liabum subcirrhosum* S.F. Blake, *Microliabum glanduliferum* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1947; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Robinson, H. E. & Brettell, R. D., 1974; Robinson, H. E., 1990a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 400–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1430* (LP)].

Microliabum eremophilum (Cabrera) H. Rob.
Sin.: *Austroliabum eremophilum* (Cabrera) H. Rob. & Brettell, *Liabum eremophilum* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1947; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Robinson, H. E. & Brettell, R. D., 1974; Robinson, H. E., 1990a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 2400–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 1294* (BAB, LP, SI)].

Microliabum glanduliferum (Cabrera) H. Rob. = **Microliabum candidum** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Microliabum humile (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Angelianthus humilis* (Cabrera) H. Rob. & Brettell, *Liabellum humile* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1955a, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Robinson, H. E., 1990a.
Hierba. Anual. Endémica. 3300–3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Petersen, E. 45* (LP)].

Microliabum polymnioides (R.E. Fr.) H. Rob.
Sin.: *Austroliabum polymniodes* (R.E. Fr.) H. Rob. & Brettell, *Liabum polymnioides* R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1947, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Robinson, H. E., 1990a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 300–2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4158* (LP)].

Micropsis DC.

Número de especies: 5 endémicas

Micropsis australis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a, 1963a, 1971a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 9* (LP)].

Micropsis bonaerensis Manganaro = **Micropsis ostenii** Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., 1974a.

Micropsis dasycarpa (Griseb.) Beauverd
Sin.: *Filago dasycarpa* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a, 1963a, 1974a; Freire, S. E., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAU, CEN, COA, MIE, PAI); URY(ART, CLA, COL, FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10809* (LP)]; BRA[*Araújo, A. A. s.n.* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 5300* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 9595* (LP)].

Micropsis herterii Beauverd = **Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Micropsis involucrata (Lam.) Cabrera = **Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a, 1963a, 1974a.

Micropsis nana Speg., hom. illeg. = **Micropsis spathulata** (Pers.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a.

Micropsis nana DC.
Sin.: *Lasiophyton pusillum* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 300–2500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2333* (LP)].

Micropsis ostenii Beauverd
Sin.: *Micropsis bonaerensis* Manganaro
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a, 1963a, 1974a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(CAS, FLA, PAY, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2385* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 382* (LP)].

Micropsis spathulata (Pers.) Cabrera
Sin.: *Evax spathulata* Pers., *Gnaphalium bracteatum* Willd., *Gnaphalium involucratum* Lam., hom. illeg., *Micropsis herterii* Beauverd, *Micropsis involucrata* (Lam.) Cabrera, *Micropsis nana* Speg., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1932a, 1963a, 1974a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, FLO, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6884* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3849* (LP)].

Micropus globiferus Bertero ex DC. = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Microseris D. Don

Número de especies: 1 introducida

Microseris brevipes Phil. = **Microseris pygmaea** D. Don

Microseris pygmaea D. Don
Sin.: *Bellardia pusilla* Colla, *Fichtea poeppigii* Sch. Bip., *Hyoseris tenella* Poepp., *Krigia chilensis* Bertero, *Krigia chilensis* Nees, *Krigia pinnatifida* Bertero ex DC., *Krigia pusilla* Hort ex DC., *Lepidonema chilense* Fisch. & C.A. Mey., *Microseris brevipes* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual o perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 7582* (LP)].

Mikania Willd.

Número de especies: 82, 30 endémicas

Mikania acrensis B.L. Rob. = **Mikania lindleyana** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cerana, M. M., 1997.

Mikania affinis Gardner = **Mikania lanuginosa** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania anethifolia (DC.) Matzenb.
Sin.: *Eupatorium anethifolium* DC., *Mikania carvifolia* Hieron. ex Arechav., *Mikania verticillata* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Matzenbacher, N. I., 1978; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. 486* (ICN, RB)]; URY[*Marchesi, E. 17617* (MVFA)].

Mikania anisodora Hassl.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Davis, P. N. 60948* (MBM)]; PRY[*Arbo, M. M. 2864* (CTES, G)].

Mikania apiifolia DC. = **Mikania ternata** (Vell.) B.L. Rob.

Mikania apiifolia DC. var. *gracilima* Dusén ex Malme = **Mikania ternata** (Vell.) B.L. Rob.
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.

Mikania araucana Phil. = **Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Robinson, B. L., 1934b.

Mikania argyreiae DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14598* (G)]; PRY[*Zardini, E. M. 7341* (MO, PY)].

Mikania auricularis Griseb. = **Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania bracteosa DC. = **Mikania involucrata** Hook. & Arn.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania buchtienii B.L. Rob.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2005.
Liana. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4321* (JUA, SI)].

Mikania buddleiaefolia DC.
Sin.: *Mikania discolor* Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1685* (RB)].

Mikania burchellii Baker
Sin.: *Mikania salicifolia* Hassl.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Cerana, M. M., 1997; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabral, E. L. 62* (SI), *Tressens, S. G. 5615* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13056* (S)]; PRY[*Hassler, E. 11291* (G), *Montes, J. E. 7228* (SI)].

Mikania cabrerae G.M. Barroso
Referencias: Holmes, W. C., 1999.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 762* (P)].

Mikania calcarulata B.L. Rob.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10548* (G)].

Mikania campanulata Gardner
Sin.: *Mikania sublaxa* Malme
Referencias: Cerana, M. M., 2000; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5828* (CORD, CTES)]; BRA[*Reitz, P. R. 6936* (LP)].

Mikania capricorni B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Cerana, M. M., 1997; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 7166* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 37539* (LP)].

Mikania carvifolia Hieron. ex Arechav. = **Mikania anethifolia** (DC.) Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I., 1978.

Mikania catharinensis Hieron. = **Mikania lundiana** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989].

Mikania charua Griseb. = **Ophryosporus charua** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania chlorolepis Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Cerana, M. M., 1997; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5548* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 734* (R)]; PRY[*Hassler, E. 9332* (BM)].

Mikania clematidifolia Dusén
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3467* (R, S)].

Mikania consanguinea Gardner = **Mikania psilostachya** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.
Sin.: *Cacalia cordifolia* L. f., *Mikania cordifolia* (L. f.) Willd. var. *tomentosa* Hieron., *Mikania gonoclada* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1991[1989]; Cerana, M. M., 1997; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Holmes, W. C., 1993; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, GUA, PAI, PHA); URY(ART, CLA, COL, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20001* (SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 23411* (SI)]; PRY[*Bordas, E. 3815* (CTES, US)]; URY[*Berro, M. B. 1513* (MVFA)].

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. var. *tomentosa* Hieron. = **Mikania cordifolia** (L. f.) Willd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania cynanchifolia (Baker) Malme
Sin.: *Mikania cynanchifolia* (Baker) Malme f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. f. *intermedia* (Malme) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *cynanchifolia* (Baker) Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *cynanchifolia* Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *intermedia* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *mollis* Chodat
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25804* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 1289* (S)]; PRY[*Hassler, E. 7184* (F, GH, MO, NY, UC)].

Mikania cynanchifolia (Baker) Malme f. *intermedia* (Malme) Malme = **Mikania cynanchifolia** (Baker) Malme
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania daspitti W.C. Holmes & McDaniel
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*de Llamas, A. 15* (G), *Montes, J. E. 2285* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. 12485* (CTES)].

Mikania decumbens Malme
Sin.: *Mikania kleiniana* Cabrera
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 40784* (SI), *Krapovickas, A. 44686* (CTES)].

Mikania dentata Spreng. = **Calea pinnatifida** (R. Br.) Less.
Referencias: Holmes, W. C., 2001.

Mikania discolor Baker = **Mikania buddleiaefolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania diversifolia DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, S. M. s.n.* (NY)].

Mikania dusenii B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Franceschi, F. 954* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 18042* (G, S)]; PRY[*Hassler, E. 2494* (BM, F, G, GH, MO, NY, S, US)].

Mikania estrellensis Baker = **Mikania trinervis** Hook. & Arn.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania euryanthela (Malme) W.C. Holmes
Sin.: *Mikania laxa* DC. subsp. *euryanthela* Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cerana, M. M., 1997; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas 12036* (LIL, LP)]; PRY[*Hassler, E. 4142* (BM, G)].

Mikania flavescens Gardner = **Mikania nummularia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania fulva Baker
Sin.: *Eupatorium fulvum* Hook. & Arn., *Mikania hassleriana* Chodat, *Mikania hassleriana* Chodat f. *cuneifolia* Chodat, *Mikania montevidensis* Spreng. ex Baker, nom. nud., *Mikania senecioides* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud., *Mikania ternifolia* DC., *Mikania ternifolia* DC. var. *senecioides* Baker, *Willoughbya ternifolia* (DC.) Kuntze
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Subarbusto. Endémica. 500–1400 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, PAI); URY(ART, LAV, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 266-44* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16886* (S, SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4641* (BM, G, GH)]; URY[*Chebataroff, J. 7003* (LP)].

Mikania glechomaefolia Sch. Bip. ex Baker = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Robinson, B. L., 1934b.

Mikania glomerata Spreng.
Sin.: *Cacalia trilobata* Vell., *Mikania glomerata* Spreng. var. *montana* Hassl., *Mikania hatschbachii* G.M. Barroso, *Mikania hederifolia* DC., *Mikania scansoria* DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CON, COA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 370* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 4928* (MBM, RB, SP), *Rambo, B. 27170* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 11325* (BM, F, G, GH)].

Mikania glomerata Spreng. var. *montana* Hassl. = **Mikania glomerata** Spreng.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania gonoclada DC. = **Mikania cordifolia** (L. f.) Willd.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania guaco Bonpl.
Referencias: Holmes, W. C., 2001.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 48742* (US)].

Mikania guaranitica Hassl.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rotman, A. D. 250* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 11778* (G, MO, US)].

Mikania haenkeana DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; Cerana, M. M., 1997.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34116* (SI)].

Mikania hassleriana Chodat = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania hassleriana Chodat f. *cuneifolia* Chodat = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania hastato-cordata Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 227* (S)].

Mikania hatschbachii G.M. Barroso = **Mikania glomerata** Spreng.
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania hederifolia DC. = **Mikania glomerata** Spreng.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania hemisphaerica Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pabst, G. F. J. 4844* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 19170* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 9333* (G, NY)].

Mikania hirsutissima DC. var. **hirsutissima**
Sin.: *Eupatorium hirtum* Less., nom. nud., *Mikania hirsutissima* DC. var. *martiana* (Gardner) Baker, *Mikania martiana* Gardner, *Mikania sepiaria* Gardner
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Liana. Nativa. 200–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, GUA, PAI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 4312* (RB), *Rodríguez, F. M. 416* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 52992* (RB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4426* (F, MO, US)].

Mikania hirsutissima DC. var. *martiana* (Gardner) Baker = **Mikania hirsutissima** DC. var. **hirsutissima**
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania hirsutissima DC. var. **ursina** Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Liana. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6534* (G)].

Mikania hoehnei B.L. Rob.
Sin.: *Mikania testudinaria* Baker, p.p.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 770* (LP)].

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme var. **hoffmanniana**
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Endémica. 600–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8752* (S)].

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme var. **microphylla** Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 1000–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10033* (S)].

Mikania hoffmanniana Dusén ex Malme var. **polycephala** (Dusén) Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Liana. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10162* (G, LP, S)].

Mikania humilis Kuntze ex Hieron. = **Mikania urticifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.

Mikania involucrata Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania bracteosa* DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(LAV, MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 29663* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 1051* (MVFA)].

Mikania joergensenii B.L. Rob. = **Mikania urticifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.

Mikania jujuyensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cerana, M. M., 1997.
Enredadera. Endémica. 1700–2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1895* (SI)].

Mikania kleiniana Cabrera = **Mikania decumbens** Malme
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania laevigata Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 27129* (LP), *Sehnem, A. 2163* (SI)].

Mikania laevis DC. = **Mikania trinervis** Hook. & Arn.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania lagoensis Baker = **Mikania thapsoides** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania lanuginosa DC.
Sin.: *Mikania affinis* Gardner
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 500–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4464* (M, R)].

Mikania lasiandrae DC.
Sin.: *Mikania strigosa* Gardner
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 400–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4441* (R)].

Mikania latisquama Cabrera = **Mikania smaragdina** Dusén ex Malme
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.

Mikania laxa DC. subsp. *euryanthela* Malme = **Mikania euryanthela** (Malme) W.C. Holmes
Referencias: Cerana, M. M., 1997; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania ligustrifolia DC.
Sin.: *Mikania racemosa* Mart.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Enredadera. Perenne. Nativa. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 501* (NY)].

Mikania lima Schltdl. = **Mikania psilostachya** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania lindbergii Baker var. **collina** Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3060* (RB)].

Mikania lindbergii Baker var. **lindbergii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9140* (HBR, LP)].

Mikania lindleyana DC.
Sin.: *Mikania acrensis* B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Cerana, M. M., 1997.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 68* (CTES, SI)]; BRA[*Hunziker, J. H. 2611* (LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5895* (LP), *Woolston, A. 993* (SI)].

Mikania lundiana DC.
Sin.: *Mikania catharinensis* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7142* (MBM)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar localidad o material de referencia (Ritter & Miotto, 2005).

Mikania martiana Gardner = **Mikania hirsutissima** DC. var. **hirsutissima**
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania mendocina Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1971a; Cerana, M. M., 1997; Robinson, B. L., 1934b.
Enredadera. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. s.n.* (BA)]; CHL[*Marticorena, C. 850* (CONC)].

Mikania micrantha Kunth
Sin.: *Mikania glechomaefolia* Sch. Bip. ex Baker, *Mikania orinocensis* Kunth, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *subcymosa* (Gardner) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *umbellifera* (Gardner) Baker, *Mikania subcrenata* Hook. & Arn., *Mikania subcymosa* Gardner, *Mikania umbellifera* Gardner
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Cabrera, A. L., et al., 2000; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(CAS, FLA, MON, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1636* (SI), *Morrone, O. 219* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40964* (LP, SI)]; PRY[*Fortunato, R. H. 1100* (BAB, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15495* (MVFA)].

Mikania microcephala DC.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Enredadera. Nativa. 600–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8114* (MBM)].

Mikania microlepis Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 12043* (S)].

Mikania microptera DC.
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 911* (ICN)].

Mikania minima (Baker) B.L. Rob.
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *minima* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cerana, M. M., 1997; Robinson, B. L., 1934b.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tweedie, J. 1188* (K)].

Mikania montevidensis Spreng. ex Baker, nom. nud. = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania nana W.C. Holmes
Referencias: Holmes, W. C., 1992.
Hierba o enredadera. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22847* (MBM)].

Mikania niederleinii Hieron. = **Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Robinson, B. L., 1934b.

Mikania nigricans Gardner
Liana. Nativa. 200–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 53309* (MBM)].

Mikania nummularia DC.
Sin.: *Mikania flavescens* Gardner
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3280* (R)].

Mikania oblongifolia DC.
Sin.: *Kanimia oblongifolia* (DC.) Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cerana, M. M., 1997.
Subarbusto. Nativa. 200–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 23363* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11075* (RB)].

Mikania obsoleta (Vell.) G.M. Barroso
Sin.: *Cacalia obsoleta* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989].
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 11212* (HBR, LP)].

Mikania officinalis Mart.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4226* (RB)].

Mikania oreophila M.R. Ritter & Miotto
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 700–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ritter, M. R. 1110* (FLOR, ICN, MBM, MO)].

Mikania orinocensis Kunth = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Holmes, W. C., 1993.

Mikania orleansensis Hieron.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Endémica. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mattos, J. R. 22754* (SI)].

Mikania pachylepis Sch. Bip. ex Baker = **Mikania rufescens** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.

Mikania paniculata DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11974* (S)]; PRY[*Osten, C. 7895* (G)].

Mikania paranensis Dusén
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 53861* (SI)].

Mikania parodii Cabrera
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, JUJ, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5537* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 30496* (LP)]; URY[*Marchesi, E. 26645* (MVFA)].

Mikania pentstemonoides DC. = **Mikania sulcata** (Hook. & Arn.) B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania periplocifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania araucana* Phil., *Mikania auricularis* Griseb., *Mikania niederleinii* Hieron., *Mikania scandens* (L.) Willd. subsp. *paraguayensis* Malme, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *sagittifolia* Hassl.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, COA, PAI, PHA); URY(CLA, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7203* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 434* (S)]; PRY[*Hassler, E. 295* (G), *Mereles, F. 1606* (SI)]; URY[*Felippone, F. 3185* (SI)].

Mikania phyllopoda Griseb. = **Mikania urticifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.

Mikania pilcomayensis (Hassl.) B.L. Rob.
Sin.: *Mikania scandens* (L.) Willd. var. *pilcomayensis* Hassl.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Liana. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 268* (G)].

Mikania pinnatiloba DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a, 1991[1989]; Cerana, M. M., 1997; Fontana, J. L., 1998; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ibarrola, T. 2491* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11462* (RB)]; PRY[*Comisión argentino-paraguaya de límites 36* (BM)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Barroso, 1959; Ritter & Miotto, 2005).

Mikania polystachya DC. = **Mikania psilostachya** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania pseudohoffmanniana G.M. Barroso var. **microphylla** G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2211* (RB)].

Mikania pseudohoffmanniana G.M. Barroso var. **pseudohoffmanniana**
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4059* (RB)].

Mikania pseudorimachii W.C. Holmes & McDaniel
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Liana. Endémica. 500–600 m.
Países: PRY(CEN, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 4722* (G)].

Mikania psilostachya DC.
Sin.: *Mikania consanguinea* Gardner, *Mikania lima* Schltdl., *Mikania polystachya* DC., *Mikania psilostachya* DC. var. *racemulosa* Baker, *Mikania psilostachya* DC. var. *scabra* Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17973* (S)].

Mikania psilostachya DC. var. *racemulosa* Baker = **Mikania psilostachya** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania psilostachya DC. var. *scabra* Baker = **Mikania psilostachya** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania racemosa Mart. = **Mikania ligustrifolia** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania riedeliana Casar. ex B.L. Rob. = **Mikania rufescens** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania rufescens Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Mikania pachylepis* Sch. Bip. ex Baker, *Mikania riedeliana* Casar. ex B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1395* (S)].

Mikania salicifolia Hassl. = **Mikania burchellii** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania saltensis Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; Cerana, M. M., 1997.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1427* (SI)].

Mikania salviifolia Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 473* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 8168* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 482* (SI)].

Mikania sapucayensis Hassl. = **Mikania variifolia** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989]; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania satureiifolia (Lam.) Willd. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania scandens (L.) Willd. f. *intermedia* (Malme) Malme = **Mikania cynanchifolia** (Baker) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *beta* Hook. & Arn. = **Eupatorium arnottii** Baker
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *cynanchifolia* Baker = **Mikania cynanchifolia** (Baker) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *intermedia* Malme = **Mikania cynanchifolia** (Baker) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *minima* Baker = **Mikania minima** (Baker) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *mollis* Chodat = **Mikania cynanchifolia** (Baker) Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *periplocifolia* (Hook. & Arn.) Baker = **Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Robinson, B. L., 1934b.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *pilcomayensis* Hassl. = **Mikania pilcomayensis** (Hassl.) B.L. Rob.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *sagittifolia* Hassl. = **Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *subcymosa* (Gardner) Baker = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Robinson, B. L., 1934b.

Mikania scandens (L.) Willd. var. *umbellifera* (Gardner) Baker = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Robinson, B. L., 1934b.

Mikania scandens (L.) Willd. subsp. *cynanchifolia* (Baker) Malme = **Mikania cynanchifolia** (Baker) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania scandens (L.) Willd. subsp. *paraguayensis* Malme = **Mikania periplocifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Mikania scansoria DC. = **Mikania glomerata** Spreng.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Mikania senecioides Sch. Bip. ex Baker, nom. nud. = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania sepiaria Gardner = **Mikania hirsutissima** DC. var. **hirsutissima**
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania sericea Hook. & Arn.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 549* (LP)].

Mikania sessilifolia DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989].
Subarbusto. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12068* (RB)].

Mikania siambonensis Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cerana, M. M., 1997.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. s.n.* (B)].

Mikania smaragdina Dusén ex Malme
Sin.: *Mikania latisquama* Cabrera, *Mikania smaragdina* Dusén ex Malme var. *nebularum* Dusén ex Malme
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8193* (S), *Sehnem, A. 5662* (SI)].

Mikania smaragdina Dusén ex Malme var. *nebularum* Dusén ex Malme = **Mikania smaragdina** Dusén ex Malme
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.

Mikania strigosa Gardner = **Mikania lasiandrae** DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania subcrenata Hook. & Arn. = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Holmes, W. C., 1993; Robinson, B. L., 1934b.

Mikania subcymosa Gardner = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Holmes, W. C., 1993; Robinson, B. L., 1934a.

Mikania sublaxa Malme = **Mikania campanulata** Gardner
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania sulcata (Hook. & Arn.) B.L. Rob.
Sin.: *Eupatorium sulcatum* Hook. & Arn., *Mikania pentstemonoides* DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CON, COA, PAI); URY(ART, FLA, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 944* (P)]; PRY[*Hassler, E. 7631* (G)]; URY[*Berro, M. B. 3549* (MVFA)].

Mikania summinima W.C. Holmes
Referencias: Cerana, M. M., 1997; Holmes, W. C., 1988.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 9626* (SI), *Schwarz, G. J. 2208* (S)].

Mikania tenuiflora Griseb. = **Eupatorium arnottii** Baker
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994.

Mikania ternata (Vell.) B.L. Rob.
Sin.: *Cacalia septemnata* Vell., *Cacalia ternata* Vell., *Mikania apiifolia* DC., *Mikania apiifolia* DC. var. *gracilima* Dusén ex Malme
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Holmes, W. C., 2001; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6120* (CTES, NY)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15226* (G, SI)]; PRY[*Arenas, P. 722* (SI)].

Mikania ternifolia DC. = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania ternifolia DC. var. *senecioides* Baker = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Mikania testudinaria Baker, p.p. = **Mikania hoehnei** B.L. Rob.
Referencias: Barroso, G. M., 1959.

Mikania thapsoides DC.
Sin.: *Eupatorium scandens* Link, *Eupatorium thapsoides* DC. ex Niederl., *Kanimia thapsoides* (DC.) Hieron., *Mikania lagoensis* Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA, MIE); URY (ART, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 907* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 51942* (S)]; PRY[*Balansa, B. 955* (G)]; URY [*Berro, M. B. 1544* (MVFA)].

Mikania thyrsoidea Baker
Referencias: Barroso, G. M., 1959.
Enredadera. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9944* (G)].

Mikania trachypleura B.L. Rob.
Sin.: *Mikania ypacareyensis* W.C. Holmes & McDaniel
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, COA, GUA); URY(ART, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Catalán, C. 92* (SI)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 12819* (MBM)]; PRY[*Chodat, R. H. 389* (G)]; URY[*Berro, M. B. 2502* (MVFA)].

Mikania triangularis Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989].
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1322* (HBR, LP)].

Mikania trinervis Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania estrellensis* Baker, *Mikania laevis* DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Liana. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15215* (SI)].

Mikania ulei Hieron.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Cabrera, A. L., 1991[1989]; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10149* (M, S)].

Mikania umbellifera Gardner = **Mikania micrantha** Kunth
Referencias: Robinson, B. L., 1934b.

Mikania urticifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Mikania humilis* Kuntze ex Hieron., *Mikania joergensenii* B.L. Rob., *Mikania phyllopoda* Griseb.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 97* (SI)]; PRY[*Page, T. s.n.* (US)].

Mikania variifolia Hieron.
Sin.: *Mikania sapucayensis* Hassl.
Referencias: Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003, 2005.
Enredadera o liana. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA, PAI); URY(PAY, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21958* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 5682* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4260* (GH)]; URY[*Felippone, F. 3181* (SI)].

Mikania verticillata Sch. Bip. ex Baker = **Mikania anethifolia** (DC.) Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I., 1978.

Mikania viminea DC.
Referencias: Barroso, G. M., 1959; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 1741* (LP)].

Mikania virgata B.L. Rob.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26593* (MBM)].

Mikania vitifolia DC.
Referencias: Cerana, M. M., 1997; Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6376* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 7129* (MBM)].

Mikania ypacareyensis W.C. Holmes & McDaniel = **Mikania trachypleura** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989]; Holmes, W. C. & McDaniel, S. T., 1996.

Milleria chiloensis Juss. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Powell, A. M., 1978.

Milleria contrayerba Cav. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Powell, A. M., 1978.

Mimela pedicularifolia Phil. = **Leucheria scrobiculata** D. Don
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Minythodes umbellata Phil. = **Chaetanthera tenella** Less. var. **tenella**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Mniodes (A. Gray) Benth.

Número de especies: 1

Mniodes cerratei Ferreyra = **Belloa schultzii** (Wedd.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Mniodes coarctata Cuatrec.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 4600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3375* (CONC)].

Mniodes tunariensis (Kuntze) Hieron. ex Weberb. = **Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990.

Mocinna brasiliensis Spreng. = **Calea pinnatifida** (R. Br.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a.

Molina articulata (Lam.) Less. = **Baccharis articulata** (Lam.) Pers.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2001.

Molina caespitosa Ruiz & Pav. = **Baccharis caespitosa** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **caespitosa**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina concava Ruiz & Pav. = **Baccharis concava** (Ruiz & Pav.) Pers.

Molina conyzoides Less. = **Baccharis conyzoides** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Molina crispa (Spreng.) Less. = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina cylindrica Less. = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina latifolia Ruiz & Pav. = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina linearis Ruiz & Pav. = **Baccharis linearis** (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. **linearis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina microcephala Less. = **Baccharis microcephala** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Molina milleflora Less. = **Baccharis milleflora** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Barroso, G. M., 1976.

Molina nitida Ruiz & Pav. = **Baccharis nitida** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1967.

Molina parviflora Ruiz & Pav. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina phyteumoides Less. = **Baccharis phyteumoides** (Less.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Molina racemosa Ruiz & Pav. = **Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina sagittalis Less. = **Baccharis sagittalis** (Less.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina salicifolia Ruiz & Pav. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giuliano, D. A., 2000.

Molina scandens Ruiz & Pav. = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina striata Ruiz & Pav. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Molina trimera Less. = **Baccharis trimera** (Less.) DC.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Molina venosa Ruiz & Pav. = **Baccharis venosa** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Cabrera, A. L., 1960.

Molina viscosa Ruiz & Pav. = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Montanoa La Llave & Lex.

Número de especies: 1 introducida

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch
Sin.: *Montanoa elegans* K. Koch, *Montanoa heracleifolia* Brongn. ex Groenl., *Montanoa pyramidata* Sch. Bip., *Polymnia grandis* Kunth, *Uhdea bipinnatifida* Kunth

Referencias: Funk, V. A., 1982.
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 9003* (CTESN)].

Montanoa elegans K. Koch = **Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch
Referencias: Funk, V. A., 1982.

Montanoa heracleifolia Brongn. ex Groenl. = **Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch

Montanoa pyramidata Sch. Bip. = **Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch
Referencias: Funk, V. A., 1982.

Moquinia argentina Cabrera = **Gochnatia argentina** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Moquinia argyrea Dusén ex Malme = **Gochnatia argyrea** (Dusén ex Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Moquinia cinerea (Hook.) DC. = **Gochnatia orbiculata** (Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia congesta Gardner = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia curviflora Griseb. = **Gochnatia curviflora** (Griseb.) O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia desertorum Gardner = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia lanuginosa Baker = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia mollisima Malme = **Gochnatia mollisima** (Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia orbiculata Malme = **Gochnatia orbiculata** (Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia orbiculata Malme f. *ovata* Malme = **Gochnatia orbiculata** (Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia paniculata (Less.) DC. = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polycephala Gardner = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polymorpha (Less.) DC. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polymorpha (Less.) DC. var. *ceanothifolia* (Less.) DC. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polymorpha (Less.) DC. var. *eleagnifolia* (Less.) DC. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polymorpha (Less.) DC. var. *obtusifolia* (Less.) DC. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polymorpha (Less.) DC. var. *populifolia* (Less.) DC. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia polymorpha (Less.) DC. var. *sordida* (Less.) DC. = **Gochnatia sordida** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia sordida (Less.) Malme = **Gochnatia sordida** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia tomentosa Bong. = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia velutina Bong. = **Gochnatia velutina** (Bong.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moquinia velutina Bong. var. *cordata* Chodat = **Gochnatia barrosii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Moscharia Ruiz & Pav.

Número de especies: 2 endémicas

Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Crisci, J. V., 1974b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12559* (LP)].

Moscharia solbrigii Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1974b.
Hierba. Anual. Endémica. 300–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 521* (CONC, LP)].

Munnozia Ruiz & Pav.

Número de especies: 1

Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell
Sin.: *Heterotheca deltoidea* Klatt, *Liabum hastifolium* Poepp., *Liabum laticiferum* V.M. Badillo
Referencias: Cabrera, A. L., 1947, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Robinson, H. E., 1983.
Subarbusto. Nativa. 700–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20784* (LP)].

Mutisia L. f.

Número de especies: 35, 25 endémicas

Mutisia acerosa Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*King, D. O. s.n.* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 2451* (LP)].

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. **hirsuta** (Meyen) Cabrera
Sin.: *Mutisia hirsuta* Meyen, *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Arbusto. Nativa. 2500–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4761* (LP)].

Mutisia acuminata Ruiz & Pav. var. **paucijuga** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Mutisia viciaefolia* Cav. var. *paucijuga* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13894* (LP)].

Mutisia alba Phil. = **Mutisia rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia arachnoidea Mart. ex D. Don, nom. superfl. = **Mutisia speciosa** Hook.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia araucana Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 800–1400 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eyerdam, W. J. 10270* (UC)].

Mutisia auriculata Poepp. ex Less. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia berteriana Endl. ex Poepp. = **Mutisia rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia berterii DC. = **Mutisia rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia brachyantha Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 1200 m.
Países: CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1590* (LP)].

Mutisia bracteata J. Remy = **Mutisia latifolia** D. Don f. **bracteata** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia breviflora Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia bridgesii Endl. ex Poepp. & Endl. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia burkartii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1976c.
Arbusto. Endémica. 1800 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. 215* (LP)].

Mutisia campanulata Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1965a, 1998; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Torres, M. A. 67* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 10173* (LP)]; PRY[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Mutisia cana Poepp.
Sin.: *Mutisia glauca* J. Remy, *Mutisia polyphylla* Phil., *Mutisia reticulata* Phil., *Mutisia volckmanni* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bonifacino, J. M. 823* (SI)].

Mutisia candolleana Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **decandolleana** (Phil. ex Reiche) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia caryophyllata Vell. = **Mutisia speciosa** Hook.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia castellanosii Cabrera var. **castellanosii**
Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var. *castellanosii* (Cabrera) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000a; Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vignati, M. A. 420* (LP)].

Mutisia castellanosii Cabrera var. **comechingoniana** Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000a.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Volkman, L. s.n.* (CORD)].

Mutisia castellanosii Cabrera var. **hieronymi** (Kuntze) Ariza
Sin.: *Mutisia retrorsa* Cav. var. *hieronymi* Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000a; Cabrera, A. L., 1965a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 2610* (LP)].

Mutisia chubutensis Speg. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. **coccinea**
Sin.: *Mutisia hypoleuca* Mart. ex Zucc. ex Baker, *Mutisia speciosa* Aiton var. *alborufescens* A. St.-Hil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tessmann, G. 1951* (LP)].

Mutisia coccinea A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Sin.: *Mutisia dealbata* (Less.) DC., *Mutisia dealbata* (Less.) DC. var. *guaranitica* Chodat, *Mutisia hayenbeckii* Arechav., *Mutisia speciosa* Aiton var. *dealbata* Less., *Mutisia speciosa* Aiton var. *elliptica* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1965a, 1974a, 1998; Katinas, L., 1996a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 516* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 14498* (CONC)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10912* (LP)]; URY[*Krapovickas, A. 4844* (LP)].

Mutisia consobrina Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia dealbata (Less.) DC. = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1998.

Mutisia dealbata (Less.) DC. var. *guaranitica* Chodat = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Mutisia decandolleana Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **decandolleana** (Phil. ex Reiche) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia decurrens Cav. var. **decurrens**
Sin.: *Aplophyllum decurrens* (Cav.) Cass.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 3287* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996159* (CONC)].

Mutisia decurrens Cav. var. **patagonica** (Phil.) S.F. Blake
Sin.: *Mutisia patagonica* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Corte, A. 209* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3677* (LP)].

Mutisia dentata Phil. = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia elegans Phil. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia eriocephala Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia friesiana Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Nativa. 3500–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Catalano, S. 25* (LP)].

Mutisia gayana J. Remy = **Mutisia oligodon** Poepp. & Endl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia glauca J. Remy = **Mutisia cana** Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia gracilis Meyen = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia grossedentata Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia hamata Reiche
Sin.: *Mutisia philippi* R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8756* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2521* (LP)].

Mutisia hastata Bertero ex DC. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia hayenbeckii Arechav. = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia heterochroa Gand. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia hirsuta Meyen = **Mutisia acuminata** Ruiz & Pav. var. **hirsuta** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia homoeantha Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Nativa. 3000–3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 33143* (LP)].

Mutisia hookeri Meyen = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia hookeri Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia hookeri Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **subulata**
Referencias: Hind, N. & Hall, T., 2003c.

Mutisia hypoleuca Mart. ex Zucc. ex Baker = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **coccinea**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ilicifolia Hook. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ilicifolia Hook. f. *alata* Hauman = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ilicifolia Hook. f. *paucidentata* Hauman = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ilicifolia Hook. var. *cavanillesii* DC. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ilicifolia Hook. var. **decandolleana** (Phil. ex Reiche) Cabrera
Sin.: *Mutisia candolleana* Phil., *Mutisia decandolleana* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Arbusto. Endémica. 200–2000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1871* (LP)].

Mutisia ilicifolia Hook. var. **ilicifolia**
Sin.: *Aplophyllum ilicifolium* (Cav.) Cass., *Mutisia breviflora* Phil., *Mutisia consobrina* Phil., *Mutisia eriocephala* Phil., *Mutisia grossedentata* Phil., *Mutisia ilicifolia* Hook., *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *cavanillesii* DC., *Mutisia involucrata* Phil. var. *consobrina* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1965a.
Arbusto. Endémica. 1000–1800 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 4150* (LP)].

Mutisia ilicifolia Hook. var. *truncata* (D. Don) DC. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia inflexa Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **subulata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia inflexa Cav. var. *melanocarpa* Poepp. & Endl. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **subulata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia involucrata Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 300–1700 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3804* (LP)].

Mutisia involucrata Phil. var. *consobrina* Phil. = **Mutisia ilicifolia** Hook. var. **ilicifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia kurtzii R.E. Fr. var. **anomala** (Lillo) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8178* (LP)].

Mutisia kurtzii R.E. Fr. var. **kurtzii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calete, A. 11917* (LP, SI)].

Mutisia kurtzii R.E. Fr. var. **pinnata** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4088* (LP)].

Mutisia landbeckii Phil. = **Mutisia rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia lanigera Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Nativa. 4000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 25468* (LP)].

Mutisia latifolia D. Don f. **latifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Arbusto. Endémica. 0–2400 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 1147* (LP)].

Mutisia latifolia D. Don f. **bracteata** (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Mutisia bracteata* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 3139* (CONC, LP)].

Mutisia lechleri Sch. Bip. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd.
Sin.: *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *dentata* Cabrera, *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *glabrata* Cuatrec., *Mutisia ledifolia* Decne. ex Wedd. f. *longiflora* J. Kost.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9438* (BAB, LP)].

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd. f. *dentata* Cabrera = **Mutisia ledifolia** Decne. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd. f. *glabrata* Cuatrec. = **Mutisia ledifolia** Decne. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia ledifolia Decne. ex Wedd. f. *longiflora* J. Kost. = **Mutisia ledifolia** Decne. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia linearifolia Hook., hom. illeg. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia linearifolia Cav.
Sin.: *Aplophyllum linearifolium* (Cav.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frenguelli, J. 521* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1766* (LP)].

Mutisia linearifolia Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Hind, N. & Hall, T., 2003c.

Mutisia linifolia Hook.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (LP)].

Mutisia macrophylla Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1772* (LP)].

Mutisia meyeniana J. Remy ex Phil. = **Mutisia oligodon** Poepp. & Endl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia moyanoi Speg. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia neriifolia Decne. ex Wedd., nom. illeg. = **Mutisia orbignyana** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia oligodon Poepp. & Endl.
Sin.: *Mutisia gayana* J. Remy, *Mutisia meyeniana* J. Remy ex Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 11564* (LP)]; CHL[*Ledezma, M. 650* (LP)].

Mutisia orbignyana Wedd.
Sin.: *Mutisia neriifolia* Decne. ex Wedd., nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11700* (SI)].

Mutisia patagonica Phil. = **Mutisia decurrens** Cav. var. **patagonica** (Phil.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia philippi R.E. Fr. = **Mutisia hamata** Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia polyphylla Phil. = **Mutisia cana** Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia popetana Phil. = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia pulchella Speg. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia reticulata Phil. = **Mutisia cana** Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia retrorsa Cav. f. *tomentosa* Hauman = **Mutisia retrorsa** Cav. var. **retrosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia retrorsa Cav. var. *castellanosii* (Cabrera) Cabrera = **Mutisia castellanosii** Cabrera var. **castellanosii**
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000a.

Mutisia retrorsa Cav. var. *hieronymi* Kuntze = **Mutisia castellanosii** Cabrera var. **hieronymi** (Kuntze) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000a.

Mutisia retrorsa Cav. var. *latifolia* Kuntze = **Mutisia retrorsa** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Hind, N. & Hall, T., 2003a.

Mutisia retrorsa Cav. var. *normalis* Kuntze = **Mutisia retrorsa** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Hind, N. & Hall, T., 2003a.

Mutisia retrorsa Cav.
Sin.: *Guariruma retrorsum* (Cav.) Cass., *Mutisia retrorsa* Cav. f. *tomentosa* Hauman, *Mutisia retrorsa* Cav. var. *latifolia* Kuntze, *Mutisia retrorsa* Cav. var. *normalis* Kuntze, *Mutisia runcinata* Willd., nom. superfl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Hind, N. & Hall, T., 2003a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauthal s.n.* (LP)].

Mutisia retusa J. Remy = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia retusa J. Remy var. *glaberrima* Phil. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia retusa J. Remy var. *moyanoi* (Speg.) Skottsb. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia retusa J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skottsb. = **Mutisia spinosa** Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia rosea Poepp. ex Less.
Sin.: *Mutisia alba* Phil., *Mutisia berteriana* Endl. ex Poepp., *Mutisia berterii* DC., *Mutisia landbeckii* Phil., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1098* (LP)].

Mutisia runcinata Willd., nom. superfl. = **Mutisia retrorsa** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia saltensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1978; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Carmelich, J. N. 190* (LP)].

Mutisia sanguinea Meyen = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia sinuata Cav.
Sin.: *Guariruma sinuatum* (Cav.) Cass., *Mutisia dentata* Phil., *Mutisia popetana* Phil., *Mutisia sanguinea* Meyen, *Mutisia sinuata* Cav. var. *brachycephala* Phil., *Mutisia sinuata* Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze, *Mutisia taraxacifolia* Less., *Mutisia taraxacifolia* Less. f. *cirrhifera* Hauman, *Mutisia taraxacifolia* Less. var. *integerrima* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1965a; Katinas, L., 1996a.
Arbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 2146* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3809* (LP)].

Mutisia sinuata Cav. var. *brachycephala* Phil. = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia sinuata Cav. var. *taraxacifolia* (Less.) Kuntze = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia speciosa Hook.
Sin.: *Mutisia arachnoidea* Mart. ex D. Don, nom. superfl. , *Mutisia caryophyllata* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1965a, 1998; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Subarbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1077* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 45586* (PACA)]; PRY[*Rojas, T. 4024* (LP)].

Mutisia speciosa Aiton var. *alborufescens* A. St.-Hil. = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **coccinea**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia speciosa Aiton var. *dealbata* Less. = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Mutisia speciosa Aiton var. *elliptica* Chodat = **Mutisia coccinea** A. St.-Hil. var. **dealbata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Mutisia spectabilis Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 1300–2800 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 356* (LP)].

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. **pulchella** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Mutisia bridgesii* Endl. ex Poepp. & Endl., *Mutisia heterochroa* Gand., *Mutisia lechleri* Sch. Bip., *Mutisia pulchella* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy, *Mutisia retusa* J. Remy var. *pulchella* (Speg.) Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4278* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 356* (LP)].

Mutisia spinosa Ruiz & Pav. var. **spinosa**
Sin.: *Mutisia auriculata* Poepp. ex Less., *Mutisia chubutensis* Speg., *Mutisia hastata* Bertero ex DC., *Mutisia ilicifolia* Hook. f. *alata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Hook. f. *paucidentata* Hauman, *Mutisia ilicifolia* Hook. var. *truncata* (D. Don) DC., *Mutisia moyanoi* Speg., *Mutisia retusa* J. Remy var. *glaberrima* Phil., *Mutisia retusa* J. Remy var. *moyanoi* (Speg.) Skottsb.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frenguelli, J. 515* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1760* (LP)].

Mutisia splendens Renjifo
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Claude-Joseph 2131* (US)].

Mutisia subspinosa Cav.
Sin.: *Guariruma subspinosum* (Cav.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a; Hind, N. & Hall, T., 2003b; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(III, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (BAF)].

Mutisia subulata Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Sin.: *Mutisia elegans* Phil., *Mutisia gracilis* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen, *Mutisia hookeri* Meyen var. *rosmarinifolia* Poepp. & Endl., *Mutisia linearifolia* Cav. var. *hookeri* (Meyen) Reiche, *Mutisia linearifolia* Hook., hom. illeg., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica. 1700–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1756* (LP)].

Mutisia subulata Ruiz & Pav. f. **subulata**
Sin.: *Guariruma inflexum* (Cav.) Cass., *Mutisia hookeri* Meyen var. *scandens* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *imberbis* Poepp. & Endl., *Mutisia inflexa* Cav. var. *melanocarpa* Poepp. & Endl., *Mutisia subulata* Ruiz & Pav. var. *cavanillessii* Hook. & Arn., *Mutisia versicolor* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1965a, 1971a; Katinas, L., 1996a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frenguelli, J. 516* (LP)]; CHL[*Jiles P., C. 2586* (LP)].

Mutisia subulata Ruiz & Pav. var. *cavanillessii* Hook. & Arn. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **subulata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia subulata Ruiz & Pav. var. *gracilis* (Meyen) Walp. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia subulata Ruiz & Pav. var. *major* Hook. & Arn. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **rosmarinifolia** (Poepp. & Endl.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia subulata Ruiz & Pav. var. *rosea* (Less.) Ruiz & Pav. = **Mutisia rosea** Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia taraxacifolia Less. = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia taraxacifolia Less. f. *cirrhifera* Hauman = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia taraxacifolia Less. var. *integerrima* Phil. = **Mutisia sinuata** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia tridens Poepp. ex Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.
Subarbusto. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 220* (G, MO, NY, P)].

Mutisia versicolor Phil. = **Mutisia subulata** Ruiz & Pav. f. **subulata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia viciaefolia Cav. var. *hirsuta* (Meyen) Wedd. = **Mutisia acuminata** Ruiz & Pav. var. **hirsuta** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Mutisia viciaefolia Cav. var. *paucijuga* Griseb. = **Mutisia acuminata** Ruiz & Pav. var. **paucijuga** (Griseb.) Cabrera

Mutisia volckmanni Phil. = **Mutisia cana** Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1965a.

Myconella myconis (L.) Sprague = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Myconia myconis (L.) Briq. & Cavill. = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Myriogyne elatinoides Less. = **Centipeda elatinoides** (Less.) Benth. & Hook. f. ex O. Hoffm.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1971a.

Nardophyllum Hook. & Arn.

Número de especies: 6, 5 endémicas

Nardophyllum armatum (Wedd.) Reiche
Sin.: *Dolichogyne armata* Wedd., *Ocyroe spinosa* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1954b, 1978; Marticorena, C., Matthei, O. R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Rodríguez Ríos, R., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Nativa. 2800–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7728* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 97246* (CONC)].

Nardophyllum bracteolatum Hauman = **Nardophyllum chiliotrichioides** (J. Remy) A. Gray
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera
Sin.: *Anactinia hookeri* J. Remy, *Aster nardophyllum* Kuntze, *Baccharis bryoides* (Lam.) Pers., *Chiliotrichum darwinii* Hook. f., *Chiliotrichum humile* Hook. f., *Chiliotrichum kingii* Hook. f., *Conyza bryoides* Lam., *Microchaete humilis* (Hook. f.) Sch. Bip., *Nardophyllum darwinii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum humile* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum kingii* (Hook. f.) A. Gray, *Nardophyllum nardophyllum* (Kuntze) Macloskie, nom. illeg., *Nardophyllum obtusifolium* Hook. & Arn., *Nardophyllum parvifolium* Phil.
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005; Cabrera, A. L., 1954b, 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33221* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 4502* (CONC)].

Nardophyllum cabrerae Bonifacino
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 700–1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonifacino, J. M. 825* (LP, MVFA, SI)].

Nardophyllum candollei (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl. = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera

Nardophyllum chiliotrichioides (J. Remy) A. Gray
Sin.: *Dolichogyne chiliotrichioides* J. Remy, *Nardophyllum bracteolatum* Hauman
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005; Cabrera, A. L., 1954b, 1971a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–3800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR, SJU); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonifacino, J. M. 692* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 621* (LP, SI)].

Nardophyllum darwinii (Hook. f.) A. Gray = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Nardophyllum deserticolum (Cabrera) G.L. Nesom = **Aylacophora deserticola** Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2001; Cabrera, A. L., 1953d, 1971a; Nesom, G. L., 1993b.

Nardophyllum genistoides (Phil.) A. Gray
Sin.: *Dolichogyne genistoides* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Gray, A., 1873.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Nardophyllum humile (Hook. f.) A. Gray = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Nardophyllum kingii (Hook. f.) A. Gray = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Nardophyllum lanatum (Meyen) Cabrera
Sin.: *Barnadesia lanata* Meyen, *Dolichogyne candollei* J. Remy, nom. superfl., *Dolichogyne gnaphalioides* DC., *Dolichogyne staehelinoides* DC., *Gochnatia revoluta* D. Don ex Hook. & Arn., *Nardophyllum candollei* (J. Remy) F. Meigen, comb. superfl., *Nardophyllum revolutum* (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Nardophyllum staehelinoides* (DC.) Macloskie
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Bonifacino, J. M., 2005; Cabrera, A. L., 1954b, 1971a.

Arbusto. Endémica. 1200–3200 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teillier A., S. 1979* (CONC)].

Nardophyllum nardophyllum (Kuntze) Macloskie, nom. illeg. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Nardophyllum obtusifolium Hook. & Arn. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Nardophyllum paniculatum Phil. = **Baccharis paniculata** DC.

Nardophyllum parvifolium Phil. = **Nardophyllum bryoides** (Lam.) Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M., 2005.

Nardophyllum patagonicum (Cabrera) G.L. Nesom = **Paleaepappus patagonicus** Cabrera
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2001; Nesom, G. L., 1993b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Nardophyllum revolutum (D. Don ex Hook. & Arn.) Hook. & Arn. = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b.

Nardophyllum scoparium Phil. = **Guynesomia scoparia** (Phil.) Bonifacino & Sancho
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2004.

Nardophyllum staehelinoides (DC.) Macloskie = **Nardophyllum lanatum** (Meyen) Cabrera

Nassauvia Comm. ex Juss.

Número de especies: 38, 36 endémicas

Nassauvia abbreviata (Hook. & Arn.) Dusén = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia abbreviata (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia abbreviata (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **robusta** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia abbreviata (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia acanthifolia (J. Remy) G.F. Grandjot = **Calopappus acerosus** Meyen
Referencias: Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1986.

Nassauvia acerosa (Meyen) Wedd. = **Calopappus acerosus** Meyen
Referencias: Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1986.

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Sin.: *Nassauvia aculeata* (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera, *Nassauvia diazii* (Phil.) Reiche, *Nassauvia latifolia* (Phil.) F. Meigen, *Nassauvia spinosa* (D. Don) Reiche, nom. illeg., *Panargyrum diazii* Phil., *Panargyrum latifolium* Phil., *Panargyrum pectinatum* Phil., *Panargyrum spinosum* D. Don, *Penthanthus aculeatus* Less.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8485* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 2491* (LP)].

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén, *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *azorelloides* Speg., *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *subspinosa* (Phil.) Macloskie, *Nassauvia subspinosa* (Phil.) Albov, *Panargyrum abbreviatum* Hook. & Arn., *Panargyrum subspinosum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burmeister, C. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6082* (LP)].

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. **robusta** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Nassauvia abbreviata* (Hook. & Arn.) Dusén var. *robusta* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5858* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6084* (LP)].

Nassauvia aculeata (Less.) Poepp. & Endl. var. *spinosa* (D. Don) Cabrera = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia ameghinoi Speg.
Sin.: *Nassauvia morenonis* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)].

Nassauvia araucana Phil. = **Nassauvia sprengelioides** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia argentea Phil.
Sin.: *Nassauvia revoluta* D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. 757* (BAB, LP, SI)]; CHL[*Burkart, A. 9551* (LP, SI)].

Nassauvia argyrophylla Speg. ex Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)].

Nassauvia axillaris (Lag. ex Lindl.) D. Don
Sin.: *Acanthophyllum axillare* (Lag. ex Lindl.) Hook. & Arn., *Strongyloma axillare* (Lag. ex Lindl.) DC., *Triptilion axillare* Lag. ex Lindl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Nativa. 1000–5000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14400* (LP, SI)]; CHL[*Looser, G. 5758* (LP)].

Nassauvia axillaris (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *contracta* Speg. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia brevifolia Phil. = **Nassauvia revoluta** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia bryoides O. Hoffm. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia candollei Macloskie = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia capillata D. Don = **Triptilion capillatum** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Nassauvia cespitosa Wedd. = **Nassauvia dentata** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia chubutensis Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Katinas, L. 12* (LP), *Moyano, C. s.n.* (LP)].

Nassauvia cordifolia (Lag. ex Lindl.) D. Don, nom. illeg. = **Triptilion cordifolium** Lag. ex Lindl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia coronipappa Arroyo & Martic.
Referencias: Arroyo, M. T. K. & Marticorena, C., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1100 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 87314* (CONC, SI)].

Nassauvia cumingii Hook. & Arn.
Sin.: *Nassauvia glabrata* Phil., *Nassauvia macracantha* DC., *Nassauvia macracantha* DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche, *Nassauvia macracantha* DC. var. *spicata* (J. Remy) Hauman, *Nassauvia spicata* J. Remy, *Nassauvia spinosa* Phil., *Nassauvia suaveolens* D. Don, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9718* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3684* (LP)].

Nassauvia darwinii (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Sin.: *Nassauvia candollei* Macloskie, *Nassauvia darwinii* (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skottsb., *Nassauvia lagascae* Reiche, hom. illeg., *Nassauvia laxa* (Phil.) Speg., *Panargyrum darwinii* Hook. & Arn., *Panargyrum lagascae* DC., *Panargyrum laxum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 1496* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 25933* (LP)].

Nassauvia darwinii (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén var. *laxa* (Phil.) Skottsb. = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia dentata Griseb.
Sin.: *Nassauvia cespitosa* Wedd., *Nassauvia patula* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2244* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 651* (K, LIL, SI)].

Nassauvia diazii (Phil.) Reiche = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia diffusa D. Don, nom. illeg. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Nassauvia digitata Wedd.
Sin.: *Nassauvia lycopodioides* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 16029* (SI)]; CHL[*Barros, E. 3229* (LP, SI)].

Nassauvia durvillei Cass. = **Nassauvia serpens** d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia dusenii O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23114* (LP)]; CHL[*Rentzell, I. 6114* (LP)].

Nassauvia fuegiana (Speg.) Cabrera
Sin.: *Nassauvia scleranthoides* O. Hoffm., *Strongylomopsis fuegiana* Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2690* (LP)].

Nassauvia gaudichaudii (Cass.) Cass. ex Gaudich.
Sin.: *Mastigophorus gaudichaudi* Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 559* (LP)].

Nassauvia glabrata Phil. = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia glomerata (Gillies ex D. Don) Wedd.
Sin.: *Panargyrum densifolium* Phil., *Panargyrum glomeratum* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lagiglia, H.A. 2235* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 10344* (LP)].

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don
Sin.: *Acanthophyllum rosulatum* Hook. & Arn., *Nassauvia axillaris* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *contracta* Speg., *Nassauvia bryoides* O. Hoffm., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *paradoxa* Skottsb., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *struthionum* (Phil.) Skottsb., *Nassauvia glomerulosa* (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *columnaris* Hauman, *Nassauvia modesta* O. Hoffm., *Nassauvia rosulata* (Hook. & Arn.) Balls, *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg., *Nassauvia struthionum* (Phil.) Speg. var. *robusta* Speg., *Strongyloma glomerulosum* (Lag.) DC., *Strongyloma struthionum* Phil., *Triptilion glomerulosum* Lag. ex Lindl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonifacino, J. M. 759* (SI)]; CHL[*Pfister, A. 472* (LP)].

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *paradoxa* Skottsb. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don f. *struthionum* (Phil.) Skottsb. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia glomerulosa (Lag. ex Lindl.) D. Don var. *columnaris* Hauman = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia heterophylla (Phil.) Reiche = **Nassauvia looseri** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia heterophylla Albov = **Nassauvia magellanica** J.F. Gmel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia hillii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32943* (LP)].

Nassauvia humilis Phil. = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia intermedia Phil. = **Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f. var. **intermedia** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia juniperina Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2228* (LP, SI)].

Nassauvia lagascae Reiche, hom. illeg. = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen f. *glabrescens* Hauman = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **globosa** Skottsb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Witte, L. 58* (LP)]; CHL[*Donat, A. 12* (LP)].

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**
Sin.: *Caloptilion lagascae* (D. Don) Hook. & Arn., *Nassauvia lagascae* (D. Don) F. Meigen f. *glabrescens* Hauman, *Nassauvia lanata* Reiche, *Portalesia procumbens* Meyen, *Sphaerocephalus lagascae* D. Don
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1982; Cuevas-Henríquez, J. G., 1996; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Serra, L. 34* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3682* (LP)].

Nassauvia lagascae (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Caloptilion lagascae* (D. Don) Hook. & Arn. var. *lanata* Phil., *Nassauvia humilis* Phil., *Nassauvia lanata* Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche, *Nassauvia lanigera* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14406* (LP, SI)]; CHL[*Barros, E. 3227* (LP)].

Nassauvia lanata Reiche = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia lanata Reiche var. *lanigera* (Phil.) Reiche = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia lanigera Phil. = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lanata** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia latifolia (Phil.) F. Meigen = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia latissima Skottsb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Skottsberg, C. J. F. 273* (SI)]; CHL[*Godley, E. J. 901* (K)].

Nassauvia laxa (Phil.) Speg. = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia looseri Cabrera
Sin.: *Nassauvia heterophylla* (Phil.) Reiche, *Panargyrum acerosum* Phil., *Panargyrum heterophyllum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 5755* (LP)].

Nassauvia lycopodioides Phil. = **Nassauvia digitata** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia macracantha DC. = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia macracantha DC. var. *glabrata* (Phil.) Reiche = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia macracantha DC. var. *pungens* (Phil.) Hauman = **Nassauvia pyramidalis** Meyen
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia macracantha DC. var. *spicata* (J. Remy) Hauman = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia maeviae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Katinas, L. 23* (LP)]; CHL[*T.B.P.A. 615* (CONC)].

Nassauvia magellanica J.F. Gmel.
Sin.: *Nassauvia heterophylla* Albov, *Nassauvia magellanica* J.F. Gmel. var. *purpurascens* (S. Moore) Cabrera, *Nassauvia purpurascens* S. Moore, *Nassauvia suaveolens* Willd.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 597* (LP)]; CHL[*Donat, A. 14* (LP)].

Nassauvia magellanica J.F. Gmel. var. *purpurascens* (S. Moore) Cabrera = **Nassauvia magellanica** J.F. Gmel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia modesta O. Hoffm. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia morenonis Kuntze = **Nassauvia ameghinoi** Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia multiflora Meyen = **Nassauvia pinnigera** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia nivalis Poepp. ex Less. = **Nassauvia revoluta** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia nivalis Poepp. ex Less. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche = **Nassauvia revoluta** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia nivalis Poepp. ex Less. var. *sericea* Phil. = **Nassauvia revoluta** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia nordenskjoldii (O. Hoffm.) Reiche = **Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f. var. **pygmaea**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia oligocephala (DC.) Wedd. = **Nassauvia uniflora** (D. Don) Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia patagonica Speg. = **Nassauvia ulicina** (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia patagonica Speg. var. *elatior* Speg. = **Nassauvia ulicina** (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia patula Phil. = **Nassauvia dentata** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia pentacaenoides Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Birabén, M. 159* (LP)].

Nassauvia pinnigera D. Don
Sin.: *Nassauvia multiflora* Meyen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pastore, F. 83* (LP)]; CHL[*Grandjot, K. 3409* (LP)].

Nassauvia planifolia Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33433* (LP)].

Nassauvia pulcherrima Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5935* (LP)].

Nassauvia pumila Poepp. ex Less. = **Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f. var. **intermedia** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia pumila Poepp. ex Less. var. *intermedia* (Phil.) Reiche = **Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f. var. **intermedia** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia pumila Poepp. ex Less. var. *nordenskjoldii* (O. Hoffm.) Reiche = **Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f. var. **pygmaea**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia pungens Phil. = **Nassauvia pyramidalis** Meyen
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia purpurascens S. Moore = **Nassauvia magellanica** J.F. Gmel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook. f. var. **intermedia** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Nassauvia intermedia* Phil., *Nassauvia pumila* Poepp. ex Less., *Nassauvia pumila* Poepp. ex Less. var. *intermedia* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hosseus, C. C. 240* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3650* (LP)].

Nassauvia pygmaea (Cass.) Hook. f. var. **pygmaea**
Sin.: *Nassauvia nordenskjoldii* (O. Hoffm.) Reiche, *Nassauvia pumila* Poepp. ex Less. var. *nordenskjoldii* (O. Hoffm.) Reiche, *Triachne pygmaea* Cass.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(VIII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Donat, A. 31* (LP)].

Nassauvia pyramidalis Meyen
Sin.: *Nassauvia macracantha* DC. var. *pungens* (Phil.) Hauman, *Nassauvia pungens* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11598* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3802* (LP)].

[Nassauvia pyramidalis Meyen var. arachnoidea Kuntze]
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.
Notas: Nombre dudoso.

Nassauvia ramosissima DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2000 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 328* (GH, P)].

Nassauvia remyana Wedd. = **Calopappus acerosus** Meyen
Referencias: Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1986.

Nassauvia revoluta D. Don
Sin.: *Nassauvia brevifolia* Phil., *Nassauvia nivalis* Poepp. ex Less., *Nassauvia nivalis* Poepp. ex Less. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Nassauvia nivalis* Poepp. ex Less. var. *sericea* Phil., *Nassauvia revoluta* D. Don var. *nivalis* (Poepp. ex Less.) Hosseus, *Nassauvia sericea* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 1000–4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21952* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 19683* (LP)].

Nassauvia revoluta D. Don var. *argentea* (Phil.) Hosseus = **Nassauvia argentea** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.

Nassauvia revoluta D. Don var. *nivalis* (Poepp. ex Less.) Hosseus = **Nassauvia revoluta** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia rosulata (Hook. & Arn.) Balls = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia ruizii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 3147* (LP)].

Nassauvia sceptrum Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 24178* (SI)].

Nassauvia scleranthoides O. Hoffm. = **Nassauvia fuegiana** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia sericea Phil. = **Nassauvia revoluta** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia serpens d'Urv.
Sin.: *Nassauvia durvillei* Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 583* (LP)].

Nassauvia spicata J. Remy = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia spinosa (D. Don) Reiche, nom. illeg. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia spinosa (Ruiz & Pav.) D. Don = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia spinosa Phil. = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia sprengelioides DC.
Sin.: *Nassauvia araucana* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rahmer, C. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3800* (LP)].

Nassauvia struthionum (Phil.) Speg. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia struthionum (Phil.) Speg. var. *robusta* Speg. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia suaveolens D. Don, hom. illeg. = **Nassauvia cumingii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia suaveolens Willd. = **Nassauvia magellanica** J.F. Gmel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia sublobata Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. 754* (BAB, LP, SI)].

Nassauvia subspinosa (Phil.) Albov = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Nassauvia ulicina (Hook. f.) Macloskie
Sin.: *Nassauvia patagonica* Speg., *Nassauvia patagonica* Speg. var. *elatior* Speg., *Trianthus ulicinus* Hook. f.

Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3952* (BAB, LP)].

Nassauvia uniflora (D. Don) Hauman
Sin.: *Nassauvia oligocephala* (DC.) Wedd., *Panargyrum oligocephalum* DC., *Panargyrum uniflorum* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 11183* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 2469* (LP)].

Neilreichia eupatorioides Fenzl = **Schistocarpha eupatorioides** (Fenzl) Kuntze
Referencias: Robinson, H. E., 1979.

Neja ciliaris DC. = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neja dianthifolia (Griseb.) G.L. Nesom = **Hysterionica dianthifolia** (Griseb.) Cabrera var. **dianthifolia**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neja filiformis (Spreng.) Nees = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neja gracilis D. Don ex Sweet = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neja macrocephala DC. = **Asteropsis macrocephala** Less.
Referencias: Nesom, G. L., 1994f.

Neja pinifolia (Poir.) G.L. Nesom = **Hysterionica pinifolia** (Poir.) Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neja pulvinata (Cabrera) G.L. Nesom = **Hysterionica dianthifolia** (Griseb.) Cabrera var. **pulvinata** (Cabrera) Ariza
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neja tenuifolia DC. = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Neocabreria catharinensis (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium catharinense** Cabrera

Neocabreria concinna (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium concinnum** DC.

Neocabreria malacophylla (Klatt) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium malachophyllum** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Neoceis carduifolia Cass. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Neoceis hieraciifolia (L.) Cass. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Neoceis rigidula Cass. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Neomolina darwinii (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig, nom. illeg. = **Baccharis darwinii** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Neomolina gracilis (DC.) F.H. Hellwig = **Baccharis gracilis** DC.

Neomolina paniculata (DC.) F.H. Hellwig, nom. illeg. = **Baccharis paniculata** DC.

Neomolina pulchella (Sch. Bip. ex Griseb.) Hellwig = **Baccharis pulchella** Sch. Bip. ex Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Neomolina racemosa (Ruiz & Pav.) Hellwig = **Baccharis racemosa** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Neomolina taltalensis (I.M. Johnst.) F.H. Hellwig, nom. illeg. = **Baccharis taltalensis** I.M. Johnst.

Neomolina ulicina (Hook. & Arn.) Hellwig = **Baccharis ulicina** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Nocca mollis (Cav.) Jacq. = **Lagascea mollis** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Nordenstamia fabrisii (Cabrera) B. Nord. = **Gynoxys fabrisii** Cabrera

Nothites satureiifolia (Lam.) DC. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Noticastrum DC.

Número de especies: 19, 14 endémicas

Noticastrum acuminatum (DC.) Cuatrec.
Sin.: *Aster calendulaceus* (Griseb.) Kuntze, *Haplopappus acuminatus* DC., *Haplopappus calendulaceus* Griseb., *Leucopsis acuminata* (DC.) Malme, *Leucopsis calendulacea* (Griseb.) Baker, *Noticastrum calendulaceum* (Griseb.) Malme

Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, PHA); URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 1131* (LP)]; BRA[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)]; PRY[*Schinini, A. 14582* (CTES)]; URY[*Chebataroff, J. 1734* (LP)].

Noticastrum adscendens DC.
Sin.: *Aster adscendens* (DC.) Reiche, *Aster pradensis* Phil., *Diplopappus sericeus* Less. var. *glandulosa* Hook. & Arn., *Noticastrum glandulosum* Phil., *Noticastrum pradense* (Phil.) Phil., *Noticastrum sanfurgi* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2656* (LP)].

Noticastrum album Phil. = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Noticastrum antucense Phil.
Sin.: *Aster antucensis* (Phil.) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze var. *antucensis* (Phil.) Reiche
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 15564* (LP)].

Noticastrum argenteum Cabrera
Sin.: *Aster marginatus* Kunth var. *argenteus* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21492* (LP)].

Noticastrum argentinense (Cabrera) Cuatrec.
Sin.: *Aster argentinensis* Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 9053* (LP)].

Noticastrum calendulaceum (Griseb.) Malme = **Noticastrum acuminatum** (DC.) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum calvatum (Baker) Cuatrec.
Sin.: *Aster calvatus* (Baker) Herter, *Leucopsis calvata* Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28260* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 40589* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 10238* (LP)].

Noticastrum chebataroffii (Herter) Zardini
Sin.: *Aster chebataroffii* Herter, *Aster decumbens* auct. non Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1978, 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, MON, RNO, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 16* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 8692* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2701* (LP)].

Noticastrum decumbens (Baker) Cuatrec.
Sin.: *Aster decumbens* Baker
Referencias: Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11106* (LP)].

Noticastrum diffusum (Pers.) Cabrera
Sin.: *Aster montevidensis* (Spreng.) Griseb., *Diplopappus diffusus* (Pers.) Hook. & Arn., *Erigeron diffusus* Pers., *Haplopappus diffusus* (Pers.) DC., *Leucopsis diffusa* (Pers.) Baker, *Noticastrum montevidense* (Spreng.) Cuatrec., *Onoseris montevidensis* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MEN, SAL, SFE, SLU); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 6529* (LP)]; BRA[*Zardini, E. M. 1106* (LP)]; URY[*Krapovickas, A. 6561* (LP)].

Noticastrum erectum J. Remy
Sin.: *Aster erectus* (J. Remy) Kuntze, *Aster erectus* (J. Remy) Reiche
Referencias: Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(VII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].

Noticastrum eriophorum J. Remy
Sin.: *Aster eriophorus* (J. Remy) Kuntze, *Aster eriophorus* (J. Remy) Reiche, *Aster leucopappus* (Phil.) Reiche, *Leucopsis harveyi* Baker, *Leucopsis sericea* (Less.) Baker var. *eriophora* (J. Remy) Baker, *Noticastrum leucopappum* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 19656* (LP)].

Noticastrum glandulosum Phil. = **Noticastrum adscendens** DC.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum gnaphalioides (Baker) Cuatrec.
Sin.: *Aster gnaphalioides* (Baker) Hassl., *Leucopsis gnaphalioides* Baker
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, GUA); URY(ART, CAS, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 630* (LP)]; BRA[*Edwall, G. 16484* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 6858* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 9220* (LP)].

Noticastrum haplopappus J. Remy = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Noticastrum hatschbachii Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1978, 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40384* (LP)].

Noticastrum jujuyense Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 881* (LP)].

Noticastrum leucopappum Phil. = **Noticastrum eriophorum** J. Remy
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum macrocephalum (Baker) Cuatrec.
Sin.: *Aster macrocephalus* (Baker) Hassl., *Aster macrocephalus* (Baker) Hassl. var. *pseudognaphalioides* Hassl., *Leucopsis macrocephala* Baker
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA, CAU, ITA, MIE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29243* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 46225* (AS, MO)].

Noticastrum malmei Zardini
Sin.: *Aster psammophilus* (Malme) Herter, *Aster psammophilus* (Malme) I.L. Teodoro, *Leucopsis psammophila* Malme, *Leucopsis psammophila* Malme var. *calvescens* Malme
Referencias: Zardini, E. M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Zardini, E. M. 1105* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 32317* (SI)].

Noticastrum marginatum (Kunth) Cuatrec.
Sin.: *Aster acaulis* Wedd., *Aster marginatus* Kunth, *Aster perezii* Cuatrec., *Noticastrum marginatum* (Kunth) Cuatrec. f. *acaulis* (Wedd.) Cuatrec.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)].

Noticastrum marginatum (Kunth) Cuatrec. f. *acaulis* (Wedd.) Cuatrec. = **Noticastrum marginatum** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum montevidense (Spreng.) Cuatrec. = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum philippii Sch. Bip., nom. nud. = **Noticastrum sericeum** (Less.) Less. ex Phil.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Noticastrum pradense (Phil.) Phil. = **Noticastrum adscendens** DC.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum psammophilum (Klatt) Cuatrec.
Sin.: *Aster psammophilus* Klatt
Referencias: Zardini, E. M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Capparelli, P. N. 631* (LP)].

Noticastrum sanfurgi Phil. = **Noticastrum adscendens** DC.
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Noticastrum sericeum (Less.) Less. ex Phil.
Sin.: *Aster albus* (Phil.) Kuntze, *Aster albus* (Phil.) Reiche, *Aster haplopappus* (J. Remy) Kuntze, *Aster haplopappus* (J. Remy) Reiche, *Aster marginatus* Kunth var. *tomentosus* Wedd., *Aster nitens* Kuntze, *Aster notosericeus* Griseb., *Aster sericeus* (Less.) Nees, *Diplopappus sericeus* Less., *Haplopappus sericeus* (Less.) DC., *Leucopsis sericea* (Less.) Baker, *Noticastrum album* Phil., *Noticastrum haplopappus* J. Remy, *Noticastrum philippii* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1963a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Zardini, E. M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, RNE, SLU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(FLA, MON, PAY, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 7247* (CORD)]; CHL[*Barros, E. 3929* (LP)]; URY[*Orihuela, G. 17* (LP)].

Novenia S.E. Freire

Número de especies: 1

Novenia acaulis (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Sin.: *Dolichogyne acaulis* Benth. & Hook. f., *Gnaphalium tunariense* Kuntze, *Lepidophyllum acaule* Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks., *Lucilia tunariensis* (Kuntze) K. Schum., *Mniodes tunariensis* (Kuntze) Hieron. ex Weberb., *Novenia tunariensis* (Kuntze) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990; Freire, S. E., 1986a, 1995.
Subarbusto. Nativa. 3100–5000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25085* (LP)].

Novenia tunariensis (Kuntze) S.E. Freire = **Novenia acaulis** (Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks.) S.E. Freire & F.H. Hellwig
Referencias: Freire, S. E. & Hellwig, F. H., 1990.

Obeliscaria pulcherrima DC. = **Ratibida columnifera** (Nutt.) Wooton & Standl. f. **pulcherrima** (DC.) Fernald
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Ocyroe spinosa Phil. = **Nardophyllum armatum** (Wedd.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Odontocarpha gayana J. Remy = **Gutierrezia gayana** (J. Remy) Reiche

Odontocarpha poeppigii DC. = **Gutierrezia resinosa** (Hook. & Arn.) S.F. Blake
Referencias: Solbrig, O. T., 1966.

Oligandra lucilioides Less. = **Lucilia lycopodioides** (Less.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1989.

Oligandra lycopodioides Less. = **Lucilia lycopodioides** (Less.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1989.

Oligogyne megapotamica DC. = **Calyptocarpus biaristatus** (DC.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Oligogyne synedrelloides Hook. & Arn. = **Calyptocarpus biaristatus** (DC.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Oligosporus emarginatus Cass. ex Gaudich. = **Abrotanella emarginata** (Cass. ex Gaudich.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Onopordum L.

Número de especies: 2 introducidas

Onopordum acanthium L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Del Aguila, J., 1964; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, DFE, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU); BRA(RGS); CHL(IX, RME); URY(MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 622* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 495* (LP)]; URY [*Rosengurtt, B. 6584* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar material de referencia (Augusto, 1946).

Onopordum arabicum Hook. = **Onopordum nervosum** Boiss.
Referencias: Hunziker, A. T. & Ariza Espinar, L., 1966.

Onopordum nervosum Boiss.
Sin.: *Onopordum arabicum* Hook.
Referencias: Amaral Franco, J. M. A., 1976b; Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Hunziker, A. T. & Ariza Espinar, L., 1966.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 15793* (CORD)].

Onoseris Willd.

Número de especies: 2

Onoseris alata Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Ferreyra, R. A., 1944; Freire, S. E., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 9306* (LP)].

Onoseris atacamensis (Phil.) Hoffm. = **Urmenetea atacamensis** Phil.
Referencias: Freire, S. E., 1996.

Onoseris brevifolia D. Don = **Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b.

Onoseris corymbosa (Less.) Benth. & Hook. f. = **Ianthopappus corymbosus** (Less.) Roque & D.J.N. Hind
Referencias: Roque, N. & Hind, D. J. N., 2001.

Onoseris hastata Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Ferreyra, R. A., 1944; Freire, S. E., 1996; Sancho, G., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 2100–2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3772* (LP)].

Onoseris heterophylla Spreng. = **Trichocline heterophylla** (Spreng.) Less.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Onoseris lanata Phil. = **Trichocline caulescens** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Onoseris montevidensis Spreng. = **Noticastrum diffusum** (Pers.) Cabrera
Referencias: Zardini, E. M., 1985.

Onoseris stricta Spreng. = **Criscia stricta** (Spreng.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1994.

Ooclinium grandiflorum DC. = **Eupatorium variegatum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Ophryosporus Meyen

Número de especies: 15, 6 endémicas

Ophryosporus anomalus R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Piqueria cumingii* B.L. Rob., hom. illeg.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972a; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jaffuel, F. 1026* (CONC)].

Ophryosporus axilliflorus (Griseb.) Hieron.
Sin.: *Eupatorium axilliflorum* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4473* (LP)].

Ophryosporus burkartii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Endémica. 3000–3200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 455* (LP)].

Ophryosporus charua (Griseb.) Hieron.
Sin.: *Mikania charua* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Arbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7520* (LP)].

Ophryosporus clavulatus (Griseb.) Griseb. = **Ophryosporus piquerioides** (DC.) Benth. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Ophryosporus floribundus (DC.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Piqueria floribunda* DC.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1779* (LP)].

Ophryosporus hoppii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Trychionolepis hoppii* B.L. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972h.
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(I, II).
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena, com. pers.).

Ophryosporus johnstonii B.L. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Arbusto. Endémica. 1200–1300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3849* (LP)].

Ophryosporus lorentzii Hieron.
Sin.: *Eupatorium laeve* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2991* (LP)].

Ophryosporus macrodon Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16818* (LP)].

Ophryosporus origanoides (Meyen & Walp.) Hieron.
Sin.: *Eupatorium origanoides* Meyen & Walp.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 2997* (LP)].

Ophryosporus paradoxus (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. ex B.D. Jacks.
Sin.: *Eupatorium paradoxus* Hook. & Arn.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 9346* (LP)].

Ophryosporus pinifolius (Phil.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Piqueria pinifolia* (Phil.) Hieron. ex B.L. Rob., *Stevia pinifolia* Phil.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972a, 1987; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Nativa. 3000–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 7786* (LP)].

Ophryosporus piquerioides (DC.) Benth. ex Baker
Sin.: *Eupatorium clavatum* Griseb., *Eupatorium piquerioides* DC., *Ophryosporus clavulatus* (Griseb.) Griseb., *Ophryosporus saltensis* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22661* (LP)].

Ophryosporus regnellii Baker
Sin.: *Eupatorium regnellii* Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1991[1989]; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 17989* (S)].

Ophryosporus saltensis Hieron. = **Ophryosporus piquerioides** (DC.) Benth. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Ophryosporus solidaginoides (Kunth) Hieron. = **Eupatorium solidaginoides** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978, 1996f.

Ophryosporus triangularis Meyen
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Arbusto. Endémica. 0–3400 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 11416* (LP)].

Orcya adhaerens Vell. = **Acanthospermum australe** (Loefl.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.

Oreophila chondrilloides D. Don ex A. Gray = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Oreophila chondrilloides Hook. & Arn., nom. nud. = **Hypochaeris chondrilloides** (A. Gray) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Oreophila meyeniana Walp. = **Hypochaeris meyeniana** (Walp.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Oreophila odorata Poepp. & Endl. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **eurylepis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Oreophila sessiliflora (Kunth) D. Don = **Hypochaeris sessiliflora** Kunth

Oreophila taraxacifolia Meyen & Walp. = **Hypochaeris taraxacoides** (Walp.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Oreophila taraxacoides Don = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Oreophila tenuifolia Hook. & Arn., nom. nud. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Oriastrum albicaule Phil. var. *albicaule* = **Chaetanthera apiculata** (J. Remy) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum albicaule Phil. var. *nivale* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera apiculata** (J. Remy) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum albiflorum (Phil.) Reiche = **Chaetanthera gnaphalioides** (J. Remy) I.M. Johnst.

Oriastrum chilense Wedd. = **Chaetanthera pusilla** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum dioicum (J. Remy) Phil. = **Chaetanthera dioica** (J. Remy) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum dioicum (J. Remy) Phil. var. *revolutum* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera revoluta** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum gayi Phil. = **Chaetanthera lycopodioides** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum glabriusculum Phil. = **Chaetanthera lycopodioides** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum gnaphalioides (J. Remy) Wedd. = **Chaetanthera gnaphalioides** (J. Remy) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum gossypinum Phil. = **Chaetanthera minuta** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum incanum Phil. = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum leucocephalum Phil. = **Chaetanthera gnaphalioides** (J. Remy) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum lycopodioides (J. Remy) Wedd. = **Chaetanthera lycopodioides** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum lycopodioides (J. Remy) Wedd. var. *glabriusculum* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera lycopodioides** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum nivale Phil. = **Chaetanthera apiculata** (J. Remy) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum parviflorum Phil. = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum pentacaenoides Phil. = **Chaetanthera pentacaenoides** (Phil.) Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum polymallum Phil. = **Chaetanthera pulvinata** (Phil.) Hauman var. **polymalla** (Phil.) Hicken
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum pulvinatum Phil. = **Chaetanthera pulvinata** (Phil.) Hauman var. **pulvinata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum pusillum Poepp. & Endl. = **Chaetanthera planiseta** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum pusillum Reiche, hom. illeg. = **Chaetanthera pusilla** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum pusillum Reiche var. *uncinatum* Reiche = **Chaetanthera pusilla** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum sphaeroidale Reiche = **Chaetanthera sphaeroidalis** (Reiche) Hicken
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Oriastrum uncinatum Phil. = **Chaetanthera acerosa** (J. Remy) Benth. & Hook. f. ex Griseb. var. **acerosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Ormenis mixta (L.) Dumort. = **Chamaemelum mixtum** (L.) All.
Referencias: Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Orthopappus Gleason

Número de especies: 1

Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason
Sin.: *Elephantopus angustifolius* Sw., *Elephantopus nudiflorus* Willd., *Elephantosis angustifolia* (Sw.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1785* (LP), *Montes, J. E. 7236* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. 185* (BA)]; PRY[*Dematteis, M. 894* (CTES), *Fortunato, R. H. 1110* (BAB, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32431* (SI)].

Osteospermum moniliferum L. = **Chrysanthemoides monilifera** (L.) Norl.

Oxydon bicolor Less. = **Chaptalia runcinata** Kunth
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Oxyphyllum Phil.

Número de especies: 1 endémica

Oxyphyllum ulicinum Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 3892* (LP)].

Oyedaea annua Hassl. = **Dimerostemma annuum** (Hassl.) H. Rob.

Pachylaena Hook. & Arn.

Número de especies: 2, 1 endémica

Pachylaena atriplicifolia Hook. & Arn.
Sin.: *Chionoptera gayophyta* DC., *Pachylaena gayophyta* (DC.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1996a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Chichi, A. 67* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2027* (LP)].

Pachylaena elegans Phil. = **Chaetanthera flabellifolia** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Pachylaena gayophyta (DC.) Hieron. = **Pachylaena atriplicifolia** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Pachylaena rosea I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1929c; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5897* (GH)].

Pachyrhynchus xeranthemoides DC. = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Pacourina Aubl.

Número de especies: 1

Pacourina edulis Aubl.
Sin.: *Pacourina edulis* Aubl. var. *spinosissima* Britton, *Pacourinopsis dentata* Cass., *Pacourinopsis integrifolia* Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI, PHA, SPE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 418* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 386* (SI), *Hassler, E. 157* (SI), *Schinini, A. 13345* (SI)].

Pacourina edulis Aubl. var. *spinosissima* Britton = **Pacourina edulis** Aubl.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Pacourinopsis dentata Cass. = **Pacourina edulis** Aubl.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Pacourinopsis integrifolia Cass. = **Pacourina edulis** Aubl.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Paleaepappus Cabrera

Número de especies: 1 endémica

Paleaepappus patagonicus Cabrera
Sin.: *Nardophyllum patagonicum* (Cabrera) G.L. Nesom
Referencias: Bonifacino, J. M. & Sancho, G., 2001; Cabrera, A. L., 1969, 1971a; Nesom, G. L., 1993b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 300–700 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonifacino, J. M. 727* (LP)].

Palenia delfinii Phil. = **Baccharis nivalis** (Wedd.) Sch. Bip. ex Phil.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Panargyrum abbreviatum Hook. & Arn. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum acerosum Phil. = **Nassauvia looseri** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum darwinii Hook. & Arn. = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum densifolium Phil. = **Nassauvia glomerata** (Gillies ex D. Don) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum diazii Phil. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum glomeratum D. Don = **Nassauvia glomerata** (Gillies ex D. Don) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum heterophyllum Phil. = **Nassauvia looseri** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum lagascae DC. = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum latifolium Phil. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum laxum Phil. = **Nassauvia darwinii** (Hook. & Arn.) O. Hoffm. & Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum oligocephalum DC. = **Nassauvia uniflora** (D. Don) Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum pectinatum Phil. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum spinosum D. Don = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum subspinosum Phil. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **azorelloides** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Panargyrum uniflorum D. Don = **Nassauvia uniflora** (D. Don) Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., 1995.

Panphalea Lag.

Número de especies: 9 endémicas

Panphalea araucariophila Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1953c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 4285* (LP)].

Panphalea bupleurifolia Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1953c; Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, DUR, FLA, FLO, MON, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 1774* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 8666* (LIL)]; URY[*Rosengurtt, B. 1716* (LP)].

Panphalea cardaminifolia Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1953c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 52111* (LP)]; URY[*Sello 553* (B)].

Panphalea commersonii Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1953c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS); URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 43616* (LIL)]; URY[*Gallinal, J. P. 276* (LP)].

Panphalea heterophylla Less.
Sin.: *Panphalea tweedii* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1953c; Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boffa, P. 332* (LP)]; BRA[*Sobral, M. 4238* (ICN)]; URY[*Gallinal, J. P. 207* (LP)].

Panphalea maxima Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1953c; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, MON, PAY, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 44544* (LIL)]; URY[*Chebataroff, J. 7001* (LP)].

Panphalea missionum Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1953c, 1998; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(COA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 2515* (LP)]; BRA[*Záchia, R. A. 1440* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 12713* (G)].

Panphalea ramboi Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1953c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 49420* (LP)].

Panphalea smithii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1959e; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10417* (LP)].

Panphalea tweedii Gardner = **Panphalea heterophylla** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1953c.

Paranephelius Poepp.

Número de especies: 1

Paranephelius asperifolius (Muschl.) H. Rob. & Brettell
Sin.: *Liabum asperifolium* Muschl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–3400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7394* (LP)].
Notas: Probablemente crezca en la provincia de Jujuy, Argentina (Cabrera, 1978).

Parastrephia Nutt.

Número de especies: 3

Parastrephia ericoides Nutt. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1945; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera
Sin.: *Baccharis lucida* Meyen, *Baccharis phyliciformis* Meyen, *Diplostephium tovari* Cuatrec., *Dolichogyne glabra* Phil., *Dolichogyne rigida* Wedd., *Dolichogyne rupestris* Webb, *Lepidophyllum abietinum* (Phil.) Reiche, *Lepidophyllum lucidum* (Meyen) Cabrera, *Lepidophyllum phyliciforme* (Meyen) Hieron. ex R.E. Fr., *Lepidophyllum phyliciforme* (Meyen) Hieron. ex R.E. Fr. var. *resinosum* (Walp.) S.F. Blake, *Lepidophyllum rigidum* (Wedd.) Benth. & Hook., *Parastrephia ericoides* Nutt., *Parastrephia phyliciformis* (Meyen) Cabrera, *Polycladus abietinus* Phil., *Vernonia phyliciformis* (Meyen) Walp., *Vernonia phyliciformis* (Meyen) Walp. var. *resinosa* Walp.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1954b, 1978; Nesom, G. L., 1993a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Nativa. 2900–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Simón, P. 529* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3390* (CONC)].

Parastrephia phyliciformis (Meyen) Cabrera = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1954b; Nesom, G. L., 1993a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera
Sin.: *Baccharis quadrangularis* Meyen, *Dolichogyne lepidophylla* Wedd., *Lepidophyllum cupressinum* (Phil.) Kuntze, *Lepidophyllum meyenii* A. Gray, *Lepidophyllum quadrangulare* (Meyen) Benth. & Hook., *Lepidophyllum tola* Cabrera, *Parastrephia lepidophylla* (Wedd.) Cabrera, *Polycladus cupressinus* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Cabrera, A. L., 1945, 1954b, 1978; Nesom, G. L., 1993a.
Arbusto. Nativa. 3000–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8269* (LP)]; CHL[*Teillier A., S. 3070* (CONC)].

Parastrephia teretiuscula (Kuntze) Cabrera
Sin.: *Lepidophyllum teretiusculum* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1945, 1954b.
Arbusto. Nativa. 3200–4200 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 3197* (CONC)].

Parthenium L.

Número de especies: 2

Parthenium cineraceum Rollins
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 3745* (BAB, FCQ, G)].

Parthenium glomeratum Rollins = **Parthenium hysterophorus** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Parthenium hysterophorus L.
Sin.: *Argyrochaeta bipinnatifida* Cav., *Echetrosis pentasperma* Phil., *Parthenium glomeratum* Rollins, *Parthenium lobatum* Buckley, *Parthenium pinnatifidum* Stokes, *Villanova bipinnatifida* Ortega
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1971a, 1974a, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Piazzano, M., Bernardello, G., Novara, L. J., Alarcón, S. R., De la Fuente, J. R. & Hadid, M., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, AMA, PHA); URY(MON, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15292* (CTES, SI)]; PRY[*Charpin, A. 21346* (G, SI)]; URY[*Berro, M. B. 6998* (MVFA)].

Parthenium lobatum Buckley = **Parthenium hysterophorus** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1974a, 1978.

Parthenium pinnatifidum Stokes = **Parthenium hysterophorus** L.

Pascalia glauca Ortega = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken

Pascalia subvaginata (N.E. Br.) Strother = **Wedelia subvaginata** N.E. Br.

Pectis L.

Número de especies: 4, 1 endémica

Pectis guaranitica Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 13663* (LP)].

Pectis odorata Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gutiérrez, D. G. & Katinas, L., 2003; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8947* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2943* (LP)].

Pectis pinnata Lam. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip.
Sin.: *Cryptopetalum ciliare* Cass., *Lorentea cryptopetala* DC., *Lorentea sessiliflora* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25157* (LP)].

Pectis substriata Rusby
Referencias: Bautista, H. P., 1987.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11076* (UC)].

Pectis violacea Griseb. = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Pentacalia epiphytica (Kuntze) Cuatrec. = **Senecio epiphyticus** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Pentaphorus fascicularis D. Don = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **fascicularis** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Pentaphorus foliolosus D. Don = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Pentaphorus glutinosus D. Don = **Gochnatia glutinosa** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Pentaphorus pyrifolius D. Don = **Gochnatia foliolosa** (D. Don) D. Don ex Hook. & Arn. var. **foliolosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c.

Penthanthus aculeatus Less. = **Nassauvia aculeata** (Less.) Poepp. & Endl. var. **aculeata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Perdicium brasiliense L. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Perdicium cacalioides Kunth = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Perdicium chilense Willd. = **Chaetanthera chilensis** (Willd.) DC. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Perdicium divaricatum Kunth = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1996b, 1998.

Perdicium flexuosum Kunth = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1996b, 1998.

Perdicium lactucoides Vahl = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perdicium magellanicum L. f. = **Perezia magellanica** (L. f.) Lag.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perdicium piloselloides Vahl = **Chaptalia piloselloides** (Vahl) Baker
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Perdicium purpureum Vahl = **Leucheria purpurea** (Vahl) Hook. & Arn.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Perdicium recurvatum Vahl = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perdicium squarrosum Vahl = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Perdicium suaveolens d'Urv. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Perezia Lag.

Número de especies: 31, 20 endémicas

Perezia abbiatti Cabrera = **Perezia ciliosa** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia acanthoides Hook. & Arn. = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia aletes J.F. Macbr. = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **sonchifolia** (Baker) Vuilleum.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia atacamensis (Phil.) Reiche = **Perezia purpurata** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia beckii Hook. & Arn. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia bellidifolia (Phil.) Reiche
Sin.: *Homoeanthus bellidifolius* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 59920* (LP)]; CHL[*Philippi, O. s.n.* (SGO)].

Perezia bidentata Meyen = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia brachylepis Phil. = **Perezia prenanthoides** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia burkartii Cabrera = **Perezia coerulescens** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949a; Simpson, B. B., 1969.

Perezia calophylla (Phil.) Reiche
Sin.: *Homoeanthus calophyllus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2229* (LP)]; CHL[*Philippi, O. 2254* (LP)].

Perezia capito (Phil.) Reiche = **Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.

Perezia carduncelloides Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16994* (LP)].

Perezia carthamoides (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea carthamoides* D. Don, *Clarionea carthamoides* D. Don var. *crispa* (Meyen) Phil., *Clarionea multicapitata* J. Remy, *Clarionea spectabilis* Phil., *Perezia diversifolia* Meyen, *Perezia diversifolia* Meyen var. *crispa* Meyen, *Perezia multicapitata* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*King 330* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 5601* (LP)].

Perezia catharinensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Anual. Endémica. 600–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 3439* (LP)].

Perezia ciliaris D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea ciliaris* (Hook. & Arn.) DC., *Homoeanthus nivalis* Phil., *Perezia coriacea* Tovar, *Perezia foliosa* Rusby, *Perezia nivalis* Wedd., p.p., *Perezia scapellifolia* J. Kost., *Perezia scapellifolia* J. Kost. var. *parviflora* J. Kost.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1382* (LP)].

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche
Sin.: *Clarionea ciliosa* Phil., *Perezia abbiatti* Cabrera, *Perezia ciliosa* (Phil.) Reiche var. *dentata* Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1745* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1109* (LP, SI)].

Perezia ciliosa (Phil.) Reiche var. *dentata* Cabrera = **Perezia ciliosa** (Phil.) Reiche
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia cirsiifolia Wedd. = **Perezia coerulescens** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia coerulescens Wedd.
Sin.: *Perezia burkartii* Cabrera, *Perezia cirsiifolia* Wedd., *Perezia coerulescens* Wedd. var. *amplibracteata* Tovar, *Perezia integrifolia* Wedd., *Perezia nitidifolia* J. Kost., *Perezia violacea* Wedd.
Referencias: Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–5500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3899* (LP)].

Perezia coerulescens Wedd. var. *amplibracteata* Tovar = **Perezia coerulescens** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia coriacea Tovar = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia cubataensis Less. = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson

Perezia delicata Vuilleum.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5917* (LP)].

Perezia diversifolia Meyen = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia diversifolia Meyen var. *crispa* Meyen = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia doniana Less. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia eryngioides (Cabrera) Crisci & Martic.
Sin.: *Trixis eryngioides* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Crisci, J. & Marticorena, C., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7777* (LP)].

Perezia flavescens Dusén = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia foliosa Rusby = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia fonkii (Phil.) Reiche
Sin.: *Clarionea affinis* Phil., *Clarionea fonkii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 10095* (SI)]; CHL[*Fonk, F. 59* (LP)].

Perezia gayana DC. = **Perezia nutans** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia glomerata Rusby = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia hunzikeri Cabrera = **Perezia purpurata** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1950a.

Perezia integrifolia Wedd. = **Perezia coerulescens** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia keshua Cabrera = **Perezia purpurata** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949a; Simpson, B. B., 1969.

Perezia kingii Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, LPA); URY(CAS, FLA, LAV, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Báez, P. 20* (LP)]; URY[*Gallinal, J. P. 5334* (LP)].

Perezia laciniata (Phil.) Reiche = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia laciniata (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia lactucoides (Vahl) Less. subsp. **lactucoides**
Sin.: *Aster magellanicus* Lam., *Chaetanthera magellanica* (Lam.) Spreng., *Clarionea glaberrima* Cass., nom. illeg., *Clarionea lactucoides* (Vahl) D. Don, *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC., *Homoianthus magellanicus* (Lam.) DC. var. *lactucoides* (Vahl) Hook., *Perdicium lactucoides* Vahl
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 1853* (LP)]; CHL[*Donat, A. 431* (GH, LIL)].

Perezia lactucoides (Vahl) Less. subsp. **palustris** (Phil.) Vuilleum.
Sin.: *Homoianthus palustris* Phil., *Perezia palustris* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 261* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 8213* (LP)].

Perezia laevis Less. = **Perezia squarrosa** (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson

Perezia lagascae Cass., nom. illeg. = **Perezia magellanica** (L. f.) Lag.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia lanigera Hook. & Arn. = **Burkartia lanigera** (Hook. & Arn.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976a.

Perezia laurifolia Kuntze = **Perezia mandonii** Rusby
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia linearis Less.
Sin.: *Homoeanthus rigidus* Phil., *Homoianthus linearis* (Less.) DC., *Homoianthus pectinellus* Gand.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VI, VII, VIII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 2179* (LP)]; CHL[*Maldonado-Bruzzone, R. 54* (LP)].

Perezia linearis Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche = **Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia lyrata (J. Remy) Wedd.
Sin.: *Clarionea pinnata* Phil., *Homoeanthus capito* Phil., *Homoianthus gayanus* J. Remy, *Homoianthus lyratus* J. Remy, *Perezia capito* (Phil.) Reiche, *Perezia pinnata* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10340* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 927* (LP)].

Perezia magellanica (L. f.) Less., comb. superfl. = **Perezia magellanica** (L. f.) Lag.
Referencias: Katinas, L., 1995.

Perezia magellanica (L. f.) Lag.
Sin.: *Clarionea elegans* Phil., *Clarionea magellanica* (L. f.) DC., *Perdicium magellanicum* L. f., *Perezia lagascae* Cass., nom. illeg., *Perezia magellanica* (L. f.) Less., comb. superfl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1400 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Agostini, P. 30b* (LP)]; CHL[*Donat, A. 4* (LP)].

Perezia mandonii Rusby
Sin.: *Perezia laurifolia* Kuntze
Referencias: Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16966* (LP)].

Perezia megalantha Speg.
Sin.: *Perezia oleracea* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 3442* (LP)]; CHL[*Donat, A. 6* (LP)].

Perezia multicapitata J. Remy = **Perezia carthamoides** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. var. *achalensis* Kuntze = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **multiflora**
Sin.: *Chaetanthera multiflora* Humb. & Bonpl., *Clarionea polycephala* Cass., nom. illeg., *Homanthis multiflorus* (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Homoianthus multiflorus* (Humb. & Bonpl.) DC., *Perezia acanthoides* Hook. & Arn., *Perezia bidentata* Meyen, *Perezia glomerata* Rusby, *Perezia multiflora* (Humb. & Bonpl.) Less. var. *achalensis* Kuntze
Referencias: Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16997* (LP)]; CHL[*Funk, V. A. 11207* (LP)].

Perezia multiflora (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **sonchifolia** (Baker) Vuilleum.
Sin.: *Perezia aletes* J.F. Macbr., *Perezia sonchifolia* Baker, *Perezia sonchifolia* Baker var. *tandilensis* Kuntze
Referencias: Katinas, L., 1995; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, LPA, RNE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kuntze, C. E. O. s.n.* (LP)]; BRA[*Sobral, M. 3062* (FLOR, ICN)]; URY[*Chebataroff, J. 2163* (LP)].

Perezia nitidifolia J. Kost. = **Perezia coerulescens** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia nivalis Wedd., p.p. = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia nutans Less.
Sin.: *Perezia gayana* DC., *Perezia perfoliata* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11460* (LP)]; CHL[*Pérez-Moreau, R. L. 23469* (LP)].

Perezia ochroleuca (Cass.) Less. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Perezia oleracea Kuntze = **Perezia megalantha** Speg.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia palustris (Phil.) Reiche = **Perezia lactucoides** (Vahl) Less. subsp. **palustris** (Phil.) Vuilleum.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia pampeana Speg. = **Criscia stricta** (Spreng.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1994.

Perezia patagonica Speg. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia patagonica Speg. var. *intermedia* Speg. = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia pectinata (Phil.) Reiche = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia pedicularidifolia Less.
Sin.: *Clarionea comosa* Phil., *Clarionea humilis* Phil., *Clarionea laciniata* Phil., *Clarionea parvifolia* Phil., *Clarionea variabilis* Phil., *Clarionea volkmanii* Phil., *Homoeanthus variabilis* Phil., *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche, *Perezia laciniata* (Phil.) Reiche var. *comosa* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pedicularidifolia* Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Perezia variabilis* (Phil.) Reiche
Referencias: Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6052* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2017* (LP)].

Perezia pedicularidifolia Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia pedicularidifolia Less. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia perfoliata J. Remy = **Perezia nutans** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia pilifera (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea lechleri* Sch. Bip., *Clarionea pilifera* D. Don, *Homoeanthus humilis* Phil., *Perezia linearis* Less. var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Perezia pilifera* (D. Don) Hook. & Arn. var. *nirihuaoesis* Hosseus
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6237* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3642* (LP)].

Perezia pilifera (D. Don) Hook. & Arn. var. *nirihuaoesis* Hosseus = **Perezia pilifera** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia pinnata (Phil.) Reiche = **Perezia lyrata** (J. Remy) Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia poeppigii Less.
Sin.: *Clarionea caulescens* Phil., *Clarionea nana* Phil., *Clarionema virens* (D. Don) Phil. var. *humilis* Phil., *Clarionia virens* D. Don, *Homoeanthus brevicaulis* Phil., *Homoeanthus remyanus* Phil., *Homoianthus pristiphyllus* J. Remy, *Perezia virens* (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2900 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2025* (LP)].

Perezia prenanthoides Less.
Sin.: *Perezia brachylepis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Corte, A. 226* (LP)]; CHL[*Burkart, A. 9574* (SI)].

Perezia purpurata Wedd.
Sin.: *Clarionea atacamensis* Phil., *Perezia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Perezia hunzikeri* Cabrera, *Perezia keshua* Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1376* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 220* (CONC)].

Perezia pygmaea Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19789* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 3038* (LP)].

Perezia recurvata (Vahl) Less.
Sin.: *Chaetanthera recurvata* (Vahl) Spreng., *Clarionea recurvata* (Vahl) D. Don, *Homoeanthus triceps* Phil., *Homoianthus donianus* (Less.) J. Remy, *Homoianthus echinulatus* Cass., *Homoianthus inermis* Meyen & Walp., nom. illeg., *Homoianthus patagonicus* Gand., *Homoianthus pectinatus* Phil., *Perdicium recurvatum* Vahl, *Perezia beckii* Hook. & Arn., *Perezia doniana* Less., *Perezia flavescens* Dusén, *Perezia patagonica* Speg., *Perezia patagonica* Speg. var. *intermedia* Speg., *Perezia pectinata* (Phil.) Reiche, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *beckii* (Hook. & Arn.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *patagonica* (Speg.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. subsp. *triceps* (Phil.) Cabrera, *Perezia recurvata* (Vahl) Less. var. *sessilis* Dusén, *Perezia reflexa* Meyen, *Perezia triceps* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., et al., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(VI, VII, VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11601* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6069* (LP)].

Perezia recurvata (Vahl) Less. var. *sessilis* Dusén = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. *beckii* (Hook. & Arn.) Cabrera = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Katinas, L., 1995.

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. *patagonica* (Speg.) Cabrera = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Katinas, L., 1995.

Perezia recurvata (Vahl) Less. subsp. *triceps* (Phil.) Cabrera = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Katinas, L., 1995.

Perezia reflexa Meyen = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia scapellifolia J. Kost. = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia scapellifolia J. Kost. var. *parviflora* J. Kost. = **Perezia ciliaris** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia sessiliflora Speg. = **Burkartia lanigera** (Hook. & Arn.) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976a.

Perezia sonchifolia Baker = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **sonchifolia** (Baker) Vuilleum.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia sonchifolia Baker var. *tandilensis* Kuntze = **Perezia multiflora** (Humb. & Bonpl.) Less. subsp. **sonchifolia** (Baker) Vuilleum.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia spathulata Phil., hom. illeg. = **Haplopappus scrobiculatus** (Nees) DC.
Referencias: Marticorena, C. & Crisci, J. V., 1972.

Perezia spathulata (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Clarionea spathulata* Lag. ex D. Don, *Homoianthus viscosus* (Less.) DC., *Perezia viscosa* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Katinas, L., 1995; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3252* (LP)]; CHL[*Pfister, A. 7165* (LP)].

Perezia squarrosa (Vahl) Less. subsp. **cubataensis** (Less.) B.B. Simpson
Sin.: *Homoianthus cubataensis* (Less.) DC., *Homoianthus laevis* (Less.) DC., *Perezia cubataensis* Less., *Perezia laevis* Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1400 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5361* (LP)].

Perezia squarrosa (Vahl) Less. subsp. **squarrosa**
Sin.: *Homoianthus ambiguus* Cass., *Homoianthus squarrosus* (Vahl) DC., *Perdicium squarrosum* Vahl
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1998; Freire, S. E., et al., 2006; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, GUA, PAI); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28725* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 14643* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12919* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3006* (LP)].

Perezia sublyrata Domke
Sin.: *Perezia sublyrata* Domke var. *glabrescens* Tovar
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–5000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 4075* (LIL)].

Perezia sublyrata Domke var. *glabrescens* Tovar = **Perezia sublyrata** Domke
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia triceps (Phil.) Reiche = **Perezia recurvata** (Vahl) Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia variabilis (Phil.) Reiche = **Perezia pedicularidifolia** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia violacea Wedd. = **Perezia coerulescens** Wedd.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia virens (D. Don) Hook. & Arn. = **Perezia poeppigii** Less.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia viscosa Less. = **Perezia spathulata** (Lag. ex D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Simpson, B. B., 1969.

Perezia volcanensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1995; Simpson, B. B., 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 8155* (LIL)].

Perityle Benth.

Número de especies: 1

Perityle discoidea (Phil.) I.M. Johnst. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Powell, A. M., 1974.

Perityle emoryi Torr.
Sin.: *Closia anthemoides* Phil., *Closia brachypetala* Phil., *Closia chilensis* Regel & Körn., *Closia cotula* J. Remy, *Closia cotula* J. Remy var. *elata* (Phil.) Reiche, *Closia digitata* Phil., *Closia discoidea* Phil., *Closia elata* Phil., *Closia elata* Phil. var. *nana* Phil., *Closia foliosa* Phil., *Closia pusilla* Phil., *Closia viridis* Phil., *Laphamia emoryi* (Torr.) Benth. & Hook. f. ex Jacks., *Laphamia nuda* (Torr.) Benth. & Hook. f. ex Jacks., *Perityle discoidea* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst., *Perityle emoryi* Torr. var. *nuda* (Torr.) A. Gray, *Perityle grayi* Rose, *Perityle nuda* Torr., *Perityle rothrockii* Rose
Referencias: Everly, M. L., 1947; Johnston, I. M., 1929a; Powell, A. M., 1974; Reiche, C. F., 1905; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3600 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3666* (LP)].

Perityle emoryi Torr. var. *elata* (Phil.) I.M. Johnst. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Powell, A. M., 1974.

Perityle emoryi Torr. var. *nuda* (Torr.) A. Gray = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Everly, M. L., 1947.

Perityle grayi Rose = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Everly, M. L., 1947; Powell, A. M., 1974.

Perityle nuda Torr. = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Everly, M. L., 1947; Powell, A. M., 1974.

Perityle rothrockii Rose = **Perityle emoryi** Torr.
Referencias: Everly, M. L., 1947; Powell, A. M., 1974.

Phoenicoseris berteriana (Decne.) Skottsb. = **Dendroseris berteroana** (Decne.) Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.

Phoenicoseris pinnata (Bertero ex Decne.) Skottsb. = **Dendroseris pinnata** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.

Phyllochilium densifolium (Phil.) Cabrera = **Chiliophyllum densifolium** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Picris L.

Número de especies: 1 introducida

Picris echioides L.
Sin.: *Helminthia echioides* (L.) Gaertn., *Helminthia echioides* (L.) Holub, *Helminthotheca echioides* (L.) Holub
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, LPA, MEN, RNE, SLU); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 106* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3442* (LP)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 445* (LP)].

Picris macloviana d'Urv. ex DC. = **Leucheria suaveolens** (d'Urv.) Speg.
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Picrosia D. Don

Número de especies: 2, 1 endémica

Picrosia australis Decne. = **Picrosia longifolia** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Picrosia cabreriana A.G. Schulz
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Schulz, A. G., 1944.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11809* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 3484* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 6356* (LP)].

Picrosia longifolia D. Don
Sin.: *Picrosia australis* Decne., *Picrosia longifolia* D. Don var. *angustissima* Kuntze, *Prenanthes subdentata* Hook., *Psilopogon albiflorus* Phil., *Tragopogon fritillarioides* Less.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., et al., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA); CHL(I); PRY(APY, CEN, PHA, SPE); URY(CAS, CLA, FLO, LAV, MON, PAY, RNO, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8540* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 9238* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 4100* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 867* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 106* (LP)].

Picrosia longifolia D. Don var. *angustissima* Kuntze = **Picrosia longifolia** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Pilosella adenocephala Sch. Bip. = **Hieracium adenocephalum** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Pilosella chilensis (Less.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium chilense** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Pilosella fulvipes (Wedd.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium fulvipes** Wedd.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Pilosella glaucifolia (Poepp. ex Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium glaucifolium** Poepp. ex Froel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Pilosella magellanica (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Pilosella mandonii Sch. Bip. = **Hieracium mandonii** (Sch. Bip.) Arv.-Touv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Pilosella myosotidifolia (Sch. Bip.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium antarcticum** d'Urv.
Referencias: Cerana, M. M. & Ariza Espinar, L., 2003.

Pilosella orthotricha (R.E. Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium chilense** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Pilosella patagonica (Hook. f.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium patagonicum** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Pilosella semiglabrata (Comm.) F.W. Schultz & Sch. Bip. = **Hieracium commersonii** Monnier var. **commersonii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Pingraea angustifolia Cass. = **Baccharis pingraea** DC. var. **pingraea**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea anomala (DC.) F.H. Hellwig = **Baccharis anomala** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea articulata (Lam.) F.H. Hellwig = **Baccharis articulata** (Lam.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Pingraea conyzoides (Less.) F.H. Hellwig = **Baccharis conyzoides** (Less.) DC.

Pingraea crispa (Spreng.) F.H. Hellwig = **Baccharis crispa** Spreng.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea cymosa (Phil.) F.H. Hellwig = **Baccharis cymosa** Phil.

Pingraea flexuosa (Baker) F.H. Hellwig = **Baccharis flexuosa** Baker
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea latifolia (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea marginalis (DC.) F.H. Hellwig = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.

Pingraea oxyodonta (DC.) F.H. Hellwig = **Baccharis oxyodonta** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea punctulata (DC.) Hellwig = **Baccharis punctulata** DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea pycnantha (Phil.) F.H. Hellwig = **Baccharis pycnantha** Phil.

Pingraea rhexioides (Kunth) F.H. Hellwig = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea sagittalis (Less.) F.H. Hellwig = **Baccharis sagittalis** (Less.) DC.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea salicifolia (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea scandens (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig = **Baccharis scandens** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pingraea sphaerocephala (Hook. & Arn.) F.H. Hellwig = **Baccharis sphaerocephala** Hook. & Arn.

Pingraea viscosa (Ruiz & Pav.) F.H. Hellwig = **Baccharis salicifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Piptocarpha R. Br.

Número de especies: 13

Piptocarpha angustifolia Dusén
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b.
Árbol. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14485* (HBR, LP)].

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker
Sin.: *Vernonia axillaris* Less.
Referencias: Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.
Arbusto o árbol. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 3116* (HBR, LP)].

Piptocarpha densifolia Dusén ex G.L. Smith
Referencias: Smith, G. L., 1982.
Arbusto o árbol. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, G. L. 1088* (MBM)].

Piptocarpha diacanthoides Hook. & Arn. = **Dasyphyllum diacanthoides** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Piptocarpha excelsa (D. Don) Hook. & Arn. = **Dasyphyllum excelsum** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1959d.

Piptocarpha isotrichia (DC.) Cabrera & Vittet
Sin.: *Vernonia isotricha* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Liana. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3066* (HBR, LP)].

Piptocarpha nitidula (Less.) Griseb. = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Piptocarpha notata (Less.) Baker
Sin.: *Carphobolus notatus* (Less.) Sch. Bip., *Vernonia notata* Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Liana. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7139* (FLOR, HBR, LP)].

Piptocarpha oblonga (Gardner) Baker
Sin.: *Carphobolus oblongus* (Gardner) Sch. Bip., *Vernonia oblonga* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Liana. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cabrera, A. L. 9975* (HBR, LP)].

Piptocarpha organensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Arbusto o árbol. Nativa. 300–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 965* (FLOR, HBR, LP)].

Piptocarpha quadrangularis (Vell.) Baker
Sin.: *Chrysocoma quadrangularis* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b.
Liana. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6742* (HBR, LP)].

Piptocarpha ramboi G.L. Smith
Referencias: Smith, G. L., 1982.
Liana. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Wasum, R. 496* (M)].

Piptocarpha regnellii (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Carphobolus regnellii* Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Arbolito. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4094* (HBR, LP)].

Piptocarpha reitziana Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Liana. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3019* (HBR, LP)].

Piptocarpha sellowii (Sch. Bip.) Baker var. **balansiana** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Liana. Perenne. Nativa. 100–600 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 880a* (LP), *Zuloaga, F. O. 5520* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 14742* (HBR, LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4282* (BA)].

Piptocarpha sellowii (Sch. Bip.) Baker var. **sellowii**
Sin.: *Carphobolus sellowii* Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Liana. Perenne. Nativa. 100–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rieneck, E. M. 257* (S)].

Piptocarpha tomentosa Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Árbol. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2281* (HBR, LP)].

Piqueria cumingii B.L. Rob., hom. illeg. = **Ophryosporus anomalus** R.M. King & H. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972a.

Piqueria floribunda DC. = **Ophryosporus floribundus** (DC.) R.M. King & H. Rob.

Piqueria pinifolia (Phil.) Hieron. ex B.L. Rob. = **Ophryosporus pinifolius** (Phil.) R.M. King & H. Rob.

Plagiocheilus Arn. ex DC.

Número de especies: 1

Plagiocheilus erectus Rusby = **Chrysanthellum indicum** DC. subsp. **afroamericanum** B.L. Turner

Plagiocheilus tanacetoides Haenke ex DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 553* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 5811* (CTES, FCQ)].

Platycheilus ochroleucus Cass. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Plazia Ruiz & Pav.

Número de especies: 2

Plazia acaciifolia J. Kost. = **Hyalis lancifolia** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Plazia argentea (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Hyalis argentea** D. Don ex Hook. & Arn. var. **argentea**
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Plazia cheiranthifolia (J. Remy) Wedd.
Sin.: *Aglaodendron cheiranthifolium* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b; Weddell, H. A., 1855.
Arbusto. Nativa. 2600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Plazia daphnoides Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b; Freire, S. E., 1996.
Arbusto. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, MEN, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, A. 8547* (LP)]; CHL[*Heins, U. L. 176* (LP)].

Plazia pinnifolia (Phil.) O. Hoffm. = **Gypothamnium pinifolium** Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Plazia spartioides (Wedd.) Kuntze = **Aphyllocladus spartioides** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Plazia virgata (Phil.) O. Hoffm. = **Aphyllocladus denticulatus** (J. Remy) Cabrera var. **denticulatus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1951b.

Plectocephalus dracaenoides (Johow) F.H. Hellwig = **Centaurodendron dracaenoides** Johow

Pleocarphus D. Don

Número de especies: 1 endémica

Pleocarphus dentatus Phil. = **Pleocarphus revolutus** D. Don

Pleocarphus revolutus D. Don
Sin.: *Jungia dentata* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche, *Jungia revoluta* (D. Don) Reiche var. *dentata* (Phil.) Reiche, *Pleocarphus dentatus* Phil.
Referencias: Harling, G. W., 1995; Reiche, C. F., 1905; Rémy, E. J., 1847.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 11407* (LP)].

Pluchea Cass.

Número de especies: 5

Pluchea absinthioides (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec. = **Tessaria absinthioides** (Hook. & Arn.) DC.
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Pluchea chingoyo (Kunth) DC.
Sin.: *Conyza chingoyo* Kunth
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Nativa. 1000–2500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3433* (CONC, LP)].

Pluchea dodoneifolia (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec. = **Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**
Referencias: Freire, S. E., 1995.

Pluchea fastigiata Griseb. = **Tessaria fastigiata** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Freire, S. E., 1998.

Pluchea glabra Griseb. = **Baccharis latifolia** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pluchea laxiflora Hook. & Arn.
Sin.: *Pluchea macrophylla* Sch. Bip. ex Baker
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5599* (LP)].

Pluchea macrocephala DC. = **Stenachaenium megapotamicum** (Spreng.) Baker var. **megapotamicum**
Referencias: Baker, J. G., 1882.

Pluchea macrophylla Sch. Bip. ex Baker = **Pluchea laxiflora** Hook. & Arn.

Pluchea microcephala R.K. Godfrey
Referencias: Ariza Espinar, L., 1969; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995; Godfrey, R. K., 1952.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 15019* (LP)].

Pluchea montana Griseb. = **Baccharis sculpta** Griseb.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pluchea oblongifolia DC.
Sin.: *Pluchea organensis* Gardner
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40955* (LP)].

Pluchea organensis Gardner = **Pluchea oblongifolia** DC.

Pluchea quitoc DC. = **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949c.

Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera
Sin.: *Conyza sagittalis* Lam., *Epaltes brasiliensis* DC., *Gnaphalium suaveolens* Vell., *Pluchea quitoc* DC., *Pluchea suaveolens* (Vell.) Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1949c, 1963a, 1974a, 1978; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4248* (LP)]; BRA[*Vidal, W. N. 273* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 8801* (LP)]; URY[*Gallinal, J. P. 4750* (LP)].

Pluchea suaveolens (Vell.) Kuntze = **Pluchea sagittalis** (Lam.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949c.

Podanthus Lag.

Número de especies: 2 endémicas

Podanthus mitiqui Lindl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 373* (CONC)].

Podanthus ovatifolius Lag.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1331* (CONC)].

Podocoma Cass.

Número de especies: 8, 2 endémicas

Podocoma asperrima Dusén ex Malme = **Podocoma spegazzinii** Cabrera
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Podocoma bellidifolia Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS); BRA(PAR); PRY(CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 17205* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 12248* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 5124* (LP)].

Podocoma blanchetiana Baker
Sin.: *Podocoma blanchetiana* Baker var. *intermedia* Hassl.
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 26315* (LP)]; BRA[*Bresolin, A. 221* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 9839* (CTES)].

Podocoma blanchetiana Baker var. *intermedia* Hassl. = **Podocoma blanchetiana** Baker
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.

Podocoma erigerifolia Steud. = **Podocoma hieraciifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Podocoma hieraciifolia (Poir.) Cass.
Sin.: *Erigeron hieraciifolium* Poir., *Erigeron primulifolium* Juss. ex Cass., *Podocoma erigerifolia* Steud., *Podocoma primulifolia* Cass., *Podopappus pubescens* Hook. & Arn.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Fontana, J. L., 1998; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAU, CON, MIE); URY(CLA, FLA, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6487* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 32160* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9357* (NY)]; URY[*Rosengurtt, B. 762* (LP)].

Podocoma hirsuta (Hook. & Arn.) Baker
Sin.: *Podopappus hirsutus* Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2005; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Nesom, G. L., 1994b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 13401* (CORD, LP)]; BRA[*Pereira, E. 7975* (MBM)]; PRY[*Montes, J. E. 11049* (NY)]; URY[*Sancho, G. 73* (LP)].

Podocoma macrocephala (Less.) Herter = **Asteropsis macrocephala** Less.
Referencias: Nesom, G. L., 1994f.

Podocoma notobellidiastrum (Griseb.) G.L. Nesom
Sin.: *Baccharidastrum notobellidiastrum* (Griseb.) Herter, *Conyza notobellidiastrum* Griseb., *Conyza notobellidiastrum* Griseb. var. *oblongifolia* Griseb., *Erigeron notobellidiastrum* (Griseb.) S.F. Blake, *Erigeron pauciflorus* Less., nom. nud., *Marsea notobellidiastrum* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993b; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1978; Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ÑEE, PAI, SPE); URY(ART, CLA, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solbrig, O. T. 3372* (NY)]; BRA[*Molon, R. C. 12623* (NY)]; PRY[*Arenas, P. 696* (CTES)]; URY[*Sancho, G. 96* (LP)].

Podocoma primulifolia Cass. = **Podocoma hieraciifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Podocoma regnellii Baker
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 8933* (S)].

Podocoma rivularis (Gardner) G.L. Nesom
Sin.: *Baccharidastrum rivulare* (Gardner) Herter, *Conyza rivularis* Gardner, *Erigeron gardneri* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Malme, G. O. A., 1933b; Nesom, G. L., 1994b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA); URY(MON, RIV, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sancho, G. 65* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 72523* (CTES)]; PRY[*Soria, N. 2410* (CTES)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (SI)].

Podocoma spegazzinii Cabrera
Sin.: *Podocoma asperrima* Dusén ex Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1932c; Malme, G. O. A., 1933b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(SAL); BRA(SCA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAB, LP)]; BRA[*Dusén, N. P. 17815* (S)]; URY[*Sancho, G. 95* (LP)].

Podopappus hirsutus Hook. & Arn. = **Podocoma hirsuta** (Hook. & Arn.) Baker
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Podopappus pubescens Hook. & Arn. = **Podocoma hieraciifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Nesom, G. L., 1994b; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Podopappus tomentosus Hook. & Arn. = **Asteropsis macrocephala** Less.
Referencias: Nesom, G. L., 1994f.

Podospermun laciniatum (L.) DC. = **Scorzonera laciniata** L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Polatherus scaber Raf. = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Polyachyrus Lag.

Número de especies: 7, 4 endémicas

Polyachyrus annuus I.M. Johnst.
Sin.: *Polyachyrus mollendoensis* I.M. Johnst.
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 758* (GH, M, UC)].

Polyachyrus auritus D. Don = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus bridgesii Poepp. & Endl. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus calderensis Phil. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus carduoides Phil.
Sin.: *Polyachyrus foliosus* Phil., *Polyachyrus glabratus* Phil., *Polyachyrus latifolius* Phil., *Polyachyrus rigidus* I.M. Johnst.
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Marticorena, A., Pardo, V., Peñaloza, A., Negritto, M. A., Cavieres, L. & Parada, M., 2004; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Endémica. 800–3000 m.
Países: CHL(II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 526* (CONC)].

Polyachyrus cinereus Ricardi & Weldt
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5335* (GH)].

Polyachyrus decurrens Lag. ex DC. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus echinopsoides Hook. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus foliosus Phil. = **Polyachyrus carduoides** Phil.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus fuscus (Meyen) Walp.
Sin.: *Diaphoranthus fuscus* Meyen, *Polyachyrus fuscus* (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus nesites* I.M. Johnst., *Polyachyrus roseus* Phil.
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Reiche, C. F., 1905; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 525* (CONC)].

Polyachyrus fuscus (Meyen) Walp. var. *roseus* (Phil.) Reiche = **Polyachyrus fuscus** (Meyen) Walp.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus gayi J. Remy
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Reiche, C. F., 1905; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Fonch, F. S. 1886* (SGO)].

Polyachyrus glabratus Phil. = **Polyachyrus carduoides** Phil.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus glandulosus Nutt. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus latifolius Phil. = **Polyachyrus carduoides** Phil.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus litoralis Phil. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus macrotis Phil. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus mollendoensis I.M. Johnst. = **Polyachyrus annuus** I.M. Johnst.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus multifidus D. Don = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus nesites I.M. Johnst. = **Polyachyrus fuscus** (Meyen) Walp.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

[Polyachyrus nivalis Phil.]
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Notas: Nombre dudoso.

Polyachyrus niveus auct. non Lag. ex DC. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus niveus Lag. ex DC. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus oblongiflorus J. Kost. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Sin.: *Polyachyrus multifidus* D. Don, *Polyachyrus niveus* auct. non Lag. ex DC., *Polyachyrus oblongiflorus* J. Kost., *Polyachyrus sanromani* Phil., *Polyachyrus selinoides* Reiche
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2253* (CONC)].

Polyachyrus poeppigii Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Sin.: *Polyachyrus auritus* D. Don, *Polyachyrus calderensis* Phil., *Polyachyrus decurrens* Lag. ex DC., *Polyachyrus litoralis* Phil., *Polyachyrus macrotis* Phil., *Polyachyrus poeppigii* Kuntze ex Less. var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Polyachyrus tenuifolius* Phil., *Polyachyrus virgatus* I.M. Johnst.
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1686* (CONC)].

Polyachyrus rigidus I.M. Johnst. = **Polyachyrus carduoides** Phil.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus roseus Phil. = **Polyachyrus fuscus** (Meyen) Walp.
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus sanromani Phil. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus selinoides Reiche = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **multifidus** (D. Don) Ricardi & Weldt
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus sphaerocephalus D. Don
Sin.: *Polyachyrus bridgesii* Poepp. & Endl., *Polyachyrus echinopsoides* Hook., *Polyachyrus glandulosus* Nutt., *Polyachyrus niveus* Lag. ex DC., *Polyachyrus tarapacanus* Phil., *Polyachyrus uniflorus* Sch. Bip., *Polyachyrus villosus* Wedd.
Referencias: Katinas, L. & Crisci, J. V., 2000; Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.
Subarbusto. Nativa. 0–4000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 10891* (LP)].

Polyachyrus tarapacanus Phil. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus tenuifolius Phil. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus uniflorus Sch. Bip. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus villosus Wedd. = **Polyachyrus sphaerocephalus** D. Don
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyachyrus virgatus I.M. Johnst. = **Polyachyrus poeppigii** Kuntze ex Less. subsp. **poeppigii**
Referencias: Ricardi, M. & Weldt, E., 1974.

Polyactidium sprengelii DC. = **Hysterionica filiformis** (Spreng.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Polycladus abietinus Phil. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Polycladus cupressinus Phil. = **Parastrephia quadrangularis** (Meyen) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Polygyne inconspicua Phil. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Polymnia andrei Arechav. = **Smallanthus connatus** (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Polymnia connata (Spreng.) S.F. Blake = **Smallanthus connatus** (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a; Zöllner, O., 1998.

Polymnia grandis Kunth = **Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch
Referencias: Funk, V. A., 1982.

Polymnia macroscypha Baker = **Smallanthus macroscyphus** (Baker) A. Grau

Polymnia siegesbeckia DC. = **Smallanthus siegesbeckius** (DC.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Polymnia silphioides DC. = **Smallanthus connatus** (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Polymnia silphioides DC. var. *perennis* Bettfr. = **Smallanthus connatus** (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1978a.

Polypappus triplinervis (Spreng.) Less. = **Baccharis trineura** Soria & Zardini
Referencias: Barroso, G. M., 1976.

Polypteris brasiliensis Less. = **Gaillardia megapotamica** (Spreng.) Baker var. **megapotamica**
Referencias: Biddulph, S. F., 1944; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porcellites brasiliensis Less. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Porophyllum Adans.

Número de especies: 8, 2 endémicas

Porophyllum angustissimum Gardner
Sin.: *Kleinia filifolia* Hook. & Arn., nom. illeg., *Porophyllum arenosum* Sch. Bip. ex Baker, *Porophyllum riedelii* Baker
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28745* (CTES, SI)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Petenatti & Ariza Espinar, 1997).

Porophyllum arenosum Sch. Bip. ex Baker = **Porophyllum angustissimum** Gardner
Referencias: Johnson, R. R., 1969; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum cabrerae D.J.N. Hind
Referencias: Hind, D. J. N., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30761* (K, SI)].

Porophyllum curticeps Malme = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum ellipticum Cass. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum ellipticum Cass. var. *genuinum* Urb., nom. inval. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum ellipticum Cass. var. *intermedium* DC. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum ellipticum Cass. var. *ruderale* (Jacq.) Urb. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum eremophilum Cabrera = **Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum excertum Baker = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum filifolium (Spreng.) DC. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum haenkei DC. = **Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.

Porophyllum hasslerianum Chodat
Referencias: Johnson, R. R., 1969.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8086* (NY, US)].

Porophyllum lanceolatum DC.
Sin.: *Porophyllum curticeps* Malme, *Porophyllum excertum* Baker, *Porophyllum lanceolatum* DC. f. *depauperata* Chodat, *Porophyllum lanceolatum* DC. f. *foetens* Chodat, *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *angustius* Chodat, *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *corymbosum* Chodat, *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *genuinum* Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *glaucum* Hassl., *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *induratum* Chodat, *Porophyllum lanceolatum* DC. var. *lineare* Hassl., *Porophyllum martii* Baker, *Porophyllum prenanthoides* DC.
Referencias: Augusto, I., 1946; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1974a, 1978; Malme, G. O. A., 1931; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23875* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 49075* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2992* (LP)].

Porophyllum lanceolatum DC. f. *depauperata* Chodat = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. f. *foetens* Chodat = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. var. *angustius* Chodat = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. var. *corymbosum* Chodat = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. var. *genuinum* Hassl. = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. var. *glaucum* Hassl. = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. var. *induratum* Chodat = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lanceolatum DC. var. *lineare* Hassl. = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum latifolium Benth. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum lineare DC. = **Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum linifolium (L.) DC., nom. illeg. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Porophyllum linifolium (Ard.) DC.
Sin.: *Cacalia linaria* Cav. var. *pumila* (Hook. & Arn.) Poir., *Cacalia linifolia* Ard., *Cacalia suffruticosa* L., *Kleinia filifolia* Spreng., *Kleinia pumila* Hook. & Arn., *Kleinia suffruticosa* (L.) Willd., *Porophyllum filifolium* (Spreng.) DC., *Porophyllum linifolium* (L.) DC., nom. illeg. , *Porophyllum suffruticosum* (L.) Cass.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Augusto, I., 1946; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Malme, G. O. A., 1931.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19250* (LP)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6674* (LP)]; URY[*Pedersen, T. M. 3617* (LP)].

Porophyllum macrolepidium Malme = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum martii Baker = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum oblanceolatum Rusby = **Porophyllum obscurum** (Spreng.) DC.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum obscurum (Spreng.) DC.
Sin.: *Kleinia linifolia* Hook. & Arn., *Kleinia obscura* Spreng., *Porophyllum eremophilum* Cabrera, *Porophyllum haenkei* DC., *Porophyllum lineare* DC., *Porophyllum oblanceolatum* Rusby
Referencias: Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., et al., 2000; Malme, G. O. A., 1931, 1933b; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CON, MIE); URY(ART, PAY, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodrigo Trigo, A. P. 2866* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 46767* (LP)]; PRY[*Meyer, T. 18968* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 7170* (LP)].

Porophyllum oppositifolium Kuntze
Sin.: *Porophyllum platyphyllum* Chodat
Referencias: Johnson, R. R., 1969.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3907* (US)].

Porophyllum platyphyllum Chodat = **Porophyllum oppositifolium** Kuntze
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum porophyllum (L.) Kuntze, nom. illeg. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum prenanthoides DC. = **Porophyllum lanceolatum** DC.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum riedelii Baker = **Porophyllum angustissimum** Gardner
Referencias: Johnson, R. R., 1969; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass.
Sin.: *Cacalia glandulosa* Salisb., *Cacalia porophyllum* L., *Cacalia ruderalis* (Jacq.) Sw., *Kleinia porophyllum* (L.) Willd., *Kleinia ruderalis* Jacq., *Porophyllum ellipticum* Cass., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *genuinum* Urb., nom. inval., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *intermedium* DC., *Porophyllum ellipticum* Cass. var. *ruderale* (Jacq.) Urb., *Porophyllum latifolium* Benth., *Porophyllum macrolepidium* Malme, *Porophyllum porophyllum* (L.) Kuntze, nom. illeg. , *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. f. *suffruticosa* Chodat, *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *angustifolia* Hassl., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob., *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* (Salisb.) Chodat, *Porophyllum ruderale* (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat, *Tagetes integrifolia* Muschl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Cabrera, A. L., 1978; Gutiérrez, D. G. & Katinas, L., 2003; Keil, D. J., 1975; Malme, G. O. A., 1931, 1933b; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, GUA, ITA, SPE); URY(ART, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 3206* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 2670* (LP)]; CHL[*Berríos, T. 1006* (CONC)]; PRY[*Woolston, A. L. 674* (LP)]; URY[*Lombardo, A. 3135* (LP)].

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. f. *suffruticosa* Chodat = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. *angustifolia* Hassl. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. *ellipticum* (Cass.) A. Gray ex B.L. Rob. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. *glandulosum* (Salisb.) Chodat = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. *macrolepidium* (Malme) Chodat = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Johnson, R. R., 1969.

Porophyllum suffruticosum (L.) Cass. = **Porophyllum linifolium** (Ard.) DC.

[Porophyllum tarapacanum Zoellner]
Referencias: Zöllner, O., 1978.
Notas: Nombre dudoso.

Portalesia procumbens Meyen = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Praxelis clematidea (Griseb.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium catarium** Veldkamp
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.

Praxelis grandiflora (DC.) Sch. Bip. = **Eupatorium variegatum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Praxelis kleinioides (Kunth) Sch. Bip. = **Eupatorium kleinioides** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Praxelis missionum (Malme) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium missionum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Praxelis ostenii (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium ostenii** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1996f.

Prenanthes lutea Vell. = **Hypochaeris lutea** (Vell.) Britton
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Prenanthes subdentata Hook. = **Picrosia longifolia** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Prionanthes antimenorrhoea Schrank = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Proselia serrata (Ruiz & Pav.) D. Don = **Chaetanthera serrata** Ruiz & Pav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Proustia Lag.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Proustia angustifolia Wedd. = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **mollis** (Kuntze) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Proustia angustifolia Wedd. var. *mollis* Kuntze = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **mollis** (Kuntze) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Fabris, H. A., 1968.

Proustia baccharoides D. Don ex Hook. & Arn. = **Proustia ilicifolia** Hook. & Arn. f. **baccharoides** (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia cinerea Phil. = **Proustia cuneifolia** D. Don f. **cinerea** (Phil.) Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia cuneifolia D. Don f. *angustifolia* (Wedd.) Fabris = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **mollis** (Kuntze) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Fabris, H. A., 1968.

Proustia cuneifolia D. Don f. **cinerea** (Phil.) Fabris
Sin.: *Proustia cinerea* Phil.
Referencias: Fabris, H. A., 1968.
Arbusto. Endémica. 300–1200 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sparre, B. B. 3094* (S)].

Proustia cuneifolia D. Don f. *mendocina* (Phil.) Fabris = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **mendocina** (Phil.) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1995c.

Proustia cuneifolia D. Don f. **tipia** (Phil.) Fabris
Sin.: *Proustia tipia* Phil.
Referencias: Fabris, H. A., 1968.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3577* (LP)].

Proustia cuneifolia D. Don var. **cuneifolia**
Sin.: *Proustia pungens* Poepp. ex Less., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze, *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *integrifolia* Hook. & Arn., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *spinulosa* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Fabris, H. A., 1968; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6024* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2377* (LP)].

Proustia cuneifolia D. Don var. **mendocina** (Phil.) Ariza
Sin.: *Proustia cuneifolia* D. Don f. *mendocina* (Phil.) Fabris, *Proustia mendocina* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1995c; Fabris, H. A., 1968; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1179* (LP)].

Proustia cuneifolia D. Don var. **mollis** (Kuntze) Cabrera
Sin.: *Proustia angustifolia* Wedd., *Proustia angustifolia* Wedd. var. *mollis* Kuntze, *Proustia cuneifolia* D. Don f. *angustifolia* (Wedd.) Fabris
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Fabris, H. A., 1968; Katinas, L., 1995.
Arbusto. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13268* (LP)].

Proustia glandulosa DC. = **Proustia pyrifolia** DC. f. **glandulosa** (DC.) Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia ilicifolia Hook. & Arn. f. **baccharoides** (D. Don ex Hook. & Arn.) Fabris
Sin.: *Proustia baccharoides* D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Fabris, H. A., 1968.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2369* (LP, SI)].

Proustia ilicifolia Hook. & Arn. f. **ilicifolia**
Sin.: *Proustia olivillo* Phil., *Proustia pungens* Poepp. ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC., *Proustia reticulata* Phil.
Referencias: Fabris, H. A., 1968.
Arbusto. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 5558* (CONC, LP)].

Proustia mendocina Phil. = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **mendocina** (Phil.) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 1995c.

Proustia oblongifolia D. Don = **Proustia pyrifolia** DC. f. **pyrifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia olivillo Phil. = **Proustia ilicifolia** Hook. & Arn. f. **ilicifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pungens Poepp. ex Less. = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **cuneifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pungens Poepp. ex Less. var. *cuneifolia* (D. Don) Wedd. = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **cuneifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pungens Poepp. ex Less. var. *heterophylla* Kuntze = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **cuneifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pungens Poepp. ex Less. var. *ilicifolia* (Hook. & Arn.) DC. = **Proustia ilicifolia** Hook. & Arn. f. **ilicifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pungens Poepp. ex Less. var. *integrifolia* Hook. & Arn. = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **cuneifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pungens Poepp. ex Less. var. *spinulosa* Hook. & Arn. = **Proustia cuneifolia** D. Don var. **cuneifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia pyrifolia DC. f. **glandulosa** (DC.) Fabris
Sin.: *Proustia glandulosa* DC.
Referencias: Fabris, H. A., 1968.
Arbusto. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Harvey, W. H. s.n.* (S)].

Proustia pyrifolia DC. f. **pyrifolia**
Sin.: *Proustia oblongifolia* D. Don, *Proustia pyrifolia* DC. var. *canescens* DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Fabris, H. A., 1968.
Arbusto. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2329* (CONC, LP)].

Proustia pyrifolia DC. var. *canescens* DC. = **Proustia pyrifolia** DC. f. **pyrifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia reticulata Phil. = **Proustia ilicifolia** Hook. & Arn. f. **ilicifolia**
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Proustia tipia Phil. = **Proustia cuneifolia** D. Don f. **tipia** (Phil.) Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1968.

Pseudelephantopus Rohr

Número de especies: 1

Pseudelephantopus funckii (Turcz.) Cabrera, comb. superfl. = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Pseudelephantopus funckii (Turcz.) Philipson = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist
Sin.: *Chaetospira funckii* (Turcz.) S.F. Blake, *Chaetospira spiralis* (Less.) Aspl. & S.F. Blake, *Distreptus spiralis* Less., *Elephantopus spicatus* auct. non Juss., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Cabrera, comb. superfl., *Pseudelephantopus funckii* (Turcz.) Philipson, *Spirochaeta funckii* Turcz.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4127* (LP)].

Pseudobaccharis acaulis (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera = **Baccharis acaulis** (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis polycephala I.L. Teodoro = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **polycephala** (I.L. Teodoro) G.M. Barroso
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002.

Pseudobaccharis retamoides (Phil.) Cabrera = **Baccharis retamoides** Phil.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Pseudobaccharis rhexioides (Kunth) V.M. Badillo = **Baccharis rhexioides** Kunth
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera = **Baccharis spartioides** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis tenella (Hook. & Arn.) Cabrera = **Baccharis tenella** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis trinervis (Pers.) I.L. Teodoro, comb. superfl. = **Baccharis trinervis** Pers.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Pseudobaccharis trinervis (Pers.) V.M. Badillo = **Baccharis trinervis** Pers.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Pseudognaphalium austrobrasilicum Deble & Marchiori = **Gnaphalium gaudichaudianum** DC.

Pseudognaphalium badium (Wedd.) Anderb. = **Gnaphalium badium** Wedd.

Pseudognaphalium cabrerae (S.E. Freire) Deble = **Gnaphalium cabrerae** S.E. Freire

Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt = **Gnaphalium cheiranthifolium** Lam.

Pseudognaphalium coquimbense (Phil.) Anderb. = **Gnaphalium coquimbense** Phil.

Pseudognaphalium cymatoides (Kunze ex DC.) Anderb. = **Gnaphalium cymathoides** Kunze ex DC.

Pseudognaphalium frigidum (Wedd.) Anderb. = **Gnaphalium frigidum** Wedd.

Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb. = **Gnaphalium gaudichaudianum** DC.

Pseudognaphalium gayanum (J. Remy) Anderb.
= **Gnaphalium gayanum** J. Remy

Pseudognaphalium glandulosum (Klatt) Anderb.
= **Gnaphalium glandulosum** Klatt

Pseudognaphalium graveolens (Kunth) Anderb.
= **Gnaphalium graveolens** Kunth

Pseudognaphalium heterotrichum (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium heterotrichum** Phil.

Pseudognaphalium illapelinum (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium illapelinum** Phil. var. **illapelinum**

Pseudognaphalium jujuyense (Cabrera) Anderb.
= **Gnaphalium jujuyense** Cabrera

Pseudognaphalium lacteum (Meyen & Walp.) Anderb.
= **Gnaphalium lacteum** Meyen & Walp.

Pseudognaphalium landbeckii (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium landbeckii** Phil.

Pseudognaphalium leucopeplum (Cabrera) Anderb.
= **Gnaphalium leucopeplum** Cabrera

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L. Burtt
= **Gnaphalium luteoalbum** L.

Pseudognaphalium melanosphaeroides (Wedd.) Anderb.
= **Gnaphalium melanosphaeroides** Wedd.

Pseudognaphalium moelleri (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium moelleri** Phil.

Pseudognaphalium montevidense (Spreng.) Anderb.
= **Gnaphalium montevidense** Spreng.

Pseudognaphalium pratense (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium pratense** Phil.

Pseudognaphalium psilophyllum (Meyen & Walp.) Anderb. = **Gnaphalium psilophyllum** Meyen & Walp.

Pseudognaphalium remyanum (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium remyanum** Phil.

Pseudognaphalium resedifolium (Tausch) Anderb.
= **Gnaphalium resedifolium** Tausch

Pseudognaphalium robustum (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium robustum** Phil.

Pseudognaphalium tarapacanum (Phil.) Anderb.
= **Gnaphalium tarapacanum** Phil.

Pseudognaphalium versatile (Rusby) Anderb.
= **Gnaphalium versatile** Rusby

Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb.
= **Gnaphalium viravira** Molina

Pseudognaphalium yalaense (Cabrera) Anderb.
= **Gnaphalium yalaense** Cabrera

Pseudogynoxys (Greenm.) Cabrera

Número de especies: 1

Pseudogynoxys benthamii Cabrera
Sin.: *Pseudogynoxys cabrerae* H. Rob. & Cuatrec., *Senecio benthamii* Baker, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Perret, P. & Martini, R., 2001; Robinson, H. E. & Cuatrecasas, J., 1977.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); PRY(APA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13851* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 6000* (G)].

Pseudogynoxys cabrerae H. Rob. & Cuatrec.
= **Pseudogynoxys benthamii** Cabrera
Referencias: Perret, P. & Martini, R., 2001.

Psila boliviensis (Wedd.) Cabrera = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **boliviensis**
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Psila boliviensis (Wedd.) Cabrera var. *latifolia* (R.E. Fr.) Cabrera = **Baccharis boliviensis** (Wedd.) Cabrera var. **latifolia** (R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Psila brachylaenoides (DC.) Aristeg. = **Baccharis brachylaenoides** DC. var. **brachylaenoides**
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Psila caespitosa Phil. = **Baccharis acaulis** (Wedd. ex R.E. Fr.) Cabrera
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Psila retamoides (Phil.) Cabrera = **Baccharis retamoides** Phil.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Psila spartioides (Hook. & Arn. ex DC.) Cabrera
= **Baccharis spartioides** (Hook. & Arn. ex DC.) J. Remy
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Psila tenella (Hook. & Arn.) Cabrera = **Baccharis tenella** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Psila trinervis (Lam.) Cabrera = **Baccharis trinervis** Pers.
Referencias: Barroso, G. M. & Bueno, O. L., 2002; Giuliano, D. A., 2000.

Psilocarphus Nutt.

Número de especies: 2

Psilocarphus berteri I.M. Johnst. = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Psilocarphus brevissimus Nutt.
Sin.: *Psilocarphus globiferus* Nutt.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Cronquist, A. J., 1950; Morefield, J. D., 1992.
Hierba. Anual. Nativa. 300–3000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Birabén, M. 558* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 927* (MO, NY, US)].

Psilocarphus chilensis (J. Remy) A. Gray = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Psilocarphus globiferus (Bertero ex DC.) Speg., nom. illeg. = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Psilocarphus globiferus Nutt. = **Psilocarphus brevissimus** Nutt.

Psilocarphus globiferus (Bertero ex DC.) Speg. var. *minimus* Cabrera = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Psilocarphus tenellus Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Sin.: *Benzanilla chilensis* J. Remy, *Micropus globiferus* Bertero ex DC., *Psilocarphus berteri* I.M. Johnst., *Psilocarphus chilensis* (J. Remy) A. Gray, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg. var. *minimus* Cabrera, *Psilocarphus globiferus* (Bertero ex DC.) Speg., nom. illeg. , *Psilocarphus tenellus* Nutt. var. *tenuis* (Eastw.) Cronquist, *Psilocarphus tenuis* Eastw.
Referencias: Morefield, J. D., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rose, J. N. 19360* (US)].

Psilocarphus tenellus Nutt. var. *tenuis* (Eastw.) Cronquist = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Psilocarphus tenuis Eastw. = **Psilocarphus tenellus** Nutt. var. **globiferus** (Bertero ex DC.) Morefield
Referencias: Morefield, J. D., 1992.

Psilopogon albiflorus Phil. = **Picrosia longifolia** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Pterocaulon Elliott

Número de especies: 11, 2 endémicas

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.
Sin.: *Baccharis erioptera* Benth., *Chlaenobolus alopecuroides* (Lam.) Cass., *Conyza alopecuroides* Lam., *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *glabrescens* Chodat, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *monostachyum* DC., *Pterocaulon interruptum* DC. var. *polystachyum* DC., *Pterocaulon latifolium* Kuntze, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *alopecuroides* (Lam.) Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subcorymbosa* Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Cabrera, A. L., 1974a, 1978; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, LAV, MAL, MON, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23658* (LP)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16857* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 6272* (G, LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 13061* (LP)].

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. var. *glabrescens* Chodat = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. var. *mollis* Chodat = **Pterocaulon rugosum** (Vahl) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. var. *polystachyum* DC. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon angustifolium DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, FLO, LAV, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24316* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 5554* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4135* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 9650* (LP)].

Pterocaulon bakeri Malme = **Pterocaulon polypterum** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon balansae Chodat
Sin.: *Pterocaulon interruptum* auct. non DC., *Pterocaulon paniculatum* Arechav., *Pterocaulon polystachyum* DC. var. *tomentosa* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subpaniculata* Arechav.

Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1995, 1998; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 748* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4726* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 10250* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 638* (LP)].

Pterocaulon cordobense Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, SFE, SLU); BRA(RGS); PRY(COA, GUA, PHA); URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10220* (LP)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1833* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 11643* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 289* (LP)].

Pterocaulon hassleri Chodat = **Pterocaulon lanatum** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon interruptum auct. non DC. = **Pterocaulon balansae** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon interruptum DC. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon interruptum DC. var. *monostachyum* DC. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon interruptum DC. var. *polystachyum* DC. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon lanatum Kuntze
Sin.: *Pterocaulon hassleri* Chodat
Referencias: Freire, S. E., 1995, 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*sin colector s.n.* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 29418* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 8834* (G, LP)].

Pterocaulon latifolium Kuntze = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon lorentzii Malme
Sin.: *Pterocaulon malmeanum* Chodat, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *angustifolia* Arechav., *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *spicata* Arechav.
Referencias: Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, COA, GUA, PHA); URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3983* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 26344* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 3942* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2907* (LP)].

Pterocaulon malmeanum Chodat = **Pterocaulon lorentzii** Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Pterocaulon paniculatum Arechav. = **Pterocaulon balansae** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon pilcomayense Malme = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Pterocaulon polypterum (DC.) Cabrera
Sin.: *Baccharis polyptera* DC., *Pterocaulon bakeri* Malme, *Vernonia pterocaulon* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 6904* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 6582* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 2560–b* (LIL, NY)].

Pterocaulon polystachyum DC.
Referencias: Freire, S. E., 1995, 1998; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CLA, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 21804* (LP)]; BRA[*Palacios, M. A. 1503* (LIL, LP)]; PRY[*Schinini, A. 3905* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 3820* (LP)].

Pterocaulon polystachyum DC. var. *tomentosa* Arechav. = **Pterocaulon balansae** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon pompilianum Standl. & Williams = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon purpurascens Malme
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2475* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 4176* (LP)].

Pterocaulon rugosum (Vahl) Malme
Sin.: *Chlaenobolus rugosus* (Vahl) Cass., *Conyza rugosa* Vahl, *Pterocaulon alopecuroides* (Lam.) DC. var. *mollis* Chodat, *Pterocaulon spicatum* DC. var. *brachystachyum* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24885* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4907* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 3737* (LP)].

Pterocaulon spicatum DC. var. *brachystachyum* DC. = **Pterocaulon rugosum** (Vahl) Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon subspicatum Chodat = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Pterocaulon subvirgatum Malme = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Freire, S. E., 1998.

Pterocaulon virgatum (L.) DC.
Sin.: *Chlaenobolus virgatus* (L.) Cass., *Conyza virgata* (L.) L., *Gnaphalium virgatum* L., *Pterocaulon pilcomayense* Malme, *Pterocaulon pompilianum* Standl. & Williams, *Pterocaulon subspicatum* Chodat, *Pterocaulon subvirgatum* Malme, *Pterocaulon virgatum* (L.) DC. f. *subvirgata* (Malme) Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, MON, PAY, RNO, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21672* (LP)]; BRA[*Conrad, J. 2144* (LP)]; PRY[*Krapovickas, A. 14214* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 13605* (LP)].

Pterocaulon virgatum (L.) DC. f. *alopecuroides* (Lam.) Arechav. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon virgatum (L.) DC. f. *angustifolia* Arechav. = **Pterocaulon lorentzii** Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon virgatum (L.) DC. f. *spicata* Arechav. = **Pterocaulon lorentzii** Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon virgatum (L.) DC. f. *subcorymbosa* Arechav. = **Pterocaulon alopecuroides** (Lam.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon virgatum (L.) DC. f. *subpaniculata* Arechav. = **Pterocaulon balansae** Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Pterocaulon virgatum (L.) DC. f. *subvirgata* (Malme) Arechav. = **Pterocaulon virgatum** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Ptilurus daucifolius D. Don = **Leucheria daucifolia** (D. Don) Crisci
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Pyrethrum balsamita (L.) Willd. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Pyrethrum balsamita (L.) Willd. var. *tanacetoides* Boiss. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Pyrethrum balsamitoides (Nábelek) Tzvelev = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Pyrethrum frutescens (L.) Willd. = **Argyranthemum frutescens** (L.) Sch. Bip.

Pyrethrum inodorum (L.) Moench = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Pyrethrum myconis (L.) Moench = **Coleostephus myconis** (L.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Pyrethrum parthenium (L.) Sm. = **Tanacetum parthenium** (L.) Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Pyrethrum tanacetum DC. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Pyrethrum vulgare (L.) Boiss. = **Tanacetum vulgare** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Pyrrocoma angustifolia DC. = **Haplopappus angustifolius** (DC.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.

Pyrrocoma aurea Phil. = **Grindelia prunelloides** (Poepp. ex Less.) A. Bartoli & Tortosa var. **discoides** Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Bartoli, A. & Tortosa, R. D., 2003b.

Pyrrocoma bezanillana J. Remy = **Haplopappus bezanillanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma canescens Phil. = **Haplopappus canescens** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma cerberoana J. Remy = **Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma denticulata Phil. = **Haplopappus cerberoanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma foliosa Phil. = **Haplopappus multifolius** Phil. ex Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma ilicifolia J. Remy = **Haplopappus remyanus** Wedd.
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma linifolia Phil. = **Haplopappus linifolius** (Phil.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma longipes Phil. = **Haplopappus velutinus** J. Remy
Referencias: Reiche, C. F., 1902a.

Pyrrocoma macraeana J. Remy = **Haplopappus macraeanus** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma nuttalli J. Remy, nom. superfl. = **Haplopappus pinnatifidus** Nutt.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Pyrrocoma parvifolia DC. = **Haplopappus parvifolius** (DC.) Gay
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma pinea Phil. = **Haplopappus pinea** (Phil.) Reiche
Referencias: Teillier A., S., 1997.

Pyrrocoma pristiphylla J. Remy = **Haplopappus pristiphyllus** (J. Remy) H.M. Hall
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma reticulata Phil. = **Haplopappus diplopappus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma rigida Phil. = **Haplopappus angustifolius** (DC.) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928; Reiche, C. F., 1902a.

Pyrrocoma saxatilis J. Remy = **Haplopappus saxatilis** (J. Remy) Reiche
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Pyrrocoma setigera Phil. = **Haplopappus pinnatifidus** Nutt.
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Quechualia fulta (Griseb.) H. Rob. = **Vernonia fulta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Quechualia trixioides (Rusby) H. Rob. = **Vernonia fulta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1993.

Radlkoferotoma berroi (Hutch.) R.M. King & H. Rob. = **Carelia berroi** Hutch.

Radlkoferotoma cistifolium (Less.) Kuntze = **Carelia cistifolia** Less.

Radlkoferotoma ramboi (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Carelia ramboi** Cabrera

Rancagua bridgesii Poepp. & Endl. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Rancagua feuillei (Bertero ex Colla) Poepp. & Endl. = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Ornduff, R., 1966.

Ratibida Raf.

Número de especies: 1 introducida

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. f. **pulcherrima** (DC.) Fernald
Sin.: *Obeliscaria pulcherrima* DC., *Ratibida columnifera* (Nutt.) Wooton & Standl. var. *pulcherrima* (DC.) Woot. & Standl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1977, 2000b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 2938* (CORD)].

Ratibida columnifera (Nutt.) Wooton & Standl. var. *pulcherrima* (DC.) Woot. & Standl. = **Ratibida columnifera** (Nutt.) Wooton & Standl. f. **pulcherrima** (DC.) Fernald
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium polystachyum** DC. var. **polystachyum**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Raulinoreitzia leptophlebia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium leptophlebium** (B.L. Rob.) Steyerm.

Raulinoreitzia tremula (Hook. & Arn.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium tremulum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Rea beteriana Decne. = **Dendroseris berteroana** (Decne.) Hook. & Arn.

Rea lacerata Phil. = **Thamnoseris lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **lacerata**

Rea leucantha Bertero = **Dendroseris neriifolia** (Decne.) Hook. & Arn.
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Rea longifolia Phil. ex Reiche = **Dendroseris micrantha** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Rea macrantha Bertero ex Decne. = **Dendroseris macrantha** (Bertero ex Decne.) Skottsb.

Rea marginata Bertero ex Decne. = **Dendroseris marginata** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Rea micrantha Bertero ex Decne. = **Dendroseris micrantha** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Rea neriifolia Decne. = **Dendroseris neriifolia** (Decne.) Hook. & Arn.

Rea pinnata Bertero ex Decne. = **Dendroseris pinnata** (Bertero ex Decne.) Hook. & Arn.

Rea pinnata Bertero ex Decne. var. *insignis* Bertero = **Dendroseris berteroana** (Decne.) Hook. & Arn.
Referencias: Reiche, C. F., 1910b.

Rea pruinata (Johow) Skottsb. = **Dendroseris pruinata** (Johow) Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.

Rhysolepis atacamensis (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera atacamensis** Phil.

Rhysolepis fabrisii (A.A. Sáenz) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera fabrisii** A.A. Sáenz

Rhysolepis gilliesii (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera gilliesii** (Hook. & Arn.) Hieron.

Rhysolepis guaranitica (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera guaranitica** Chodat

Rhysolepis linearifolia (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera linearifolia** Chodat

Rhysolepis macrorhiza (Baker) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera macrorhiza** Baker

Rhysolepis mollis (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera mollis** Griseb.

Rhysolepis nudicaulis (Baker) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera nudicaulis** Baker

Rhysolepis rojasii (S.F. Blake) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera rojasii** S.F. Blake

Rhysolepis salicifolia (Hassl.) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera salicifolia** Hassl.

Rhysolepis santacatarinensis H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera santacatarinense** (H. Rob. & A.J. Moore) A.A. Sáenz

Rhysolepis tuberosa (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera tuberosa** Griseb.

Rhysolepis tucumanensis (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore = **Viguiera tucumanensis** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tucumanensis**

Richterago radiata (Vell.) Roque = **Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera

Robinsonia DC.

Número de especies: 7 endémicas

Robinsonia berteroi (DC.) R.W. Sanders, Stuessy & Martic.
Sin.: *Balbisia berteroi* DC.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kunkel, G. W. H. 131* (CONC)].

Robinsonia evenia Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 11308* (CONC)].

Robinsonia gayana Decne.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 15075* (CONC)].

Robinsonia gracilis Decne.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 11300* (CONC)].

Robinsonia macrocephala Decne.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Robinsonia masafuerae Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9185* (CONC)].

Robinsonia thurifera Decne.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5424* (CONC)].

Rothia degenerica Kuntze = **Schkuhria degenerica** (Kuntze) R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Heiser, C. B., 1945; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Rothia intermedia Kuntze = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Rothia pinnata (Lam.) Kuntze = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Rothia pinnata (Lam.) Kuntze var. *pallida* Kuntze = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Rothia pinnata (Lam.) Kuntze var. *purpurascens* Kuntze = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Rothia pusilla (Wedd.) Kuntze = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Rudbeckia bellidioides Sm. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Rudbeckia decumbens Sm. = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Salmea DC.

Número de especies: 1

Salmea eupatoria DC. var. *intermedia* DC. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea grandiceps Cass. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea nitida (La Llave & Lex.) Sch. Bip. ex Klatt = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea oppositiceps Cass. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea parviceps Cass. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea pubescens (S.F. Blake) Standl. & Steyerm. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea salicifolia Brongn. ex Neumann = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea scandens (L.) DC.
Sin.: *Bidens scandens* L., *Calea amellus* L., *Fornicaria scandens* (L.) Raf., *Salmea eupatoria* DC. var. *intermedia* DC., *Salmea grandiceps* Cass., *Salmea nitida* (La Llave & Lex.) Sch. Bip. ex Klatt, *Salmea oppositiceps* Cass., *Salmea parviceps* Cass., *Salmea pubescens* (S.F. Blake) Standl. & Steyerm., *Salmea salicifolia* Brongn. ex Neumann, *Salmea scandens* (L.) DC. subsp. *paraguariensis* Hassl., *Salmea scandens* (L.) DC. var. *amellus* (L.) Kuntze, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *genuina* S.F. Blake, nom. inval. , *Salmea scandens* (L.) DC. var. *obtusata* S.F. Blake, *Salmea scandens* (L.) DC. var. *pubescens* S.F. Blake, *Salmea sessilifolia* Griseb., *Salmea tomentosa* Nash, *Salmeopsis clausseni* Benth., *Santolina amellus* L., *Spilanthes nitida* La Llave & Lex., *Verbesina scandens* Klatt
Referencias: Bolick, M. R., 1991; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22223* (K, LP)]; PRY[*Woolston, A. L. 860* (LP, SI)].

Salmea scandens (L.) DC. var. *amellus* (L.) Kuntze = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea scandens (L.) DC. var. *genuina* S.F. Blake, nom. inval. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea scandens (L.) DC. var. *obtusata* S.F. Blake = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea scandens (L.) DC. var. *pubescens* S.F. Blake = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea scandens (L.) DC. subsp. *paraguariensis* Hassl. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea sessilifolia Griseb. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmea tomentosa Nash = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Salmeopsis clausseni Benth. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Santolina amellus L. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Santolina suaveolens Pursh, hom. illeg. = **Matricaria matricarioides** (Less.) Porter
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Santolina tinctoria Molina = **Helenium tinctorium** (Molina) J.F. Macbr.
Referencias: Bierner, M. W., 1978.

Sanvitalia Lam.

Número de especies: 1

Sanvitalia versicolor Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1964.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 781* (CORD)].

Schistocarpha Less.

Número de especies: 1

Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze
Sin.: *Neilreichia eupatorioides* Fenzl, *Schistocarpha hoffmanii* Kuntze, *Schistocarpha oppositifolia* (Kuntze) Rydb., *Zycona oppositifolia* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Robinson, H. E., 1979.
Hierba. Anual. Nativa. 600–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4522* (LP)].

Schistocarpha hoffmanii Kuntze = **Schistocarpha eupatorioides** (Fenzl) Kuntze
Referencias: Robinson, H. E., 1979.

Schistocarpha oppositifolia (Kuntze) Rydb. = **Schistocarpha eupatorioides** (Fenzl) Kuntze
Referencias: Robinson, H. E., 1979.

Schkuhria Roth

Número de especies: 3

Schkuhria abrotanoides Roth = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria abrotanoides Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria abrotanoides Roth var. *pomasquiensis* Hieron. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria advena Thell. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria bonariensis Hook. & Arn. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria coquimbana Phil. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria degenerica (Kuntze) R.E. Fr.
Sin.: *Rothia degenerica* Kuntze, *Schkuhria oolepis* Sch. Bip., nom. nud., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *major* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Heiser, C. B., 1945; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1864* (LP)].

Schkuhria isopappa Benth. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria multiflora Hook. & Arn.
Sin.: *Achyropappus neo-mexicanus* (A. Gray) Rydb., *Achyropappus schkuhrioides* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Amblyopappus neo-mexicanus* (A. Gray) A. Gray, *Bahia gilliesii* A. Gray, *Bahia neo-mexicana* (A. Gray) A. Gray, *Cephalobembix neo-mexicana* (A. Gray) Rydb., *Rothia intermedia* Kuntze, *Rothia pusilla* (Wedd.) Kuntze, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *aristata* (R.E. Fr.) Cabrera, *Schkuhria multiflora* Hook. & Arn. var. *pusilla* (Wedd.) Cabrera, *Schkuhria neo-mexicana* A.Gray, *Schkuhria pusilla* Wedd., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *aristata* R.E. Fr., *Schkuhria pusilla* Wedd. var. *longipedicellata* Hauman
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Heiser, C. B., 1945; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. 4899* (LP)]; CHL[*Martin, H. C. 582* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 4285* (LP)].

Schkuhria multiflora Hook. & Arn. var. *aristata* (R.E. Fr.) Cabrera = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria multiflora Hook. & Arn. var. *pusilla* (Wedd.) Cabrera = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria neo-mexicana A.Gray = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria octoaristata DC. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria oolepis Sch. Bip., nom. nud. = **Schkuhria degenerica** (Kuntze) R.E. Fr.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell.
Sin.: *Amblyopappus mendocinus* Phil., *Pectis pinnata* Lam., *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze var. *pallida* Kuntze, *Rothia pinnata* (Lam.) Kuntze var. *purpurascens* Kuntze, *Schkuhria abrotanoides* Roth, *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *isopappa* (Benth.) Hieron., *Schkuhria abrotanoides* Roth var. *pomasquiensis* Hieron., *Schkuhria advena* Thell., *Schkuhria bonariensis* Hook. & Arn., *Schkuhria coquimbana* Phil., *Schkuhria isopappa* Benth., *Schkuhria octoaristata* DC., *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera, *Schkuhria pinnata* (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. inval.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Conticello, L. & Bustamante, A., 1999[2000]; Heiser, C. B., 1945; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Turner, B. L., 1995.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(IV); PRY(AMA, CEN); URY(COL, LAV, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Job, M. M. 2644* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 352* (CONC)]; PRY[*Tell Bertoni, G. 1041* (LP)]; URY[*Marchesi, E. 2586* (LP)].

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *abrotanoides* (Roth) Cabrera = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *octoaristata* (DC.) Cabrera = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. var. *typica* Cabrera, nom. inval. = **Schkuhria pinnata** (Lam.) Kuntze ex Thell.
Referencias: Cabrera, A. L., 1932b.

Schkuhria pusilla Wedd. = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria pusilla Wedd. var. *aristata* R.E. Fr. = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schkuhria pusilla Wedd. var. *longipedicellata* Hauman = **Schkuhria multiflora** Hook. & Arn.
Referencias: Heiser, C. B., 1945; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Schkuhria pusilla Wedd. var. *major* Sch. Bip., nom. nud. = **Schkuhria degenerica** (Kuntze) R.E. Fr.
Referencias: Heiser, C. B., 1945.

Schlechtendalia Less.

Número de especies: 1

Schlechtendalia luzulaefolia Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Urtubey, E., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, RGS); URY(CAS, CLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 1364* (LP)]; BRA [*Pereira, E. 7765* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 32308* (LP)].

Scolymus L.

Número de especies: 1 introducida

Scolymus hispanicus L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, ERI, SFE); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24279* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 2845* (CONC), *Zoellner, O. 4509* (LP)].

Scorzonera L.

Número de especies: 1 introducida

Scorzonera laciniata L.
Sin.: *Podospermun laciniatum* (L.) DC.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Bartoli, A. & Roitman, G., 1990; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 26891* (LP)].

Senecio L.

Número de especies: 423, 362 endémicas, 5 introducidas

Senecio acanthifolius Hombr. & Jacq. subsp. **acanthifolius**
Sin.: *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord., *Senecio auriculatus* Albov, hom. illeg., *Senecio ombrophyllus* Skottsb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1200 m.

Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 534* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6107* (LP)].

Senecio acanthifolius Hombr. & Jacq. subsp. **virens** (Phil.) Cabrera & Zardini
Sin.: *Iocenes acanthifolius* (Hombr. & Jacq.) Nord. subsp. *virens* (Phil.) Nord., *Senecio virens* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6050* (LP)]; CHL[*Delfin, F. s.n.* (SGO)].

Senecio acaulis Phil. = **Senecio breviscapus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio achalensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 8558* (CORD)].

Senecio aclonetus Phil. = **Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio adamantinus Bong.
Sin.: *Senecio camporum* Gardner, *Senecio sessilis* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6122* (HBR, LP)].

Senecio adenophylloides Sch. Bip. ex Wedd. = **Senecio rufescens** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio adenophyllus Meyen & Walp.
Sin.: *Senecio adenophyllus* Meyen & Walp. var. *oblongifolius* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8363* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1151* (SI)].

Senecio adenophyllus Meyen & Walp. var. *oblongifolius* Wedd. = **Senecio adenophyllus** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio adenotrichius DC.
Sin.: *Adenotrichia amplexicaulis* Lindl., *Heterolepis conyzoides* Bertero ex DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 4386* (LP)].

Senecio adrianicus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2300 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 22029* (LP)].

Senecio ahrendsi Phil. = **Senecio glaber** Less. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio albicaulis Hook. & Arn. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio albicaulis Hook. & Arn. var. *gilliesii* Hook. & Arn. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.

Senecio albicaulis Hook. & Arn. var. *glabriusculus* Griseb. = **Senecio vira-vira** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio albicaulis Hook. & Arn. var. *lobulatus* Hook. & Arn. = **Senecio filaginoides** DC. var. **lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio albicaulis Hook. & Arn. var. *pinnatifidus* Hook. & Arn. = **Senecio leucostachys** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio albiflorus Phil., hom. illeg. = **Senecio filaginoides** DC. var. **lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio albiflorus Sch. Bip. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

[Senecio alboaffianus Macloskie]
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio albolanatus Phil. = **Senecio haenkei** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio albolanatus Phil., hom. illeg. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio alcicornis Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio chrysanthemoides* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 859* (K)].

Senecio alfalfalis Phil. = **Senecio microphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio algens Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1939a, 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 4200–5200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9200* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1074* (SI)].

Senecio alloeophyllus O. Hoffm. var. **alloephyllus**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1300–1800 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 550* (LP)]; CHL[*Donat, A. 9* (LP)].

Senecio alloeophyllus O. Hoffm. var. **glaberrimus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Witte, L. 48* (LP)].

Senecio almeidae Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5773* (GH)].

[Senecio alsophilus Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio altoandinus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 4500–4900 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19802* (LP)].

Senecio amabilis Vell. = **Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ambatensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goldbach 463* (LP)].

Senecio ameghinoi Speg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)].

Senecio ammophilus Phil. = **Senecio philippii** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio amphibolus Wedd. = **Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985.

Senecio amphibolus Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera = **Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985.

Senecio amplus J. Remy = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio anacephalus Griseb. = **Senecio candollii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio anconquijae Cabrera f. **anconquijae** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 3800–4200 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zardini, E. M. 342* (LP)].

Senecio anconquijae Cabrera f. **discoideus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 4258* (LP)].

Senecio andersonii Hook. f. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **andersonii** (Hook. f.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio andersonii Hook. f. var. *beta* Hook. f. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **patagonicus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.

Senecio andicola Phil., hom. illeg. = **Senecio oreinus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio andryaloides DC. = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio angustissimus Phil.
Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *angustissimus* (Phil.) Speg., *Senecio nahuelbutanus* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3156* (LP)]; CHL[*Barros, E. 262* (LP)].

Senecio antennaria Wedd. = **Chersodoma antennaria** (Wedd.) Cabrera

Senecio anthemidiphyllus J. Remy
Sin.: *Senecio brachylepis* Phil., *Senecio campanae* Phil., *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn., *Senecio psammoecus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2700 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 21957* (LP)]; CHL[*Gay, C. 658* (LP)].

Senecio antirhinifolius Phil. = **Senecio subumbellatus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio antofagastanus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1322* (LP)].

Senecio antucensis Phil. = **Senecio portalesianus** J. Remy var. **portalesianus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio antucensis Phil. var. *lanuginosa* Phil. = **Senecio portalesianus** J. Remy var. **lanuginosus** (Phil.) Cabrera

Senecio apensis Cabrera
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Soria, N. 5624* (CTES, FCQ, MO)].

Senecio apricus Phil. = **Senecio farinifer** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio aquaniger Cabrera & Zardini = **Senecio pogonias** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio aquaticus Hill subsp. **barbareifolius** (Wimm. & Grab.) Walters
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 72* (CONC)].

Senecio aquilaris Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 4900–5000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9251* (LP)].

Senecio arachnoideus Phil. = **Senecio donianus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio arachnoideus Phil. var. *viridis* Hauman = **Senecio donianus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

[Senecio araucanus Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio arechavaletae Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 900 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; URY[*Arechavaleta, J. 4011* (LP, MVM)].

Senecio arenicola Reiche = **Senecio cuneatus** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio arequipensis Cuatrec. = **Chersodoma arequipensis** (Cuatrec.) Cuatrec.
Referencias: Dillon, M. O. & Sagástegui A., A., 1997[1996].

Senecio argentatus S. Moore = **Senecio sericeo-nitens** Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio argenteus Kuntze ex DC. = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a.

Senecio argentinensis Speg. = **Senecio tweediei** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a.

Senecio argentinus Baker = **Senecio vira-vira** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio argillosus Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*Legrand, C. M. D. H. 1159* (LP)].

Senecio argophylloides Griseb. var. **argophylloides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2800–3600 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2964* (LP)].

Senecio argophylloides Griseb. var. **rupestris** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3200–4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)].

Senecio argophyllus Phil. = **Senecio chilensis** Less. var. **argophyllus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio argyreus Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1000–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 344* (LP)]; CHL[*Burkart, A. 9553* (LP)].

Senecio aristianus J. Remy
Sin.: *Senecio guayacanensis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 367* (LP)].

Senecio arleguianus J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1200 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 404* (P)].

Senecio armeriifolius Phil. = **Senecio scorzonerifolius** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio arnicoides Hook. & Arn.
Sin.: *Aster plantagineus* Poepp. ex DC., *Senecio plantagineus* Bertero
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3338* (LP)].

Senecio arnottii Hook. f.
Sin.: *Senecio arnottii* Hook. f. var. *major* Macloskie, *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn., *Senecio limbardioides* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF); CHL(X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2109* (BAB)]; CHL[*King s.n.* (K, LP)].

[Senecio arnottii Hook. f. var. dentatus Macloskie]
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio arnottii Hook. f. var. *major* Macloskie = **Senecio arnottii** Hook. f.

Senecio ascotanensis Phil. = **Senecio rosmarinus** Phil. var. **ascotanensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio aspericaulis J. Remy
Sin.: *Senecio hypsophylus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2400–2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerling, G. F. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 317* (LP)].

Senecio asplenifolius Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2719* (LP)].

Senecio atacamensis Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3100 m.
Países: ARG(CAT, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 4093* (LP)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP, SI)].

Senecio attenuatus Sch. Bip. ex Rusby var. *microphyllus* Britton = **Senecio potosianus** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1985.

Senecio auriculatus Albov, hom. illeg. = **Senecio acanthifolius** Hombr. & Jacq. subsp. **acanthifolius**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio auriculatus Poepp. ex DC. = **Senecio glabratus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio australandinus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 26479* (LP)].

Senecio austrorufescens Cuatrec. = **Senecio rufescens** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio baccharidifolius DC.
Sin.: *Cacalia baccharidifolia* Poepp. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 1200–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Asp, O. s.n.* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3598* (LP)].

Senecio baccharidifolius DC. var. *angustifolius* DC. = **Senecio lastarrianus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio baccharidifolius DC. var. *subradiatus* DC. = **Senecio triodon** Phil. var. **triodon**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a.

Senecio bahioides Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *glaber* Hook. & Arn., *Senecio bahioides* Hook. & Arn. var. *lanosus* Hook. & Arn., *Senecio irregularis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 922* (LP)].

Senecio bahioides Hook. & Arn. var. *glaber* Hook. & Arn. = **Senecio bahioides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio bahioides Hook. & Arn. var. *lanosus* Hook. & Arn. = **Senecio bahioides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio balansae Baker = **Senecio grisebachii** Baker var. **balansae** (Baker) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio balsamicus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2700 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*King, T. s.n.* (LP)].

Senecio bangii Rusby
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 3000–3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12086* (LP)].

Senecio barbarae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Marticorena, C., Matthei, O. R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Rodríguez Ríos, R., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300–5000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9096* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 97236* (CONC)].

Senecio barbatus D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Senecio pogonias** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio barrosianus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 478* (LP)].

Senecio beaufilsii Kuntze
Sin.: *Senecio beaufilsii* Kuntze var. *toninii* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.

Subarbusto. Endémica. 900–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2471* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 85062* (CONC)].

Senecio beaufilsii Kuntze var. *toninii* Kuntze = **Senecio beaufilsii** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1970a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio behnii Ricardi & Martic.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 3200–3300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, V. s.n.* (CONC)].

Senecio belenensis Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2576* (LP)].

Senecio belophyllus J. Remy = **Senecio farinifer** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio benaventianus J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 200–2000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (LP)].

Senecio benthamii Baker, hom. illeg. = **Pseudogynoxys benthamii** Cabrera
Referencias: Perret, P. & Martini, R., 2001; Robinson, H. E. & Cuatrecasas, J., 1977.

Senecio bergii Hieron.
Sin.: *Senecio quequensis* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Long, M. A., 2002.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)].

Senecio berterianus Colla = **Senecio glabratus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio berterianus DC., hom. illeg. = **Senecio coquimbensis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio berterianus DC. var. *obtusus* DC. = **Senecio cerberoanus** J. Remy var. **cerberoanus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

[Senecio bettfreundii Speg.]
Referencias: Hosseus, C. C., 1915.
Notas: Nombre dudoso.

[Senecio bipinnatifidus Hook. & Arn.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio bipontinii Wedd.
Sin.: *Senecio carnifolius* Cabrera, *Senecio julietii* Phil., *Senecio polyphyllus* Sch. Bip., *Senecio polyphyllus* Sch. Bip. ex Wedd., hom. illeg. , *Senecio sarcophyllus* Phil., hom. illeg., *Senecio schultzii* Wedd., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6170* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3736* (LP)].

Senecio boelckei Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1600–2200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jones, D. F. 98* (LP)].

Senecio bomanii R.E. Fr.
Sin.: *Dendrophorbium bomanii* (R.E. Fr.) C. Jeffrey
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4448* (LP)].

Senecio bonariensis Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn.. *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio rhodaster* Baker, *Senecio sagittarioides* Speg., *Senecio sagittifolius* Baker, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Tombesi, T. S., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6243* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 312* (S)]; URY[*Cabrera, A. L. 3880* (LP)].

Senecio borchersii Phil. = **Senecio bustillosianus** J. Remy var. **borchersii** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio botijae Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 96/992* (CONC, MSB, SGO)].

Senecio bowenkampi Phil. = **Senecio microphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio brachycodon Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3289* (LP)].

Senecio brachylepis Phil. = **Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio brachylobus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volkmann, H. 21* (SGO)].

Senecio bracteolatus Phil. = **Senecio proteus** J. Remy var. **proteus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio bracteolatus Hook. & Arn. var. **bracteolatus**
Sin.: *Senecio coxi* Phil., *Senecio diabolicus* Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4991* (LP)]; CHL[*Cox, G. 1862* (SI)].

Senecio bracteolatus Hook. & Arn. var. **valderramae** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio inutilis* Speg., *Senecio valderramae* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1000–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA, LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 737* (LP)].

Senecio bracteosus J. Remy = **Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **bracteosus** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **brasiliensis**
Sin.: *Cineraria brasiliensis* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, ITA, MIE); URY(ART, LAV, MAL, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25982* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 29595* (LP)]; PRY[*Schmeda, N. 653* (G, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 10400* (LP)].

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **incanus** Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 229* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 7115* (LP)].

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker
Sin.: *Senecio amabilis* Vell., *Senecio cannabinifolius* Hook. & Arn., *Senecio megapotamicus* H. Buek, *Senecio tripartitus* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a, 1974a, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, ITA, MIE); URY(CAS, COL, MAL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26093* (SI)]; BRA[*Stahl, W. s.n.* (GH)]; PRY[*Krapovickas, A. 46145* (CTES)]; URY[*Lombardo, A. 2046* (LP)].

Senecio bravensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9939* (LP)].

Senecio breanus Phil. = **Senecio cachinalensis** Phil. var. **cachinalensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio breviculus Phil. = **Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio breviscapus DC.
Sin.: *Senecio acaulis* Phil., *Senecio chamaecephalus* Wedd., *Senecio wernerioides* Wedd., *Werneria cortusifolia* Griseb., *Werneria wernerioides* (Wedd.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12085* (LP)]; CHL[*Buchtien, O. 1207* (SI)].

Senecio bridgesii Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3492* (LP)].

Senecio brunonianus Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio serenensis* J. Remy

Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 100 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2652* (LP)].

Senecio buglossus Phil.
Sin.: *Senecio limonius* Phil., *Senecio valdivianus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Buchtien, O. 1029* (LP)].

Senecio burchellii auct. non (DC.) Cabrera = **Senecio madagascariensis** Poir.
Referencias: Cabrera, A. L. & Re, R., 1965; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a, 1976a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio burkartii Cabrera
Sin.: *Senecio hygrophilus* Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800–4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 4243* (LP)].

Senecio bustillosianus J. Remy var. **borchersii** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio borchersii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1800–2200 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Borchers, A. 1884* (LP)].

Senecio bustillosianus J. Remy var. **bustillosianus**
Sin.: *Senecio schulzeanus* Meigen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2600–2700 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 1119* (LP)].

Senecio cacalioides Fisch. ex Spreng. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978.

Senecio cachinalensis Phil. var. **cachinalensis**
Sin.: *Senecio breanus* Phil., *Senecio larrañagae* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 200–400 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 820* (GH, LP, SI)].

Senecio cachinalensis Phil. var. **copiapinus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio copiapinus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1401* (LP)].

Senecio caespitosus Phil. = **Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cajonensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4600 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 3334* (LIL)].

Senecio calceiflorus Cabrera = **Senecio filaginoides** DC. var. **lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio calchaquinus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. s.n.* (LP)].

Senecio calingastensis Tombesi
Referencias: Tombesi, T. S., 2001.
Subarbusto. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4657* (SI)].

Senecio calocephalus Poepp.
Sin.: *Senecio columbaria* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 13948* (LP)].

Senecio campanae Phil. = **Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio camporum Gardner = **Senecio adamantinus** Bong.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975.

Senecio canchahuinganquensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1000–1200 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 340* (LP)].

Senecio candidans DC.
Sin.: *Brachypappus candicans* (Vahl) Sch. Bip., *Cacalia candicans* Vahl, *Culcitium gayanum* J. Remy, *Senecio culciremy* Cuatrec.

Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(VIII, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4947* (LP)]; CHL[*Barros, E. 252* (LP)].

Senecio candolleanus Hook. & Arn., hom. illeg. = **Senecio leucopeplus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio candollii Wedd.
Sin.: *Culcitium glaciale* Meyen & Walp., *Culcitium humile* DC., *Senecio anacephalus* Griseb., *Senecio glacialis* (Meyen & Walp.) Cuatrec., *Senecio mandonianus* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13972* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 3686* (LP)].

Senecio cannabinifolius Hook. & Arn. = **Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio caparoënsis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–1600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2700* (LP)].

Senecio capillarifolius Speg. = **Senecio chrysocomoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio carbonensis C. Ezcurra, Ferreyra & Clayton
Referencias: Ezcurra, C., Ferreyra, M. & Clayton, S., 1995.
Subarbusto. Endémica. 1500–1800 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferreyra, M. 352* (SI)].

Senecio carduifolius (Cass.) Desf. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio caricifolius Hook. & Arn. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio carnifolius Cabrera = **Senecio bipontinii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio carnosus Phil., hom. illeg. = **Senecio nublensis** Soldano
Referencias: Soldano, A., 1998.

Senecio catamarcensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4248* (LP)].

Senecio catharinensis Dusén ex Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (LP)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11901* (US)].

Senecio ceratophylloides Griseb.
Sin.: *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *macrodon* (Baker) Malme, *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *major* D. Don ex Hook. & Arn., *Senecio ceratophyllus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Senecio chilensis* Less. var. *ceratophyllus* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker, *Senecio chilensis* Less. var. *macrodon* Baker, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophylloides* (Griseb.) Kuntze, *Senecio cuspidatus* DC. var. *ceratophyllus* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Senecio cuspidatus* DC. var. *macrodon* (Baker) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SLU); BRA(RGS); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6563* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 48744* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 39* (LP)].

Senecio ceratophyllus D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ceratophyllus D. Don ex Hook. & Arn. var. *macrodon* (Baker) Malme = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ceratophyllus D. Don ex Hook. & Arn. var. *major* D. Don ex Hook. & Arn. = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

[Senecio ceratophyllus D. Don ex Hook. & Arn. var. nana Hook. & Arn.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio cerberoanus J. Remy var. **cerberoanus**
Sin.: *Senecio berterianus* DC. var. *obtusus* DC., *Senecio phaedrus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2258* (LP)].

Senecio cerberoanus J. Remy var. **lanatus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, I. 729* (GB)].

Senecio cernuiflorus Cabrera = **Senecio serratifolius** (Meyen & Walp.) Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cernuus Phil. = **Senecio serratifolius** (Meyen & Walp.) Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cervicornis Phil. = **Senecio illinitus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio chamaecephalus Wedd. = **Senecio breviscapus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chamaedryfolius Less. = **Senecio nigrescens** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio chamomillifolius Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 602* (CONC)].

Senecio chañaralensis Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Vidal Gormaz, F. s.n.* (SGO)].

Senecio charaguensis Cuatrec. = **Senecio hieronymi** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chersodomus Reiche = **Chersodoma candida** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Senecio chilensis Baker, hom. illeg. = **Senecio montevidensis** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chilensis Less. f. **discoideus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 274* (LP)]; CHL[*Villagrán, C. 8248* (CONC)].

Senecio chilensis Less. var. **argophyllus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio argophyllus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 259* (LP)]; CHL[*Barros, E. 230* (LP)].

Senecio chilensis Less. var. *ceratophyllus* (D. Don ex Hook. & Arn.) Baker = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chilensis Less. var. **chilensis**
Sin.: *Cineraria tillandsiaefolia* Poepp. ex DC., *Senecio argenteus* Kuntze ex DC., *Senecio gummifer* Hook. & Arn., *Senecio linariifolius* Colla, *Senecio linearifolius* Colla, *Senecio phagnaloides* DC., *Senecio tillandsiaefolius* Poepp. ex DC.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 100–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2037* (LP)]; CHL[*Looser, G. 1314* (LP)].

Senecio chilensis Less. var. *macrodon* Baker = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chillanensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 700–1800 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3193* (LP)].

Senecio chiloensis Phil. = **Senecio otites** Kunze ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chionophilus Phil.
Sin.: *Senecio hollermayeri* Cabrera, *Senecio vulcanicus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., com. pers.; Philippi, R. A., 1862a.
Subarbusto. Endémica. 500–2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5925* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 5589* (CONC)].

Senecio chionotus Phil. = **Senecio haenkei** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio choiquelahuensis Speg. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **patagonicus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio chrysanthemoides Phil. = **Senecio alcicornis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio chrysanthemum Dusén
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 300–1500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tessleff. 6078* (LP)].

Senecio chrysocomoides Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio capillarifolius* Speg., *Senecio chubutensis* Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)]; CHL[*Pirion, A. 3498* (GH)].

Senecio chrysolepis Phil.
Sin.: *Senecio juncalensis* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 3200–4500 m.
Países: ARG(SAL, SJU); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerling, G. F. s.n.* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1040* (CONC, LP)].

Senecio chubutensis Speg. = **Senecio chrysocomoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

[Senecio cinereus Colla]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio cisplatinus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(RIV, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22822* (LP)]; BRA[*Malme, G. O. A. 68* (S)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (LP)].

Senecio clarioneifolius J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2300–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 16852* (LP)]; CHL[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio clavatus Hauman = **Senecio hickenii** Hauman
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio clavifolius Rusby = **Senecio potosianus** Klatt
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

[Senecio cleistolepis Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio clivicola Wedd. var. **clivicola**
Sin.: *Senecio fiebrigianus* Cabrera, *Senecio pampae* Lingelsh. var. *penicillatus* Lingelsh.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werner, T. B. 875* (LP)].

Senecio clivicola Wedd. var. **pampae** (Lingelsh.) Cabrera
Sin.: *Senecio pampae* Lingelsh., *Senecio pampae* Lingelsh. var. *pampae*
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6385* (LP)].

Senecio coluhuapiensis Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)].

Senecio columbaria J. Remy = **Senecio calocephalus** Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio comberi Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, T. 788* (K)].

Senecio confertissimus Cabrera = **Senecio depressus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio consanguineus Phil. = **Senecio tristis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio conyzaefolius Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 52184* (LP, PACA)].

Senecio copiapinus Phil. = **Senecio cachinalensis** Phil. var. **copiapinus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio coquimbensis Phil.
Sin.: *Senecio berterianus* DC., hom. illeg., *Senecio glanduloso-hirtellus* Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 100–700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2840* (LP)].

Senecio corcovadensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)].

Senecio cordillerae Phil. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio coronopodiphyllus J. Remy
Sin.: *Metazanthus cacalioides* Meyen
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 2153* (LP)]; CHL[*Germain, P. s.n.* (LP)].

Senecio coscayanus Ricardi & Martic.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 3200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 392* (CONC)].

Senecio cotuloides Reiche = **Senecio zosterifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio covasii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1800–2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14136* (BAA)]; CHL[*Gay, C. 634* (SI)].

Senecio covuncensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, P. 720* (LP)].

Senecio coxi Phil. = **Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **bracteolatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. f. *maritimus* Malme = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **maritimus** (Malme) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. *andryaloides* (DC.) Arechav. = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Sin.: *Cineraria crassiflora* Poir., *Cineraria vestita* Spreng., *Senecio andryaloides* DC., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *andryaloides* (DC.) Arechav., *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. var. *tricuspis* Baker, *Senecio culcitium* J. Remy
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27401* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8404* (S, US)]; URY[*Gallinal, J. P. 1204* (LP)].

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. **maritimus** (Malme) Cabrera
Sin.: *Senecio crassiflorus* (Poir.) DC. f. *maritimus* Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5806* (LP)]; URY[*Ardao 1178* (LP)].

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. **subceratophyllus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CAS, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 48947* (LP)]; URY[*Lombardo, A. 2038* (LP)].

Senecio crassiflorus (Poir.) DC. var. *tricuspis* Baker = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio cremeiflorus Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14316* (LP)].

Senecio cremnicola Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 7906* (LP)].

Senecio cremnophilus I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3200–3400 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 4872* (LP)].

Senecio cremophilus Phil., hom. illeg. = **Senecio xerophilus** Phil. var. **deserticola** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio crepidifolius DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 2500–3600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25101* (LP)].

Senecio crepidioides Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 400–600 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 395* (LP)].

Senecio crispus Phil., hom. illeg. = **Senecio hirtus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio crispus Phil. var. *santelisis* (Phil.) Reiche = **Senecio santelicis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio crithmoides Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio diazii* Phil., *Senecio iberidifolius* Phil., *Senecio remyanus* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a.
Subarbusto. Endémica. 1800–4500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11205* (LP)]; CHL[*Looser, G. 1121* (LP)].

Senecio cryptocephalus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)].

Senecio ctenophyllus Phil.
Sin.: *Senecio vittatus* Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1000–3000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 746* (LP)].

Senecio culciremy Cuatrec. = **Senecio candidans** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio culcitenellus Cuatrec.
Sin.: *Culcitium sessile* Speg., *Culcitium tenellum* Dusén, *Senecio neosessilis* Cuatrec., *Senecio santacrucensis* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dimitri, M. J. 8149* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 1086* (CONC)].

Senecio culcitium J. Remy = **Senecio crassiflorus** (Poir.) DC. var. **crassiflorus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio cumingii Hook. & Arn. var. **bracteosus** (J. Remy) Cabrera
Sin.: *Senecio bracteosus* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.

Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16625* (GH)].

Senecio cumingii Hook. & Arn. var. **cumingii**
Sin.: *Senecio paralias* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 973* (LP)].

Senecio cuneatus Hook. f.
Sin.: *Senecio arenicola* Reiche, *Senecio dusenii* O. Hoffm. ex Macloskie
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 600 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*James, P. 2271* (LP, SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6276* (SI)].

Senecio cuspidatus DC. = **Senecio montevidensis** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cuspidatus DC. var. *ceratophylloides* (Griseb.) Kuntze = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cuspidatus DC. var. *ceratophyllus* (Hook. & Arn.) Kuntze = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cuspidatus DC. var. *macrodon* (Baker) Kuntze = **Senecio ceratophylloides** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cuspidatus DC. var. *montevidensis* (Spreng.) Kuntze = **Senecio montevidensis** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio cylindrocephalus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5651* (LP)].

Senecio cymosus J. Remy
Sin.: *Acrisione cymosa* (J. Remy) B. Nord.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C., com. pers.; Nordenstam, B., 1985.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(V, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hollermayer, A. 31* (LP)].

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. var. *alyssoides* Sch. Bip. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. var. *beta* J. Remy = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacq.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. var. *intermedius* Sch. Bip. = **Senecio laseguei** Hombr. & Jacquinot
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. var. *lobatifolia* Hombr. & Jacq. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacq.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. var. *pinnatifidus* Macloskie = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacq.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio danyausii Hombr. & Jacq. var. *trifurcatus* Sch. Bip. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacq.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio darwinii Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 15177* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6156* (LP)].

Senecio darwinii Hook. & Arn. f. *falklandicus* (Hook. f.) Skottsb. = **Senecio littoralis** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio darwinii Hook. & Arn. var. *eradiatus* A. Gray = **Senecio humifusus** (Hook. f.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio darwinii Hook. & Arn. var. *laxus* Hook. & Arn. = **Senecio darwinii** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio dasyphyllus (Gand.) Cuatrec. = **Senecio vaginifolius** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio davilae Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 600–3000 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 563* (LP)].

Senecio dealbatus Phil. = **Senecio poeppigii** Hook. & Arn. var. **poeppigii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio debilis Phil., hom. illeg. = **Senecio invalidus** C. Jeffrey
Referencias: Jeffrey, C., 1992.

Senecio deferens Griseb.
Sin.: *Senecio stenopterus* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Anual. Endémica. 400–3000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22185* (LP)]; PRY[*Mereles, F. 6470* (CTES)].

Senecio delfinii Phil. = **Senecio molinae** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio delicatulus Cabrera & Zardini
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)].

Senecio demissus Phil. = **Senecio trifidus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio denticulatus (Hook. & Arn.) DC., hom. illeg. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **yegua**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio denticulatus (Hook. & Arn.) DC. var. *araeus* Phil. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **depilis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio denticulatus (Hook. & Arn.) DC. var. *depilis* Phil. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **depilis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio denticulatus (Hook. & Arn.) DC. var. *pilotus* Phil. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **pilotus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio depressus Hauman, hom. illeg. = **Senecio lorentziella** Hicken
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio depressus Hook. & Arn.
Sin.: *Culcitium depressum* Don ex Hook. & Arn., *Senecio confertissimus* Cabrera, *Senecio poeppigii* Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3000–3400 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11295* (LP)]; CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (SI)].

Senecio deserticola Cabrera = **Senecio xerophilus** Phil. var. **deserticola** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio desiderabilis Vell.
Sin.: *Senecio ellipticus* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975; Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto o liana. Nativa. 300–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 659* (LP)].

Senecio desideratus DC.
Sin.: *Senecio hauthalii* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3470* (LP)].

Senecio diabolicus Speg. = **Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **bracteolatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio diaguita Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2000–3200 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 3210* (LP)].

Senecio diazii Phil. = **Senecio crithmoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio dichotomus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–2900 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 114* (LP)].

Senecio diclinus Wedd. = **Chersodoma antennaria** (Wedd.) Cabrera

Senecio diclinus Wedd. var. *glabriusculus* Cabrera = **Chersodoma glabriuscula** (Cabrera) M.O. Dillon & Sagást.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Senecio diemii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Neumeyer, J. J. 473* (LP)].

Senecio digitatus Phil.
Sin.: *Werneria pygmophila* S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22559* (LP)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP)].

Senecio disparifolius Cabrera = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio divaricoides Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1600 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dimitri, M. J. s.n.* (LP)].

Senecio diversifolius Phil., hom. illeg. = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio doeringii Hieron. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio dombeyanus DC. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio domeykoanus Phil. = **Senecio pachyphyllos** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio doñae-annae Phil. = **Senecio volckmannii** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio donianus Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio arachnoideus* Phil., *Senecio arachnoideus* Phil. var. *viridis* Hauman, *Senecio lanuginosus* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 700–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 12762* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3154* (LP)].

Senecio doroniciflorus Hook. & Arn. = **Senecio selloi** (Spreng.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio dryophyllus Meyen & Walp.
Sin.: *Senecio amphibolus* Wedd., *Senecio amphibolus* Wedd. var. *socialis* (Wedd.) Cabrera, *Senecio socialis* Wedd., *Senecio subvulgaris* Kuntze, *Senecio tarapacanus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8739* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1145* (GH, LIL, LP, SI, US)].

Senecio dumosus Phil. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **dumosus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio dusenii O. Hoffm. ex Macloskie = **Senecio cuneatus** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio eightsii Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)].

Senecio ellipticus DC. = **Senecio desiderabilis** Vell.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio elquiensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 99* (SI)].

Senecio encelia J. Remy = **Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio epiphyticus Kuntze
Sin.: *Pentacalia epiphytica* (Kuntze) Cuatrec., *Senecio steinbachianus* Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22377* (LP)].

Senecio ericoides Reiche = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio eriophyton J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3500–4800 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 2384* (LP)]; CHL[*Gay, C. 780* (LP)].

Senecio erraticus Bertol.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 6369* (LP)].

Senecio eruciformis J. Remy var. **brachycephalus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio rutaceus* Phil. var. *brachycephalus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Looser, G. 4616* (LP)].

Senecio eruciformis J. Remy var. **eruciformis**
Sin.: *Senecio rutaceus* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2200–2600 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 1230* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3151* (LP)].

Senecio espinosae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3816* (LP)].

Senecio evacoides Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 4000–4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8659* (LP)].

Senecio exilis Hombr. & Jacq. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio expansus Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 3900–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4041* (LP)].

Senecio fabrisii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–2400 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1107* (LP)].

Senecio falklandicus Hook. f. = **Senecio littoralis** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio famatinensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 684* (CORD)].

Senecio farinifer Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio apricus* Phil., *Senecio belophyllus* J. Remy, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 700–1600 m.
Países: CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 264* (LP)].

[Senecio fasciculatus Hook. & Arn.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio fernandezi Phil. = **Senecio molinae** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ferruglii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferruglio, E. s.n.* (LP)].

Senecio feuillei Phil. = **Senecio gilliesianus** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio fiebrigianus Cabrera = **Senecio clivicola** Wedd. var. **clivicola**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio filaginoides DC. var. **filaginoides**
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn., *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *gilliesii* Hook. & Arn., *Senecio albolanatus* Phil., hom. illeg., *Senecio caricifolius* Hook. & Arn., *Senecio doeringii* Hieron., *Senecio leuciscus* Phil., *Senecio leyboldtii* Phil., *Senecio meyenii* Phil., *Senecio quenselii* Skottsb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Senecio sericeus* Kuntze, p.p.
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1963a, 1971a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 400–2700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF, TUC); CHL(VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4595* (CORD)]; CHL[*Nee s.n.* (LP)].

Senecio filaginoides DC. var. **lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *lobulatus* Hook. & Arn., *Senecio albiflorus* Phil., hom. illeg., *Senecio calceiflorus* Cabrera, *Senecio psammophilus* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *candolleanus* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1971a, 1978; Marticorena, C., Matthei, O. R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Rodríguez Ríos, R., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.
Arbusto. Endémica. 1600–4300 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 33* (LP)]; CHL[*Baumann 350* (CONC)].

Senecio fischeri Sch. Bip. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio fistulosus Poepp. ex DC., hom. illeg. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **ochroleucus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Sin.: *Senecio amplus* J. Remy, *Senecio cordillerae* Phil., *Senecio dombeyanus* DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC., *Senecio hualtata* Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche, *Senecio quillotensis* Phil., *Senecio variabilis* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2400 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22828* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 3101* (LP)].

Senecio fistulosus Poepp. ex Less. var. **ochroleucus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Senecio fistulosus* Poepp. ex DC., hom. illeg. , *Senecio ochroleucus* Hook. & Arn., *Senecio xanthocephalus* Dusén
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU); CHL(IV, V, VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6123* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3988* (LP)].

Senecio flagellifolius Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700–2700 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. s.n.* (LIL)].

Senecio flagellisectus Griseb. = **Senecio rudbeckiaefolius** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio floccidus Hombr. & Jacq. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio foliolosus Reiche = **Senecio proteus** J. Remy var. **proteus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio forsteri Phil. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **andersonii** (Hook. f.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio fragrantissimus Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2005.
Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 1337* (LP)].

Senecio francisci Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1300–3500 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Segethi, C. s.n.* (SGO)].

Senecio friesii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22035* (LP)].

Senecio fueginus Phil. = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ganganensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 25761* (LP)].

Senecio garaventai Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1600–1900 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 1873* (LP)].

Senecio gayanus DC.
Sin.: *Senecio soloanus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 700–1000 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 622* (LP)].

Senecio geissei Phil. = **Senecio proteus** J. Remy var. **geissei** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio germainii Phil. = **Senecio haloragis** J. Remy var. **haloragis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio gilliesianus Hieron.
Sin.: *Senecio feuillei* Phil., *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *glaberrima* Hieron., *Senecio gilliesii* Phil., hom. illeg., *Senecio pinnatus* Poir. var. *pectinatus* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 800–3800 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 473* (LIL)].

Senecio gilliesianus Hieron. var. *arachnoidea* Hieron. = **Senecio goldsackii** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a.

Senecio gilliesianus Hieron. var. *glaberrima* Hieron. = **Senecio gilliesianus** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio gilliesii Phil., hom. illeg. = **Senecio gilliesianus** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio gilliesii Hook. & Arn. var. **dasycarpus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 26153* (LP)].

Senecio gilliesii Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Sin.: *Cacalia candicans* Poepp. ex DC., *Cacalia nivea* Kuntze ex DC., *Culcitium dentatum* Don ex Hook. & Arn., *Culcitium gilliesii* (Hook. & Arn.) Speg., *Culcitium poeppigii* DC., *Senecio passus-crucis* Kuntze, *Senecio poeppigii* (DC.) Wedd., hom. illeg.
Referencias: Baeza, C. M., López, P. & Kottirsch, G., 2001; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 420* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio gilvus Phil. = **Senecio gnidioides** Phil. var. **gilvus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio glaber Less. var. **glaber**
Sin.: *Senecio tocornali* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19685* (LP)]; CHL[*Montero, G. 2938* (LP)].

Senecio glaber Less. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio ahrendsi* Phil., *Senecio möelleri* Phil., *Senecio pratensis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1100–1400 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2498* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio glabratus Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio auriculatus* Poepp. ex DC., *Senecio berterianus* Colla, *Senecio macrotus* Kuntze ex Meyen, *Senecio valparadisiacus* Colla
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 4385* (LP)].

Senecio glacialis (Meyen & Walp.) Cuatrec. = **Senecio candollii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio glandulifer Dematteis & Cristóbal
Referencias: Dematteis, M. & Cristóbal, C. L., 2006.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 16003* (BAB, C, CTES, ENCB, F, G, MEXU, MO, UC, WIS, Z)].

Senecio glanduloso-hirtellus Reiche = **Senecio coquimbensis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio glandulosus Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2200–2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 928* (LP)].

Senecio gnidioides Phil. var. **gilvus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio gilvus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6257* (LP)]; CHL[*Philippi, O. s.n.* (LP)].

Senecio gnidioides Phil. var. **gnidioides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11540* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1331* (LP)].

Senecio goldsackii Phil.
Sin.: *Senecio gilliesianus* Hieron. var. *arachnoidea* Hieron., *Senecio stipellatus* O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 200–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2727* (LP)].

Senecio goyazensis Gardner = **Erechtites goyazensis** (Gardner) Cabrera

Senecio graminifolius Phil. = **Senecio zosterifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio grandis Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 12197* (BAF, SI, US)].

Senecio grandjotii Cabrera
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1963; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3200–3800 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 23511* (LP)]; CHL[*Grandjot, G. F. 2714* (LP)].

Senecio graveolens Wedd. = **Senecio nutans** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio graveolens Wedd. var. *psiloachaenius* Cabrera = **Senecio nutans** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio grindeliaefolius DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2800–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 21584* (LP)]; CHL[*Nee s.n.* (GH)].

Senecio grisebachii Baker var. **anomalus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); PRY(CAA, CEN, PAI); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. s.n.* (LP)]; BRA[*Bornmüller, A. 605* (GH)]; PRY[*Pavetti Morin 9733a* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 5451* (LP)].

Senecio grisebachii Baker var. **balansae** (Baker) Cabrera
Sin.: *Senecio balansae* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS); PRY(CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas, T. 8891* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 4450* (G, SI)].

Senecio grisebachii Baker var. **grisebachii**
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a, 1967a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4877* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 79213* (MBM)]; PRY[*Krapovickas, A. 12565* (CTES, LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 2185* (LP)].

Senecio grisebachii Baker var. **leptotus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR); PRY(CAN, COA, SPE); URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Friedman, M. 461* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 11771* (MBM)]; PRY[*Quarín, C. L. 1518* (CTES, SI)]; URY[*Chebataroff, J. 4137* (LP)].

Senecio grisebachii Baker var. **pseudovernonioides** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7238* (S)].

Senecio grisebachii Baker var. **schyzotus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, SFE); URY(PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3256* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 10980* (LP)].

Senecio grisebachii Baker var. **subincanus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6819* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 9608* (LP)].

Senecio grossidens Dusén ex Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 56789* (LP, US)]; PRY[*Mereles, F. 3947* (G)].

Senecio grüneri Cabrera = **Senecio trichocodon** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio guayacanensis Phil. = **Senecio aristianus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio gummifer Hook. & Arn. = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio gunckelii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1500 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3827* (LP)].

Senecio gymnocaulos Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2138* (LP)].

Senecio gypsophilus Phil. = **Senecio microphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio haenkeanus Cuatrec.
Sin.: *Culcitium haenkei* Wedd., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K. & Marticorena, C., 1985; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 4500–5000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 84902* (CONC)].

Senecio haenkei DC.
Sin.: *Senecio albolanatus* Phil., *Senecio chionotus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 800–3500 m.
Países: ARG(SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 18928* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 999* (LP)].

Senecio hakeifolius Hook. & Arn. = **Senecio viscosissimus** Colla
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio hakeifolius Hook. & Arn. var. *adenophyllus* Hook. & Arn. = **Senecio microphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio hakeifolius Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Sin.: *Senecio hakeifolius* Bertero ex DC. var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche, *Senecio leptophyllus* Hook. & Arn., *Senecio linearilobus* Bong. var. *beta* Hook. & Arn., *Senecio ochroleucus* Phil., *Senecio platycodon* Baker, p.p., *Senecio valparadisiensis* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 100–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 450* (LP)].

Senecio hakeifolius Bertero ex DC. var. *ochroleucus* (Phil.) Reiche = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio hakeifolius Bertero ex DC. var. **vidalii** (Phil.) Reiche
Sin.: *Senecio vidalii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 222* (LP)].

Senecio hakeifolius Hook. & Arn. var. *viscidus* Hook. & Arn. = **Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio haloragis J. Remy var. **glandulosus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 341* (LP)].

Senecio haloragis J. Remy var. **haloragis**
Sin.: *Senecio germainii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (LP)].

Senecio hastatus Bong. = **Senecio oleosus** Vell.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.

Senecio hatcherianus O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1800–2100 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1992* (LP)].

Senecio hauthalii Kuntze = **Senecio desideratus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio helgae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., Matthei, O. R., Arroyo, M. T. K., Muñoz-Schick, M., Rodríguez Ríos, R., Squeo, F. A. & Arancio, G., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4600 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 937* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 97303* (CONC)].

Senecio helianthoides Phil. = **Senecio prenanthifolius** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio heliophytoides Phil. = **Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **heliophytoides** (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio hemmendorffii Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kuhlmann, J. G. s.n.* (LP, SP)].

Senecio heterophyllus DC. = **Senecio pilquensis** H. Buek
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio heteroschizus Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 8949* (LP)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (LP)].

Senecio heterotrichus DC.
Sin.: *Senecio maldonadensis* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, COL, MAL, MON, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22771* (LP)]; BRA[*Sello 3997* (B)]; URY[*Osten, C. 22063* (LP)].

Senecio hickenii Hauman
Sin.: *Senecio clavatus* Hauman
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10057* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3159* (LP)].

Senecio hieraciifolius L. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio hieraciifolius L. var. *giganteus* Raf. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio hieracium J. Remy
Sin.: *Senecio pearcei* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6173* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1311* (LP)].

Senecio hieronymi Griseb.
Sin.: *Senecio charaguensis* Cuatrec., *Senecio tafiensis* Cabrera
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 200–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); PRY(APA, CAN, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15436* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 6401* (FCQ, MO)].

Senecio hilairianus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 1392* (P)].

Senecio hirsutulus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck s.n.* (SGO)].

Senecio hirthi Phil. = **Senecio philippii** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio hirtus Cabrera
Sin.: *Senecio crispus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 3500–4000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1036* (CONC, GH, K, LIL, SI)].

Senecio hjertingii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1600–2300 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Böcher, T. W. 2055* (LP)].

Senecio hoehnei Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1950b.
Subarbusto. Endémica. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6941* (S)].

Senecio hollermayeri Cabrera = **Senecio chionophilus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio holophyllus J. Remy = **Senecio laevicaulis** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio hookeri Hombr. & Jacq. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **patagonicus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio hualtaranensis Petenatti, Ariza & Del Vitto
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Petenatti, E. M., Ariza Espinar, L. & Del Vitto, L. A., 1994.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Del Vitto, L. A. 6098* (UNSL)].

Senecio hualtata Bertero ex DC. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio hualtata Bertero ex DC. var. *variabilis* (Phil.) Reiche = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio huitrinicus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 26730* (LP)].

Senecio humifusus (Hook. f.) Cabrera
Sin.: *Melalema humifusa* Hook. f., *Senecio darwinii* Hook. & Arn. var. *eradiatus* A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 6561* (LP)]; CHL[*Schlegel, F. 8136* (CONC)].

Senecio humillimus Sch. Bip. ex Wedd.
Sin.: *Senecio humillimus* Sch. Bip. ex Wedd. var. *fruticulosus* Wedd., *Senecio humillimus* Sch. Bip. ex Wedd. var. *melanolepis* Wedd., *Senecio pulviniformis* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1935, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 3100–4800 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8299* (LP)]; CHL[*Marticorena, C. 106* (CONC)].

Senecio humillimus Sch. Bip. ex Wedd. var. *fruticulosus* Wedd. = **Senecio humillimus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio humillimus Sch. Bip. ex Wedd. var. *melanolepis* Wedd. = **Senecio humillimus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio hyadesii Franch. = **Senecio leucomallus** A. Gray var. **leucomallus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio hygrophilus Cuatrec. = **Senecio burkartii** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio hypsophylus Phil. = **Senecio aspericaulis** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a.

Senecio ibari Phil. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio iberidifolius Phil. = **Senecio crithmoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio icoglossoides Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, DUR, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: URY[*Lombardo, A. 2014* (LP)].

Senecio icoglossus DC. var. *araneosus* DC. = **Senecio pulcher** Hook. & Arn. f. **pulcher**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio icoglossus DC. var. **icoglossus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b; Marchesi, E., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–2400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17321* (S)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Senecio icoglosus DC. var. **splendens** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Báez, J. R. s.n.* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 52186* (LP, PACA)]; PRY[*Mereles, F. 1507* (G, SI)].

Senecio ignobilis Sch. Bip. ex Baker, nom. nud. = **Erechtites ignobilis** Baker
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio illapelinus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3200–3500 m.
Países: ARG(SJU); CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio illinitus Phil.
Sin.: *Senecio cervicornis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(II, IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2567* (LP)].

Senecio incae Phil. = **Senecio uspallatensis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio incognitus Cabrera = **Senecio madagascariensis** Poir.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio infimus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Endémica. 3100–3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5799* (LP)].

Senecio innovans Klatt = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio inutilis Speg. = **Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **valderramae** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio invalidus C. Jeffrey
Sin.: *Senecio debilis* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Jeffrey, C., 1992.
Subarbusto. Endémica. 1100–1500 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero 1828* (SGO)].

Senecio irregularis Phil. = **Senecio bahioides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio isernii Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Isern, J. s.n.* (SGO)].

Senecio jacobeiformis J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: CHL(II, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 223* (LP)].

Senecio jaffuelii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14334* (SI)]; CHL[*Jaffuel, F. 829* (GH)].

Senecio jarae Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1949b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8371* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1166* (LP)].

Senecio jilesii Cabrera
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 4104* (LP)].

Senecio jobii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2100–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roth, S. s.n.* (LP)].

Senecio jodopappus Sch. Bip. ex Wedd. = **Chersodoma jodopappa** (Sch. Bip. ex Wedd.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Senecio johnstonianus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2000–2700 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 451* (LP)].

Senecio jorquerae Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 239* (LP)].

Senecio jujuyensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3700–4200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15471* (LP)].

Senecio julianus Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 3923* (LP)].

Senecio julietii Phil. = **Senecio bipontinii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio juncalensis Phil. = **Senecio chrysolepis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio jungei Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landbeck 1862* (LP)].

Senecio jürgensii Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Frenzel, A. 674* (LP)].

Senecio keshua Cabrera
Sin.: *Culcitium oligocephalum* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–5000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 7001* (LIL)].

Senecio kingii Hook. f. f. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus = **Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio kingii Hook. f. var. **kingii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–2300 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11535* (LP)]; CHL[*Beetle, A. A. 24148* (SI)].

Senecio kingii Hook. f. var. **paradoxus** (Albov ex Kurtz) Cabrera
Sin.: *Senecio kurtzii* Albov, hom. illeg., *Senecio paradoxus* Albov ex Kurtz, *Senecio poculiferus* S. Moore
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 551* (LP)]; CHL[*Pisano, E. 2301* (CONC)].

Senecio krapovickasii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300–4700 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 6309* (BAB)].

Senecio kunturinus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez 1362* (LP)].

Senecio kurtzii Albov, hom. illeg. = **Senecio kingii** Hook. f. var. **paradoxus** (Albov ex Kurtz) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio kurtzii Phil. = **Senecio smithii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio lacarensis Phil. = **Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **heliophytoides** (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio laciniosus Phil. = **Senecio pentaphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio lactucoides Klatt = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **prenanthoides** (Kunth) Cuatrec.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio laetevirens Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 12759* (LP)]; CHL[*Meigen, F. C. s.n.* (SGO)].

Senecio laevicaulis DC.
Sin.: *Senecio holophyllus* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 623* (LP)].

Senecio landbeckii Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 232* (LP)].

Senecio langei Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 1155a* (LP)].

Senecio lanifer Mart. ex C. Jeffrey
Sin.: *Senecio vernonioides* Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg.
Referencias: Jeffrey, C., 1992; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAU, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6910* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 5783* (CTES)].

Senecio lanosissimus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Tombesi, T. S., 2001.
Subarbusto. Endémica. 1800–4000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 510* (LP)].

Senecio lanuginosus D. Don = **Senecio donianus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio larrañagae Phil. = **Senecio cachinalensis** Phil. var. **cachinalensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio laseguei Hombr. & Jacq.
Sin.: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq. var. *intermedius* Sch. Bip., *Senecio magellanensis* Macloskie, *Senecio magellanicus* Phil., hom. illeg., *Senecio philippii* De Wild.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.

Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 942* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6112* (LP)].

Senecio lastarrianus J. Remy
Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *angustifolius* DC., *Senecio nitidus* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 217* (LP)].

Senecio laucanus Ricardi & Martic.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 4200–4300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 208* (CONC)].

Senecio lechleri Phil. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **patagonicus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

[Senecio leiophyllus Turcz.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio leptanthus Phil. = **Erechtites leptantha** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio leptocaulos Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 800–1600 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio leptolobus DC.
Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., p.p., *Senecio pinnatus* Poir. var. *leptolobus* (DC.) Baker, *Senecio uruguayensis* Cabrera
Arbusto. Endémica. 0–1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(ART, CLA, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 795c* (HBR, LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 2386b* (LP)].

Senecio leptophyllus Hook. & Arn. = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio leptoschizus Bong.
Sin.: *Senecio leptoschizus* Bong. var. *leptocladus* Baker
Hierba. Perenne. Nativa. 1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 174* (LP)].

Senecio leptoschizus Bong. var. *leptocladus* Baker = **Senecio leptoschizus** Bong.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio leucanthemifolius Phil. = **Senecio santiagoensis** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio leuciscus Phil. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio leucomallus Phil., hom. illeg. = **Senecio maulinus** Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio leucomallus A. Gray var. **incisus** A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 548* (LP)]; CHL[*Wilkes, C. s.n.* (US)].

Senecio leucomallus A. Gray var. **leucomallus**
Sin.: *Senecio hyadesii* Franch.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 356* (LP)]; CHL[*Wilkes, C. s.n.* (US)].

Senecio leucopeplus Cabrera
Sin.: *Senecio candolleanus* Hook. & Arn., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4432* (LP)].

Senecio leucophyton Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–1800 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11122* (LP)]; CHL[*Germain, P. s.n.* (LP)].

Senecio leucostachys Baker
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *pinnatifidus* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 700–1900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 986* (LP)].

Senecio leucus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999.
Arbusto. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(SAL); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 963* (SI)].

Senecio leyboldtii Phil. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio lilloi Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 333* (CORD, LP)].

Senecio limbardioides Hook. & Arn. = **Senecio paucidentatus** DC. var. **limbardioides** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio limbardioides Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn. = **Senecio arnottii** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio limbardioides Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn. = **Senecio arnottii** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio limonius Phil. = **Senecio buglossus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio limosus Dusén ex Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 800–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6422* (HBR, LP)].

Senecio linaresensis Soldano
Sin.: *Senecio subdentatus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Senecio linariifolius Colla = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio aclonetus* Phil., *Senecio encelia* J. Remy, *Senecio microcephalus* Phil. var. *aclonetus* (Phil.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–2200 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1319* (LP)].

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *angustissimus* (Phil.) Speg. = **Senecio angustissimus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *discotideus* Kuntze = **Senecio polygaloides** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. **heliophytoides** (Phil.) Reiche
Sin.: *Senecio heliophytoides* Phil., *Senecio lacarensis* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5129* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 48* (LP)].

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. **linariifolius**
Sin.: *Senecio promaucanus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 1000–2900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6138* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3831* (LP)].

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *longifolia* Phil. = **Senecio farinifer** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus* DC. = **Senecio subumbellatus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. **subtomentosus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5865* (LP)].

Senecio linariifolius Poepp. ex DC. var. *tenuifolius* DC. = **Senecio polygaloides** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio linearifolius Colla = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio linearilobus Bong.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Subarbusto. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3970* (LP)].

Senecio linearilobus Bong. var. *beta* Hook. & Arn. = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio lithostaurus Cabrera
Sin.: *Senecio remyanus* Phil. f. *eradiatus* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 11698* (LP)]; CHL[*Kuntze, C. E. O. s.n.* (LP)].

Senecio littoralis J. Remy, hom. illeg. = **Senecio vaginatus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio littoralis Poepp. ex DC., nom. inval. = **Senecio planiflorus** Kunze ex Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio littoralis Gaudich.
Sin.: *Senecio darwinii* Hook. & Arn. f. *falklandicus* (Hook. f.) Skottsb., *Senecio falklandicus* Hook. f., *Senecio littoralis* Gaudich. var. *lanata* Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 566* (LP)].

Senecio littoralis Gaudich. var. *glabrata* Gaudich. = **Senecio vaginatus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio littoralis Gaudich. var. *lanata* Gaudich. = **Senecio littoralis** Gaudich.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio longipes Hook. f. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio longipes Hook. f. var. *dentatus* Sch. Bip. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio longipes Hook. f. var. *integrifolius* Sch. Bip. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio looseri Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2800–5000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 193* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3152* (LP)].

Senecio lorentziella Hicken
Sin.: *Senecio depressus* Hauman, hom. illeg., *Senecio lorentzii* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3155* (LP)].

Senecio lorentzii Phil., hom. illeg. = **Senecio lorentziella** Hicken
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio lorentzii Griseb.
Sin.: *Senecio lorentzii* Griseb. var. *latifolius* Cabrera, *Senecio lorentzii* Griseb. var. *radiatus* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16934* (LP)].

Senecio lorentzii Griseb. var. *latifolius* Cabrera = **Senecio lorentzii** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio lorentzii Griseb. var. *radiatus* Cabrera = **Senecio lorentzii** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio luridus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 2400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Senecio macer Phil. = **Senecio portulacoides** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio macrotus Kuntze ex Meyen = **Senecio glabratus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio maculatus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4300 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 4235* (LIL)].

Senecio madagascariensis Poir.
Sin.: *Senecio burchellii* auct. non (DC.) Cabrera, *Senecio incognitus* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marchesi, E., com. pers.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, SFE); URY(CAS, MON, RNO, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6658* (LP, SI)]; URY[*Izaguirre, P. 10726* (MVFA)].

Senecio madariagae Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–3400 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP)].

Senecio maeviae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18731* (LP)].

Senecio magellanensis Macloskie = **Senecio laseguei** Hombr. & Jacq.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio magellanicus Phil., hom. illeg. = **Senecio laseguei** Hombr. & Jacq.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio magellanicus Hook. & Arn.
Sin.: *Culcitium magellanicum* Hombr. & Jacq., *Culcitium magellanicum* Hombr. & Jacq. f. *angustifolia* Skottsb., *Culcitium magellanicum* Hombr. & Jacq. f. *typica* Skottsb., nom. inval., *Senecio tunicatus* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 250–1300 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 6602* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6163* (LP)].

Senecio maldonadensis Baker = **Senecio heterotrichus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio mandonianus Wedd. = **Senecio candollii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio manguensis Cabrera & Zardini
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700–1900 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Carette, B. 21* (LP, SI)].

Senecio mapuche Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1800–2200 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. s.n.* (LP)].

Senecio martinensis Dusén
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Witte, L. 62* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 7732* (CONC)].

Senecio mattfeldianus Cabrera
Sin.: *Senecio sagittifolius* Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 9827* (FLOR, HBR, LP)]; URY[*Lombardo, A. 2067* (LP)].

Senecio maulinus Reiche
Sin.: *Senecio leucomallus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 200–2800 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Claude-Joseph 5294* (US)].

Senecio medicinalis Phil. = **Senecio oreophyton** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio megaoreinus Zardini
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 500 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 2375* (BAB, LP)].

Senecio megapotamicus H. Buek = **Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio melanopotamicus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, LPA, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4791* (SI)].

Senecio melloi Cabrera = **Senecio subnemoralis** Dusén
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975.

Senecio mendocinus Phil. = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **erectus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio mendocinus Phil. f. *saltensis* Hicken = **Senecio octolepis** Griseb. var. **saltensis** (Hicken) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio mesembrynus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hamleton s.n.* (LP, SI)].

Senecio meyenii Phil. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio microcephalus Phil. var. *aclonetus* (Phil.) Kuntze = **Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **aclonetus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio microcephalus Phil. var. **angustifolius** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 363* (LP)].

Senecio microcephalus Phil. var. **microcephalus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6103* (LP)]; CHL[*Philippi, O. s.n.* (SI)].

Senecio microphyllus Phil.
Sin.: *Senecio alfalfalis* Phil., *Senecio bowenkampi* Phil., *Senecio gypsophilus* Phil., *Senecio hakeifolius* Hook. & Arn. var. *adenophyllus* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1500–2300 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 12724* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3481* (LP), *Germain, P. s.n.* (SI)].

Senecio micropifolius DC.
Sin.: *Senecio pelolepis* Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1900–4300 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3818* (LP)].

Senecio micropifolius DC. var. *monocephalus* DC. = **Senecio poeppigii** Hook. & Arn. var. **poeppigii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio microtis Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–3200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP)].

Senecio mikanioides Otto ex Walp.
Sin.: *Senecio scandens* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1957a, 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA); CHL(V, VIII, X, IJF); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4521* (LP)]; CHL [*Gunckel, L. H. 5995* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 2000* (LP)].

Senecio minutifolius Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1600–3200 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio miser Hook. f.
Sin.: *Senecio ericoides* Reiche, *Senecio fueginus* Phil., *Senecio miser* Hook. f. f. *major* Albov, *Senecio prichardii* S. Moore, *Senecio verruculosus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze var. *dentatus* Kuntze, *Senecio verruculosus* Kuntze var. *subulatus* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6115* (LP)].

Senecio miser Hook. f. f. *major* Albov = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio miser Hook. f. var. *tehuelches* Speg. = **Senecio tehuelches** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio missionum Cabrera = **Senecio pluricephalus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio modestus Phil., hom. illeg. = **Senecio werdermannii** Greenm.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio möelleri Phil. = **Senecio glaber** Less. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio molinae Phil.
Sin.: *Senecio delfinii* Phil., *Senecio fernandezi* Phil., *Senecio phyllocomus* Phil., *Senecio pratensis* Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 300–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VIII, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5119* (LP)]; CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO)].

Senecio mollis Poepp. ex DC. = **Senecio sinuatilobus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio montevidensis auct. non (Spreng.) Baker = **Senecio vira-vira** Hieron.

Senecio montevidensis (Spreng.) Baker
Sin.: *Cineraria montevidensis* Spreng., *Senecio chilensis* Baker, hom. illeg., *Senecio cuspidatus* DC., *Senecio cuspidatus* DC. var. *montevidensis* (Spreng.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1957a, 1963a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(CAS, COL, DUR, MAL, MON, ROC, SAO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5540* (LP)]; BRA[*Sello s.n.* (GH)]; URY[*Arechavaleta, J. 4005* (LP)].

Senecio monticola Phil., hom. illeg. = **Senecio oreinus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio monttianus J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2400–3000 m.
Países: CHL(IV, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SI)].

Senecio morenonis Kuntze = **Senecio sericeo-nitens** Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio multibracteatus Phil. = **Senecio polygaloides** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio multicaulis Poepp., hom. illeg. = **Senecio subumbellatus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio munnozii Cabrera
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1359* (CONC)].

Senecio murinus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 400–1400 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 3510* (LP)].

Senecio murorum J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 100–200 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 2251* (LP)].

Senecio mustersii Speg. var. **dentatus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 25971* (LP)].

Senecio mustersii Speg. var. **mustersii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 700–1400 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4011* (LP)].

Senecio myriocephalus Baker, hom. illeg. = **Senecio pluricephalus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio myriophyllus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1435* (LP)].

Senecio nahuelbutanus Phil. = **Senecio angustissimus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio navarri Phil. = **Senecio pentaphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio neaei DC. var. **incisus** DC.
Sin.: *Senecio sericeus* Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(MEN, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona 2150* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6116* (LP)].

Senecio neaei DC. var. **neaei**
Sin.: *Cacalia canescens* Poepp. ex DC., nom. inval., *Senecio sericeus* Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 300–1800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR); CHL(VIII, IX, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 2246* (LP)]; CHL[*Poeppig, E. F. 914* (GH)].

Senecio nemiae A. Bartoli, Tortosa & S.E. Freire
Referencias: Bartoli, A., Tortosa, R. D. & Freire, S. E., 2004.
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7090* (BAB)].

Senecio neosessilis Cuatrec. = **Senecio culcitenellus** Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio neuquensis Cabrera = **Senecio triodon** Phil. var. **neuquensis** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio niederleinii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 692* (CORD)].

Senecio nigrescens Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio chamaedryfolius* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 312* (LP)].

Senecio nitidus Phil. = **Senecio lastarrianus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio nordenskjöldii O. Hoffm. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **tricuspidatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio nordenskjöldii O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm. = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **tricuspidatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio nublensis Soldano
Sin.: *Senecio carnosus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Soldano, A., 1998.
Subarbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 19676* (LP)].

Senecio nutans Sch. Bip.
Sin.: *Senecio graveolens* Wedd., *Senecio graveolens* Wedd. var. *psiloachaenius* Cabrera, *Senecio psychrophilus* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999.
Arbusto. Nativa. 3500–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3471* (LP)]; CHL[*Barros, E. 185* (LP)].

Senecio obesus Klatt
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 600–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. s.n.* (LP)].

Senecio obtectus Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2200–2600 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Carette, B. s.n.* (SI)]; CHL[*Kuntze, C. E. O. s.n.* (NY)].

Senecio ochroleucus Hook. & Arn. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **ochroleucus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ochroleucus Phil. = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio ochroleucus Hook. & Arn. var. *alfa* Hook. & Arn. = **Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ochroleucus Hook. & Arn. var. *beta* Hook. & Arn. = **Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.

Senecio octolepis Griseb. var. **octolepis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2000–3200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12203* (LP)].

Senecio octolepis Griseb. var. **saltensis** (Hicken) Cabrera
Sin.: *Senecio mendocinus* Phil. f. *saltensis* Hicken
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2800–4000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez 1428* (LP)].

Senecio odonellii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 1909* (LP)].

Senecio oleosus Vell.
Sin.: *Senecio hastatus* Bong.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 375* (LP)].

Senecio oligoleucus Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Subarbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. 4006* (LP)].

Senecio oligophyllus Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1296c* (HBR, LP)]; PRY[*Krapovickas, A. 44940* (CTES)].

Senecio olivaceobracteatus Ricardi & Martic.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 3500–4200 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 326* (LP)].

Senecio olivaceus Phil. = **Senecio paucidentatus** DC. var. **limbardioides** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio ombrophyllus Skottsb. = **Senecio acanthifolius** Hombr. & Jacq. subsp. **acanthifolius**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio oreinus Cabrera
Sin.: *Senecio andicola* Phil., hom. illeg., *Senecio monticola* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 1700–3300 m.
Países: ARG(MEN); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 4900* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3819* (LP)].

Senecio oreophilus Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 49* (S)].

Senecio oreophyton J. Remy
Sin.: *Senecio medicinalis* Phil., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *retroflexus* Hook. & Arn., *Senecio uspallatensis* Hook. & Arn. var. *tenuior* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3100–4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 2205* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 254* (LP)].

Senecio ostenii Mattf. var. **balaenicus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Lombardo, A. 2053* (LP)].

Senecio ostenii Mattf. var. **ostenii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(BAI); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 22306* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 5809* (LP)].

Senecio otaeguianus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (LP)].

Senecio otites Kunze ex DC.
Sin.: *Senecio chiloensis* Phil., *Senecio otophorus* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5019* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 114* (LP)].

Senecio otophorus Phil. = **Senecio otites** Kunze ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio otopterus Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7486* (LP)].

Senecio ovalifolius Turcz. = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **yegua**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio oxyodon Phil. = **Chersodoma candida** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Senecio oxyphyllus DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marchesi, E., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); URY(CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7311* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 29588* (LP)]; URY[*Lema 8015* (MVFA)].

Senecio pachyphyllos J. Remy
Sin.: *Senecio domeykoanus* Phil., *Senecio sedifolius* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6266* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3589* (LP)].

Senecio paeninsularis S. Moore = **Senecio tricuspidatus** Hook. & Arn. var. **tricuspidatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio palenae Phil. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **patagonicus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pampae Lingelsh. = **Senecio clivicola** Wedd. var. **pampae** (Lingelsh.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pampae Lingelsh. var. *pampae* = **Senecio clivicola** Wedd. var. **pampae** (Lingelsh.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pampae Lingelsh. var. *penicillatus* Lingelsh. = **Senecio clivicola** Wedd. var. **clivicola**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pampeanus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Muñoz, J. D., 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18594* (LP)].

Senecio paposanus Phil. = **Senecio philippicus** Regel & Körn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio pappii Ricardi & Martic.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 3200–3600 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 496* (CONC)].

Senecio paradoxus Albov ex Kurtz = **Senecio kingii** Hook. f. var. **paradoxus** (Albov ex Kurtz) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio paraguariensis Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(SCA); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 537* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 4213* (HBR, LP)]; PRY[*Rojas, T. 5688* (LP)].

Senecio paralias Phil. = **Senecio cumingii** Hook. & Arn. var. **cumingii**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio paranensis Malme
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975; Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6733* (LP, S)].

Senecio parodii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6364* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 1846* (CONC)].

Senecio passus-crucis Kuntze = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio patagonicus Phil., hom. illeg. = **Senecio sericeo-nitens** Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **alyssoides** (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq., *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq. var. *alyssoides* Sch. Bip., *Senecio exilis* Hombr. & Jacq., *Senecio floccidus* Hombr. & Jacq.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 2024* (LP)]; CHL[*Hicken, C. M. 182* (LP)].

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **andersonii** (Hook. f.) Cabrera
Sin.: *Senecio andersonii* Hook. f., *Senecio forsteri* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Covas, G., 1964; Moore, D. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 100–900 m.
Países: ARG(CHU, SCR, SDE); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 2323* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 45* (LP)].

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacq.) Cabrera
Sin.: *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq. var. *beta* J. Remy, *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq. var. *lobatifolia* Hombr. & Jacq., *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq. var. *pinnatifidus* Macloskie, *Senecio danyausii* Hombr. & Jacq. var. *trifurcatus* Sch. Bip., *Senecio xanthoxylon* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scolnik, R. 422* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6091* (LP)].

Senecio patagonicus Hook. & Arn. var. **patagonicus**
Sin.: *Senecio andersonii* Hook. f. var. *beta* Hook. f., *Senecio choiquelahuensis* Speg., *Senecio hookeri* Hombr. & Jacq., *Senecio lechleri* Phil., *Senecio palenae* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 200–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 62* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 156* (LP)].

Senecio paucidentatus DC. var. **limbardioides** (Hook. & Arn.) Cabrera
Sin.: *Senecio limbardioides* Hook. & Arn., *Senecio olivaceus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Senecio paucidentatus DC. var. **paucidentatus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 4625* (LP)].

Senecio paulensis Bong.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975; Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9339* (S)].

Senecio pearcei Phil. = **Senecio hieracium** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pelolepis Johnst. = **Senecio micropifolius** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio pelquensis Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tessleff. s.n.* (BAB)].

Senecio pemehuensis Soldano
Sin.: *Senecio scoparius* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Soldano, A., 1998.
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Senecio pentadactylus Phil. = **Senecio trifurcatus** (G. Forst.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pentaphyllus Phil.
Sin.: *Senecio laciniosus* Phil., *Senecio navarri* Phil., *Senecio pentaphyllus* Phil. var. *navarri* (Phil.) Reiche, *Senecio schoenleini* Meigen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2300–2500 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3828* (LP)].

Senecio pentaphyllus Phil. var. *navarri* (Phil.) Reiche = **Senecio pentaphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio peraltae Phil. = **Senecio segethii** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio peregrinus Griseb.
Sin.: *Dendrophorbium peregrinum* (Griseb.) C. Jeffrey
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 400–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4493* (LP)].

Senecio perezii Cabrera f. **integerrima** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1200–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 52* (LP)].

Senecio perezii Cabrera f. **perezii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 600–1200 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sayago, M. 3247* (LP)].

Senecio peripotamus C. Jeffrey
Sin.: *Senecio rivularis* J. Remy, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Jeffrey, C., 1992.
Subarbusto. Endémica. 300–2700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 649* (SGO)].

Senecio peteroanus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1600–2100 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR); CHL(VII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferruglio, E. 48* (LP)]; CHL[*Montero, G. 3401* (LP)].

Senecio pfisteri Ricardi & Martic.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300–4400 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 207* (CONC)].

Senecio phaedrus Phil. = **Senecio cerberoanus** J. Remy var. **cerberoanus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio phagnaloides DC. = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio philippicus Regel & Körn.
Sin.: *Senecio paposanus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 200–900 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5288* (GH)].

Senecio philippii De Wild. = **Senecio laseguei** Hombr. & Jacq.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio philippii Sch. Bip. ex Wedd.
Sin.: *Senecio ammophilus* Phil., *Senecio hirthi* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3117* (LP)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (LP, SI)].

Senecio phylicifolius Poepp. ex DC.
Sin.: *Cineraria phylicifolia* Poepp. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 200–2000 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 258* (LP)].

Senecio phyllocomus Phil. = **Senecio molinae** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio phylloleptus Cuatrec.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 834* (CONC)].

Senecio phyllomorphus Steud. = **Senecio pilquensis** H. Buek
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pilquensis H. Buek
Sin.: *Cacalia heterophylla* Poepp. ex DC., *Senecio heterophyllus* DC., *Senecio phyllomorphus* Steud., *Senecio porophylloides* J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 900–1700 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 177* (LP)]; CHL[*Barros, E. 261* (LP)].

Senecio pinachensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19114* (LP)].

Senecio pinnatifidus Phil. = **Senecio proteus** J. Remy var. **proteus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio pinnatus DC., nom. illeg. = **Senecio platensis** Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio pinnatus Poir. var. *achalensis* Griseb. = **Senecio vira-vira** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pinnatus Poir. var. *glandulosus* Ball = **Senecio ventanensis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pinnatus Poir. var. *leptolobus* (DC.) Baker = **Senecio leptolobus** DC.

Senecio pinnatus Poir. var. *pectinatus* Baker = **Senecio gilliesianus** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pinnatus Poir. var. **pinnatus**
Sin.: *Cineraria megapotamica* Spreng., p.p.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1957a, 1963a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Malme, G. O. A., 1933b; Seckt, H. K. F. H., 1929–1930.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, PHA); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, H. F. 195* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 7939* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 2188* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 3193* (LP)].

Senecio pinnatus Poir. var. **simplicifolius** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23539* (SI)].

[Senecio pinnatus Poir. var. tenuisectus Griseb.]
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio pissisii Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3000–4100 m.
Países: ARG(SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. 141* (LP)]; CHL[*Volckmann, G. s.n.* (BAB, LP, SGO)].

Senecio planiflorus Kunze ex Cabrera
Sin.: *Senecio littoralis* Poepp. ex DC., nom. inval., *Senecio sinuatilobus* DC. var. *littoralis* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 926* (LP)].

Senecio plantagineus Bertero = **Senecio arnicoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio platensis Arechav.
Sin.: *Senecio pinnatus* DC., nom. illeg.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L., 1957a.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 1547b* (S)]; URY[*Lombardo, A. 649* (LP)].

Senecio platycodon Baker, p.p. = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio pluricephalus Cabrera
Sin.: *Dendrophorbium missionum* (Cabrera) C. Jeffrey, *Dendrophorbium pluricephalum* (Cabrera) C. Jeffrey, *Senecio missionum* Cabrera, *Senecio myriocephalus* Baker, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1150* (LP)]; BRA[*Sello 4257* (B, GH)]; PRY[*Balansa, B. 931* (G)].

Senecio poculiferus S. Moore = **Senecio kingii** Hook. f. var. **paradoxus** (Albov ex Kurtz) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio poeppigii (DC.) Wedd., hom. illeg. = **Senecio gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var. *condensatus* Reiche = **Senecio depressus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var. **discoideus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1800 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19729* (LP)].

Senecio poeppigii Hook. & Arn. var. **poeppigii**
Sin.: *Culcitium candidum* Don ex Hook. & Arn., *Senecio dealbatus* Phil., *Senecio micropifolius* DC. var. *monocephalus* DC., *Senecio williamsii* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1300–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6180* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3603* (LP)].

Senecio pogonias Cabrera
Sin.: *Senecio aquaniger* Cabrera & Zardini, *Senecio barbatus* D. Don ex Hook. & Arn., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24414* (LP)].

Senecio polygaloides Phil.
Sin.: *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *discotideus* Kuntze, *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *tenuifolius* DC., *Senecio multibracteatus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000–3800 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 15747* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 596* (LP, SI)].

Senecio polyphyllus Sch. Bip. = **Senecio bipontinii** Wedd.

Senecio polyphyllus Sch. Bip. ex Wedd., hom. illeg. = **Senecio bipontinii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Senecio polyphyllus Kunze ex DC.
Sin.: *Senecio tristis* Phil. var. *comberi* Greenm.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700–2600 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6191* (LP)]; CHL[*Burkart, A. 9534* (LP, SI)].

Senecio polyphyllus Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche = **Senecio portalesianus** J. Remy var. **portalesianus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio porophylloides J. Remy = **Senecio pilquensis** H. Buek
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio portalesianus J. Remy var. **lanuginosus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio antucensis* Phil. var. *lanuginosa* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1400–2500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 226* (LP)].

Senecio portalesianus J. Remy var. **portalesianus**
Sin.: *Senecio antucensis* Phil., *Senecio polyphyllus* Kunze ex DC. var. *antucensis* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–2800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6274* (LP)]; CHL[*Hauthal s.n.* (LP)].

Senecio portulacoides J. Remy
Sin.: *Senecio macer* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1200–2800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 139* (P)].

Senecio potamogetonifolius Sch. Bip. ex Phil. = **Senecio zosterifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio potosianus Klatt
Sin.: *Senecio attenuatus* Sch. Bip. ex Rusby var. *microphyllus* Britton, *Senecio clavifolius* Rusby
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 22062* (LIL)].

Senecio pratensis Phil. = **Senecio glaber** Less. var. **pratensis** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pratensis Phil. var. *delfinii* (Phil.) Reiche = **Senecio molinae** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio prenanthifolius Phil.
Sin.: *Senecio helianthoides* Phil., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Lechl., nom. nud., *Senecio ranconensis* Sch. Bip. ex Phil., nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VI, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5900* (LP)]; CHL[*Hicken, C. M. 135* (SI)].

Senecio prichardii S. Moore = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio promatensis Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. 2123* (ICN, LP)].

Senecio promaucanus Phil. = **Senecio linariifolius** Poepp. ex DC. var. **linariifolius**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio proteus J. Remy var. **geissei** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio geissei* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1200–1800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16532* (SI)].

Senecio proteus J. Remy var. **proteus**
Sin.: *Senecio bracteolatus* Phil., *Senecio foliolosus* Reiche, *Senecio pinnatifidus* Phil., *Senecio stenophyllus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 800–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villanueva, G. s.n.* (LP)].

Senecio psammoecus Cabrera = **Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio psammophilus Griseb. = **Senecio filaginoides** DC. var. **lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio psammophilus Phil., hom. illeg. = **Senecio anthemidiphyllus** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pseudalmeidae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 300 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 851* (LP)].

Senecio pseudaspericaulis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 22429* (LP)].

Senecio pseuderucoides Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 1900 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16734* (SI)].

Senecio pseudotites Griseb.
Sin.: *Senecio pseudotites* Griseb. var. *glabra* Hicken
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4801* (LIL, LP)].

Senecio pseudotites Griseb. var. *glabra* Hicken = **Senecio pseudotites** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio psychrophilus Wedd. = **Senecio nutans** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pteropogon Griseb. = **Leucheria pteropogon** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Senecio pubescens Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500–1600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Senecio puchii Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L., 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 3800–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8380* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1110* (GH, US)].

Senecio pulcher Hook. & Arn. f. **albiflorus** Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. 2045* (ICN, LP)].

Senecio pulcher Hook. & Arn. f. **pulcher**
Sin.: *Senecio icoglossus* DC. var. *araneosus* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10339* (LP, SI)]; BRA[*Rambo, B. 1985* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 7116* (LP)].

Senecio pulicarioides Baker var. **auriculatus** Baker
Referencias: Malme, G. O. A., 1931.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 2988* (S)].

Senecio pulicarioides Baker var. **pulicarioides**
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sello 187* (GH)].

Senecio pulviniformis Hieron. = **Senecio humillimus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pumilus Tortosa & A. Bartoli
Referencias: Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2005.
Arbusto. Endémica. 1900–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ancibor, E. s.n.* (BAA)].

Senecio punae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3500–4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17524* (LP)].

Senecio punctarenicus Krause = **Senecio smithii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio purpuratus Phil. = **Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio purpuratus Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche = **Senecio subdiscoideus** Sch. Bip. ex Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio pycnanthus Phil.
Sin.: *Senecio pycnanthus* Phil. var. *brevifolia* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SI)].

Senecio pycnanthus Phil. var. *brevifolia* Phil. = **Senecio pycnanthus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio quenselii Skottsb. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio quequensis Cabrera = **Senecio bergii** Hieron.
Referencias: Long, M. A., 2002.

Senecio quillotensis Phil. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio ragonesei Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Endémica. 800–3300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 16419* (LP)].

Senecio rahmeri Phil. var. **rahmeri**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 4100–4300 m.
Países: ARG(CAT, SAL); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3214* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 976* (LP, SI)].

Senecio rahmeri Phil. var. **sericeus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 6307* (LP)].

Senecio ramboanus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Mondin, C. A. & Matzenbacher, N. I., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 54512* (LP, PACA)].

Senecio rancaguensis J. Remy = **Senecio yegua** (Colla) Cabrera var. **yegua**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ranconensis Sch. Bip. ex Lechl., nom. nud. = **Senecio prenanthifolius** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b, 1971a.

Senecio ranconensis Sch. Bip. ex Phil., nom. nud. = **Senecio prenanthifolius** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio reedi Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 3079* (LP)].

Senecio reicheanus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 3600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1104* (LP)].

Senecio reitzianus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rohr, J. A. 609* (LIL)].

Senecio remyanus Phil. = **Senecio crithmoides** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio remyanus Phil. f. *eradiatus* Kuntze = **Senecio lithostaurus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio renjifoanus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 24680* (LP)]; CHL[*Villarroel, A. s.n.* (LP)].

Senecio repollensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–2200 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 547* (LP)].

Senecio retanensis Cabrera
Sin.: *Senecio sectilis* Griseb. var. *radiatus* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2200–2800 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 8669* (CORD, LP)].

Senecio rhodaster Baker = **Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio ricardii Martic. & Quezada
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 3100–3400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9874* (CONC)].

Senecio riograndensis Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I., 1996.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. 2031* (ICN, LP)].

Senecio riojanus Cabrera var. **radiatus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 300–1100 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11023* (LP)].

Senecio riojanus Cabrera var. **riojanus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 2109* (LP)].

Senecio rivularis J. Remy, hom. illeg. = **Senecio peripotamus** C. Jeffrey

Senecio roripifolius Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5186* (LP)].

Senecio rosmarinus Phil. var. **ascotanensis** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio ascotanensis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3300–4200 m.
Países: ARG(LRI, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnston, I. M. 301163* (LP)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP)].

Senecio rosmarinus Phil. var. **rosmarinus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3800–3900 m.
Países: ARG(CAT); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Philippi, F. s.n.* (LP)]; CHL[*Luebert B., F. 46* (EIF)].

Senecio rudbeckiaefolius Meyen & Walp.
Sin.: *Senecio flagellisectus* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4659* (LP)].

Senecio rufescens DC.
Sin.: *Senecio adenophylloides* Sch. Bip. ex Wedd., *Senecio austrorufescens* Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 3500–5200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 854* (LP)]; CHL[*Nee s.n.* (G)].

Senecio ruiz-lealii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–2700 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 680* (LP)].

Senecio rutaceus Phil. = **Senecio eruciformis** J. Remy var. **eruciformis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio rutaceus Phil. var. *brachycephalus* Phil. = **Senecio eruciformis** J. Remy var. **brachycephalus** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sagittarioides Speg. = **Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sagittifolius Arechav. = **Senecio mattfeldianus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio sagittifolius Baker, hom. illeg. = **Senecio bonariensis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio salsus Griseb. = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio saltensis Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marchesi, E., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3960* (LP)]; URY[*Del Puerto, O. 5768* (MVFA)].

Senecio sanagastae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3158* (LP)].

Senecio sandwithii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 600–1200 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, T. 203* (K)].

Senecio santacrucensis Cabrera = **Senecio culcitenellus** Cuatrec.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio santelicis Phil.
Sin.: *Senecio crispus* Phil. var. *santelisis* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3500–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 210* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Senecio santiagoensis Kuntze
Sin.: *Senecio leucanthemifolius* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2300–2500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kuschel, G. s.n.* (LP)].

Senecio sarcophyllus Phil., hom. illeg. = **Senecio bipontinii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio saucensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2400 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18547* (LP)].

Senecio saxicola Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Nativa. 200–300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16255* (GH, SI)].

Senecio scandens DC. = **Senecio mikanioides** Otto ex Walp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.

Senecio schoenemannii Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schönemann, O. s.n.* (SGO)].

Senecio schoenleini Meigen = **Senecio pentaphyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio schreiteri Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1700–2100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5654* (LIL)].

Senecio schultzii Wedd., hom. illeg. = **Senecio bipontinii** Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio schulzeanus Meigen = **Senecio bustillosianus** J. Remy var. **bustillosianus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio scoparius Phil., hom. illeg. = **Senecio pemehuensis** Soldano
Referencias: Soldano, A., 1998.

Senecio scopulorum Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 900–1500 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Poeppig, E. F. 925d* (SI)].

Senecio scorzonerifolius Meyen & Walp.
Sin.: *Senecio armeriifolius* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 4200–4600 m.
Países: ARG(JUJ, LRI); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19814* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1070* (LP)].

Senecio sectilis Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1200–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 69* (LIL)].

Senecio sectilis Griseb. var. *radiatus* Griseb. = **Senecio retanensis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sedifolius Phil. = **Senecio pachyphyllos** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio segethii Phil.
Sin.: *Senecio peraltae* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4100 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnston, I. M. 6186* (LP)]; CHL[*Volckmann, G. s.n.* (LP, SI)].

Senecio selloi (Spreng.) DC.
Sin.: *Cineraria selloi* Spreng., *Senecio doroniciflorus* Hook. & Arn.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 48906* (LP)]; URY[*Legrand, D. 222* (LP)].

Senecio seminudus Bory = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio serenensis J. Remy = **Senecio brunonianus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio sericeo-nitens Speg.
Sin.: *Senecio argentatus* S. Moore, *Senecio morenonis* Kuntze, *Senecio patagonicus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 700–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5101* (LP)]; CHL[*Rentzell, I. 6079* (SI)].

Senecio sericeus Kuntze, p.p. = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.

Senecio sericeus Kuntze var. *candolleanus* Kuntze = **Senecio filaginoides** DC. var. **lobulatus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.

Senecio sericeus Kuntze var. *gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze = **Senecio filaginoides** DC. var. **filaginoides**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sericeus Kuntze var. *glabriusculus* (Griseb.) Kuntze = **Senecio vira-vira** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sericeus Kuntze var. *incisus* (DC.) Kuntze = **Senecio neaei** DC. var. **incisus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sericeus Kuntze var. *neaei* (DC.) Kuntze = **Senecio neaei** DC. var. **neaei**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sericeus Kuntze var. *pinnatifidus* Kuntze = **Senecio vira-vira** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio serranus Zardini
Sin.: *Graphistylis serranus* (Zardini) D. J. N. Hind
Referencias: Hind, D. J. N., 1994; Zardini, E. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21212* (MBM, MO, US)].

Senecio serratifolius (Meyen & Walp.) Cuatrec.
Sin.: *Culcitium serratifolium* Meyen & Walp., *Senecio cernuiflorus* Cabrera, *Senecio cernuus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19853* (LP)]; CHL[*Mahu, M. 4060* (LP)].

Senecio sessilis Vell. = **Senecio adamantinus** Bong.

Senecio setulosus Phil. = **Senecio tristis** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

[Senecio simpsonii Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio sinuatilobus DC.
Sin.: *Senecio mollis* Poepp. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 3778* (LP)].

Senecio sinuatilobus DC. var. *littoralis* DC. = **Senecio planiflorus** Kunze ex Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio skottsbergii Cabrera var. **anomalus** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pirion, A. 3387* (GH)].

Senecio skottsbergii Cabrera var. **skottsbergii**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 600–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koslowsky, J. s.n.* (BAB, LP)]; CHL[*Fester, G. s.n.* (SI)].

Senecio smithii DC.
Sin.: *Brachypappus smithii* (DC.) Sch. Bip., *Cineraria gigantea* Sm., *Cineraria leucantha* Banks & Sol. ex Walp., *Senecio kurtzii* Phil., *Senecio punctarenicus* Krause, *Senecio verbascifolius* Hombr. & Jacq.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 269* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 56* (LP)].

Senecio socialis Wedd. = **Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio socompae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3500–4700 m.
Países: ARG(SAL); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22554* (LP)]; CHL[*Luebert B., F. 194* (EIF)].

Senecio soloanus Phil. = **Senecio gayanus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sonchoides Vuk. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio sorianoi Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 500–600 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18720* (LP)].

Senecio spegazzinii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. s.n.* (LP)].

Senecio steinbachianus Cuatrec. = **Senecio epiphyticus** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio stenophyllus Phil. = **Senecio proteus** J. Remy var. **proteus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio stenopterus Griseb. = **Senecio deferens** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio steparius Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, T. 117* (K)].

Senecio stigophlebius Cabrera, hom. illeg. = **Senecio stigophlebius** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975.

Senecio stigophlebius Baker
Sin.: *Senecio stigophlebius* Cabrera, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 44* (R)].

Senecio stipellatus O. Hoffm. = **Senecio goldsackii** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.

Senecio subarnicoides Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 36355* (PACA)].

Senecio subauritus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 900–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rahmer, C. s.n.* (LP)].

Senecio subdentatus Phil., hom. illeg. = **Senecio linaresensis** Soldano
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio subdiscoideus Sch. Bip. ex Wedd.
Sin.: *Metazanthus grandiflorus* Meyen, hom. illeg., *Senecio breviculus* Phil., *Senecio caespitosus* Phil., *Senecio kingii* Hook. f. f. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Hosseus, *Senecio purpuratus* Phil., *Senecio purpuratus* Phil. var. *subdiscoideus* (Sch. Bip. ex Wedd.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–3800 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5897* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3651* (LP)].

[Senecio subdiscoideus Sch. Bip. ex Wedd. f. homogama Hauman]
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio subnemoralis Dusén
Sin.: *Senecio melloi* Cabrera
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1773* (CORD)].

Senecio subpanduratus O. Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 14732* (LP)].

Senecio subpubescens Cabrera
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1000–1700 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5873* (LP)]; CHL[*Barros, E. 216* (LP)].

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. *elatior* Hook. & Arn. = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **subulatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **erectus** Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio mendocinus* Phil., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *macranthus* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 885* (LP)].

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. *macranthus* Hook. & Arn. = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **erectus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. *prostratus* D. Don = **Senecio subulatus** D. Don ex Hook. & Arn. var. **subulatus**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **salsus** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Senecio disparifolius* Cabrera, *Senecio diversifolius* Phil., hom. illeg., *Senecio innovans* Klatt, *Senecio salsus* Griseb., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *diversifolius* (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9512* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1107* (GH, LP, SI)].

Senecio subulatus D. Don ex Hook. & Arn. var. **subulatus**
Sin.: *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *elatior* Hook. & Arn., *Senecio subulatus* D. Don ex Hook. & Arn. var. *prostratus* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1963a, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 1000–1300 m.
Países: ARG(BAI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2790* (LP)].

Senecio subumbellatus Phil.
Sin.: *Senecio antirhinifolius* Phil., *Senecio linariifolius* Poepp. ex DC. var. *subdiscoideus* DC., *Senecio multicaulis* Poepp., hom. illeg. , *Senecio thermarum* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1500–3600 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 277* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 3633* (LP)].

Senecio subvulgaris Kuntze = **Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio sundtii Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 3600–4700 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3255* (LP)]; CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (SI)].

Senecio sylvaticus L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 600–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5074* (LP)]; CHL[*Boelcke, O. 287* (LP)].

Senecio tacuaremboensis Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (B)].

Senecio tafiensis Cabrera = **Senecio hieronymi** Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio talquinus Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 2100 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dupuy, L. H. s.n.* (SGO)].

Senecio tandilensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6824* (LP)].

Senecio tarapacanus Phil. = **Senecio dryophyllus** Meyen & Walp.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978, 1985; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio tehuelches (Speg.) Cabrera
Sin.: *Senecio miser* Hook. f. var. *tehuelches* Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Saldivia, P. & Faúndez, L., 2005.
Subarbusto. Endémica. 400–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11180* (LP)]; CHL[*Saldivia, P. s.n.* (SGO)].

[Senecio tenuicaulis Phil.]
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Notas: Nombre dudoso.

Senecio thermarum Phil. = **Senecio subumbellatus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio thinophilus Phil. = **Senecio troncosii** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio tilcarensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2800–3100 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13958* (LP)].

Senecio tillandsiaefolius Poepp. ex DC. = **Senecio chilensis** Less. var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio tinctolobus I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 3000–4300 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 6072* (GH)].

Senecio tocomarensis Cabrera & Zardini
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 4300 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22535* (LP)].

Senecio tocornali Phil. = **Senecio glaber** Less. var. **glaber**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio toroanus Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000–2700 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 18917* (LP)].

Senecio trafulensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 800–1200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5102* (LP)].

Senecio tricephalus Kuntze
Sin.: *Senecio tupungatoi* Hauman
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2500–3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11256* (LP)].

Senecio trichocaulon Baker
Sin.: *Senecio trichocodon* Baker var. *trichocaulon* (Baker) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. 1001* (BAB, LP)]; BRA[*Bornmüller, A. 582* (GH)]; PRY[*Caballero Mármori, G. s.n.* (CTES, G)].

Senecio trichocodon Baker
Sin.: *Senecio grüneri* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1169* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 929* (G)].

Senecio trichocodon Baker var. *trichocaulon* (Baker) Cabrera = **Senecio trichocaulon** Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio tricuspidatus Hook. & Arn. var. **dentatus** (Sch. Bip.) Cabrera
Sin.: *Senecio ibari* Phil., *Senecio longipes* Hook. f., *Senecio longipes* Hook. f. var. *dentatus* Sch. Bip., *Senecio longipes* Hook. f. var. *integrifolius* Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 8161* (LP)]; CHL[*Guiñazú, J. R. 42* (LP)].

Senecio tricuspidatus Hook. & Arn. var. **dumosus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio dumosus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Silvestri, F. s.n.* (LP)].

Senecio tricuspidatus Hook. & Arn. var. **tricuspidatus**
Sin.: *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm., *Senecio nordenskjöldii* O. Hoffm. var. *simplicior* O. Hoffm., *Senecio paeninsularis* S. Moore
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12554* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6113* (LP)].

Senecio trifidus Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio demissus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c, 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 2700–4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cuezzo, A. R. 2550* (LP)].

Senecio trifurcatus (G. Forst.) Less.
Sin.: *Cineraria trifurcata* Spreng., *Senecio pentadactylus* Phil., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg., *Senecio trifurcatus* (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd., *Tussilago trifurcata* G. Forst.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Hierba. Perenne. Endémica. 800–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 2057* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 803* (LP)].

Senecio trifurcatus (G. Forst.) Less. var. *pentadactylus* (Phil.) Speg. = **Senecio trifurcatus** (G. Forst.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio trifurcatus (G. Forst.) Less. var. *pisensis* Sch. Bip. ex Wedd. = **Senecio trifurcatus** (G. Forst.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio trifurcifolius Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Nativa. 4200–5100 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1153* (LP, SI)].

Senecio triodon Phil. var. **neuquensis** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Senecio neuquensis* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–1700 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jones, D. F. 85* (LP)].

Senecio triodon Phil. var. **triodon**
Sin.: *Senecio baccharidifolius* DC. var. *subradiatus* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 900–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5914* (LP)]; CHL[*Barros, E. 500* (LP)].

Senecio tripartitus DC. = **Senecio brasiliensis** (Spreng.) Less. var. **tripartitus** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1963a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio tripinnatifidus Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Subarbusto. Endémica. 1100–1300 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (LP)].

Senecio tristis Phil.
Sin.: *Senecio consanguineus* Phil., *Senecio setulosus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 1200–2100 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4824* (LP)]; CHL[*Barros, E. 302* (LP)].

Senecio tristis Phil. var. *comberi* Greenm. = **Senecio polyphyllus** Kunze ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio troncosii Phil.
Sin.: *Senecio thinophilus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 358* (LP)].

Senecio tucumanensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1939c; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 5642* (LIL)].

Senecio tunicatus Kuntze = **Senecio magellanicus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio tupungatoi Hauman = **Senecio tricephalus** Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio tweediei Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio argentinensis* Speg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a, 1974a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Malme, G. O. A., 1931; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28113* (SI)]; BRA[*Sellow, F. 2375* (S)]; URY[*Gallinal, J. P. 1201* (LP)].

Senecio uliginosus Phil. = **Senecio zosterifolius** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio uruguayensis Cabrera = **Senecio leptolobus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1975.

Senecio uspallatensis Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio incae* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19647* (LP)].

Senecio uspallatensis Hook. & Arn. var. *retroflexus* Hook. & Arn. = **Senecio oreophyton** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio uspallatensis Hook. & Arn. var. *tenuior* Hook. & Arn. = **Senecio oreophyton** J. Remy
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio vaginatus Hook. & Arn.
Sin.: *Senecio littoralis* Gaudich. var. *glabrata* Gaudich., *Senecio littoralis* J. Remy, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 565* (LP)].

Senecio vaginifolius Sch. Bip.
Sin.: *Culcitium dasyphyllum* Gand., *Culcitium magellanicum* Hombr. & Jacq. f. *latifolia* Skottsb., *Senecio dasyphyllus* (Gand.) Cuatrec.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1400 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16495* (LP)]; CHL[*Riggi, E. 61* (LP)].

Senecio valderramae Phil. = **Senecio bracteolatus** Hook. & Arn. var. **valderramae** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio valdivianus Phil. = **Senecio buglossus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio valerianifolius Desf. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio valerianifolius Gardner = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio valerianifolius Wolf = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Senecio valparadisiacus Colla = **Senecio glabratus** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio valparadisiensis J. Remy = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **hakeifolius**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio variabilis Phil. = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **fistulosus**
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio varvarcensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a.
Subarbusto. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13999* (BAA)].

Senecio ventanensis Cabrera
Sin.: *Senecio pinnatus* Poir. var. *glandulosus* Ball
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4677* (LP)].

Senecio verbascifolius Hombr. & Jacq. = **Senecio smithii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio vernonioides Sch. Bip. ex Baker, hom. illeg. = **Senecio lanifer** Mart. ex C. Jeffrey
Referencias: Jeffrey, C., 1992.

Senecio verruculosus Kuntze = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio verruculosus Kuntze var. *dentatus* Kuntze = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio verruculosus Kuntze var. *subulatus* Kuntze = **Senecio miser** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio vervoorstii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 2200 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3126* (LIL)].

Senecio vidalii Phil. = **Senecio hakeifolius** Bertero ex DC. var. **vidalii** (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio vira-vira Hieron.
Sin.: *Senecio albicaulis* Hook. & Arn. var. *glabriusculus* Griseb., *Senecio argentinus* Baker, *Senecio montevidensis* auct. non (Spreng.) Baker, *Senecio pinnatus* Poir. var. *achalensis* Griseb., *Senecio sericeus* Kuntze var. *glabriusculus* (Griseb.) Kuntze, *Senecio sericeus* Kuntze var. *pinnatifidus* Kuntze

Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1957a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, LPA, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); URY(CAS, LAV, MAL, MON, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villar, A. D. 382* (LP)]; BRA[*Riedel, J. 942* (S)]; URY[*Chebataroff, J. 7116* (LP)].

Senecio virens Phil. = **Senecio acanthifolius** Hombr. & Jacq. subsp. **virens** (Phil.) Cabrera & Zardini
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio viridis Phil. var. **radiatus** R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 2500–3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 808* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 621* (CONC)].

Senecio viridis Phil. var. **viridis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Arbusto. Endémica. 3000–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9378* (LP)]; CHL[*Barros, E. 249* (LP)].

Senecio viscosissimus Colla
Sin.: *Cineraria humilis* Poepp., *Senecio hakeaefolius* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(II, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 347* (CONC)].

Senecio vittatus Reiche = **Senecio ctenophyllus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Senecio volckmannii Phil.
Sin.: *Senecio doñae-annae* Phil., *Senecio volckmannii* Phil. var. *lejocarpus* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Tortosa, R. D. & Bartoli, A., 2006.
Subarbusto. Nativa. 3300–4500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24402* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 232* (LP, SI)].

Senecio volckmannii Phil. var. *lejocarpus* Cabrera = **Senecio volckmannii** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio vukotinovici Schloss. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Senecio vulcanicus Phil., hom. illeg. = **Senecio chionophilus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio vulgaris L.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SCR, TDF); CHL(III, V, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alboff, N. 368* (LP)]; CHL[*Barros, E. 6098* (LP)]; URY[*Berro, M. B. s.n.* (LP)].

Senecio websteri Hook. f.
Sin.: *Senecio websteri* Hook. f. var. *subdiscoideus* A. Gray
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gallardo, C. s.n.* (LP)]; CHL[*Wilkes, C. s.n.* (GH)].

Senecio websteri Hook. f. var. *subdiscoideus* A. Gray = **Senecio websteri** Hook. f.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio werdermannii Greenm.
Sin.: *Senecio modestus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 7278* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 645* (LP, SI)].

Senecio wernerioides Wedd. = **Senecio breviscapus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio westermanii Dusén
Referencias: Cabrera, A. L., 1957a; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3265* (LP)].

Senecio williamsii Phil. = **Senecio poeppigii** Hook. & Arn. var. **poeppigii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio xanthocephalus Dusén = **Senecio fistulosus** Poepp. ex Less. var. **ochroleucus** (Hook. & Arn.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio xanthoxylon Phil. = **Senecio patagonicus** Hook. & Arn. var. **lobatifolius** (Hombr. & Jacq.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Senecio xerophilus Phil. var. **deserticola** (Cabrera) Cabrera
Sin.: *Senecio cremophilus* Phil., hom. illeg., *Senecio deserticola* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 4500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Senecio xerophilus Phil. var. **xerophilus**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Subarbusto. Endémica. 3100–4700 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (LP)]; CHL[*Werdermann, E. 1037* (LP, SI)].

Senecio yalae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14368* (LP)].

Senecio yegua (Colla) Cabrera var. **depilis** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var. *araeus* Phil., *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var. *depilis* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(IV, VI, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 221* (LP)].

Senecio yegua (Colla) Cabrera var. **pilotus** (Phil.) Cabrera
Sin.: *Acrisione denticulata* (Hook. & Arn.) B. Nord. var. *pilota* (Phil.) B. Nord., *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC. var. *pilotus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b; Marticorena, C., com. pers.; Nordenstam, B., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 706* (LP)].

Senecio yegua (Colla) Cabrera var. **yegua**
Sin.: *Acrisione denticulata* (Hook. & Arn.) B. Nord. var. *denticulata* , *Cacalia denticulata* Hook. & Arn., *Danaa yegua* Colla, *Senecio denticulatus* (Hook. & Arn.) DC., hom. illeg. , *Senecio ovalifolius* Turcz., *Senecio rancaguensis* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Nordenstam, B., 1985.
Arbusto. Endémica. 700–900 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gentili, M. 160* (LP)]; CHL[*Looser, G. 3747* (LP)].

Senecio zapahuirensis Martic. & Quezada
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 2100–3000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 7813* (CONC)].

Senecio zapalae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1200 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 37* (LP)].

Senecio zoellneri Martic. & Quezada
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 261* (CONC)].

Senecio zosterifolius Hook. & Arn.
Sin.: *Haplostichia stolonifera* Phil., *Senecio cotuloides* Reiche, *Senecio graminifolius* Phil., *Senecio potamogetonifolius* Sch. Bip. ex Phil., *Senecio uliginosus* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b, 1971a; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(V, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5826* (LP)]; CHL[*Hartwig, A. K. J. 198* (GH)].

Seriola andina DC., nom. nud. = **Hypochaeris arenaria** Gaudich.
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Seriola brasiliensis Less. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Seriola brasiliensis Less. var. *parviflora* Hook. & Arn. = **Hypochaeris microcephala** (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Seriola incana Hook. & Arn. = **Hypochaeris incana** (Hook. & Arn.) Macloskie var. **incana**
Referencias: Bortiri, E., 1999; Cabrera, A. L., 1971a.

Seriola petiolaris Hook. & Arn. = **Hypochaeris petiolaris** (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Seriola taraxacoides (Don) Hook. & Arn. = **Hypochaeris scorzonerae** (DC.) F. Muell. var. **glabrata** (DC.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1963b.

Seriola tenuifolia Hook. & Arn. = **Hypochaeris tenuifolia** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tenuifolia**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Seriola tweediei Hook. & Arn. = **Hypochaeris chillensis** (Kunth) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Seriphidium mendozanum (DC.) Bremer & Humphries = **Artemisia mendozana** DC. var. **mendozana**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Seris denticulata DC. = **Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b.

Serratula acutifolia Poir. = **Lucilia acutifolia** (Poir.) Cass.
Referencias: Freire, S. E., 1986b.

Serratula arvensis L. = **Cirsium arvense** (L.) Scop.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b.

Siegesbeckia L.

Número de especies: 2

Siegesbeckia cordifolia Kunth = **Siegesbeckia jorullensis** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Siegesbeckia jorullensis auct. non Kunth = **Siegesbeckia serrata** DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

[Siegesbeckia jorullensis Kunth]
Sin.: *Siegesbeckia cordifolia* Kunth
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Siegesbeckia mandonii Sch. Bip., nom. nud. = **Siegesbeckia serrata** DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Siegesbeckia orientalis L.
Referencias: Humbles, J. E., 1972.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17171* (LP, NY, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 30471* (MO, PY)].

Siegesbeckia serrata DC.
Sin.: *Siegesbeckia jorullensis* auct. non Kunth, *Siegesbeckia mandonii* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1993b, 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Schulz, D. L., 1987.
Hierba. Anual. Nativa. 1300–2900 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(V, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2612* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Sparre, B. B. 2223* (K)].

Silphium trilobatum L. = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Silybum Vaill. ex Adans.

Número de especies: 1 introducida

Silybum marianum (L.) Gaertn.
Sin.: *Carduus marianus* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Delucchi, G., 1998b; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Novara, L. J., 1993h; Troiani, H. O. & Steibel, P., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, TDF, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CLA, FLA, MAL, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 100* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 2336* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 244* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 495* (MVFA)].

Simsia Pers.

Número de especies: 1

Simsia dombeyana DC.
Sin.: *Encelia hirsuta* Kuntze, *Encelia hirsuta* Kuntze f. *radiata* Kuntze, *Simsia hirsuta* (Kuntze) S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Mondin, C. A., 2004a; Spooner, D. M., 1990.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11451* (CORD, MCNS)]; BRA[*Mondin, C. A. 2920* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 42467* (AS, MO)].

Simsia hirsuta (Kuntze) S.F. Blake = **Simsia dombeyana** DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Smallanthus Macloskie

Número de especies: 5, 2 endémicas

Smallanthus araucariophilus C.A. Mondin
Referencias: Mondin, C. A., 2004a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS).

Ejemplares de referencia: BRA[*Mondin, C. A. 2553* (HASU, ICN, PACA)].

Smallanthus connatus (Spreng.) H. Rob.
Sin.: *Gymnolomia connata* Spreng., *Polymnia andrei* Arechav., *Polymnia connata* (Spreng.) S.F. Blake, *Polymnia silphioides* DC., *Polymnia silphioides* DC. var. *perennis* Bettfr.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D. A., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Mondin, C. A., 2004a; Robinson, H. E., 1978a; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Sáenz, A. A., 1996; Zöllner, O., 1998.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V); PRY(APA); URY(ART, COL, MAL, PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 708* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44020* (CTES)]; CHL[*Zöllner, O. 22030* (SGO)]; PRY[*Zardini, E. M. 43810* (MO, PY)]; URY [*Berro, M. B. 4586* (MVFA)].

Smallanthus macroscyphus (Baker) A. Grau
Sin.: *Polymnia macroscypha* Baker
Referencias: Sáenz, A. A., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18154* (LP)].

Smallanthus riograndensis C.A. Mondin
Referencias: Mondin, C. A., 2004a, b.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mondin, C. A. 2653* (HASU, ICN, PACA)].

Smallanthus siegesbeckius (DC.) H. Rob.
Sin.: *Polymnia siegesbeckia* DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1978a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)]; PRY[*Zardini, E. M. 47372* (AS, MO)].

Solidago L.

Número de especies: 2, 1 endémica

Solidago chilensis Meyen var. **chilensis**
Sin.: *Solidago linearifolia* DC., *Solidago linearifolia* DC. var. *brachypoda* Speg., *Solidago microglossa* DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME); PRY(APY, COA); URY(ART, CAS, DUR, MAL, MON, PAY, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Torres Robles, S. 408* (LP)]; BRA[*Irmão, L. A. 38* (LP)]; CHL[*Maldonado, R. 57* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2938* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 5904* (LP)].

Solidago chilensis Meyen var. **megapotamica** (DC.) Cabrera
Sin.: *Solidago microglossa* DC., *Solidago microglossa* DC. var. *megapotamica* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Job, M. M. 81* (LP)]; BRA[*Kummrow, R. 442* (LP)]; PRY[*Simonis, J. E. 47* (LP)].

Solidago linearifolia DC. = **Solidago chilensis** Meyen var. **chilensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Solidago linearifolia DC. var. *brachypoda* Speg. = **Solidago chilensis** Meyen var. **chilensis**
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Solidago microglossa DC. = **Solidago chilensis** Meyen var. **megapotamica** (DC.) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Solidago microglossa DC. var. *linearifolia* (DC.) Baker = **Solidago chilensis** Meyen var. **chilensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Solidago microglossa DC. var. *megapotamica* DC. = **Solidago chilensis** Meyen var. **megapotamica** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Solidago patagonica Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(RNE); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5015* (LP)]; CHL[*Schlegel, F. 2211* (CONC)].

Soliva Ruiz & Pav.

Número de especies: 5, 3 endémicas

Soliva acaulis Hook. & Arn. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a, 1974a.

Soliva alata (Spreng.) DC. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br. ex Less.
Sin.: *Gymnostyles anthemifolia* Juss.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Novara, L. J., 1994c.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, COA, ITA); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 2892* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 6745* (LP)]; PRY[*Jorgensen, P. 4285* (LP)]; URY[*Herter, G. 775* (SI)].

Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br. ex Less. var. *acaulis* (Hook. & Arn.) Baker = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva barclayana DC. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva daucifolia Nutt. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva lusitanica (Spreng.) Less. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a.

Soliva macrocephala Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a, 1974a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, DFE, ERI, SFE); URY(ART, CAS, COL, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7217* (LP)]; URY[*Fabris, H. A. 42* (LP)].

Soliva mexicana DC. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960.

Soliva microloma Phil. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva minuta (L. f.) Sweet = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva nasturiifolia (Juss.) DC. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a.

Soliva neglecta Cabrera = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva pedicellata Ruiz & Pav. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960.

Soliva pedunculata Ruiz & Pav. ex Steud. = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1960.

Soliva pterosperma (Juss.) Less. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

Soliva pygmaea Kunth = **Cotula mexicana** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1960.

Soliva radiata Poepp. ex Less. = **Blennosperma chilense** Less.

Soliva sessilis Ruiz & Pav.
Sin.: *Gymnostyles alata* Spreng., *Gymnostyles barclayana* (DC.) Steud., *Gymnostyles pterosperma* Juss., *Soliva alata* (Spreng.) DC., *Soliva barclayana* DC., *Soliva daucifolia* Nutt., *Soliva microloma* Phil., *Soliva neglecta* Cabrera, *Soliva pterosperma* (Juss.) Less., *Soliva sessilis* Ruiz & Pav. var. *barclayana* (DC.) Baker, *Soliva valdiviana* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MIS, RNE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APA, CON, COA, GUA, MIE, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5917* (CTES)]; BRA[*Klein, R. M. 2577* (LP)]; CHL[*Cabrera, A. L. 12574* (LP)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5243* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 458* (LP)].

Soliva sessilis Ruiz & Pav. var. *barclayana* (DC.) Baker = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Soliva stolonifera (Brot.) R. Br. ex G. Don
Sin.: *Gymnostyles lusitanica* Spreng., *Gymnostyles nasturtiifolia* Juss., *Gymnostyles stolonifera* (Brot.) R. Br. ex G. Don, *Hippia stolonifera* Brot., *Soliva acaulis* Hook. & Arn., *Soliva anthemifolia* (Juss.) R. Br. ex Less. var. *acaulis* (Hook. & Arn.) Baker, *Soliva lusitanica* (Spreng.) Less., *Soliva nasturiifolia* (Juss.) DC., *Soliva urbica* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1949d, 1963a, 1974a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, DFE, ERI); CHL(VII, RME); URY(CAS, FLA, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 3349* (LP)]; CHL[*Barros, E. 1857* (LP)]; URY[*Herter, W. G. F. 87* (SI)].

Soliva tenella A. Cunn. = **Cotula australis** (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978.

Soliva triniifolia Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1949d.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabido, M. 20025* (CORD)].

Soliva urbica Phil. = **Soliva stolonifera** (Brot.) R. Br. ex G. Don

Soliva valdiviana Phil. = **Soliva sessilis** Ruiz & Pav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Sommerfeltia Less.

Número de especies: 2 endémicas

Sommerfeltia cabrerae Chebat.
Referencias: Chebataroff, J., 1981.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Sancho, G. 90* (LP)].

Sommerfeltia spinulosa (Spreng.) Less.
Sin.: *Conyza spinulosa* Spreng.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1963a; Nesom, G. L., 1994f; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4473* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 546* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 4016* (LP)].

Sonchus L.

Número de especies: 4 introducidas

Sonchus agrestis Sw. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Sonchus arvensis L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Ariza Espinar, L., 1967a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 10046* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 639* (CONC), *Moore, D. M. 2248* (LP)].

Sonchus asper (L.) Hill
Sin.: *Sonchus oleraceus* L. var. *asper* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF); BRA(SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, IJF, RME); PRY(GUA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1192* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 6911* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3590* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12677* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 531* (LP)].

Sonchus brasiliensis Meyen & Walp. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Sonchus erythropappus Meyen & Walp. ex Walp. = **Erechtites valerianifolius** (Wolf) DC. f. **valerianifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Sonchus laevis Sloane = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **hieraciifolius**
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Sonchus occidentalis Spreng. = **Erechtites hieraciifolius** (L.) Raf. ex DC. var. **cacalioides** (Fisch. ex Spreng.) Griseb.
Referencias: Belcher, R. O., 1956.

Sonchus oleraceus L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Marchesi, E., com. pers.; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, IDE, IJF, RME); PRY(APY, CAN); URY(CAS, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ringuelet, E. J. 646* (LP)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (LP)]; CHL[*Gunckel, L. H. 35718* (CONC)]; PRY[*Jörgensen, P. 7278* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 809* (MVFA)].

Sonchus oleraceus L. var. *asper* L. = **Sonchus asper** (L.) Hill
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Sonchus tenerrimus L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 801* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 469* (CONC)].

Spadonia cinerea Hook. = **Gochnatia orbiculata** (Malme) Cabrera
Referencias: Sancho, G., 2000.

Spadonia paniculata Less. = **Gochnatia paniculata** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Spadonia polymorpha Less. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Spadonia polymorpha Less. var. *ceanothifolia* Less. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 1996, 2000.

Spadonia polymorpha Less. var. *elaeagnifolia* Less. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 1996, 2000.

Spadonia polymorpha Less. var. *obtusifolia* Less. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **ceanothifolia** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 1996, 2000.

Spadonia polymorpha Less. var. *populifolia* Less. = **Gochnatia polymorpha** (Less.) Cabrera subsp. **polymorpha**
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Spadonia polymorpha Less. var. *sordida* Less. = **Gochnatia sordida** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971c; Sancho, G., 2000.

Sparganophorus vaillantii Crantz = **Struchium sparganophorum** (L.) Kuntze

Sphaerocephalus lagascae D. Don = **Nassauvia lagascae** (D. Don) F. Meigen var. **lagascae**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Sphagneticola O. Hoffm.

Número de especies: 2

Sphagneticola brachycarpa (Baker) Pruski
Sin.: *Aspilia callosa* Chodat, *Aspilia silphioides* (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. f. *parvifolia* Chodat, *Stemmodontia brachycarpa* (Baker) Morong, *Thelechitonia brachycarpa* (Baker) H. Rob. & Cuatrec., *Wedelia brachycarpa* Baker, *Wedelia callosa* (Chodat) B.L. Turner, *Wedelia pilosa* Baker, *Wedelia pilosa* Baker var. *brachycarpa* Hassl.
Referencias: Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005; Pruski, J. F., 1996; Robinson, H. E. & Cuatrecasas, J., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(SCA); PRY(CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 2314* (CORD)]; BRA[*Hatschbach, G. 49379* (NY)]; PRY[*Pérez, B. 1238* (AS, MO)].

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski
Sin.: *Complaya trilobata* (L.) Strother, *Silphium trilobatum* L., *Thelechitonia trilobata* (L.) H. Rob. & Cuatrec., *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc.
Referencias: Mondin, C. A., 2004a; Pruski, J. F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3560* (ICN, NY)].

Spilanthes Jacq.

Número de especies: 3, 1 endémica

Spilanthes affinis Hook. & Arn. = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Spilanthes alpestris Griseb. = **Acmella alpestris** (Griseb.) R.K. Jansen
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Spilanthes americana (L. f.) Hieron. = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes americana (L. f.) Hieron. f. *ciliatifolia* A.H. Moore = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes americana (L. f.) Hieron. f. *longiinternodiata* A.H. Moore = **Acmella pusilla** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes americana (L. f.) Hieron. var. *stolonifera* (DC.) A.H. Moore = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. f. *grisea* Chodat = **Acmella grisea** (Chodat) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. f. *minor* Chodat = **Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. f. *nervosa* Chodat = **Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. f. *setosa* Chodat = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. var. *grisea* (Chodat) Chodat = **Acmella grisea** (Chodat) R.K. Jansen

Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. var. *intermedia* Chodat = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. var. *leptophylla* (DC.) Baker = **Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arnicoides DC. var. *macropoda* (DC.) Baker = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes arrayana Gardner = **Acmella brachyglossa** Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes barinensis Aristeg. = **Spilanthes nervosa** Chodat
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Spilanthes bellidioides (Sm.) Cabrera = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes blepharicarpa DC. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes caespitosa DC. = **Acmella brachyglossa** Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes ciliata Kunth = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes decumbens (Sm.) A.H. Moore = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes decumbens (Sm.) A.H. Moore var. *leptophylla* (DC.) A.H. Moore = **Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes decumbens (Sm.) A.H. Moore var. *macropoda* (DC.) A.H. Moore = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes doronicoides DC. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes ecliptoides Gardner = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Spilanthes eggersii Hieron. = **Acmella brachyglossa** Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes eurycarena A.H. Moore = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes fimbriata Kunth = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes glaberrima Hassl. = **Acmella glaberrima** (Hassl.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes grandis DC. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore = **Acmella grisea** (Chodat) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore var. *chodatana* A.H. Moore = **Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore var. *intermedia* (Chodat) A.H. Moore = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore var. *micra* A.H. Moore = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes grisea (Chodat) A.H. Moore var. *setosa* (Chodat) A.H. Moore = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes helenioides Hook. & Arn. = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes karvinskiana DC. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Spilanthes leiocarpa DC.
Sin.: *Ceratocephalus leiocarpus* (DC.) Kuntze, *Spilanthes urens* Jacq. var. *hispidula* DC.
Referencias: Jansen, R. K., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Escobar A., H. 217x* (SI)].

Spilanthes leptophylla DC. = **Acmella leptophylla** (DC.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes limonica A.H. Moore = **Acmella brachyglossa** Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes longifolia DC. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes macropoda DC. = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes mariannae DC. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1968.

Spilanthes melampodioides Gardner = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes micralloeophylla A.H. Moore = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **affinis** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Spilanthes mutisii Kunth = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes nervosa Chodat
Sin.: *Spilanthes barinensis* Aristeg., *Spilanthes urens* Jacq. f. *ciliatifolia* Hassl., *Spilanthes urens* Jacq. f. *lanea* A.H. Moore, *Spilanthes urens* Jacq. var. *nervosa* (Chodat) Hassl.
Referencias: Jansen, R. K., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8274* (BM, F, G, GH, K, MICH, MO, MPU, NY, S, W)].

Spilanthes nitida La Llave & Lex. = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Spilanthes ocymifolia (Lam.) A.H. Moore f. *radiifera* A.H. Moore = **Acmella brachyglossa** Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes oppositifolia (Lam.) D'Arcy = **Acmella oppositifolia** (Lam.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes paraguayensis R.K. Jansen
Sin.: *Spilanthes urens* Jacq. var. *typica* Hassl.
Referencias: Jansen, R. K., 1981.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 2632* (BM, F, G, MPU)].

Spilanthes poeppigii DC. = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes popayanensis Hieron. = **Acmella ciliata** (Kunth) Cass.
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes pusilla Hook. & Arn. = **Acmella pusilla** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes sessilifolia Hemsl. = **Jaegeria hirta** (Lag.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Spilanthes sphaerocephala DC. = **Acmella bellidioides** (Sm.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes stenophylla Hook. & Arn. = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes stolonifera DC. = **Acmella decumbens** (Sm.) R.K. Jansen var. **decumbens**
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes stolonifera DC. var. *pusilla* (Hook. & Arn.) Baker = **Acmella pusilla** (Hook. & Arn.) R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1985.

Spilanthes urens Jacq. f. *ciliatifolia* Hassl. = **Spilanthes nervosa** Chodat
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Spilanthes urens Jacq. f. *lanea* A.H. Moore = **Spilanthes nervosa** Chodat
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Spilanthes urens Jacq. var. *hispidula* DC. = **Spilanthes leiocarpa** DC.
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Spilanthes urens Jacq. var. *nervosa* (Chodat) Hassl. = **Spilanthes nervosa** Chodat
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Spilanthes urens Jacq. var. *typica* Hassl. = **Spilanthes paraguayensis** R.K. Jansen
Referencias: Jansen, R. K., 1981.

Spilanthes wedelioides Hook. & Arn. = **Eclipta elliptica** DC.

Spirochaeta funckii Turcz. = **Pseudelephantopus spiralis** (Less.) Cronquist
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Spixia violacea Schrank = **Centratherum punctatum** Cass.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Kirkman, L. K., 1981.

Stachycephalum Sch. Bip. ex Benth.

Número de especies: 1 endémica

Stachycephalum argentinum Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 10967* (CORD)].

Stemmatella urticifolia (Kunth) O. Hoffm. = **Galinsoga urticifolia** (Kunth) Benth.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Stemmodontia brachycarpa (Baker) Morong = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Stenachaenium Benth.

Número de especies: 4

Stenachaenium adenanthum (Sch. Bip. ex Krasch.) Krasch.
Sin.: *Dichropappus adenanthus* Sch. Bip. ex Krasch.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 2361* (S)].

Stenachaenium campestre Baker
Sin.: *Stenachaenium macrocephalum* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Freire, S. E., 1995, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 12350* (LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 34226* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12918* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3913* (LP)].

Stenachaenium macrocephalum Griseb. = **Stenachaenium campestre** Baker
Referencias: Baker, J. G., 1882.

Stenachaenium megapotamicum (Spreng.) Baker f. **minor** Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6969* (G)].

Stenachaenium megapotamicum (Spreng.) Baker var. **megapotamicum**
Sin.: *Conyza megapotamica* Spreng., *Pluchea macrocephala* DC.
Referencias: Baker, J. G., 1882.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 14865* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 40536* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2478* (LP)].

Stenachaenium megapotamicum (Spreng.) Baker var. **pedunculata** Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4277* (G)].

Stenachaenium riedelii Baker
Referencias: Freire, S. E., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(LAV, MAL, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 11683* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 44144* (LP)]; PRY[*Montes, J. E. 12983* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 4461* (LP)].

Stenocephalum hexanthum Sch. Bip. = **Vernonia hexantha** (Sch. Bip.) Baker var. **hexantha**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Stenocephalum hystrix (Chodat) H. Rob. = **Vernonia hystrix** Chodat

Stenocephalum megapotamicum (Spreng.) Sch. Bip. = **Vernonia megapotamica** Spreng.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Stenocline gardneri Baker = **Achyrocline gardnerii** (Baker) Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005b.

Stenophalium gardneri (Baker) D.J.N. Hind = **Achyrocline gardnerii** (Baker) Deble & Marchiori
Referencias: Deble, L. P. & Marchiori, J. N. C., 2005b.

Stephananthus junceus Lehm. = **Baccharis juncea** (Lehm.) Desf.
Referencias: Giuliano, D. A., 2000.

Steriphe acerosa (Bertero ex Phil.) Phil. = **Haplopappus integerrimus** (Hook. & Arn.) H.M. Hall var. **integerrimus**
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Steriphe corymbosa Phil. = **Haplopappus pedunculosus** J. Remy
Referencias: Hall, H. M., 1928.

Steriphe navarri Phil. = **Haplopappus schumannii** (Kuntze) G.K. Br. & W.D. Clark
Referencias: Brown, G. K. & Clark, W. D., 1982.

Stevia Cav.

Número de especies: 65, 42 endémicas

Stevia achalensis Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 11913* (CORD)].

[Stevia adenophora Lag.]
Notas: Nombre dudoso.

Stevia alpina Griseb. var. **alpina**
Sin.: *Stevia grisebachiana* Hieron., *Stevia schickendantzii* Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19961* (LP)].

Stevia alpina Griseb. var. **glutinosa** Ariza & Cerana
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 19930* (CORD)].

Stevia alternifolia Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11372* (HBR, LP, US)].

Stevia amambayensis B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10111b* (BM, G)].

Stevia ammotropha B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CEN, MIE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9347* (BM, G, GH, LIL)].

Stevia amplexicaulis Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10111* (G)].

Stevia apensis B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 3387* (LP)].

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. & Arn. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval. , *Stevia polycephala* auct. non Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1974a, 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); PRY(APA, CAU, CON, COA, SPE); URY(ART, CAS, FLA, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8352* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5174* (G)]; URY[*Chebataroff, J. 11309* (LP)].

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval. = **Stevia aristata** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia aristata D. Don ex Hook. & Arn. var. *villaricensis* B.L. Rob. = **Stevia villaricensis** (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.

Stevia arnottiana Baker = **Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia balansae Hieron.
Sin.: *Stevia hassleriana* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23920* (LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4756* (G, SI)].

Stevia boliviensis Griseb., p.p. = **Stevia procumbens** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia boliviensis Griseb., p.p. = **Stevia vaga** Griseb. var. **effusa** (Hieron.) Ariza & Cerana
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia breviaristata Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia lorentzii* Griseb., *Stevia pubigera* Hieron., *Stevia schultzii* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978, 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 9062* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7370* (LP)].

Stevia burkartii B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1149* (LP, SI)]; URY[*Chebataroff, J. 5318* (LP)].

Stevia calycina DC. = **Eupatorium calyculatum** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia camachensis Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6967* (LP)].

Stevia camporum Griseb., hom. illeg. = **Stevia sanguinea** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia caraparíensis Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4200* (LP)].

Stevia catharinensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11534* (HBR, LP, US)]; PRY[*Basualdo, I. 1056* (G)].

Stevia centinelae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–2700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5136* (LP)].

Stevia chamaedrys Griseb. var. **chamaedrys**
Sin.: *Stevia nevadensis* Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 271* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 9931* (CONC)].

Stevia chamaedrys Griseb. var. **glandulifera** Ariza & Cerana
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 19200* (CORD)].

Stevia cinerascens Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Robinson, B. L., 1930.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(RNO, RIV, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 797* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11958* (HBR, US)]; URY[*Marchesi, E. 28191* (MVFA)].

Stevia clausseni Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Nativa. 900–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8409* (HBR, LP)].

Stevia commixta B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4946* (HBR, LP)]; PRY[*Hassler, E. 9033* (BM, G, LIL)].

Stevia congesta Hook. & Arn.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Marchesi, E. 18213* (MVFA)].

Stevia crassicephala Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–1800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20619* (LP)].

Stevia crenulata Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18770* (LP)].

Stevia cruziana Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1899, 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 786* (S)].

Stevia cuneata Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10286* (G, K)].

Stevia diversipapposa Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **vaga**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia diversipapposa Hieron. f. *breviaristata* Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **vaga**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia diversipapposa Hieron. f. *exaristata* Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **vaga**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia diversipapposa Hieron. f. *longiaristata* Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **vaga**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia effusa Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **effusa** (Hieron.) Ariza & Cerana
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia effusa Hieron. var. *saltensis* Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **saltensis** (Hieron.) Ariza & Cerana
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.

Stevia effusa Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval. = **Stevia vaga** Griseb. var. **effusa** (Hieron.) Ariza & Cerana
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia entreriensis Hieron.
Sin.: *Dissothrix hassleriana* Chodat, *Stevia entreriensis* Hieron. var. *minor* Hieron., *Stevia hirsuta* Griseb., hom. illeg., *Stevia oxylaena* DC. var. *villosa* Hieron., hom. illeg., *Stevia oxylaena* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1974a, 1996b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); PRY(APY, AMA, CON, COA, PAI, PHA); URY(COL, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22006* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4308* (G)]; URY[*Cabrera, A. L. 3922* (LP)].

Stevia entreriensis Hieron. var. *minor* Hieron. = **Stevia entreriensis** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.

Stevia estrellensis B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10196* (G, GH, K, LIL)].

Stevia fiebrigii Hieron. var. **fiebrigii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2300–2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4115* (LP)].

Stevia fiebrigii Hieron. var. *gracillima* B.L. Rob. = **Stevia fiebrigii** Hieron. var. **vattuonei** (Hicken) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia fiebrigii Hieron. var. **jujuiensis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–1800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4432* (LP)].

Stevia fiebrigii Hieron. var. **vattuonei** (Hicken) Cabrera
Sin.: *Stevia fiebrigii* Hieron. var. *gracillima* B.L. Rob., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. *vattuonei* Hicken
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1300 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 14041* (LP)].

[Stevia fruticosa Griseb.]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Nombre dudoso.

Stevia gardneriana Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Braga, R. 262* (LP)].

Stevia gilliesii Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Sin.: *Stevia arnottiana* Baker, *Stevia lanceolata* Hook. & Arn., hom. illeg., *Stevia tenuifolia* Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SDE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 5236* (CORD)].

Stevia gilliesii Hook. & Arn. var. **glandulosa** Ariza & Cerana
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 565* (CORD)].

Stevia gratioloides Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *gratioloides* (Hook. & Arn.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, DUR, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Palacios, M. A. 1140* (LP)]; URY[*Berro, M. B. 2482* (MVFA)].

Stevia grisebachiana Hieron. = **Stevia alpina** Griseb. var. **alpina**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia guaranitica Chodat = **Stevia leptophylla** Baker

Stevia hassleriana Chodat = **Stevia balansae** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.

Stevia hirsuta Griseb., hom. illeg. = **Stevia entreriensis** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia hirsuta Hook. & Arn. = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia hyssopifolia Phil., hom. illeg. = **Stevia philippiana** Hieron.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.

Stevia involucrata Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4503* (HBR, LP)].

Stevia jujuyensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.

Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 4242* (LP)].

Stevia lanceolata Hook. & Arn., hom. illeg. = **Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia laxa Hook. & Arn. = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia laxa Hook. & Arn. var. *curtula* Malme = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Malme, G. O. A., 1899.

Stevia leptophylla Baker
Sin.: *Stevia guaranitica* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13504* (LP)]; PRY[*Arbo, M. M. 1683* (CTES, SI)].

Stevia lilloi B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; Robinson, B. L., 1930.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1914* (MU, SI)].

Stevia linarifolia DC. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.

Stevia lorentzii Griseb. = **Stevia breviaristata** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia lundiana DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Robinson, B. L., 1930.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Llamas, A. s.n.* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 14199* (LP)].

[Stevia macbridei B.L. Rob.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Stevia maimarensis (Hieron.) Cabrera
Sin.: *Stevia mercedensis* Hieron. var. *glanditecta* B.L. Rob., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. *maimarensis* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11231* (CORD, MCNS), *Pozner, R. 247* (CTES, SI)].

Stevia megapotamica DC. = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia menthaefolia Sch. Bip.
Referencias: Baker, J. G., 1876b.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (LP)].

Stevia menthaefolia Phil., hom. illeg. = **Stevia philippiana** Hieron.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.

Stevia mercedensis Hieron. var. *glanditecta* B.L. Rob. = **Stevia maimarensis** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1978.

Stevia mercedensis Hieron. var. **mercedensis**
Sin.: *Stevia mercedensis* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 20451* (LP)].

Stevia mercedensis Hieron. var. **pereyrae** B.L. Rob.
Sin.: *Stevia pereyrae* (B.L. Rob.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13921* (LP)].

Stevia mercedensis Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval. = **Stevia mercedensis** Hieron. var. **mercedensis**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia minor Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 420* (CORD, GOET)].

Stevia multiaristata Griseb., hom. illeg. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia multiaristata Spreng.
Sin.: *Pectis violacea* Griseb., *Stevia hirsuta* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn., *Stevia laxa* Hook. & Arn. var. *curtula* Malme, *Stevia megapotamica* DC., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. *laxa* (Hook. & Arn.) Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. *multiaristata* (Spreng.) Baker, *Stevia violacea* (Griseb.) Hieron.

Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1974a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(CLA, COL, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23872* (SI)]; BRA[*Regnell, A. F. s.n.* (S)]; URY[*Cabrera, A. L. 4018* (LP)].

[Stevia multiaristata Spreng. var. latifolia Lorentz & Niederl.]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Nombre dudoso.

Stevia multiaristata Spreng. var. *patagonica* Hieron. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **patagonica** (Hieron.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia myriadenia Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Subarbusto. Nativa. 1000–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12367* (HBR)].

Stevia nevadensis Hieron. = **Stevia chamaedrys** Griseb. var. **chamaedrys**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia okadae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Endémica. 3400–3600 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Okada, K. A. 5863* (LP)].

Stevia ophryodonta B.L. Rob.
Referencias: Robinson, B. L., 1934b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Schroeder, J. 16325* (G)].

Stevia ophryophylla B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11983* (HBR, LP, US)].

Stevia oxylaena Griseb., hom. illeg. = **Stevia entreriensis** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia oxylaena DC. var. *villosa* Hieron., hom. illeg. = **Stevia entreriensis** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia parvifolia Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10960* (HBR, LP)]; PRY[*Hassler, E. 9979* (G, K, LIL)].

Stevia pereyrae (B.L. Rob.) Cabrera = **Stevia mercedensis** Hieron. var. **pereyrae** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia philippiana Hieron.
Sin.: *Stevia hyssopifolia* Phil., hom. illeg., *Stevia menthaefolia* Phil., hom. illeg.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 1600–1800 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 130* (CONC)].

Stevia pinifolia Phil. = **Ophryosporus pinifolius** (Phil.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972a.

Stevia pohliana Baker
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 8295* (S)].

Stevia polycephala auct. non Baker = **Stevia aristata** D. Don ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia potrerensis Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–1600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13021* (LP)].

Stevia procumbens Hieron.
Sin.: *Stevia boliviensis* Griseb., p.p.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–5000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25233* (LP)].

Stevia procumbens Hieron. var. *tucumanensis* Hieron. = **Stevia vaga** Griseb. var. **vaga**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia pubigera Hieron. = **Stevia breviaristata** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl., comb. superfl. = **Stevia rebaudiana** (Bertoni) Bertoni

Stevia rebaudiana (Bertoni) Bertoni
Sin.: *Eupatorium rebaudianum* Bertoni, *Stevia rebaudiana* (Bertoni) Hemsl., comb. superfl.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996b.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.

Países: PRY(AMA, CEN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 1057* (G)].

Stevia regnellii Sch. Bip.
Referencias: Baker, J. G., 1876b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18932* (LP)].

Stevia rojasii Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7822* (G)].

Stevia sabulonis B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(MIE); URY(MAL, RNO).
Ejemplares de referencia: PRY[*Chodat, R. H. 373* (G)]; URY[*Chebataroff, J. 3654* (LP)].

Stevia saltensis Hieron. = **Stevia yaconensis** Hieron. var. **saltensis** (Hieron.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia sanguinea Hieron.
Sin.: *Stevia camporum* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. *angustifolia* Baker = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. *genuina* Hieron., nom. inval. = **Stevia satureiifolia** (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. *laxa* (Hook. & Arn.) Baker = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. *maimarensis* Hieron. = **Stevia maimarensis** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1963; Cabrera, A. L., 1978.

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. *multiaristata* (Spreng.) Baker = **Stevia multiaristata** Spreng.

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. **patagonica** (Hieron.) Hieron.
Sin.: *Stevia multiaristata* Spreng. var. *patagonica* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a.
Subarbusto. Endémica. 300–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Berg, C. C. 120* (LP)].

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. **satureiifolia**
Sin.: *Eupatorium satureiifolium* Lam., *Mikania satureiifolia* (Lam.) Willd., *Nothites satureiifolia* (Lam.) DC., *Stevia linarifolia* DC., *Stevia multiaristata* Griseb., hom. illeg., *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. *angustifolia* Baker, *Stevia satureiifolia* (Lam.) Sch. Bip. var. *genuina* Hieron., nom. inval.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.
Subarbusto. Endémica. 200–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, SDE, SLU); BRA(PAR, RGS); URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1257* (SI)]; BRA[*Irmão, L. A. s.n.* (LP)]; URY[*Alonso Paz, E. 3606* (MVFQ)].

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. *vattuonei* Hicken = **Stevia fiebrigii** Hieron. var. **vattuonei** (Hicken) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia satureiifolia (Lam.) Sch. Bip. var. **ventanensis** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1963a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8124* (LP)].

Stevia schickendantzii Hieron. = **Stevia alpina** Griseb. var. **alpina**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia schreiteri B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3637* (LP)].

Stevia schultzii Hieron. = **Stevia breviaristata** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia selloi (Spreng.) B.L. Rob.
Sin.: *Kleinia selloi* Spreng., *Stevia selloi* (Spreng.) B.L. Rob. var. *ypacarayensis* B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989; Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(MAL, RIV).

Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 860* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 11461* (HBR, LP, US)]; PRY[*Woolston, A. L. 1105* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 2465* (LP)].

Stevia selloi (Spreng.) B.L. Rob. var. *ypacarayensis* B.L. Rob. = **Stevia selloi** (Spreng.) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996b.

Stevia spathulata Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1993c, 1996b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 498* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 9537* (G)].

Stevia tarijensis Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21474* (LP)].

Stevia tenuifolia Phil. = **Stevia gilliesii** Hook. & Arn. var. **gilliesii**
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia tenuis Hook. & Arn.
Sin.: *Stevia veronicae* DC. var. *tenuis* (Hook. & Arn.) Baker
Referencias: Baker, J. G., 1876b; Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6431* (HBR, LP)].

Stevia vaga Griseb. var. **effusa** (Hieron.) Ariza & Cerana
Sin.: *Stevia boliviensis* Griseb., p.p., *Stevia effusa* Hieron., *Stevia effusa* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Subarbusto. Endémica. 1400–1600 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2592* (CORD, CTES, SI)].

Stevia vaga Griseb. var. **saltensis** (Hieron.) Ariza & Cerana
Sin.: *Stevia effusa* Hieron. var. *saltensis* Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8156* (LP)].

Stevia vaga Griseb. var. **vaga**
Sin.: *Stevia diversipapposa* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f. *breviaristata* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f. *exaristata* Hieron., *Stevia diversipapposa* Hieron. f. *longiaristata* Hieron., *Stevia procumbens* Hieron. var. *tucumanensis* Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Robinson, B. L., 1930.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 13884* (CORD)].

Stevia veronicae DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11304* (LP)].

[Stevia veronicae DC. var. erythrochaeta DC.]
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Stevia veronicae DC. var. *gratioloides* (Hook. & Arn.) Baker = **Stevia gratioloides** Hook. & Arn.
Referencias: Malme, G. O. A., 1931.

Stevia veronicae DC. var. *tenuis* (Hook. & Arn.) Baker = **Stevia tenuis** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1989.

Stevia villaricensis (B.L. Rob.) Cabrera & Vittet
Sin.: *Stevia aristata* D. Don ex Hook. & Arn. var. *villaricensis* B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. s.n.* (LP)]; PRY[*Jörgensen, P. 4267* (GH, LIL, LP, SI)].

Stevia violacea (Griseb.) Hieron. = **Stevia multiaristata** Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stevia yacoensis Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval. = **Stevia yaconensis** Hieron. var. **yaconensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954.

Stevia yaconensis Hieron. var. **aristifera** B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; Robinson, B. L., 1930.
Hierba. Perenne. Nativa. 2200–2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18273* (LP)].

Stevia yaconensis Hieron. var. **saltensis** (Hieron.) B.L. Rob.
Sin.: *Stevia saltensis* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978; Robinson, B. L., 1930.
Hierba. Perenne. Nativa. 1200–2100 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6590* (SI)].

Stevia yaconensis Hieron. var. **subeglandulosa** Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14457* (LP)].

Stevia yaconensis Hieron. var. **yaconensis**
Sin.: *Stevia yacoensis* Hieron. var. *typica* B.L. Rob., nom. inval.
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1954; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14648* (LP)].

Stevia yalae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997; Cabrera, A. L., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19952* (LP)].

Steyermarkia dispalata (Gardner) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium dispalatum** Gardner

Steyermarkia dusenii (Malme) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium dusenii** Malme

Steyermarkia pyrifolia (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium pyrifolium** DC.

Stilpnopappus Mart. ex DC.

Número de especies: 1

Stilpnopappus regnellii Baker
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15991* (S)].

Stomatanthes oblongifolius (Spreng.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium oblongifolium** (Spreng.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1997.

Stomatanthes subcapitatus (Malme) H. Rob. = **Eupatorium subcapitatum** Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1996f.

Strongyloma axillare (Lag. ex Lindl.) DC. = **Nassauvia axillaris** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Strongyloma glomerulosum (Lag.) DC. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Strongyloma struthionum Phil. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Strongylomopsis fuegiana Speg. = **Nassauvia fuegiana** (Speg.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Strongylosperma australe (Sieber ex Spreng.) Less. = **Cotula australis** (Sieber ex Spreng.) Hook. f.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a, 1978; Caro, J. A., 1961b.

Struchium P. Browne

Número de especies: 1 introducida

Struchium sparganophorum (L.) Kuntze
Sin.: *Ethulia sparganophora* L., *Sparganophorus vaillantii* Crantz
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1130* (HBR, LP)].

Stuckertiella Beauverd

Número de especies: 2, 1 endémica

Stuckertiella capitata (Wedd.) Beauverd
Sin.: *Gamochaeta capitata* Wedd., *Gamochaeta weddelliana* (Rusby) Anderb., *Gnaphalium capitatum* (Wedd.) Griseb., hom. illeg., *Gnaphalium weddellianum* Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5229* (LP)].

Stuckertiella peregrina Beauverd
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Freire, S. E., 1995.
Hierba. Anual. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4814* (LP)].

Stylesia ambrosioides (Lag.) Nutt. = **Bahia ambrosioides** Lag.
Referencias: Ellison, W. L., 1964.

Stylesia puberula Nutt. = **Bahia ambrosioides** Lag.
Referencias: Ellison, W. L., 1964.

Symphipappus casarettoi B.L. Rob. = **Eupatorium casarettoi** (B.L. Rob.) Steyerm.

Symphipappus catharinensis (Cabrera) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium catharinense** Cabrera

Symphipappus itatayensis (Hieron.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium itatiayense** Hieron.

Symphipappus leptophlebius B.L. Rob. = **Eupatorium leptophlebium** (B.L. Rob.) Steyerm.

Symphipappus lymansmithii B.L. Rob. = **Eupatorium lymansmithii** (B.L. Rob.) Steyerm.

Symphipappus polystachyus Baker var. *microcephala* Baker = **Eupatorium itatiayense** Hieron.

Symphipappus reticulatus Baker var. *vernicosus* Baker = **Eupatorium reitzii** Cabrera

Symphyopappus compressum (Gardner) B.L. Rob.
= **Eupatorium compressum** Gardner

Symphyopappus cuneatus (DC.) Sch. Bip. ex Baker
= **Eupatorium cuneatum** DC.

Symphyotrichum G.L. Nesom

Número de especies: 7, 4 endémicas

Symphyotrichum glabrifolium (DC.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster glabrifolius* (DC.) Reiche, *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *australis* (Phil.) Reiche, *Erigeron australis* Phil., *Erigeron glabrifolius* DC., *Erigeron scorzoneraefolium* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Nesom, G. L., 1994c; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 15703* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20017* (CONC)].

Symphyotrichum graminifolium (Spreng.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster cabrerae* Ariza, *Aster divaricatus* Baker var. *graminifolius* (Spreng.) Baker, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron. var. *graminifolius* (Spreng.) Hieron., *Conyza graminifolia* Spreng., *Conyzanthus graminifolius* (Spreng.) Tamamsch.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2001; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Fontana, J. L., 1998; Nesom, G. L., 1994c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY); URY(CAS, FLA, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12422* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 36244* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 3654* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 755-b* (LP)].

Symphyotrichum patagonicum (Cabrera) G.L. Nesom
Sin.: *Aster patagonicus* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Nesom, G. L., 1994c.
Hierba. Anual. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25925* (LP)].

Symphyotrichum peteroanum (Phil.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster peteroanus* Phil., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *latifolius* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C., com. pers.; Nesom, G. L., 1994c.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5135* (LP)]; CHL[*Burkart, A. 9502* (LP)].

Symphyotrichum regnellii (Baker) G.L. Nesom
Sin.: *Aster regnellii* Baker, *Erigeron regnelli* Sch. Bip., nom. nud.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Nesom, G. L., 1994c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25356* (CTES, LP)]; BRA[*Smith, L. B. 12235* (LP)].

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster asteroides* (Colla) Rusby, *Aster divaricatus* Baker, hom. illeg., *Aster exilis* Elliott var. *australis* A. Gray, *Aster linifolius* Griseb., hom. illeg., *Aster moelleri* (Phil.) Reiche, *Aster squamatus* (Spreng.) Hieron., *Aster subtropicus* Morong, *Baccharis asteroides* Colla, *Conyza berteroana* Phil., *Conyza squamata* Spreng., *Conyzanthus squamatus* (Spreng.) Tamamsch., *Erigeron depilis* Phil., *Erigeron semiamplexicaule* Meyen, *Tripolium conspicuum* J. Remy, *Tripolium moelleri* Phil., *Tripolium oliganthum* Phil., *Tripolium subulatum* Nees & Mart. var. *brasilianum* DC.
Referencias: Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Malme, G. O. A., 1933b; Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME); PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MON, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Job, M. M. s.n.* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 12047* (LP)]; CHL[*Barros, E. 9036* (LP)]; PRY[*Jiménez, L. 11089* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 915* (LP)].

Symphyotrichum vahlii (Gaudich.) G.L. Nesom var. **tenuifolium** (Phil.) G.L. Nesom
Sin.: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *tenuifolius* (Phil.) Cabrera, *Aster zosterifolius* Reiche, *Erigeron pugae* Phil., *Tripolium tenuifolium* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a; Nesom, G. L., 1994c.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6070* (LP)]; CHL[*Hollermayer, A. 814* (LP)].

Symphyotrichum vahlii (Gaudich.) G.L. Nesom var. **vahlii**
Sin.: *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn., *Aster vahlii* (Gaudich.) Hook. & Arn. var. *robusta* De Wild., *Erigeron graminifolius* Phil., *Erigeron vahlii* Gaudich., *Erigeron vahlii* Gaudich. var. *robusta* Albov
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., 1971a; Cuatrecasas, J., 1969b; Nesom, G. L., 1994c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6085* (LP)]; CHL[*Maldonado-Bruzzone, R. 148* (LP)].

Synedrella Gaertn.

Número de especies: 1

Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.
Sin.: *Ucacou nodiflorum* (L.) Hitchc., *Verbesina nodiflora* L.

Referencias: Turner, B. L., 1994b.
Hierba. Anual. Nativa. 300–600 m.
Países: BRA(SCA); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sáenz, A. A. s.n.* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 41753* (MO, PY)].

Synedrellopsis Hieron. & Kuntze

Número de especies: 1

Synedrellopsis grisebachii Hieron. & Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Muñoz, J. D., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SLU, TUC); PRY(APY, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 14314* (CORD)]; PRY[*Vanni, R. O. 2070* (CTES)].

Tagetes L.

Número de especies: 13, 8 endémicas

Tagetes andina M. Ferraro = **Tagetes multiflora** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes anisata Lillo = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes argentina Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Gutiérrez, D. G. & Katinas, L., 2003; Neher, R. T., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16582* (LP)].

[Tagetes arvensis Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Tagetes belenidium (DC.) Kuntze = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Tagetes biflora Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Neher, R. T., 1965; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU, SLU); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12607* (LP)]; CHL[*Parror, E. 2044* (LP)].

Tagetes bonariensis Pers. = **Tagetes minuta** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes cabrerae M. Ferraro = **Tagetes terniflora** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes campanulata Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Gutiérrez, D. G. & Katinas, L., 2003; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Subarbusto. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22052* (LP)].

Tagetes dichotoma Turcz. = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes erythrocephala Rusby = **Tagetes multiflora** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes feuillei Bertero ex Colla = **Lasthenia kunthii** (Less.) Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1995a; Ornduff, R., 1966; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Tagetes filifolia Lag.
Sin.: *Diglossus variabilis* Cass., *Tagetes anisata* Lillo, *Tagetes dichotoma* Turcz., *Tagetes foeniculacea* Poepp. ex DC., *Tagetes multifida* DC., *Tagetes pauciloba* DC., *Tagetes pseudomicrantha* Lillo, *Tagetes pusilla* Kunth, *Tagetes scabra* Brandegee, *Tagetes silenoides* Meyen & Walp.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Neher, R. T., 1965; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–4400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7835* (LP)].

Tagetes foeniculacea Poepp. ex DC. = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes gigantea Carrière = **Tagetes terniflora** Kunth
Referencias: Neher, R. T., 1965.

Tagetes glandulifera Schrank = **Tagetes minuta** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes glandulosa Link = **Tagetes minuta** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes graveolens L'Hér. ex DC. = **Tagetes terniflora** Kunth
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes integrifolia Muschl. = **Porophyllum ruderale** (Jacq.) Cass.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes laxa Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 123* (LP)].

Tagetes mendocina Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Subarbusto. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).

Ejemplares de referencia: ARG[*Volponi, C. R. 454* (LP)].
Notas: Citada para la Región Metropolitana, Chile, sin indicar ejemplar de referencia (Neher, 1965; Petenatti & Ariza Espinar, 1997).

Tagetes minuta L.
Sin.: *Tagetes bonariensis* Pers., *Tagetes glandulifera* Schrank, *Tagetes glandulosa* Link, *Tagetes porophyllum* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L., et al., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Malme, G. O. A., 1931, 1933b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.; Neher, R. T., 1965.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, RME); PRY(APY, AMA, COA, PHA); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 2340* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 541* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 1768* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 6766* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3293* (LP)].

Tagetes multifida DC. = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Keil, D. J., 1975.

Tagetes multiflora Kunth
Sin.: *Tagetes andina* M. Ferraro, *Tagetes erythrocephala* Rusby, *Tagetes multiflora* Kunth var. *rupestris* Wedd.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Cabrera, A. L., 1978; Neher, R. T., 1965; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 3945* (LP)]; CHL[*Martin, H. C. 581* (LP)].

Tagetes multiflora Kunth var. *rupestris* Wedd. = **Tagetes multiflora** Kunth
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Tagetes ostenii Hicken
Referencias: Deble, L. P., Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C., 2005a; Neher, R. T., 1965.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Souza, M. L. s.n.* (FLOR, ICN)]; URY[*Osten, C. 5463* (SI)].

Tagetes papposa Vent. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Tagetes pauciloba DC. = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Keil, D. J., 1975.

Tagetes perezii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Subarbusto. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9415* (LP, SI)].

Tagetes porophyllum Vell. = **Tagetes minuta** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes pseudomicrantha Lillo = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes pumila Willd., nom. illeg. = **Dyssodia papposa** (Vent.) Hitchc.
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Tagetes pusilla Kunth = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes riojana M. Ferraro
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Ferraro, M., 1955; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Frenguelli, J. 511* (LP)].

Tagetes rotundifolia Mill. = **Tithonia rotundifolia** (Mill.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; La Duke, J. C., 1982; Zardini, E. M., 1974.

Tagetes rupestris Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937a; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–2600 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 470* (LP)].

Tagetes scabra Brandegee = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Keil, D. J., 1975.

Tagetes silenoides Meyen & Walp. = **Tagetes filifolia** Lag.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b.

Tagetes terniflora Kunth
Sin.: *Tagetes cabrerae* M. Ferraro, *Tagetes gigantea* Carrière, *Tagetes graveolens* L'Hér. ex DC., *Tagetes tinctoria* Walp.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1967b; Cabrera, A. L., 1978; Neher, R. T., 1965; Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 700–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 35* (LP)].

Tagetes tinctoria Walp. = **Tagetes terniflora** Kunth
Referencias: Neher, R. T., 1965.

Tanacetum L.

Número de especies: 3 introducidas

Tanacetum balsamita L.
Sin.: *Balsamita major* Desf., *Chrysanthemum balsamita* L., hom. illeg., *Chrysanthemum balsamitoides* Nábelek, *Leucanthemum balsamita* (L.) Over, *Matricaria balsamita* (L.) Desr., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd., *Pyrethrum balsamita* (L.) Willd. var. *tanacetoides* Boiss., *Pyrethrum balsamitoides* (Nábelek) Tzvelev,

Pyrethrum majus (Desf.) Tzvelev, *Pyrethrum tanacetum* DC., *Tanacetum balsamita* L. subsp. *balsamitoides* (Sch. Bip.) Grierson, *Tanacetum balsamitoides* Sch. Bip.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, LPA, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 3115* (LP)].

Tanacetum balsamita L. subsp. *balsamitoides* (Sch. Bip.) Grierson = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Tanacetum balsamitoides Sch. Bip. = **Tanacetum balsamita** L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Tanacetum leucanthemum (L.) Sch. Bip. = **Leucanthemum vulgare** Lam.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
Sin.: *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh., *Leucanthemum parthenium* (L.) Gren. & Godr., *Matricaria parthenium* L., *Pyrethrum parthenium* (L.) Sm.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., 1939a, 1963a, 1971a, 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983; Novara, L. J., 1994c.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23201* (LP)]; BRA[*Loureiro, M. L. 465* (LP)]; CHL[*Barros, E. 3445* (LP)]; URY[*Burkart, A. 19988* (SI)].

Tanacetum vulgare L.
Sin.: *Chrysanthemum vulgare* (L.) Bernh., *Pyrethrum vulgare* (L.) Boiss.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Novara, L. J., 1994c.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, DFE, MEN, NEU, RNE, SAL, TDF, TUC); BRA(PAR); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(COL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 594* (LP)]; BRA[*Cordeiro, J. 1162* (MBM)]; CHL[*Barros, E. 6155* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 3849* (LP)].

Taraxacum Weber ex F.H. Wigg.

Número de especies: 12, 3 endémicas, 6 introducidas

Taraxacum andinum Dahlst. = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex H. Lindb.
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Soest, J. L. s.n.* (L)].

Taraxacum copidophyllum Dahlst.
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Soest, J. L. s.n.* (L)].

Taraxacum coronopifolium d'Urv. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1971a.

Taraxacum cuzcense A.J. Richards
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–3700 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Holway, E. W. D. s.n.* (US)].

Taraxacum dens-leonis Desf. = **Taraxacum officinale** G. Weber ex F.H. Wigg.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum dens-leonis Desf. var. *laevigatum* (Willd.) Hook. = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser = **Taraxacum laevigatum** (Willd.) DC.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum fernandezianum Dahlst.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(NEU, SAL); BRA(PAR, SCA); CHL(IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, A. 67* (L)]; BRA[*Smith, L. B. 8794* (US)]; CHL[*Soest, J. L. s.n.* (L)].

Taraxacum gilliesii Hook. & Arn.
Sin.: *Taraxacum andinum* Dahlst., *Taraxacum dens-leonis* Desf. var. *laevigatum* (Willd.) Hook., *Taraxacum ibari* Phil., *Taraxacum laevigatum* (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche, *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip., *Taraxacum magellanicum* Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst., *Taraxacum rhusiocarpum* Dahlst.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Cabrera, A. L., 1971a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)]; CHL[*Schwabe, H. 2131* (LP)].

Taraxacum ibari Phil. = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC.
Sin.: *Leontodon laevigatus* Willd., *Taraxacum erythrospermum* Andrz. ex Besser
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Marzocca s.n.* (BAB)].

Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. var. *magellanicum* (Comm. ex Sch. Bip.) Reiche = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum magellanicum Comm. ex Sch. Bip. = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum magellanicum Comm. ex Sch. Bip. var. *lobatum* Dahlst. = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum marklundii Palmgr.
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Introducida. 500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Soest, J. L. s.n.* (L)].

Taraxacum officinale G. Weber ex F.H. Wigg.
Sin.: *Leontodon taraxacum* L., *Leontodon vulgare* Lam., *Taraxacum dens-leonis* Desf., *Taraxacum subspathulatum* A.J. Richards, *Taraxacum vulgare* (Lam.) Schrank
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a; Marchesi, E., com. pers.; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); PRY(APA, CAA, GUA); URY(CAS, MON, RNO, ROC, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 77* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 15199* (LP)]; CHL[*Fernández, J. s.n.* (LP), *Matthei, O. R. 530* (CONC)]; PRY[*Schinini, A. 27034* (CTES)]; URY[*Felippone, F. 2809* (SI)].

Taraxacum patagonicum Uhlemann
Referencias: Uhlemann, I., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Uhlemann, I. s.n.* (DR)].

Taraxacum plumbeum Dahlst.
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Introducida. 500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Soest, J. L. s.n.* (L)].

Taraxacum pumilum Gaudich. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Taraxacum raunkiaerii Wiinst.
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 1835* (MICH)].

Taraxacum rhusiocarpum Dahlst. = **Taraxacum gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum subspathulatum A.J. Richards = **Taraxacum officinale** G. Weber ex F.H. Wigg.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Taraxacum vatisectum Markl.
Referencias: Richards, A. J., 1976.
Hierba. Perenne. Introducida. 500 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Soest, J. L. s.n.* (L)].

Taraxacum vulgare (Lam.) Schrank = **Taraxacum officinale** G. Weber ex F.H. Wigg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Terranea fernandezia Colla = **Erigeron fernandezius** (Colla) Harling
Referencias: Solbrig, O. T., 1962.

Tessaria Ruiz & Pav.

Número de especies: 4

Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.
Sin.: *Baccharis absinthioides* Hook. & Arn., *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Pluchea absinthioides* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ariza Espinar, L., 1979; Augusto, I., 1946; Cabrera, A. L., 1939b, 1963a, 1971a, 1978; Freire, S. E., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, RME); PRY(COA); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ringuelet, E. J. 581* (LP)]; BRA[*Augusto, I. s.n.* (ICN)]; CHL[*Barros, E. 91* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 35* (G)]; URY[*Cabrera, A. L. 7125* (LP)].

Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. var. *ambigua* (DC.) R.E. Fr. = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **ambigua** (DC.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1997.

Tessaria ambigua DC. = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **ambigua** (DC.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1997.

Tessaria ambigua DC. var. *uniflora* Cuatrec. = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **integrifolia**
Referencias: Cuatrecasas, J., 1935.

Tessaria dentata Ruiz & Pav. = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **integrifolia**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b.

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**
Sin.: *Conyza straminea* Chodat, *Eupatorium dodoneifolium* Hook. & Arn., *Pluchea dodoneifolia* (Hook. & Arn.) H. Rob. & Cuatrec., *Tessaria straminea* (Chodat) Hassl., *Tessaria viscosa* Lillo
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b, 1974a, 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E., 1995, 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(CEN, PHA); URY(COL, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 20692* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 11564* (LP)]; URY[*Chebataroff, J. 8022* (LP)].

Tessaria dodoneifolia (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **plucheoides** (Hassl.) S.E. Freire
Sin.: *Tessaria plucheoides* Hassl.
Referencias: Freire, S. E., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: PRY(CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 9527* (G, LP)].

Tessaria fastigiata (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Pluchea fastigiata* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1995, 1998.
Subarbusto. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4111* (LP)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 4428* (MO)].

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. **ambigua** (DC.) S.E. Freire
Sin.: *Tessaria absinthioides* (Hook. & Arn.) DC. var. *ambigua* (DC.) R.E. Fr., *Tessaria ambigua* DC., *Tessaria integrifolia* Ruiz & Pav. var. *polyandra* Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E., 1997, 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 19332* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 27* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 5292* (LP)].

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. **integrifolia**
Sin.: *Gynheteria incana* Spreng., p.p., *Tessaria ambigua* DC. var. *uniflora* Cuatrec., *Tessaria dentata* Ruiz & Pav., *Tessaria legitima* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b, 1963a, 1974a; Cuatrecasas, J., 1935; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Freire, S. E., 1995, 1998; Marchesi, E., com. pers.; Robinson, H. E. & Cuatrecasas, J., 1973.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castiglioni, J. A. 2960* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 8750* (LP)]; URY[*Izaguirre, P. 21270* (MVFA)].

Tessaria integrifolia Ruiz & Pav. var. *polyandra* Cabrera = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **ambigua** (DC.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1997.

Tessaria legitima DC. = **Tessaria integrifolia** Ruiz & Pav. var. **integrifolia**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b.

Tessaria plucheoides Hassl. = **Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **plucheoides** (Hassl.) S.E. Freire
Referencias: Freire, S. E., 1998.

Tessaria straminea (Chodat) Hassl. = **Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b.

Tessaria viscosa Lillo = **Tessaria dodoneifolia** (Hook. & Arn.) Cabrera subsp. **dodoneifolia**
Referencias: Ariza Espinar, L., 1979; Cabrera, A. L., 1939b.

Thamnoseris F. Phil.

Número de especies: 1 endémica

Thamnoseris lacerata (Phil.) F. Phil. f. **lacerata**
Sin.: *Dendroseris lacerata* (Phil.) Hemsley; *Rea lacerata* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1935b; Marticorena, C. & Quesada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–200 m
Países: CHL (IDE).
Ejemplares de referencia: *Simpson s.n.* (SGO).

Thamnoseris lacerata (Phil.) F. Phil. f. **lobata** (I.M. Johnst.) Skottsb.
Sin: *Thamnoseris lobata* I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1935b; Marticorena, C. & Quesada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–200 m
Países: CHL (IDE).
Ejemplares de referencia: *Vidal s.n.* (SGO).

Thamnoseris lobata I.M. Johnst. = **Thamnoseris lacerata** (Phil.) F. Phil. f. **lobata** (I.M. Johnst.) Skottsb.

Thelechitonia brachycarpa (Baker) H. Rob. & Cuatrec. = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Thelechitonia trilobata (L.) H. Rob. & Cuatrec. = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Thelesperma Less.

Número de especies: 1

Thelesperma gracile (Torr.) A. Gray = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Thelesperma megapotamicum (Spreng.) Herter, comb. superfl. = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Thelesperma megapotamicum (Spreng.) Kuntze
Sin.: *Bidens gracilis* Torr., *Bidens leyboldii* Phil., *Bidens megapotamica* Spreng., *Bidens paradoxa* Don ex Hook. & Arn., *Isostigma megapotamicum* (Spreng.) Sherff, *Thelesperma gracile* (Torr.) A. Gray, *Thelesperma megapotamicum* (Spreng.) Herter, comb. superfl., *Thelesperma scabiosoides* Less.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1971a, 1974a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SDE, SFE, SLU); URY (COL, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 14814* (CORD), *Pozner, R. 172* (CTES, SI)]; URY [*Marchesi, E. 26985* (MVFA)].

Thelesperma scabiosoides Less. = **Thelesperma megapotamicum** (Spreng.) Kuntze
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Thrincia hirta Roth = **Leontodon hirtus** L.

Thymophylla Lag.

Número de especies: 1

Thymophylla belenidium (DC.) Cabrera = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Thymophylla gracilis Rydb. = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Thymophylla pentachaeta (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Sin.: *Dyssodia belenidium* (DC.) Macloskie, *Dyssodia belenidium* (DC.) O. Hoffm., *Dyssodia cupulata* A. Nelson, *Dyssodia gracilis* (Rydb.) Cory, *Dyssodia pentachaeta* (DC.) B.L. Rob. var. *belenidium* (DC.) Strother, *Dyssodia thurberi* (A. Gray) B.L. Rob., *Hymenatherum belenidium* DC., *Hymenatherum candolleanum* Hook. & Arn., *Hymenatherum thurberi* A. Gray, *Tagetes belenidium* (DC.) Kuntze, *Thymophylla belenidium* (DC.) Cabrera, *Thymophylla gracilis* Rydb., *Thymophylla thurberi* (A. Gray) Wooton & Standl.
Referencias: Novara, L. J. & Petenatti, E. M., 2000; Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997; Strother, J. L., 1969, 1986.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hirschkorn, J. 677* (LP)].

Thymophylla thurberi (A. Gray) Wooton & Standl. = **Thymophylla pentachaeta** (DC.) Small var. **belenidium** (DC.) Strother
Referencias: Strother, J. L., 1969.

Thyrsanthema chilensis (DC.) Kuntze = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **chilensis** (DC.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Thyrsanthema ebracteata Kuntze = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Thyrsanthema nutans (L.) Kuntze = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tilesia G. Mey.

Número de especies: 1

Tilesia baccata (L. f.) Pruski
Sin.: *Coreopsis baccata* L. f., *Wulffia baccata* (L. f.) Kuntze, *Wulffia platyglossa* DC., *Wulffia stenoglossa* DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2075* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 23483* (LP)]; PRY[*Krapovickas, A. 12526* (CTES, LP)].

Tithonia Desf. ex Juss.

Número de especies: 2 introducidas

Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake
Sin.: *Tagetes rotundifolia* Mill., *Tithonia uniflora* J.F. Gmel.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; La Duke, J. C., 1982; Zardini, E. M., 1974.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11274* (CORD, MCNS)].

Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass.
Sin.: *Helianthus tubaeformis* Jacq.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; La Duke, J. C., 1982; Zardini, E. M., 1974.
Hierba. Anual. Introducida. 200–2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, JUJ, SAL, SDE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 47502* (CTES)].

Tithonia uniflora J.F. Gmel. = **Tithonia rotundifolia** (Mill.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; La Duke, J. C., 1982; Zardini, E. M., 1974.

Tolpis Adans.

Número de especies: 1 introducida

Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Sin.: *Crepis barbata* L., *Tolpis umbellata* Bertol.
Referencias: Matthei, O. R., 1995b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–700 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 782* (CONC)].

Tolpis umbellata Bertol. = **Tolpis barbata** (L.) Gaertn.

Tragoceras peucedanifolium Spreng. = **Isostigma peucedanifolium** (Spreng.) Less.

Tragopogon L.

Número de especies: 3 introducidas

Tragopogon dubius Scop.
Sin.: *Tragopogon major* Jacq.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14922* (LP)].

Tragopogon fritillarioides Less. = **Picrosia longifolia** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Tragopogon major Jacq. = **Tragopogon dubius** Scop.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a.

Tragopogon picroides L. = **Urospermum picroides** (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Tragopogon porrifolius L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, RNE); CHL(IV, V, VI, VIII, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 10528* (LP)]; CHL[*Zoellner, O. 1404* (LP)].

Tragopogon pratensis L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 527* (LP)].

Triachne pygmaea Cass. = **Nassauvia pygmaea** (Cass.) Hook. f. var. **pygmaea**
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Trianthus ulicinus Hook. f. = **Nassauvia ulicina** (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Cabrera, A. L., 1982.

Trichocline Cass.

Número de especies: 20, 14 endémicas

Trichocline argentea Griseb. = **Trichocline plicata** Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline aurea (D. Don) Reiche
Sin.: *Bichenia aurea* D. Don, *Chaetanthera berteriana* Less., *Trichocline pedicularifolia* Walp.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 1707* (LP)].

Trichocline auriculata (Wedd.) Hieron. var. **auriculata**
Sin.: *Bichenia auriculata* Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 3300–4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17693* (LP)].

Trichocline auriculata (Wedd.) Hieron. var. **breviscapa** Zardini
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13997* (LP)].

Trichocline boecheri Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 8373* (LP)].

Trichocline catharinensis Cabrera var. **catharinensis**
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9041* (LP, RB, US)].

Trichocline catharinensis Cabrera var. **discolor** Cabrera
Referencias: Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10068* (LP, RB)]; URY[*Del Puerto, O. 3976* (MVFA)].

Trichocline caulescens Phil.
Sin.: *Onoseris lanata* Phil., *Trichocline nivea* Phil., *Trichocline stuebelii* Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–3500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1058* (E, GH, K, LIL, LP, SI)].

Trichocline cineraria (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Bichenia cineraria* D. Don, *Bichenia crenata* (J. Remy) Wedd., *Chaetanthera crenata* J. Remy, *Gerbera cineraria* (D. Don) Kuntze, *Leuceria contrayerba* Kurtz, *Trichocline contrayerba* (Kurtz) Hauman, *Trichocline crenata* (J. Remy) Reiche, *Trichocline tontalensis* Hieron.
Referencias: Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 7178* (LP)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (K, P)].

Trichocline cineraria (D. Don) Hook. & Arn. var. *pulvinata* (Kuntze) Hauman = **Trichocline dealbata** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline collina Baker = **Trichocline speciosa** Less.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline contrayerba (Kurtz) Hauman = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline cordifolia Baker = **Chaptalia cordifolia** (Baker) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973.

Trichocline crenata (J. Remy) Reiche = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline dealbata (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f. ex Griseb.
Sin.: *Chaetanthera dealbata* Hook. & Arn., *Chaetanthera parviflora* Phil., *Gerbera pulvinata* Kuntze, *Trichocline cineraria* (D. Don) Hook. & Arn. var. *pulvinata* (Kuntze) Hauman
Referencias: Katinas, L., 1996a; Pruski, J. F., 2005a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11647* (BAB, LP, SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 21833* (CONC)].

Trichocline deserticola Zardini
Sin.: *Trichocline spathulata* (Phil.) Zardini, nom. illeg.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Zardini, E. M., 1975, 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 401* (CONC)].

Trichocline exscapa Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–4300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1371* (BA, BAF, SI)].

Trichocline foliosa Hook. & Arn. = **Trichocline macrocephala** Less.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline heterophylla Griseb., hom. illeg. = **Criscia stricta** (Spreng.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1994.

Trichocline heterophylla (Spreng.) Less.
Sin.: *Chaptalia heterophylla* (Spreng.) D. Don, *Onoseris heterophylla* Spreng.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, FLA, MAL, MON, RNO).
Ejemplares de referencia: URY[*Chebataroff, J. 1722* (LP)].

Trichocline heterophylla (Spreng.) Less. var. *humilis* (Less.) Baker = **Trichocline humilis** Less.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline humilis Less.
Sin.: *Trichocline heterophylla* (Spreng.) Less. var. *humilis* (Less.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1998; Katinas, L., 1996a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE); PRY(PAI); URY(ART, CAS, COL, FLA, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 3064* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 1216* (G)]; URY[*Chebataroff, J. 5223* (LP)].

Trichocline incana (Lam.) Cass.
Sin.: *Arnica incana* (Lam.) Pers., *Doronicum incanum* Lam., *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze
Referencias: Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, CAS, COL, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. s.n.* (ICN)]; URY[*Chebataroff, J. 10254* (LP)].

Trichocline linearifolia Malme
Referencias: Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18423* (LP)].

Trichocline macrocephala Less.
Sin.: *Trichocline foliosa* Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Katinas, L., 1996a; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Zardini, E. M., 1975.

Hierba. Perenne. Nativa. 600–1300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maruñak, V. 116* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 21010* (LP)].

Trichocline macrorhiza Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24036* (LP)].

Trichocline maxima Less.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (K)]; URY[*Chebataroff, J. 9112* (LP)].

Trichocline nervosa Less. = **Lulia nervosa** (Less.) Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1980.

Trichocline nivea Phil. = **Trichocline caulescens** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline paraguayensis Baker = **Trichocline speciosa** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Trichocline pedicularifolia Walp. = **Trichocline aurea** (D. Don) Reiche
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline plicata Hook. & Arn.
Sin.: *Brachyclados stuckertii* Speg., *Gerbera plicata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Trichocline argentea* Griseb.
Referencias: Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24889* (LP)].

Trichocline radiata (Vell.) S.F. Blake = **Actinoseris radiata** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1970b.

Trichocline reptans (Wedd.) Rob., comb. superfl. = **Trichocline reptans** (Wedd.) Hieron.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2001.

Trichocline reptans (Wedd.) Hieron.
Sin.: *Bichenia reptans* Wedd., *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze f. *aurantiaca* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze f. *pallida* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *intermedia* Kuntze, *Gerbera incana* (Lam.) Kuntze var. *reptans* (Wedd.) Kuntze, *Trichocline reptans* (Wedd.) Rob., comb. superfl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2001; Cabrera, A. L., 1978, 1998; Katinas, L., 1996a; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24099* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 8357* (LP)].

Trichocline sinuata (D. Don) Cabrera
Sin.: *Bichenia sinuata* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Katinas, L., 1996a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5667* (LP)].

Trichocline spathulata (Phil.) Zardini, nom. illeg. = **Trichocline deserticola** Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1976b.

Trichocline speciosa Less.
Sin.: *Trichocline collina* Baker, *Trichocline paraguayensis* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1973; Cabrera, A. L., 1998; Zardini, E. M., 1975.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, COA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15036* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 13972* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 5777* (G, K, P)].

Trichocline stuebelii Phil. = **Trichocline caulescens** Phil.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichocline tontalensis Hieron. = **Trichocline cineraria** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Zardini, E. M., 1975.

Trichogonia (DC.) Gardner

Número de especies: 4, 3 endémicas

Trichogonia chodatii (Hassl.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium chodatii* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 814* (G, K, LIL)].

Trichogonia fiebrigii Mattf.
Sin.: *Trichogonia salviifolia* Gardner f. *linearifolia* Hassl., *Trichogonia salviifolia* Gardner f. *microphylla* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4271* (G)].

Trichogonia hassleri Mattf.
Sin.: *Trichogonia menthifolia* Gardner f. *attenuata* Hassl., *Trichogonia menthifolia* Gardner f. *cordata* Hassl., *Trichogonia menthifolia* Gardner var. *martii* Hassl., *Trichogonia menthifolia* Gardner var. *tomentosula* Hassl.

Referencias: Cabrera, A. L., 1996c; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CAU, CON, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 2874* (SI)].

Trichogonia menthifolia Gardner f. *attenuata* Hassl. = **Trichogonia hassleri** Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Trichogonia menthifolia Gardner f. *cordata* Hassl. = **Trichogonia hassleri** Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Trichogonia menthifolia Gardner var. *martii* Hassl. = **Trichogonia hassleri** Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Trichogonia menthifolia Gardner var. *tomentosula* Hassl. = **Trichogonia hassleri** Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Trichogonia phlebodes (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Sin.: *Eupatorium phlebodes* B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c; King, R. M. & Robinson, H. E., 1987.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10178* (BM, G, LIL)].

Trichogonia salviifolia Gardner f. *linearifolia* Hassl. = **Trichogonia fiebrigii** Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Trichogonia salviifolia Gardner f. *microphylla* Hassl. = **Trichogonia fiebrigii** Mattf.
Referencias: Cabrera, A. L., 1996c.

Trichogonia scabra Klatt = **Eupatorium tubaraoense** Hieron.

Tridax L.

Número de especies: 1

Tridax procumbens L.
Sin.: *Amellus pedunculatus* Ortega ex Willd., *Balbisia canescens* Pers., *Balbisia divaricata* Cass., *Balbisia elongata* Willd., *Balbisia pedunculata* Ortega ex Hoffmanns., *Tridax procumbens* L. var. *canescens* (Pers.) DC., *Tridax procumbens* L. var. *ovatifolia* B.L. Rob. ex Greenm.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1986; Bulacio, E., Slanis, A. C., Figueroa Romero, M. R. & Muruaga, N. B., 1997; Powell, A. M., 1965.
Hierba. Anual. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8196* (SI)]; BRA[*Silva, M. 544* (NY)].

Tridax procumbens L. var. *canescens* (Pers.) DC. = **Tridax procumbens** L.
Referencias: Powell, A. M., 1965.

Tridax procumbens L. var. *ovatifolia* B.L. Rob. ex Greenm. = **Tridax procumbens** L.
Referencias: Powell, A. M., 1965.

Tridax verticillata Klatt = **Calea verticillata** (Klatt) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1998a.

Tripleurospermum Sch. Bip.

Número de especies: 1 introducida

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993.

Tripleurospermum perforatum (Mérat) Wagenitz, comb. superfl. = **Tripleurospermum perforatum** (Mérat) Laínz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b.

Tripleurospermum perforatum (Mérat) Laínz
Sin.: *Chamomilla inodora* (L.) Gilib., *Chrysanthemum inodorum* (L.) L., *Matricaria inodora* L., *Matricaria perforata* Mérat, *Pyrethrum inodorum* (L.) Moench, *Tripleurospermum inodorum* (L.) Sch. Bip., *Tripleurospermum perforatum* (Mérat) Wagenitz, comb. superfl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1997b; Bremer, K. & Humphries, C. J., 1993; Cabrera, A. L., 1971a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF, TUC); CHL(XII); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19877* (LP)]; CHL[*Matthei, O. R. 607* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 1295* (LP)].

Tripolium conspicuum J. Remy = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Tripolium moelleri Phil. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Tripolium oliganthum Phil. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Tripolium subulatum Nees & Mart. var. *brasilianum* DC. = **Symphyotrichum squamatum** (Spreng.) G.L. Nesom
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Tripolium tenuifolium Phil. = **Symphyotrichum vahlii** (Gaudich.) G.L. Nesom var. **tenuifolium** (Phil.) G.L. Nesom
Referencias: Nesom, G. L., 1994c.

Triptilion Ruiz & Pav.

Número de especies: 7 endémicas

Triptilion achillea DC. var. *glabrisceps* Speg. = **Triptilion achilleae** DC.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion achilleae DC.
Sin.: *Triptilion achillea* DC. var. *glabrisceps* Speg., *Triptilion chilense* Bertero ex DC., nom. illeg., *Triptilion dusenii* O. Hoffm., *Triptilion euphrasioides* Bertero ex DC., *Triptilion tenuifolium* Phil.
Referencias: Katinas, L., 1995; Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VI, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1284* (LP)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Triptilion andinum Phil. = **Triptilion capillatum** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion axillare Lag. ex Lindl. = **Nassauvia axillaris** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion benaventei J. Remy
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1300 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. 7965* (CONC)].

Triptilion berteroi Phil.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 1200–1600 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Triptilion bulbosum J. Remy = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion capillatum (D. Don) Hook. & Arn.
Sin.: *Nassauvia capillata* D. Don, *Triptilion andinum* Phil., *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Reiche, *Triptilion capillatum* (D. Don) Hook. & Arn. var. *laxum* (Phil.) Reiche, *Triptilion laxum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Katinas, L., 1995; Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 300–2200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; CHL[*Kause, I. 3781* (LP)].

Triptilion capillatum (D. Don) Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Reiche = **Triptilion capillatum** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion capillatum (D. Don) Hook. & Arn. var. *laxum* (Phil.) Reiche = **Triptilion capillatum** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion chilense Bertero ex DC., nom. illeg. = **Triptilion achilleae** DC.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion cordifolium Lag. ex Lindl.
Sin.: *Nassauvia cordifolia* (Lag. ex Lindl.) D. Don, nom. illeg., *Triptilion maritimum* Poepp. ex DC., nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 7411* (LP)].

Triptilion diffusum D. Don = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion digitatum Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion dusenii O. Hoffm. = **Triptilion achilleae** DC.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion euphrasioides Bertero ex DC. = **Triptilion achilleae** DC.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion gibbosum J. Remy
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 117* (SI)].

Triptilion glomerulosum Lag. ex Lindl. = **Nassauvia glomerulosa** (Lag. ex Lindl.) D. Don
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion humile Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion integrifolium Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion laciniatum Willd. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion laxum Phil. = **Triptilion capillatum** (D. Don) Hook. & Arn.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion maritimum Poepp. ex DC., nom. nud. = **Triptilion cordifolium** Lag. ex Lindl.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion millefolium Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion pectinatum Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion pectinatum Phil. var. *millefolium* (Phil.) Reiche = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion ramulosum Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion remyanum Phil. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Triptilion spinosum Ruiz & Pav.
Sin.: *Nassauvia diffusa* D. Don, nom. illeg., *Nassauvia spinosa* (Ruiz & Pav.) D. Don, *Triptilion bulbosum* J. Remy, *Triptilion diffusum* D. Don, *Triptilion digitatum* Phil., *Triptilion humile* Phil., *Triptilion integrifolium* Phil., *Triptilion laciniatum* Willd., *Triptilion millefolium* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil., *Triptilion pectinatum* Phil. var. *millefolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion ramulosum* Phil., *Triptilion remyanum* Phil., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *eriochlaenum* DC., *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.) Reiche, *Triptilion spinosum* Ruiz & Pav. var. *remyanum* (Phil.) Reiche
Referencias: Cabrera, A. L., 1982; Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3277* (LP)].

Triptilion spinosum Ruiz & Pav. var. *eriochlaenum* DC. = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.

Triptilion spinosum Ruiz & Pav. var. *integrifolium* (Phil.) Reiche = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.

Triptilion spinosum Ruiz & Pav. var. *remyanum* (Phil.) Reiche = **Triptilion spinosum** Ruiz & Pav.

Triptilion tenuifolium Phil. = **Triptilion achilleae** DC.
Referencias: Katinas, L., Crisci, J. V. & Freire, S. E., 1992.

Trixis P. Browne

Número de especies: 13, 3 endémicas

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze f. *discolor* (D. Don) Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze f. *sublanata* Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *auriculata* (Hook.) Cabrera = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *cladoptera* (Baker) Cabrera = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *discolor* (D. Don) Cabrera = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *divaricata* (Spreng.) Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *flexuosa* (Kunth) Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *heterophylla* Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *petiolata* Kuntze = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *typica* Cabrera, nom. inval. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze subsp. *discolor* (D. Don) Katinas = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis auriculata Hook. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis brasiliensis (L.) DC. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis brasiliensis Less., nom. illeg. = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis brasiliensis Less. var. *aquatica* Less. = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis brasiliensis (L.) DC. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis brasiliensis (L.) DC. var. *sellowii* (Less.) Hassl. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis cacalioides (Kunth) D. Don
Sin.: *Perdicium cacalioides* Kunth, *Trixis frutescens* P. Browne var. *denticulata* Less., *Trixis hexantha* S. Moore, *Trixis neaeana* DC., *Trixis papillosa* D. Don, *Trixis paradoxa* Cass., *Trixis subparadoxa* Herrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Katinas, L., 1995, 1996b.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25240* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 5089* (LP)]; PRY[*Charpin, A. 21421* (G)].

Trixis calcarea Gardner = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis cerroleonensis Soria & Zardini = **Trixis ophiorhiza** Gardner subsp. **ophiorhiza**
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Trixis chionopappa Baker, nom. illeg. = **Trixis ophiorhiza** Gardner subsp. **ophiorhiza**
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis denticulata Dusén ex Malme = **Holocheilus illustris** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis diffusa Rusby = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis discolor D. Don = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. f. *petiolata* Chodat = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. f. *subpetiolata* Chodat = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *auriculata* (Hook.) DC. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *cladoptera* Baker = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *discolor* (D. Don) Griseb. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *exauriculata* DC. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *glandulifera* Hassl. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *odoratissima* (Gardner) Baker = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. var. *sprengeliana* (Gardner) Baker = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. subsp. **discolor** (D. Don) Katinas
Sin.: *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze f. *discolor* (D. Don) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze f. *sublanata* Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze subsp. *discolor* (D. Don) Katinas,

Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze var. *discolor* (D. Don) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *heterophylla* Kuntze, *Trixis discolor* D. Don, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. f. *petiolata* Chodat, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *glandulifera* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b, 1998.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LRI, SFE, SJU, SLU); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23853* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 2213* (LP, SI)].

Trixis divaricata (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Sin.: *Castra regia* Vell., *Perdicium divaricatum* Kunth, *Perdicium flexuosum* Kunth, *Prionanthes antimenorrhoea* Schrank, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *auriculata* (Hook.) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *cladoptera* (Baker) Cabrera, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *divaricata* (Spreng.) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *flexuosa* (Kunth) Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *petiolata* Kuntze, *Trixis antimenorrhoea* (Schrank) Kuntze var. *typica* Cabrera, nom. inval. , *Trixis auriculata* Hook., *Trixis calcarea* Gardner, *Trixis diffusa* Rusby, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. f. *subpetiolata* Chodat, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *auriculata* (Hook.) DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *cladoptera* Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *discolor* (D. Don) Griseb., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *exauriculata* DC., *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *odoratissima* (Gardner) Baker, *Trixis divaricata* (Kunth) Spreng. var. *sprengeliana* (Gardner) Baker, *Trixis flexuosa* (Kunth) Spreng., *Trixis odoratissima* Gardner, *Trixis salicifolia* D. Don, *Trixis sprengeliana* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Katinas, L., 1996b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15431* (LP, SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 5501* (K, LP)]; PRY[*Hassler, E. 1325* (G, SI)]; URY[*Del Puerto, O. s.n.* (MVFA)].

Trixis eryngioides Cabrera = **Perezia eryngioides** (Cabrera) Crisci & Martic.

Trixis flexuosa (Kunth) Spreng. = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis flexuosa Baker, nom. illeg. = **Trixis praestans** (Vell.) Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis frutescens P. Browne var. *cacalioides* Griseb. = **Trixis grisebachii** Kuntze
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis frutescens P. Browne var. *denticulata* Less. = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis glaberrima Less. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis glabrata Baker, nom. illeg. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis glandulifera (Lag.) Benth. & Hook. f. ex Hieron., nom. illeg. = **Dolichlasium lagascae** D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a.

Trixis glaziovii Baker
Sin.: *Trixis glaziovii* Baker var. *aurantiaca* Dusén
Referencias: Katinas, L., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–3000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 32800* (LP)].

Trixis glaziovii Baker var. *aurantiaca* Dusén = **Trixis glaziovii** Baker
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis grandis S.F. Blake = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis grisebachii Kuntze
Sin.: *Trixis frutescens* P. Browne var. *cacalioides* Griseb.
Referencias: Katinas, L., 1995, 1996b.
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 22255* (LP)].

Trixis hassleri Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8318* (G, K, P)].

Trixis hexantha S. Moore = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis hieracioides (D. Don) DC. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis hieronymi Arechav. = **Holocheilus illustris** (Vell.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis hoffmaniana Taub. = **Trixis ophiorhiza** Gardner subsp. **ophiorhiza**
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis lessingii DC.
Sin.: *Trixis brasiliensis* Less. var. *aquatica* Less., *Trixis brasiliensis* Less., nom. illeg., *Trixis grandis* S.F. Blake, *Trixis lessingii* DC. var. *aquatica* (Less.) DC., *Trixis lessingii* DC. var. *glabrata* Chodat, *Trixis lessingii* DC. var. *major* Chodat, *Trixis lundii* DC., *Trixis picroides* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, COA, PAI); URY(CLA, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 3705* (LP)]; PRY[*Balansa, B. 733* (G, K, P), *Schinini, A. 30186* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 6918* (LP, MVFA)].
Notas: Citada para el NE de Argentina sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Cabrera & Freire, 1998).

Trixis lessingii DC. var. *aquatica* (Less.) DC. = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis lessingii DC. var. *glabrata* Chodat = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Trixis lessingii DC. var. *major* Chodat = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Trixis lorentzii Arechav. = **Trichilia pallida** Sw.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis loretzii Arechav. = **Trixis pallida** Less.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis lundii DC. = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis matisiana Díaz & Vélez = **Trixis proustioides** Hieron.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis megapotamica Hook. & Arn. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis missionum Cabrera = **Trixis praestans** (Vell.) Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis mollissima D. Don = **Trixis praestans** (Vell.) Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis montesecoensis Sagást. & M.O. Dillon = **Trixis proustioides** Hieron.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis neaeana DC. = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis nobilis (Vell.) Katinas
Sin.: *Castra nobilis* Vell., *Trixis glaberrima* Less., *Trixis glabrata* Baker, nom. illeg., *Trixis megapotamica* Hook. & Arn., *Trixis rosea* Baker, nom. illeg., *Trixis stricta* Mart., hom. illeg., *Trixis suaveolens* Baker, nom. illeg., *Trixis verbascifolium* Less., *Trixis verbasciformis* Less., *Trixis verbasciformis* Less. var. *glaberrima* (Less.) Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 18257* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 18001* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 246* (G, K)]; URY[*Cabrera, A. L. 3301* (LP)].

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis ochroleuca Baker, hom. illeg. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. *incisa* Hassl. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1998.

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. *pusilla* Hassl. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1998; Cabrera, A. L., 1968.

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. *robusta* Hassl. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Freire, S. E., 1998; Cabrera, A. L., 1968.

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. f. *subintegra* Hassl. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998.

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. var. *hieracioides* (D. Don) Kuntze = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis ochroleuca (Cass.) Hook. & Arn. var. *thrincioides* (Griseb.) Kuntze = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis odoratissima Gardner = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis ophiorhiza Gardner var. *glandulifera* Hassl. = **Trixis ophiorhiza** Gardner subsp. **glandulifera** (Hassl.) Katinas
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Trixis ophiorhiza Gardner subsp. **glandulifera** (Hassl.) Katinas
Sin.: *Trixis ophiorhiza* Gardner var. *glandulifera* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10547* (G)].

Trixis ophiorhiza Gardner subsp. **ophiorhiza**
Sin.: *Trixis cerroleonensis* Soria & Zardini, *Trixis chionopappa* Baker, nom. illeg., *Trixis hoffmaniana* Taub.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1555* (SI)].

Trixis othonoides Less. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis pallida Less.
Sin.: *Trixis loretzii* Arechav., *Trixis pallida* Less. var. *australis* Griseb., *Trixis pallida* Less. var. *subsericea* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Katinas, L., 1995, 1996b; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, RNO, RIV, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1383* (LP)]; BRA[*Rambo, B. 9431* (LP)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5077* (E, G)]; URY[*Chebataroff, J. 10509* (LP)].

Trixis pallida Less. var. *australis* Griseb. = **Trixis pallida** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b.

Trixis pallida Less. var. *subsericea* Chodat = **Trixis pallida** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b.

Trixis papillosa D. Don = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis paradoxa Cass. = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis picroides Gardner = **Trixis lessingii** DC.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis pinnatifida Less. = **Holocheilus pinnatifidus** (Less.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis praestans (Vell.) Cabrera
Sin.: *Cacalia praestans* Baker, nom. illeg., *Castra praestans* Vell., *Trixis flexuosa* Baker, nom. illeg., *Trixis missionum* Cabrera, *Trixis mollissima* D. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1995, 1996b; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, COA); URY(COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22784* (LP), *Correa, M. N. 7944* (LP)]; BRA[*Klein, R. M. 9610* (LP)]; PRY[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 3725* (LP)].

Trixis proustioides Hieron.
Sin.: *Trixis matisiana* Díaz & Vélez, *Trixis montesecoensis* Sagást. & M.O. Dillon, *Trixis ragonesei* Cabrera
Referencias: Katinas, L., 1996b.
Arbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27968* (LP, SI)].

Trixis ragonesei Cabrera = **Trixis proustioides** Hieron.
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis ravenii Zardini & Soria = **Trixis spicata** Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1998.

Trixis rosea Baker, nom. illeg. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis salicifolia D. Don = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis schulzii Cabrera = **Holocheilus schulzii** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998.

Trixis sellowii Less. ex DC. = **Holocheilus brasiliensis** (L.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968.

Trixis senecioides Hook. = **Leucheria oligocephala** J. Remy
Referencias: Crisci, J. V., 1976b.

Trixis sonchoides Chodat = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998.

Trixis spicata Gardner
Sin.: *Trixis ravenii* Zardini & Soria
Referencias: Cabrera, A. L., 1998; Katinas, L., 1996b.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10251* (G, K, LP, P)].

Trixis sprengeliana Gardner = **Trixis divaricata** (Kunth) Spreng. subsp. **divaricata**
Referencias: Katinas, L., 1998.

Trixis stricta (Spreng.) Less. = **Criscia stricta** (Spreng.) Katinas
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a; Katinas, L., 1994.

Trixis stricta Mart., hom. illeg. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis suaveolens Baker, nom. illeg. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis subparadoxa Herrera = **Trixis cacalioides** (Kunth) D. Don
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis thrincioides (Griseb.) Hassl. = **Holocheilus hieracioides** (D. Don) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1968, 1998.

Trixis thyrsoidea Dusén ex Malme
Referencias: Katinas, L., 1996b; Mondin, C. A. & Moura Baptista, L., 1996.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6685* (LP)].

Trixis verbascifolium Less. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis verbasciformis Less. = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Trixis verbasciformis Less. var. *glaberrima* (Less.) Malme = **Trixis nobilis** (Vell.) Katinas
Referencias: Katinas, L., 1996b.

Troximon coronopifolius (d'Urv.) Cabrera = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Troximon poepigii (DC.) De Wild. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Troximon pumilum (Gaudich.) De Wild. = **Agoseris coronopifolia** (d'Urv.) K.L. Chambers & D.M. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998.

Trychionolepis hoppii B.L. Rob. = **Ophryosporus hoppii** (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.
Referencias: King, R. M. & Robinson, H. E., 1972h.

Tussilago exscapa Pers. = **Chaptalia exscapa** (Pers.) Baker var. **exscapa**
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tussilago integerrima Vell. = **Chaptalia integerrima** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tussilago lyrata Pers. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tussilago nutans L. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tussilago sarmentosa Pers. = **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Freire, S. E., 1998.

Tussilago sinuata Pers. = **Chaptalia piloselloides** (Vahl) Baker
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tussilago trifurcata G. Forst. = **Senecio trifurcatus** (G. Forst.) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Tussilago vaccina Vell. = **Chaptalia nutans** (L.) Pol.
Referencias: Burkart, A., 1944a.

Tylloma albiflorum Phil. = **Chaetanthera gnaphalioides** (J. Remy) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma brachylepis Phil. = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma ciliatum Phil. = **Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma euphrasioides (DC.) F. Meigen = **Chaetanthera euphrasioides** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma eurylepis Phil. = **Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. var. *brachylepis* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. var. *eurylepis* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. var. *microphyllum* Phil. = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. var. *rotundifolium* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. var. *stolpi* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma glabratum DC. var. *strictum* (Phil.) Reiche = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma gnaphalioides Phil. = **Chaetanthera minuta** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma involucratum Phil. = **Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma lanatum Phil. = **Chaetanthera lanata** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma limbatum D. Don = **Chaetanthera limbata** (D. Don) Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma minutum Phil. = **Chaetanthera minuta** (Phil.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma pusillum D. Don = **Chaetanthera pusilla** (D. Don) Hook. & Arn.

Tylloma renifolium (J. Remy) Wedd. = **Chaetanthera renifolia** (J. Remy) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma rotundifolium Phil. = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma splendens (J. Remy) Wedd. = **Chaetanthera splendens** (J. Remy) B.L. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma stolpi Phil. = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Tylloma strictum Phil. = **Chaetanthera glabrata** (DC.) F. Meigen
Referencias: Cabrera, A. L., 1937b.

Ucacou nodiflorum (L.) Hitchc. = **Synedrella nodiflora** (L.) Gaertn.
Referencias: Turner, B. L., 1994b.

Uhdea bipinnatifida Kunth = **Montanoa bipinnatifida** (Kunth) K. Koch
Referencias: Funk, V. A., 1982.

Unxia anemonifolia Kunth = **Villanova oppositifolia** Lag.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Unxia anthemidifolia Bertero ex Colla = **Blennosperma chilense** Less.

Unxia anthemidifolia Bertero ex Less. = **Blennosperma chilense** Less.

Urmenetea Phil.

Número de especies: 1 endémica

Urmenetea atacamensis Phil.
Sin.: *Onoseris atacamensis* (Phil.) Hoffm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., 1996; Sancho, G., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 80* (LP)]; CHL[*Barros, E. 2014* (LP)].

Urolepis hecatantha (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium hecatanthum** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a, 1978, 1996f.

Urospermum Scop.

Número de especies: 1 introducida

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt
Sin.: *Tragopogon picroides* L.
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, DFE, SFE); CHL(IV, V, RME); URY(CLA, FLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BAF)]; CHL[*Zoellner, O. 653* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1286* (LP)].

Vanillosma multiflorum Mart. = **Vernonia puberula** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vargasia caracasana DC. = **Galinsoga caracasana** (DC.) Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Vasquezia anemonifolia (Kunth) S.F. Blake = **Villanova oppositifolia** Lag.
Referencias: Blake, S. F., 1930.

Vasquezia biternata Phil. = **Villanova oppositifolia** Lag.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F. Blake = **Villanova oppositifolia** Lag.
Referencias: Blake, S. F., 1937.

Verbesina L.

Número de especies: 14, 7 endémicas

Verbesina alba L. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina allophylla S.F. Blake = **Verbesina suncho** (Griseb.) S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina arnottii Baker = **Angelphytum arnottii** (Baker) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Verbesina aspilioides Griseb. = **Angelphytum aspilioides** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina auriculata Hook. & Arn. = **Verbesina subcordata** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Verbesina aurita Phil.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1991, 2000b.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC); CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 14219* (CORD)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Verbesina australis Baker = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina brasiliana Pers. = **Adenostemma brasilianum** (Pers.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978, 1996d.

Verbesina caleaefolia Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1955b.
Subarbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6358* (LP)].

Verbesina conyzoides Trew = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Sin.: *Verbesina australis* Baker, *Verbesina encelioides* (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray var. *exauriculata* B.L. Rob. ex Greenm., *Verbesina microptera* (DC.) Herter, *Verbesina scabra* Phil., *Ximenesia encelioides* Cav., *Ximenesia microptera* DC.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(II, III); PRY(APY); URY(PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 235* (CTES, SI), *Ulibarri, E. A. 1747* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 224* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 2085* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 4416* (MVFA)].

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray var. *exauriculata* B.L. Rob. ex Greenm. = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina glabrata Hook. & Arn.
Referencias: Mondin, C. A., 2004a.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16188* (NY)].

Verbesina grisebachii Baker = **Angelphytum grisebachii** (Baker) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Verbesina guaranitica Chodat
Sin.: *Zexmenia guaranitica* (Chodat) S.F. Blake
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5647* (BM)].

Verbesina heterosperma Griseb. = **Verbesina subcordata** DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Verbesina lilloi S.F. Blake
Sin.: *Chaenocephalus alatus* Lillo
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1201* (CORD)].

Verbesina macrophylla (Cass.) S.F. Blake var. **nelidae** (Cabrera) Olsen
Sin.: *Verbesina nelidae* Cabrera
Referencias: Olsen, J. S., 1985.
Subarbusto. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11477* (SI)].

Verbesina megapotamica Spreng. = **Eclipta megapotamica** (Spreng.) Sch. Bip. ex S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Verbesina microptera (DC.) Herter = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina montevidensis Spreng. = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Cabrera, A. L., 1974c.

Verbesina myrtifolia Chodat = **Angelphytum myrtifolium** (Chodat) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Verbesina nelidae Cabrera = **Verbesina macrophylla** (Cass.) S.F. Blake var. **nelidae** (Cabrera) Olsen
Referencias: Olsen, J. S., 1985.

Verbesina nodiflora L. = **Synedrella nodiflora** (L.) Gaertn.
Referencias: Turner, B. L., 1994b.

Verbesina octantha S.F. Blake = **Verbesina suncho** (Griseb.) S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina paraguariensis Chodat = **Angelphytum paraguariense** (Chodat) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Verbesina prostrata L. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina rugosa Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Arbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4960* (G)].

Verbesina saltensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1955b.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1830* (LP)].

Verbesina saubinetia Klatt
Hierba. Perenne. Endémica. 500–700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4565* (CONC)].

Verbesina scabra Phil. = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Verbesina scandens Klatt = **Salmea scandens** (L.) DC.
Referencias: Bolick, M. R., 1991.

Verbesina sordescens DC. var. **glabrata** Chodat
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5962* (MO, NY)].

Verbesina sordescens DC. var. **sordescens**
Referencias: Cabrera, A. L., 1976a; Malme, G. O. A., 1933b; Mondin, C. A., 2004a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27689* (SI)]; BRA[*Wasum, R. 8189* (NY)]; PRY[*Soria, N. 5814* (FCQ, MO)].

Verbesina subcordata DC.
Sin.: *Verbesina auriculata* Hook. & Arn., *Verbesina heterosperma* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998; Sáenz, A. A., 1996.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, ITA, PAI); URY(ART, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cuadrado, G. 347* (CTES)]; BRA[*Kegler, A. 184* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 27653* (CTES, SI)]; URY[*Lombardo, A. 4422* (MVJB)].

Verbesina subdiscoidea Toledo
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Soria, N. 6257* (FCQ, MO)].

Verbesina suncho (Griseb.) S.F. Blake
Sin.: *Chaenocephalus heterophyllus* Griseb., *Chaenocephalus macrophyllus* Griseb., *Chaenocephalus suncho* Griseb., *Verbesina allophylla* S.F. Blake, *Verbesina octantha* S.F. Blake
Referencias: Ariza Espinar, L., 1980b, 2000b; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 20660* (CORD)].

Vermifuga corymbosa Ruiz & Pav. = **Flaveria bidentis** (L.) Kuntze
Referencias: Petenatti, E. M. & Ariza Espinar, L., 1997.

Vernonanthura amplexicaulis (R.E. Fr.) H. Rob. = **Vernonia amplexicaulis** R.E. Fr.

Vernonanthura auriculata (Griseb.) H. Rob. = **Vernonia auriculata** Griseb.

Vernonanthura beyrichii (Less.) H. Rob. = **Vernonia beyrichii** Less.

Vernonanthura brasiliana (L.) H. Rob. = **Vernonia brasiliana** (L.) Druce

Vernonanthura catharinensis (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia catharinensis** Cabrera

Vernonanthura chamaedrys (Less.) H. Rob. = **Vernonia chamaedrys** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura chaquensis (Cabrera) H. Rob.
= **Vernonia chaquensis** Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura cichoriiflora (Chodat) H. Rob.
= **Vernonia cichoriiflora** Chodat

Vernonanthura crassa (Vell.) H. Rob. = **Vernonia crassa** (Vell.) Ekman ex Malme

Vernonanthura cuneifolia (Gardner) H. Rob. = **Vernonia cuneifolia** Gardner

Vernonanthura cupularis (Chodat) H. Rob. = **Vernonia cupularis** Chodat var. **cupularis**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura diffusa (Less.) H. Rob. = **Vernonia diffusa** Less.

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. = **Vernonia discolor** (Spreng.) Less.

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H. Rob. = **Vernonia diffusa** Less.

Vernonanthura ferruginea (Less.) H. Rob. = **Vernonia ferruginea** Less.

Vernonanthura laxa (Gardner) H. Rob. = **Vernonia laxa** Gardner

Vernonanthura lipeoensis (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia lipeoensis** Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura loretensis (Hieron.) H. Rob. = **Vernonia loretensis** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura lucida (Less.) H. Rob. = **Vernonia lucida** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura montevidensis (Spreng.) H. Rob.
= **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura mucronulata (Less.) H. Rob. = **Vernonia mucronulata** Less.

Vernonanthura nebularum (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia lipeoensis** Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura nudiflora (Less.) H. Rob. = **Vernonia nudiflora** Less. f. **nudiflora**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura oligactoides (Less.) H. Rob. = **Vernonia oligactoides** Less.

Vernonanthura oligolepis (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.
= **Vernonia oligolepis** Sch. Bip. ex Baker

Vernonanthura petiolaris (DC.) H. Rob. = **Vernonia petiolaris** DC.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura pinguis (Griseb.) H. Rob. = **Vernonia pinguis** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura puberula (Less.) H. Rob. = **Vernonia puberula** Less.

Vernonanthura rigiophylla (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob.
= **Vernonia elsieae** Stutts

Vernonanthura schulziana (Cabrera) H. Rob. = **Vernonia schulziana** Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonanthura squamulosa (Hook. & Arn.) H. Rob.
= **Vernonia squamulosa** Hook. & Arn.

Vernonanthura tweedieana (Baker) H. Rob. = **Vernonia tweedieana** Baker

Vernonanthura viscidula (Less.) H. Rob. = **Vernonia viscidula** Less.

Vernonanthura westiniana (Less.) H. Rob. = **Vernonia westiniana** Less.

Vernonia Schreb.

Número de especies: 121, 45 endémicas

Vernonia abbatobiana Chodat = **Vernonia hystrix** Chodat
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia amambaia (H. Rob.) Dematteis
Sin.: *Lepidaploa amambaia* H. Rob.
Referencias: Dematteis, M., 2002b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 22903* (CTES)].

Vernonia amplexicaulis R.E. Fr.
Sin.: *Vernonanthura amplexicaulis* (R.E. Fr.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1941a, 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2002a.
Arbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27889* (SI), *Fabris, H. A. 4562* (LP)]; PRY[*Schinini, A. 20251* (CTES)].

Vernonia angustifolia D. Don ex Hook. = **Vernonia nudiflora** Less. f. **nudiflora**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia apiculata Mart. ex DC.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Ramella, L. 2751* (G, PY)].

Vernonia arachniolepis Ekman ex Dusén
Sin.: *Lessingianthus arachniolepis* (Ekman ex Dusén) H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1988a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9191* (S)].

Vernonia arborescens (L.) Sw. var. *corrientensis* Hieron. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1999.

Vernonia arechavaletae André = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia argentea Less.
Sin.: *Cacalia argentea* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus argenteus* (Less.) H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1988a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2992* (SI)]; PRY[*Dematteis, M. 858* (CTES), *Hassler, E. 10390* (SI)].

Vernonia argyropappa H. Buek = **Vernonia salzmannii** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.

Vernonia assans Mart. ex DC. = **Vernonia brasiliana** (L.) Druce
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1992.

Vernonia asteriflora Mart. ex DC.
Sin.: *Cacalia asteriflora* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Cacalia kuntzei* (Hieron.) Kuntze, *Lessingianthus asteriflorus* (Mart. ex DC.) H. Rob., *Vernonia kuntzei* Hieron.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16014* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9150* (K, LIL, P)].

[Vernonia auriculata Griseb.]
Sin.: *Cacalia auriculata* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vernonia axillaris Less. = **Piptocarpha axillaris** (Less.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia balansae Hieron.
Sin.: *Lepidaploa balansae* (Hieron.) H. Rob., *Lessingianthus dorsiventralis* (Chodat) H. Rob., *Vernonia dorsiventralis* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1397* (ICN, SI), *Niederlein, G. 1455* (BA), *Porta, R. E. 49* (SI)]; BRA[*Bueno, O. L. 1032* (SI), *Sobral, M. 325* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 3127* (SI), *Woolston, A. L. 555* (SI)].

Vernonia bardanoides Less.
Sin.: *Cacalia bardanoides* (Less.) Kuntze, *Cacalia lappoides* (Baker) Kuntze, *Lessingianthus bardanoides* (Less.) H. Rob., *Vernonia cirsiiflora* Mart. ex Baker, *Vernonia lappoides* Baker, *Vernonia reticulata* Gardner
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16972* (S)]; PRY[*Bacigalupo, N. M. 1115* (SI), *Fiebrig, K. A. G. 6031* (SI), *Soria, N. 3652* (FCQ)].

Vernonia bellula Dematteis
Referencias: Dematteis, M., 2000.
Subarbusto. Nativa. 600 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fernández Casas, F. J. 5989* (BM, BR, CTES, G, MA, MO)].

Vernonia beyrichii Less.
Sin.: *Vernonanthura beyrichii* (Less.) H. Rob., *Vernonia denticulata* DC.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 8770* (CTES, K)].

Vernonia brasiliana (L.) Druce
Sin.: *Baccharis brasiliana* L., *Vernonanthura brasiliana* (L.) H. Rob., *Vernonia assans* Mart. ex DC., *Vernonia odoratissima* Kunth, *Vernonia salviifolia* Chodat, *Vernonia scabra* Pers.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974c; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SAL); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morel, I. 3273* (LIL, LP), *Schulz, A. G. 5357* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 808* (SI), *Hassler, E. 219* (SI), *Schmeda, G. 727* (SI)].

Vernonia brevifolia Less.
Sin.: *Cacalia brevifolia* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus brevifolius* (Less.) H. Rob., *Vernonia brevifolia* Less. var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Baker, *Vernonia brevifolia* Less. var. *squarrosifoliata* Hieron., *Vernonia ericifolia* Hook. & Arn., *Vernonia filifolia* Mart., *Vernonia linosyrifolia* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Dematteis, M., 2002a; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1161* (LP), *Morrone, O. 2209* (SI), *Romanczuk, M. C. 539* (SI), *Zardini, E. M. 741* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 34227* (SI), *Rambo, B. 38589* (SI), *Reineck, E. M. 113* (BA)]; PRY[*Burkart, A. 18713* (SI), *Rojas, T. 2225* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4581* (G)].

Vernonia brevifolia Less. var. *ericifolia* (Hook. & Arn.) Baker = **Vernonia brevifolia** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia brevifolia Less. var. *squarrosifoliata* Hieron. = **Vernonia brevifolia** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia brunneri (H. Rob.) Cabrera
Sin.: *Mesanthophora brunneri* H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–200 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Brunner, D. R. 1720* (G, MO, PY, US)].

Vernonia campestris DC. = **Vernonia desertorum** Mart. ex DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia candelabrum Chodat = **Vernonia verbascifolia** Less.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.

Vernonia cataractarum Hieron.
Sin.: *Lessingianthus cataractum* (Hieron.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, M. 1005* (G, MNES), *van de Venne, H. s.n.* (BA, LP)]; BRA[*Gaelzer, M. B. 60* (SI)].

Vernonia catharinensis Cabrera
Sin.: *Vernonanthura catharinensis* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto. Endémica. 300–1600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8715* (HBR, LP)].

Vernonia centauropsidea Hieron.
Referencias: Dematteis, M. & Cabrera, A. L., 1998; Hieronymus, G. H. E. W., 1908.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 9935* (LIL)].

Vernonia centriflora Link & Otto = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia chamaedrys Less.
Sin.: *Cacalia chamaedrys* (Less.) Kuntze, *Vernonanthura chamaedrys* (Less.) H. Rob., *Vernonia ilex* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 316* (SI), *Montes, J. E. 443* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 5720* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 966* (SI), *Burkart, A. 18287* (ICN, SI)].

Vernonia chamissonis Less.
Sin.: *Cacalia chamissonis* (Less.) Kuntze, *Lepidaploa chamissonis* (Less.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 3048* (SI)].

Vernonia chaquensis Cabrera
Sin.: *Vernonanthura chaquensis* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); PRY(APA, CAU, CAA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 911* (SI), *Pedersen, T. M. 5793* (SI), *Schulz, A. G. 14872* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 27818* (CTES)].

Vernonia chromolepis Gardner = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia chrysophylla Gardner = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby

Vernonia cichoriiflora Chodat
Sin.: *Vernonanthura cichoriiflora* (Chodat) H. Rob.
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 34263* (SI), *Pedersen, T. M. 11052* (SI)].

Vernonia cincta Griseb.
Sin.: *Cacalia cincta* (Griseb.) Kuntze, *Cyrtocymura cincta* (Griseb.) H. Rob., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *cincta* (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1987.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34385* (SI), *Neumann, R. 406* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 280* (G, SI), *Woolston, A. L. 525* (SI)].

Vernonia cirsiiflora Mart. ex Baker = **Vernonia bardanoides** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia cognata Less.
Sin.: *Cacalia cognata* (Less.) Kuntze, *Vernonia cognata* Less. var. *sceptrum* (Chodat) Cabrera, *Vernonia senecionea* Mart. ex DC., *Vernonia senecionea* Mart. ex DC. var. *adenocarpa* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, ITA, SPE); URY(CLA, COL, PAY, RIV, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1302* (LP), *Guaglianone, E. R. 881* (SI), *Krapovickas, A. 28816* (CTES, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13723* (S, SI), *Dusén, P. K. H. 14357* (G, SI), *Hagelund, K. 13118* (ICN), *Rambo, B. 35094* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4907* (SI), *Woolston, A. L. 132* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32387* (SI)].

Vernonia cognata Less. var. *sceptrum* (Chodat) Cabrera = **Vernonia cognata** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia collina Gardner = **Vernonia mucronulata** Less.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia constricta Matzenb. & Mafioleti
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Matzenbacher, N. I. 823* (ICN)].

Vernonia conyzoides Chodat = **Vernonia oligactoides** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1992.

Vernonia correntina Cabrera & Cristóbal
Referencias: Cabrera, A. L. & Cristóbal, C. L., 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 13895* (CTES, SI)].

Vernonia crassa (Vell.) Ekman ex Malme
Sin.: *Chrysocoma crassa* Vell., *Vernonanthura crassa* (Vell.) H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1992.
Subarbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Curial, O. s.n.* (SI), *Jönsson, G. 209a* (SI)].

Vernonia crenata Gardner = **Vernonia ferruginea** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1992.

Vernonia cuneifolia Gardner
Sin.: *Vernonanthura cuneifolia* (Gardner) H. Rob., *Vernonia itapensis* Chodat
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 300–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15160* (S)]; PRY[*Krapovickas, A. 32524* (SI)].

Vernonia cupularis Chodat var. **cupularis**
Sin.: *Vernonanthura cupularis* (Chodat) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1992.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 636* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1244* (PY)].

Vernonia cupularis Chodat var. **oligocephala** Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6050* (G)].

Vernonia decumbens Gardner
Sin.: *Lepidaploa decumbens* (Gardner) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10647* (HBR, LP)].

Vernonia densevillosa Mart. ex DC. = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby

Vernonia densiflora Gardner
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Árbol. Nativa. 300–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAU, ITA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8588* (HBR, LP)]; PRY[*Balansa, B. 750* (G, S), *Soria, N. 7299a* (FCQ, MO)].

Vernonia denticulata DC. = **Vernonia beyrichii** Less.

Vernonia desertorum Mart. ex DC.
Sin.: *Cacalia desertorum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Lessingianthus desertorum* (Mart. ex DC.) H. Rob., *Vernonia campestris* DC., *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *campestris* (DC.) Baker, *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *longipes* Baker, *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *macrocephala* Chodat
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Jones, S. B. J., 1981.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU, CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 2780* (R)]; PRY[*Hassler, E. 4555* (BM, G, K, P, W)].

Vernonia desertorum Mart. ex DC. var. *campestris* (DC.) Baker = **Vernonia desertorum** Mart. ex DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia desertorum Mart. ex DC. var. *longipes* Baker = **Vernonia desertorum** Mart. ex DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia desertorum Mart. ex DC. var. *macrocephala* Chodat = **Vernonia desertorum** Mart. ex DC.
Referencias: Jones, S. B. J., 1981.

Vernonia desertorum Mart. ex DC. var. *polycephala* Chodat = **Vernonia lithospermifolia** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Jones, S. B. J., 1981.

Vernonia diffusa Less.
Sin.: *Vernonanthura diffusa* (Less.) H. Rob., *Vernonanthura divaricata* (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1992, 1999.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17242* (SI)].

Vernonia diffusa Less. var. *macrocephala* Hieron. = **Vernonia petiolaris** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia discolor (Spreng.) Less.
Sin.: *Eupatorium discolor* Spreng., *Vernonanthura discolor* (Spreng.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Árbol. Nativa. 100–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6732* (G, SI), *Sehnem, A. 2703* (SI)].

Vernonia dorsiventralis Chodat = **Vernonia balansae** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia dusenii Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16959* (S)].

Vernonia echioides Less.
Sin.: *Eupatorium arechavaletae* Baker, *Vernonia lingua* Chodat, *Vernonia oreophila* Speg., hom. illeg., *Vernonia spegazzini* Hicken, *Vernonia verbenacea* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974c; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2002a; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, GUA, ITA, PHA, SPE); URY(ART, CLA, DUR, FLA, FLO, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29095* (SI), *Dematteis, M. 283* (SI)]; BRA[*Miguel, I. G. 25* (SI), *Pereira, E. 10550* (SI), *Pereira, E. 7937* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6070* (SI), *Hassler, E. 8235* (SI), *Rojas, T. 2872* (SI), *Woolston, A. L. 464* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32435* (SI)].

Vernonia echitifolia Mart. ex DC.
Sin.: *Acilepidopsis echitifolia* (Mart. ex DC.) H. Rob., *Vernonia eremophila* auct. non Mart. ex DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, ITA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 11208* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11371* (SI), *Hatschbach, G. 40944* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 14024* (SI)].

Vernonia elsieae Stutts
Sin.: *Cacalia rigiophylla* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Vernonanthura rigiophylla* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob., *Vernonia rigiophylla* Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Stutts, J. G., 1983.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4026* (MBM)].

Vernonia ensifolia Mart. = **Vernonia glabrata** Less. var. **glabrata**
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia eremophila auct. non Mart. ex DC. = **Vernonia echitifolia** Mart. ex DC.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

[Vernonia eremophila Mart. ex DC.]
Sin.: *Lepidaploa rufogrisea* (A. St.-Hil.) H. Rob., *Vernonia frutilculosa* Mart. ex DC., *Vernonia oreophila* Malme, *Vernonia resinosa* Gardner, *Vernonia rufogrisea* A. St.-Hil., *Vernonia saxicola* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia tricephala* Gardner
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vernonia ericifolia Hook. & Arn. = **Vernonia brevifolia** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia erigerontis Mart. ex DC., nom. nud. = **Vernonia simplex** Less.

Vernonia eriolepis Gardner
Sin.: *Cacalia eriolepis* (Gardner) Kuntze, *Lepidaploa eriolepis* (Gardner) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15422* (SI), *Klein, R. M. 5426* (HBR)].

Vernonia estrellensis Gardner = **Vernonia puberula** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia exigua Cabrera
Sin.: *Lessingianthus exiguus* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6476* (HBR, LP)].

Vernonia ferruginea Less.
Sin.: *Cacalia ferruginea* (Less.) Kuntze, *Vernonanthura ferruginea* (Less.) H. Rob., *Vernonia crenata* Gardner, *Vernonia polycephala* DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1992; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Arbusto. Nativa. 600–800 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 32636* (C, CTES, G, SI), *Soria, N. 7292* (FCQ, MO)].

Vernonia filifolia Mart. = **Vernonia brevifolia** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia flavescens Less. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia flexuosa Sims var. **ensifolia** Hieron.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, M. 4532* (ICN)].

Vernonia flexuosa Sims var. **flexuosa**
Sin.: *Cacalia flexuosa* (Sims) Kuntze, *Chrysolaena flexuosa* (Sims) H. Rob., *Vernonia montevidensis* Nees ex Otto & A. Dietr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1988b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1141* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 40999* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 45856* (SI)]; URY[*Dematteis, M. 493* (CTES)].

Vernonia flexuosa Sims var. **microcephala** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1272* (LP)]; BRA[*Silveira, N. J. E. 2273* (HAS)].

Vernonia florida Gardner = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia frutilculosa Mart. ex DC. = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Vernonia fulta Griseb.
Sin.: *Cacalia fulta* (Griseb.) Kuntze, *Quechualia fulta* (Griseb.) H. Rob., *Quechualia trixioides* (Rusby) H. Rob., *Vernonia senecioniifolia* Britton, *Vernonia trixioides* Rusby
Referencias: Cabrera, A. L., 1941b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Robinson, H. E., 1993.
Arbusto. Nativa. 200–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SFE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2529* (CTES, SI)].

Vernonia glabrata Less. var. **angustifolia** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez {2° serie}, F. M. 85* (LP, SI)].

Vernonia glabrata Less. var. *bracteata* Chodat = **Vernonia polyphylla** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia glabrata Less. var. **cuneifolia** Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8008a* (G)].

Vernonia glabrata Less. var. **glabrata**
Sin.: *Cacalia glabrata* (Less.) Kuntze, *Cacalia radula* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Lessingianthus glabratus* (Less.) H. Rob., *Vernonia ensifolia* Mart., *Vernonia oxyodonta* Malme, *Vernonia radula* Mart. ex DC.

Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a, 1995b; Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, PAI, SPE); URY(ART, PAY, RIV, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 712* (BAB, LIL), *Rodríguez, F. M. 723* (SI), *Zuloaga, F. O. 715* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40935* (SI), *Rambo, B. 38747* (SI), *Smith, L. B. 12187* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 3434* (SI), *Soria, N. 3248* (SI)]; URY[*Osten, C. 5472* (SI), *Pedersen, T. M. 16216* (SI)].

Vernonia glabrata Less. var. *lanata* Chodat = **Vernonia lanata** (Chodat) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.

Vernonia glabrata Less. var. *linearifolia* Chodat = **Vernonia polyphylla** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia glabrata Less. var. *parvifolia* Chodat = **Vernonia parvifolia** (Chodat) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.

Vernonia glanduloso-dentata Hieron.
Referencias: Augusto, I., 1946.
Arbusto. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 1359* (B)].

Vernonia gochnatioides Hook. & Arn. ex DC. = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia graminifolia Gardner = **Vernonia psilophylla** DC.

Vernonia grandiflora Less. = **Vernonia pumilla** (Vell.) Cabrera
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

[Vernonia grisea Baker]
Sin.: *Lepidaploa grisea* (Baker) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vernonia hassleriana Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA, CAN, ITA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5774* (G)].

Vernonia hebeclada DC. = **Vernonia westiniana** Less.

Vernonia herbacea (Vell.) Rusby
Sin.: *Cacalia obovata* (Less.) Kuntze, *Chrysocoma herbacea* Vell., *Chrysolaena herbacea* (Vell.) H. Rob., *Vernonia chrysophylla* Gardner, *Vernonia densevillosa* Mart. ex DC., *Vernonia obovata* Less., *Vernonia paucifolia* Rusby
Referencias: Jones, S. B. J., 1981; Malme, G. O. A., 1933b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18908* (CTES, L)].

Vernonia herbertii Cuatrec. = **Vernonia salzmannii** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1990.

Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var. **balansae** Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 921* (G)].

Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var. **eleagnoides** Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5729* (G)].

Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var. **hexantha**
Sin.: *Stenocephalum hexanthum* Sch. Bip., *Vernonia megapotamica* Spreng. var. *hexantha* (Sch. Bip.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b; Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grüner, G. 1307* (LP), *Rodríguez, F. M. s.n.* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16206* (SI), *Smith, L. B. 9023* (HBR, LP, US)]; PRY[*Dematteis, M. 856* (CTES)].

Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var. **nivea** (Chodat) Chodat
Sin.: *Vernonia nivea* Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1256* (G)].

Vernonia hexantha (Sch. Bip.) Baker var. **paraguariensis** Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5443* (G)].

Vernonia hilariana Gardner = **Vernonia petiolaris** DC.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1992.

Vernonia hirtiflora Sch. Bip. ex Baker = **Vernonia remotiflora** Rich.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia hypochaeris DC.
Sin.: *Cacalia hypochaeris* (DC.) Kuntze, *Lessingianthus hypochaeris* (DC.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1988a.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gaelzer, M. B. 68* (ICN), *Smith, L. B. 14929* (RB)]; PRY[*Hassler, E. 5297* (G)].

Vernonia hypochlora Malme
Sin.: *Cacalia oligophylla* (Vell.) Kunth, *Chrysocoma oligophylla* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Malme, G. O. A., 1933b; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1988b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA), *Reitz, P. R. 10691* (HBR)].

Vernonia hystricosa Cabrera & Dematteis
Sin.: *Vernonia microdonta* Sch. Bip. ex Baker, nom. nud.
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999; Dematteis, M., 2002a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA, ITA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 10908* (CTES, F, G, SI)].

Vernonia hystrix Chodat
Sin.: *Stenocephalum hystrix* (Chodat) H. Rob., *Vernonia abbatobiana* Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902; Robinson, H. E., 1988a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, COA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 922* (G), *Dematteis, M. 852* (CTES)].

Vernonia ilex Chodat = **Vernonia chamaedrys** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia imbricata Chodat = **Vernonia oligolepis** Sch. Bip. ex Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia incana Less.
Sin.: *Cacalia incana* (Less.) Kuntze, *Vernonia inmunis* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974c, 1978; Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CEN, PAI, PHA); URY(ART, CLA, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8480* (SI), *Nicora, E. G. 3486* (ICN)]; BRA[*Mattos, J. R. 29003* (HAS), *Matzenbacher, N. I. s.n.* (ICN), *Rauh, W. s.n.* (SI)]; PRY[*Arenas, P. s.n.* (BACP, SI), *Hassler, E. 1925* (G), *Rojas, T. 2217* (SI)]; URY[*Osten, C. 5469* (SI)].

Vernonia inmunis Griseb. = **Vernonia incana** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia intermedia DC.
Sin.: *Cacalia intermedia* (DC.) Kuntze, *Vernonia linearifolia* Hook. & Arn.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(RGS); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mattos, J. R. 20963* (HAS)]; URY[*Castellanos, A. 17612* (CTES, LIL)].

Vernonia intermedia DC. var. *ramosior* DC. = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.

Vernonia isotricha DC. = **Piptocarpha isotrichia** (DC.) Cabrera & Vittet
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia itapensis Chodat = **Vernonia cuneifolia** Gardner
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia kuntzei Hieron. = **Vernonia asteriflora** Mart. ex DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia lanata (Chodat) Cabrera
Sin.: *Vernonia glabrata* Less. var. *lanata* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 774* (G), *Schinini, A. 2211* (SI)].

Vernonia lanifera Cristóbal & Dematteis
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2002, 2003; Dematteis, M., 2004.
Subarbusto. Nativa. 100–1200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28821* (CTES, G, MICH, MO, SI), *Montes, J. E. 2378* (SI), *Montes, J. E. 523* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21014* (LP, MBM)].

Vernonia lanuginosa Gardner = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia lappoides Baker = **Vernonia bardanoides** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia laxa Gardner
Sin.: *Vernonanthura laxa* (Gardner) H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3942* (S)].

Vernonia leonensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999.
Subarbusto. Endémica. 400–800 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Charpin, A. 21749* (G, SI)].

Vernonia lepidifera Chodat = **Vernonia propinqua** Hieron. var. **propinqua**
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia lepidifera Chodat var. *canescens* Chodat = **Vernonia propinqua** Hieron. var. **canescens** (Chodat) Dematteis
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999; Cabrera, A. L., 1944b.

Vernonia linearifolia Hook. & Arn. = **Vernonia intermedia** DC.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia linearis D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud. = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.
Referencias: Dematteis, M., 2004; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia lingua Chodat = **Vernonia echioides** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia linosyrifolia Chodat = **Vernonia brevifolia** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia lipeoensis Cabrera
Sin.: *Vernonanthura lipeoensis* (Cabrera) H. Rob., *Vernonanthura nebularum* (Cabrera) H. Rob., *Vernonia nebularum* Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974c, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1995.
Arbusto o arbolito. Endémica. 1400–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27846* (SI), *Mármol, L. A. 9311* (LIL), *Novara, L. J. 9970* (SI)].

Vernonia lithospermifolia Hieron.
Sin.: *Chrysolaena lithospermifolia* (Hieron.) H. Rob., *Vernonia desertorum* Mart. ex DC. var. *polycephala* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M. & Cabrera, A. L., 1998; Jones, S. B. J., 1981; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Franceschi, F. 154* (SI), *Krapovickas, A. 44612* (CTES, SI), *Schinini, A. 14513* (CTES, LP)]; BRA[*Arzivenco, L. 389* (ICN), *Dusén, P. K. H. 13263* (SI), *Dusén, P. K. H. 15689* (SI), *Gaelzer, M. B. 280* (ICN), *Pereira, E. 7943* (RB, SI)]; PRY[*Hassler, E. 1575* (SI), *Hassler, E. 4467* (BM), *Krapovickas, A. 46079* (SI), *Rojas, T. 2224* (SI)].

Vernonia lithospermoides Baker = **Vernonia remotiflora** Rich.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia longeracemosa Mart. ex DC. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia lorentzii Hieron.
Sin.: *Lessingianthus lorentzii* (Hieron.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10743* (SI)].

Vernonia loretensis Hieron.
Sin.: *Vernonanthura loretensis* (Hieron.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 306* (SI), *Zuloaga, F. O. 5342* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1600* (SI), *Soria, N. 3452* (SI)].

Vernonia lucida Less.
Sin.: *Cacalia lucida* (Less.) Kuntze, *Vernonanthura lucida* (Less.) H. Rob., *Vernonia nitidula* Less. var. *lucida* (Less.) Arechav.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Endémica. 100–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, ITA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1216* (LP), *Montes, J. E. 15109* (ICN, SI)]; BRA[*Hagelund, K. 2192* (ICN), *Smith, L. B. 11937* (HBR, LP, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6112* (SI), *Hassler, E. 10229* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Matzenbacher & Mafioleti, 1994).

Vernonia macrocephala Less.
Sin.: *Lessingianthus macrocephalus* (Less.) H. Rob.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Endémica. 100–400 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 38510* (SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 11648* (SI)].

Vernonia macrophylla Less.
Sin.: *Cacalia macrophylla* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus macrophyllus* (Less.) H. Rob.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 66520* (C, CTES, MBM)].

Vernonia magnifica (Deble, Dematteis & Marchiori) Dematteis
Sin.: *Lessingianthus magnificus* Deble, Dematteis & Marchiori
Referencias: Deble, L. P., Dematteis, M. & Marchiori, J. N. C., 2005.
Arbusto. Endémica. 100–400 m.
Países: BRA(RGS); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Marchiori, J. N. C. 140* (SI)].

Vernonia megapotamica Spreng.
Sin.: *Stenocephalum megapotamicum* (Spreng.) Sch. Bip., *Vernonia megapotamica* Spreng. var. *argentina* Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA); URY(ART, CLA, LAV, PAY, RIV, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14505* (SI), *Krapovickas, A. 23357* (SI), *Martínez Crovetto, R. 8169* (BAB), *Montes, J. E. 2401* (SI), *Morrone, O. 1928* (SI), *Rambo, B. 35085* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13584* (SI), *Krapovickas, A. 40809* (SI), *Matzenbacher, N. I. 476* (ICN), *Matzenbacher, N. I. s.n.* (MPUC), *Rambo, B. 35085* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. 7195* (ICN), *Montes, J. E. 7207* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32402* (SI)].

Vernonia megapotamica Spreng. var. *argentina* Hieron. = **Vernonia megapotamica** Spreng.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia megapotamica Spreng. var. *hexantha* (Sch. Bip.) Cabrera = **Vernonia hexantha** (Sch. Bip.) Baker var. **hexantha**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia microdonta Sch. Bip. ex Baker, nom. nud. = **Vernonia hystricosa** Cabrera & Dematteis
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999.

Vernonia miersiana Gardner = **Vernonia salzmannii** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.

Vernonia mollissima D. Don ex Hook. & Arn. var. **microcephala** Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15468* (BAA, BAB, CTES, LP)].

Vernonia mollissima D. Don ex Hook. & Arn. var. **mollisima**
Sin.: *Cacalia mollissima* (D. Don ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Lessingianthus mollissimus* (D. Don ex Hook. & Arn.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14353* (SI), *Burkart, A. 5735* (SI), *Dematteis, M. 248* (SI), *Krapovickas, A. 28841* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 7851* (ICN)]; PRY[*Jörgensen, P. 4809* (SI), *Schinini, A. 30145* (CTES)].

Vernonia montevidensis Nees ex Otto & A. Dietr. = **Vernonia flexuosa** Sims var. **flexuosa**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia mucronulata Less.
Sin.: *Vernonanthura mucronulata* (Less.) H. Rob., *Vernonia collina* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Duarte, A. P. 5375* (RB, SI)].

[Vernonia muricata DC.]
Referencias: Robinson, H. E., 1995.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vernonia muricata auct. non DC. = **Lepidaploa pseudomuricata** H. Rob.

Vernonia nebularum Cabrera = **Vernonia lipeoensis** Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia niederleinii Hieron.
Sin.: *Lessingianthus niederleinii* (Hieron.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29054* (SI), *Tressens, S. G. 3814* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16706* (SI), *Hagelund, K. 657* (ICN), *Zardini, E. M. 9900* (FCQ, MO)]; PRY[*Arenas, P. 116* (BAB), *Schinini, A. 28132* (SI), *Zardini, E. M. 9900* (FCQ, MO)].

Vernonia nitidula Less.
Sin.: *Baccharis montevidensis* Spreng., *Cacalia montevidensis* (Spreng.) Kuntze, *Piptocarpha nitidula* (Less.) Griseb., *Vernonanthura montevidensis* (Spreng.) H. Rob., *Vernonia arechavaletae* André, *Vernonia florida* Gardner, *Vernonia gochnatioides* Hook. & Arn. ex DC., *Vernonia nitidula* Less. var. *acutifolia* Griseb., *Vernonia nitidula* Less. var. *florida* (Gardner) Baker, *Vernonia nitidula* Less. var. *intermedia* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b., 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1992; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, COA, MIE); URY(ART, CLA, COL, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 6966* (SI), *Zardini, E. M. 655* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 3301* (ICN), *Hatschbach, G. 2526* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18690* (SI), *Hassler, E. 884* (G), *Hassler, E. 9418* (P, SI), *Schinini, A. 30438* (SI)]; URY[*Burkart, A. 18168* (SI), *Hunziker, J. H. s.n.* (BAB)].

Vernonia nitidula Less. var. *acutifolia* Griseb. = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia nitidula Less. var. *florida* (Gardner) Baker = **Vernonia nitidula** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia nitidula Less. var. *intermedia* Chodat = **Vernonia nitidula** Less.

Vernonia nitidula Less. var. *lucida* (Less.) Arechav. = **Vernonia lucida** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia nivea Chodat = **Vernonia hexantha** (Sch. Bip.) Baker var. **nivea** (Chodat) Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.

Vernonia notata Less. = **Piptocarpha notata** (Less.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia novarae Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1997b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Arbusto. Endémica. 1400–1800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 9993* (MCNS, SI)].

Vernonia nudiflora Less. f. **albiflora** Matzenb.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Endémica. 300–400 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hagelund, K. 1767* (ICN)].

Vernonia nudiflora Less. f. **nudiflora**
Sin.: *Cacalia nudiflora* (Less.) Kuntze, *Vernonanthura nudiflora* (Less.) H. Rob., *Vernonia angustifolia* D. Don ex Hook., *Vernonia salicifolia* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1992; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SJU, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 6458* (BAB, SI), *Rosa, E. B. 65* (SI), *Schinini, A. 16771* (ICN)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11345* (SI), *Gaelzer, M. B. 51* (ICN), *Krapovickas, A. 34241* (SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 32366* (SI), *Pedersen, T. M. 11572* (SI), *Rosengurtt, B. 4728* (PACA)].

Vernonia oblonga Gardner = **Piptocarpha oblonga** (Gardner) Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980.

Vernonia obovata Less. = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby
Referencias: Jones, S. B. J., 1981.

Vernonia odoratissima Kunth = **Vernonia brasiliana** (L.) Druce
Referencias: Cabrera, A. L., 1974c; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia oligactoides Less.
Sin.: *Cacalia oligactoides* (Less.) Kuntze, *Vernonanthura oligactoides* (Less.) H. Rob., *Vernonia conyzoides* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b; Stutts, J. G., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9680* (BM, S)]; PRY[*Rojas, T. s.n.* (P, SI), *Schinini, A. 28164* (SI)].

Vernonia oligolepis Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Cacalia oligolepis* (Sch. Bip. ex Baker) Kuntze, *Vernonanthura oligolepis* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob., *Vernonia imbricata* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Dematteis, M., 2002a; Malme, G. O. A., 1933b; Stutts, J. G., 1988.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11477* (HBR, LP, R, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 11057* (SI), *Rojas, T. s.n.* (SI), *Soria, N. 6418* (FCQ, MO)].

Vernonia oreophila Malme = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Vernonia oreophila Speg., hom. illeg. = **Vernonia echioides** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia oxylepis Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Lepidaploa psilostachya* (DC.) H. Rob.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M. & Cabrera, A. L., 1998; Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1990b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28694* (CTES, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10642* (S)]; PRY[*Hassler, E. 11115* (G)].

Vernonia oxyodonta Malme = **Vernonia glabrata** Less. var. **glabrata**
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia palustris Gardner
Sin.: *Dasyanthina palustris* (Gardner) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1993, 1999.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Morrone, O. 412* (SI)].

Vernonia parodii Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1941b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Petetin, C. A. 1478* (SI), *Schulz, A. G. 912* (CTES, LP)]; PRY[*Rojas, T. 2877* (LP, SI)].

Vernonia parvifolia (Chodat) Cabrera
Sin.: *Lessingianthus parvifolius* (Chodat) H. Rob., *Vernonia glabrata* Less. var. *parvifolia* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 777* (G), *Schinini, A. 2213* (SI)].

Vernonia paucifolia Rusby = **Vernonia herbacea** (Vell.) Rusby

Vernonia perangusta Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9552* (S)].

Vernonia petiolaris DC.
Sin.: *Vernonanthura petiolaris* (DC.) H. Rob., *Vernonia diffusa* Less. var. *macrocephala* Hieron., *Vernonia hilariana* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1992.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5474* (BAA, BAB, SI), *Eskuche, U. G. 1808* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 3045* (SI), *Sehnem, A. 4948* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 31424* (CTES)].

Vernonia phyliciformis (Meyen) Walp. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Vernonia phyliciformis (Meyen) Walp. var. *resinosa* Walp. = **Parastrephia lucida** (Meyen) Cabrera
Referencias: Sancho, G. & Ariza Espinar, L., 2003.

Vernonia pinguis Griseb.
Sin.: *Vernonanthura pinguis* (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8185* (SI), *Cabrera, A. L. 4542* (LP)]; PRY[*Soria, N. 1726* (FCQ, MO), *Soria, N. 5908a* (FCQ, MO)].

Vernonia plantaginifolia Less. = **Chresta plantaginifolia** (Less.) Gardner

Vernonia plantaginoides (Less.) Hieron.
Sin.: *Cacalia plantaginoides* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus plantaginodes* (Less.) H. Rob., *Vernonia pseudosquarrosa* Hieron., *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *plantaginoides* Less., *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *squarrosa* Less., *Vernonia squarrosa* (Less.) Less., *Vernonia squarrosa* (Less.) Less. var. *angustifolia* Less., *Vernonia squarrosa* (Less.) Less. var. *plantaginea* Less., *Vernonia squarrulosa* Mattf. ex Malme
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 17037* (ICN, SI)]; BRA[*Hagelund, K. s.n.* (ICN)]; URY[*Sello, H. L. 919* (SI)].

Vernonia platensis (Spreng.) Less.
Sin.: *Cacalia platensis* (Spreng.) Kuntze, *Chrysolaena platensis* (Spreng.) H. Rob., *Conyza platensis* Spreng.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, COA, PAI); URY(FLA, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SJO, TAC, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 69* (SI), *Bridarolli, A. J. 2525* (LP)]; BRA[*Dutra, J. 1297* (ICN)]; PRY[*Jiménez, B. 41* (BM, CTES, MO), *Soria, N. 5989* (FCQ, MO)]; URY[*Osten, C. 14755* (LP)].

Vernonia platyphylla Chodat
Sin.: *Lessingianthus platyphyllus* (Chodat) H. Rob.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Endémica. 400–800 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9917* (BAF, G)].

Vernonia poeppigiana DC. = **Vernonia salzmannii** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.

Vernonia polyanthes Less.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9909* (G)].

Vernonia polycephala DC. = **Vernonia ferruginea** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1992.

Vernonia polyphylla Sch. Bip. ex Baker
Sin.: *Lessingianthus polyphyllus* (Sch. Bip. ex Baker) H. Rob., *Vernonia glabrata* Less. var. *bracteata* Chodat, *Vernonia glabrata* Less. var. *linearifolia* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1995b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2002a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1437* (SI), *Ekman, E. L. 1159* (LP), *Grüner, G. 1291* (LP), *Zuloaga, F. O. 6630* (SI)]; BRA[*Gaelzer, M. B. 55* (ICN)]; PRY[*Dematteis, M. 873* (CTES), *Hassler, E. 9104* (LIL), *Soria, N. 2048* (FCQ, MO)].

Vernonia praecox (Kuntze) K. Schum. = **Vernonia squamulosa** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1992.

Vernonia profusa Dematteis & Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999.
Subarbusto. Endémica. 600–800 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 30440* (CTES, G, LP, TEX)].

Vernonia propinqua Hieron. var. **canescens** (Chodat) Dematteis
Sin.: *Vernonia lepidifera* Chodat var. *canescens* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Dematteis, M. 888* (CTES), *Hassler, E. 6548* (G)].

Vernonia propinqua Hieron. var. **propinqua**
Sin.: *Chrysolaena propinqua* (Hieron.) H. Rob., *Vernonia lepidifera* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1941b, 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2002a; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, GUA, ITA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 371* (CTES), *Zuloaga, F. O. 3205* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 44599* (MBM)]; PRY[*Dematteis, M. 860* (CTES)].

Vernonia pseudoincana (Hieron.) Cabrera
Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) Kuntze var. *pseudoincana* (Hieron.) Kuntze, *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *australis* auct. non Hieron., *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *denudata* Baker, *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *latifolia* Less., *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *pseudoincana* Hieron., *Vernonia salicifolia* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2004.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU); BRA(RGS); PRY(CEN); URY(CAS, COL, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dematteis, M. 605* (BAB, CTES), *Hieronymus, G. H. E. W. s.n.* (CTES)]; BRA[*Rambo, B. 1968* (LP)]; PRY[*Rojas, T. 8644* (S)]; URY[*Rosengurtt, B. 2448* (LP)].

Vernonia pseudolinearifolia Hieron.
Referencias: Dematteis, M., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART, CLA, DUR, PAY, RIV, RNO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Dematteis, M. 1445* (CORD, CTES, SI)].

Vernonia pseudosquarrosa Hieron. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia psilophylla DC.
Sin.: *Cacalia graminifolia* (Gardner) Kuntze, *Cacalia psilophylla* (DC.) Kuntze, *Lessingianthus psilophyllus* (DC.) H. Rob., *Vernonia graminifolia* Gardner
Referencias: Augusto, I., 1946; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 40842* (CTES)].

Vernonia pterocaulon Baker = **Pterocaulon polypterum** (DC.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Ragonese, A. M., 1978.

Vernonia puberula Less.
Sin.: *Vanillosma multiflorum* Mart., *Vernonanthura puberula* (Less.) H. Rob., *Vernonia estrellensis* Gardner, *Vernonia puberula* Less. var. *serrulata* (Sch. Bip.) Hieron., *Vernonia serrulata* Sch. Bip.

Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dutra, J. 1386* (ICN), *Hatschbach, G. 20081* (CTES)].

Vernonia puberula Less. var. *serrulata* (Sch. Bip.) Hieron. = **Vernonia puberula** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia pumilla (Vell.) Cabrera
Sin.: *Cacalia pumilla* (Vell.) Kuntze, *Chrysocoma pumilla* Vell., *Lessingianthus grandiflorus* (Less.) H. Rob., *Lessingianthus pumillus* (Vell.) H. Rob., *Vernonia grandiflora* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16011* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 6287* (LP)].

Vernonia pusilla Dematteis
Referencias: Dematteis, M., 2004.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(APY, AMA, CAU, CEN, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 29216* (CTES, MBM, WIS)]; PRY[*Krapovickas, A. 12396* (CTES, LP)].

Vernonia quinqueflora Less.
Sin.: *Critoniopsis quinqueflora* (Less.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961; Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1999.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2466* (G, HBR, LP)].

Vernonia radula Mart. ex DC. = **Vernonia glabrata** Less. var. **glabrata**

Vernonia ramellae Cabrera
Sin.: *Lessingianthus ramellae* (Cabrera) H. Rob., *Vernonia sessilifolia* Less. var. *auriculata* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6674* (G)].

Vernonia reitziana Cabrera
Sin.: *Lessingianthus reitzianus* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Subarbusto. Endémica. 1200–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ferrucci, M. S. 236* (CTES, MBM), *Reitz, P. R. 6084* (HBR)].

Vernonia remotiflora Rich.
Sin.: *Lepidaploa remotiflora* (Rich.) H. Rob., *Vernonia hirtiflora* Sch. Bip. ex Baker, *Vernonia lithospermoides* Baker, *Vernonia sessiliflora* Willd. ex Less., *Vernonia tricholepis* DC.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2002a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maruñak, V. 963* (BAB, CTES), *Tressens, S. G. 3936* (CTES), *Zuloaga, F. O. 4939* (SI)]; PRY[*Dematteis, M. 867* (CTES), *Ramella, L. 24459* (BAB), *Soria, N. 2089* (FCQ)].

Vernonia remotiflora Rich. var. *aristifera* Cabrera = **Vernonia setososquamosa** Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia resinosa Gardner = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Vernonia reticulata Gardner = **Vernonia bardanoides** Less.
Referencias: Robinson, H. E., 1988a.

Vernonia rigiophylla Sch. Bip. ex Baker = **Vernonia elsieae** Stutts
Referencias: Stutts, J. G., 1983.

Vernonia rojasii Cabrera
Sin.: *Mesanthophora rojasii* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1940.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 2212* (LP, SI)].

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl.
Sin.: *Cacalia rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) Kuntze, *Lessingianthus rubricaulis* (Humb. & Bonpl.) H. Rob., *Vernonia chromolepis* Gardner, *Vernonia intermedia* DC. var. *ramosior* DC., *Vernonia linearis* D. Don ex Hook. & Arn., nom. nud., *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *australis* Hieron., *Vernonia rubricaulis* Humb. & Bonpl. var. *bonplandiana* Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2004; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 46518* (CTES), *Montes, J. E. 1734* (LP)]; BRA[*Hagelund, K. 5646* (ICN), *Jiménez, B. 1828* (BM, CTES, MO, PY)]; PRY[*Soria, N. 7536* (FCQ), *Vanni, R. O. 2628* (CTES)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 2448* (LP)].

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *australis* auct. non Hieron. = **Vernonia pseudoincana** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *australis* Hieron. = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *bonplandiana* Less. = **Vernonia rubricaulis** Humb. & Bonpl.
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *denudata* Baker = **Vernonia pseudoincana** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *latifolia* Less. = **Vernonia pseudoincana** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *plantaginoides* Less. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *pseudoincana* Hieron. = **Vernonia pseudoincana** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L. & Dematteis, M., 1999; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. var. *squarrosa* Less. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia rufogrisea A. St.-Hil. = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Vernonia salicifolia Gillies ex Hook. & Arn. = **Vernonia pseudoincana** (Hieron.) Cabrera
Referencias: Dematteis, M., 2004.

Vernonia salicifolia Griseb. = **Vernonia nudiflora** Less. f. **nudiflora**
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia saltensis Hieron.
Sin.: *Lessingianthus saltensis* (Hieron.) H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1994; Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Nativa. 300–1300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 531* (CORD), *Pozner, R. 454* (CTES, SI), *Schulz, A. G. 935* (CTES, LP)]; PRY[*Krapovickas, A. 45327* (CTES, G, SI)].

Vernonia salviifolia Chodat = **Vernonia brasiliana** (L.) Druce
Referencias: Cabrera, A. L., 1974c; Chodat, R. H., 1901; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia salzmannii DC.
Sin.: *Lepidaploa salzmanii* (DC.) H. Rob., *Vernonia argyropappa* H. Buek, *Vernonia herbertii* Cuatrec., *Vernonia miersiana* Gardner, *Vernonia poeppigiana* DC., *Vernonia velutina* Hieron.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43889* (CTES)]; PRY[*Ramella, L. 2790* (G)].

Vernonia saxicola Sch. Bip. ex Baker = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Vernonia scabra Pers. = **Vernonia brasiliana** (L.) Druce
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia sceptrum Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1902.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Dematteis, M. 909* (CTES, FCQ), *Hassler, E. 5828* (G)].

Vernonia schulziana Cabrera
Sin.: *Vernonanthura schulziana* (Cabrera) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1992, 1995.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 3757* (LP)]; BRA[*Gaelzer, M. B. 93* (ICN)].

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers.
Sin.: *Cacalia scorpioides* (Lam.) Kuntze, *Chrysocoma repanda* Vell., *Conyza scorpioides* Lam., *Cyrtocymura scorpioides* (Lam.) H. Rob., *Lepidaploa scorpioides* (Lam.) Cass., *Vernonia arborescens* (L.) Sw. var. *corrientensis* Hieron., *Vernonia centriflora* Link & Otto, *Vernonia flavescens* Less., *Vernonia lanuginosa* Gardner, *Vernonia longeracemosa* Mart. ex DC., *Vernonia subrepanda* Pers., *Vernonia tournefortioides* Kunth
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, PAI); URY(ART, COL, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 44167* (CTES)]; BRA[*Hagelund, K. 5406* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 378* (G), *Zardini, E. M. 3131* (FCQ, MO), *Zardini, E. M. 4127* (FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 1100* (G)].

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. var. *cincta* (Griseb.) Cabrera = **Vernonia cincta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. var. *sororia* (DC.) Baker = **Vernonia sororia** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1999.

Vernonia sellowii Less.
Sin.: *Cacalia sellowii* (Less.) Kuntze, *Lessingianthus sellowii* (Less.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1974a; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1988a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, COA, MIE); URY(ART, CLA, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14761* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 39701* (CTES)]; PRY[*Dematteis, M. 864* (CTES)]; URY[*Dematteis, M. 492* (CTES)].

Vernonia senecionea Mart. ex DC. = **Vernonia cognata** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia senecionea Mart. ex DC. var. *adenocarpa* DC. = **Vernonia cognata** Less.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia senecioniifolia Britton = **Vernonia fulta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia sericea Rich. var. *tarijensis* Griseb. = **Vernonia tarijensis** (Griseb.) Hieron.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia serrulata Sch. Bip. = **Vernonia puberula** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia sessiliflora Willd. ex Less. = **Vernonia remotiflora** Rich.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Robinson, H. E., 1990b.

Vernonia sessilifolia Less.
Referencias: Chodat, R. H., 1902; Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 40785* (CTES, K)]; PRY[*Schinini, A. 28185* (CTES)].

Vernonia sessilifolia Less. var. *auriculata* Chodat = **Vernonia ramellae** Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1995b.

Vernonia setososquamosa Hieron.
Sin.: *Vernonia remotiflora* Rich. var. *aristifera* Cabrera
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APA, AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 46269* (CTES), *Lorentz, P. G. 1205* (CORD), *Novara, L. J. 10877* (CORD, CTES, MCNS)]; PRY[*Krapovickas, A. 45468* (CTES, SI)].

Vernonia simplex Less.
Sin.: *Lessingianthus simplex* (Less.) H. Rob., *Vernonia erigerontis* Mart. ex DC., nom. nud., *Vernonia simplex* Less. var. *angustifolia* Less., *Vernonia simplex* Less. var. *latifolia* Less., *Vernonia simplex* Less. var. *regnellii* Baker
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Jones, S. B. J., 1981; Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Nativa. 900–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13335* (HBR)].

Vernonia simplex Less. var. *angustifolia* Less. = **Vernonia simplex** Less.

Vernonia simplex Less. var. *latifolia* Less. = **Vernonia simplex** Less.
Referencias: Jones, S. B. J., 1981.

Vernonia simplex Less. var. *regnellii* Baker = **Vernonia simplex** Less.

[Vernonia sororia DC.]
Sin.: *Cacalia scorpioides* (Lam.) Kuntze var. *sororia* (DC.) Kuntze, *Lepidaploa sororia* (DC.) H. Rob., *Vernonia scorpioides* (Lam.) Pers. var. *sororia* (DC.) Baker
Referencias: Robinson, H. E., 1995.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vernonia spegazzini Hicken = **Vernonia echioides** Less.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia spicata Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1974c; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 5394* (LIL)].

Vernonia squamulosa Hook. & Arn.
Sin.: *Cacalia praecox* Kuntze, *Cacalia squamulosa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Vernonanthura squamulosa* (Hook. & Arn.) H. Rob., *Vernonia praecox* (Kuntze) K. Schum.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Dematteis, M., 2002a; Robinson, H. E., 1992.
Arbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 12121* (SI), *Schinini, A. 10221* (CTES, G, LP, SI)].

Vernonia squarrosa (Less.) Less. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia squarrosa (Less.) Less. var. *angustifolia* Less. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia squarrosa (Less.) Less. var. *plantaginea* Less. = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia squarrulosa Mattf. ex Malme = **Vernonia plantaginoides** (Less.) Hieron.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia subpaludosa Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16178* (S)].

Vernonia subrepanda Pers. = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia tarijensis (Griseb.) Hieron.
Sin.: *Cacalia tarijensis* (Griseb.) Kuntze, *Lepidaploa tarijensis* (Griseb.) H. Rob., *Vernonia sericea* Rich. var. *tarijensis* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b, 1978; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Robinson, H. E., 1990b.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4173* (CTES, LP)].

Vernonia teyucuarensis Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1987; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.
Subarbusto. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1019* (SI), *Schinini, A. 19870* (CTES, LP, SI)].

Vernonia tournefortioides Kunth = **Vernonia scorpioides** (Lam.) Pers.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia tricephala Gardner = **Vernonia eremophila** Mart. ex DC.

Vernonia tricholepis DC. = **Vernonia remotiflora** Rich.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia triplinervia Spreng. = **Baccharis trineura** Soria & Zardini
Referencias: Soria Rey, N. & Zardini, E. M., 2001.

Vernonia trixioides Rusby = **Vernonia fulta** Griseb.
Referencias: Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003.

Vernonia tweedieana Baker
Sin.: *Chrysocoma arborea* Vell., *Vernonanthura tweedieana* (Baker) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4905* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 756* (ICN)]; PRY[*Morrone, O. 412* (FCQ, SI), *Schinini, A. 28135* (CTES)].

Vernonia ulei Hieron.
Sin.: *Lessingianthus ulei* (Hieron.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Nativa. 300–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1214* (B)].

Vernonia valenzuelae Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Robinson, H. E., 1988a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6996* (BM, G, P)].

Vernonia velutina Hieron. = **Vernonia salzmannii** DC.
Referencias: Robinson, H. E., 1990b.

Vernonia verbascifolia Less.
Sin.: *Cacalia verbascifolia* (Less.) Kuntze, *Chrysolaena verbascifolia* (Less.) H. Rob., *Vernonia candelabrum* Chodat
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Cabrera, A. L., 1944b; Cristóbal, C. L. & Dematteis, M., 2003; Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994; Robinson, H. E., 1988b; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Subarbusto. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, COA, PAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Crisci, J. V. 331* (LP), *Ekman, E. L. 1214* (LP)]; BRA[*Hagelund, K. 5643* (ICN)]; PRY[*Krapovickas, A. 45761* (CTES)]; URY[*Sellow, F. s.n.* (P)].

Vernonia verbenacea DC. = **Vernonia echioides** Less.
Referencias: Matzenbacher, N. I. & Mafioleti, S., 1994.

Vernonia viminea Ekman ex Malme
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7677* (S)].

[Vernonia virens Sch. Bip. ex Baker]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Vernonia viscidula Less.
Sin.: *Vernonanthura viscidula* (Less.) H. Rob.
Referencias: Cabrera, A. L. & Vittet, N., 1961.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).

Vernonia westermanii Ekman & Dusén ex Malme
Sin.: *Lessingianthus westermanii* (Ekman & Dusén ex Malme) H. Rob.
Referencias: Malme, G. O. A., 1933b.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16400* (S)].

Vernonia westiniana Less.
Sin.: *Vernonanthura westiniana* (Less.) H. Rob., *Vernonia hebeclada* DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Klein, R. M., 1980; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40707* (CTES)].

Viguiera Kunth

Número de especies: 31, 18 endémicas

Viguiera adenotricha S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Macrae, F. s.n.* (G, K)].

Viguiera amphichlora S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5160* (BM, G)].

Viguiera anchusaefolia (DC.) Baker var. **anchusaefolia**
Sin.: *Leighia anchusaefolia* DC., *Leighia baldwiniana* Nutt., *Leighia dissitifolia* DC., *Leighia lomatoneura* DC.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1979.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10196* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 890* (PACA)]; URY[*Alonso Paz, E. 3668* (MVFQ)].

Viguiera anchusaefolia (DC.) Baker var. **inmarginata** (DC.) Baker
Sin.: *Leighia inmarginata* DC., *Leighia stenophylla* Hook. & Arn., *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1979.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(COL, FLO, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29609* (SI)]; BRA[*Mondin, C. A. 2910* (HASU)]; URY[*Pedersen, T. M. 15672* (MBM)].

Viguiera atacamensis Phil.
Sin.: *Rhysolepis atacamensis* (Phil.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera linearis* Reiche
Referencias: Blake, S. F., 1918; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 2800–2900 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Viguiera attenuata Gardner = **Aspilia attenuata** (Gardner) Baker

Viguiera breviflosculosa S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA, FLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 3125* (MVFA)].

Viguiera cabrerae H. Rob. = **Hymenostephium debile** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Viguiera corymbosa (DC.) S.F. Blake = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a.

Viguiera debilis (Cabrera) Ariza = **Hymenostephium debile** (Cabrera) Cabrera

Viguiera densifolia Baker
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 858* (K)].

Viguiera discoidea (Griseb.) S.F. Blake = **Viguiera tucumanensis** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **discoidea** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera elegans Gardner = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Viguiera fabrisii A.A. Sáenz
Sin.: *Rhysolepis fabrisii* (A.A. Sáenz) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Sáenz, A. A., 1979.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28437* (LP, SI)].

Viguiera filifolia Sch. Bip.
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9889* (G)].

Viguiera floribunda Gardner = **Aspilia floribunda** (Gardner) Baker

Viguiera foliacea Spreng. = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Viguiera gayana (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg. = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake

Viguiera gilliesii (Hook. & Arn.) Hieron.
Sin.: *Flourensia hispida* Phil., *Helianthus heteropappus* Gillies ex Hook. & Arn., *Leighia gilliesii* Hook. & Arn., *Rhysolepis gilliesii* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Blake, S. F., 1918; Sáenz, A. A., 1979.
Subarbusto. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Haene, H. 1609* (LP, SI)].

Viguiera glabra Gardner = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Viguiera gracilis Gardner = **Aspilia floribunda** (Gardner) Baker

Viguiera guaranitica Chodat
Sin.: *Rhysolepis guaranitica* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Blake, S. F., 1918; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SDE); BRA(RGS); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1028* (LIL, LP)]; BRA[*Mondin, C. A. 2825* (HASU)]; PRY[*Zardini, E. M. 51423* (AS, MO)].

Viguiera hassleriana Chodat
Referencias: Blake, S. F., 1918; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4306* (BM, G)].

Viguiera hirsuta Gardner = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Viguiera linearifolia Chodat
Sin.: *Rhysolepis linearifolia* (Chodat) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Blake, S. F., 1918; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3666* (CTES, FCQ, SI), *Soria, N. 6065* (FCQ, MO)].

Viguiera linearis Reiche = **Viguiera atacamensis** Phil.

Viguiera macrorhiza Baker
Sin.: *Rhysolepis macrorhiza* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 1139* (K)].

Viguiera malmei S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Endémica. 300–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 794* (BM, G)].

Viguiera megapotamica Malme
Referencias: Mondin, C. A., 2004a.
Arbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 760b* (GH)].

Viguiera misionensis A.A. Sáenz
Referencias: Sáenz, A. A., 1979.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28299* (CTES, LP, SI)].

Viguiera mollis Griseb.
Sin.: *Helianthopsis mollis* (Griseb.) Sala & Echarte, *Helianthus argentinus* A.A. Sáenz, *Rhysolepis mollis* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Panero, J. L., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11807* (LP, SI)].

Viguiera nudicaulis Baker
Sin.: *Rhysolepis nudicaulis* (Baker) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Blake, S. F., 1918; Mondin, C. A., 2004a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mondin, C. A. 2951* (HASU)]; URY[*Berro, M. B. 2432* (MVFA)].

Viguiera oligodonta S.F. Blake = **Viguiera tucumanensis** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **oligodonta** (S.F. Blake) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera paranensis (Malme) J.U. Santos
Sin.: *Aspilia paranensis* Malme, *Wedelia paranensis* (Malme) B.L. Turner
Referencias: Santos, J. U. M., 1992.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15646* (BM, G, S)].

Viguiera pazensis Rusby
Sin.: *Flourensia atacamensis* (Phil.) Reiche, *Helianthus atacamensis* Phil.
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21992* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 155* (CONC)].

Viguiera pflanzii Perkins = **Viguiera procumbens** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera pilicaulis S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10757* (BAF, BM, G)].

Viguiera poeppigii A. Gray = **Viguiera revoluta** (Meyen) S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera procumbens (Pers.) S.F. Blake
Sin.: *Helianthus procumbens* Pers., *Viguiera pflanzii* Perkins, *Viguiera punensis* S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Okada, K. A. 5793* (BA, LP)].

Viguiera punensis S.F. Blake = **Viguiera procumbens** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera pusilla Less. ex Baker = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Viguiera ramosissima Gardner = **Aspilia floribunda** (Gardner) Baker

Viguiera reflexa Sch. Bip. ex Baker = **Aspilia reflexa** (Sch. Bip. ex Baker) Baker

Viguiera revoluta (Meyen) S.F. Blake
Sin.: *Flourensia corymbosa* DC., *Flourensia corymbosa* DC. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Flourensia corymbosa* DC. var. *lanceolata* (Meyen) Reiche, *Helianthus araucanus* Phil., *Helianthus lanceolatus* Meyen, *Helianthus revolutus* Meyen, *Viguiera corymbosa* (DC.) S.F. Blake, *Viguiera gayana* (Phil.) Cabrera ex Espinosa, nom. illeg., *Viguiera poeppigii* A. Gray
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1971a; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(III, IV, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13598* (BAA, BAB, LP, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20030* (CONC)].

Viguiera rojasii S.F. Blake
Sin.: *Rhysolepis rojasii* (S.F. Blake) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 33327* (CTES, SI)].

Viguiera salicifolia Hassl.
Sin.: *Rhysolepis salicifolia* (Hassl.) H. Rob. & A.J. Moore, *Viguiera villaricensis* S.F. Blake
Referencias: Sáenz, A. A., 1979.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1902* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 8627* (G, NY)].

Viguiera santacatarinense (H. Rob. & A.J. Moore) A.A. Sáenz
Sin.: *Rhysolepis santacatarinensis* H. Rob. & A.J. Moore
Arbusto. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 59135* (MBM, US)].

Viguiera simulans S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4367* (BM, G, K)].

Viguiera stenophylla (Hook. & Arn.) Griseb. = **Viguiera anchusaefolia** (DC.) Baker var. **inmarginata** (DC.) Baker
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera stenophylla (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb. = **Viguiera tucumanensis** (Hook. & Arn.) Griseb. var. **discoidea** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.

Viguiera subdentata S.F. Blake
Referencias: Blake, S. F., 1918.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 1136* (P)].

Viguiera trichophylla Dusén
Referencias: Blake, S. F., 1918; Malme, G. O. A., 1933b.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3488* (BM, G, K, S)].

Viguiera tuberosa Griseb.
Sin.: *Rhysolepis tuberosa* (Griseb.) H. Rob. & A.J. Moore

Referencias: Blake, S. F., 1918; Cabrera, A. L., 1974a; Mondin, C. A., 2004a; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); BRA(RGS); PRY(CAN, CON, ITA, PHA); URY(ART, PAY, RNO, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 6600* (CTES, LP)]; BRA[*Mondin, C. A. 2948* (HASU)]; PRY[*Pérez, L. 3037* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4195* (MVFA)].

Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. var. **discoidea** (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Viguiera discoidea* (Griseb.) S.F. Blake, *Viguiera stenophylla* (Hook. & Arn.) Griseb. var. *discoidea* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 46623* (CTES)].

Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. var. **oligodonta** (S.F. Blake) Cabrera
Sin.: *Viguiera oligodonta* S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 11048* (CORD, MCNS)].

Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. var. **tucumanensis**
Sin.: *Leighia tucumanensis* Hook. & Arn., *Rhysolepis tucumanensis* (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Sáenz, A. A., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 395* (SI)].

Viguiera villaricensis S.F. Blake = **Viguiera salicifolia** Hassl.
Referencias: Sáenz, A. A., 1979.

Villanova Ruiz & Pav.

Número de especies: 2, 1 endémica

Villanova anemonifolia (Kunth) Less. = **Villanova oppositifolia** Lag.
Referencias: Reiche, C. F., 1905.

Villanova bipinnatifida Ortega = **Parthenium hysterophorus** L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.

Villanova oppositifolia Lag.
Sin.: *Unxia anemonifolia* Kunth, *Vasquezia anemonifolia* (Kunth) S.F. Blake, *Vasquezia biternata* Phil., *Vasquezia oppositifolia* (Lag.) S.F. Blake, *Villanova anemonifolia* (Kunth) Less.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Anual. Nativa. 0–300 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. 1288* (SGO)].

[Villanova perpusilla Phil.]
Referencias: Reiche, C. F., 1905.
Notas: Nombre dudoso.

Villanova robusta Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Reiche, C. F., 1905.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–3800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rahmer, C. s.n.* (SGO)].

Virgilia grandiflora Nutt. = **Gaillardia aristata** Pursh
Referencias: Biddulph, S. F., 1944.

Vittadinia multifida Griseb. = **Baccharis ulicina** Hook. & Arn.
Referencias: Giuliano, D. A., 2001.

Vittadinia trifurcata (Less.) Griseb. = **Microgyne trifurcata** Less.
Referencias: Sancho, G., Bonifacino, J. M. & Pruski, J. F., 2006.

Vittetia orbiculata (DC.) R.M. King & H. Rob. = **Eupatorium orbiculatum** DC.

Wedelia Jacq., nom. cons.

Número de especies: 6

Wedelia apensis (Chodat) B.L. Turner = **Angelphytum apensis** (Chodat) A.A. Sáenz

Wedelia attenuata (Gardner) B.L. Turner = **Aspilia attenuata** (Gardner) Baker

Wedelia aurantiaca (Griseb.) B.L. Turner = **Aspilia aurantiaca** Griseb. var. **aurantiaca**

Wedelia brachycarpa Baker = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Wedelia brachylepis Griseb. = **Zexmenia brachylepis** (Griseb.) Cabrera
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Wedelia buphtalmiflora Lorentz = **Zexmenia buphtalmiflora** (Lorentz) Ariza
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wedelia burchellii (Baker) B.L. Turner = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Wedelia callosa (Chodat) B.L. Turner = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Wedelia camporum (Chodat) B.L. Turner = **Aspilia camporum** Chodat

Wedelia chrysostephana Griseb. = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wedelia copiapina (Phil.) Reiche = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wedelia crassiuscula S.F. Blake = **Wedelia subvaginata** N.E. Br.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Wedelia ecliptaefolia (DC.) B.L. Turner = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wedelia glabra (Gardner) B.L. Turner = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Wedelia glauca (Ortega) S.F. Blake, comb. superfl. = **Wedelia glauca** (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm. ex Hicken
Sin.: *Aspilia ecliptaefolia* (DC.) Baker, *Helianthus copiapinus* Phil., *Leighia ecliptifolia* DC., *Lorentzia pascaloides* Griseb., *Pascalia glauca* Ortega, *Wedelia chrysostephana* Griseb., *Wedelia copiapina* (Phil.) Reiche, *Wedelia ecliptaefolia* (DC.) B.L. Turner, *Wedelia glauca* (Ortega) S.F. Blake, comb. superfl.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); CHL(III); PRY(PHA); URY(COL, MON, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8887* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3624* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 41695* (AS, MO)]; URY[*Cabrera, A. L. 3187* (LP)].

Wedelia hassleriana (Chodat) B.L. Turner = **Aspilia hassleriana** Chodat

Wedelia hirsuta (Gardner) B.L. Turner = **Aspilia foliacea** (Spreng.) Baker

Wedelia holwayii S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.
Subarbusto. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 25150* (LP, SI)].

Wedelia kerrii N.E. Br.
Sin.: *Wedelia kerrii* N.E. Br. var. *decumbens* Hassl., *Wedelia longepetiolata* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1959c; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1289* (SI)]; BRA[*Ribas, O. S. 3922* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 28285* (CTES)].

Wedelia kerrii N.E. Br. var. *decumbens* Hassl. = **Wedelia kerrii** N.E. Br.

Wedelia leucanthema (Chodat) B.L. Turner = **Aspilia leucanthema** Chodat
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Stevens, W. D., 1998.

Wedelia longepetiolata Hassl. = **Wedelia kerrii** N.E. Br.

Wedelia montevidensis (Spreng.) B.L. Turner = **Aspilia montevidensis** (Spreng.) Kuntze var. **montevidensis**
Referencias: Sáenz, A. A., 1999.

Wedelia paranensis (Malme) B.L. Turner = **Viguiera paranensis** (Malme) J.U. Santos
Referencias: Santos, J. U. M., 1992.

Wedelia pascalioides (Griseb.) B.L. Turner = **Aspilia pascalioides** Griseb.
Referencias: Sáenz, A. A., 1999.

Wedelia phyllostachya (Baker) B.L. Turner = **Aspilia phyllostachya** Baker

Wedelia pilosa Baker = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Wedelia pilosa Baker var. *brachycarpa* Hassl. = **Sphagneticola brachycarpa** (Baker) Pruski

Wedelia reflexa (Baker) B.L. Turner = **Aspilia reflexa** (Sch. Bip. ex Baker) Baker

Wedelia riedelii (Baker) B.L. Turner = **Aspilia riedelli** Baker

Wedelia saltensis Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 600–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3475* (SI)].

Wedelia sessilifolia Mart. ex Baker = **Aspilia reflexa** (Sch. Bip. ex Baker) Baker

Wedelia silphioides (Hook. & Arn.) B.L. Turner = **Aspilia silphioides** (Hook. & Arn.) Benth. & Hook. f.

Wedelia subvaginata N.E. Br.
Sin.: *Pascalia subvaginata* (N.E. Br.) Strother, *Wedelia crassiuscula* S.F. Blake, *Wedelia subvaginata* N.E. Br. var. *major* Hassl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); PRY(CEN, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 46456* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 5997* (CTES, FCQ, MO)].

Wedelia subvaginata N.E. Br. var. *major* Hassl. = **Wedelia subvaginata** N.E. Br.

Wedelia subvelutina DC.
Sin.: *Wedelia subvelutina* DC. var. *linearifolia* Chodat
Referencias: Sáenz, A. A., 1999.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29076* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12236* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27140* (CTES, SI)].

Wedelia subvelutina DC. var. *linearifolia* Chodat = **Wedelia subvelutina** DC.

Wedelia trilobata (L.) Hitchc. = **Sphagneticola trilobata** (L.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Werneria Kunth

Número de especies: 11, 3 endémicas

Werneria apiculata Sch. Bip.
Sin.: *Werneria pygmaea* Gillies ex Hook. & Arn. var. *apiculata* (Sch. Bip.) Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15451* (LP)].

Werneria aretioides Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17577* (LP)]; CHL[*Marticorena, A. 108* (CONC)].

Werneria brachypappus Phil., hom. illeg. = **Werneria denticulata** S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Rockhausen, M. S., 1939.

Werneria calyculata Turcz. = **Werneria pumila** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria caulescens (Wedd.) Griseb. = **Werneria villosa** A. Gray
Referencias: Rockhausen, M. S., 1939.

Werneria ciliolata A. Gray = **Xenophyllum ciliolatum** (A. Gray) V.A. Funk
Referencias: Funk, V. A., 1997.

Werneria cochlearis Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C., com. pers.; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, SAL); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 114* (CORD, LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 97380* (CONC)].

Werneria cortusifolia Griseb. = **Senecio breviscapus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Werneria decumbens Hieron. = **Xenophyllum weddellii** (Phil.) V.A. Funk
Referencias: Funk, V. A., 1997.

Werneria densa Benth. = **Werneria pumila** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria denticulata S.F. Blake
Sin.: *Werneria brachypappus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–5000 m.
Países: ARG(LRI, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 709* (CORD)]; CHL[*Ricardi, M. 36465* (LP)].

Werneria digitata auct. non Wedd. = **Xenophyllum pseudodigitatum** (Rockh.) V.A. Funk
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b; Funk, V. A., 1997.

Werneria glaberrima Phil.
Referencias: Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Endémica. 4200–4600 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Luebert B., F. 486* (EIF)].

Werneria heteroloba Wedd. f. **heteroloba**
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9049* (LP)]; CHL[*Funk, V. A. 11191* (LP)].

Werneria heteroloba Wedd. f. **microcephala** Rockh.
Sin.: *Werneria pinnatifida* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 3900–4100 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arancio, G. 335* (CONC)].

Werneria incisa Phil. = **Xenophyllum incisum** (Phil.) V.A. Funk var. **incisum**
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria incisa Phil. var. *pubescens* Rockh. = **Xenophyllum incisum** (Phil.) V.A. Funk var. **pubescens** (Rockh.) Cabrera & S.E. Freire
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria juniperina Hieron. = **Xenophyllum ciliolatum** (A. Gray) V.A. Funk
Referencias: Funk, V. A., 1997.

Werneria lorentziana Hieron. = **Xenophyllum poposum** (Phil.) V.A. Funk
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria pinnatifida J. Remy = **Werneria heteroloba** Wedd. f. **microcephala** Rockh.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b.

Werneria poposa Phil. = **Xenophyllum poposum** (Phil.) V.A. Funk
Referencias: Funk, V. A., 1997.

Werneria pseudodigitata Rockh. = **Xenophyllum pseudodigitatum** (Rockh.) V.A. Funk
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria pumila Kunth
Sin.: *Werneria calyculata* Turcz., *Werneria densa* Benth.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 273* (LP)].

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Werneria rhizoma* J. Remy
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Cabrera, A. L., 1948b, 1971b, 1978; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., Squeo, F. A., Arancio, G. & Muñoz-Schick, M., 2001; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–5000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17589* (LP)]; CHL[*Funk, V. A. 11220* (LP)].

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. var. *apiculata* (Sch. Bip.) Wedd. = **Werneria apiculata** Sch. Bip.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978.

Werneria pygmophila S.F. Blake = **Senecio digitatus** Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1949b.

Werneria rhizoma J. Remy = **Werneria pygmaea** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999.

Werneria rosenii R.E. Fr. = **Xenophyllum rosenii** (R.E. Fr.) V.A. Funk
Referencias: Funk, V. A., 1997.

Werneria solivifolia Sch. Bip.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 266* (CONC)].

Werneria spathulata Wedd.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 69-xxi* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 302* (CONC)].

Werneria villosa A. Gray
Sin.: *Werneria caulescens* (Wedd.) Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Rockhausen, M. S., 1939.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werner, D. 561* (LP)].

Werneria weddellii Phil. = **Xenophyllum weddellii** (Phil.) V.A. Funk
Referencias: Funk, V. A., 1997.

Werneria wernerioides (Wedd.) Kuntze = **Senecio breviscapus** DC.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1980; Cabrera, A. L., 1949b.

Wiborgia acmella Roth = **Galinsoga parviflora** Cav.
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1978.

Wiborgia oblongifolia Hook. = **Eclipta prostrata** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wiborgia parviflora (Cav.) Kunth = **Galinsoga parviflora** Cav.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wiborgia urticaefolia Kunth = **Galinsoga urticifolia** (Kunth) Benth.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Willoughbya ternifolia (DC.) Kuntze = **Mikania fulva** Baker
Referencias: Ritter, M. R. & Miotto, S. T. S., 2003.

Wollastonia prostrata DC. = **Eclipta elliptica** DC.

Wulffia baccata (L. f.) Kuntze = **Tilesia baccata** (L. f.) Pruski
Referencias: Pruski, J. F., 1996.

Wulffia debilis Cabrera = **Hymenostephium debile** (Cabrera) Cabrera
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Wulffia platyglossa DC. = **Tilesia baccata** (L. f.) Pruski

Wulffia stenoglossa DC. = **Tilesia baccata** (L. f.) Pruski

Xanthium L.

Número de especies: 7, 1 endémica, 2 introducidas

Xanthium ambrosioides Hook. & Arn.
Sin.: *Xanthium spinosum* L. var. *ambrosioides* (Hook & Arn.) Löve & Dans.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1959a, 1963a, 1971a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 3478* (CORD)].

Xanthium argenteum Widder
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].
Hierba. Anual. Endémica. 400–1500 m.
Países: CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994891* (CONC)].

Xanthium australe Millsp. & Sherff = **Xanthium cavanillesii** Schouw
Referencias: Cabrera, A. L., 1974a.

Xanthium catharticum Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1971a, 1978.
Hierba. Anual. Introducida. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Haene, H. 1947* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 167* (CONC)].

Xanthium cavanillesii Schouw
Sin.: *Xanthium australe* Millsp. & Sherff, *Xanthium cavanillesii* Schouw var. *cordobense* Widder, *Xanthium strumarium* L'Hér. subsp. *cavanillesii* (Schouw) D. Löve & Dans.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1971a, 1974a, 1978; Malme, G. O. A., 1933b; Mondin, C. A., 2004a; Navas Bustamante, L. E., 1979.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SJU); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(III, IV, VII, VIII, RME); URY(CAS, CLA, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1187* (SI)]; BRA[*Oliveira, P. I. 873* (MBM)]; CHL[*Matthei, O. R. 45* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 4063* (MVFA)].

Xanthium cavanillesii Schouw var. *cordobense* Widder = **Xanthium cavanillesii** Schouw
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Xanthium saccharatum Wallr.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1974a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1094* (SI)].

Xanthium spinosum L. var. *ambrosioides* (Hook & Arn.) Löve & Dans. = **Xanthium ambrosioides** Hook. & Arn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Xanthium spinosum L. var. **pseudinerme** Widder
Referencias: Cabrera, A. L., 1963a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 8535* (LP)].

Xanthium spinosum L. var. **spinosum**
Sin.: *Acanthoxanthium spinosum* (L.) E. Fourn.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Cabrera, A. L., 1963a, 1971a, 1974a, 1978; Mondin, C. A., 2004a; Navas Bustamante, L. E., 1979; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(II, III, IV, V, VII, VIII, IX, IJF, RME); PRY(APY, CEN, PAI); URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 476* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 2434* (NY)]; CHL[*Matthei, O. R. 448* (CONC)]; PRY[*Brunner, D. R. 1657* (MO, PY)]; URY[*Berro, M. B. 503* (MVFA)].

Xanthium strumarium L.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 36192* (AS, MO)].

Xanthium strumarium L'Hér. subsp. *cavanillesii* (Schouw) D. Löve & Dans. = **Xanthium cavanillesii** Schouw
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Xenophyllum V.A. Funk
Número de especies: 6, 2 endémicas

Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk
Sin.: *Werneria ciliolata* A. Gray, *Werneria juniperina* Hieron.
Referencias: Funk, V. A., 1997; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Nativa. 4000–5200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3377* (CONC)].

Xenophyllum incisum (Phil.) V.A. Funk var. **incisum**
Sin.: *Werneria incisa* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Funk, V. A., 1997; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8623* (LP)]; CHL[*Pisano, E. s.n.* (LP)].

Xenophyllum incisum (Phil.) V.A. Funk var. **pubescens** (Rockh.) Cabrera & S.E. Freire
Sin.: *Werneria incisa* Phil. var. *pubescens* Rockh.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Funk, V. A., 1997.
Subarbusto. Endémica. 4500–5000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, D. 1382* (LP)].

Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk
Sin.: *Werneria lorentziana* Hieron., *Werneria poposa* Phil.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Funk, V. A., 1997; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Nativa. 3500–5300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9093* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 940* (LP)].

Xenophyllum pseudodigitatum (Rockh.) V.A. Funk
Sin.: *Werneria digitata* auct. non Wedd., *Werneria pseudodigitata* Rockh.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Funk, V. A., 1997; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 4200–5000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19009* (LP)]; CHL[*Zöllner, O. 3370* (LP)].

Xenophyllum rosenii (R.E. Fr.) V.A. Funk
Sin.: *Werneria rosenii* R.E. Fr.
Referencias: Cabrera, A. L., 1948b, 1978; Cabrera, A. L., Freire, S. E. & Ariza Espinar, L., 1999; Funk, V. A., 1997.
Subarbusto. Nativa. 5200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 862* (CORD, P, US)].

Xenophyllum weddellii (Phil.) V.A. Funk
Sin.: *Werneria decumbens* Hieron., *Werneria weddellii* Phil.
Referencias: Funk, V. A., 1997; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Nativa. 4000–5000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (K, LP, SGO, US)].

Xeranthemum caespitosum Thouars = **Chevreulia sarmentosa** (Pers.) S.F. Blake
Referencias: Cabrera, A. L., 1978.

Ximenesia encelioides Cav. = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Ximenesia microptera DC. = **Verbesina encelioides** (Cav.) Benth. & Hook. f. ex A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Yunquea Skottsb.
Número de especies: 1 endémica

Yunquea tenzii Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kunkel, G. W. H. 304* (CONC)].

Zexmenia La Llave
Número de especies: 2, 1 endémica

Zexmenia apensis (Chodat) Hassl. = **Angelphytum apensis** (Chodat) A.A. Sáenz

Zexmenia arnottii (Baker) Hassl. = **Angelphytum arnottii** (Baker) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zexmenia aspilioides (Griseb.) Hassl. = **Angelphytum aspilioides** (Griseb.) H. Rob.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Zexmenia brachylepis (Griseb.) Cabrera
Sin.: *Wedelia brachylepis* Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Freire, S. E., Sancho, G., Urtubey, E., Bayón, N. D., Katinas, L., Giuliano, D., Gutiérrez, D., Saénz, A. A., Iharlegui, L., Monti, C. & Delucchi, G., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sáenz, A. A. 1558* (LP, SI)]; PRY[*Schinini, A. 33421* (CTES, SI)].

Zexmenia buphtalmiflora (Lorentz) Ariza
Sin.: *Wedelia buphtalmiflora* Lorentz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1982b; Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., et al., 2000; Freire, S. E., Katinas, L. & Sancho, G., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 332* (SI)].

Zexmenia grisebachii (Baker) Hassl. = **Angelphytum grisebachii** (Baker) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zexmenia guaranitica (Chodat) S.F. Blake = **Verbesina guaranitica** Chodat

Zexmenia hieronymi Hassl. = **Angelphytum hieronymi** (Hassl.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984.

Zexmenia induta (Chodat) Hassl. = **Angelphytum indutum** (Chodat) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zexmenia myrtifolia (Chodat) Hassl. = **Angelphytum myrtifolium** (Chodat) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zexmenia oppositifolia A.A. Sáenz = **Angelphytum oppositifolium** (A.A. Sáenz) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984.

Zexmenia paraguariensis (Chodat) S.F. Blake = **Angelphytum paraguariense** (Chodat) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zexmenia pseudosilphioides Hassl. = **Angelphytum pseudosilphioides** (Hassl.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zexmenia tenuifolia Hassl. = **Angelphytum tenuifolium** (Hassl.) H. Rob.
Referencias: Robinson, H. E., 1984a.

Zinnia L., nom. cons.

Número de especies: 1

Zinnia hybrida Hort = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1963.

Zinnia intermedia Engelm. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1963.

Zinnia leptopoda DC. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1963.

Zinnia mendocina Phil. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Zinnia multiflora L. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Zinnia pauciflora L. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Zinnia pauciflora L. var. *flava* (Kuntze) Seckt = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Zinnia peruviana (L.) L.
Sin.: *Chrysogonum peruvianum* L., *Crassina peruviana* (L.) Kuntze, *Zinnia hybrida* Hort, *Zinnia intermedia* Engelm., *Zinnia leptopoda* DC., *Zinnia mendocina* Phil., *Zinnia multiflora* L., *Zinnia pauciflora* L., *Zinnia pauciflora* L. var. *flava* (Kuntze) Seckt, *Zinnia revoluta* Cav., *Zinnia tenuiflora* Jacq., *Zinnia verticillata* Andr.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b; Cabrera, A. L., 1978; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Torres, A. M., 1963.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pozner, R. 222* (CTES, SI)]; PRY[*Mereles, F. 5065* (CTES, FCQ, MO)].

Zinnia revoluta Cav. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Ariza Espinar, L., 2000b.

Zinnia tenuiflora Jacq. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1963.

Zinnia verticillata Andr. = **Zinnia peruviana** (L.) L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1978; Torres, A. M., 1963.

Zollicoferia elquiensis Phil. = **Malacothrix coulteri** A. Gray
Referencias: Ariza Espinar, L. & Urtubey, E., 1998; Cabrera, A. L., 1971a.

Zycona oppositifolia Kuntze = **Schistocarpha eupatorioides** (Fenzl) Kuntze
Referencias: Robinson, H. E., 1979.

AVICENNIACEAE

1 género, 1 especie.

Avicennia L.

Número de especies: 1

Avicennia schaueriana Stapf & Leechm. ex Moldenke
Referencias: Moldenke, H. N., 1939; Schwarzbach, A. E. & McDade, L. A., 2002.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 55713* (MBM), *Silva, J. M. 570* (MBM)].
Notas: Según Moldenke (1939: 336) la especie llega hasta Uruguay.

BALANOPHORACEAE

4 géneros, 5 especies.

Archimedea pyramidalis Leandro ex A. St.-Hil., p.p. = **Lophophytum mirabile** Schott & Endl. subsp. **bolivianum** (Wedd.) B. Hansen
Referencias: Hansen, B., 1987.

Cynomorium cayennense Sw. = **Helosis cayennensis** (Sw.) Spreng.
Referencias: Hansen, B., 1980.

Helosis Rich.

Número de especies: 1

Helosis brasiliensis Schott & Endl. = **Helosis cayennensis** (Sw.) Spreng.
Referencias: Hansen, B., 1980.

Helosis cayennensis (Sw.) Spreng.
Sin.: *Cynomorium cayennense* Sw., *Helosis brasiliensis* Schott & Endl.
Referencias: Fontana, J. L. & Popoff, O., 2006; Hansen, B., 1980.
Hierba parásita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fontana, J. L. 1911* (CTESN)]; BRA[*Hatschbach, G. 11287* (MBM, US)].

Juelia lilloana Sleumer = **Ombrophytum subterraneum** (Aspl.) B. Hansen
Referencias: Hansen, B., 1980.

Juelia meyeri Sleumer = **Ombrophytum subterraneum** (Aspl.) B. Hansen
Referencias: Hansen, B., 1980; Sleumer, H. O., 1954a.

Juelia subterranea Aspl. = **Ombrophytum subterraneum** (Aspl.) B. Hansen
Referencias: Hansen, B., 1980.

Langsdorffia Mart.

Número de especies: 1

Langsdorffia hypogaea Mart.
Referencias: Fox, C. & Zardini, E. M., 1998; Fraga de Almeida Falçao, W., 1975; Hansen, B., 1980.
Hierba parásita. Perenne. Nativa. 700–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20771* (C, MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 45003* (AS, MO)].

Lophophytum Schott & Endl.

Número de especies: 2

Lophophytum bolivianum Wedd. = **Lophophytum mirabile** Schott & Endl. subsp. **bolivianum** (Wedd.) B. Hansen
Referencias: Hansen, B., 1980.

Lophophytum leandri Eichler
Sin.: *Lophophytum mirabile* auct. non Schott & Endl.
Referencias: Burkart, A., 1949a; Fontana, J. L., 1998; Fraga de Almeida Falçao, W., 1975; Hansen, B., 1980.
Hierba parásita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. 1709* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 9842* (MBM, US)]; PRY[*Quintana, M. 597* (CTES)].

Lophophytum mirabile auct. non Schott & Endl. = **Lophophytum leandri** Eichler
Referencias: Fraga de Almeida Falçao, W., 1975.

Lophophytum mirabile Schott & Endl. subsp. **bolivianum** (Wedd.) B. Hansen
Sin.: *Archimedea pyramidalis* Leandro ex A. St.-Hil., p.p., *Lophophytum bolivianum* Wedd.
Referencias: Burkart, A., 1949a; Hansen, B., 1980, 1987; Sleumer, H. O., 1954a.
Parásita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1687* (CTES)]; PRY[*Balansa, B. 2717* (K, P)].

Ombrophytum Poepp. ex Endl.

Número de especies: 1

Ombrophytum peruvianum auct. non Poepp. & Endl. = **Ombrophytum subterraneum** (Aspl.) B. Hansen

Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen
Sin.: *Juelia lilloana* Sleumer, *Juelia meyeri* Sleumer, *Juelia subterranea* Aspl., *Ombrophytum peruvianum* auct. non Poepp. & Endl.
Referencias: Hansen, B., 1980; Sleumer, H. O., 1954a.
Parásita. Perenne. Nativa. 500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabezas, V. s.n.* (SI)]; CHL[*Martin 486* (SI)].

BALSAMINACEAE

1 género, 3 especies introducidas.

Impatiens L.

Número de especies: 3 introducidas

Impatiens balsamina L.
Referencias: Marques, M. C. M., 1976.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2755* (HBR, US)].

Impatiens glandulifera Royle
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Puntieri, J. G. s.n.* (BCRU)].

Impatiens sultani Hook. f. = **Impatiens walleriana** Hook. f.
Referencias: Jørgensen, P. M., 1999c.

Impatiens walleriana Hook. f.
Sin.: *Impatiens sultani* Hook. f.
Referencias: Jørgensen, P. M., 1999c; Marques, M. C. M., 1976.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1306* (SI), *Deginani, N. B. 1101* (MU, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 6296* (US)].

BASELLACEAE

Autor: Eriksson, R.

2 géneros, 4 especies.

Anredera Juss.

Número de especies: 3

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis
Sin.: *Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis subsp. *gracilis* (Miers) Xifreda & Argimón, *Boussingaultia cordifolia* Ten., *Boussingaultia gracilis* Miers, *Boussingaultia gracilis* Miers f. *pseudobaselloides* Hauman, *Boussingaultia gracilis* Miers var. *pseudobaselloides* (Hauman) L.H. Bailey
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hauman, L. L., 1925c; Reitz, R., 1968d; Sperling, C. R., 1987; Villa Carenzo, M., 1966; Xifreda, C. C., 1999b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, COL, MON, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2047* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 2702* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 28007* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 927* (F, GH, MO, NY, S, SI, UC, US)].
Notas: En ocasiones cultivada como ornamental.

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis subsp. *gracilis* (Miers) Xifreda & Argimón = **Anredera cordifolia** (Ten.) Steenis

Anredera krapovickasii (Villa) Sperling
Sin.: *Boussingaultia krapovickasii* Villa
Referencias: Sperling, C. R., 1987, 1995; Villa Carenzo, M., 1966; Xifreda, C. C., 1999b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 4723* (LIL, S, UPS)].

Anredera tucumanesis (Lillo & Hauman) Sperling
Sin.: *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman, *Boussingaultia tucumanensis* Lillo & Hauman var. *brasiliensis* Hauman
Referencias: Hauman, L. L., 1925c; Sperling, C. R., 1987, 1995; Villa Carenzo, M., 1966; Xifreda, C. C., 1999b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(TUC); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2962* (BM, F, GH, K, MO, NY, S, SI, UC, US)]; BRA[*Kummrow, R. 1913* (GB, MBM)].

Boussingaultia cordifolia Ten. = **Anredera cordifolia** (Ten.) Steenis
Referencias: Steenis, C. G. G. J., 1957.

Boussingaultia gracilis Miers = **Anredera cordifolia** (Ten.) Steenis
Referencias: Steenis, C. G. G. J., 1957.

Boussingaultia gracilis Miers f. *pseudobaselloides* Hauman = **Anredera cordifolia** (Ten.) Steenis
Referencias: Steenis, C. G. G. J., 1957.

Boussingaultia gracilis Miers var. *pseudobaselloides* (Hauman) L.H. Bailey = **Anredera cordifolia** (Ten.) Steenis
Referencias: Steenis, C. G. G. J., 1957.

Boussingaultia krapovickasii Villa = **Anredera krapovickasii** (Villa) Sperling
Referencias: Sperling, C. R., 1995.

Boussingaultia tucumanensis Lillo & Hauman = **Anredera tucumanesis** (Lillo & Hauman) Sperling
Referencias: Sperling, C. R., 1995.

Boussingaultia tucumanensis Lillo & Hauman var. *brasiliensis* Hauman = **Anredera tucumanesis** (Lillo & Hauman) Sperling
Referencias: Eriksson, R., 1996.

Ullucus Caldas

Número de especies: 1

Ullucus aborigineus Brücher = **Ullucus tuberosus** Caldas subsp. **aborigineus** (Brücher) Sperling
Referencias: Sperling, C. R., 1993.

Ullucus tuberosus Caldas f. *rubriflorus* Kuntze = **Ullucus tuberosus** Caldas subsp. **aborigineus** (Brücher) Sperling
Referencias: Sperling, C. R., 1987.

Ullucus tuberosus Caldas subsp. **aborigineus** (Brücher) Sperling
Sin.: *Ullucus aborigineus* Brücher, *Ullucus tuberosus* Caldas f. *rubriflorus* Kuntze
Referencias: Brücher, E. H., 1967; Sperling, C. R., 1987, 1993; Xifreda, C. C., 1999b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brücher, E. H. 3015* (VEN)].

BEGONIACEAE

1 género, 54 especies, 36 especies endémicas.

Begonia L.

Número de especies: 54, 36 endémicas

Begonia agrial Rojas Acosta = **Begonia cucullata** Willd. var. **spatulata** (Lodd.) Golding
Referencias: Golding, J., 1982.

Begonia angulata Vell.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5974* (HBR, US)].

Begonia argentinensis Speg. = **Begonia boliviensis** A. DC. var. **boliviensis**
Referencias: Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.

Begonia balansae C. DC. var. **balansae**
Referencias: Candolle, A. C. P. de, 1914; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Molfino, J. F., 1923b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3474* (LP, SI)]; PRY[*Hassler, E. 6441* (SI)].

Begonia balansae C. DC. var. **glabrior** C. DC.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6442* (G)].

Begonia barkleyana L.B. Sm.
Sin.: *Begonia dusenii* Brade, hom. illeg.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 281* (SI), *Reitz, P. R. 3979* (HBR, US)].

Begonia bauensis Brade = **Begonia isopterocarpa** Irmsch.
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.

Begonia biguassuensis Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5869* (HBR)].

Begonia blumenaviensis Irmsch. = **Begonia polyandra** Irmsch.
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia blumenaviensis Irmsch. subsp. *brachyphylla* Irmsch. = **Begonia polyandra** Irmsch.
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia boliviensis A. DC. var. **boliviensis**
Sin.: *Begonia argentinensis* Speg.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Perera, T., 1996; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Holmberg, E. L. s.n.* (BAB, SI), *Schreiter, R. 10885* (SI)].

Begonia boliviensis A. DC. var. **latipetala** Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1949; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 10053* (US)].

Begonia boliviensis A. DC. var. **volcanensis** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4950* (SI)].

Begonia brasiliensis Klotzsch = **Begonia fischeri** Schrank var. **fischeri**
Referencias: Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984b.

Begonia calvescens (Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.) E.L. Jacques & Mamede
Sin.: *Begonia schenckii* Irmsch. var. *calvescens* Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Jacques, E. L. & Mamede, M. C. H., 2004; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2200a* (HBR)].

Begonia campos-portoana Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3721* (HBR, US)].

Begonia capanemae Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Schuech, G. s.n.* (RB)].

Begonia catharinensis Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5950* (HBR, US)].

Begonia chapecoënsis Brade = **Begonia per-dusenii** Brade
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia coccinea Hook.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. s.n.* (HBR)].

Begonia convolvulacea (Klotzsch) A. DC.
Sin.: *Begonia geniculata* Vell., hom. illeg., *Wageneria convolvulacea* Klotzsch
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15350* (NY)].

Begonia coriacea A. DC., hom. illeg. = **Begonia tominana** Golding
Referencias: Golding, J., 1981.

Begonia cucullata Willd. var. **arenosicola** (C. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub.
Sin.: *Begonia subcucullata* C. DC., *Begonia subcucullata* C. DC. var. *arenosicola* C. DC.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Golding, J., 1982; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(SCA); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1279* (SI), *Zuloaga, F. O. 7006* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9803* (HBR, US)]; PRY[*Schrottky, C. 40* (SI)].

Begonia cucullata Willd. var. **cucullata**
Sin.: *Begonia cucullata* Willd. var. *hookeri* (A. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub., *Begonia hookeri* Sw., *Begonia paludicola* C. DC., *Begonia semperflorens* Link & Otto, *Begonia semperflorens* Link & Otto var. *hookeri* A. DC.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Golding, J., 1982; Mereles, F., 2001; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, COA, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1725* (SI), *Vanni, R. O. 3446* (CTES)]; BRA[*Kummrow, R. 484* (SI), *Reitz, P. R. 4735* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 9079* (G)]; URY[*Berro, M. B. 304* (MVFA)].

Begonia cucullata Willd. var. *hookeri* (A. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub. = **Begonia cucullata** Willd. var. **cucullata**
Referencias: Golding, J., 1982.

Begonia cucullata Willd. var. **spatulata** (Lodd.) Golding
Sin.: *Begonia agrial* Rojas Acosta, *Begonia spathulata* Lodd.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Golding, J., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, JUJ, MIS); BRA(PAR); PRY(CAA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6664* (SI)]; BRA[*Reiss, R. 122* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 35468* (CTES)].

Begonia descoleana L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1950; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 4561* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 11812* (HBR, US)].

Begonia dusenii Brade, hom. illeg. = **Begonia barkleyana** L.B. Sm.
Referencias: Smith, L. B., 1973.

Begonia echinosepala Regel var. **echinosepala**
Sin.: *Begonia itajaiensis* Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3049* (HBR, US)].

Begonia echinosepala Regel var. **elongatifolia** Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1192* (B)].

Begonia fiebrigii C. DC.
Referencias: Candolle, A. C. P. de, 1914; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Molfino, J. F., 1923b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6313* (SI)].
Notas: Citada para Misiones, Argentina, sin indicar localidad o material de referencia (Molfino, 1923b; Smith et al., 1986).

Begonia fischeri Schrank var. **fischeri**
Sin.: *Begonia brasiliensis* Klotzsch, *Begonia patula* auct. non Haw., *Begonia setosa* Klotzsch
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1322* (SI)]; BRA[*Kummrow, R. 431* (SI), *Reitz, P. R. 2238* (HBR, US)].

Begonia fischeri Schrank var. **malvacea** (Klotzsch) Irmsch.
Sin.: *Begonia intercedens* Irmsch., *Begonia malvacea* Klotzsch
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*von Jhering 399* (SP)].

Begonia fritz-muelleri Brade = **Begonia radicans** Vell.
Referencias: Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984a.

Begonia fruticosa A. DC.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2131* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11983* (SI), *Reitz, P. R. 5971* (HBR, US)].

Begonia fuscocaulis Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Barão de Capanema s.n.* (RB)].

Begonia garuvae L.B. Sm. & R.C. Sm.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10669* (HBR, US)].

Begonia geniculata Vell., hom. illeg. = **Begonia convolvulacea** (Klotzsch) A. DC.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.

Begonia hammoniae Irmsch. = **Begonia hispida** Schott ex A. DC.
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia hassleri C. DC.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hassler, E. 460* (G)].

Begonia heineri Brade = **Begonia subvillosa** Klotzsch var. **subvillosa**
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia hieronymi Lindau = **Begonia micranthera** Griseb. var. **hieronymi** (Lindau) L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.

Begonia hieronymi Lindau var. *rhacophylla* Irmsch. = **Begonia micranthera** Griseb. var. **rhacophylla** (Irmsch.) L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984b.

Begonia hilariana A. DC.
Sin.: *Begonia raulinii* Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17254* (HBR, US)].

Begonia hirtella Link
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2308* (SI), *Reitz, P. R. 425c* (HBR)].

Begonia hispida Schott ex A. DC.
Sin.: *Begonia hammoniae* Irmsch., *Begonia reitzii* Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6274* (HBR, US)].

Begonia hookeri Sw. = **Begonia cucullata** Willd. var. **cucullata**
Referencias: Golding, J., 1982.

Begonia insularis Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Duarte 3376* (RB)].

Begonia intercedens Irmsch. = **Begonia fischeri** Schrank var. **malvacea** (Klotzsch) Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984a.

Begonia isopterocarpa Irmsch.
Sin.: *Begonia bauensis* Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2782* (HBR)].

Begonia itajaiensis Brade = **Begonia echinosepala** Regel var. **echinosepala**
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia itatinensis Irmsch. ex Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 700–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3291* (HBR)].

Begonia itupavensis Brade
Referencias: Brade, A. C., 1944; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6893* (S)].

Begonia konder-reisiana L.B. Sm. & R.C. Sm.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4061* (HBR, US)].

Begonia leptotricha C. DC. = **Begonia subvillosa** Klotzsch var. **leptotricha** (C. DC.) L.B. Sm. & Wassh.
Referencias: Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1983.

Begonia limmingheana Morren = **Begonia radicans** Vell.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984a.

Begonia lineolata Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4215* (HBR)].

[Begonia listada L.B. Sm. & Wassh.]
Notas: Nombre dudoso.

Begonia lucida D. Parodi, hom. illeg. = **Begonia lucidissima** Golding & Kareg.
Referencias: Golding, J. & Karegeannes, C., 1984.

Begonia lucidissima Golding & Kareg.
Sin.: *Begonia lucida* D. Parodi, hom. illeg.
Referencias: Golding, J. & Karegeannes, C., 1984; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Parodi, D. s.n.* (*)].

Begonia maculata Raddi
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerling, G. F. 492* (SI), *Gerling, G. F. s.n.* (BAB, SI)].

Begonia malvacea Klotzsch = **Begonia fischeri** Schrank var. **malvacea** (Klotzsch) Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953.

[Begonia maracayuensis D. Parodi]
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.
Notas: Nombre dudoso.

Begonia micranthera Griseb. var. **fimbriata** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 10086* (GH, LIL)].

Begonia micranthera Griseb. var. **foliosa** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–2300 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI), *Venturi, S. 8097* (SI)].

Begonia micranthera Griseb. var. **hieronymi** (Lindau) L.B. Sm. & B.G. Schub.
Sin.: *Begonia hieronymi* Lindau
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Golding, J., 1982; Lindau, G., 1894; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)].

Begonia micranthera Griseb. var. **micranthera**
Sin.: *Begonia micranthera* Griseb. var. *typica* L.B. Sm. & B.G. Schub., nom. inval.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Perera, T., 1996; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 33160* (CTES), *Venturi, S. 1076* (LP)].

Begonia micranthera Griseb. var. **nana** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 2595* (GH, LIL), *Venturi, S. 4949* (SI)].

Begonia micranthera Griseb. var. **rhacophylla** (Irmsch.) L.B. Sm. & Wassh.
Sin.: *Begonia hieronymi* Lindau var. *rhacophylla* Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1949; Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984b; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4948b* (US)].

Begonia micranthera Griseb. var. *typica* L.B. Sm. & B.G. Schub., nom. inval. = **Begonia micranthera** Griseb. var. **micranthera**

Begonia micranthera Griseb. var. **venturii** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)].

Begonia obovatistipula C. DC.
Referencias: Candolle, A. C. P. de, 1914; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4514* (G)].

[Begonia octopetala L'Hér.]
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Begonia paludicola C. DC. = **Begonia cucullata** Willd. var. **cucullata**
Referencias: Golding, J., 1982; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.

[Begonia paniculata D. Parodi]
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.
Notas: Nombre dudoso.

[Begonia paraguayensis D. Parodi]
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.
Notas: Nombre dudoso.

Begonia paranaensis Brade
Referencias: Brade, A. C., 1944; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3642* (R)].

Begonia parodiana L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 22726* (GH)].

Begonia parvistipulata Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10240* (HBR, US)].

Begonia patula auct. non Haw. = **Begonia fischeri** Schrank var. **fischeri**
Referencias: Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.

Begonia per-dusenii Brade
Sin.: *Begonia chapecoënsis* Brade, *Begonia schubertiana* Irmsch.

Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 16689* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3857* (HBR)].

Begonia pilgeriana Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 18039* (HBR, US)].

Begonia pluvialis L.B. Sm. ex S.F. Sm. & Wassh.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, S. F. & Wasshausen, D. C., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21328* (MBM, US)].

Begonia polyandra Irmsch.
Sin.: *Begonia blumenaviensis* Irmsch., *Begonia blumenaviensis* Irmsch. subsp. *brachyphylla* Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13934* (HBR, R, US)].

Begonia procumbens Vell. = **Begonia radicans** Vell.
Referencias: Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1984a.

Begonia pulchella Raddi
Sin.: *Begonia similis* Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 3804* (R)].

Begonia radicans Vell.
Sin.: *Begonia fritz-muelleri* Brade, *Begonia limmingheana* Morren, *Begonia procumbens* Vell.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 710* (SI), *Reitz, P. R. 5573* (HBR, US)].

Begonia raulinii Brade = **Begonia hilariana** A. DC.
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia reitzii Brade = **Begonia hispida** Schott ex A. DC.
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia rubricaulis Hook. var. **rubricaulis**
Sin.: *Huszia rubricaulis* (Hook.) Klotzsch
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Perera, T., 1996; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2996* (LIL, SI)].

Begonia rubricaulis Hook. var. **volcanensis** L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 9246* (G, LIL)].

Begonia rufosericea J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6264* (HBR)].

Begonia rupium Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. s.n.* (HBG)].

Begonia schenckii Irmsch. var. *calvescens* Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm. = **Begonia calvescens** (Brade ex L.B. Sm. & R.C. Sm.) E.L. Jacques & Mamede
Referencias: Jacques, E. L. & Mamede, M. C. H., 2004.

Begonia schenckii Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 6216* (US)].

Begonia schubertiana Irmsch. = **Begonia per-dusenii** Brade
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia semperflorens Link & Otto = **Begonia cucullata** Willd. var. **cucullata**
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Golding, J., 1982.

Begonia semperflorens Link & Otto var. *hookeri* A. DC. = **Begonia cucullata** Willd. var. **cucullata**
Referencias: Golding, J., 1982.

Begonia serafinensis Brade = **Begonia subvillosa** Klotzsch var. **subvillosa**
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia serafinensis Brade var. *cerqueirae* Brade = **Begonia subvillosa** Klotzsch var. **subvillosa**
Referencias: Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971.

Begonia serranegrae L.B. Sm. ex S.F. Sm. & Wassh.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, S. F. & Wasshausen, D. C., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25785* (MBM, US)].

Begonia setosa Klotzsch = **Begonia fischeri** Schrank var. **fischeri**
Referencias: Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1983.

Begonia similis Brade = **Begonia pulchella** Raddi
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002.

Begonia sleumeri L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3189* (SI, US)].

Begonia solitudinis Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1700 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2697* (HBR)].

Begonia spathulata Lodd. = **Begonia cucullata** Willd. var. **spatulata** (Lodd.) Golding
Referencias: Golding, J., 1982.

Begonia squamipes Irmsch.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12335* (HBR, US)].

Begonia stenolepis L.B. Sm. & R.C. Sm.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9911* (HBR, R, US)].

Begonia subcucullata C. DC. = **Begonia cucullata** Willd. var. **arenosicola** (C. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.

Begonia subcucullata C. DC. var. *arenosicola* C. DC. = **Begonia cucullata** Willd. var. **arenosicola** (C. DC.) L.B. Sm. & B.G. Schub.
Referencias: Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.

Begonia subvillosa Klotzsch var. **leptotricha** (C. DC.) L.B. Sm. & Wassh.
Sin.: *Begonia leptotricha* C. DC.
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Wasshausen, D. C., 1983; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5354* (SI), *Fiebrig, K. A. G. 5707* (G)].

Begonia subvillosa Klotzsch var. **subvillosa**
Sin.: *Begonia heineri* Brade, *Begonia serafinensis* Brade, *Begonia serafinensis* Brade var. *cerqueirae* Brade
Referencias: Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Irmscher, E., 1953; Lindau, G., 1894; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941; Smith, L. B. & Smith, R. C., 1971; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10822* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 3931* (MNES, SI), *Múlgura de Romero, M. E. 4016* (MNES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12664* (HBR, R, US)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3556* (CTES, FCQ, SI)]; URY[*Marchesi, E. 1487* (MVFA)].

Begonia tafiensis Lillo
Referencias: Descole, H. R., O´Donell, C. A. & Lourteig, A., 1939a; Golding, J. & Wasshausen, D. C., 2002; Smith, L. B. & Schubert, B. G., 1941.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 242* (SI), *Lillo, M. s.n.* (LIL)].

Begonia tominana Golding
Sin.: *Begonia coriacea* A. DC., hom. illeg.
Referencias: Golding, J., 1981; Smith, L. B., Wasshausen, D. C., Golding, J. & Karegeannes, C., 1986.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Weddell, H. A. s.n.* (*)].

Huszia rubricaulis (Hook.) Klotzsch = **Begonia rubricaulis** Hook. var. **rubricaulis**

Wageneria convolvulacea Klotzsch = **Begonia convolvulacea** (Klotzsch) A. DC.
Referencias: Candolle, A. L. P. P. de, 1861.

BERBERIDACEAE

Autor: Ulloa Ulloa, C.

1 género, 34 especies, 31 especies endémicas.

Berberis L.

Número de especies: 34, 31 endémicas

Berberis actinacantha Mart.
Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *crispa* (Gay) Reiche, *Berberis brachyacantha* Phil. ex Reiche, *Berberis congestiflora* Gay var. *hakeoides* Hook. f., *Berberis coquimbensis* Muñoz, *Berberis crispa* Gay, *Berberis florida* Phil., *Berberis hakeoides* (Hook. f.) C.K. Schneid., *Berberis variiflora* C.K. Schneid.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 100–1900 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7493* (ASU)].

Berberis actinacantha Mart. var. *crispa* (Gay) Reiche = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis actinacantha Mart. var. *grevilleana* (Gillies ex Hook. & Arn.) C.K. Schneid. = **Berberis grevilleana** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis actinacantha Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche = **Berberis horrida** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

Berberis actinacantha Mart. var. *mollis* Reiche = **Berberis horrida** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis andeana Job
Referencias: Job, M. M., 1953; Orsi, M. C., 1976.
Árbol. Endémica. 1900–2100 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4651* (BAB, LIL, LP, SI)].

[Berberis andreana Naudin]
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961.
Notas: Nombre dudoso.

Berberis antucoana C.K. Schneid. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis argentinensis Hosseus
Sin.: *Berberis pseudospinulosa* Job
Referencias: Hunziker, A. T., 1967b; Orsi, M. C., 1976.
Arbusto. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22088* (SI)].

Berberis barilochensis Job = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis bidentata Lechl.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999; Orsi, M. C., 1976, 1984.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1640* (BAA, LIL, SI)]; CHL[*Hohenacker, W. R. F. 823* (P)].
Notas: Según Landrum (1999) es un posible híbrido de *Berberis trigona* y *B. darwinii*.

Berberis brachyacantha Phil. ex Reiche = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis brachybotria Gay = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **brachybotria** (Gay) Landrum
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis brachybotria Gay var. *brevispina* Reiche = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **brachybotria** (Gay) Landrum
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

[Berberis brevifolia Phil. ex Reiche]
Referencias: Landrum, L. R., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Berberis buxifolia Lam. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis buxifolia Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis buxifolia Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis buxifolia Lam. var. *gracilior* Albov = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis buxifolia Lam. var. *montana* (Gay) Reiche = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

Berberis buxifolia Lam. var. *nuda* C.K. Schneid. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis buxifolia Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis buxifolia Lam. var. *spinosissima* Reiche = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis cabrerae Job = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. **brachybotria** (Gay) Landrum
Sin.: *Berberis brachybotria* Gay, *Berberis brachybotria* Gay var. *brevispina* Reiche
Referencias: Landrum, L. R., 1999, 2003b.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7893* (ASU)].

Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Sin.: *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche, *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche, *Berberis diffusa* Gay, *Berberis ferox* Gay, *Berberis fragrans* Phil. ex Reiche, *Berberis gayi* K. Koch
Referencias: Landrum, L. R., 1999, 2003b.
Arbusto. Endémica. 300–1600 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 551* (CONC)].

Berberis chilensis Gillies ex Hook. var. *diffusa* (Gay) Reiche = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis chilensis Gillies ex Hook. var. *ferox* (Gay) Reiche = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

Berberis chillanensis (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis chillanensis (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

[Berberis ciliaris Lindl.]
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Berberis coletioides Lechl. = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis coletioides Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

Berberis comberi Sprague & Sandwith
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999; Orsi, M. C., 1976, 1984.
Arbusto. Endémica. 900–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 21446* (ASU, MERL)].

Berberis commutata Eichler
Sin.: *Berberis mikuna* Job
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Job, M. M., 1953; Orsi, M. C., 1976; Schneider, C. K., 1904–1905; Trauth Nare, A. E., 2001.
Arbusto. Nativa. 1300–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 177* (SI), *Rodríguez, F. M. 1293* (BAB, LP, SI)].

Berberis congestiflora Gay
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 8583* (SI)].

Berberis congestiflora Gay var. *hakeoides* Hook. f. = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis copahuensis Job
Referencias: Job, M. M., 1953; Orsi, M. C., 1976, 1984.
Arbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. s.n.* (CORD)].
Notas: Según Landrum (1999) es un híbrido de *Berberis empetrifolia* y *B. montana*.

Berberis coquimbensis Muñoz = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis coriacea A. St.-Hil. = **Berberis laurina** Billb.
Referencias: Mattos, J. R., 1967b; Trauth Nare, A. E., 2001.

Berberis corymbosa Hook. & Arn.
Sin.: *Berberis corymbosa* Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche, *Berberis paniculata* Phil.
Referencias: Landrum, L. R., 1999; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 300–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9157* (CONC, M, NA)].

Berberis corymbosa Hook. & Arn. var. *paniculata* (Phil.) Reiche = **Berberis corymbosa** Hook. & Arn.

Berberis costulata Gand. = **Berberis darwinii** Hook.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis crispa Gay = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis cuneata DC. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis darwinii Hook.
Sin.: *Berberis costulata* Gand., *Berberis knightii* (Lindl.) K. Koch, *Mahonia knightii* Lindl.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Job, M. M., 1942; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schajowskoy, S. s.n.* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6282* (SI)].

[Berberis darwinii Hook. var. magellanica Ahrendt]
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961.
Notas: Nombre dudoso.

Berberis diffusa Gay = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis dulcis Sweet = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis empetrifolia Lam.
Sin.: *Berberis empetrifolia* Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid., *Berberis mutabilis* Phil., *Berberis wawrana* C.K. Schneid.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Job, M. M., 1942; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984; Schneider, C. K., 1904–1905.
Subarbusto. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32872* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1272* (SI)].

Berberis empetrifolia Lam. var. *magellanica* C.K. Schneid. = **Berberis empetrifolia** Lam.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis ferox Gay = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis flexuosa auct. non Ruiz & Pav. = **Berberis lilloana** Job
Referencias: Orsi, M. C., 1976.

Berberis florida Phil. = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis fragrans Phil. ex Reiche = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis gayi K. Koch = **Berberis chilensis** Gillies ex Hook. & Arn. var. **chilensis**
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

Berberis glaucescens A. St.-Hil. = **Berberis laurina** Billb.
Referencias: Mattos, J. R., 1967b; Trauth Nare, A. E., 2001.

Berberis glomerata Hook. & Arn.
Sin.: *Berberis glomerata* Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis zahlbruckneriana* C.K. Schneid.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7544* (ASU, SGO)].

Berberis glomerata Hook. & Arn. var. *zahlbruckneriana* (C.K. Schneid.) Ahrendt = **Berberis glomerata** Hook. & Arn.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis grevilleana Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *grevilleana* (Gillies ex Hook. & Arn.) C.K. Schneid.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984.
Arbusto. Endémica. 1800–2800 m.
Países: ARG(COR, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Landrum, L. R. 8329* (ASU, MERL)].

Berberis grisebachii Lechl. = **Berberis trigona** Kunze ex Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis hakeoides (Hook. f.) C.K. Schneid. = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis heterophylla Juss. ex Poir. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis heterophylla Juss. ex Poir. var. *pluriflora* Reiche = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis hieronymi C.K. Schneid.
Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *subintegrifolia* Kurtz
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Orsi, M. C., 1976; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 561* (LP)].

Berberis horrida Gay
Sin.: *Berberis actinacantha* Mart. var. *horrida* (Gay) Reiche, *Berberis actinacantha* Mart. var. *mollis* Reiche, *Berberis pilosifolia* Ahrendt
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7915* (ASU)].

Berberis ilicifolia L. f.
Sin.: *Berberis lagenaria* Poir., *Berberis subantarctica* Gand.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7203* (SI)]; CHL[*Landrum, L. R. 8399* (ASU)].

Berberis inermis Pers. = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis jobii Orsi
Referencias: Orsi, M. C., 1976.
Arbusto. Endémica. 1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32138* (SI)].

Berberis jujuyensis Job
Referencias: Job, M. M., 1953; Orsi, M. C., 1976.
Arbusto. Endémica. 1400 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16282* (LP)].

Berberis kleinii Mattos
Referencias: Mattos, J. R., 1967a, b.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7184* (HBR)].

Berberis knightii (Lindl.) K. Koch = **Berberis darwinii** Hook.
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

Berberis lagenaria Poir. = **Berberis ilicifolia** L. f.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis laurina Billb.
Sin.: *Berberis coriacea* A. St.-Hil., *Berberis glaucescens* A. St.-Hil., *Berberis spinulosa* A. St.-Hil.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Mattos, J. R., 1967b; Pedralli, G. A., 2002; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(DUR, LAV, MAL, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13531* (HBR)]; URY[*Mattos, J. R. 483* (SP)].
Notas: Citada erróneamente para la flora de Argentina.

Berberis lilloana Job
Sin.: *Berberis flexuosa* auct. non Ruiz & Pav.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Job, M. M., 1953; Orsi, M. C., 1976.
Arbusto. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11578* (SI)].

Berberis linearifolia Phil. = **Berberis trigona** Kunze ex Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis linearifolia Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt = **Berberis trigona** Kunze ex Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis litoralis Phil.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto o arbolito. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7460* (ASU)].

Berberis marginata Gay = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis masafuerana Skottsb.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b.
Arbusto o arbolito. Endémica. 200–1100 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. s.n.* (S)].

Berberis michay Job = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis microphylla G. Forst.
Sin.: *Berberis antucoana* C.K. Schneid., *Berberis barilochensis* Job, *Berberis buxifolia* Lam., *Berberis buxifolia* Lam. var. *antarctica* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *antucoana* (C.K. Schneid.) Orsi, *Berberis buxifolia* Lam. var. *gracilior* Albov, *Berberis buxifolia* Lam. var. *nuda* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *papillosa* C.K. Schneid., *Berberis buxifolia* Lam. var. *spinosissima* Reiche, *Berberis cuneata* DC., *Berberis dulcis* Sweet, *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir., *Berberis heterophylla* Juss. ex Poir. var. *pluriflora* Reiche, *Berberis inermis* Pers., *Berberis marginata* Gay, *Berberis michay* Job, *Berberis parodii* Job, *Berberis spinosissima* (Reiche) Ahrendt
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7290* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 916* (CONC, OS)].

Berberis mikuna Job = **Berberis commutata** Eichler
Referencias: Trauth Nare, A. E., 2001.

Berberis montana Gay
Sin.: *Berberis buxifolia* Lam. var. *montana* (Gay) Reiche, *Berberis cabrerae* Job, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean, *Berberis chillanensis* (C.K. Schneid.) Sprague ex Bean var. *hirsutipes* Sprague, *Berberis coletioides* Lechl., *Berberis coletioides* Lechl. var. *gracilis* (C.K. Schneid.) Ahrendt, *Berberis montana* Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid., *Berberis montana* Gay var. *gracilis* C.K. Schneid., *Berberis polypetala* Phil.

Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1984; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 500–2700 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21913* (CONC, SI)]; CHL[*Behn, F. s.n.* (SI)].

Berberis montana Gay var. *chillanensis* C.K. Schneid. = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis montana Gay var. *coletioides* (Lechl.) C.K. Schneid. = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis montana Gay var. *gracilis* C.K. Schneid. = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis montevidensis C.K. Schneid.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de referencia: URY[*King s.n.* (W)].

[Berberis morenonis Kuntze]
Referencias: Landrum, L. R., 1999.
Notas: Nombre dudoso.

Berberis mutabilis Phil. = **Berberis empetrifolia** Lam.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis negeriana Tischler
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7434* (ASU)].

Berberis paniculata Phil. = **Berberis corymbosa** Hook. & Arn.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis parodii Job = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis pearcei Phil. = **Berberis serratodentata** Lechl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999; Orsi, M. C., 1976.

Berberis philippii Ahrendt = **Berberis rotundifolia** Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis pilosifolia Ahrendt = **Berberis horrida** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis polymorpha Phil. = **Berberis rotundifolia** Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis polypetala Phil. = **Berberis montana** Gay
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

[Berberis pseudoilicifolia Skottsb.]
Referencias: Landrum, L. R., 1999.
Notas: Nombre dudoso. Posible híbrido entre *Berberis ilicifolia* y *B. serratodentata*.

Berberis pseudospinulosa Job = **Berberis argentinensis** Hosseus
Referencias: Orsi, M. C., 1976.

Berberis rotundifolia Poepp. & Endl.
Sin.: *Berberis philippii* Ahrendt, *Berberis polymorpha* Phil., *Berberis umbellata* Phil., hom. illeg.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 200–2300 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7995* (ASU, SGO)].

Berberis ruscifolia Lam.
Sin.: *Berberis ruscifolia* Lam. var. *coriacea* Job
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Orsi, M. C., 1976; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, LPA, LRI, NEU, SDE, SFE, SLU); URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maldonado, S. 116* (LP, SI)]; URY[*Commerson, P. s.n.* (P)].

Berberis ruscifolia Lam. var. *coriacea* Job = **Berberis ruscifolia** Lam.
Referencias: Orsi, M. C., 1976.

Berberis ruscifolia Lam. var. *subintegrifolia* Kurtz = **Berberis hieronymi** C.K. Schneid.
Referencias: Orsi, M. C., 1976.

Berberis sellowiana C.K. Schneid.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (B)]; URY[*Arechavaleta, J. 3018* (B)].

Berberis serratodentata Lechl.
Sin.: *Berberis pearcei* Phil.
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984.
Arbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6142* (SI)]; CHL[*Lechler, W. 2985* (MBM, P)].

[Berberis setigrifolia Ahrendt]
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Berberis spinosissima (Reiche) Ahrendt = **Berberis microphylla** G. Forst.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis spinulosa A. St.-Hil. = **Berberis laurina** Billb.
Referencias: Mattos, J. R., 1967b.

Berberis subantarctica Gand. = **Berberis ilicifolia** L. f.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis trigona Kunze ex Poepp. & Endl.
Sin.: *Berberis grisebachii* Lechl., *Berberis linearifolia* Phil., *Berberis linearifolia* Phil. var. *longifolia* (Reiche) Ahrendt, *Berberis trigona* Kunze ex Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Orsi, M. C., 1976, 1984; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 500–1800 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 1968* (MERL)]; CHL[*Landrum, L. R. 8004* (ASU, SGO)].

Berberis trigona Kunze ex Poepp. & Endl. var. *longifolia* Reiche = **Berberis trigona** Kunze ex Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis umbellata Phil., hom. illeg. = **Berberis rotundifolia** Poepp. & Endl.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis valdiviana Phil.
Sin.: *Berberis valdiviana* Phil. var. *gracilifolia* Ahrendt
Referencias: Ahrendt, L. W. A., 1961; Landrum, L. R., 1999, 2003b; Schneider, C. K., 1904–1905.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 682* (SI)].

Berberis valdiviana Phil. var. *gracilifolia* Ahrendt = **Berberis valdiviana** Phil.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis variiflora C.K. Schneid. = **Berberis actinacantha** Mart.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis wawrana C.K. Schneid. = **Berberis empetrifolia** Lam.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Berberis zahlbruckneriana C.K. Schneid. = **Berberis glomerata** Hook. & Arn.
Referencias: Landrum, L. R., 1999.

Mahonia knightii Lindl. = **Berberis darwinii** Hook.
Referencias: Landrum, L. R., 2003b.

BERBERIDOPSIDACEAE

Autor: Zmarzty, S.
1 género, 1 especie endémica.

Berberidopsis Hook. f.

Número de especies: 1 endémica

Berberidopsis corallina Hook. f.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Chase, M. W., Zmarzty, S., Lledó, M. D., Wurdack, K. J., Swensen, S. M. & Fay, M. F., 2002; Gardner, M. F., 1997; Gunckel, L. H., 1964; Veldkamp, J., 1984.
Arbusto. Endémica. 100–600 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Meyer, F. G. 9766* (K, US)].

BETULACEAE

2 géneros, 3 especies, 2 especies introducidas.

Alnus Mill.

Número de especies: 2, 1 introducida

Alnus acuminata Kunth
Sin.: *Alnus acuminata* Kunth var. *spachii* Regel, *Alnus ferruginea* Kunth var. *aliso* Lorentz & Hieron. ex Winckler, nom. nud., *Alnus jorullensis* Kunth var. *spachii* (Regel) Winckler
Referencias: Furlow, J. J., 1979a; Grau, A., 1985.
Árbol. Nativa. 1000–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 98* (CTES, SI), *Krapovickas, A. 14529* (CTES, MO, UC)].

Alnus acuminata Kunth var. *spachii* Regel = **Alnus acuminata** Kunth
Referencias: Furlow, J. J., 1979a.

Alnus betula L. var. *glutinosa* L. = **Alnus glutinosa** (L.) Gaertn.
Referencias: Baeza, C. M., 2003.

Alnus ferruginea Kunth var. *aliso* Lorentz & Hieron. ex Winckler, nom. nud. = **Alnus acuminata** Kunth
Referencias: Furlow, J. J., 1979a.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Sin.: *Alnus betula* L. var. *glutinosa* L.
Referencias: Baeza, C. M., 2003; Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IV, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brion, C. A. M. s.n.* (BCRU)]; CHL[*Stuessy, T. F. 7615* (CONC)].

[Alnus jorullensis Kunth]
Referencias: Furlow, J. J., 1979b.

Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Alnus jorullensis Kunth var. *spachii* (Regel) Winckler = **Alnus acuminata** Kunth
Referencias: Furlow, J. J., 1979a.

Betula L.

Número de especies: 1 introducida

Betula pendula Roth
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez, 359-a* (BCRU)].

BIGNONIACEAE

Autores: Arbo, M. M. & Lohmann, L.

28 géneros, 119 especies, 17 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Adenocalymma Mart. ex Meisn.

Número de especies: 8, 2 endémicas

Adenocalymma acutissimum (Cham.) Miers = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC.
Sin.: *Adenocalymma bracteatum* (Cham.) DC. var. *macradenum* Bureau, *Adenocalymma macrostachyum* Miers, *Bignonia bracteata* Cham.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 200–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 891* (C, K, MBM, MO, WIS)]; PRY[*Bernardi, L. 20529* (G), *Hassler, E. 5141* (G)].

Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC. var. *macradenum* Bureau = **Adenocalymma bracteatum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma comosum (Cham.) DC.
Sin.: *Adenocalymma acutissimum* (Cham.) Miers, *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *acutissimum* Bureau, *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *lanceolatum* Bureau & K. Schum., *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *nitidum* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Adenocalymma comosum* (Cham.) DC. var. *typicum* Bureau & K. Schum., nom. inval., *Adenocalymma nitidum* Mart. ex DC., *Adenocalymma prehensile* Miers, *Adenocalymma sepiarum* Mart. ex DC., *Bignonia acutissima* Cham., *Bignonia comosa* Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 200–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 50547* (MBM, MO)].

Adenocalymma comosum (Cham.) DC. var. *acutissimum* Bureau = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma comosum (Cham.) DC. var. *lanceolatum* Bureau & K. Schum. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma comosum (Cham.) DC. var. *nitidum* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma comosum (Cham.) DC. var. *typicum* Bureau & K. Schum., nom. inval. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma densiflora Rusby = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma dusenii Kraenzl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lohmann, L. G., 2003, com. pers; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 47840* (CTES, MBM)].

Adenocalymma friesianum Kraenzl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma glomeratum Sprague = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers; Sprague, T. A., 1905.

Adenocalymma hatschbachii A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1993; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43956* (MBM, MO)].

Adenocalymma macrostachyum Miers = **Adenocalymma bracteatum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. var. **apterospermum** Sandwith
Referencias: Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 43737* (CTES, MBM, MO)].

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. var. **marginatum**
Sin.: *Bignonia marginata* Cham.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Fabris, H. A., 1965c, 1979a; Hassler, E., 1898; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mroginski, L. A. 334* (BAA, CTES, LIL, LP)]; BRA[*Irgang, B. E. s.n.* (CTES, ICN)]; PRY[*Mereles, F. 7790* (CTES, FCQ)]; URY[*Osten, C. 5420* (SI)].

Adenocalymma nitidum Mart. ex DC. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma ocositense Donn. Sm. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma paniculatum Benth. ex Miers = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma paulistarum Bureau & K. Schum.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Machado, E. N. 1* (CTES, SI)]; PRY[*Mereles, F. 6748* (CTES, FCQ)].

Adenocalymma peregrinum (Miers) L.G. Lohmann
Sin.: *Memora cuspidata* Hassl., *Memora cuspidata* Hassl. f. *cirrhifera* Hassl., *Memora cuspidata* Hassl. f. *parvifoliolata* Hassl., *Memora peregrina* (Miers) Sandwith, *Pleonotoma peregrina* Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers; Sandwith, N. Y., 1953.
Liana. Nativa. 400–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22478* (MBM, MO)]; PRY[*Hassler, E. 10735* (G, K, MICH, MO, NY, US)].

Adenocalymma portoricense Bello = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma prehensile Miers = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma scansile Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrucci, M. S. 506* (MO)]; BRA[*Hatschbach, G. 6280* (K, L, MBM, MO)]; PRY[*Brunner, D. R. 879* (MO, PY)].

Adenocalymma sepiarum Mart. ex DC. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Adenocalymma splendens Bureau & K. Schum. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Alsocydia virginalis Mart. ex DC., nom. nud. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium Kunth

Número de especies: 10

Amphilophium bracteatum (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Haplolophium bracteatum* Cham., *Haplolophium lundii* DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7507* (AAU, L, MO, RB)].

Amphilophium crucigerum (L.) L.G. Lohmann
Sin.: *Anisostichus crucigera* (L.) Small, *Bignonia botryoides* Cham., *Bignonia crucigera* L., *Bignonia echinata* Jacq., *Bignonia phaseoloides* Cham., *Bignonia squalus* Vell., *Bignonia tilifolia* Kunth, *Bignonia vitalba* Cham., *Bignonia vitalba* Cham. var. *aequinoctialis* Cham., *Nevesarmondia cordifolia* (Mart.) K. Schum., *Petastoma phaseoloides* (Cham.) Miers, *Pithecoctenium aubletii* Splitg., *Pithecoctenium botryoides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium catharinae* DC., *Pithecoctenium cordifolium* Mart., *Pithecoctenium crucigerum* (L.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. f. *grandiflora* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *intermedium* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *tomentosum* Hassl., *Pithecoctenium echinatum* (Jacq.) Baill. var. *typicum* Sprague, nom. inval., *Pithecoctenium glaucum* Rusby, *Pithecoctenium hatschbachii* A.H. Gentry, *Pithecoctenium hexagonum* DC., *Pithecoctenium hexagonum* DC. var. *brasilianum* DC., *Pithecoctenium lundii* DC., *Pithecoctenium muricatum* Moç. ex DC., *Pithecoctenium phaseoloides* (Cham.) Schenck, *Pithecoctenium squalus* (Vell.) DC., *Pithecoctenium tribachiatum* Loes., *Pithecoctenium vitalba* DC., *Pithecoctenium vitalba* DC. f. *glabratum* Hassl., *Pithecoctenium vitalba* DC. f. *intermedium* Hassl., *Pithecoctenium vitalba* DC. var. *extratropica* Cham., *Pithecoctenium vitalba* DC. var. *rostratum* Hassl.

Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1982; Hassler, E., 1898; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Liana. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 47* (BA, BAF, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 25859* (CTES, MBM)]; PRY[*Arbo, M. M. 6103* (MO)].

Amphilophium cynanchoides (DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Anemopaegma clematideum* Griseb., *Bignonia baclei* DC., *Pithecoctenium clematideum* (Griseb.) Griseb., *Pithecoctenium cynanchoides* DC., *Pithecoctenium cynanchoides* DC. var. *pellucidum* Hassl.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c, 1979a, 1993; Hassler, E., 1909a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Moldenke, H. N., 1945; Schulz, A. G., 1939.
Liana. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, ÑEE, PHA); URY(PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Baer, G. A. 15* (BA, BAB, BAF, CTES, SI)]; PRY[*Mereles, F. 8370* (CTES, FCQ)]; URY[*Herter, G. 1032* (SI)].

Amphilophium dolichoides (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Bignonia dolichoides* Cham., *Pithecoctenium dolichoides* (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 300–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40395* (C, CTES, MBM, MO)].

Amphilophium elongatum (Vahl) L.G. Lohmann
Sin.: *Bignonia elongata* Vahl, *Distictella elongata* (Vahl) Urb., *Distictis elongata* (Vahl) Bureau & K. Schum., *Doxantha elongata* (Vahl) Miers, *Pithecoctenium elongatum* (Vahl) Klotzsch, *Pithecoctenium obovatum* Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 100–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Braga, R. 1038* (MO)].

Amphilophium falcatum (Vell.) L.G. Lohmann
Sin.: *Bignonia falcata* Vell., *Pithecoctenium cordifolia* DC., nom. inval.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18505* (CTES, MBM, MO)].

Amphilophium glanduliferum Mart. ex DC. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium glaziovii Bureau ex K. Schum.
Sin.: *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *begonifolium* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *glabrum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *robustius* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *stenocarpum* J.C. Gomes, *Bothriopodium glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *symmetricum* J.C. Gomes, *Distictis glaziovii* (Bureau ex K. Schum.) Bureau & K. Schum., *Haplolophium dusenianum* Kraenzl., *Haplolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) A.H. Gentry, *Pithecoctenium glaziovii* Bureau & K. Schum., *Urbaniella duseniana* (Kraenzl.) Dusén ex Melch., *Urbanolophium dusenianum* (Kraenzl.) Melch., *Urbanolophium glaziovii* (Bureau & K. Schum.) Melch.
Referencias: Gentry, A. H., 1992b; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 66533* (CTES, MBM)].

Amphilophium jelskii Zahlbr. = **Amphilophium pannosum** (DC.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium macrophyllum Kunth = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium molle Cham. & Schltdl. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium mollicomum Pittier = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium mutisii Kunth = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium oxylophium Donn. Sm. = **Amphilophium pannosum** (DC.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth
Sin.: *Amphilophis xerophilum* Hassl., *Amphilophium glanduliferum* Mart. ex DC., *Amphilophium macrophyllum* Kunth, *Amphilophium molle* Cham. & Schltdl., *Amphilophium mollicomum* Pittier, *Amphilophium mutisii* Kunth, *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *imatacense* A.H. Gentry, *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *molle* (Cham. & Schltdl.) Standl., *Amphilophium paniculatum* (L.) Kunth var. *mollicomum* (Pittier) A.H. Gentry, *Amphilophium paraguariense* Hassl. ex A.G. Schulz, *Amphilophium purpureum* Brandegee, *Amphilophium*

vauthieri DC., *Arrabidaea paniculata* (L.) Seem., *Bignonia paniculata* L., *Endoloma purpurea* Raf.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1973a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Liana. Nativa. 100–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni, M. S. 5915* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 50857* (CTES, MBM)]; PRY[*Mereles, F. 967* (CTES, FCQ, SI)].

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. *imatacense* A.H. Gentry = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. *molle* (Cham. & Schltdl.) Standl. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. *mollicomum* (Pittier) A.H. Gentry = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium pannosum (DC.) Bureau & K. Schum.
Sin.: *Amphilophium jelskii* Zahlbr., *Amphilophium oxylophium* Donn. Sm., *Bignonia pannosa* DC., *Bignonia pubescens* Pav. ex DC., hom. illeg.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1973a.
Liana. Nativa. 600–1600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 32920* (AAU, CTES, K, LIL, MO, NY)].

Amphilophium paraguariense Hassl. ex A.G. Schulz = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium purpureum Brandegee = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Amphilophium sandwithii Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1993; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 1600–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5379* (CTES, LP)].

Amphilophium vauthieri DC. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma Mart. ex Meisn.

Número de especies: 6

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex Souza
Sin.: *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *angustifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *glabrum* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *hirsuta* Hassl., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *latifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *petiolatum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *puberulum* Bureau, *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *pubescens* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *sessilifolium* DC., *Anemopaegma mirandum* (Cham.) Mart. ex DC. var. *verticellatum* Bureau, *Anemopaegma sessilifolium* Mart. ex DC., *Anemopaegma subundulatum* Bureau & K. Schum., *Bignonia arvensis* Vell., *Bignonia miranda* Cham., *Jacaranda arvensis* (Vell.) Steud.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20046* (C, L)]; PRY[*Jiménez, B. 1618* (BM, CTES, PY)].

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum.
Sin.: *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *brachybotrys* DC., *Anemopaegma chamberlaynii* (Sims) Bureau & K. Schum. var. *tenerior* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma citrifolium* (DC.) Baill., *Anemopaegma longipes* K. Schum., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC., *Anemopaegma racemosum* Mart. ex DC. var. *bachybotrys* DC., *Anemopaegma scandens* (Vell.) Mello ex K. Schum., *Bignonia aequinoctialis* L. var. *chamberlaynii* (Sims) Ker Gawl., *Bignonia chamberlaynii* Sims, *Bignonia chamberlaynii* Sims var. *tenerior* Cham., *Bignonia scandens* Vell., *Jacaranda arrabidae* Steud., *Macfadyena citrifolia* (DC.) Miers, *Tabebuia citrifolia* DC.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10564* (HBR)]; PRY[*Jiménez, B. 1807* (BM, CTES, G, MO, PY)].

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum. var. *brachybotrys* DC. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K. Schum. var. *tenerior* Bureau & K. Schum. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma citrifolium (DC.) Baill. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma clematideum Griseb. = **Amphilophium cynanchoides** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma decorum S. Moore = **Bignonia decora** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma fiebrigianum Kraenzl. = **Anemopaegma longipetiolatum** Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma flavum Morong
Sin.: *Anemopaegma sylvestre* S. Moore, *Anemopaegma symmetricum* Rusby
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Schulz, A. G., 1939.
Liana. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(CEN, COA, GUA, ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 4006* (BAB, BAF, CTES)]; PRY[*Hassler, E. 1665* (CTES, SI)].

Anemopaegma glaucum Mart. ex DC.
Sin.: *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *laceifolia* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *pubescens* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma glaucum* Mart. ex DC. var. *triplinervium* Bureau & K. Schum., *Anemopaegma lanceifolium* DC., *Anemopaegma lanceifolium* DC. var. *puberum* DC., *Anemopaegma triplinervium* Mart. ex DC., *Anemopaegma typus* Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Arbusto. Nativa. 600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6751* (CTES)].

Anemopaegma glaucum Mart. ex DC. var. *laceifolia* Bureau & K. Schum. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma glaucum Mart. ex DC. var. *pubescens* Bureau & K. Schum. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.

Anemopaegma glaucum Mart. ex DC. var. *triplinervium* Bureau & K. Schum. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Anemopaegma lanceifolium DC. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma lanceifolium DC. var. *puberum* DC. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma longipes K. Schum. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma longipetiolatum Sprague
Sin.: *Anemopaegma fiebrigianum* Kraenzl.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sprague, T. A., 1905.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 33816* (CTES)].

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *angustifolium* DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *glabrum* DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *hirsuta* Hassl. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *latifolium* DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *petiolatum* Bureau = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *puberulum* Bureau = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *pubescens* DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *sessilifolium* DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC. var. *verticellatum* Bureau = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma prostratum DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Liana. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27716* (CTES, MBM)]; PRY[*Malme, G. O. A. 1008* (S, UPS)].

Anemopaegma racemosum Mart. ex DC. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma racemosum Mart. ex DC. var. *bachybotrys* DC. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma scandens (Vell.) Mello ex K. Schum. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma sessilifolium Mart. ex DC. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma subundulatum Bureau & K. Schum. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma sylvestre S. Moore = **Anemopaegma flavum** Morong
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma symmetricum Rusby = **Anemopaegma flavum** Morong
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma triplinervium Mart. ex DC. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma typus Bureau & K. Schum. = **Anemopaegma glaucum** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anemopaegma whitei Rusby = **Fridericia whitei** (Rusby) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Anisostichus crucigera (L.) Small = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Argylia D. Don

Número de especies: 12, 11 endémicas

Argylia adscendens DC. var. **adscendens**
Sin.: *Argylia huidobriana* Clos, *Argylia lutea* Phil., *Argylia viridis* Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–3200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16535* (SI)].

Argylia adscendens DC. var. **viridis** (Phil.) Gleisner & Ricardi
Sin.: *Argylia viridis* Phil.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1800–2500 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 3350* (CONC)].

Argylia australis Phil. = **Argylia bustillosii** Phil.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia bifrons Phil.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 3670* (GH, US)].

Argylia bustillosii Phil.
Sin.: *Argylia australis* Phil., *Argylia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. superfl., *Argylia potentillifolia* DC. var. *australis* (Phil.) Speg.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1999b; Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Subarbusto. Endémica. 800–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 3289* (CTES, SI)]; CHL[*Bridges, T. C. 1214* (SI)].

Argylia canescens D. Don = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia checoensis (Meyen) I.M. Johnst.
Sin.: *Argylia incana* Phil., *Argylia sitiens* I.M. Johnst., *Oxalis checoensis* Meyen
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 430* (HB, M, MO, SI)].

Argylia chrysantha Phil. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia digitalina Phil. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia eremophila Phil. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia farnesiana Gleisner & Ricardi
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Subarbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1121* (CONC, MO)].

Argylia feuillie DC. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia geranioides DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1400 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 327* (CONC)].

Argylia glabriuscula Phil. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia glutinosa Phil.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–2900 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Behn, F. s.n.* (LP)].

Argylia huidobriana Clos = **Argylia adscendens** DC. var. **adscendens**
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Pirani, J. R., 1996.

Argylia incana Phil. = **Argylia checoensis** (Meyen) I.M. Johnst.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia lutea Phil. = **Argylia adscendens** DC. var. **adscendens**
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia potentillifolia DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–3500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Krapovickas, A. 5741* (CTES)].

Argylia potentillifolia DC. var. *australis* (Phil.) Macloskie, comb. superfl. = **Argylia bustillosii** Phil.
Referencias: Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia potentillifolia DC. var. *australis* (Phil.) Speg. = **Argylia bustillosii** Phil.
Referencias: Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia puberula DC. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, S. M., 1969.

Argylia radiata (L.) D. Don
Sin.: *Argylia canescens* D. Don, *Argylia chrysantha* Phil., *Argylia digitalina* Phil., *Argylia eremophila* Phil., *Argylia feuillie* DC., *Argylia glabriuscula* Phil., *Argylia puberula* DC., *Argylia tenuifolia* C. Presl, *Argylia villosa* Phil., *Argylia viridis* Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche, *Bignonia radiata* L., *Oxymitus argylioides* C. Presl
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 446* (CTES)].

Argylia robusta Sandwith
Sin.: *Argylia trifoliata* auct. non DC.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1999b; Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 3294* (CTES, GH, LP)].

Argylia sitiens I.M. Johnst. = **Argylia checoensis** (Meyen) I.M. Johnst.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia tenella Phil. = **Argylia tomentosa** Phil.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, S. M., 1969.

Argylia tenuifolia C. Presl = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia tomentosa Phil.
Sin.: *Argylia tenella* Phil., *Argylia tomentosa* Phil. var. *tenella* (Phil.) Reiche
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–2900 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, S. M. 439* (CONC)].

Argylia tomentosa Phil. var. *tenella* (Phil.) Reiche = **Argylia tomentosa** Phil.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia trifoliata auct. non DC. = **Argylia robusta** Sandwith
Referencias: Fabris, H. A., 1965c.

Argylia trifoliata DC. = **Argylia uspallatensis** DC.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia uspallatensis DC.
Sin.: *Argylia trifoliata* DC., *Tecoma uspallatensis* Mart. ex DC.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(II, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5441* (BAB, CORD, SI)]; CHL[*Bridges, T. C. s.n.* (GH)].

Argylia villosa Phil. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia viridis Phil. = **Argylia adscendens** DC. var. **viridis** (Phil.) Gleisner & Ricardi
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia viridis Phil. var. *digitalina* (Phil.) Reiche = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Argylia viridis Phil. var. *lutea* (Phil.) Reiche = **Argylia adscendens** DC. var. **adscendens**
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Arrabidaea acuminata (J.R. Johnst.) Urb. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea amazonica K. Schum. = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Arrabidaea anguillulicarpa Hassl. = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea ateramnantha Bureau & K. Schum. = **Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea barquisimetensis Pittier = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea blanchetii DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea blanchetii DC. var. *desertotum* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *acuminata* Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *attenuata* Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *cuneata* (DC.) Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *firma* Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *induta* Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *platyphylla* (DC.) Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea brachypoda (A. DC.) Bureau var. *rigida* Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea calodictyos Sprague = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea candicans (Rich.) DC. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea candicans (Rich.) DC. var. *latifolia* DC. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea carabobensis Pittier = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea cardenasii Rusby = **Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea caudigera (S. Moore) A.H. Gentry = **Fridericia caudigera** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. f. *cuprea* (Cham.) Sandwith = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *acutifolia* Bureau = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *angustifolia* Bureau & K. Schum. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *cuprea* (Cham.) Bureau & K. Schum. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *thyrsoideae* (DC.) Bureau = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea chironeura Bureau ex Glaz., nom. nud. = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea coleocalyx Bureau & K. Schum. = **Fridericia caudigera** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea coleocalyx Bureau & K. Schum. var. *induta* Sprague = **Fridericia caudigera** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea coleocalyx Bureau & K. Schum. var. *macrantha* Sprague = **Fridericia caudigera** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea cordifolia Klotzsch = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea corymbifera (Vahl) Bureau & K. Schum. = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea craterophora (DC.) Bureau = **Fridericia craterophora** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea craterophora (DC.) Bureau var. *acutifolia* Bureau = **Fridericia craterophora** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea cuprea (Cham.) Bornm., hom. illeg. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea cuprea Pittier = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea decora (S. Moore) Hassl. = **Bignonia decora** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea decora (S. Moore) Hassl. var. *macrophylla* Hassl. = **Bignonia decora** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea desertorum DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea dichasia J.D. Sm. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea dichotoma (Vell.) Bureau = **Tanaecium selloi** (Spreng.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea divaricata Bureau & K. Schum. = **Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea fagoides Cham. = **Fridericia fagoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea florida DC. = **Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea grandiflora Hassl. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea guaricensis Pittier = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea larensis Pittier = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea lenticellosa Pittier = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea leucopogon (Cham.) Sandwith = **Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea lundellii Standl. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea mollis (Vahl) Bureau & K. Schum. = **Fridericia mollis** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea muehlbergiana Hassl. = **Fridericia mutabilis** (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea mutabilis Bureau & K. Schum. = **Fridericia mutabilis** (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea obliqua (Kunth) Bureau = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea obliqua (Kunth) Bureau var. *hirsuta* (DC.) Dugand = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea obovata DC. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea orbignyana DC. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea ovalifolia Pittier = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea pachycalyx Sprague = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea panamensis Sprague = **Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea paniculata (L.) Seem. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum., nom. illeg. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *acuminata* Bureau = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *cuneata* DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *elliptica* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firma* (Bureau) Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firmula* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *heterophylla* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *induta* (Bureau) Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *lasiorrhachis* Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *puberula* Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sprague, T. A., 1905.

Arrabidaea platyphylla (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *stricta* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea pleei DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003.

Arrabidaea praecox Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea pruinosa Klotzsch ex Bureau & K. Schum. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea pulchella (Cham.) Bureau = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea quinquenervia Bureau & K. Schum. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. f. *glabrescens* Sprague = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. f. *mollis* (Sprague) Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. f. *puberula* Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. f. *subglabra* Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. var. *elliptica* Sprague = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. var. *genuina* Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. var. *induta* Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. var. *oxyphylla* Sprague & Sandwith = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. var. *praecox* (Hassl.) Hassl. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodantha Bureau & K. Schum. var. *typica* Sprague, nom. inval. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rhodothyrsus Kraenzl. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rosea DC. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea rotundata (DC.) Bureau ex K. Schum. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea samydoides (Cham.) Sandwith = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea schomburgkii Klotzsch ex Bureau & K. Schum. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea schumanniana Huber = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea sciuripabula K. Schum. = **Bignonia sciuripabula** (K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea selloi (Spreng.) Sandwith = **Tanaecium selloi** (Spreng.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea sickiana J.C. Gomes = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea sieberi A. DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea spraguei Pittier = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea subincana DC. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea tobatiensis Chodat = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea triphylla Willd. ex DC. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea triplinervia (Mart. ex DC.) Baill. = **Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea triplinervia (Mart. ex DC.) Baill. var. *brachycalix* Hassl. = **Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea truncata (Sprague) Sandwith = **Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea virescens DC. = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea virescens DC. var. *farinosa* Salzm. ex DC. = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea whitei (Rusby) Sandwith = **Fridericia whitei** (Rusby) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Arrabidaea zuliaensis Pittier = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Batocydia exoleta Mart. ex DC. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Batocydia unguis Mart. ex DC., nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Batocydia unguis-cati (L.) Mart. ex Britton, nom. illeg. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia L.

Número de especies: 4

Bignonia acuminata J.R. Johnst. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia acutissima Cham. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia acutistiopula Schltdl. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia aequinoctialis L. var. *chamberlaynii* (Sims) Ker Gawl. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia antisyphilitica Mart. = **Cybistax antisyphilitica** (Mart.) Mart.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia araliacea Cham. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Bignonia arrabidae Steud. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia arvensis Vell. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia aurea Silva Manso = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia baclei DC. = **Amphilophium cynanchoides** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia balbisiana DC. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia balbisiana DC. var. *glabra* DC. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia balbisiana DC. var. *hirsuta* DC. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia binata Silva Manso = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Sandwith, N. Y., 1937.

Bignonia binata Thunb.
Sin.: *Adenocalymma ocositense* Donn. Sm., *Arrabidaea schumanniana* Huber, *Bignonia binata* Silva Manso, *Bignonia eximia* Morong, *Bignonia noterophila* DC., *Bignonia purpurea* Lodd. ex Hook. f., *Bignonia umbellata* DC., *Bignonia umbellulata* DC., *Clytostoma binatum* (Thunb.) Sandwith, *Clytostoma elegans* Standl., *Clytostoma isthmicum* Pittier, *Clytostoma noterophilum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Petastoma multiglandulosa* Kraenzl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15423* (CTES, LIL, LP, MBM)]; BRA[*Hatschbach, G. 47545* (MBM, MO)]; PRY[*Arbo, M. M. 2847* (CTES, MO)].

Bignonia blanchetii DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia boliviana Rusby = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia botryoides Cham. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachiata Sessé & Moç. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *acutifolia* DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *cuneata* DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *elliptica* DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *firmula* DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *heterophylla* DC. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *platyphylla* (Cham.) DC., nom. illeg. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brachypoda DC. var. *pubescens* Sond. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia bracteata Cham. = **Adenocalymma bracteatum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia brasiliana Lam. = **Jacaranda brasiliana** (Lam.) Pers.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia californica Brandegee = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia callistegioides Cham.
Sin.: *Bignonia lindleyi* DC., *Bignonia picta* Lindl., *Bignonia speciosa* Graham, *Clytostoma calystegioides* (Cham.) Bureau, *Clytostoma uniflorum* K. Schum., *Cuspidaria callistegioides* (Cham.) DC., *Pithecoctenium callistegioides* (Cham.) Niederl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c, 1979a, 1993; Hicken, C. M., 1910; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Liana. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, MEN, MIS, SAL); BRA(RGS); PRY(APY, CEN); URY(CAS, CLA, FLA, MON, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5326* (BAB, SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1622* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 9007* (CTES, FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 1012* (SI)].

Bignonia calycina DC. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia candicans Rich. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia capensis Thunb. = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia caroba Vell. = **Jacaranda caroba** (Vell.) DC.
Referencias: Lohmann, L. & Pirani, J. R., 1996.

Bignonia cassinoides Lam. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia catharinensis Schenk = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Bignonia caudigera S. Moore = **Fridericia caudigera** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia chamberlaynii Sims = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia chamberlaynii Sims var. *tenerior* Cham. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia chica Humb. & Bonpl. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia chrysantha Jacq. = **Tabebuia chrysantha** (Jacq.) G. Nicholson

Bignonia ciliata Wawra = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia coccinea Vell. = **Dolichandra cynanchoides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia cognata Cham. = **Tynanthus cognatus** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia colorata Poir. = **Fridericia candicans** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia columbiana Morong = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia comosa Cham. = **Adenocalymma comosum** (Cham.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia conjugata Vell. = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia conspicua Rich. ex DC., nom. nud. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia convoluta Vell. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1975.

Bignonia corallina Jacq. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia coriacea Sellow ex Steud. = **Tanaecium selloi** (Spreng.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia corymbifera Vahl = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

[Bignonia corymbosa (Vent.) L.G. Lohmann]
Sin.: *Macfadyena corymbosa* (Vent.) Griseb., *Macfadyena riparia* S. Moore, *Phryganocydia corymbosa* (Vent.) Bureau, *Spathodea corymbosa* Vent.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bignonia craterophora DC. = **Fridericia craterophora** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia crucigera L. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia cuprea Cham. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia cuprea Cham. var. *grandiflora* Cham. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia cuprea Cham. var. *parviflora* Cham. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia dasyantha DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia dasyonyx S.F. Blake = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia decora (S. Moore) L.G. Lohmann
Sin.: *Anemopaegma decorum* S. Moore, *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl., *Arrabidaea decora* (S. Moore) Hassl. var. *macrophylla* Hassl., *Clytostoma decorum* (S. Moore) Bureau & K. Schum., *Cydista decora* (S. Moore) A.H. Gentry
Referencias: Angely, J. A., 1965; Gentry, A. H., 1977a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 100–400 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5642* (MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 1790* (BM, CTES, MO, PY)].

Bignonia dentata DC. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia dichotoma Vell., hom. illeg. = **Tanaecium selloi** (Spreng.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia difficilis Cham. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia digitalis Vell. = **Zeyheria montana** Mart.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia dolichoides Cham. = **Amphilophium dolichoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia echinata Jacq. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia ehretioides Cham. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia elegans Cham., hom. illeg. = **Tynanthus elegans** Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia elongata Vahl = **Amphilophium elongatum** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia eximia Morong = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia exoleta Vell. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia fagoides Cham. = **Fridericia fagoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia falcata Vell. = **Amphilophium falcatum** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia farinosa Salzm. ex DC. = **Fridericia conjugata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia flavescens Vell. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia fraxinifolia (Kunth) Spreng. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia frutescens Mill. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia fulva Cav. = **Tecoma fulva** (Cav.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia glabrata Kunth = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia glandulosa Mart. ex DC., nom. illeg. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia glandulosa Mart., nom. illeg. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia gracilis Lodd. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia grewioides S. Moore = **Fridericia fagoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia hebantha Mart. ex DC., nom. nud. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia heptaphylla Vell. = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1975, 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia hibiscifolia Cham. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Fabris, H. A., 1993; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Bignonia ignea Vell. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Bignonia incisa DC., nom. nud. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia inflata Griseb. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia lanuginosa Hemsl. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia laurifolia Vahl = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia lenta Mart. ex DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia leucantha Vell. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia leucopogon Cham. = **Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia leucoxylon DC., nom. nud. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia lindleyi DC. = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia longiflora Vell. = **Tabebuia vellosoi** J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia longisiliqua Vell. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Arbo, M. M., 1999; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia marginata Cham. = **Adenocalymma marginatum** (Cham.) DC. var. **marginatum**
Referencias: Fabris, H. A., 1965c.

Bignonia martiusiana DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia meyeniana Schauer = **Tecoma fulva** (Cav.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia miranda Cham. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Bignonia mollis Vahl = **Fridericia mollis** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia morongii Britton = **Tabebuia nodosa** (Griseb.) Griseb.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia myriantha Cham. = **Xylophragma myrianthum** (Cham. ex Steud.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia nitida Britton ex Bureau & K. Schum., nom. nud. = **Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Bignonia nitidula Mart. ex DC., nom. nud. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia noterophila DC. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia obliqua Kunth = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia obovata Vell. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia obtusifolia Lam. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia occidentalis Salzm. ex DC. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pachyptera DC., nom. nud. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia paniculata L. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia pannosa DC. = **Amphilophium pannosum** (DC.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia patrisiana DC., nom. nud. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia perforata Cham. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897.

Bignonia perianthomega Vell. = **Perianthomega vellozoi** Bureau
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia phaseoloides Cham. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia physaloides Cham. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia picta Lindl. = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia populifolia DC. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pratensis Poepp. ex Bureau & K. Schum. = **Xylophragma pratense** (Bureau & K. Schum.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pseudounguis Desf. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pterocarpa Cham. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1975; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pubescens L. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pubescens Pav. ex DC., hom. illeg. = **Amphilophium pannosum** (DC.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1993; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia pulchella Cham. = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia punctata DC. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia purpurea Lodd. ex Hook. f. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia pyramidata Rich. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Bignonia quadrivalvis Jacq. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia radiata L. = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia regnelliana Sond. = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia roseo-alba Ridl. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia rotundata DC. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia rubescens S. Moore = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia rufescens DC. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia rupestris Gardner = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia samydoides Cham. = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia scandens Vell. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia sciuripabula (K. Schum.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea sciuripabula* K. Schum., *Clytostoma itatiaiense* J.C. Gomes, *Clytostoma sciuripabulum* (K. Schum.) Bureau & K. Schum., *Clytostoma sciuripabulum* (K. Schum.) Bureau & K. Schum. var. *longiflorum* Sprague
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, GUA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 899* (CTES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16670* (HBR)]; PRY[*Zardini, E. M. 13995* (CTES, FCQ)].

Bignonia selloi Spreng. = **Tanaecium selloi** (Spreng.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia serratifolia Vahl = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Bignonia sieberi DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia sinclairii Benth. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia sorbifolia Salisb. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia speciosa Graham = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia squalus Vell. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia squamellulosa DC., nom. nud. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G., 2003.

Bignonia stans L. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia striata DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia subvernicosa Cham., nom. nud. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia tabebuya Vell. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia tecoma Wehmer = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia tecomiflora Rusby = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia tecomoides DC. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia tenuiflora DC. = **Tecoma tenuiflora** (DC.) Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia tetraquetra Cham. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia thyrsoidea DC. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia tilifolia Kunth = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia tomentella S. Moore = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia triantha DC. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia triplinervia DC. = **Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia tuberculosa Vell. = **Zeyheria tuberculosa** (Vell.) Bureau
Referencias: González Parini, F., Pérez, L. & Mereles, F., 2004.

Bignonia tubulosa Klotzsch = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia tweediana Lindl. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia uliginosa Gomes = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Bignonia umbellata DC. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia umbellulata DC. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia umbrosa Kunth = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia uncata Andrews = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia uncata Sims, nom. inval. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia uncinata G. Mey. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia unguiculata Vell. = **Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia unguis L. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1973a.

Bignonia unguis-cati L. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1973b.

Bignonia unguis-cati L. var. *exoleta* (Vell.) Sprague = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Bignonia unguis-cati L. var. *gracilis* (Lodd.) DC. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia unguis-cati L. var. *guatemalensis* K. Schum. & Loes. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia unguis-cati L. var. *radicans* DC. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia unguis-cati L. var. *serrata* Bureau & K. Schum. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1977c.

Bignonia variabilis Mart. = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia varians DC. = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia velutina DC. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia venusta Ker Gawl. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Bignonia vespertilia Barb. Rodr. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia villosa Bertero ex Spreng. = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia virginalis Mart. ex DC. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia vitalba Cham. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bignonia vitalba Cham. var. *aequinoctialis* Cham. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Rizzini = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *begonifolium* J.C. Gomes = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *glabrum* J.C. Gomes = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *robustius* J.C. Gomes = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *stenocarpum* J.C. Gomes = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Bothriopodium glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Rizzini var. *symmetricum* J.C. Gomes = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Calampelis scaber (Ruiz & Pav.) D. Don, nom. illeg. = **Eccremocarpus scaber** Ruiz & Pav.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Calampelis scaber (Ruiz & Pav.) Sweet = **Eccremocarpus scaber** Ruiz & Pav.
Referencias: D'Arcy, W. G., 1997; Sandwith, N. Y., 1965.

Campsidium Seem.

Número de especies: 1 endémica

Campsidium chilense Reissek & Seem. = **Campsidium valdivianum** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Campsidium valdivianum (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Campsidium chilense* Reissek & Seem., *Tecoma valdiviana* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Dimitri, M. J., 1972b; Fabris, H. A., 1965c, 1999b; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o liana. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, D. 985* (CTES)]; CHL[*Werdermann, E. 74* (MO, SI)].

Campsis Lour.

Número de especies: 1 introducida

Campsis radicans L.
Referencias: Juárez de Varela, F. C., 1994a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Liana. Introducida. 400–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 2992* (MCNS, MO)].

Catalpa cassinoides (Lam.) Spreng. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Chodanthus praepensus (Miers) Sandwith = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Chodanthus splendens (Bureau & K. Schum.) Hassl. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Chodanthus splendens (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Chodanthus splendens (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *glomeratus* Hassl. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.

Chodanthus splendens (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *grandiflora* (Hassl.) Hassl. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Clytostoma binatum (Thunb.) Sandwith = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma calystegioides (Cham.) Bureau = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma decorum (S. Moore) Bureau & K. Schum. = **Bignonia decora** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma elegans Standl. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma isthmicum Pittier = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma itatiaiense J.C. Gomes = **Bignonia sciuripabula** (K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma noterophilum (DC.) Bureau & K. Schum. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma punctatum Bureau ex Glaz. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Clytostoma sciuripabulum (K. Schum.) Bureau & K. Schum. = **Bignonia sciuripabula** (K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma sciuripabulum (K. Schum.) Bureau & K. Schum. var. *longiflorum* Sprague = **Bignonia sciuripabula** (K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Clytostoma uniflorum K. Schum. = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Cremastus balbisianus (DC.) Miers = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

[Crescentia cujete L.]
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Hassler, E., 1917.
Notas: Especie excluida del área del proyecto. Citada sobre la base de material estéril (*Hassler 12061,* G).

Cuspidaria DC., nom. cons.

Número de especies: 2

Cuspidaria callistegioides (Cham.) DC. = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Cuspidaria convoluta (Vell.) A.H. Gentry
Sin.: *Bignonia convoluta* Vell., *Bignonia pterocarpa* Cham., *Bignonia tetraquetra* Cham., *Cuspidaria populeaster* Mart. ex DC., *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC., *Cuspidaria pterocarpa* (Cham.) DC. var. *pobuscens* Corr. Méllo, *Cuspidaria trifoliata* DC., *Lochmocydia populeaster* Mart. ex DC., *Nouletia pterocarpa* (Cham.) Pichon, *Saldanhaea convoluta* Corr. Méllo
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1975; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Stutz, L. C., 1983.
Liana. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28486* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12875* (HBR, US)]; PRY[*Schinini, A. 27870* (CTES, G, MO)].

Cuspidaria corymbifera (Vahl) Baill. ex K. Schum. = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith

Cuspidaria hibiscifolia (Cham.) Bureau = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Cuspidaria lateriflora (Mart.) DC.
Sin.: *Lochmocydia laterifolia* (Mart.) Mart., *Saldanhaea confertiflora* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Saldanhaea lateriflora* (Mart.) Bureau var. *ovata* Bureau, *Tecoma lateriflora* Mart.
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 500–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11370* (G)].

Cuspidaria paucifolia DC. = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Cuspidaria populeaster Mart. ex DC. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Cuspidaria pterocarpa (Cham.) DC. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1975; Lohmann, L. G., com. pers.

Cuspidaria pterocarpa (Cham.) DC. var. *pobuscens* Corr. Méllo = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Cuspidaria pulchella (Cham.) Baill. = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Cuspidaria trifoliata DC. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1975; Lohmann, L. G., 2003.

Cybistax Mart. ex Meisn.

Número de especies: 1

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.
Sin.: *Bignonia antisyphilitica* Mart., *Cybistax antisyphilitica* (Mart.) Mart. var. *trochocalyx* Bureau & K. Schum.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1975; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Spegazzini, C. L. & Girola, C. D., 1911; Sprague, T. A., 1905.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(JUJ); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 8949* (CTES, MCNS, SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1573* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 6753* (CTES, LP)].

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. var. *trochocalyx* Bureau & K. Schum. = **Cybistax antisyphilitica** (Mart.) Mart.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Cydista decora (S. Moore) A.H. Gentry = **Bignonia decora** (S. Moore) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Cydista difficilis Miers = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.

Cydista preaepensa Miers = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.

Distictella elongata (Vahl) Urb. = **Amphilophium elongatum** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Distictis elongata (Vahl) Bureau & K. Schum. = **Amphilophium elongatum** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Distictis glaziovii (Bureau ex K. Schum.) Bureau & K. Schum. = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Dolichandra Cham.

Número de especies: 7, 1 endémica

Dolichandra chodatii (Hassl.) L.G. Lohmann
Sin.: *Parabignonia chodatii* (Hassl.) A.H. Gentry, *Paradolichandra chodatii* Hassl., *Paradolichandra chodatii* Hassl. var. *brachycalyx* Hassl.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1979; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Arbusto o liana. Nativa. 100–700 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34412* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 6966* (L, RB)]; PRY[*Hassler, E. 11085* (BAF)].

Dolichandra cynanchoides Cham.
Sin.: *Bignonia coccinea* Vell., *Dolichandra cynanchoides* Cham. var. *latifolia* Hassl., *Macfadyena coccinea* (Vell.) Miers, *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong, *Macfadyena cynanchoides* (Cham.) Morong var. *latifolia* Hassl., *Spathodea dolichandra* Steud.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c, 1979a, 1993; Hassler, E., 1898; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schulz, A. G., 1939.
Liana. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(COL, MON, RNO, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 1172* (BAA, CONC, CTES, MBM)]; BRA[*Rambo, B. 49678* (PACA)]; PRY[*Mereles, F. 5257* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 1006* (G)].

Dolichandra cynanchoides Cham. var. *latifolia* Hassl. = **Dolichandra cynanchoides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Dolichandra dentata (K. Schum.) L.G. Lohmann
Sin.: *Macfadyena dentata* K. Schum., *Macfadyena tweediana* Griseb.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c, 1979a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Enredadera o liana. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, GUA, PAI); URY(ART, CAS, FLA, MON, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4284* (LP, SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1607* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3360* (CTES)]; URY[*Felippone, F. 6962* (SI)].

Dolichandra fenzliana Miq. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Dolichandra kohautiana C. Presl = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Dolichandra maximilianii (Mart. ex DC.) Kuntze = **Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Dolichandra quadrivalvis (Jacq.) L.G. Lohmann
Sin.: *Bignonia fraxinifolia* (Kunth) Spreng., *Bignonia populifolia* DC., *Bignonia quadrivalvis* Jacq., *Melloa duseniana* Kraenzl., *Melloa fraxinifolia* (Kunth) K. Schum. ex Schnee, *Melloa populifolia* (DC.) Britton, *Melloa populifolia* (DC.) Bureau ex Benth. & Hook. f., *Melloa quadrivalvis* (Jacq.) A.H. Gentry, *Phryganocydia pisoniana* Mart. ex DC., nom. nud., *Spathodea fraxinifolia* (Spreng.) Kunth, *Spathodea pisoniana* DC., *Tabebuia pisoniana* (DC.) Miers, *Tecoma pisoniana* (DC.) DC. ex Bureau & K. Schum.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1973b; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 5435* (AS, CTES, LP, MO)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11001* (C, CTES, MO)]; PRY[*Soria, N. 3966* (CTES, FCQ)].

Dolichandra uncata (Andrews) L.G. Lohmann
Sin.: *Bignonia pachyptera* DC., nom. nud., *Bignonia uncata* Andrews, *Bignonia uncata* Sims, nom. inval., *Bignonia uncinata* G. Mey., *Dolichandra fenzliana* Miq., *Doxantha uncata* (Andrews) Miers, *Macfadyena fenzliana* (Miq.) Miq., *Macfadyena guatemalensis* S.F. Blake, *Macfadyena hassleri* Sprague, *Macfadyena hispida* (DC.) Seem., *Macfadyena mollis* (Sond.) Seem., *Macfadyena pubescens* S. Moore, *Macfadyena uncata* (Andrews) Sprague & Sandwith, *Macfadyena uncinata* (G. Mey.) A. DC., *Macfadyena unculata* K. Schum., *Pachyptera puberula* DC., *Spathodea hispida* DC., *Spathodea mollis* Sond., *Spathodea uncata* (Andrews) Spreng., *Spathodea uncinata* (G. Mey.) Spreng.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Gentry, A. H., 1973a; Hassler, E., 1898; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sprague, T. A., 1905.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(CAS).

Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1299* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40492* (CTES, MBM)]; PRY[*Hassler, E. 7529* (C, G, NY, S, SI, US, W)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (MO)].

Dolichandra unguiculata (Vell.) L.G. Lohmann

Sin.: *Bignonia unguiculata* Vell., *Dolichandra maximilianii* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Doxantha unguiculata* (Vell.) Miers, *Parabignonia maximilianii* (Mart. ex DC.) Bureau ex K. Schum., *Parabignonia unguiculata* (Vell.) A.H. Gentry, *Tecoma maximilianii* Mart. ex DC.

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.

Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 39143* (MBM, MO)].

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann

Sin.: *Batocydia exoleta* Mart. ex DC., *Batocydia unguis-cati* (L.) Mart. ex Britton, nom. illeg., *Batocydia unguis* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia acutistiopula* Schltdl., *Bignonia californica* Brandegee, *Bignonia catharinensis* Schenk, *Bignonia dasyonyx* S.F. Blake, *Bignonia exoleta* Vell., *Bignonia gracilis* Lodd., *Bignonia inflata* Griseb., *Bignonia lanuginosa* Hemsl., *Bignonia pseudounguis* Desf., *Bignonia triantha* DC., *Bignonia tweediana* Lindl., *Bignonia unguis-cati* L., *Bignonia unguis-cati* L. var. *exoleta* (Vell.) Sprague, *Bignonia unguis-cati* L. var. *gracilis* (Lodd.) DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *guatemalensis* K. Schum. & Loes., *Bignonia unguis-cati* L. var. *radicans* DC., *Bignonia unguis-cati* L. var. *serrata* Bureau & K. Schum., *Bignonia unguis* L., *Bignonia vespertilia* Barb. Rodr., *Dolichandra kohautiana* C. Presl, *Doxantha acutistipula* (Schltdl.) Miers, *Doxantha adunca* Miers, *Doxantha chelophora* Miers, nom. nud., *Doxantha dasyonyx* (S.F. Blake) S.F. Blake, *Doxantha exoleta* (Vell.) Miers, *Doxantha mexicana* Miers, nom. nud., *Doxantha praesignis* Miers, nom. nud., *Doxantha radicans* (DC.) Miers, *Doxantha serrulata* Miers, nom. nud., *Doxantha tenuicula* Miers, nom. nud., *Doxantha torquata* Miers, nom. nud., *Doxantha tweediana* (Lindl.) Miers, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers, *Doxantha unguis-cati* (L.) Miers var. *exoleta* (Vell.) Fabris, *Doxantha unguis* (L.) Miers, *Doxantha unguis* (L.) Miers var. *microphylla* Chodat, *Macfadyena unguis-cati* (L.) A.H. Gentry, *Microbignonia auristellae* Kraenzl.

Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1979a, 1993; Gentry, A. H., 1973b; Hassler, E., 1898; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983.

Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–2100 m.

Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, COL, FLA, MON, RNO, RIV, SJO).

Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 733* (CTES, MO, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 22394* (CTES, MBM)]; PRY[*Hassler, E. 1513* (SI)]; URY[*Seijo, G. J. 2653* (CTES)].

Dombeya lappacea L'Hér. = **Tourrettia lappacea** (L'Hér.) Willd.

Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1980.

Doxantha acutistipula (Schltdl.) Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha adunca Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha chelophora Miers, nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha dasyonyx (S.F. Blake) S.F. Blake = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha elongata (Vahl) Miers = **Amphilophium elongatum** (Vahl) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha exoleta (Vell.) Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Gentry, A. H., 1973a; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha mexicana Miers, nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha praesignis Miers, nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha radicans (DC.) Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha serrulata Miers, nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha tenuicula Miers, nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha torquata Miers, nom. nud. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha tweediana (Lindl.) Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha uncata (Andrews) Miers = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann

Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Doxantha unguiculata (Vell.) Miers = **Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha unguis (L.) Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1973a.

Doxantha unguis (L.) Miers var. *microphylla* Chodat = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Doxantha unguis-cati (L.) Miers = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Gentry, A. H., 1973b.

Doxantha unguis-cati (L.) Miers var. *exoleta* (Vell.) Fabris = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Ducoudraea capensis Bureau = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Eccremocarpus Ruiz & Pav.

Número de especies: 1

Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav.
Sin.: *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) D. Don, nom. illeg., *Calampelis scaber* (Ruiz & Pav.) Sweet, *Eccremocarpus scaber* Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A. DC., *Eccremocarpus sepium* Bertero
Referencias: D'Arcy, W. G., 1997; Fabris, H. A., 1965c, 1999b; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y., 1965.
Arbusto. Nativa. 200–2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(V, VI, VII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 2103* (BAA, SI)]; CHL[*Landrum, L. R. 10050* (ASU, CTES)].

Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav. var. *sepium* Bertero ex A. DC. = **Eccremocarpus scaber** Ruiz & Pav.
Referencias: D'Arcy, W. G., 1997; Fabris, H. A., 1965c; Sandwith, N. Y., 1965.

Eccremocarpus sepium Bertero = **Eccremocarpus scaber** Ruiz & Pav.
Referencias: D'Arcy, W. G., 1997.

Endoloma purpurea Raf. = **Amphilophium paniculatum** (L.) Kunth
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Fridericia Mart.

Número de especies: 18

Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea calodictyos* Sprague, *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC., *Arrabidaea candicans* (Rich.) DC. var. *latifolia* DC., *Arrabidaea orbignyana* DC., *Arrabidaea pachycalyx* Sprague, *Arrabidaea pruinosa* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea quinquenervia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rhodothyrsus* Kraenzl., *Arrabidaea schomburgkii* Klotzsch ex Bureau & K. Schum., *Arrabidaea subincana* DC., *Arrabidaea zuliaensis* Pittier, *Bignonia candicans* Rich., *Bignonia colorata* Poir.
Referencias: Gentry, A. H., 1977c, 1982; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 100–200 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*González, F. 1038* (CTES, FCQ)].

Fridericia caudigera (S. Moore) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea caudigera* (S. Moore) A.H. Gentry, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *induta* Sprague, *Arrabidaea coleocalyx* Bureau & K. Schum. var. *macrantha* Sprague, *Bignonia caudigera* S. Moore
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1976; Hassler, E., 1898; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5620* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15744* (CTES, MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 3453* (CTES, SI)].

Fridericia chica (Bonpl.) L.G. Lohmann
Sin.: *Adenocalymma portoricense* Bello, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. f. *cuprea* (Cham.) Sandwith, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *acutifolia* Bureau, *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *angustifolia* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *cuprea* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) Verl. var. *thyrsoideae* (DC.) Bureau, *Arrabidaea cuprea* (Cham.) Bornm., hom. illeg., *Arrabidaea cuprea* Pittier, *Arrabidaea larensis* Pittier, *Arrabidaea rosea* DC., *Arrabidaea triphylla* Willd. ex DC., *Bignonia chica* Humb. & Bonpl., *Bignonia cuprea* Cham., *Bignonia cuprea* Cham. var. *grandiflora* Cham., *Bignonia cuprea* Cham. var. *parviflora* Cham., *Bignonia rubescens* S. Moore, *Bignonia rufescens* DC., *Bignonia thyrsoidea* DC., *Lundia chica* (Bonpl.) Seem., *Temnocydia carajuda* Mart. ex DC., *Vasconcellia acutiflora* Mart. ex DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Liana. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, MIE, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5459* (BAA, BAB, CTES, SI)]; BRA[*Cordeiro, J. 1601* (CTES, MBM)]; PRY[*Jiménez, B. 1569* (BM, CTES, MO, PY)].

Fridericia conjugata (Vell.) L.G. Lohmann
Sin.: *Adenocalymma paniculatum* Benth. ex Miers, *Arrabidaea amazonica* K. Schum., *Arrabidaea chironeura* Bureau ex Glaz., nom. nud., *Arrabidaea virescens* DC., *Arrabidaea virescens* DC. var. *farinosa* Salzm. ex DC., *Bignonia ciliata* Wawra, *Bignonia conjugata* Vell., *Bignonia farinosa* Salzm. ex DC.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 300–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 690* (MO)].

Fridericia craterophora (DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau, *Arrabidaea craterophora* (DC.) Bureau var. *acutifolia* Bureau, *Bignonia craterophora* DC.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 300–400 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Solomon, J. C. 7017* (MO, PY)].

Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann
Sin.: *Adenocalymma friesianum* Kraenzl., *Arrabidaea acuminata* (J.R. Johnst.) Urb., *Arrabidaea barquisimetensis* Pittier, *Arrabidaea corallina* (Jacq.) Sandwith, *Arrabidaea guaricensis* Pittier, *Arrabidaea lenticellosa* Pittier, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau, *Arrabidaea obliqua* (Kunth) Bureau var. *hirsuta* (DC.) Dugand, *Arrabidaea obovata* DC., *Arrabidaea ovalifolia* Pittier, *Arrabidaea praecox* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *glabrescens* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *mollis* (Sprague) Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *puberula* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. f. *subglabra* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *elliptica* Sprague, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *genuina* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *induta* Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *oxyphylla* Sprague & Sandwith, *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *praecox* (Hassl.) Hassl., *Arrabidaea rhodantha* Bureau & K. Schum. var. *typica* Sprague, nom. inval., *Arrabidaea rotundata* (DC.) Bureau ex K. Schum., *Arrabidaea sickiana* J.C. Gomes, *Arrabidaea spraguei* Pittier, *Bignonia acuminata* J.R. Johnst., *Bignonia balbisiana* DC., *Bignonia balbisiana* DC. var. *glabra* DC., *Bignonia balbisiana* DC. var. *hirsuta* DC., *Bignonia boliviana* Rusby, *Bignonia columbiana* Morong, *Bignonia corallina* Jacq., *Bignonia glabrata* Kunth, *Bignonia hibiscifolia* Cham., *Bignonia obliqua* Kunth, *Bignonia rotundata* DC., *Bignonia villosa* Bertero ex Spreng., *Cremastus balbisianus* (DC.) Miers, *Cuspidaria hibiscifolia* (Cham.) Bureau, *Panterpa dichotoma* (Jacq.) Miers, *Petastoma obliqum* (Kunth) Miers, *Piriadacus hibiscifolius* (Cham.) Pichon, *Tabebuia chapadensis* S. Moore
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Fontana, J. L., 1998; Grisebach, A. H. R., 1879; Hassler, E., 1898; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sandwith, N. Y., 1953; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 26519* (CTES, G, ICN, LIL, LP, MO, UC)]; BRA[*Reitz, P. R. 14332* (HBR, K)]; PRY[*Kiesling, R. 9509* (CTES, G, PY, SI)].

Fridericia fagoides (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea fagoides* Cham., *Bignonia fagoides* Cham., *Bignonia grewioides* S. Moore
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 300–400 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10739* (BM, MO, NY, S)].

Fridericia florida (DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea cardenasii* Rusby, *Arrabidaea divaricata* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea florida* DC., *Arrabidaea panamensis* Sprague, *Bignonia nitida* Britton ex Bureau & K. Schum., nom. nud., *Vasconcellia florida* Bureau ex DC.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983.
Liana. Nativa. 100–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5222* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21110* (CTES, MBM, MO)]; PRY[*Marín, G. 505* (CTES, PY)].

Fridericia guilielma Mart. = **Fridericia speciosa** Mart.
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Fridericia leucopogon (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea leucopogon* (Cham.) Sandwith, *Bignonia leucopogon* Cham., *Panterpa leucopogon* (Cham.) Miers, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau, *Petastoma leucopogon* (Cham.) Bureau var. *glabra* K. Schum., *Petastoma puniceum* (Mart.) Miers
Referencias: Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 100–400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Assis, M. A. 747* (CTES)].

[Fridericia mollis (Vahl) L.G. Lohmann]
Sin.: *Arrabidaea mollis* (Vahl) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Fridericia mollis (Vahl) L.G. Lohmann]
Sin.: *Bignonia mollis* Vahl

Fridericia mutabilis (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea muehlbergiana* Hassl., *Arrabidaea mutabilis* Bureau & K. Schum.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Fabris, H. A., 1965c; Hassler, E., 1898; Lohmann, L. G., com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guillén, R. 196* (BAB, CTES, MNES)]; BRA[*Smith, L. B. 12656* (HBR, US)]; PRY[*Arbo, M. M. 8880* (CTES, G, MEXU, MO)].

Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *acuminata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *attenuata* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *cuneata* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *firma* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *induta* Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *platyphylla* (DC.) Bureau, *Arrabidaea brachypoda* (A. DC.) Bureau var. *rigida* Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *acuminata* Bureau, *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *cuneata* DC., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *elliptica* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firma* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *firmula* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *heterophylla* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *induta* (Bureau) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *lasiorrhachis* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *puberula* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *stricta* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea platyphylla* (Cham.) Bureau & K. Schum., nom. illeg., *Bignonia brachypoda* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *acutifolia* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *cuneata* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *elliptica* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *firmula* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *heterophylla* DC., *Bignonia brachypoda* DC. var. *platyphylla* (Cham.) DC., nom. illeg., *Bignonia brachypoda* DC. var. *pubescens* Sond., *Bignonia regnelliana* Sond., *Petastoma simplicifolia* Miers
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Liana. Nativa. 300–700 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 54049* (MO)]; PRY[*Schinini, A. 36000* (CTES, PY)].

Fridericia pubescens (L.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea blanchetii* DC., *Arrabidaea blanchetii* DC. var. *desertotum* (DC.) Bureau & K. Schum., *Arrabidaea carabobensis* Pittier, *Arrabidaea cordifolia* Klotzsch, *Arrabidaea desertorum* DC., *Arrabidaea lundellii* Standl., *Arrabidaea pleei* DC., *Arrabidaea pubescens* (L.) A.H. Gentry, *Arrabidaea sieberi* A. DC., *Bignonia blanchetii* DC., *Bignonia pubescens* L., *Bignonia sieberi* DC., *Bignonia tomentella* S. Moore, *Petastoma pubescens* (L.) Miers, *Vasconcellia desertorum* Mart. ex DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Gentry, A. H., 1973b; Lohmann, L. G., com. pers.
Liana. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 42200* (MO)]; PRY[*López, M. G. 344* (CTES)].

Fridericia pulchella (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea pulchella* (Cham.) Bureau, *Arrabidaea tobatiensis* Chodat, *Bignonia pulchella* Cham., *Cuspidaria paucifolia* DC., *Cuspidaria pulchella* (Cham.) Baill., *Lundia pauciflora* Mart. ex DC., *Mansoa schwackei* Bureau & K. Schum., *Paracarpea pulchella* (Cham.) Pichon
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lohmann, L. G., com. pers.; Sandwith, N. Y., 1968.
Liana. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27131* (CTES, MBM, S)]; PRY[*Gentry, A. H. 18189* (MO)].

Fridericia samydoides (Cham.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea anguillulicarpa* Hassl., *Arrabidaea samydoides* (Cham.) Sandwith, *Bignonia samydoides* Cham., *Bignonia variabilis* Mart., *Bignonia varians* DC., *Petastoma crenatum* Miers, *Petastoma glabrum* Miers, *Petastoma laurifolium* Kraenzl., *Petastoma samydoides* (Cham.) Miers
Referencias: Arbo, M. M., 1997c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sandwith, N. Y., 1968.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3538* (CTES, MO)]; BRA[*Ferrucci, M. S. 293* (C, CTES, G, MO)]; PRY[*Bernardi, L. 19559* (G, MO), *Fiebrig, K. A. G. 6317* (SI)].

Fridericia speciosa Mart.
Sin.: *Fridericia guilielma* Mart., *Tabebuia sanguinea* DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20919* (MBM, MICH, MO)]; PRY[*Hassler, E. s.n.* (G)].

Fridericia triplinervia (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea ateramnantha* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill., *Arrabidaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Baill. var. *brachycalix* Hassl., *Bignonia triplinervia* DC., *Petastoma triplinervia* (Mart. ex DC.) Miers, *Saritaea triplinervia* (Mart. ex DC.) Dugand
Referencias: Arbo, M. M., 1997c; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Devoto, F. E. & Rothkugel, M., 1942; Hassler, E., 1898; Latzina, E., 1935; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sprague, T. A., 1905.
Liana. Nativa. 100–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3544* (CTES, GH, LIL, MO)]; BRA[*Kummrow, R. 509* (CTES, MBM)]; PRY[*Schinini, A. 6173* (CTES, G, LIL, LP, MO)].

Fridericia truncata (Sprague) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea truncata* (Sprague) Sandwith, *Mansoa truncata* Sprague, *Mansoa truncata* Sprague var. *parviflora* (Hassl.) Sandwith, *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *grandiflorum* Hassl., *Petastoma truncatum* (Sprague) Hassl. var. *parviflorum* Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y., 1968; Sprague, T. A., 1905.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, AMA, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21106* (CTES, LP, SI)]; PRY[*De Egea, J. 211* (BM, CTES, FCQ, G, MO, PY, UNR)].

Fridericia whitei (Rusby) L.G. Lohmann
Sin.: *Anemopaegma whitei* Rusby, *Arrabidaea whitei* (Rusby) Sandwith, *Petastoma whitei* (Rusby) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Enredadera. Perenne. Nativa. 200–300 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*de Sloover, J. R. 134* (MO)].

Gelseminum amoenum Kuntze = **Tecoma tenuiflora** (DC.) Fabris
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a.

Gelseminum araliaceum (Cham.) Kuntze = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Gelseminum avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Kuntze = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Gelseminum chrysotrichum (Mart. ex DC.) Kuntze = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Gelseminum garrocha (Hieron.) Kuntze = **Tecoma garrocha** Hieron.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Gelseminum garrocha (Hieron.) Kuntze var. *bicolor* Kuntze = **Tecoma garrocha** Hieron.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Gelseminum molle (Kunth) Kuntze = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Gelseminum stans (L.) Kuntze = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus albus (Cham.) Mattos = **Tabebuia alba** (Cham.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus araliaceus (Cham.) Mattos = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Handroanthus atractocarpus (Bureau & K. Schum.) Mattos = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Mattos = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Mattos var. *paullensis* (Toledo) Mattos = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Handroanthus caraiba (Mart.) Mattos = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos var. *obtusata* (DC.) Mattos = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus eximus (Miq.) Mattos = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus flavescens (Vell.) Mattos = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Handroanthus heptaphyllus Mattos = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos var. *lepidotus* (Bureau) Mattos = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus leucophlaeos (Mart. ex DC.) Mattos = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus longiflorus (Vell.) Mattos = **Tabebuia vellosoi** J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus odontodiscus (Bureau & K. Schum.) Mattos = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus piutinga (Pilg.) Mattos = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus pulcherrimus (Sandwith) Mattos = **Tabebuia pulcherrima** Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus roseo-albus (Ridl.) Mattos = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos = **Tabebuia umbellata** (Sond.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos = **Tabebuia vellosoi** J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Haplolophium bracteatum Cham. = **Amphilophium bracteatum** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Haplolophium dusenianum Kraenzl. = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Haplolophium glaziovii (Bureau & K. Schum.) A.H. Gentry = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Haplolophium lundii DC. = **Amphilophium bracteatum** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Jacaranda Juss.

Número de especies: 8

[Jacaranda acutifolia Humb. & Bonpl.]
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Jacaranda arrabidae Steud. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Jacaranda arvensis (Vell.) Steud. = **Anemopaegma arvense** (Vell.) Stellfeld ex Souza
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Jacaranda brasiliana (Lam.) Pers.
Sin.: *Bignonia brasiliana* Lam.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Árbol. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 1597* (HBG)].

Jacaranda caroba (Vell.) DC.
Sin.: *Bignonia caroba* Vell., *Jacaranda caroba* (Vell.) DC. var. *oxyphylla* (Cham.) Bureau, *Jacaranda oxyphylla* Cham.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Pirani, J. R., 1996; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22957* (CTES, MBM)]; PRY[*Schinini, A. 20585* (CTES, G)].

Jacaranda caroba (Vell.) DC. var. *oxyphylla* (Cham.) Bureau = **Jacaranda caroba** (Vell.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda chapadensis Barb. Rodr. = **Jacaranda cuspidifolia** Mart. ex DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda chelonia Griseb. = **Jacaranda mimosifolia** D. Don
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda cuspidifolia Kunth, nom. illeg. = **Jacaranda cuspidifolia** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda cuspidifolia Mart. ex DC.
Sin.: *Jacaranda chapadensis* Barb. Rodr., *Jacaranda cuspidifolia* Kunth, nom. illeg., *Jacaranda cuspidifolia* Mart. ex DC. var. *calycina* Bureau
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Hassler, E., 1898; Sprague, T. A., 1905.
Árbol. Nativa. 100–1300 m.
Países: ARG(SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 398* (CORD, GOET)]; BRA[*Hassler, E. 2260* (G)]; PRY[*Rojas, T. 2204* (CTES, SI)].

Jacaranda cuspidifolia Mart. ex DC. var. *calycina* Bureau = **Jacaranda cuspidifolia** Mart. ex DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda decurrens Cham.
Sin.: *Jacaranda decurrens* Cham. subsp. *symmetrifoliolata* Farias & Proença, *Jacaranda decurrens* Cham. var. *glabrata* Hassl., *Jacaranda pteroides* Silva Manso, *Jacaranda robertii* S. Moore
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Gentry, A. H., 1992a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 5207* (*)]; PRY[*Arbo, M. M. 8872* (CTES)].

Jacaranda decurrens Cham. var. *glabrata* Hassl. = **Jacaranda decurrens** Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda decurrens Cham. subsp. *symmetrifoliolata* Farias & Proença = **Jacaranda decurrens** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda digitaliflora Lem. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda digitaliflora Lem. var. *albiflora* Lem. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda echinata Spreng. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda endotricha DC. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda gloxiniiflora Lem. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda hebephora DC. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda intermedia Sond. = **Jacaranda micrantha** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda micrantha Cham.
Sin.: *Jacaranda intermedia* Sond.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 100–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1220* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20545* (C, CTES, MBM, MO)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4365* (C, CTES, K, LP)].

Jacaranda mimosifolia D. Don
Sin.: *Jacaranda chelonia* Griseb., *Jacaranda ovalifolia* R. Br.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c, 1979a, 1993; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Moldenke, H. N., 1945; Spegazzini, C. L. & Girola, C. D., 1911.
Árbol. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(ERI, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, COA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1937* (BAF, LIL, SI)]; PRY[*Mereles, F. 4536* (FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 274* (SI)].
Notas: Cultivada en Argentina (Buenos Aires, Distrito Federal), Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina) y Paraguay.

Jacaranda mutabilis Hassl.
Sin.: *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *integra* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. f. *subcoaetanea* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *angustiflora* Hassl., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Jacaranda mutabilis* Hassl. var. *parvifolia* Hassl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10539* (C, G, MICH, MO)].

Jacaranda mutabilis Hassl. f. *integra* Hassl. = **Jacaranda mutabilis** Hassl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Jacaranda mutabilis Hassl. f. *subcoaetanea* Hassl. = **Jacaranda mutabilis** Hassl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Jacaranda mutabilis Hassl. var. *angustiflora* Hassl. = **Jacaranda mutabilis** Hassl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Jacaranda mutabilis Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Jacaranda mutabilis** Hassl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda mutabilis Hassl. var. *parvifolia* Hassl. = **Jacaranda mutabilis** Hassl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda ovalifolia R. Br. = **Jacaranda mimosifolia** D. Don
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda oxyphylla Cham. = **Jacaranda caroba** (Vell.) DC.
Referencias: Lohmann, L. & Pirani, J. R., 1996.

Jacaranda paulista Silva Manso = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda pteroides Silva Manso = **Jacaranda decurrens** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda puberula Cham.
Sin.: *Bignonia obovata* Vell., *Jacaranda digitaliflora* Lem., *Jacaranda digitaliflora* Lem. var. *albiflora* Lem., *Jacaranda endotricha* DC., *Jacaranda gloxiniiflora* Lem., *Jacaranda hebephora* DC., *Jacaranda paulista* Silva Manso, *Jacaranda puberula* Cham. var. *macrophylla* Cham., *Jacaranda puberula* Cham. var. *microphylla* Cham., *Jacaranda purpurea* Vattimo, *Jacaranda semiserrata* Cham., *Jacaranda subrhombea* DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2968* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40477* (CTES, MBM)]; PRY[*Schinini, A. 20373* (CTES, G)].

Jacaranda puberula Cham. var. *macrophylla* Cham. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Jacaranda puberula Cham. var. *microphylla* Cham. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Jacaranda purpurea Vattimo = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda quinquefolia Steud. ex DC. = **Zeyheria montana** Mart.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda robertii S. Moore = **Jacaranda decurrens** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda semiserrata Cham. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda subrhombea DC. = **Jacaranda puberula** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Jacaranda tuberculosa Steud. = **Zeyheria tuberculosa** (Vell.) Bureau
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lochmocydia laterifolia (Mart.) Mart. = **Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Lochmocydia populeaster Mart. ex DC. = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia DC.

Número de especies: 2, 1 endémica

Lundia chica (Bonpl.) Seem. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith
Sin.: *Arrabidaea corymbifera* (Vahl) Bureau & K. Schum., *Bignonia corymbifera* Vahl, *Bignonia umbrosa* Kunth, *Cuspidaria corymbifera* (Vahl) Baill. ex K. Schum., *Lundia phaseolifolia* Rusby, *Lundia truncata* Rusby, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau, *Lundia umbrosa* (Kunth) Bureau var. *coccinea* Bureau, *Lundia valenzuelae* Dugand, *Petastoma corymbiferum* (Vahl) Miers
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Liana. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 44308* (MO)].

Lundia glabra DC. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Lundia hebantha DC. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Lundia nitidula DC. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia nitidula DC. var. *virginalis* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1977b; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia pauciflora Mart. ex DC. = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Lundia phaseolifolia Rusby = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia truncata Rusby = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia umbrosa (Kunth) Bureau = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia umbrosa (Kunth) Bureau var. *coccinea* Bureau = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia valenzuelae Dugand = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Lundia virginalis DC.
Sin.: *Alsocydia virginalis* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia hebantha* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia nitidula* Mart. ex DC., nom. nud., *Bignonia virginalis* Mart. ex DC., *Lundia glabra* DC., *Lundia hebantha* DC., *Lundia nitidula* DC., *Lundia nitidula* DC. var. *virginalis* (DC.) Bureau & K. Schum., *Lundia virginalis* DC. var. *nitidula* (DC.) A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1977b; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6393* (K)].

Lundia virginalis DC. var. *nitidula* (DC.) A.H. Gentry = **Lundia virginalis** DC.
Referencias: Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Macfadyena citrifolia (DC.) Miers = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena coccinea (Vell.) Miers = **Dolichandra cynanchoides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Macfadyena corymbosa (Vent.) Griseb. = **Bignonia corymbosa** (Vent.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Macfadyena cynanchoides (Cham.) Morong = **Dolichandra cynanchoides** Cham.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Macfadyena cynanchoides (Cham.) Morong var. *latifolia* Hassl. = **Dolichandra cynanchoides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Macfadyena dentata K. Schum. = **Dolichandra dentata** (K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Macfadyena fenzliana (Miq.) Miq. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena guatemalensis S.F. Blake = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Macfadyena hassleri Sprague = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena hispida (DC.) Seem. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena mollis (Sond.) Seem. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena pubescens S. Moore = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena riparia S. Moore = **Bignonia corymbosa** (Vent.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena tweediana Griseb. = **Dolichandra dentata** (K. Schum.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Macfadyena uncata (Andrews) Sprague & Sandwith = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena uncinata (G. Mey.) A. DC. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena unculata K. Schum. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Mansoa DC.

Número de especies: 1

Mansoa acuminatissima Bureau & K. Schum. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K. Schum.
Sin.: *Adenocalymma glomeratum* Sprague, *Adenocalymma splendens* Bureau & K. Schum., *Arrabidaea grandiflora* Hassl., *Bignonia difficilis* Cham., *Chodanthus praepensus* (Miers) Sandwith, *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *glomeratus* Hassl., *Chodanthus splendens* (Bureau & K. Schum.) Hassl. var. *grandiflora* (Hassl.) Hassl., *Clytostoma punctatum* Bureau ex Glaz., *Cydista difficilis* Miers, *Cydista preaepensa* Miers, *Mansoa acuminatissima* Bureau & K. Schum., *Mansoa laevis* DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fabris, H. A., 1965c; Hassler, E., 1898; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Stutz, L. C., 1983.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2710* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 40565* (CTES, MBM)]; PRY[*Mereles, F. 8159* (CTES, FCQ)].

Mansoa laevis DC. = **Mansoa difficilis** (Cham.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Mansoa schwackei Bureau & K. Schum. = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Mansoa truncata Sprague = **Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann
Referencias: Sandwith, N. Y., 1968.

Mansoa truncata Sprague var. *parviflora* (Hassl.) Sandwith = **Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann
Referencias: Sandwith, N. Y., 1968.

Melloa duseniana Kraenzl. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Melloa fraxinifolia (Kunth) K. Schum. ex Schnee = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Melloa populifolia (DC.) Britton = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Melloa populifolia (DC.) Bureau ex Benth. & Hook. f. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Melloa quadrivalvis (Jacq.) A.H. Gentry = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Memora cuspidata Hassl. = **Adenocalymma peregrinum** (Miers) L.G. Lohmann

Memora cuspidata Hassl. f. *cirrhifera* Hassl. = **Adenocalymma peregrinum** (Miers) L.G. Lohmann

Memora cuspidata Hassl. f. *parvifoliolata* Hassl. = **Adenocalymma peregrinum** (Miers) L.G. Lohmann

Memora lenta (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Memora peregrina (Miers) Sandwith = **Adenocalymma peregrinum** (Miers) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Memora perianthomega (Vell.) Miers = **Perianthomega vellozoi** Bureau
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Microbignonia auristellae Kraenzl. = **Dolichandra unguis-cati** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Mussatia venezuelensis Bureau = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Nevesarmondia cordifolia (Mart.) K. Schum. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Nouletia pterocarpa (Cham.) Pichon = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Oxymitus argylioides C. Presl = **Argylia radiata** (L.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, M., 1969; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Pachyptera dasyantha DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Pachyptera puberula DC. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pachyptera umbelliformis DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Panterpa dichotoma (Jacq.) Miers = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Panterpa leucopogon (Cham.) Miers = **Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Parabignonia chodatii (Hassl.) A.H. Gentry = **Dolichandra chodatii** (Hassl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Parabignonia maximilianii (Mart. ex DC.) Bureau ex K. Schum. = **Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Parabignonia unguiculata (Vell.) A.H. Gentry = **Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Paracarpea pulchella (Cham.) Pichon = **Fridericia pulchella** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Paradolichandra chodatii Hassl. = **Dolichandra chodatii** (Hassl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Paradolichandra chodatii Hassl. var. *brachycalyx* Hassl. = **Dolichandra chodatii** (Hassl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Paragonia pyramidata (Rich.) Bureau = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Paragonia pyramidata (Rich.) Bureau var. *elliptica* Bureau = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Paragonia pyramidata (Rich.) Bureau var. *tomentosa* Bureau & K. Schum. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Perianthomega Bureau ex Baill.

Número de especies: 1

Perianthomega vellozoi Bureau
Sin.: *Bignonia perianthomega* Vell., *Memora perianthomega* (Vell.) Miers, *Stizophyllum triternatum* J.C. Gomes
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(APY, CEN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 4148* (C, CTES, LP)].

Petastoma corymbiferum (Vahl) Miers = **Lundia corymbifera** (Vahl) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Petastoma crenatum Miers = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma glabrum Miers = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma laurifolium Kraenzl. = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Petastoma leiophyllum Kraenzl. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Petastoma leucopogon (Cham.) Bureau = **Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma leucopogon (Cham.) Bureau var. *glabra* K. Schum. = **Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma macrocalyx Kraenzl. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma multiglandulosa Kraenzl. = **Bignonia binata** Thunb.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Petastoma obliqum (Kunth) Miers = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma phaseoloides (Cham.) Miers = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma physaloides (Cham.) Miers = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma pubescens (L.) Miers = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma puniceum (Mart.) Miers = **Fridericia leucopogon** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma samydoides (Cham.) Miers = **Fridericia samydoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma simplicifolia Miers = **Fridericia platyphylla** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma triplinervia (Mart. ex DC.) Miers = **Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma truncatum (Sprague) Hassl. = **Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma truncatum (Sprague) Hassl. var. *grandiflorum* Hassl. = **Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Petastoma truncatum (Sprague) Hassl. var. *parviflorum* Hassl. = **Fridericia truncata** (Sprague) L.G. Lohmann
Referencias: Sandwith, N. Y., 1968.

Petastoma urceolare Kraenzl. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Petastoma whitei (Rusby) Sandwith = **Fridericia whitei** (Rusby) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Phryganocydia corymbosa (Vent.) Bureau = **Bignonia corymbosa** (Vent.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Phryganocydia pisoniana Mart. ex DC., nom. nud. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Piriadacus hibiscifolius (Cham.) Pichon = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium aubletii Splitg. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium botryoides (Cham.) DC. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium callistegioides (Cham.) Niederl. = **Bignonia callistegioides** Cham.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium catharinae DC. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium clematideum (Griseb.) Griseb. = **Amphilophium cynanchoides** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium cordifolia DC., nom. inval. = **Amphilophium falcatum** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium cordifolium Mart. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H. Gentry = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium cynanchoides DC. = **Amphilophium cynanchoides** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium cynanchoides DC. var. *pellucidum* Hassl. = **Amphilophium cynanchoides** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium dolichoides (Cham.) Bureau & K. Schum. = **Amphilophium dolichoides** (Cham.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Baill. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Baill. f. *grandiflora* Hassl. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Baill. var. *intermedium* Hassl. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Baill. var. *tomentosum* Hassl. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium echinatum (Jacq.) Baill. var. *typicum* Sprague, nom. inval. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium elongatum (Vahl) Klotzsch = **Amphilophium elongatum** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium glaucum Rusby = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium glaziovii Bureau & K. Schum.
= **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium hatschbachii A.H. Gentry
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium hexagonum DC. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium hexagonum DC. var. *brasilianum* DC.
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium lundii DC. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium muricatum Moç. ex DC.
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium obovatum Mart. ex DC.
= **Amphilophium elongatum** (Vahl) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium phaseoloides (Cham.) Schenck
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium reticulare DC. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium squalus (Vell.) DC. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium tribachiatum Loes. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium vitalba DC. = **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium vitalba DC. f. *glabratum* Hassl.
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium vitalba DC. f. *intermedium* Hassl.
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium vitalba DC. var. *extratropica* Cham.
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pithecoctenium vitalba DC. var. *rostratum* Hassl.
= **Amphilophium crucigerum** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pleonotoma peregrina Miers = **Adenocalymma peregrinum** (Miers) L.G. Lohmann
Referencias: Sandwith, N. Y., 1953.

Podranea Sprague

Número de especies: 1 introducida

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague
Sin.: *Tecoma ricasoliana* Tanfani
Arbusto o liana. Introducida. 700–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Brinker, J. 8097* (MO)].
Notas: Originaria de África, cultivada en Argentina, Paraguay y Brasil.

Pyrostegia C. Presl

Número de especies: 1

Pyrostegia amabilis Miers, nom. nud. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pyrostegia dichotoma Miers ex K. Schum. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Pyrostegia ignea (Vell.) C. Presl, nom. nud. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.

Pyrostegia pallida Miers, nom. nud. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.

Pyrostegia parviflora Miers, nom. nud. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Pyrostegia reticulata Miers, nom. nud. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Pyrostegia tecomiflora (Rusby) K. Schum. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Pyrostegia tubulosa (Klotzsch) Bureau & K. Schum.
= **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers
Sin.: *Bignonia ignea* Vell., *Bignonia tubulosa* Klotzsch, *Bignonia venusta* Ker Gawl., *Jacaranda echinata* Spreng., *Pyrostegia amabilis* Miers, nom. nud., *Pyrostegia dichotoma* Miers ex K. Schum., *Pyrostegia ignea* (Vell.) C. Presl, nom. nud., *Pyrostegia pallida* Miers, nom. nud., *Pyrostegia parviflora* Miers, nom. nud., *Pyrostegia reticulata* Miers, nom. nud., *Pyrostegia tecomiflora* (Rusby) K. Schum., *Pyrostegia tubulosa* (Klotzsch) Bureau & K. Schum., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *typica* Sprague, nom. inval., *Pyrostegia venusta* (Ker Gawl.) Miers var. *villosa* Hassl. ex Sprague, *Tecoma venusta* (Ker Gawl.) Lem., *Tynanthus igneus* (Vell.) Barb. Rodr.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 10571* (CTES, G, LP, SI)]; BRA[*Saito, Y. 23* (CTES)]; PRY[*Aguayo, A. 594* (CTES, FCQ)].

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers var. *typica* Sprague, nom. inval. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers var. *villosa* Hassl. ex Sprague = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.

Rojasiophyton tuberculatum Hassl. = **Xylophragma pratense** (Bureau & K. Schum.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saldanhaea confertiflora Bureau = **Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saldanhaea convoluta Corr. Méllo = **Cuspidaria convoluta** (Vell.) A.H. Gentry
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Saldanhaea lateriflora (Mart.) Bureau = **Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G., com. pers.

Saldanhaea lateriflora (Mart.) Bureau var. *elliptica* Bureau = **Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saldanhaea lateriflora (Mart.) Bureau var. *ovata* Bureau = **Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saldanhaea myriantha (Cham. ex Steud.) Bureau = **Xylophragma myrianthum** (Cham. ex Steud.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saldanhaea myriantha (Cham. ex Steud.) Bureau var. *pubescens* Bureau = **Xylophragma myrianthum** (Cham. ex Steud.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saldanhaea pratensis Bureau & K. Schum. = **Xylophragma pratense** (Bureau & K. Schum.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Saritaea triplinervia (Mart. ex DC.) Dugand = **Fridericia triplinervia** (Mart. ex DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Schizopsis chimonantha Bureau ex Baill. = **Tynanthus cognatus** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Schizopsis regnelliana Bureau ex Baill. = **Tynanthus elegans** Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Sparattosperma Mart. ex Meisn.

Número de especies: 1

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum.
Sin.: *Bignonia leucantha* Vell., *Bignonia leucoxylon* DC., nom. nud., *Bignonia subvernicosa* Cham., nom. nud., *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex DC., *Sparattosperma lithontripticum* Mart. ex DC. var. *subtomentosum* Bureau, *Sparattosperma stenocarpum* Bureau & K. Schum., *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum., *Sparattosperma vernicosum* (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *subtomentosa* Bureau, *Spathodea vernicosa* Cham., *Tecoma salzmanni* DC., *Tecoma subvernicosa* DC.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Gentry, A. H., 1992a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Árbol. Nativa. 100–400 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 2023* (BM, CTES, G, MO)].

Sparattosperma lithontripticum Mart. ex DC. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Sparattosperma lithontripticum Mart. ex DC. var. *subtomentosum* Bureau = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Sparattosperma neurocalyx Bureau & K. Schum. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Sparattosperma stenocarpum Bureau & K. Schum. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Sparattosperma vernicosum (Cham.) Bureau & K. Schum. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Sparattosperma vernicosum (Cham.) Bureau & K. Schum. var. *subtomentosa* Bureau = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Spathodea corymbosa Vent. = **Bignonia corymbosa** (Vent.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Spathodea dolichandra Steud. = **Dolichandra cynanchoides** Cham.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Spathodea fraxinifolia (Spreng.) Kunth = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Spathodea hispida DC. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Spathodea magnolioides Cham. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Spathodea mollis Sond. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Spathodea pisoniana DC. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Spathodea uncata (Andrews) Spreng. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Spathodea uncinata (G. Mey.) Spreng. = **Dolichandra uncata** (Andrews) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Spathodea vernicosa Cham. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Sphingiphila A.H. Gentry

Número de especies: 1

Sphingiphila tetramera A.H. Gentry
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbolito. Nativa. 100–200 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 2875* (FCQ)].

Stenolobium amoenum K. Schum. = **Tecoma tenuiflora** (DC.) Fabris
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium bifidum (Kaulf.) Fée = **Lindsaea bifida** (Kaulf.) Mett. ex Kuhn

Stenolobium caeruleum Benth. var. *glabrescens* Benth. = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Stenolobium caeruleum Benth. var. *sericeum* Benth. = **Calopogonium sericeum** (Benth.) Chodat & Hassl.

Stenolobium caeruleum Benth. var. *villosior* Benth. = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Stenolobium fulvum (Cav.) Sprague = **Tecoma fulva** (Cav.) D. Don
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium glabrum Benth. = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Stenolobium guarracha Hieron. ex Bureau & K. Schum., nom. nud. = **Tecoma garrocha** Hieron.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium incisum Rose & Standl. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium molle (Kunth) Seem. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium quinquejugum Loes. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium stans (L.) Seem. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a.

Stenolobium stans (L.) Seem. var. *apiifolium* (DC.) Seem. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium stans (L.) Seem. var. *multijugum* R.E. Fr. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium stans (L.) Seem. var. *pinnatum* Seem. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stenolobium tomentosum Benth. = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Stenolobium tronadora Loes. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Pirani, J. R., 1996.

Stizophyllum Miers

Número de especies: 1

Stizophyllum dentatum (DC.) Miers = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Stizophyllum denticulatum Miers = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stizophyllum glandulosum (Mart. ex DC.) Miers = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Pirani, J. R., 1996.

Stizophyllum longisiliquum Bureau ex Baill. = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Stizophyllum occidentale (Salzm. ex DC.) Miers = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers
Sin.: *Bignonia arrabidae* Steud., *Bignonia calycina* DC., *Bignonia dentata* DC., *Bignonia glandulosa* Mart. ex DC., nom. illeg., *Bignonia glandulosa* Mart., nom. illeg., *Bignonia longisiliqua* Vell., *Bignonia occidentalis* Salzm. ex DC., *Bignonia perforata* Cham., *Bignonia physaloides* Cham., *Bignonia punctata* DC., *Bignonia velutina* DC., *Petastoma physaloides* (Cham.) Miers, *Petastoma urceolare* Kraenzl., *Stizophyllum dentatum* (DC.) Miers, *Stizophyllum denticulatum* Miers, *Stizophyllum glandulosum* (Mart. ex DC.) Miers, *Stizophyllum longisiliquum* Bureau ex Baill., *Stizophyllum occidentale* (Salzm. ex DC.) Miers, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *dentatum* (Miers) Bureau, *Stizophyllum perforatum* (Cham.) Miers var. *physaloides* (Cham.) Bureau, *Stizophyllum velutinum* (DC.) Miers
Referencias: Gentry, A. H., 1982; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43605* (MBM, MO)].

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers var. *dentatum* (Miers) Bureau = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stizophyllum perforatum (Cham.) Miers var. *physaloides* (Cham.) Bureau = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stizophyllum triternatum J.C. Gomes = **Perianthomega vellozoi** Bureau
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Stizophyllum velutinum (DC.) Miers = **Stizophyllum perforatum** (Cham.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia Gomes ex DC.

Número de especies: 15, 1 endémica

Tabebuia alba (Cham.) Sandwith
Sin.: *Handroanthus albus* (Cham.) Mattos, *Tecoma alba* Cham.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Buchinger, M., 1960; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sandwith, N. Y., 1948; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Árbol. Nativa. 200–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2274* (CTES, SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1500* (SI)]; PRY[*Brunner, D. R. 1294* (MO)].

Tabebuia araliacea (Cham.) Morong & Britton = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia argentea (Bureau & K. Schum.) Britton = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Sin.: *Bignonia aurea* Silva Manso, *Bignonia squamellulosa* DC., nom. nud., *Handroanthus caraiba* (Mart.) Mattos, *Handroanthus leucophlaeos* (Mart. ex DC.) Mattos, *Tabebuia argentea* (Bureau & K. Schum.) Britton, *Tabebuia caraiba* (Mart.) Bureau, *Tabebuia suberosa* Rusby, *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum., *Tecoma argentea* Bureau & K. Schum. f. *parviflora* Hassl., *Tecoma aurea* (Silva Manso) DC., *Tecoma caraiba* Mart., *Tecoma caraiba* Mart. var. *grandiflora* Hassl., *Tecoma caraiba* Mart. var. *squamellulosa* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma leucophlaeos* Mart. ex DC., *Tecoma squamellulosa* DC., *Tecoma trichocalycina* DC.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Morales, J. M., 1995; Sprague, T. A., 1905.
Árbol. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(COS, FOR, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3068* (CTES, LIL, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3384* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 356* (SI)].

Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia avellanedae Lorentz ex Griseb. var. *paulensis* Toledo = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia caraiba (Mart.) Bureau = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC.
Sin.: *Bignonia cassinoides* Lam., *Bignonia obtusifolia* Lam., *Bignonia tabebuya* Vell., *Bignonia uliginosa* Gomes, *Catalpa cassinoides* (Lam.) Spreng., *Spathodea magnolioides* Cham., *Tabebuia magnolioides* (Cham.) Miers, *Tabebuia uliginosa* (Gomes) DC., *Tecoma uliginosa* Mart. ex DC.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21389* (MBM, MO)].

Tabebuia catarinensis A.H. Gentry
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto. Endémica. 700–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6490* (B, L, MBM)].

Tabebuia chapadensis S. Moore = **Fridericia dichotoma** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

[Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson]
Sin.: *Bignonia chrysantha* Jacq.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.
Sin.: *Gelseminum chrysotrichum* (Mart. ex DC.) Kuntze, *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos, *Handroanthus chrysotrichus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *obtusata* (DC.) Mattos, *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC., *Tecoma chrysotricha* Mart. ex DC. var. *obtusata* (DC.) Bureau & K. Schum., *Tecoma flavescens* Mart. ex DC., *Tecoma grandis* Kraenzl., *Tecoma obtusata* DC., *Tecoma ochracea* Cham. var. *denudata* Cham.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3541* (SI)].

Tabebuia citrifolia DC. = **Anemopaegma chamberlaynii** (Sims) Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Tabebuia dugandii Standl. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia eximia (Miq.) Sandwith = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo
Sin.: *Bignonia heptaphylla* Vell., *Handroanthus avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos var. *paullensis* (Toledo) Mattos, *Handroanthus eximus* (Miq.) Mattos, *Handroanthus heptaphyllus* Mattos, *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos var. *lepidotus* (Bureau) Mattos, *Tabebuia avellanedae* Lorentz ex Griseb. var. *paulensis* Toledo, *Tabebuia eximia* (Miq.) Sandwith, *Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl. var. *lepidota* (Bureau) Toledo, *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl., *Tecoma curialis* Saldanha, *Tecoma eximia* Miq., *Tecoma impetiginosa* Mart. ex DC. var. *lepidota* Bureau, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *glabra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *grandiflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *parviflora* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *desinens* Sprague
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Hassler, E., 1898; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 31081* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 48815* (MBM, S, US)]; PRY[*Mereles, F. 8125* (CTES, FCQ)]; URY[*Lombardo, A. 3107* (MVJB)].

Tabebuia heteropoda (DC.) Sandwith = **Tabebuia ochracea** (Cham.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.
Sin.: *Gelseminum avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Kuntze, *Handroanthus avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Mattos, *Handroanthus impetiginosus* (Mart. ex DC.) Mattos, *Tabebuia avellanedae* Lorentz ex Griseb., *Tabebuia dugandii* Standl., *Tabebuia ipe* (Mart. ex K. Schum.) Standl. var. *integra* (Sprague) Sandwith, *Tabebuia nicaraguensis* S.F. Blake, *Tabebuia palmeri* Rose, *Tabebuia schunkevigoi* D.R. Simpson, *Tecoma adenophylla* Bureau & K. Schum., *Tecoma avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Speg., *Tecoma avellanedae* (Lorentz ex Griseb.) Speg. var. *alba* Lillo, *Tecoma*

impetiginosa Mart. ex DC., *Tecoma integra* (Sprague) Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *lepidota* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. f. *leucotricha* Hassl., *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integra* Sprague, *Tecoma ipe* Mart. ex K. Schum. var. *integrifolia* Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1992a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Sprague, T. A., 1905.
Árbol. Nativa. 200–1400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1101* (BA, BAA, BAF, CTES, LIL, LP, SI)]; PRY[*González, F. 958* (CTES, FCQ)].

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. var. *lepidota* (Bureau) Toledo = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

[Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith]
Referencias: Angely, J. A., 1965; Gentry, A. H., 1992a.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tabebuia ipe (Mart. ex K. Schum.) Standl. = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia ipe (Mart. ex K. Schum.) Standl. var. *integra* (Sprague) Sandwith = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia lapacho (K. Schum.) Sandwith
Sin.: *Tecoma lapacho* K. Schum.
Referencias: Buchinger, M., 1960; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y., 1948.
Árbol. Nativa. 700–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 4497* (CTES, LIL, MO)].

Tabebuia magnolioides (Cham.) Miers = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia monticola Pittier = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia nicaraguensis S.F. Blake = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.
Sin.: *Bignonia morongii* Britton, *Tabebuia nodosa* (Griseb.) Griseb. var. *parviflora* Griseb., *Tecoma nodosa* Griseb.
Referencias: Buchinger, M., 1960; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1992a; Grisebach, A. H. R., 1879; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Schulz, A. G., 1939.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, AMA, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1404* (BA, LIL, LP, SI)]; PRY[*Degen, R. 3004* (CTES, FCQ)].

Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb. var. *parviflora* Griseb. = **Tabebuia nodosa** (Griseb.) Griseb.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl.
Sin.: *Tabebuia heteropoda* (DC.) Sandwith, *Tabebuia ochracea* (Cham.) Standl. subsp. *heteropoda* (DC.) A.H. Gentry, *Tecoma hassleri* Sprague, *Tecoma heteropoda* DC., *Tecoma ochracea* Cham.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Gentry, A. H., 1992a; Hassler, E., 1898; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Árbol. Nativa. 100–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5188* (BAB, LIL, LP, MO, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 383a* (MO)]; PRY[*Hassler, E. 348* (CTES, SI)].

Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. subsp. *heteropoda* (DC.) A.H. Gentry = **Tabebuia ochracea** (Cham.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia odontodiscus (Bureau & K. Schum.) Toledo = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia palmeri Rose = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia papyrophloios (Bureau & K. Schum.) Melch. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia pisoniana (DC.) Miers = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Tabebuia piutinga (Pilg.) Sandwith = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia pulcherrima Sandwith
Sin.: *Handroanthus pulcherrimus* (Sandwith) Mattos, *Tecoma petropolitana* Glaz.
Referencias: Buchinger, M., 1960; Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sandwith, N. Y., 1948; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Árbol. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, ITA, MIE, ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 7485* (CORD, LP)]; BRA[*Krapovickas, A. 36962* (BAB, CTES, LIL, MBM, WIS)]; PRY[*De Egea, J. 64* (CTES, FCQ, MO)].

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith
Sin.: *Bignonia roseo-alba* Ridl., *Handroanthus odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus piutinga* (Pilg.) Mattos, *Handroanthus roseo-albus* (Ridl.) Mattos, *Sparattosperma neurocalyx* Bureau & K. Schum., *Tabebuia odontodiscus* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tabebuia papyrophloios* (Bureau & K. Schum.) Melch., *Tabebuia piutinga* (Pilg.) Sandwith, *Tecoma mattogrossensis* Kraenzl., *Tecoma odontodiscus* Bureau & K. Schum. var. *paraguariensis* Hassl., *Tecoma papyrophloios* Bureau & K. Schum., *Tecoma schumanni* Kraenzl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Árbol. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 35973* (AS, CESJ, CTES, G, HUEFS, MA, MBM, SPF)].

Tabebuia sanguinea DC. = **Fridericia speciosa** Mart.
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Tabebuia schunkevigoi D.R. Simpson = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson
Sin.: *Bignonia araliacea* Cham., *Bignonia conspicua* Rich. ex DC., nom. nud., *Bignonia flavescens* Vell., *Bignonia patrisiana* DC., nom. nud., *Bignonia serratifolia* Vahl, *Gelseminum araliaceum* (Cham.) Kuntze, *Handroanthus araliaceus* (Cham.) Mattos, *Handroanthus atractocarpus* (Bureau & K. Schum.) Mattos, *Handroanthus flavescens* (Vell.) Mattos, *Tabebuia araliacea* (Cham.) Morong & Britton, *Tabebuia monticola* Pittier, *Tecoma araliacea* (Cham.) DC., *Tecoma atractocarpa* Bureau & K. Schum., *Tecoma conspicua* DC., *Tecoma nigricans* Klotzsch, nom. nud., *Tecoma patrisiana* DC., *Tecoma serratifolia* (Vahl) G. Don, *Tecoma speciosa* DC. ex Mart.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Árbol. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40499* (MBM, MO)].

Tabebuia suberosa Rusby = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia uliginosa (Gomes) DC. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia umbellata (Sond.) Sandwith
Sin.: *Handroanthus umbellatus* (Sond.) Mattos, *Tabebuia umbellata* (Sond.) Sandwith var. *lanceolata* (Bureau & K. Schum.) Toledo, *Tecoma umbellata* Sond., *Tecoma umbellata* Sond. var. *lanceolata* Bureau & K. Schum.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Árbol. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 37035* (C, M, MBM, MO)].

Tabebuia umbellata (Sond.) Sandwith var. *lanceolata* (Bureau & K. Schum.) Toledo = **Tabebuia umbellata** (Sond.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tabebuia vellosoi J.M. Toledo & Barboza
Sin.: *Bignonia longiflora* Vell., *Handroanthus longiflorus* (Vell.) Mattos, *Handroanthus vellosoi* (Toledo) Mattos, *Tecoma alba* Cham. var. *subdenudata* Bureau, *Tecoma longiflora* (Vell.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o árbol. Nativa. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15440* (F, MO, NY)].

Tanaecium Sw.

Número de especies: 3

Tanaecium brasiliense Miers = **Tanaecium cyrtanthum** (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., com. pers.

Tanaecium cyrtanthum (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum.
Sin.: *Tanaecium brasiliense* Miers, *Tecoma cyrtantha* Mart. ex DC.
Referencias: Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Arbusto. Nativa. 100–1000 m.
Países: ARG(SAL); PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 12827* (K, LIL)]; PRY[*Rojas, T. 2209* (CTES, SI)].

Tanaecium pyramidatum (Rich.) L.G. Lohmann
Sin.: *Adenocalymma densiflora* Rusby, *Arrabidaea dichasia* J.D. Sm., *Bignonia brachiata* Sessé & Moç., *Bignonia dasyantha* DC., *Bignonia ehretioides* Cham., *Bignonia laurifolia* Vahl, *Bignonia lenta* Mart. ex DC., *Bignonia martiusiana* DC., *Bignonia pyramidata* Rich., *Bignonia rupestris* Gardner, *Bignonia sinclairii* Benth., *Bignonia striata* DC., *Memora lenta* (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum., *Mussatia venezuelensis* Bureau, *Pachygenium perrottetii* DC., *Pachyptera dasyantha* DC., *Pachyptera umbelliformis* DC., *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau, *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *elliptica* Bureau, *Paragonia pyramidata* (Rich.) Bureau var. *tomentosa* Bureau & K. Schum., *Petastoma leiophyllum* Kraenzl., *Petastoma macrocalyx* Kraenzl., *Pithecoctenium reticulare* DC., *Zeyheria surinamensis* Miq.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Hauk, W. D., 1998; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2343* (CTES, MO, P)]; PRY[*Hassler, E. 8418* (G)]; URY[*Tweedie, J. 1347* (P)].

Tanaecium selloi (Spreng.) L.G. Lohmann
Sin.: *Arrabidaea dichotoma* (Vell.) Bureau, *Arrabidaea selloi* (Spreng.) Sandwith, *Bignonia coriacea* Sellow ex Steud., *Bignonia dichotoma* Vell., hom. illeg., *Bignonia selloi* Spreng.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Bureau, L. E. & Schumann, K. M., 1896–1897; Fabris, H. A., 1965c, 1979a, 1993; Grisebach, A. H. R., 1879; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974; Sandwith, N. Y., 1953; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Liana. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21159* (CTES, LP, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 37894* (CTES, MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 9310* (CTES, MO, PY)]; URY[*Berro, M. B. 1517* (LP)].

Tecoma Juss.

Número de especies: 5, 1 introducida

Tecoma adenophylla Bureau & K. Schum. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma alba Cham. = **Tabebuia alba** (Cham.) Sandwith
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma alba Cham. var. *subdenudata* Bureau = **Tabebuia vellosoi** J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma araliacea (Cham.) DC. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma argentea Bureau & K. Schum. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma argentea Bureau & K. Schum. f. *parviflora* Hassl. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma atractocarpa Bureau & K. Schum. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma aurea (Silva Manso) DC. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Speg. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma avellanedae (Lorentz ex Griseb.) Speg. var. *alba* Lillo = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl.
Sin.: *Bignonia capensis* Thunb., *Ducoudraea capensis* Bureau, *Tecoma petersii* Klotzsch, *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Tecomaria krebsii* Klotzsch, *Tecomaria petersii* Klotzsch
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 556* (SI)].
Notas: Cultivada en Argentina, Paraguay y Brasil.

Tecoma caraiba Mart. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma caraiba Mart. var. *grandiflora* Hassl. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma caraiba Mart. var. *squamellulosa* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma chrysotricha Mart. ex DC. = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma chrysotricha Mart. ex DC. var. *obtusata* (DC.) Bureau & K. Schum. = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma conspicua DC. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma curialis Saldanha = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma cyrtantha Mart. ex DC. = **Tanaecium cyrtanthum** (Mart. ex DC.) Bureau & K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c.

Tecoma eximia Miq. = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma fabrisii T. Mey. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma flavescens Mart. ex DC. = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma fulva (Cav.) D. Don
Sin.: *Bignonia fulva* Cav., *Bignonia meyeniana* Schauer, *Stenolobium fulvum* (Cav.) Sprague, *Tecomaria fulvum* (Cav.) Seem.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto. Nativa. 200–2300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 9470* (MO)].

Tecoma garrocha Hieron.
Sin.: *Gelseminum garrocha* (Hieron.) Kuntze, *Gelseminum garrocha* (Hieron.) Kuntze var. *bicolor* Kuntze, *Stenolobium guarracha* Hieron. ex Bureau & K. Schum., nom. nud.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1992a; Hieronymus, G. H. E. W., 1882; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o arbolito. Nativa. 400–2900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 17509* (CTES, LL, MBM, MO, P, WIS)].

Tecoma grandis Kraenzl. = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma hassleri Sprague = **Tabebuia ochracea** (Cham.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma heteropoda DC. = **Tabebuia ochracea** (Cham.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma impetiginosa Mart. ex DC. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma impetiginosa Mart. ex DC. var. *lepidota* Bureau = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma incisa (Rose & Standl.) I.M. Johnst. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma integra (Sprague) Hassl. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. f. *glabra* Sprague = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. f. *grandiflora* Sprague = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. f. *lepidota* Sprague = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. f. *leucotricha* Hassl. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. f. *parviflora* Sprague = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. var. *desinens* Sprague = **Tabebuia heptaphylla** (Vell.) Toledo
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. var. *integra* Sprague = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma ipe Mart. ex K. Schum. var. *integrifolia* Hassl. = **Tabebuia impetiginosa** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma lapacho K. Schum. = **Tabebuia lapacho** (K. Schum.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma lateriflora Mart. = **Cuspidaria lateriflora** (Mart.) DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1982.

Tecoma leucophlaeos Mart. ex DC. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma longiflora (Vell.) Bureau & K. Schum. = **Tabebuia vellosoi** J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma mattogrossensis Kraenzl. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma maximilianii Mart. ex DC. = **Dolichandra unguiculata** (Vell.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Tecoma mollis Kunth = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma myriantha DC., nom. nud. = **Xylophragma myrianthum** (Cham. ex Steud.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Tecoma nigricans Klotzsch, nom. nud. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma nodosa Griseb. = **Tabebuia nodosa** (Griseb.) Griseb.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma obtusata DC. = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ochracea Cham. = **Tabebuia ochracea** (Cham.) Standl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma ochracea Cham. var. *denudata* Cham. = **Tabebuia chrysotricha** (Mart. ex DC.) Standl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma odontodiscus Bureau & K. Schum. var. *paraguariensis* Hassl. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma papyrophloios Bureau & K. Schum. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma patrisiana DC. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma petersii Klotzsch = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma petropolitana Glaz. = **Tabebuia pulcherrima** Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma pisoniana (DC.) DC. ex Bureau & K. Schum. = **Dolichandra quadrivalvis** (Jacq.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Tecoma pratensis Bureau & K. Schum. = **Xylophragma pratense** (Bureau & K. Schum.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma ricasoliana Tanfani = **Podranea ricasoliana** (Tanfani) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma salzmanni DC. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma schumanni Kraenzl. = **Tabebuia roseo-alba** (Ridl.) Sandwith
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma serratifolia (Vahl) G. Don = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma sorbifolia Kunth = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma speciosa DC. ex Mart. = **Tabebuia serratifolia** (Vahl) G. Nicholson
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma squamellulosa DC. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Sin.: *Bignonia frutescens* Mill., *Bignonia incisa* DC., nom. nud., *Bignonia sorbifolia* Salisb., *Bignonia stans* L., *Bignonia tecoma* Wehmer, *Bignonia tecomiflora* Rusby, *Bignonia tecomoides* DC., *Gelseminum molle* (Kunth) Kuntze, *Gelseminum stans* (L.) Kuntze, *Stenolobium incisum* Rose & Standl., *Stenolobium molle* (Kunth) Seem., *Stenolobium quinquejugum* Loes., *Stenolobium stans* (L.) Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *apiifolium* (DC.) Seem., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *multijugum* R.E. Fr., *Stenolobium stans* (L.) Seem. var. *pinnatum* Seem., *Stenolobium tronadora* Loes., *Tecoma fabrisii* T. Mey., *Tecoma incisa* (Rose & Standl.) I.M. Johnst., *Tecoma mollis* Kunth, *Tecoma sorbifolia* Kunth, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *angustatum* Rehder, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *apilifolia* DC., *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *mollis* (Kunth) Siddiqi, *Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth var. *velutina* DC., *Tecoma tronadora* (Loes.) I.M. Johnst., *Tecoma velutina* Lindl.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1979a; García, R. C., 1992; Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Schneider, E. P. M. & Londero, I. W. B., 1965.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CAT, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 19592* (BAA, CTES, F, G, IAC, LL, MBM, MO, P, UC, WIS)]; BRA[*Sehnem, A. 1482* (SI)]; PRY[*Bordas, E. 4054* (CTES)].

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. *angustatum* Rehder = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. *apilifolia* DC. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. *mollis* (Kunth) Siddiqi = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth var. *velutina* DC. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma subvernicosa DC. = **Sparattosperma leucanthum** (Vell.) K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma tenuiflora (DC.) Fabris
Sin.: *Bignonia tenuiflora* DC., *Gelseminum amoenum* Kuntze, *Stenolobium amoenum* K. Schum.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c, 1993; Gentry, A. H., 1992a.
Arbusto. Nativa. 1400–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23988* (CTES, LP)].

Tecoma trichocalycina DC. = **Tabebuia aurea** (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma tronadora (Loes.) I.M. Johnst. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma uliginosa Mart. ex DC. = **Tabebuia cassinoides** (Lam.) DC.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma umbellata Sond. = **Tabebuia umbellata** (Sond.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma umbellata Sond. var. *lanceolata* Bureau & K. Schum. = **Tabebuia umbellata** (Sond.) Sandwith
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma uspallatensis Mart. ex DC. = **Argylia uspallatensis** DC.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Gleisner, G. & Ricardi, S. M., 1969.

Tecoma valdiviana Phil. = **Campsidium valdivianum** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1992a.

Tecoma velutina Lindl. = **Tecoma stans** (L.) Juss. ex Kunth
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecoma venusta (Ker Gawl.) Lem. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecomaria capensis (Thunb.) Spach = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecomaria fulvum (Cav.) Seem. = **Tecoma fulva** (Cav.) D. Don
Referencias: Gentry, A. H., 1992a.

Tecomaria krebsii Klotzsch = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tecomaria petersii Klotzsch = **Tecoma capensis** (Thunb.) Lindl.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Temnocydia carajuda Mart. ex DC. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Tourrettia Foug., nom. cons.

Número de especies: 1

Tourrettia lappacea (L'Hér.) Willd.
Sin.: *Dombeya lappacea* L'Hér., *Tourrettia volubilis* J.F. Gmel., nom. illeg.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1980; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–2800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Garibaldi, J. 144* (CTES)].

Tourrettia volubilis J.F. Gmel., nom. illeg. = **Tourrettia lappacea** (L'Hér.) Willd.
Referencias: Fabris, H. A., 1965c; Gentry, A. H., 1980.

Tynanthus Miers ex K. Schum.

Número de especies: 3

Tynanthus cognatus (Cham.) Miers
Sin.: *Bignonia cognata* Cham., *Schizopsis chimonantha* Bureau ex Baill.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 48829* (MBM, MO)].

Tynanthus elegans Miers
Sin.: *Bignonia elegans* Cham., hom. illeg., *Schizopsis regnelliana* Bureau ex Baill.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.; Sandwith, N. Y. & Hunt, D. R., 1974.
Liana. Nativa. 300–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 33671* (CTES, MBM)].

Tynanthus igneus (Vell.) Barb. Rodr. = **Pyrostegia venusta** (Ker Gawl.) Miers
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Tynanthus micranthus Corr. Méllo ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Rivera, G. L., 1997.
Liana. Nativa. 100–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3487* (CORD, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 22593* (CTES, MBM)]; PRY[*Schinini, A. 31364* (ASU, CTES, G, MA, MBM, MO)].

Urbaniella duseniana (Kraenzl.) Dusén ex Melch. = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Urbanolophium dusenianum (Kraenzl.) Melch. = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Urbanolophium glaziovii (Bureau & K. Schum.) Melch. = **Amphilophium glaziovii** Bureau ex K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Vasconcellia acutiflora Mart. ex DC. = **Fridericia chica** (Bonpl.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Vasconcellia desertorum Mart. ex DC. = **Fridericia pubescens** (L.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G., com. pers.

Vasconcellia florida Bureau ex DC. = **Fridericia florida** (DC.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Xylophragma Sprague

Número de especies: 2

Xylophragma myrianthum (Cham. ex Steud.) Sprague
Sin.: *Bignonia myriantha* Cham. Ex Steud., *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau, *Saldanhaea myriantha* (Cham. ex Steud.) Bureau var. *pubescens* Bureau, *Tecoma myriantha* DC., nom. nud., *Xylophragma myrianthum* (Cham. ex Steud.) Sprague var. *magnolifolium* J.C. Gomes
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., 2003, com. pers.
Liana. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sampaio, A. B. 847* (MO)].

Xylophragma myrianthum (Cham. ex Steud.) Sprague var. *magnolifolium* J.C. Gomes = **Xylophragma myrianthum** (Cham. ex Steud.) Sprague
Referencias: Lohmann, L. G., 2003, com. pers.

Xylophragma pratense (Bureau & K. Schum.) Sprague
Sin.: *Bignonia pratensis* Poepp. ex Bureau & K. Schum., *Rojasiophyton tuberculatum* Hassl., *Saldanhaea pratensis* Bureau & K. Schum., *Tecoma pratensis* Bureau & K. Schum.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006; Lohmann, L. G., com. pers.
Liana. Nativa. 600–700 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22187* (MBM, MO)]; PRY[*Hassler, E. 10594* (C, G, MICH, MO, NY, RB, S, SI, US)].

Zeyheria Mart.

Número de especies: 2

Zeyheria digitalis (Vell.) Hoehne & Kuhlm. = **Zeyheria montana** Mart.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Zeyheria kuntzei K. Schum. = **Zeyheria tuberculosa** (Vell.) Bureau
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Zeyheria montana Mart.
Sin.: *Bignonia digitalis* Vell., *Jacaranda quinquefolia* Steud. ex DC., *Zeyheria digitalis* (Vell.) Hoehne & Kuhlm., *Zeyheria velloziana* Miers
Referencias: Gentry, A. H., 1992a; Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10086* (SI)].

Zeyheria surinamensis Miq. = **Tanaecium pyramidatum** (Rich.) L.G. Lohmann
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau
Sin.: *Bignonia tuberculosa* Vell., *Jacaranda tuberculosa* Steud., *Zeyheria kuntzei* K. Schum.
Referencias: González Parini, F., Pérez, L. & Mereles, F., 2004.
Árbol. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 50957* (MO)]; PRY[*Mereles, F. 9024* (CTES, FCQ, MO, PY)].

Zeyheria velloziana Miers = **Zeyheria montana** Mart.
Referencias: Lohmann, L. G. & Ulloa Ulloa, C., 2006.

BIXACEAE

1 género, 1 especie.

Bixa L.

Número de especies: 1

Bixa americana Poir., nom. illeg. = **Bixa orellana** L.
Referencias: Mereles, F., 1989b.

Bixa orellana L.
Sin.: *Bixa americana* Poir., nom. illeg., *Bixa urucurana* Willd.
Referencias: Legname, R., 1982; Mereles, F., 1989b; Reitz, P. R., 1984b; Robyns, A. G. M. W. A., 1967; Roca de Saldías, Y., 1993a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 10765* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1572* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 2950* (G, NY)].
Notas: Cultivada en los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina, Brasil.

Bixa urucurana Willd. = **Bixa orellana** L.
Referencias: Mereles, F., 1989a.

Myrtophyllum chilense Turcz. = **Azara microphylla** Hook. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1977.

BOMBACACEAE

5 géneros, 12 especies.

Bombax aculeatum Vell. = **Ceiba speciosa** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1998a.

Bombax album (Lodd.) Bakh. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax argentinum R.E. Fr. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984; Meyer, T., 1968; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax campestre auct. non (Mart. & Zucc.) K. Schum. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax crenulatum K. Schum. = **Eriotheca gracilipes** (K. Schum.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Bombax crenulatum K. Schum. var. *lobata* Hassl. = **Eriotheca gracilipes** (K. Schum.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Bombax crenulatum K. Schum. var. *subintegra* Hassl. = **Eriotheca gracilipes** (K. Schum.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Bombax cyathophorum (Casar.) K. Schum. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax cyathophorum (Casar.) K. Schum. var. *latifoliatum* Hassl. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax cyathophorum (Casar.) K. Schum. var. *longipes* Hassl. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax endecaphyllum auct. non Vell. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax gracilipes K. Schum. = **Eriotheca gracilipes** (K. Schum.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Bombax grandiflorum Cav. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax longiflorum (Mart. & Zucc.) K. Schum. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax longiflorum (Mart. & Zucc.) K. Schum. f. *elegans* (R.E. Fr.) Hassl. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax longiflorum (Mart. & Zucc.) K. Schum. f. *multifoliatum* Hassk. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Santos, E., 1967.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. = **Pseudobombax marginatum** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *apaënse* Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *argentinum* (R.E. Fr.) Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984; Meyer, T., 1968; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *paraguayense* (R.E. Fr.) Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *rupestre* Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var. *cuspidatum* Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var. *intermedium* Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *fiebrigii* Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. subsp. *genuinum* Hassl., nom. inval. = **Pseudobombax marginatum** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax martianum K. Schum. = **Pseudobombax tomentosum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax martianum K. Schum. subsp. *guaraniticum* Hassl. = **Pseudobombax tomentosum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax paraguayense R.E. Fr. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984; Meyer, T., 1968; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Bombax roseorum Cuatrec. = **Tartagalia roseorum** (Cuatrec.) T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1968.

Carolinea alba Lodd. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Carolinea longiflora Mart. & Zucc. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984; Robyns, A. G. M. W. A., 1963; Santos, E., 1967.

Carolinea tomentosa Mart. & Zucc. = **Pseudobombax tomentosum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Ceiba Mill.

Número de especies: 3

Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna
Sin.: *Chorisia chodatii* Hassl., *Chorisia insignis* auct. non Kunth, *Chorisia insignis* Kunth var. *chodatii* (Hassl.) Hassl.
Referencias: Gibbs, P. E. & Semir, J., 2003; Ravenna, P. F., 1998a.
Árbol. Nativa. 400–1200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, CEN, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3071* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1883* (SI)].

[Ceiba crispiflora (Kunth) Ravenna]
Sin.: *Chorisia crispiflora* Kunth
Referencias: Gibbs, P. E. & Semir, J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ceiba fiebrigii Hochr. = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Referencias: Bernardi, L., 1984.

[Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir]
Sin.: *Chorisia insignis* Kunth
Referencias: Gibbs, P. E. & Semir, J., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *coetanea* Hassl. = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *praecox* Hassl. = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *transiens* Hassl. = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **glabriflora** Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **glabriflora** Hassl.
Sin.: *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *transiens* Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3004* (G)].

Ceiba pubiflora (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Sin.: *Ceiba fiebrigii* Hochr., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *coetanea* Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. f. *praecox* Hassl., *Ceiba pubiflora* (A. St.-Hil.) K. Schum. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Chorisia pubiflora* (A. St.-Hil.) G. Dawson, *Eriodendron pubiflorum* A. St.-Hil.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Gibbs, P. E. & Semir, J., 2003.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 729* (BAB, MO, NY)]; BRA[*Hatschbach, G. 46574* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 3* (SI), *Hassler, E. 134* (SI), *Zardini, E. M. 4531* (FCQ, MO)].

Ceiba rivierii (Decne.) K. Schum. = **Spirotheca rivierii** (Decne.) Ulbr.
Referencias: Santos, E., 1967.

Ceiba speciosa (A. St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna
Sin.: *Bombax aculeatum* Vell., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. var. *paraguayensis* Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ravenna, P. F., 1998a; Santos, E., 1967; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 852* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5034* (HBR, R), *Venturi, S. 852* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 481* (SI), *Stutz, L. C. 1602* (G)].

Chorisia chodatii Hassl. = **Ceiba chodatii** (Hassl.) Ravenna
Referencias: Gibbs, P. E. & Semir, J., 2003.

Chorisia crispiflora Kunth = **Ceiba crispiflora** (Kunth) Ravenna

Chorisia insignis auct. non Kunth = **Ceiba chodatii** (Hassl.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1998a.

Chorisia insignis Kunth = **Ceiba insignis** (Kunth) P.E. Gibbs & Semir

Chorisia insignis Kunth var. *chodatii* (Hassl.) Hassl. = **Ceiba chodatii** (Hassl.) Ravenna

Chorisia pubiflora (A. St.-Hil.) G. Dawson = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Chorisia speciosa A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. = **Ceiba speciosa** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Ravenna
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ravenna, P. F., 1998a.

Chorisia speciosa A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. var. *paraguayensis* Hassl. = **Ceiba speciosa** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Ravenna
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Eriodendron pubiflorum A. St.-Hil. = **Ceiba pubiflora** (A. St.-Hil.) K. Schum. var. **pubiflora**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Gibbs, P. E. & Semir, J., 2003.

Eriodendron rivierii Decne. = **Spirotheca rivierii** (Decne.) Ulbr.
Referencias: Santos, E., 1967.

Eriotheca Schott & Endl.

Número de especies: 1

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns
Sin.: *Bombax crenulatum* K. Schum., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *lobata* Hassl., *Bombax crenulatum* K. Schum. var. *subintegra* Hassl., *Bombax gracilipes* K. Schum., *Eriotheca hassleri* A. Robyns
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5181* (G)].

Eriotheca hassleri A. Robyns = **Eriotheca gracilipes** (K. Schum.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Eriotheca roseorum (Cuatrec.) A. Robyns = **Tartagalia roseorum** (Cuatrec.) T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1968.

Pachira commersonii Planch. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Pachira cyathophora Casar. = **Pseudobombax grandiflorum** (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Referencias: Santos, E., 1967.

Pachira longiflora (Mart. & Zucc.) Decne. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Santos, E., 1967.

Pachira macrantha A. St.-Hil. = **Pseudobombax longiflorum** (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Pachira marginata A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. = **Pseudobombax marginatum** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Pachira marginata A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f. *arborea* Chodat & Hassl. = **Pseudobombax argentinum** (R.E. Fr.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Pachira marginata A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f. *fruticosa* Chodat & Hassl., p.p. = **Pseudobombax marginatum** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.

Pachira rufescens A. St.-Hil. & Naudin = **Pseudobombax marginatum** (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Pseudobombax Dugand

Número de especies: 5

Pseudobombax argentinum (R.E. Fr.) A. Robyns
Sin.: *Bombax argentinum* R.E. Fr., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *apaënse* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *argentinum* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *paraguayense* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *rupestre* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. f. *fiebrigii* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var. *cuspidatum* Hassl., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. var. *intermedium* Hassl., *Bombax paraguayense* R.E. Fr., *Pachira marginata* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f. *arborea* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Meyer, T., 1968; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(AMA, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5155* (US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5244* (G), *Hassler, E. 155* (SI)].

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns var. **grandiflorum**
Sin.: *Bombax album* (Lodd.) Bakh., *Bombax campestre* auct. non (Mart. & Zucc.) K. Schum., *Bombax cyathophorum* (Casar.) K. Schum., *Bombax endecaphyllum* auct. non Vell., *Bombax grandiflorum* Cav., *Carolinea alba* Lodd., *Pachira commersonii* Planch., *Pachira cyathophora* Casar.
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963; Santos, E., 1967.
Árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8959* (HBR)].

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns var. **majus** A. Robyns
Referencias: Robyns, A. G. M. W. A., 1963.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 767a* (GH, MO)].

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Sin.: *Bombax cyathophorum* (Casar.) K. Schum. var. *latifoliatum* Hassl., *Bombax cyathophorum* (Casar.) K. Schum. var. *longipes* Hassl., *Bombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum., *Bombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum. f. *elegans* (R.E. Fr.) Hassl., *Bombax longiflorum* (Mart. & Zucc.) K. Schum. f. *multifoliatum* Hassk., *Carolinea longiflora* Mart. & Zucc., *Pachira longiflora* (Mart. & Zucc.) Decne., *Pachira macrantha* A. St.-Hil.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Robyns, A. G. M. W. A., 1963; Santos, E., 1967.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16512* (S, US)]; PRY[*Hassler, E. 10848* (G)].

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) A. Robyns
Sin.: *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum., *Bombax marginatum* (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) K. Schum. subsp. *genuinum* Hassl., nom. inval., *Pachira marginata* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess., *Pachira marginata* A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess. f. *fruticosa* Chodat & Hassl., p.p., *Pachira rufescens* A. St.-Hil. & Naudin
Referencias: Bernardi, L., 1984; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8237* (G)].

Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A. Robyns
Sin.: *Bombax martianum* K. Schum., *Bombax martianum* K. Schum. subsp. *guaraniticum* Hassl., *Carolinea tomentosa* Mart. & Zucc.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON, COA).

Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8699* (G)].

Spirotheca Ulbr.

Número de especies: 2

Spirotheca passifloroides Cuatrec.
Referencias: Santos, E., 1967.
Árbol. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 750* (SI), *Reitz, P. R. 8962* (HBR)].

Spirotheca rivierii (Decne.) Ulbr.
Sin.: *Ceiba rivierii* (Decne.) K. Schum., *Eriodendron rivierii* Decne., *Xylon rivierii* (Decne.) Kuntze
Referencias: Santos, E., 1967.
Árbol. Nativa. 500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6926* (HBR)].

Tartagalia Capurro

Número de especies: 1

Tartagalia roseorum (Cuatrec.) T. Mey.
Sin.: *Bombax roseorum* Cuatrec., *Eriotheca roseorum* (Cuatrec.) A. Robyns, *Tartagalia rubra* Capurro
Referencias: Meyer, T., 1968; Robyns, A. G. M. W. A., 1963.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Capurro, R. H. s.n.* (BAA), *Zuleta, G. s.n.* (SI)].

Tartagalia rubra Capurro = **Tartagalia roseorum** (Cuatrec.) T. Mey.
Referencias: Meyer, T., 1968.

Xylon rivierii (Decne.) Kuntze = **Spirotheca rivierii** (Decne.) Ulbr.
Referencias: Santos, E., 1967.

BORAGINACEAE

Autor: Miller, J. S. (*Cordia* y *Varronia*)

30 géneros, 207 especies, 107 especies endémicas, 25 especies introducidas.

Aldea circinata Willd. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Aldea pinnata Ruiz & Pav. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Allocarya alternifolia Brand = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Allocarya corymbosa (Ruiz & Pav.) Brand = **Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.

Allocarya germainii (Phil.) Reiche = **Plagiobothrys germainii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Allocarya humilis Brand, p.p. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Allocarya pedicellaris (Phil.) Reiche = **Plagiobothrys uliginosus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Allocarya procumbens (Colla) Greene = **Plagiobothrys procumbens** (Colla) A. Gray
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Allocarya sessiliflora Reiche = **Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1991a.

Allocarya sessilifolia Greene = **Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1991a.

Allocarya uliginosa (Phil.) Greene = **Plagiobothrys uliginosus** (Phil.) I.M. Johnst.

Amsinckia Lehm.

Número de especies: 2

Amsinckia angustifolia Lehm. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia angustifolia Lehm. var. *microcarpa* Speg. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia angustifolia Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia basistaminea Ces. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Brand, A., 1931; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia calycina (Moris) Chater
Sin.: *Amsinckia angustifolia* Lehm., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *microcarpa* Speg., *Amsinckia angustifolia* Lehm. var. *pseudolycopsioides* Clos, *Amsinckia basistaminea* Ces., *Amsinckia hispida* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Amsinckia hispida* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *microcarpa* (Speg.) Brand, *Amsinckia pseudolycopsicoides* Speg., *Cryptantha spegazzinii* I.M. Johnst., *Lithospermum calycinum* Moris,

Lithospermum chilense Colla, *Lithospermum hispidum* Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Brand, A., 1931; Chater, A. O., 1971; Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Nativa. 0–4500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32949* (SI), *Lagiglia, H.A. 449* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 878* (SI)].

Amsinckia hispida (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia hispida (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *microcarpa* (Speg.) Brand = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia patagonica Speg. = **Cryptantha patagonica** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Amsinckia pseudolycopsicoides Speg. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Amsinckia tessellata A. Gray
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. L. 3420* (BAB)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Anchusa L.

Número de especies: 1 introducida

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. = **Lycopsis arvensis** L.
Referencias: Selvi, F., Nardi, E. & Bigazzi, M., 1996.

Anchusa ciliata Cham. = **Moritzia ciliata** (Cham.) DC. ex Meisn.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Anchusa cruciata Cham. = **Antiphytum cruciatum** (Cham.) DC.

Anchusa officinalis L.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Seijo, G. J. 1373* (SI)].

Anchusa pygmaea Kunth = **Plagiobothrys pygmaeus** (Kunth) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Anchusa tetraquetra Cham. = **Thaumatocaryon tetraquetrum** (Cham.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1968.

Antiphytum DC. ex Meisn.

Número de especies: 1

Antiphytum cruciatum (Cham.) DC.
Sin.: *Anchusa cruciata* Cham.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: URY(CLA, MAL, RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 4975* (MVFA)].

Asperugo L.

Número de especies: 1 introducida

Asperugo procumbens L.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1968.
Hierba. Anual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12286* (BAA, BAB)].

Auxemma glazioviana Taub. = **Cordia glazioviana** (Taub.) Gottschling & J.S. Mill.

Borago L.

Número de especies: 1 introducida

Borago officinalis L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Johnston, I. M., 1927; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE); CHL(IX); URY(CAS, FLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rotman, A. D. 995* (SI)]; CHL[*Alamos s.n.* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 8187* (MVFA)].

Buglossoides arvense (L.) I.M. Johnst. = **Lithospermum arvense** L.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Johnston, I. M., 1954.

Cerdana alliodora Ruiz & Pav. = **Cordia alliodora** (Ruiz & Pav.) Cham.

Cochlearia ericoidea Miers = **Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea anchusaefolia (Poir.) Gürke = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Cochranea anchusaefolia (Poir.) Gürke var. *latifolia* DC. = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea chenopodiacea (A. DC.) Miers
= **Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **chenopodiaceum**
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea conferta Miers, nom. nud. = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea congesta Miers = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea corymbosa Miers = **Heliotropium megalanthum** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea crassifolia (Phil.) Phil. = **Heliotropium megalanthum** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea filifolia Miers = **Heliotropium filifolium** (Miers) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea florida (A. DC.) Miers = **Heliotropium floridum** (A. DC.) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea glutinosa (Phil.) Phil. = **Heliotropium glutinosum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea hebecula Miers = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea hispidula Miers = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea kingi Phil. = **Heliotropium filifolium** (Miers) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea longistyla (Phil.) Phil. = **Heliotropium longistylum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea myosotifolia (A. DC.) Miers = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea parviflora Phil. = **Heliotropium inconspicuum** Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea pycnophylla (Phil.) Phil. ex Reiche
= **Heliotropium pycnophyllum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea rugosa (Phil.) Phil. = **Heliotropium taltalense** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea sclerocarpa Phil. = **Heliotropium sclerocarpum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea sentis Phil. = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea sinuata Miers = **Heliotropium sinuatum** (Miers) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea stenophylla (Hook. & Arn.) Miers
= **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cochranea taltalensis Phil. = **Heliotropium taltalense** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Coldenia atacamensis Phil. = **Tiquilia atacamensis** (Phil.) A.T. Richardson

Coldenia decumbens Hauman = **Tiquilia nuttallii** (Hook.) A.T. Richardson
Referencias: Johnston, I. M., 1925.

Coldenia glabra Phil. = **Frankenia chilensis** C. Presl

Coldenia grandiflora Phil. = **Tiquilia grandiflora** (Phil.) A.T. Richardson

Coldenia littoralis Phil. = **Tiquilia litoralis** (Phil.) A.T. Richardson

Coldenia nuttallii Hook. = **Tiquilia nuttallii** (Hook.) A.T. Richardson

Coldenia paronychioides Phil. = **Tiquilia paronychioides** (Phil.) A.T. Richardson

Coldenia phaenocarpa Phil. = **Heliotropium microstachyum** Ruiz & Pav.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Cordia L.

Número de especies: 13, 1 endémica

[Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.]
Sin.: *Cerdana alliodora* Ruiz & Pav.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.
Sin.: *Cordia patagonula* Aiton, *Patagonica americana* (L.) Kuntze, *Patagonula alba* Rojas Acosta, nom. nud., *Patagonula americana* L., *Patagonula americana* L.

var. *glabra* Cham., *Patagonula americana* L. var. *hirsuta* Fresen., *Patagonula australis* Salisb., *Patagonula fuscata* Rojas Acosta, nom. nud., *Patagonula glabra* (Cham.) Miers, *Patagonula tweediana* Miers
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Di Fulvio, T. E., 1969a; Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, PAI, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1239* (SI), *Rodríguez, F. M. 27* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 35476* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1514* (SI), *Kiesling, R. 9807* (PY, SI), *Stutz, L. C. 841* (G)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVJB)].

Cordia axillaris I.M. Johnst. = **Varronia axillaris** (I.M. Johnst.) Borhidi

Cordia bifurcata Roem. & Schult. = **Varronia dichotoma** Ruiz & Pav.

Cordia bordasii Schinini
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Schinini, A., 1981.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 16533* (SI)].

Cordia caaguazuensis Chodat = **Varronia villicaulis** (Fresen.) Borhidi

Cordia chacoensis Chodat = **Varronia curassavica** Jacq.

Cordia chamissoniana Steud. var. *aemilii* Chodat = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia corymbosa (L.) G. Don f. *detonsa* I.M. Johnst. = **Varronia dichotoma** Ruiz & Pav.

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. = **Varronia curassavica** Jacq.

Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. = **Varronia cylindrostachya** Ruiz & Pav.

Cordia decandra Hook. & Arn.
Referencias: Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dillon, M. O. 5014* (SI), *Goodspeed, T. H. 16327* (SI)].

Cordia discolor Cham. = **Varronia polycephala** Lam.

Cordia ecalyculata Vell.
Sin.: *Cordia leptocaula* Fresen., *Cordia salicifolia* Cham.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Johnston, I. M., 1930; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 739* (SI), *Zuloaga, F. O. 5294* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 34539* (SI), *Henz, E. 35727* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5891* (SI), *Stutz, L. C. 853* (G), *Zardini, E. M. 44559* (SI)].

Cordia floribunda (Desv.) Spreng. = **Varronia cylindrostachya** Ruiz & Pav.

Cordia frondosa Schott ex Spreng. = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia gerascanthus Jacq. = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia glabrata A. DC.
Sin.: *Cordia glabrata* A. DC. var. *amambayensis* Chodat, *Cordia glabrata* A. DC. var. *longipeda* (Mez) Chodat, *Cordia glabrata* A. DC. var. *orbicularis* Chodat & Vischer, *Cordia longipeda* Mez, *Cordia longituba* Chodat & Vischer
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Johnston, I. M., 1930.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Degen, R. 3352* (CTES, FCQ, MO), *Krapovickas, A. 13241* (SI), *Zardini, E. M. 41525* (SI)].

Cordia glabrata A. DC. var. *amambayensis* Chodat = **Cordia glabrata** A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia glabrata A. DC. var. *longipeda* (Mez) Chodat = **Cordia glabrata** A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia glabrata A. DC. var. *orbicularis* Chodat & Vischer = **Cordia glabrata** A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia glazioviana (Taub.) Gottschling & J.S. Mill.
Sin.: *Auxemma glazioviana* Taub.
Referencias: Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006.
Árbol. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bernardi, L. 20431* (G, MO)].

Cordia guaranitica Chodat & Hassl. = **Varronia guaranitica** (Chodat & Hassl.) J.S. Mill.

Cordia guaranitica Chodat & Hassl. var. *foliosa* Chodat & Hassl. = **Varronia guaranitica** (Chodat & Hassl.) J.S. Mill.

Cordia guaranitica Chodat & Hassl. var. *pedunculosa* Chodat & Hassl. = **Varronia guaranitica** (Chodat & Hassl.) J.S. Mill.

Cordia hassleriana Chodat = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia hermanniefolia Cham. = **Varronia polycephala** Lam.

Cordia hypoleuca DC. = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia leptocaula Fresen. = **Cordia ecalyculata** Vell.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia longipeda Mez = **Cordia glabrata** A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia longituba Chodat & Vischer = **Cordia glabrata** A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia magnoliifolia Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14287* (G, MO)].

Cordia monosperma (Jacq.) Roem. & Schult. = **Varronia polycephala** Lam.

[Cordia paraguariensis Chodat & Hassl.]
Sin.: *Varronia paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Borhidi
Notas: Nombre dudoso.

Cordia patagonula Aiton = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Cordia paucidentata Fresen. = **Varronia paucidentata** (Fresen.) Friesen

Cordia paucidentata Fresen. var. *subulata* Chodat & Hassl. = **Varronia paucidentata** (Fresen.) Friesen

Cordia paucidentata Fresen. var. *valenzuelensis* Chodat = **Varronia paucidentata** (Fresen.) Friesen

Cordia polycephala (Lam.) I.M. Johnst. = **Varronia polycephala** Lam.

Cordia rufescens A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Arbolito. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, N. P. 16248* (S)].

Cordia saccelia Gottschling & J.S. Mill.
Sin.: *Saccellium lanceolatum* Humb. & Bonpl.
Referencias: Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4152* (SI), *Taylor, C. M. 11353* (SI)].

Cordia salicifolia Cham. = **Cordia ecalyculata** Vell.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cordia salicina DC. = **Varronia curassavica** Jacq.

Cordia sellowiana Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Árbol. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2478* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 11176* (G)].

Cordia sessilifolia Cham. var. *tomentosa* (Chodat & Hassl.) I.M. Johnst. = **Varronia villicaulis** (Fresen.) Borhidi

Cordia silvestris Fresen.
Referencias: Cavalheiro, L., Fernandes Peralta, D. & Furlan, A., 2003.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 3348* (CTES)].

Cordia taguahyensis Vell.
Referencias: Cavalheiro, L., Fernandes Peralta, D. & Furlan, A., 2003.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 46739* (CTES)].

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
Sin.: *Cordia chamissoniana* Steud. var. *aemilii* Chodat, *Cordia frondosa* Schott ex Spreng., *Cordia gerascanthus* Jacq., *Cordia hassleriana* Chodat, *Cordia hypoleuca* DC., *Cordiada trichotoma* Vell., *Lithocardium gerascanthus* (Kuntze) Jacq. var. *puberulum* Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Johnston, I. M., 1930; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAN, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33904* (SI), *Morrone, O. 1092* (SI), *Zuloaga, F. O. 5441* (SI)]; BRA[*Kummrow, R. 539* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6164* (SI), *Stutz, L. C. 1394* (G), *Woolston, A. L. 539* (SI)].

Cordia ulmifolia (Juss.) DC. = **Varronia polycephala** Lam.

Cordia uruguaya Arechav. = **Varronia paucidentata** (Fresen.) Friesen

Cordia verbenacea DC. = **Varronia curassavica** Jacq.

Cordia villicaulis Fresen. = **Varronia villicaulis** (Fresen.) Borhidi

Cordia villicaulis Fresen. var. *tomentosa* Chodat & Hassl. = **Varronia villicaulis** (Fresen.) Borhidi

Cordiada trichotoma Vell. = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Cortesia cuneata Hauman, hom. illeg. = **Ehretia cortesia** Gottschling

Cortesia cuneifolia Cav. = **Ehretia cortesia** Gottschling
Referencias: Gottschling, M. & Hilger, H. H., 2004.

Cortesia microphylla Miers = **Ehretia cortesia** Gottschling

Cryptantha G. Don

Número de especies: 47, 40 endémicas

Cryptantha albida (Kunth) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha argentinica* Brand, *Cryptantha falcata* (Hieron.) I.M. Johnst., *Eritrichium falcatum* Hieron., *Myosotis albida* Kunth
Referencias: Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 300–4200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 494* (SI), *Cialdella, A. M. 510* (SI), *Kiesling, R. 3589* (SI)].

Cryptantha alfalfalis (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium alfalfalis* Phil., *Eritrichium rigidum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 700–1100 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 640* (CONC)].

Cryptantha alyssoides (A. DC.) Reiche
Sin.: *Cryptantha talquina* (Phil.) Brand, *Eritrichium alyssoides* A. DC., *Eritrichium gilliesii* Phil., *Eritrichium talquinum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2700 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 3522* (SI)].

Cryptantha aprica (Phil.) Reiche
Sin.: *Cryptantha candelabrum* Brand, *Eritrichium apricum* Phil., *Eritrichium bridgesii* Phil., *Eritrichium closii* Phil., *Eritrichium denudatum* Phil., *Eritrichium lignosum* Phil., *Eritrichium rengifoanum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 400–2400 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 564* (CONC)].

Cryptantha argentea I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Quezada, M. 146* (CONC)].

Cryptantha argentinica Brand = **Cryptantha albida** (Kunth) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha aspera (Phil.) Grau
Sin.: *Eritrichium asperum* Phil.
Referencias: Grau, J., 1982.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1589* (CONC)].

Cryptantha axillaris (Phil.) Reiche = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha borchersii (Phil.) Hauman = **Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha calycina (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium calycinum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 3100–3800 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 83557* (CONC)].

Cryptantha calycotricha I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 1548* (CONC)].

Cryptantha candelabrum Brand = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha candolleana Brand = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**
Referencias: Johnston, I. M., 1935a.

Cryptantha capituliflora (Clos) Reiche
Sin.: *Eritrichium capituliflorum* Clos, *Eritrichium cephalanthum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9709* (SI), *Galetto, L. 998* (CORD)]; CHL[*Marticorena, C. 568* (CONC)].

Cryptantha capituliflora (Clos) Reiche var. *compacta* Brand = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha chaetocalyx (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha divaricata* Reiche, *Eritrichium chaetocalyx* Phil., *Eritrichium pustulosum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 2813* (MO)].

Cryptantha chispae Grau
Sin.: *Eritrichium affine* Phil.
Referencias: Grau, J., 1981.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 7523* (CONC)].

Cryptantha chrysantha (Phil.) Reiche = **Cryptantha volckmannii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha circumscissa (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha circumscissa* (Hook. & Arn.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Greeneocharis circumscissa* (Hook. & Arn.) Rydb., *Lithospermum circumscissum* Hook. & Arn.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 1799* (BAB)].

Cryptantha circumscissa (Hook. & Arn.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval. = **Cryptantha circumscissa** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha clandestina (Trevir.) I.M. Johnst.
Sin.: *Lithospermum clandestinum* Trevir.
Referencias: Johnston, I. M., 1935a.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 3047* (SI)].

Cryptantha collina (Phil.) Reiche = **Plagiobothrys collinus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha corymbosa (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. = **Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha cynoglossoides (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha phacelioides* auct. non (Clos) Reiche, *Eritrichium cynoglossoides* Phil., *Eritrichium uspallatense* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 9602* (BAF)]; CHL[*Goodspeed, T. H. 17194* (SI)].

Cryptantha debilis (Phil.) Reiche = **Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha dichita (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium dichita* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villanueva, G. s.n.* (SGO)].

Cryptantha diffusa (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha borchersii* (Phil.) Hauman, *Cryptantha debilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha famatinae* Brand, *Eritrichium borchersii* Phil., *Eritrichium debile* Phil., *Eritrichium diffusum* Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SJU); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 19525* (SI), *Rossow, R. A. 1764* (BAB)]; CHL[*Werdermann, E. 220* (SI)].

Cryptantha dimorpha (Phil.) Greene
Sin.: *Eritrichium dimorphum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 600–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Joseph, F. C. 3857* (CONC)].

Cryptantha diplotricha (Phil.) Reiche
Sin.: *Cryptantha axillaris* (Phil.) Reiche, *Cryptantha capituliflora* (Clos) Reiche var. *compacta* Brand, *Cryptantha diplotricha* (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha hossei* Brand, *Cryptantha modesta* Brand, *Eritrichium axillare* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil., *Eritrichium diplotrichum* Phil. var. *humilis* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL, SJU); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 1841* (SI), *Galetto, L. 1007* (CORD), *Haene, E. 1779* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 4759* (CONC)].

Cryptantha diplotricha (Phil.) Reiche var. *humilis* (Phil.) Reiche = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha divaricata Reiche = **Cryptantha chaetocalyx** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha dolichophylla (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium dolichophyllum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 100–1200 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Squeo, F. A. 87055* (CONC)].

Cryptantha falcata (Hieron.) I.M. Johnst. = **Cryptantha albida** (Kunth) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha fallax (Phil.) Reiche = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha famatinae Brand = **Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha filaginea (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium filagineum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 15792* (SI)].

Cryptantha filiformis (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium filiforme* Phil., *Eritrichium mite* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 764* (SI)].

Cryptantha floribunda (Phil.) Reiche = **Cryptantha globulifera** (Clos) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha gayi I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1254* (CONC)].

Cryptantha globulifera (Clos) Reiche
Sin.: *Cryptantha floribunda* (Phil.) Reiche, *Eritrichium floribundum* Phil., *Eritrichium globuliferum* Clos
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE); CHL(I, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33209* (SI)]; CHL[*Goodspeed, T. H. 16686* (SI)].

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**
Sin.: *Cryptantha candolleana* Brand, *Eritrichium diplasianthum* Phil., *Eritrichium foliosum* Phil., *Eritrichium longisetum* Phil., *Eritrichium strictum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2800 m.
Países: CHL(I, II, IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 40* (SI)].

Cryptantha glomerata Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **quadrinuculata** Grau
Sin.: *Cryptantha vidali* (Phil.) Reiche, *Eritrichium vidali* Phil.
Referencias: Grau, J., 1982.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 36809* (CONC)].

Cryptantha glomerulifera (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium glomeruliferum* Phil.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(I, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAB)]; CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Cryptantha gnaphalioides (A. DC.) Reiche
Sin.: *Eritrichium fruticosum* Phil., *Eritrichium gnaphalioides* A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2900 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 366w* (SI), *Werdermann, E. 238* (SI)].

Cryptantha gracilis (Phil.) Reiche = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha haplostachya (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium haplostachyum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1814* (CONC)].

Cryptantha hispida (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium hispidum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 2700–3800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3019* (CONC)].

Cryptantha hossei Brand = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha inconspicua (Phil.) Reiche = **Plagiobothrys collinus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha involucrata (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium involucratum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 1300–3500 m.
Países: CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 193* (SI)].

Cryptantha kingii (Phil.) Reiche
Sin.: *Cryptantha macrocalyx* (Phil.) Reiche, *Cryptantha virens* (Phil.) Reiche, *Eritrichium kingii* Phil., *Eritrichium macrocalyx* Phil., *Eritrichium virens* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1690* (CONC)].

Cryptantha latefissa R.L. Pérez-Mor.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 4742* (BAB)].

Cryptantha limensis (A. DC.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium limense* A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 3800 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 446* (CONC)].

Cryptantha linearis (Colla) Greene
Sin.: *Cryptantha fallax* (Phil.) Reiche, *Cryptantha gracilis* (Phil.) Reiche, *Cryptantha minutiflora* (Phil.) Brand, *Eritrichium fallax* Phil., *Eritrichium gracile* Phil., *Eritrichium lineare* (Colla) DC., *Eritrichium minutiflorum* Phil., *Myosotis linearis* Colla
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 2034* (CONC)].

Cryptantha longifolia (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium longifolium* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Cryptantha macrocalyx (Phil.) Reiche = **Cryptantha kingii** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha maritima Greene var. **pilosa** I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 6185* (SI)].

Cryptantha marticorenae Grau
Referencias: Grau, J., 1981.
Hierba. Anual. Endémica. 300–900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4429* (CONC)].

Cryptantha mendocina I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15556* (SI), *Burkart, A. 19201* (SI)].

Cryptantha microphylla (Phil.) Reiche = **Cryptantha parviflora** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha minutiflora (Phil.) Brand = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha modesta Brand = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha papillosa R.L. Pérez-Mor.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Endémica. 2200–2300 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11597* (BAA, BAB, SI)].

Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche
Sin.: *Cryptantha microphylla* (Phil.) Reiche, *Eritrichium microphyllum* Phil., *Eritrichium parviflorum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3600 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4722* (CONC)].

Cryptantha patagonica (Speg.) I.M. Johnst.
Sin.: *Amsinckia patagonica* Speg., *Cynoglossospermum humile* Kuntze, *Eritrichium diffusum* Speg., hom. illeg., *Eritrichium parvulum* Macloskie, hom. illeg.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33209b* (SI), *Crespo, S. 1640* (SI)].

Cryptantha phacelioides auct. non (Clos) Reiche = **Cryptantha cynoglossoides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cryptantha phaceloides (Clos) Reiche
Sin.: *Eritrichium phaceloides* Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 3300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 2269* (CONC)].

Cryptantha romanii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, J. 2125* (CONC)].

Cryptantha spathulata (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium spathulatum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Cryptantha spegazzinii I.M. Johnst. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971; Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha subamplexicaulis (Phil.) Reiche
Sin.: *Eritrichium subamplexicaule* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 16109* (SI)].

Cryptantha talquina (Phil.) Brand = **Cryptantha alyssoides** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1935.

Cryptantha taltalensis I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 15771* (SI)].

Cryptantha vidali (Phil.) Reiche = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **quadrinuculata** Grau
Referencias: Grau, J., 1982.

Cryptantha virens (Phil.) Reiche = **Cryptantha kingii** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cryptantha volckmannii (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha chrysantha* (Phil.) Reiche, *Eritrichium chrysanthum* Phil., *Eritrichium volckmannii* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 600–2900 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 6050* (CONC)].

Cryptantha werdermanniana I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Anual. Endémica. 2300 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1043* (GH)].

Cynoglossospermum humile Kuntze = **Cryptantha patagonica** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Cynoglossum L.

Número de especies: 5, 1 endémica, 4 introducidas

Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Hierba. Bianual. Introducida. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31538* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7923* (MBM)].

Cynoglossum berteroi Colla = **Selkirkia berteroi** (Colla) Hemsl.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cynoglossum creticum Mill.
Sin.: *Cynoglossum officinale* Hauman, hom. illeg., *Cynoglossum pictum* Sol.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Bianual. Introducida. 500–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33083* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20068* (CONC)].

Cynoglossum limense Willd.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arriagada, J. E. 28* (CONC)].

Cynoglossum lineare Ruiz & Pav. = **Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Cynoglossum officinale Hauman, hom. illeg. = **Cynoglossum creticum** Mill.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cynoglossum ovatifolium Griseb. = **Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cynoglossum paniculatum Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Johnston, I. M., 1927.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20127* (CONC)].

Cynoglossum pictum Sol. = **Cynoglossum creticum** Mill.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cynoglossum revolutum Ruiz & Pav. = **Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Cynoglossum zeylanicum Thunb. ex Lehm.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(VII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 9800* (CONC)].

Echinospermum gracile (Ruiz & Pav.) Lehm. = **Plagiobothrys gracilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Echinospermum patagonicum Speg. = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Echinospermum redowskii (Hornem.) Lehm. = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1932.

Echium L.

Número de especies: 2 introducidas

Echium plantagineum L.
Sin.: *Echium violaceum* auct. non L.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, NEU, SAL, SFE, TDF, TUC); BRA(PAR); CHL(VI, VII, VIII, IX); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Huidobro, A. M. 1659* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 25581* (CTES)]; CHL[*Matthei, O. R. 1226* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 80a* (SI), *Seijo, G. J. 2433* (CTES, SI)].

Echium violaceum auct. non L. = **Echium plantagineum** L.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Echium vulgare L. var. **vulgare**
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. s.n.* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996127* (CONC), *Burkart, A. 27532* (SI)].

Echium vulgare L. var. **wierzbickii** (Haberle) Coste
Sin.: *Echium wierzbickii* Haberle
Referencias: Correa, M. N., 1999c.
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 10474* (BAB)].

Echium wierzbickii Haberle = **Echium vulgare** L. var. **wierzbickii** (Haberle) Coste

Ehretia P. Browne

Número de especies: 1

Ehretia cortesia Gottschling
Sin.: *Cortesia cuneata* Hauman, hom. illeg., *Cortesia cuneifolia* Cav., *Cortesia microphylla* Miers
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1965; Gottschling, M. & Hilger, H. H., 2004; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pérez-Moreau, R. L., 1994; Ragonese, A. E., 1951.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SDE, SFE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31042* (SI), *Hunziker, A. T. 13269* (SI)].

Ehretia montevidensis Spreng. = **Citharexylum montevidense** (Spreng.) Moldenke

Eritrichium affine Phil. = **Cryptantha chispae** Grau
Referencias: Grau, J., 1981.

Eritrichium albiflorum Griseb. = **Myosotis albiflora** Banks & Sol. ex Hook. f.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium albiflorus Griseb. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Eritrichium alfalfalis Phil. = **Cryptantha alfalfalis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium alyssoides A. DC. = **Cryptantha alyssoides** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium apricum Phil. = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium armeriifolius Phil. = **Plagiobothrys armeriifolius** (Phil.) I.M. Johnst.

Eritrichium asperum Phil. = **Cryptantha aspera** (Phil.) Grau
Referencias: Grau, J., 1982.

Eritrichium asperum Phil., hom. illeg. = **Plagiobothrys fulvus** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium axillare Phil. = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium borchersii Phil. = **Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium bracteatum Phil. = **Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium bridgesii Phil. = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium calandrinioides Phil. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Eritrichium calycinum Phil. = **Cryptantha calycina** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium capituliflorum Clos = **Cryptantha capituliflora** (Clos) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium cephalanthum Phil. = **Cryptantha capituliflora** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium chaetocalyx Phil. = **Cryptantha chaetocalyx** (Phil.) I.M. Johnst.

Eritrichium chrysanthum Phil. = **Cryptantha volckmannii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium closii Phil. = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium collinum Phil. = **Plagiobothrys collinus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium cynoglossoides Phil. = **Cryptantha cynoglossoides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium debile Phil. = **Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium delicatulum Phil. = **Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium denudatum Phil. = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium dichita Phil. = **Cryptantha dichita** (Phil.) I.M. Johnst.

Eritrichium diffusum Phil. = **Cryptantha diffusa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium diffusum Speg., hom. illeg. = **Cryptantha patagonica** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium dimorphum Phil. = **Cryptantha dimorpha** (Phil.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium diplasianthum Phil. = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium diplotrichum Phil. = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium diplotrichum Phil. var. *humilis* Phil. = **Cryptantha diplotricha** (Phil.) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium dolichophyllum Phil. = **Cryptantha dolichophylla** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium falcatum Hieron. = **Cryptantha albida** (Kunth) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium fallax Phil. = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium filagineum Phil. = **Cryptantha filaginea** (Phil.) Reiche

Eritrichium filiforme Phil. = **Cryptantha filiformis** (Phil.) Reiche

Eritrichium floribundum Phil. = **Cryptantha globulifera** (Clos) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium foliosum Phil. = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium fruticosum Phil. = **Cryptantha gnaphalioides** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium germainii Phil. = **Plagiobothrys germainii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium gilliesii Phil. = **Cryptantha alyssoides** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium glabratum Phil. = **Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Eritrichium globuliferum Clos = **Cryptantha globulifera** (Clos) Reiche
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium glomeruliferum Phil. = **Cryptantha glomerulifera** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium gnaphalioides A. DC. = **Cryptantha gnaphalioides** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium gracile Phil. = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium graminifolium Phil. = **Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium haplostachyum Phil. = **Cryptantha haplostachya** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium hispidum Phil. = **Cryptantha hispida** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium humile Macloskie, hom. illeg. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Eritrichium humile DC. var. *congestum* Wedd. = **Plagiobothrys congestus** (Wedd.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium inconspicuum Phil. = **Plagiobothrys collinus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium involucratum Phil. = **Cryptantha involucrata** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium kingii Phil. = **Cryptantha kingii** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium laxiflorum Phil. = **Plagiobothrys fulvus** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium lignosum Phil. = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium limense A. DC. = **Cryptantha limensis** (A. DC.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium limonium Phil. = **Plagiobothrys oppositifolius** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium lineare (Colla) DC. = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium longifolium Phil. = **Cryptantha longifolia** (Phil.) Reiche

Eritrichium longisetum Phil. = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium macrocalyx Phil. = **Cryptantha kingii** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium mesembryanthemoides Speg. = **Plagiobothrys mesembryanthemoides** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium microphyllum Phil. = **Cryptantha parviflora** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium minutiflorum Phil. = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium mite Phil. = **Cryptantha filiformis** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium oppositifolius Phil. = **Plagiobothrys oppositifolius** (Phil.) I.M. Johnst.

Eritrichium pampeanum Speg. = **Myosotis verna** Nutt.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium parviflorum Phil. = **Cryptantha parviflora** (Phil.) Reiche

Eritrichium parvulum Macloskie, hom. illeg. = **Cryptantha patagonica** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium pedicellare Phil. = **Plagiobothrys uliginosus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium phaceloides Clos = **Cryptantha phaceloides** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium polycaule Phil. = **Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium pratense Phil. = **Plagiobothrys pratensis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium pulchellum Phil. = **Plagiobothrys pulchellus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium pustulosum Phil. = **Cryptantha chaetocalyx** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium pygmaeum Wedd. = **Plagiobothrys pygmaeus** (Kunth) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium rengifoanum Phil. = **Cryptantha aprica** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium rigidum Phil. = **Cryptantha alfalfalis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium sessiliflorum A. DC. = **Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium spathulatum Phil. = **Cryptantha spathulata** (Phil.) Reiche

Eritrichium strictum Phil. = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **glomerata**
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium subamplexicaule Phil. = **Cryptantha subamplexicaulis** (Phil.) Reiche

Eritrichium talquinum Phil. = **Cryptantha alyssoides** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium tinctorium A. DC. = **Plagiobothrys myosotoides** (Lehm.) Brand

Eritrichium uliginosum auct. non Phil. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Eritrichium uliginosum Phil. = **Plagiobothrys uliginosus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium uspallatense Phil. = **Cryptantha cynoglossoides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Eritrichium vernum Phil. = **Plagiobothrys polycaulis** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium verrucosum Phil. = **Plagiobothrys verrucosus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium vidali Phil. = **Cryptantha glomerata** Lehm. ex Fisch. & C.A. Mey. subsp. **quadrinuculata** Grau
Referencias: Grau, J., 1982.

Eritrichium virens Phil. = **Cryptantha kingii** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eritrichium volckmannii Phil. = **Cryptantha volckmannii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Eutoca cumingii Benth. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Eutoca frigida Phil. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Eutoca grandis Phil. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Eutoca litoralis Phil. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Eutoca peraltae Phil. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Eutoca pinnatifida Phil. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Eutoca pusilla Phil. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Greeneocharis circumscissa (Hook. & Arn.) Rydb. = **Cryptantha circumscissa** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Gruvelia pusilla A. DC. = **Pectocarya pusilla** (A. DC.) A. Gray
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Hackelia Opiz

Número de especies: 1

Hackelia revoluta (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cynoglossum ovatifolium* Griseb., *Cynoglossum revolutum* Ruiz & Pav., *Lappula revoluta* Brand, *Lappula revoluta* Brand f. *fiebrigii* Brand, *Lappula revoluta* Brand f. *ovatifolia* Brand
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Hierba. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[Cialdella, A. M. 103 (SI), *Kiesling, R. 5152* (SI)].

Heliophytum brachystachyum DC. = **Heliotropium microstachyum** Ruiz & Pav.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliophytum chenopodiaceum A. DC. = **Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **chenopodiaceum**
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliophytum floridum A. DC. = **Heliotropium floridum** (A. DC.) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliophytum indicum (L.) DC. = **Heliotropium indicum** L.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliophytum macrostachyum DC. = **Heliotropium macrostachyum** (DC.) Hemsl.

Heliophytum phylicoides (Cham.) DC. = **Heliotropium phylicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliophytum stenophyllum (Hook. & Arn.) A. DC. = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliophytum stenophyllum (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A. DC. = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium L.

Número de especies: 55, 38 endémicas, 1 introducida

Heliotropium abbreviatum Rusby
Referencias: Di Fulvio, T. E., 2003.
Hierba. Perenne. Nativa. 2900–3100 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Fulvio, T. E. 1071* (CORD, CTES, SI)].

Heliotropium amplexicaule Vahl
Sin.: *Cochranea anchusaefolia* (Poir.) Gürke, *Cochranea anchusaefolia* (Poir.) Gürke var. *latifolia* DC., *Heliotropium anchusifolium* Poir., *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *grandiflorum* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *medium* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. f. *parviflorum* Kuntze, *Heliotropium anchusifolium* Poir. var. *angustifolium* Griseb., *Heliotropium anchusifolium* Poir. var. *latifolia* Hicken, *Heliotropium anchusifolium* Poir. var. *lithospermifolium* Griseb., *Heliotropium lithospermifolium* Speg.
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); URY(CAS, MON, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 344* (SI), *Kiesling, R. 6676* (SI), *Rotman, A. D. 757* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 53187* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 96704* (SI), *Seijo, G. J. 2671* (CTES, SI)].

Heliotropium anchusifolium Poir. = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium anchusifolium Poir. f. *grandiflorum* Kuntze = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium anchusifolium Poir. f. *medium* Kuntze = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium anchusifolium Poir. f. *parviflorum* Kuntze = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium anchusifolium Poir. var. *angustifolium* Griseb. = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium anchusifolium Poir. var. *latifolia* Hicken = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium anchusifolium Poir. var. *lithospermifolium* Griseb. = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium andinum Rusby = **Heliotropium campestre** Griseb.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium angiospermum Murray
Sin.: *Heliotropium parviflorum* L., *Heliotropium simplex* Meyen
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); CHL(I); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Conrad, J. 2101* (MO)]; CHL[*Meyen s.n.* (B)]; PRY[*Zardini, E. M. 36600* (AS, MO)].

Heliotropium auratum Phil.
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2000b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–3800 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diers, L. 187* (SI), *Hunziker, A. T. 19640* (CORD)].

Heliotropium brachystachyum (DC.) Griseb. = **Heliotropium microstachyum** Ruiz & Pav.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium breanum Phil. = **Heliotropium pycnophyllum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium brevifolium Phil. = **Heliotropium pycnophyllum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium campestre Griseb.
Sin.: *Heliotropium andinum* Rusby
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5079* (SI), *Rotman, A. D. 792* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3221* (FCQ), *Fiebrig, K. A. G. 4016* (US)].

Heliotropium canum Phil. = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium catamarcense I.M. Johnst.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1868* (G, SI, US), *Kiesling, R. 5037* (SI)].

Heliotropium cerroleonense R. Degen
Referencias: Degen, R., 1994b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 2646* (FCQ, G)].

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. **chenopodiaceum**
Sin.: *Cochranea chenopodiacea* (A. DC.) Miers, *Heliophytum chenopodiaceum* A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 200–1700 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 6260* (G)].

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche
Sin.: *Cochlearia ericoidea* Miers, *Eritrichium glabratum* Phil., *Heliotropium pearcei* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–2300 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 399* (SI)].

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers) Reiche = **Heliotropium filifolium** (Miers) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium chenopodiaceum (A. DC.) Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche = **Heliotropium sclerocarpum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium chrysanthum Phil.
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2000b; Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Böcher, T. W. 2084* (SI), *Hunziker, A. T. 16744* (CORD)].

Heliotropium clausseni A. DC. = **Heliotropium salicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium clausseni A. DC. f. *robustior* Chodat = **Heliotropium salicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium corymbosum (Miers) Reiche = **Heliotropium megalanthum** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium crassifolium Phil. = **Heliotropium megalanthum** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium crysanthum Phil.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2000b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 8083* (SI)].

Heliotropium curassavicum L. var. **argentinum** I.M. Johnst.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, PHA); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 373* (CORD, CTES, SI)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2249-c* (K)]; PRY[*Rojas, T. 2102* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 76710* (F)].

Heliotropium curassavicum L. var. **curassavicum**
Sin.: *Heliotropium curassavicum* L. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval., *Heliotropium curassavicum* L. var. *parviflorum* Ball
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, FOR, LRI, RNE, SDE, SLU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, RME); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Calderón, C. E. 1038* (SI), *Krapovickas, A. 1282* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 711* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 41626* (SI)].

Heliotropium curassavicum L. var. **fruticulosum** I.M. Johnst.
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Johnston, I. M., 1959.
Subarbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27089* (SI), *Kiesling, R. 8844* (SI)].

Heliotropium curassavicum L. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval. = **Heliotropium curassavicum** L. var. **curassavicum**
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium curassavicum L. var. *parviflorum* Ball = **Heliotropium curassavicum** L. var. **curassavicum**
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium dunaense R. Degen
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Degen, R., 1994b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Degen, R. 2911* (FCQ, G)].

Heliotropium elongatum Hoffm. ex Roem. & Schult.
Sin.: *Heliotropium elongatum* Hoffm. ex Roem. & Schult. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 385* (CORD, CTES, SI), *Jörgensen, P. 3466* (SI), *Krapovickas, A. 1294* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 46645* (SI), *Sehnem, A. 1435* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2942* (FCQ), *Woolston, A. L. 363* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 18458* (B)].

Heliotropium elongatum Hoffm. ex Roem. & Schult. var. *genuinum* I.M. Johnst., nom. inval. = **Heliotropium elongatum** Hoffm. ex Roem. & Schult.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium eremogenum I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1937; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schlegel, F. 7819* (CONC)].

Heliotropium filifolium (Miers) I.M. Johnst.
Sin.: *Cochranea filifolia* Miers, *Cochranea kingi* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *filifolium* (Miers) Reiche, *Heliotropium kingi* (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 1343* (BM, F, G, K)].

Heliotropium filiforme Lehm.
Sin.: *Heliotropium tenue* Roem. & Schult.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, CAN); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 7649* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 5452* (BM, G, K)]; URY[*Pedersen, T. M. 16291* (SI)].

Heliotropium floridum (A. DC.) Clos
Sin.: *Cochranea florida* (A. DC.) Miers, *Heliophytum floridum* A. DC., *Heliotropium floridum* (A. DC.) Clos var. *latifolium* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. 23b* (NY)].

Heliotropium floridum (A. DC.) Clos var. *latifolium* Phil. = **Heliotropium floridum** (A. DC.) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

[Heliotropium fruticosum L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Heliotropium geissei F. Phil.
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2000a; Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–1200 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 26705* (MERL)]; CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Heliotropium glutinosum Phil.
Sin.: *Cochranea glutinosa* (Phil.) Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 1100–1500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 3698* (G)].

Heliotropium hasslerianum Chodat
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Sánchez, E. A., 1985; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SAL); PRY(CAU, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molina, A. M. 375* (BAB)]; PRY[*Hassler, E. 4761* (G), *Jörgensen, P. 4855* (SI)].

Heliotropium hispidulum (Miers) Reiche = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium hispidulum Phil. = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium hispidum Kunth var. *maximum* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Heliotropium salicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium huascoense I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*López s.n.* (G)].

Heliotropium inconspicuum Reiche
Sin.: *Cochranea parviflora* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 1000–1200 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5631* (G)].

Heliotropium indicum L.
Sin.: *Heliophytum indicum* (L.) DC.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(APY, MIE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1664* (SI), *Morrone, O. 1895* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5654* (FCQ), *Pedersen, T. M. 8627* (SI)].

Heliotropium inundatum Sw. = **Heliotropium procumbens** Mill.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium inundatum Sw. f. *elliptica* Chodat = **Heliotropium procumbens** Mill.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium inundatum Sw. f. *pusilla* Hassl. = **Heliotropium procumbens** Mill.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium inundatum Sw. var. *chacoense* R.E. Fr. = **Heliotropium procumbens** Mill.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium izagae Phil. = **Heliotropium sinuatum** (Miers) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium jaffuelii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1937; Marticorena, C., com. pers.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1065* (CONC)].

Heliotropium johnstonii Ragonese
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Ragonese, A. E., 1950.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SDE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12026* (SI), *Ragonese, A. E. 6031* (BAB)].

Heliotropium kingi (Phil.) Reiche = **Heliotropium filifolium** (Miers) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium krauseanum Fedde
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Luebert B., F. & Pinto, R., 2004.
Arbusto. Nativa. 700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 955* (BM, K)].

Heliotropium kurtzii Gangui
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Gangui, N., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Covas, G. 18569* (SI), *Diem, J. 3559* (SI), *Kurtz, F. 6286* (SI)].

Heliotropium leiocarpum Morong
Sin.: *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *albiflora* Chodat, *Heliotropium leiocarpum* Morong f. *minor* Chodat
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1983* (SI), *Zuloaga, F. O. 5183* (SI)]; PRY[*Schrottky, C. 48* (SI)].

Heliotropium leiocarpum Morong f. *albiflora* Chodat = **Heliotropium leiocarpum** Morong
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium leiocarpum Morong f. *minor* Chodat = **Heliotropium leiocarpum** Morong
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium linariifolium Phil.
Sin.: *Heliotropium linearifolium* F. Phil., *Heliotropium longiflorum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 767* (BM, F, G, K, SI)].

Heliotropium linearifolium F. Phil. = **Heliotropium linariifolium** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium lithospermifolium Speg. = **Heliotropium amplexicaule** Vahl
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium longiflorum Phil. = **Heliotropium linariifolium** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium longistylum Phil.
Sin.: *Cochranea longistyla* (Phil.) Phil., *Heliotropium vernicosum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*King, G. s.n.* (SGO)].

[Heliotropium macrostachyum (DC.) Hemsl.]
Sin.: *Heliophytum macrostachyum* DC.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Heliotropium margaritense Hassl. ex I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10992* (B, G, K)].

Heliotropium maximum Chodat & Hassl. = **Heliotropium salicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium megalanthum I.M. Johnst.
Sin.: *Cochranea corymbosa* Miers, *Cochranea crassifolia* (Phil.) Phil., *Heliotropium corymbosum* (Miers) Reiche, *Heliotropium crassifolium* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 1341* (BM, G, K)].

Heliotropium mendocinum Phil.
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, MEN, MIS, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 207* (SI)].

Heliotropium microstachyum Ruiz & Pav.
Sin.: *Coldenia phaenocarpa* Phil., *Heliophytum brachystachyum* DC., *Heliotropium brachystachyum* (DC.) Griseb.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SFE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 576* (CORD), *Kiesling, R. 8043* (SI), *Zuloaga, F. O. 6035* (SI)];

Heliotropium monostachyum Cham. = **Heliotropium transalpinum** Vell. var. **transalpinum**
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium monostachyum Cham. var. *tiaridioides* (Cham.) Chodat = **Heliotropium tiaridioides** Cham.
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2004.

Heliotropium myosotifolium (A. DC.) Reiche
Sin.: *Cochranea hebecula* Miers, *Cochranea hispidula* Miers, *Cochranea myosotifolia* (A. DC.) Miers, *Cochranea sentis* Phil., *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *myosotifolium* A. DC., *Heliotropium canum* Phil., *Heliotropium hispidulum* (Miers) Reiche, *Heliotropium hispidulum* Phil., *Heliotropium stenophyllum* Hook. & Arn. var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Arbusto. Endémica. 0–2400 m.
Países: CHL(I, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. 23a* (NY)].

Heliotropium nicotianaefolium Poir.
Sin.: *Heliotropium sidaefolium* Cham., *Tournefortia heliotropioides* Hook.
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(COA, PAI); URY(COL, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. s.n.* (SI), *Zuloaga, F. O. 2735* (SI)]; PRY[*Basualdo, I. 1473* (FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 8341* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad precisa (Johnston, 1928).

Heliotropium ocellatum Cham.
Sin.: *Schleidenia ocellata* (Cham.) Fresen.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(SPE); URY(ART, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15430* (SI), *Montes, J. E. 566* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11664* (BAB, CTES)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9384* (MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 7202* (MVFA)].

Heliotropium pallescens I.M. Johnst.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1964, 1994.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2530* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3359* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 2100* (SI), *Rojas, T. 2477* (BM)].

Heliotropium paronychioides A. DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Correa, M. N., 1999c; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Anual. Endémica. 100–3100 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8802* (SI), *Nicora, E. G. 3675* (SI), *Troiani, H. O. 15240* (SI)]; CHL[*Goodspeed, T. H. 17282* (SI)].

Heliotropium parviflorum L. = **Heliotropium angiospermum** Murray
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium patagonicum (Speg.) I.M. Johnst.
Sin.: *Valentina patagonica* Speg., *Valentiniella patagonica* (Speg.) Speg.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arroyo, S. C. 105* (SI), *Donat, A. 114* (CORD, SI)].
Notas: Citada para Chile sin mencionar material de referencia (Marticorena, C., com. pers.).

Heliotropium pearcei Phil. = **Heliotropium chenopodiaceum** (A. DC.) Clos var. **ericoideum** (Miers) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium philippianum I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5233* (G)].

Heliotropium phylicoides Cham.
Sin.: *Heliophytum phylicoides* (Cham.) DC., *Heliotropium phylicoides* Cham. f. *luciliaefolium* Arechav.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); URY(COL, LAV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11513* (SI), *Troncoso, N. S. s.n.* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 991* (SI)].

Heliotropium phylicoides Cham. f. *luciliaefolium* Arechav. = **Heliotropium phylicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium pinnatisectum R.L. Pérez-Mor.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Pérez-Moreau, R. L., 1963.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. L. 3322* (BAB, SI)].

Heliotropium pinnatum Vahl = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

[Heliotropium polyphyllum Lehm.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Heliotropium procumbens Mill.
Sin.: *Heliotropium inundatum* Sw., *Heliotropium inundatum* Sw. f. *elliptica* Chodat, *Heliotropium inundatum* Sw. f. *pusilla* Hassl., *Heliotropium inundatum* Sw. var. *chacoense* R.E. Fr., *Heliotropium riparium* Mart. ex Chodat
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 352* (SI), *Deginani, N. B. 1426* (SI), *Morrone, O. 1900* (SI), *Zuloaga, F. O. 2623* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3467* (SI), *Woolston, A. L. 228* (SI)]; URY[*Gilbert, B. D. 228* (K)].

Heliotropium pycnophyllum Phil.
Sin.: *Cochranea pycnophylla* (Phil.) Phil. ex Reiche, *Heliotropium breanum* Phil., *Heliotropium brevifolium* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 849* (BM, F, G, K)].

Heliotropium repens Griseb. = **Heliotropium veronicifolium** Griseb.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium repens Griseb. var. *medium* Kuntze = **Heliotropium veronicifolium** Griseb.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium repens Griseb. var. *stenophyllum* Kuntze = **Heliotropium veronicifolium** Griseb.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium riparium Mart. ex Chodat = **Heliotropium procumbens** Mill.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium rosmarinifolium Bertero ex A. DC. = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium rosmarinifolium Bertero ex Steud., nom. nud. = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium rugosum Phil. = **Heliotropium taltalense** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium ruiz-lealii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1959.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4234* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 18837* (LL)].

Heliotropium salicoides Cham.
Sin.: *Heliotropium clausseni* A. DC., *Heliotropium clausseni* A. DC. f. *robustior* Chodat, *Heliotropium hispidum* Kunth var. *maximum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Heliotropium maximum* Chodat & Hassl., *Schleidenia salicoides* (Cham.) Fresen.
Referencias: Gangui, N., 1955; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SDE); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[Zuloaga, F. O. 6543 (SI)]; BRA[Hatschbach, G. 2895 (CTES)]; PRY[Jiménez, B. 1705 (CTES, PY), Soria, N. 4419 (SI)].

Heliotropium salsum Griseb. = **Heliotropium veronicifolium** Griseb.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium schreiteri I.M. Johnst.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Degen, R., 1994; Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 17326* (SI), *Schreiter, R. 3603* (G)]; PRY[*Degen, R. 2743* (FCQ)].

Heliotropium sclerocarpum Phil.
Sin.: *Cochranea sclerocarpa* Phil., *Heliotropium chenopodiaceum* (A. DC.) Clos var. *sclerocarpa* (Phil.) Reiche

Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dillon, M. O. 5015* (SI)].

Heliotropium sidaefolium Cham. = **Heliotropium nicotianaefolium** Poir.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium simplex Meyen = **Heliotropium angiospermum** Murray

Heliotropium sinuatum (Miers) I.M. Johnst.
Sin.: *Cochranea sinuata* Miers, *Heliotropium izagae* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hunziker, J. H. 9856* (SI)].

Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn.
Sin.: *Cochranea conferta* Miers, nom. nud., *Cochranea congesta* Miers, *Cochranea stenophylla* (Hook. & Arn.) Miers, *Heliophytum stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC., *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex A. DC., *Heliotropium rosmarinifolium* Bertero ex Steud., nom. nud., *Heliotropium stenophyllum* (Hook. & Arn.) A. DC. var. *rosmarinifolium* (Bertero ex A. DC.) Clos, *Meladendron chilense* Molina
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 120* (SI)].

Heliotropium stenophyllum Hook. & Arn. var. *myosotifolium* (A. DC.) Clos = **Heliotropium myosotifolium** (A. DC.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium stenophyllum (Hook. & Arn.) A. DC. var. *rosmarinifolium* (Bertero ex A. DC.) Clos = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium stylosum Phil. = **Nesocaryum stylosum** (Phil.) I.M. Johnst.

Heliotropium taltalense (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cochranea rugosa* (Phil.) Phil., *Cochranea taltalensis* Phil., *Heliotropium rugosum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 837* (SI)].

Heliotropium tenue Roem. & Schult. = **Heliotropium filiforme** Lehm.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium tiaridioides Cham.
Sin.: *Heliotropium monostachyum* Cham. var. *tiaridioides* (Cham.) Chodat, *Heliotropium tiaridioides* Cham. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Heliotropium transalpinum* Vell. var. *tiaridioides* (Cham.) I.M. Johnst.
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2004.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CEN, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1261* (SI), *Guaglianone, E. R. 2838* (SI), *Zuloaga, F. O. 5518* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 35149* (SI), *Rambo, B. 35469* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 190* (SI), *Zardini, E. M. 7172* (FCQ, MO)].

Heliotropium tiaridioides Cham. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval. = **Heliotropium tiaridioides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1964.

Heliotropium tiaridioides Cham. var. *schizocarpum* I.M. Johnst. = **Heliotropium transalpinum** Vell. var. **transalpinum**
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1964.

Heliotropium transalpinum Vell. var. **arcanum** Di Fulvio & Ariza
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2004.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL); PRY(CAU, MIE, ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2380* (BAB, G, MO, SI)]; PRY[*Mereles, F. 7960* (CTES)].

Heliotropium transalpinum Vell. var. *tiaridioides* (Cham.) I.M. Johnst. = **Heliotropium tiaridioides** Cham.
Referencias: Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L., 2004.

Heliotropium transalpinum Vell. var. **transalpinum**
Sin.: *Heliotropium monostachyum* Cham., *Heliotropium tiaridioides* Cham. var. *schizocarpum* I.M. Johnst.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1964; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, ÑEE, PAI); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1483* (SI), *Morrone, O. 3933* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15955* (G)]; PRY[*Jörgensen, P. 3468* (SI), *Stutz, L. C. 128* (G), *Zardini, E. M. 28615* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2040* (MVFA)].

Heliotropium vernicosum Phil. = **Heliotropium longistylum** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Heliotropium veronicifolium Griseb.
Sin.: *Heliotropium repens* Griseb., *Heliotropium repens* Griseb. var. *medium* Kuntze, *Heliotropium repens* Griseb. var. *stenophyllum* Kuntze, *Heliotropium salsum* Griseb.

Referencias: Di Fulvio, T. E., 1969b; Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solís Neffa, V. 612* (CTES, SI), *Venturi, S. 493* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1439* (B)].

Hydrophyllum magellanicum Lam. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Ixorhea Fenzl

Número de especies: 1 endémica

Ixorhea tschudiana Fenzl
Sin.: *Oxyosmyles viscosissima* Speg.
Referencias: Di Fulvio, T. E., 1978, 1982; Fenzl, E., 1886; Hauman, L. L., 1922.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 223* (SI), *Novara, L. J. 7452* (SI)].

Lappula Moench

Número de especies: 1

Lappula incospicua Brand = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Brand, A., 1931; Johnston, I. M., 1932.

Lappula patagonica Macloskie = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula redowskii (Hornem.) Greene
Sin.: *Echinospermum patagonicum* Speg., *Echinospermum redowskii* (Hornem.) Lehm., *Lappula incospicua* Brand, *Lappula patagonica* Macloskie, *Lappula redowskii* (Hornem.) Greene var. *desertorum* I.M. Johnst., *Lappula redowskii* (Hornem.) Greene var. *eu-redowskii* Brand, *Lappula redowskii* (Hornem.) Greene var. *occidentalis* I.M. Johnst., *Lappula texana* I.M. Johnst., *Myosotis redowskii* Hornem.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927, 1932.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 15200* (SI), *Troncoso, N. S. s.n.*(SI)]; CHL[*Elvebakk, A. 542* (CONC)].

Lappula redowskii (Hornem.) Greene var. *desertorum* I.M. Johnst. = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula redowskii (Hornem.) Greene var. *eu-redowskii* Brand = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula redowskii (Hornem.) Greene var. *occidentalis* I.M. Johnst. = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula revoluta Brand = **Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula revoluta Brand f. *fiebrigii* Brand = **Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula revoluta Brand f. *ovatifolia* Brand = **Hackelia revoluta** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lappula texana I.M. Johnst. = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lithocardium gerascanthus (Kuntze) Jacq. var. *puberulum* Kuntze = **Cordia trichotoma** (Vell.) Arráb. ex Steud.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Lithospermum L.

Número de especies: 1 introducida

Lithospermum arvense L.
Sin.: *Buglossoides arvense* (L.) I.M. Johnst., *Lithospermum officinale* Molfino, hom. illeg.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927, 1954.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TUC); URY(CAS, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33096* (SI), *Troncoso, N. S. 3167* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2047* (MVFA)].

Lithospermum calycinum Moris = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Chater, A. O., 1971.

Lithospermum chilense Colla = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lithospermum circumscissum Hook. & Arn. = **Cryptantha circumscissa** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928; Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Lithospermum clandestinum Trevir. = **Cryptantha clandestina** (Trevir.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1935.

Lithospermum hispidum Ruiz & Pav. = **Amsinckia calycina** (Moris) Chater
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lithospermum muricatum Ruiz & Pav. = **Plagiobothrys muricatus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Lithospermum officinale Molfino, hom. illeg. = **Lithospermum arvense** L.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Johnston, I. M., 1954.

Lycopsis L.

Número de especies: 1 introducida

Lycopsis arvensis L.
Sin.: *Anchusa arvensis* (L.) M. Bieb.
Referencias: Burkart, A., 1940; Hunziker, A. T. & Caro, J. A., 1958.
Hierba. Introducida. 500–1500 m.
Países: ARG(COR, LPA, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9836* (SI)].

Marylaunidium dichotomum (Ruiz & Pav.) Kuntze = **Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Marylaunidium echioides (Griseb.) Kuntze = **Nama undulatum** Kunth var. **undulatum**
Referencias: Hitchcock, C. L., 1933.

Marylaunidium jamaicense (L.) Kuntze = **Nama jamaicense** L.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Marylaunidium undulatum (Kunth) Kuntze = **Nama undulatum** Kunth var. **undulatum**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Meladendron chilense Molina = **Heliotropium stenophyllum** Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Microgenetes cumingii A. DC. = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Moritzia DC. ex Meisn.

Número de especies: 2 endémicas

Moritzia ciliata (Cham.) DC. ex Meisn.Sin.: *Anchusa ciliata* Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 672* (US)].

Moritzia dusenii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17273* (G)].

Moritzia tetraquetra (Cham.) Brand = **Thaumatocaryon tetraquetrum** (Cham.) I.M. Johnst.

Myosotis L.

Número de especies: 12, 1 endémica, 10 introducidas

Myosotis albida Kunth = **Cryptantha albida** (Kunth) I.M. Johnst.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1976.

Myosotis albiflora Banks & Sol. ex Hook. f.
Sin.: *Eritrichium albiflorum* Griseb.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2386* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6096* (CONC)].

Myosotis antarctica Hook. f.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 3866* (CONC)].

Myosotis arvensis (L.) Hill
Sin.: *Myosotis scorpioides* L. var. *arvensis* L.
Referencias: Moore, D. M. & Goodall, R. N., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(NEU, TDF, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7950* (SI)].

Myosotis azorica H.C. Watson ex Hook.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Soriano, A., 1947c.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2167* (SI)].

[Myosotis berroi Arechav.]
Notas: Nombre dudoso.

Myosotis corymbosa Ruiz & Pav. = **Plagiobothrys corymbosus** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1991a.

Myosotis discolor Pers. subsp. **canariensis** (Pit.) Grau
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 2323* (CONC)].

Myosotis discolor Pers. subsp. **discolor**
Sin.: *Myosotis versicolor* (Pers.) Sm.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Marticorena, C., com. pers.; Moore, D. M. & Goodall, R. N., 1977. .
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9445* (SI)]; CHL[*Goodspeed, T. H. 24138* (SI), *Moore, D. M. 117* (SI)].

Myosotis fulva Hook. & Arn. = **Plagiobothrys fulvus** (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Myosotis gracilis Ruiz & Pav. = **Plagiobothrys gracilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Myosotis humilis Ruiz & Pav. = **Plagiobothrys humilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Myosotis latifolia Poir.
Referencias: Johnston, I. M., 1959.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–800 m.
Países: CHL(III, VIII, X, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: CHL[*Quezada, M. 185* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 5621* (*)].

Myosotis laxa Lehm.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, DFE, NEU); BRA(PAR); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ezcurra, C. 75* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3041* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 704* (CONC)].

Myosotis linearis Colla = **Cryptantha linearis** (Colla) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Myosotis micrantha auct. non Pall. = **Myosotis stricta** Link ex Roem. & Schult.
Referencias: Abrams, L., 1951.

Myosotis procumbens Colla = **Plagiobothrys procumbens** (Colla) A. Gray
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Myosotis ramosissima Rochel
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: CHL(XII).
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena, com. pers.).

Myosotis redowskii Hornem. = **Lappula redowskii** (Hornem.) Greene
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Myosotis scorpioides L.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cusato, L. 2459* (BAA)]; CHL[*Matthei, O. R. 619* (CONC)].

Myosotis scorpioides L. var. *arvensis* L. = **Myosotis arvensis** (L.) Hill
Referencias: Moore, D. M. & Goodall, R. N., 1977.

Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.
Sin.: *Myosotis micrantha* auct. non Pall.
Referencias: Abrams, L., 1951; Correa, M. N., 1999c; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guerrido, C. 344* (MU, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 500* (CONC)].

Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9880* (BAB)]; CHL[*Swenson, U. 370* (CONC)].

[Myosotis uruguayensis Arechav.]
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Notas: Nombre dudoso.

Myosotis verna Nutt.
Sin.: *Eritrichium pampeanum* Speg., *Myosotis virginica* (L.) Britton, Stern & Poggenb.
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 965* (SI)].

Myosotis versicolor (Pers.) Sm. = **Myosotis discolor** Pers. subsp. **discolor**
Referencias: Moore, D. M. & Goodall, R. N., 1977.

Myosotis virginica (L.) Britton, Stern & Poggenb. = **Myosotis verna** Nutt.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Nama L., nom. cons.

Número de especies: 3

Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy
Sin.: *Hydrolea dichotoma* Ruiz & Pav., *Marylaunidium dichotomum* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy f. *amplifolia* Brand, *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc., *Nama dichotomum* (Ruiz & Pav.) Choisy var. *stricta* (Phil.) Brand, *Nama stricta* Phil.
Referencias: Borsini, O. H., 1946b; Deginani, N. B., 1983; Hitchcock, C. L., 1933b; Novara, L. J., 1993g.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3455* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 52* (CONC)].

Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy f. *amplifolia* Brand = **Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy var. *amplifolia* (Brand) C.L. Hitchc. = **Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

Nama dichotomum (Ruiz & Pav.) Choisy var. *stricta* (Phil.) Brand = **Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Nama echioides Griseb. = **Nama undulatum** Kunth var. **undulatum**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Nama echioides Griseb. var. *hispida* Griseb. = **Nama undulatum** Kunth var. **undulatum**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Nama jamaicense L.
Sin.: *Marylaunidium jamaicense* (L.) Kuntze
Referencias: Borsini, O. H., 1946b; Deginani, N. B., 1983; Hitchcock, C. L., 1933b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 23834* (LP, SI)].

Nama stricta Phil. = **Nama dichotomum** (Ruiz & Pav.) Choisy
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Nama undulatum Kunth var. **australe** C.L. Hitchc.
Referencias: Borsini, O. H., 1946b; Deginani, N. B., 1983; Hitchcock, C. L., 1933b.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SJU, SLU); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8971* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 5867* (G)].

Nama undulatum Kunth var. *hispidum* (Griseb.) Brand = **Nama undulatum** Kunth var. **undulatum**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Nama undulatum Kunth var. **undulatum**
Sin.: *Marylaunidium echioides* (Griseb.) Kuntze, *Marylaunidium undulatum* (Kunth) Kuntze, *Nama echioides* Griseb., *Nama echioides* Griseb. var. *hispida* Griseb., *Nama undulatum* Kunth var. *hispidum* (Griseb.) Brand
Referencias: Borsini, O. H., 1946b; Deginani, N. B., 1983; Hitchcock, C. L., 1933b; Novara, L. J., 1993g.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 174* (LP)].

Nesocaryum I.M. Johnst.
Número de especies: 1 endémica

Nesocaryum stylosum (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Heliotropium stylosum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Simpson s.n.* (SGO)].

Omphalodes Mill.
Número de especies: 1 introducida

Omphalodes linifolia (L.) Moench
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 38501* (CONC)].

Oxyosmyles viscosissima Speg. = **Ixorhea tschudiana** Fenzl

Patagonica americana (L.) Kuntze = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.
Referencias: Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006.

Patagonula alba Rojas Acosta, nom. nud. = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.
Referencias: Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006.

Patagonula americana L. = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Patagonula americana L. var. *glabra* Cham. = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Patagonula americana L. var. *hirsuta* Fresen. = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Patagonula australis Salisb. = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Patagonula fuscata Rojas Acosta, nom. nud. = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.
Referencias: Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006.

Patagonula glabra (Cham.) Miers = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Patagonula tweediana Miers = **Cordia americana** (L.) Gottschling & J.S. Mill.

Pectocarya DC. ex Meisn.
Número de especies: 5, 1 endémica, 1 introducida

Pectocarya anomala I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Nativa. 2300–2600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 79* (CONC)].

Pectocarya boliviana (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *boliviana* I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Hierba. Anual. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30575* (SI), *Cialdella, A. M. 424* (SI)].

Pectocarya chilensis DC. = **Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya dimorpha (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Sin.: *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2676* (CONC)].

Pectocarya gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. = **Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *boliviana* I.M. Johnst. = **Pectocarya boliviana** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *dimorpha* I.M. Johnst. = **Pectocarya dimorpha** (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval. = **Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya lateriflora Brand = **Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC.
Sin.: *Cynoglossum lineare* Ruiz & Pav., *Pectocarya chilensis* DC., *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Pectocarya gracilis* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. var. *genuina* I.M. Johnst., nom. inval., *Pectocarya lateriflora* Brand, *Pectocarya linearis* (Ruiz & Pav.) DC. var. *ferocula* I.M. Johnst.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Correa, M. N., 1999c; Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Introducida. 500–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9920* (SI), *Sanzin, R. 96* (SI)]; CHL[*Looser, G. 186h* (SI)].

Pectocarya linearis (Ruiz & Pav.) DC. var. *ferocula* I.M. Johnst. = **Pectocarya linearis** (Ruiz & Pav.) DC.
Referencias: Hitchcock, C. L., Cronquist, A. J. & Ownbey, F. M., 1959; Johnston, I. M., 1927.

Pectocarya pusilla (A. DC.) A. Gray
Sin.: *Gruvelia pusilla* A. DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 212* (G, NY)].

Phacelia Juss.

Número de especies: 9, 4 endémicas

Phacelia artemisioides Griseb.
Sin.: *Phacelia glandulosa* Nutt. var. *patagonica* Ball
Referencias: Deginani, N. B., 1982, 1999b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 28067* (SI), *Correa, M. N. 8576* (BAB)]; URY[*Rosengurtt, B. 2040* (SI)].

Phacelia boliviana Brand = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia brachyantha Benth.
Sin.: *Phacelia brachyantha* Benth. var. *paniculata* A. DC., *Phacelia clinopodioides* Bertero ex Brand, *Phacelia simplicifolia* Colla
Referencias: Brand, A., 1913; Deginani, N. B., 1982, 1983, 1999b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(IV, V, VI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8627* (LIL, SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (BAF)].

Phacelia brachyantha Benth. var. *paniculata* A. DC. = **Phacelia brachyantha** Benth.
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

Phacelia circinata (Willd.) Jacq. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia circinata (Willd.) Jacq. var. *acutiloba* DC. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia circinata (Willd.) Jacq. var. *obtusiloba* DC. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia circinata (Willd.) Jacq. var. *paniculata* DC. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia clinopodioides Bertero ex Brand = **Phacelia brachyantha** Benth.
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

[Phacelia congesta Hook.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray
Sin.: *Eutoca cumingii* Benth., *Eutoca frigida* Phil., *Eutoca grandis* Phil., *Eutoca litoralis* Phil., *Eutoca peraltae* Phil., *Eutoca pinnatifida* Phil., *Eutoca pusilla* Phil., *Microgenetes cumingii* A. DC., *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche, *Phacelia cumingii* (Benth.) A. Gray var. *pusilla* (Phil.) Reiche, *Phacelia frigida* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Brand, A., 1913; Deginani, N. B., 1982, 1983, 1999b.
Hierba. Anual. Endémica. 3200–3800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31629* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17253* (SI)].

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray var. *frigida* (Phil.) Brand = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray var. *grandis* (Phil.) Reiche = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray var. *litoralis* (Phil.) Reiche = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia cumingii (Benth.) A. Gray var. *pusilla* (Phil.) Reiche = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia foliosa Phil. = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia frigida (Phil.) Reiche = **Phacelia cumingii** (Benth.) A. Gray
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

Phacelia glandulosa Nutt. var. *patagonica* Ball = **Phacelia artemisioides** Griseb.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

[Phacelia hossei Brand]
Referencias: Deginani, N. B., 1982.
Notas: Nombre dudoso.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville f. *amoena* Brand = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville f. *andina* Brand = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville f. *genuina* Brand, nom. inval. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville f. *pinnata* (Vahl) Brand = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville f. *plantaginea* Brand = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia magellanica (Lam.) Coville f. *robusta* Brand = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia nana Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1982, 1983, 1999b.
Hierba. Anual. Nativa. 3500–4700 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 423* (SI), *Schwabe, H. 790* (LP, SI)]; CHL[*Marticorena, C. 352* (CONC)].

Phacelia parviflora Phil. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnata (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnata (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr. = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd.
Sin.: *Phacelia boliviana* Brand, *Phacelia foliosa* Phil., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb., *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* Reiche, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *lobulata* Hicken, *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd., *Phacelia viscosa* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Brand, A., 1913; Deginani, N. B., 1982, 1983, 1999b; Novara, L. J., 1993g.

Hierba. Perenne. Nativa. 1000–4600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, NEU, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8775* (SI, US)]; CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (SGO)].

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. f. *minor* Hicken = **Phacelia setigera** Phil. var. **humahuaquense** Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. var. *decumbens* Brand = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. var. *elatior* Griseb. = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. var. *foliosa* Reiche = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1982.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. var. *lobulata* Hicken = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnatifida Griseb. ex Wedd. var. *robusta* Wedd. = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia pinnatifida Griseb. var. *setigera* (Phil.) Reiche = **Phacelia setigera** Phil. var. **setigera**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

[Phacelia ramosissima Douglas ex Lehm. var. brunoniana A. DC.]
Notas: Nombre dudoso.

Phacelia sanzinii Hicken
Referencias: Deginani, N. B., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanzin, R. 33* (SI)].

Phacelia secunda J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Sin.: *Aldea pinnata* Ruiz & Pav., *Heliotropium pinnatum* Vahl, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *amoena* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *pinnata* (Vahl) Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *robusta* Brand, *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr., *Phacelia pinnata* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. var. *robusta* (Brand) J.F. Macbr., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance
Referencias: Brand, A., 1913; Deginani, N. B., 1982, 1999b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TUC); CHL(VII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5870* (LIL, LP, SI)]; CHL[*Prina, A. O. 2490* (SI, SRFA)].

Phacelia secunda J.F. Gmel. var. **secunda**
Sin.: *Aldea circinata* Willd., *Hydrophyllum magellanicum* Lam., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *acutiloba* DC., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *obtusiloba* DC., *Phacelia circinata* (Willd.) Jacq. var. *paniculata* DC., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *andina* Brand, *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *genuina* Brand, nom. inval., *Phacelia magellanica* (Lam.) Coville f. *plantaginea* Brand, *Phacelia parviflora* Phil., *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance, *Phacelia secunda* J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Brand, A., 1913; Deginani, N. B., 1982, 1983, 1999b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4077* (LP)]; CHL[*Constance, L. 3522* (SI)].

Phacelia secunda J.F. Gmel. subsp. *parviflora* (Phil.) Constance = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia secunda J.F. Gmel. subsp. *pinnata* (Ruiz & Pav.) Constance = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **pinnata** (Vahl) Deginani
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia secunda J.F. Gmel. subsp. *plantaginea* (Brand) Constance = **Phacelia secunda** J.F. Gmel. var. **secunda**
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Phacelia setigera Phil. var. **humahuaquense** Deginani
Sin.: *Phacelia pinnatifida* Griseb. ex Wedd. f. *minor* Hicken
Referencias: Deginani, N. B., 1982, 1983.
Hierba. Anual. Endémica. 4000–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17571* (LP)].

Phacelia setigera Phil. var. **setigera**
Sin.: *Phacelia pinnatifida* Griseb. var. *setigera* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Deginani, N. B., 1982, 1983, 1999b.
Hierba. Anual. Endémica. 4000–4800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, SAL, SJU); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 432* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 7006* (SI)].

Phacelia simplicifolia Colla = **Phacelia brachyantha** Benth.
Referencias: Deginani, N. B., 1999b.

Phacelia sinuata Phil.
Referencias: Deginani, N. B., 1982, 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11082* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17264* (SI)].

Phacelia viscosa Phil. = **Phacelia pinnatifida** Griseb. ex Wedd.
Referencias: Deginani, N. B., 1983.

Plagiobothrys Fisch. & C.A. Mey.

Número de especies: 18, 15 endémicas

Plagiobothrys albiflorus (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Plagiobothrys armeriifolius (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium armeriifolius* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[Philippi, R. A. s.n. (SGO)].

Plagiobothrys calandrinioides (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Allocarya alternifolia* Brand, *Allocarya humilis* Brand, p.p., *Eritrichium albiflorus* Griseb., *Eritrichium calandrinioides* Phil., *Eritrichium humile* Macloskie, hom. illeg., *Eritrichium uliginosum* auct. non Phil., *Plagiobothrys albiflorus* (Griseb.) R.L. Pérez-Mor. ex D.M. Moore, *Plagiobothrys lechleri* I.M. Johnst., *Plagiobothrys procumbens* Macloskie, hom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2360* (SI), *Troiani, H. O. 15295* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 114* (SI)].

Plagiobothrys collinus (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Cryptantha collina* (Phil.) Reiche, *Cryptantha inconspicua* (Phil.) Reiche, *Eritrichium collinum* Phil., *Eritrichium inconspicuum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2160* (CONC)].

Plagiobothrys congestus (Wedd.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium humile* DC. var. *congestum* Wedd.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Charpin, A. 20670ac* (SI), *Taylor, C. M. 11278* (SI)].

Plagiobothrys corymbosus (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Sin.: *Allocarya corymbosa* (Ruiz & Pav.) Brand, *Allocarya sessiliflora* Reiche, *Allocarya sessilifolia* Greene, *Cryptantha corymbosa* (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst., *Eritrichium sessiliflorum* A. DC., *Myosotis corymbosa* Ruiz & Pav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1991a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 3548* (SI), *Boelcke, O. 4398* (SI)]; CHL[*Quezada, M. 110* (CONC)].

Plagiobothrys foliosus I.M. Johnst.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuardo s.n.* (G)].

Plagiobothrys fulvus (Hook. & Arn.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium asperum* Phil., hom. illeg., *Eritrichium laxiflorum* Phil., *Myosotis fulva* Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 3026* (SI)].

Plagiobothrys germainii (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Allocarya germainii* (Phil.) Reiche, *Eritrichium germainii* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 956* (CONC)].

Plagiobothrys gracilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Sin.: *Echinospermum gracile* (Ruiz & Pav.) Lehm., *Myosotis gracilis* Ruiz & Pav., *Rochelia gracilis* (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(IV, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ruiz López, H. 1110* (MA)].

[Plagiobothrys humilis (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.]
Sin.: *Myosotis humilis* Ruiz & Pav.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Plagiobothrys lechleri I.M. Johnst. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

[Plagiobothrys mesembryanthemoides (Speg.) I.M. Johnst.]
Sin.: *Eritrichium mesembryanthemoides* Speg.
Notas: Nombre dudoso. Probablemente sea una Portulacaceae.

[Plagiobothrys muricatus (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.]
Sin.: *Lithospermum muricatum* Ruiz & Pav.
Notas: Nombre dudoso.

Plagiobothrys myosotoides (Lehm.) Brand
Sin.: *Eritrichium tinctorium* A. DC., *Plagiobothrys tinctorius* (Ruiz & Pav.) A. Gray
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 1285* (CONC)].

Plagiobothrys myosotoides (Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand = **Plagiobothrys verrucosus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Brand, A., 1931.

Plagiobothrys oppositifolius (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium limonium* Phil., *Eritrichium oppositifolius* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Plagiobothrys patagonicus I.M. Johnst. = **Plagiobothrys verrucosus** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.

Plagiobothrys pedicellaris (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO)].

Plagiobothrys polycaulis (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium bracteatum* Phil., *Eritrichium delicatulum* Phil., *Eritrichium graminifolium* Phil., *Eritrichium polycaule* Phil., *Eritrichium vernum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 77* (CONC)].

Plagiobothrys pratensis (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium pratense* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 57155* (CONC)].

Plagiobothrys procumbens Macloskie, hom. illeg. = **Plagiobothrys calandrinioides** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Moore, D. M., 1974.

Plagiobothrys procumbens (Colla) A. Gray
Sin.: *Allocarya procumbens* (Colla) Greene, *Myosotis procumbens* Colla
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 7188* (CONC)].
Notas: Citada para la provincia de Neuquén, Argentina, sin indicar material de referencia (Chiapella & Ezcurra, 1999).

Plagiobothrys pulchellus (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium pulchellum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 9414* (CONC)].

[Plagiobothrys pygmaeus (Kunth) I.M. Johnst.]
Sin.: *Anchusa pygmaea* Kunth, *Eritrichium pygmaeum* Wedd.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Plagiobothrys tinctorius (Ruiz & Pav.) A. Gray = **Plagiobothrys myosotoides** (Lehm.) Brand

Plagiobothrys uliginosus (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Allocarya pedicellaris* (Phil.) Reiche, *Allocarya uliginosa* (Phil.) Greene, *Eritrichium pedicellare* Phil., *Eritrichium uliginosum* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 567* (CONC)].

Plagiobothrys verrucosus (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Eritrichium verrucosum* Phil., *Plagiobothrys myosotoides* (Lehm.) Brand var. *patagonicus* (I.M. Johnst.) Brand, *Plagiobothrys patagonicus* I.M. Johnst.
Referencias: Brand, A., 1931; Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1927.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32942* (SI), *Troiani, H. O. 15456* (SI)]; CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Rochelia gracilis (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr. = **Plagiobothrys gracilis** (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Saccellium lanceolatum Humb. & Bonpl. = **Cordia saccelia** Gottschling & J.S. Mill.
Referencias: Gottschling, M. & Miller, J. S., 2006.

Schleidenia ocellata (Cham.) Fresen. = **Heliotropium ocellatum** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Schleidenia salicoides (Cham.) Fresen. = **Heliotropium salicoides** Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1928.

Selkirkia Hemsl.

Número de especies: 1 endémica

Selkirkia berteroi (Colla) Hemsl.
Sin.: *Cynoglossum berteroi* Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1927.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 132* (CONC)].

Symphytum L.

Número de especies: 1 introducida

Symphytum officinale L.
Referencias: Molfino, J. F., 1925c.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1326* (SI)].

Thaumatocaryon Baill.

Número de especies: 1

Thaumatocaryon tetraquetrum (Cham.) I.M. Johnst.
Sin.: *Anchusa tetraquetra* Cham., *Moritzia tetraquetra* (Cham.) Brand
Referencias: Johnston, I. M., 1927; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 95* (SI), *Guaglianone, E. R. 2945* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15230* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5885* (SI)].

Tiquilia Pers.

Número de especies: 6, 1 endémica

Tiquilia atacamensis (Phil.) A.T. Richardson
Sin.: *Coldenia atacamensis* Phil.
Referencias: Richardson, A. T., 1976.
Subarbusto. Endémica. 0–3500 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3009* (CONC)].

Tiquilia grandiflora (Phil.) A.T. Richardson
Sin.: *Coldenia grandiflora* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Richardson, A. T., 1976.
Subarbusto. Nativa. 1400 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 743* (SI)].

Tiquilia litoralis (Phil.) A.T. Richardson
Sin.: *Coldenia littoralis* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Richardson, A. T., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–1300 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3530* (SI)].

Tiquilia nuttallii (Hook.) A.T. Richardson
Sin.: *Coldenia decumbens* Hauman, *Coldenia nuttallii* Hook., *Tiquiliopsis nuttallii* A. Heller
Referencias: Correa, M. N., 1999c; Johnston, I. M., 1925, 1935a.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Prina, A. O. 1529* (SI)].

Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson
Sin.: *Coldenia paronychioides* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Richardson, A. T., 1976.
Subarbusto. Nativa. 0–3300 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Martin, H. C. 566* (SI), *Werdermann, E. 705* (SI)].

Tiquilia tacnensis A.T. Richardson
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Nativa. 1900–2000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 974* (CONC)].

Tiquiliopsis nuttallii A. Heller = **Tiquilia nuttallii** (Hook.) A.T. Richardson
Referencias: Johnston, I. M., 1925.

Tournefortia L.

Número de especies: 6

Tournefortia bicolor Sw.
Referencias: Cavalheiro, L., Fernandes Peralta, D. & Furlan, A., 2003; Johnston, I. M., 1930.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gentry, A. H. 49845* (MO)]; PRY[*Hassler, E. 5185* (BM, G, K, NY)].

Tournefortia breviflora DC.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Ariza Espinar, L., 2003; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Johnston, I. M., 1930.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CEN, PAI); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 4181* (LP)]; BRA[*Hatschbach, G. 2747* (SI)]; PRY[*Basualdo, I. 1437* (FCQ, MO)]; URY[*Alonso Paz, E. 3655* (MVFQ)].

Tournefortia elegans Cham. = **Tournefortia paniculata** Cham. var. **paniculata**
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Tournefortia grandifolia auct. non Fresen. = **Tournefortia paniculata** Cham. var. **austrina** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Tournefortia heliotropioides Hook. = **Heliotropium nicotianaefolium** Poir.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Tournefortia lilloi I.M. Johnst.
Sin.: *Tournefortia undulata* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Johnston, I. M., 1930; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Arbusto. Nativa. 500–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32779* (SI), *Morrone, O. 3725* (SI), *Morrone, O. 3808* (SI), *Rodríguez, D. 1015* (SI), *Venturi, S. 7472* (SI)].

Tournefortia paniculata Cham. var. **austrina** I.M. Johnst.
Sin.: *Tournefortia grandifolia* auct. non Fresen.

Referencias: Di Fulvio, T. E., 1967; Johnston, I. M., 1930; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11082* (SI), *Jörgensen, P. 61* (SI), *Morrone, O. 3943* (SI), *Venturi, S. 8176* (SI)].

Tournefortia paniculata Cham. var. **paniculata**
Sin.: *Tournefortia elegans* Cham.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 1807* (SI), *Guaglianone, E. R. 2898* (SI), *Rotman, A. D. 911* (SI), *Xifreda, C. C. 434* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 10503* (CTES)]; PRY[*Ferrucci, M. S. 1571* (CTES, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15891* (MVFA)].

[Tournefortia polystachya Ruiz & Pav.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Tournefortia psilostachya Kunth]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Johnston, I. M., 1930; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31347* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 1642* (SI), *O'Donell, C. A. 3169* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 8900* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 42714* (SI), *Zardini, E. M. 4579* (FCQ, MO)].

Tournefortia salzmannii DC.
Sin.: *Tournefortia salzmannii* DC. var. *blanchetiana* Chodat & Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Johnston, I. M., 1930; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, AMA, CEN, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30563* (SI), *Morrone, O. 4042* (SI), *Morrone, O. 4068* (SI), *Venturi, S. 5059* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 34589* (SI), *Zardini, E. M. 8155* (MO)].

Tournefortia salzmannii DC. var. *blanchetiana* Chodat & Hassl. = **Tournefortia salzmannii** DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

Tournefortia undulata Griseb., hom. illeg. = **Tournefortia lilloi** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.

[Tournefortia volubilis L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Valentina patagonica Speg. = **Heliotropium patagonicum** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Valentiniella patagonica (Speg.) Speg. = **Heliotropium patagonicum** (Speg.) I.M. Johnst.
Referencias: Gangui, N., 1955; Johnston, I. M., 1928.

Varronia P. Browne

Número de especies: 7

Varronia axillaris (I.M. Johnst.) Borhidi
Sin.: *Cordia axillaris* I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Arbusto. Nativa. 200–300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 9023* (SI), *Morrone, O. 1214* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 43494* (CTES)].

Varronia curassavica Jacq.
Sin.: *Cordia chacoensis* Chodat, *Cordia curassavica* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia salicina* DC., *Cordia verbenacea* DC.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Estrada Sánchez, J., 1995; Gaviria, J., 1987; Johnston, I. M., 1930; Pérez-Moreau, R. L., 1994; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, MIE); URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33892* (SI), *Morrone, O. 1758* (SI), *Zuloaga, F. O. 6558* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37730* (SI), *Reineck, E. M. 125* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2950* (FCQ), *Pedersen, T. M. 6544* (SI), *Schinini, A. 14945* (CTES, SI)]; URY[*Brussa, C. s.n.* (MVJB)].

[Varronia cylindrostachya Ruiz & Pav.]
Sin.: *Cordia cylindrostachya* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult., *Cordia floribunda* (Desv.) Spreng.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Varronia dichotoma Ruiz & Pav.
Sin.: *Cordia bifurcata* Roem. & Schult., *Cordia corymbosa* (L.) G. Don f. *detonsa* I.M. Johnst.
Referencias: Estrada Sánchez, J., 1995; Johnston, I. M., 1930; Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L., 1983; Pérez-Moreau, R. L., 1994; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 200–1500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(CAN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(COL, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26341* (SI), *Morrone, O. 2082* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37394* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1535* (BM, CTES, MO, PY), *Jörgensen, P. 3735* (SI)]; URY[*Krapovickas, A. 12582* (SI)].

Varronia guaranitica (Chodat & Hassl.) J.S. Mill.
Sin.: *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Cordia guaranitica* Chodat & Hassl. var. *pedunculosa* Chodat & Hassl.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, SAL); PRY(CAA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 2262* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 22* (SI)].

Varronia paraguariensis (Chodat & Hassl.) Borhidi = **Cordia paraguariensis** Chodat & Hassl.

Varronia paucidentata (Fresen.) Friesen
Sin.: *Cordia paucidentata* Fresen., *Cordia paucidentata* Fresen. var. *subulata* Chodat & Hassl., *Cordia paucidentata* Fresen. var. *valenzuelensis* Chodat, *Cordia uruguaya* Arechav.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, MIE); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 16043* (SI), *Krapovickas, A. 16928* (SI), *Rodríguez, F. M. 6* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 9017* (CTES)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5176* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 996b* (SI)].

Varronia polycephala Lam.
Sin.: *Cordia discolor* Cham., *Cordia hermanniefolia* Cham., *Cordia monosperma* (Jacq.) Roem. & Schult., *Cordia polycephala* (Lam.) I.M. Johnst., *Cordia ulmifolia* (Juss.) DC.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 8166* (FCQ, MO)].

Varronia villicaulis (Fresen.) Borhidi
Sin.: *Cordia caaguazuensis* Chodat, *Cordia sessilifolia* Cham. var. *tomentosa* (Chodat & Hassl.) I.M. Johnst., *Cordia villicaulis* Fresen., *Cordia villicaulis* Fresen. var. *tomentosa* Chodat & Hassl.
Referencias: Johnston, I. M., 1930.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, CAU, COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10936* (S)]; PRY[*Hassler, E. 9108* (G)].

BRASSICACEAE

Autores: Al-Shehbaz, I. A.

71 géneros, 301 especies, 181 especies endémicas, 71 especies introducidas.

Aethionema R. Br.
Número de especies: 1 introducida

Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Sin.: *Thlaspi saxatile* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1696* (SI)].

Agallis lanata (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz = **Tropidocarpum lanatum** (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 2001.

Agallis montana Phil. = **Tropidocarpum lanatum** (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 2001.

Alliaria Heist. ex Fabr.
Número de especies: 1 introducida

Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Sin.: *Arabis petiolata* M. Bieb.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005; Puntieri, J. G. & Brion, C. A. M., 2003b.
Hierba. Bianual. Introducida. 400–800 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Puntieri, J. G. 461* (BCRU)].

Alyssum L.
Número de especies: 1 introducida

Alyssum alyssoides (L.) L.
Sin.: *Clypeola alyssoides* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1964a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33094* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 12462* (BAA, BAB, SI)].

Alyssum boliviense Muschl. = **Physaria urbaniana** (Muschl.) O'Kane & Al-Shehbaz
Referencias: O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.

Alyssum maritimum (L.) Lam. = **Lobularia maritima** (L.) Desv.
Referencias: Borgen, L., 1987.

Alyssum mendocinum (Phil.) Kuntze = **Physaria mendocina** (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.

Alyssum urbanianum Muschl. = **Physaria urbaniana** (Muschl.) O'Kane & Al-Shehbaz
Referencias: O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.

Arabidopsis Heynh.
Número de especies: 1 introducida

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Sin.: *Arabis thaliana* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(SCR); CHL(VIII, IX, X, XI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12860* (BAA, BAB)]; CHL[*Gunckel, L. H. 37606* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 447* (GH, MO, NY, SI, UC)].

Arabis L.

Número de especies: 1 introducida

Arabis alpina L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rechencq, F. s.n.* (CRP)].

Arabis bracteata Wedd. = **Weberbauera peruviana** (DC.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004c; Romanczuk, M. C., 1982.

Arabis commersonii DC. = **Cardamine chenopodiifolia** Pers.
Referencias: Boelcke, O., 1976.

Arabis drabaeformis Schltdl. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Arabis lanata Walp. = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Arabis macloviana (d'Urv.) Hook. f. = **Phlebolobium maclovianum** (d'Urv.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Arabis macloviana Reiche, hom. illeg. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Arabis magellanica (Juss. ex Pers.) Dusén = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Arabis petiolata M. Bieb. = **Alliaria petiolata** (M. Bieb.) Cavara & Grande

Arabis spathulata (Poir.) DC. = **Cardamine chenopodiifolia** Pers.
Referencias: Boelcke, O., 1976.

Arabis tarapacana Phil. = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Arabis thaliana L. = **Arabidopsis thaliana** (L.) Heynh.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Armoracia valdiviana Phil. = **Hollermayera valdiviana** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981e.

Aschersoniodoxa Gilg & Muschl.

Número de especies: 1

Aschersoniodoxa cachensis (Speg.) Al-Shehbaz
Sin.: *Braya cachensis* Speg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990d.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–5100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3456* (BAA, SI, US)].

Ateixa andina (O.E. Schulz) Ravenna = **Sarcodraba andina** O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.

Barbarea R. Br.

Número de especies: 2 introducidas

[Barbarea intermedia Boreau]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Barbarea praecox R. Br. = **Barbarea verna** (Mill.) Asch.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1988.

Barbarea verna (Mill.) Asch.
Sin.: *Barbarea praecox* R. Br., *Erysimum vernum* Mill.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1988.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonarelli, G. 3882* (BA)]; CHL[*Joseph, F. C. 1017* (US)].

Barbarea vulgaris R. Br.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9096* (BAB)].

Biscutella chilensis Lag. ex DC. = **Cremolobus chilensis** (Lag. ex DC.) DC.
Referencias: Khanna, P. K. & Rollins, R. C., 1965.

Brassica L.

Número de especies: 5 introducidas

Brassica antarctica Molina = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.

Brassica campestris L. = **Brassica rapa** L.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1985; Heywood, V. H., 1964.

Brassica juncea (L.) Czern.
Sin.: *Sinapis juncea* L.
Referencias: Boelcke, O., 1987.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS, SAL, SJU); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3147* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1997* (CTES, K, MO)].

Brassica macloviana d'Urv. = **Phlebolobium maclovianum** (d'Urv.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Brassica magellanica Juss. ex Pers. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Brassica napus L.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(ERI, JUJ); CHL(IV, VIII, IX, X, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5283* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 8331* (CONC)].

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
Sin.: *Sinapis nigra* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, RNE, SAL, SFE); CHL(II, III, IV, V, VIII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14564* (BAA, MO)]; CHL[*Garaventa, A. 491* (SI)].

Brassica oleracea L.
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: CHL(X, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Meyer, F. G. 9351* (K)].

Brassica rapa L.
Sin.: *Brassica campestris* L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1125* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 16554* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1999* (SI)]; URY[*Felippone, F. 2662* (SI)].

Brassica vesicaria L. = **Eruca vesicaria** (L.) Cav.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Braya cachensis Speg. = **Aschersoniodoxa cachensis** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990d.

Braya glebaria Speg. = **Xerodraba glebaria** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Braya imbricatifolia (Barnéoud) A. Gray = **Weberbauera imbricatifolia** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Braya lycopodioides Speg. = **Xerodraba lycopodioides** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Braya lycopodioides Speg. var. *contracta* Speg. = **Xerodraba lycopodioides** (Speg.) Skottsb.

Braya monantha (Gilg ex Kuntze) Speg. = **Xerodraba monantha** (Gilg ex Kuntze) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Braya monimocalyx Gilg & Muschl. ex Hosseus, nom. nud. = **Brayopsis monimocalyx** O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989c.

Braya patagonica Speg. = **Xerodraba patagonica** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Braya pectinata Speg. = **Xerodraba pectinata** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Braya pycnophylloides Speg. = **Xerodraba pycnophylloides** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Brayopsis Gilg & Muschl.

Número de especies: 2

Brayopsis calycina (Desv.) Gilg & Muschl.
Sin.: *Draba calycina* Desv.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989c.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3887* (BAA, C, K)].

Brayopsis hauthalii (Gilg & Muschl.) Skottsb. = **Eudema hauthalii** Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990b; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Brayopsis monimocalyx O.E. Schulz
Sin.: *Braya monimocalyx* Gilg & Muschl. ex Hosseus, nom. nud.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989c.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3492* (BAA, LIL, SI)].

Brayopsis skottsbergii Gilg = **Eudema hauthalii** Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990b; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Bursa procumbens (L.) Kuntze = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Boelcke, O., 1974.

Cakile Mill.

Número de especies: 1 introducida

Cakile maritima Scop.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Rodman, J. E., 1974.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MAL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 7058* (BAB)]; URY[*Hunziker, J. H. 3926* (BAB)].

Camelina Crantz

Número de especies: 3 introducidas

Camelina alyssum (Mill.) Thell.
Sin.: *Camelina parodii* Ibarra & La Porte, *Camelina sativa* (L.) Crantz var. *dentata* (Willd.) Ibarra & La Porte, *Myagrum alyssum* Mill.
Referencias: Boelcke, O., 1967; Ibarra, F. E. & La Porte, J. S., 1947.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, SFE); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Miatello, L. 108* (SI)]; CHL[*Teillier A., S. 5186* (CONC)].

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10208* (BAA, BAB, SI)].

Camelina parodii Ibarra & La Porte = **Camelina alyssum** (Mill.) Thell.
Referencias: Boelcke, O., 1967.

Camelina sativa (L.) Crantz
Sin.: *Myagrum sativum* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Ibarra, F. E. & La Porte, J. S., 1947.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SFE); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 7360* (BAB)]; URY[*Rosengurtt, B. 4371* (MVFA)].

Camelina sativa (L.) Crantz var. *dentata* (Willd.) Ibarra & La Porte = **Camelina alyssum** (Mill.) Thell.
Referencias: Boelcke, O., 1967.

Capsella Medik.

Número de especies: 1 introducida

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Sin.: *Thlaspi bursa-pastoris* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1123* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43933* (CTES)]; CHL[*Yunge, C. 8114* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 445* (GH, NY, SI)].

Capsella procumbens (L.) Fr. = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Appel, O. & Al-Shehbaz, I. A., 1998; Boelcke, O., 1974.

Cardamine L.

Número de especies: 18, 13 endémicas, 3 introducidas

Cardamine affinis Hook. & Arn. = **Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.

Cardamine africana L.
Referencias: Schulz, O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1378* (MO, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12783* (B, F, MO, P)].

Cardamine alsophila Phil. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine andicola Phil. = **Cardamine cordata** Barnéoud

Cardamine andina Phil. = **Cardamine cordata** Barnéoud

Cardamine antiscorbutica Banks & Sol. ex Hook. f. = **Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine antiscorbutica Banks & Sol. ex Hook. f. var. *andicola* Albov = **Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Cardamine antiscorbutica Banks & Sol. ex Hook. f. var. *pauciflora* Speg. = **Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Cardamine antiscorbutica Banks & Sol. ex Hook. f. var. *umbrosa* Albov = **Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Cardamine axillaris Wedd. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine axillaris Wedd. var. *tucumanensis* Griseb. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine bonariensis Pers.
Sin.: *Cardamine alsophila* Phil., *Cardamine axillaris* Wedd., *Cardamine axillaris* Wedd. var. *tucumanensis* Griseb., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *flaccida* (Cham. & Schltdl.) J.F. Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *minima* (Steud.) J.F. Macbr., *Cardamine bonariensis* Pers. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz, *Cardamine bracteata* Phil., *Cardamine caespitosa* Phil., *Cardamine cymbalaria* Chodat & Wilczek, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl., *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *alsophila* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *bonariensis* (Pers.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. subsp. *minima* (Steud.) O.E. Schulz, *Cardamine flaccida* Cham. & Schltdl. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz, *Cardamine minima* Steud., *Cardamine nasturtioides* Cambess., *Cardamine nemophila* Phil., *Cardamine pusilla* Phil., *Cardamine ramosissima* Steud., *Cardamine tridens* Phil.
Referencias: Boelcke, O., 1987; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SCR, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); PRY(APA); URY(CAS, FLA, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 2903* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4661* (US)]; CHL[*Garaventa, A. 4515* (SI)]; PRY[*Croat, T. B. 89834* (MO)]; URY[*Herter, G. 2258* (MO)].

Cardamine bonariensis Pers. var. *flaccida* (Cham. & Schltdl.) J.F. Macbr. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine bonariensis Pers. var. *minima* (Steud.) J.F. Macbr. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine bonariensis Pers. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine bracteata Phil. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine caespitosa Phil. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine calbucana Phil. = **Cardamine cordata** Barnéoud
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine callitrichoides Speg. = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine chenopodiifolia Pers.
Sin.: *Arabis commersonii* DC., *Arabis spathulata* (Poir.) DC., *Sisymbrium bellidifolium* Poir.
Referencias: Boelcke, O., 1987; Schulz, O. E., 1903.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(RGS, SCA); CHL(IJF); PRY(GUA); URY(CAS, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26966* (BACP, K, SI)]; BRA[*Rambo, B. 48797* (SI)]; CHL[*Reed, E. C. s.n.* (SGO)]; PRY[*Balansa, B. 2622* (P)]; URY[*Herter, G. 71215* (G, GH, K, MO, S, SI, UC)].

Cardamine chilensis DC.
Sin.: *Cardamine callitrichoides* Speg., *Cardamine chilensis* DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *nana* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine chilensis* DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche, *Cardamine micropetala* Phil., *Cardamine nana* Barnéoud, *Cardamine solisii* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil., *Cardamine valdiviana* Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz, *Cardamine vulgaris* Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Schulz, O. E., 1903.
Hierba. Anual o perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SAL); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19893* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 2024* (CONC, SI)].

Cardamine chilensis DC. var. *angustifolia* O.E. Schulz = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine chilensis DC. var. *nana* (Barnéoud) O.E. Schulz = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine chilensis DC. var. *valdiviana* (Phil.) Reiche = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine clandestina (Spreng.) Kuntze = **Rorippa clandestina** (Spreng.) J.F. Macbr.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Cardamine colchaguensis Barnéoud = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Cardamine cordata Barnéoud
Sin.: *Cardamine andicola* Phil., *Cardamine andina* Phil., *Cardamine calbucana* Phil., *Cardamine cordata* Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Cardamine decumbens* Barnéoud, *Cardamine monticosa* Phil., *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Cardamine peteroana* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *alpina* Chodat & Wilcz.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11304* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1313* (CAS, CONC, F, G, GH, MO, NY, SI, UC, US)].

Cardamine cordata Barnéoud var. *decumbens* (Barnéoud) O.E. Schulz = **Cardamine cordata** Barnéoud

Cardamine cremnophila I.M. Johnst. = **Ivania cremnophila** (I.M. Johnst.) O.E. Schulz

Cardamine cymbalaria Chodat & Wilczek = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine decumbens Barnéoud = **Cardamine cordata** Barnéoud

Cardamine deserticola Phil. = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. var. *tucumanensis* (Griseb.) O.E. Schulz = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. subsp. *alsophila* (Phil.) O.E. Schulz = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. subsp. *bonariensis* (Pers.) O.E. Schulz = **Cardamine bonariensis** Pers.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine flaccida Cham. & Schltdl. subsp. *minima* (Steud.) O.E. Schulz = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine flavescens Phil. = **Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine flexuosa With.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rotman, A. D. 691* (SI)].

Cardamine garaventae O.E. Schulz = **Cardamine vulgaris** Phil.

Cardamine geraniifolia (Poir.) DC.
Sin.: *Dentaria geraniifolia* (Poir.) Reiche, *Sisymbrium geraniifolium* Poir.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA, BAA, SI)]; CHL[*Donat, A. 345* (BA, BM, CAS, F, K)].

Cardamine glacialis (G. Forst.) DC.
Sin.: *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Hook. f., *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *andicola* Albov, *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *pauciflora* Speg., *Cardamine antiscorbutica* Banks & Sol. ex Hook. f. var. *umbrosa* Albov, *Cardamine glacialis* (G. Forst.) DC. var. *pubescens* O.E. Schulz, *Sisymbrium glaciale* G. Forst.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3101* (BAA, BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92047* (CONC, SGO)].

Cardamine glacialis (G. Forst.) DC. var. *pubescens* O.E. Schulz = **Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.

Cardamine grandjotii O.E. Schulz = **Cardamine vulgaris** Phil.

Cardamine hilariana Walp. = **Rorippa hilariana** (Walp.) Cabrera
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Cardamine hirsuta L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, NEU, RNE, SAL, SJU, TUC); BRA(RGS); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19090* (BACP, SI)]; BRA[*Bueno, O. L. 3665* (F)]; CHL[*Garaventa, A. 400* (SI)]; URY[*Rodriguez, H. 8524* (MVFA)].

Cardamine hirsuta L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche = **Cardamine vulgaris** Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine hispidula Phil.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Schulz, O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LRI); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 418* (CORD)]; CHL[*Puga, F. s.n.* (SGO)].

Cardamine integrifolia Phil., nom. illeg. = **Cardamine variabilis** Phil.

Cardamine integrifolia Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz = **Cardamine variabilis** Phil.

Cardamine kruesselii Johow ex Reiche
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johow, F. R. A. s.n.* (CONC)].

Cardamine macrostachya Phil. = **Cardamine vulgaris** Phil.

Cardamine marginata Phil.
Sin.: *Cardamine vulgaris* Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Schulz, O. E., 1903.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 5254* (CONC)].

Cardamine micropetala Phil. = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine minima Steud. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine monticosa Phil. = **Cardamine cordata** Barnéoud
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine nana Barnéoud = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine nasturtioides Cambess. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine nemophila Phil. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine nivalis Gillies ex Hook. & Arn. = **Cardamine volckmannii** Phil.

Cardamine nivalis Gillies ex Hook. & Arn. subsp. *andina* (Phil.) O.E. Schulz = **Cardamine cordata** Barnéoud

Cardamine patagonica Speg. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Cardamine pentaphylla Phil. = **Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.

Cardamine peteroana Phil. = **Cardamine cordata** Barnéoud

Cardamine petiolulata Phil. ex O.E. Schulz = **Cardamine volckmannii** Phil.

[Cardamine pratensis L.]
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cardamine pusilla Phil. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine ramosissima Steud. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine reniformis Phil. = **Cardamine rostrata** Griseb.

Cardamine rostrata Griseb.
Sin.: *Cardamine reniformis* Phil., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4521* (BACP, CONC, SI)].

Cardamine rostrata Griseb. var. *alpina* Chodat & Wilcz. = **Cardamine cordata** Barnéoud
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Cardamine rostrata Griseb. var. *dichondroides* Speg. = **Cardamine variabilis** Phil.

Cardamine rostrata Griseb. var. *reniformis* (Phil.) O.E. Schulz = **Cardamine rostrata** Griseb.

Cardamine solisii Phil. = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine tenuirostris Hook. & Arn.
Sin.: *Cardamine affinis* Hook. & Arn., *Cardamine flavescens* Phil., *Cardamine pentaphylla* Phil., *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz, *Cardamine tenuirostris* Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz, *Nasturtium stenophylllum* F. Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 1243* (BACP)]; CHL[*Montero, G. 5346* (BACP, CONC, SI)].

Cardamine tenuirostris Hook. & Arn. subsp. *affinis* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz = **Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.

Cardamine tenuirostris Hook. & Arn. subsp. *reicheana* O.E. Schulz = **Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.

Cardamine thermarum Martic. = **Cardamine variabilis** Phil.

Cardamine tridens Phil. = **Cardamine bonariensis** Pers.

Cardamine tuberosa DC.
Sin.: *Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, IX, XI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4526* (BAA, CONC, SI)].

Cardamine tuberosa DC. subsp. *cognata* (Steud.) O.E. Schulz = **Cardamine tuberosa** DC.
Referencias: Schulz, O. E., 1903.

Cardamine valdiviana Phil. = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine valdiviana Phil. var. *callitrichoides* (Speg.) O.E. Schulz = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine variabilis Phil.
Sin.: *Cardamine integrifolia* Phil. var. *diversifolia* O.E. Schulz, *Cardamine integrifolia* Phil., nom. illeg., *Cardamine rostrata* Griseb. var. *dichondroides* Speg., *Cardamine thermarum* Martic., *Cardamine variabilis* Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz, *Sisymbrium simpsonii* Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Schulz, O. E., 1903.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13717* (BAA, BAB, BACP, SI)]; CHL[*Garaventa, A. 4603* (BACP, SI)].

Cardamine variabilis Phil. var. *pinnatisecta* O.E. Schulz = **Cardamine variabilis** Phil.

Cardamine volckmannii Phil.
Sin.: *Cardamine nivalis* Gillies ex Hook. & Arn., *Cardamine petiolulata* Phil. ex O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13963* (BAA, BACP, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 257* (CAS, CONC, E, F, G, GH, MO, S, SI, UC)].

Cardamine vulgaris Phil. var. *marginata* (Phil.) O.E. Schulz = **Cardamine marginata** Phil.

Cardamine vulgaris Phil. var. *micropetala* (Phil.) O.E. Schulz = **Cardamine chilensis** DC.

Cardamine vulgaris Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz = **Cardamine vulgaris** Phil.

Cardamine vulgaris Phil.
Sin.: *Cardamine garaventae* O.E. Schulz, *Cardamine grandjotii* O.E. Schulz, *Cardamine hirsuta* L. var. *vulgaris* (Phil.) Reiche, *Cardamine macrostachya* Phil., *Cardamine vulgaris* Phil. var. *oligozyga* O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TUC); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 8988* (BAA, G, MO, SI)]; CHL[*Garaventa, A. 4617* (BAA, CONC, SI)].

Cardaria chalepensis (L.) Hand.-Mazz. = **Lepidium chalepense** L.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Cardaria draba (L.) Desv. = **Lepidium draba** L.

Cardaria draba (L.) Desv. var. *chalepensis* (L.) O.E. Schulz = **Lepidium chalepense** L.

Cardaria pubescens (C.A. Mey.) Jarm. = **Lepidium appelianum** Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Cheiranthus incanus L. = **Matthiola incana** (L.) R. Br.

Cheiranthus maritimus L. = **Malcolmia maritima** (L.) R. Br.

Chilocardamum O.E. Schulz
Número de especies: 4 endémicas

Chilocardamum castellanosii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium castellanosii* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 3715* (BAA)].

Chilocardamum longistylum (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium longistylum* Romanczuk
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2118* (BAA)].

Chilocardamum onuridifolium (Ravenna) Al-Shehbaz
Sin.: *Dimitria onuridifolia* Ravenna, *Sisymbrium onuridifolium* (Ravenna) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 172* (SI)].

Chilocardamum patagonicum (Speg.) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium flexicaule* Dusén, *Sisymbrium patagonicum* Speg., *Thelypodium flexicaule* (Dusén) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982; Schulz, O. E., 1924.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (BAA, LP)].

Chorispora DC.
Número de especies: 1 introducida

Chorispora tenella (Pall.) DC.
Sin.: *Raphanus tenellus* Pall.
Referencias: Boelcke, O., 1964a.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 746* (SI)].

Clypeola alyssoides L. = **Alyssum alyssoides** (L.) L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Clypeola maritima L. = **Lobularia maritima** (L.) Desv.
Referencias: Borgen, L., 1987.

Cochlearia L.
Número de especies: 1 introducida

Cochlearia coronopus L. = **Lepidium coronopus** (L.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004a.

Cochlearia officinalis L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vallentin, E. F. s.n.* (K)].

Coronopus australis (Hook. f.) Speg. = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Coronopus didymus (L.) Sm. = **Lepidium didymum** L.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Coronopus didymus (L.) Sm. subsp. *australis* (Hook. f.) Muschl. = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Coronopus leptocarpus Boelcke = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce

Coronopus leptocarpus Boelcke var. *microcarpus* Boelcke = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce

Coronopus pinnatifidus Dulac var. *australis* (Hook. f.) Reiche = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Coronopus rhytidocarpus (Hook.) Macloskie = **Lepidium rhytidocarpum** (Hook.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Coronopus serratus (Poir.) Desv. = **Lepidium serratum** (Poir.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. = **Lepidium coronopus** (L.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004a.

Cremolobus DC.

Número de especies: 2

Cremolobus chilensis (Lag. ex DC.) DC.
Sin.: *Biscutella chilensis* Lag. ex DC., *Urbanodoxa tarapacana* Ricardi & Martic.
Referencias: Khanna, P. K. & Rollins, R. C., 1965.
Hierba. Anual. Nativa. 0–4400 m.
Países: ARG(TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5281* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 157* (CONC, GH)].

[Cremolobus linearifolius Hook. & Arn.]
Notas: Nombre dudoso, posiblemente una especie de *Menonvillea*.

Cremolobus subscandens Kuntze
Referencias: Khanna, P. K. & Rollins, R. C., 1965.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dinelli, C. 5108* (GH)].

Cymatoptera chilensis Turcz. = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Decaptera trifida Turcz. = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Delpinoella patagonica Speg. = **Delpinophytum patagonicum** (Speg.) Speg.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Delpinophytum Speg.

Número de especies: 1 endémica

Delpinophytum patagonicum (Speg.) Speg.
Sin.: *Delpinoella patagonica* Speg.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Blake, M. E. 450* (SI)].

Dentaria geraniifolia (Poir.) Reiche = **Cardamine geraniifolia** (Poir.) DC.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Descurainia Webb & Berthel.

Número de especies: 20, 14 endémicas, 2 introducidas

Descurainia adpressa Boelcke
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8767* (SI)].

Descurainia altoandina Romanczuk
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Bianual. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11248* (BAB, SI)].

Descurainia antarctica (E. Fourn.) O.E. Schulz
Sin.: *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *bonarelli* O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia antarctica* (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *purpureola* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *patagonica* Speg., *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *purpureola* Speg., *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *leiocarpa* O.E. Schulz, *Descurainia glandulifera* (Speg.) Gilg & Muschl., *Sisymbrium antarcticum* E. Fourn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12638* (BAB)]; CHL[*Moore, D. M. 68* (SI)].

Descurainia antarctica (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *bonarelli* O.E. Schulz = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Descurainia antarctica (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Speg.) O.E. Schulz = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Descurainia antarctica (E. Fourn.) O.E. Schulz var. *purpureola* (Speg.) O.E. Schulz = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Descurainia appendiculata (Griseb.) O.E. Schulz
Sin.: *Descurainia appendiculata* (Griseb.) O.E. Schulz var. *angustisecta* O.E. Schulz, *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl var. *appendiculata* (Griseb.) Hosseus, *Sisymbrium canescens* Nutt. var. *appendiculatum* Griseb.
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Prina, A. O., 1995a.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, O. E. 39* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1526* (MVFA)].

Descurainia appendiculata (Griseb.) O.E. Schulz var. *angustisecta* O.E. Schulz = **Descurainia appendiculata** (Griseb.) O.E. Schulz

Descurainia argentina O.E. Schulz
Sin.: *Descurainia argentina* O.E. Schulz var. *brachysilicua* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium canescens* Nutt. f. *brachysiliquum* Chodat & Wilczek
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3297* (SI)].

Descurainia argentina O.E. Schulz var. *brachysilicua* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz = **Descurainia argentina** O.E. Schulz

Descurainia brachycarpa (Phil.) Reiche = **Descurainia depressa** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia brevifructa Boelcke ex Mart.-Laborde
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3132* (SI)].

Descurainia canescens (Nutt.) Prantl = **Descurainia pinnata** (Walter) Britton
Referencias: Detling, L. E., 1939.

Descurainia canescens (Nutt.) Prantl var. *appendiculata* (Griseb.) Hosseus = **Descurainia appendiculata** (Griseb.) O.E. Schulz
Referencias: Schulz, O. E., 1924.

Descurainia canescens (Nutt.) Prantl var. *patagonica* Speg. = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Descurainia canescens (Nutt.) Prantl var. *purpureola* Speg. = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Descurainia chubutica O.E. Schulz = **Rorippa chubutica** (O.E. Schulz) Mart.-Laborde

Descurainia cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl
Sin.: *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *glabrescens* (Speg.) O.E. Schulz, *Descurainia cumingiana* (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche, *Descurainia glabrescens* (Speg.) Speg., *Descurainia tenuissima* (Phil.) Speg., *Hesperis cumingiana* (Fisch. & E. Mey.) Kuntze, *Sisymbrium cumingianum* Fisch. & C.A. Mey., *Sisymbrium cumingii* J. Presl, *Sisymbrium elegantulum* Phil., *Sisymbrium glabrescens* Speg., *Sisymbrium tenuissimum* Phil., *Sophia glabrescens* (Speg.) Macloskie, *Sophia tenuissima* (Phil.) Macloskie
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11103* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Cuming, H. 235* (K, SGO)].

Descurainia cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *elegantula* (Phil.) O.E. Schulz = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Descurainia cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *glabrescens* (Speg.) O.E. Schulz = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Descurainia cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *leiocarpa* O.E. Schulz = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Descurainia cumingiana (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl var. *tenuissima* (Phil.) Reiche = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche
Sin.: *Descurainia brachycarpa* (Phil.) Reiche, *Descurainia depressa* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *pflanzii* (Muschl.) O.E. Schulz, *Descurainia pflanzii* Muschl., *Sisymbrium brachycarpum* Phil., *Sisymbrium depressum* Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 3000–4600 m.

Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cajal, J. L. 123* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 181* (CONC)].

Descurainia depressa (Phil.) Prantl ex Reiche var. *pflanzii* (Muschl.) O.E. Schulz = **Descurainia depressa** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia deserticola (Speg.) Speg. = **Trichotolinum deserticola** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Descurainia diversifolia O.E. Schulz
Sin.: *Descurainia diversifolia* O.E. Schulz var. *cunninghamii* O.E. Schulz
Hierba. Anual o bianual. Endémica.
Países: CHL(II, III, IV, V, XII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Buchtien, O. s.n.* (B)].

Descurainia diversifolia O.E. Schulz var. *cunninghamii* O.E. Schulz = **Descurainia diversifolia** O.E. Schulz

Descurainia erodiifolia Prantl ex Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Bianual. Endémica. 2600–3200 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 552* (CONC)].

Descurainia glabrescens (Speg.) Speg. = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Descurainia glandulifera (Speg.) Gilg & Muschl. = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Descurainia glaucescens (Phil.) Prantl ex Reiche
Sin.: *Descurainia pimpinellifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 800–4400 m.
Países: ARG(MEN, SCR); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9707* (BAA)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Descurainia heterotricha Speg.
Sin.: *Sophia heterotricha* (Speg.) Macloskie
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 2400–3100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7520* (SI)].

Descurainia minutiflora (Phil.) Reiche = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr.
Sin.: *Descurainia perkinsiana* Muschl., *Descurainia pulcherrima* Muschl., *Sisymbrium myriophyllum* Willd. ex DC.
Referencias: Fries, R. E., 1905; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 764* (CORD)]; CHL[*Villagrán, C. 2457* (CONC)].

Descurainia nana Romanczuk
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 300–600 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12503* (BAA, BAB, BACP, SI)].

Descurainia nuttallii (Colla) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium nuttalli* Colla
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(V, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1315* (G)].

Descurainia perkinsiana Muschl. = **Descurainia myriophylla** (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Descurainia pflanzii Muschl. = **Descurainia depressa** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia pimpinellifolia (Barnéoud) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium pimpinellifolium* Barnéoud
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Bianual. Endémica. 1500–4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4420* (SI)]; CHL[*Wagenknecht, R. 4000* (SI)].

Descurainia pimpinellifolia (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glaucescens* (Phil.) O.E. Schulz = **Descurainia glaucescens** (Phil.) Prantl ex Reiche
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Descurainia pinnata (Walter) Britton
Sin.: *Descurainia canescens* (Nutt.) Prantl, *Erysimum pinnatum* Walter
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Detling, L. E., 1939.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 820* (BAB, BACP)].

Descurainia pulcherrima Muschl. = **Descurainia myriophylla** (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Descurainia rubescens (Phil.) Reiche = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Sin.: *Sisymbrium sophia* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12507* (BAB, SI)]; CHL[*Boelcke, O. 16556* (SI), *Moore, D. M. 2487* (SI)].

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche
Sin.: *Descurainia minutiflora* (Phil.) Reiche, *Descurainia rubescens* (Phil.) Reiche, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche f. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *minutiflora* (Phil.) O.E. Schulz, *Descurainia stricta* (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium minutiflorum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium rubescens* Phil., *Sisymbrium strictum* Phil., *Sisymbrium umbelliferum* Phil.
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 2200–4700 m.
Países: ARG(CAT, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 174* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 258* (B, BM, G, GH, SI, US)].

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche f. *umbellifera* (Phil.) O.E. Schulz = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche var. *florida* (Phil.) O.E. Schulz = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche var. *minutiflora* (Phil.) O.E. Schulz = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia stricta (Phil.) Prantl ex Reiche var. *rubescens* (Phil.) O.E. Schulz = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Descurainia subscandens (Speg.) Gilg & Muschl. = **Mostacillastrum subscandens** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Descurainia tenuissima (Phil.) Speg. = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Descurainia titicacensis (Walp.) Lillo
Sin.: *Sisymbrium titicacense* Walp.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Bianual. Nativa.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 5613* (SI)].

Dictyophragmus O.E. Schulz

Número de especies: 1 endémica

Dictyophragmus punensis (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium punense* Romanczuk
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1991.
Hierba. Anual. Endémica. 3400–3800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diers, L. 132* (SI)].

Dimitria onuridifolia Ravenna = **Chilocardamum onuridifolium** (Ravenna) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Diplotaxis DC.

Número de especies: 3 introducidas

Diplotaxis chilensis Barnéoud = **Schizopetalon dentatum** (Barnéoud) Gilg & Muschl.

Diplotaxis erucoides (L.) DC.
Sin.: *Sinapis erucoides* L.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B. & Méndez, E., 2001.
Hierba. Anual o bianual. Introducida.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8540* (SI)].

Diplotaxis muralis (L.) DC.
Sin.: *Sisymbrium murale* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5528* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 166* (CONC)].

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
Sin.: *Sisymbrium tenuifolium* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, DFE, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 2373* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. s.n.* (MVFA)].

Draba L.

Número de especies: 11, 8 endémicas, 1 introducida

Draba ameghinoi Speg. = **Draba australis** R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba andina Phil. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba araucana Phil. = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.

Draba argentina Speg. = **Draba australis** R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba argentina Speg. var. *grandiflora* Speg. = **Draba australis** R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba argentina Speg. var. *latifolia* Speg. = **Draba australis** R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba atacamensis Gilg = **Draba macleanii** Hook. f.

Draba atuelica Chodat & Wilczek = **Draba magellanica** Lam.

Draba australis R. Br. ex Hook. f.
Sin.: *Draba ameghinoi* Speg., *Draba argentina* Speg., *Draba argentina* Speg. var. *grandiflora* Speg., *Draba argentina* Speg. var. *latifolia* Speg., *Draba australis* R. Br. f. *uruguayana* (Arechav.) O.E. Schulz, *Draba australis* R. Br. var. *ameghinoi* (Speg.) Kurtz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, XII); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 2594* (BACP, H, HIP, K, SI)]; CHL[*T.B.P.A. 636* (HIP, SI)]; URY[*Berro, M. B. 661* (BAA, SI)].

Draba australis R. Br. f. *uruguayana* (Arechav.) O.E. Schulz = **Draba australis** R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba australis R. Br. var. *ameghinoi* (Speg.) Kurtz = **Draba australis** R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba azorellicola O.E. Schulz = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.

[Draba brackenridgei A.Gray]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Draba burkartiana O.E. Schulz
Sin.: *Draba burkartiana* O.E. Schulz var. *parodiana* O.E. Schulz
Referencias: Schulz, O. E., 1933.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5351* (B, F, SI)].

Draba burkartiana O.E. Schulz var. *parodiana* O.E. Schulz = **Draba burkartiana** O.E. Schulz

Draba calycina Desv. = **Brayopsis calycina** (Desv.) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989c.

Draba cauquensis Phil. = **Weberbauera stenophylla** (Leyb.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba chillanensis Phil. = **Weberbauera chillanensis** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba chodatii O.E. Schulz = **Draba magellanica** Lam.

Draba chodatii O.E. Schulz var. *subtorta* O.E. Schulz = **Draba tucumanensis** O.E. Schulz

Draba chubutensis Speg. = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba colchaguensis Phil. = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.

Draba davilae Phil. = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba falklandica Hook. f. = **Draba magellanica** Lam.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba funiculosa Hook. f.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15025* (BAA, BAB, BACP)]; CHL[*Donat, A. 351* (BAF, BM, CAS, F, GH, K, M, NY, SI, U, Z)].

Draba gilliesii Hook. & Arn.
Sin.: *Draba araucana* Phil., *Draba azorellicola* O.E. Schulz, *Draba chubutensis* Speg., *Draba colchaguensis* Phil., *Draba davilae* Phil., *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *argentina*, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *glabrata* (Gilg ex Speg.) O.E. Schulz, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche, *Draba gilliesii* Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche, *Draba magellanica* Lam. var. *glabrata* Gilg ex Speg., *Draba rosulata* Phil., *Draba stolonifera* Barnéoud
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Schulz, O. E., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–4000 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13822* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Zöllner, O. 8629* (CONC, MO, NA)].

Draba gilliesii Hook. & Arn. var. *argentina* = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.

Draba gilliesii Hook. & Arn. var. *glabrata* (Gilg ex Speg.) O.E. Schulz = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba gilliesii Hook. & Arn. var. *rosulata* (Phil.) Reiche = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba gilliesii Hook. & Arn. var. *stolonifera* (Barnéoud) Reiche = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba graminifolia Speg. = **Onuris spegazziniana** Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba greggioides Griseb. = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Draba hatcheriana Gilg ex Macloskie = **Onuris hatcheriana** (Gilg) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba imbricatifolia Barnéoud = **Weberbauera imbricatifolia** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba imbricatifolia Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche = **Weberbauera suffruticosa** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba incana L. var. *sylvatica* (Albov) Macloskie = **Draba magellanica** Lam.
Referencias: Schulz, O. E., 1927.

Draba intricatissima Phil. = **Eremodraba intricatissima** (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990f; Schulz, O. E., 1924.

Draba karraikensis Speg. = **Sarcodraba karraikensis** (Speg.) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba kurtzii Gilg ex Hosseus, nom. nud. = **Draba magellanica** Lam.

Draba leyboldii Phil. = **Weberbauera stenophylla** (Leyb.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba loayzana Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1994b.
Hierba. Perenne. Nativa. 4400–4700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3703* (BAA, MO, S, SI)].

Draba macleanii Hook. f.
Sin.: *Draba atacamensis* Gilg
Hierba. Perenne. Nativa. 3900–4900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3387* (BAA, LIL, SI)]; CHL[*Villagrán, C. 1199* (CONC)].

Draba magellanica Lam.
Sin.: *Draba atuelica* Chodat & Wilczek, *Draba chodatii* O.E. Schulz, *Draba falklandica* Hook. f., *Draba incana* L. var. *sylvatica* (Albov) Macloskie, *Draba kurtzii* Gilg ex Hosseus, nom. nud., *Draba magellanica* Lam. var. *falklandica* (Hook. f.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz, *Draba magellanica* Lam. var. *sylvatica* Albov, *Draba rosularis* Chodat & Wilczek, hom. illeg., *Draba saffordii* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Schulz, O. E., 1927.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LRI, MEN, NEU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21936* (BACP, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92140a* (CONC)].

Draba magellanica Lam. var. *falklandica* (Hook. f.) O.E. Schulz = **Draba magellanica** Lam.
Referencias: Schulz, O. E., 1927.

Draba magellanica Lam. var. *glabrata* Gilg ex Speg. = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba magellanica Lam. var. *saffordii* (Phil.) O.E. Schulz = **Draba magellanica** Lam.
Referencias: Schulz, O. E., 1927.

Draba magellanica Lam. var. *subglabrata* Speg. = **Draba pusilla** F. Phil.

Draba magellanica Lam. var. *sylvatica* Albov = **Draba magellanica** Lam.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba monantha Gilg ex Kuntze = **Xerodraba monantha** (Gilg ex Kuntze) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba monantha Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud. = **Xerodraba pycnophylloides** (Speg.) Skottsb.

Draba oligosperma Speg. = **Onuris graminifolia** Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba patagonica Phil. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba philippii O.E. Schulz = **Draba thlaspiformis** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990e.

Draba pusilla F. Phil.
Sin.: *Draba magellanica* Lam. var. *subglabrata* Speg., *Draba schoenleinii* F. Meigen, *Draba subglabrata* (Speg.) O.E. Schulz
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3400 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(IV, VI, VII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11239* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*T.B.P.A. 785* (BAB, HIP, SI)].

Draba rosularis Chodat & Wilczek, hom. illeg. = **Draba magellanica** Lam.

Draba rosulata Phil. = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba saffordii Phil. = **Draba magellanica** Lam.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba schoenleinii F. Meigen = **Draba pusilla** F. Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.

Draba spegazziana Dusén = **Onuris graminifolia** Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba stenophylla Leyb. = **Weberbauera stenophylla** (Leyb.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba stolonifera Barnéoud = **Draba gilliesii** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Draba subglabrata (Speg.) O.E. Schulz = **Draba pusilla** F. Phil.

Draba suffruticosa Barnéoud = **Weberbauera suffruticosa** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Draba tenuis Barnéoud = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Boelcke, O., 1974.

Draba thlaspiformis (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Draba philippii* O.E. Schulz, *Eudema thlaspiforme* Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990e.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dávila, B. s.n.* (B, GH, SGO)].

Draba tucumanensis O.E. Schulz
Sin.: *Draba chodatii* O.E. Schulz var. *subtorta* O.E. Schulz
Referencias: Schulz, O. E., 1933.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1574* (BAF, GH, MO, S, SI, US)].

Draba verna L.
Sin.: *Erophila verna* (L.) Chevall.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, ERI, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3825* (BAB)]; CHL[*Looser, G. 2945* (SI)].

Eremodraba O.E. Schulz
Número de especies: 1

Eremodraba intricatissima (Phil.) O.E. Schulz
Sin.: *Draba intricatissima* Phil., *Hesperis intricatissima* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium intricatissimum* (Kuntze) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990f; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Anual. Nativa. 1400–2900 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 751* (BM, CAS, E, F, G, GH, K, M, MO, SI, UC)].

Erophila verna (L.) Chevall. = **Draba verna** L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eruca Mill.
Número de especies: 1 introducida

Eruca sativa Mill. = **Eruca vesicaria** (L.) Cav.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eruca vesicaria (L.) Cav.
Sin.: *Brassica vesicaria* L., *Eruca sativa* Mill., *Eruca vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4708* (BAB)]; CHL[*Matthei, O. R. 534* (CONC)].

Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell. = **Eruca vesicaria** (L.) Cav.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Erucastrum obtusangulum Hieron., hom. illeg. = **Mostacillastrum subscandens** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Erysimum L.
Número de especies: 2 introducidas

Erysimum cheiranthoides L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Moore, D. M., 1968.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Slanden 117/1* (BM)].

Erysimum maclovianum (d'Urv.) Gay ex Gaudich. = **Phlebolobium maclovianum** (d'Urv.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Erysimum officinale L. = **Sisymbrium officinale** (L.) Scop.
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.

Erysimum pinnatum Walter = **Descurainia pinnata** (Walter) Britton
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Erysimum pusillum Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Erysimum repandum L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12966* (BAA, BACP)].

Erysimum vernum Mill. = **Barbarea verna** (Mill.) Asch.

Eudema Humb. & Bonpl.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Eudema colobanthoides (Skottsb.) O.E. Schulz
= **Xerodraba colobanthoides** Skottsb.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.

Eudema friesii O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990b; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Perenne. Nativa. 3700–5000 m.
Países: ARG(SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 703* (B, BAA, UPS, US)]; CHL[*Pisano, E. 1725* (CONC, SGO)].

Eudema glebaria (Speg.) Gilg & Muschl. = **Xerodraba glebaria** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eudema hauthalii Gilg & Muschl.
Sin.: *Brayopsis hauthalii* (Gilg & Muschl.) Skottsb., *Brayopsis skottsbergii* Gilg
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990b; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–4000 m.
Países: ARG(LRI, SCR, SJU); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1386* (BAA, GH, US)]; CHL[*Zöllner, O. 8133* (CONC, SI)].

Eudema lycopodioides (Speg.) Gilg & Muschl.
= **Xerodraba lycopodioides** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eudema microphylla Gilg & Muschl. = **Xerodraba pycnophylloides** (Speg.) Skottsb.

Eudema monantha (Gilg ex Kuntze) Gilg & Muschl.
= **Xerodraba monantha** (Gilg ex Kuntze) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eudema patagonica (Speg.) Gilg & Muschl.
= **Xerodraba patagonica** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eudema pectinata (Speg.) Gilg & Muschl. = **Xerodraba pectinata** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eudema pycnophylloides (Speg.) Gilg & Muschl.
= **Xerodraba pycnophylloides** (Speg.) Skottsb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Eudema thlaspiforme Phil. = **Draba thlaspiformis** (Phil.) Al-Shehbaz

Eudema werdermannii O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990b; Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4400 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 169* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 974* (B, BAA, BM, F, G, GH, K, MO, NY, S, UC, US, Z)].

Exhalimolobos Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Número de especies: 3, 1 endémica

Exhalimolobos burkartii (Romanczuk & Boelcke) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Sin.: *Polypsecadium burkartii* Romanczuk & Boelcke
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 800–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11133* (SI)].

Exhalimolobos pazensis (Rusby) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Sin.: *Halimolobos adpressus* O.E. Schulz, *Sisymbrium pazensis* Rusby
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.
Hierba. Perenne. Nativa. 1700–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. 7671* (BAA, BACP)].

Exhalimolobos weddellii (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Sin.: *Draba greggioides* Griseb., *Greggia montana* Griseb., *Halimolobos boelckei* Mart.-Laborde, *Halimolobos hispidulus* (DC.) O.E. Schulz var. *weddellii* (E. Fourn.) Rollins, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz, *Halimolobos montanus* (Griseb.) O.E. Schulz var. *andina* O.E. Schulz, *Halimolobos weddellii* (E. Fourn.) O.E. Schulz, *Hesperis weddellii* (E. Fourn.) Kuntze, *Sisymbrium hispidulum* (DC.) Triana & Planch. var. *weddellii* (E. Fourn.) Baehni & J.F. Macbr., *Sisymbrium weddelii* E. Fourn.
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006; Martínez-Laborde, J. B., 1992.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(ART, COL, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1035* (GH, MO, SI, UC, US)]; URY[*Del Puerto, O. 9027* (MVFA)].

Grammosperma dusenii O.E. Schulz = **Sarcodraba dusenii** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.

Greggia montana Griseb. = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Halimolobos adpressus O.E. Schulz = **Exhalimolobos pazensis** (Rusby) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Halimolobos boelckei Mart.-Laborde = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Halimolobos hispidulus (DC.) O.E. Schulz var. *weddellii* (E. Fourn.) Rollins = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Halimolobos montanus (Griseb.) O.E. Schulz = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Halimolobos montanus (Griseb.) O.E. Schulz var. *andina* O.E. Schulz = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Halimolobos weddellii (E. Fourn.) O.E. Schulz = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Hesperis L.

Número de especies: 1 introducida

Hesperis africana L. = **Strigosella africana** (L.) Botsch.
Referencias: Botschantzev, V. P., 1972.

Hesperis andina (Phil.) Kuntze = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis arnottiana (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Polypsecadium arnottianum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis cumingiana (Fisch. & E. Mey.) Kuntze = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Hesperis foliosa (Phil.) Kuntze = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis frutescens (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Neuontobotrys frutescens** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis imbricatifolia (Barnéoud) Kuntze = **Weberbauera imbricatifolia** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Hesperis intricatissima (Phil.) Kuntze = **Eremodraba intricatissima** (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990f; Schulz, O. E., 1924.

Hesperis lechleri (E. Fourn.) Kuntze = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Hesperis leptocarpa (Hook. & Arn.) Kuntze = **Mostacillastrum leptocarpum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis linearifolia Kuntze = **Neuontobotrys linearifolia** (Kuntze) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b.

Hesperis litoralis (Phil.) Kuntze = **Polypsecadium litorale** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis magellanica (Juss. ex Pers.) Kuntze = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis matronalis L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1126* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 682* (CONC)].

Hesperis peruviana (DC.) Kuntze = **Weberbauera peruviana** (DC.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004c.

Hesperis petraea Kuntze = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Hesperis sagittata (Hook. & Arn.) Kuntze = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis stenophylla (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Mostacillastrum stenophyllum** (Gillies ex Hook. & Arn.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Hesperis suffruticosa (Barnéoud) Kuntze = **Weberbauera suffruticosa** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Hesperis weddellii (E. Fourn.) Kuntze = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Heterothrix gracilis (Wedd.) O.E. Schulz = **Mostacillastrum gracile** (Wedd.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Heterothrix petraea (Phil.) O.E. Schulz = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Hexaptera cicatricosa Phil. = **Menonvillea cicatricosa** (Phil.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera constitutionis F. Phil. = **Menonvillea constitutionis** (F. Phil.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera cuneata Gillies & Hook. = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins

Hexaptera cuneata Gillies & Hook. f. *brevifolia* Skottsb. = **Menonvillea nordenskjoeldii** (Dusén) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera cuneata (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentula* Kuntze = **Menonvillea spathulata** (Gillies & Hook.) Rollins

Hexaptera cuneata Gillies & Hook. var. *nordenskjoeldii* (Dusén) Gilg & Muschl. = **Menonvillea nordenskjoeldii** (Dusén) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera cuneata Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera famatinensis Boelcke = **Menonvillea famatinensis** (Boelcke) Rollins

Hexaptera famatinensis Boelcke var. *sphaerocarpa* Boelcke = **Menonvillea famatinensis** (Boelcke) Rollins

Hexaptera frigida Phil. = **Menonvillea frigida** (Phil.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera jussiaei Barnéoud = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera jussiaei Barnéoud var. *tridens* Reiche = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera kurtzii Hosseus = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera linearis Barnéoud = **Menonvillea purpurea** (Hastings) Rollins

Hexaptera littoralis Barnéoud = **Menonvillea littoralis** (Barnéoud) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera macrocarpa I.M. Johnst. = **Menonvillea macrocarpa** (I.M. Johnst.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera nordenskjoeldii Dusén = **Menonvillea nordenskjoeldii** (Dusén) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera pinnatifida Gillies & Hook. = **Menonvillea hookeri** Rollins

Hexaptera pinnatifida Gillies & Hook. var. *nana* Hieron., nom. nud. = **Menonvillea famatinensis** (Boelcke) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera purpurea Hastings = **Menonvillea purpurea** (Hastings) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera pusilla Phil. = **Menonvillea spathulata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera scapigera Phil. = **Menonvillea scapigera** (Phil.) Rollins subsp. **scapigera**

Hexaptera spathulata Gillies & Hook. = **Menonvillea spathulata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera spathulata Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche = **Menonvillea spathulata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera spathulata Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl. = **Menonvillea spathulata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera tridens Phil. = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera violacea Phil. = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hexaptera virens Phil. = **Menonvillea virens** (Phil.) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Hirschfeldia Moench

Número de especies: 1 introducida

Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.
Sin.: *Sinapis incana* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(III, IV, V, VIII, IX, IDE, IJF, RME); URY(PAY, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3304* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 81* (CONC)]; URY[*Del Puerto, O. 8458* (MVFA)].

Hollermayera O.E. Schulz
Número de especies: 1 endémica

Hollermayera sylvatica O.E. Schulz = **Hollermayera valdiviana** (Phil.) Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 1981e.

Hollermayera valdiviana (Phil.) Ravenna
Sin.: *Armoracia valdiviana* Phil., *Hollermayera sylvatica* O.E. Schulz
Referencias: Ravenna, P. F., 1981e.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Hornungia Rchb.
Número de especies: 1 introducida

Hornungia procumbens (L.) Hayek
Sin.: *Bursa procumbens* (L.) Kuntze, *Capsella procumbens* (L.) Fr., *Draba tenuis* Barnéoud, *Hutchinsia procumbens* (L.) Desv., *Hutchinsia reticulata* Griseb., *Hutchinsia tenuis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt. ex Torr. & A. Gray, *Lepidium procumbens* L., *Microcardamum tenue* (Barnéoud) O.E. Schulz
Referencias: Appel, O. & Al-Shehbaz, I. A., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(I, III, IV, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3233* (BAA, BACP)]; CHL[*Werdermann, E. 945* (F, G, GH, SI)].

Hutchinsia procumbens (L.) Desv. = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Boelcke, O., 1974.

Hutchinsia reticulata Griseb. = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Boelcke, O., 1974.

Hutchinsia tenuis (Barnéoud) O.E. Schulz = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Boelcke, O., 1974.

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. ex Torr. & A. Gray = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek

Hymenophysa pubescens C.A. Mey. = **Lepidium appelianum** Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Iberis L.
Número de especies: 1 introducida

Iberis amara L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual o bianual. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 479* (BAB)].

Iberis nudicaulis L. = **Teesdalia nudicaulis** (L.) R. Br.

Isatis L.
Número de especies: 1 introducida

Isatis tinctoria L.
Hierba. Anual. Introducida. 100–500 m.
Países: CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 527* (CONC)].

Ivania O.E. Schulz
Número de especies: 1 endémica

Ivania cremnophila (I.M. Johnst.) O.E. Schulz
Sin.: *Cardamine cremnophila* I.M. Johnst.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–3300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 4927* (G, GH, K)].

Kardamoglyphos nana Schltdl. = **Rorippa nana** (Schltdl.) J.F. Macbr.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1983c.

Lepidium L.
Número de especies: 47, 25 endémicas, 10 introducidas

Lepidium affine Wedd., hom. illeg. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium aletes J.F. Macbr.
Sin.: *Lepidium aletes* J.F. Macbr. var. *integrifolium* (Thell.) Boelcke, *Lepidium calycinum* Godr., *Lepidium calycinum* Godr. var. *integrifolium* Thell.
Referencias: Boelcke, O., 1986; Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); CHL(V, VIII, IX, XI, XII); PRY(APA, CEN, COA, PAI, SPE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RNO, SJO, SOR, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5470* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 22790* (CTES)]; CHL[*Barros, E. 1070* (CONC)]; PRY[*Woolston, A. L. 859* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10997* (MVFA)].

Lepidium aletes J.F. Macbr. var. *integrifolium* (Thell.) Boelcke = **Lepidium aletes** J.F. Macbr.

Lepidium angustissimum Phil.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Endémica. 1900–2400 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 6384* (CONC)].

Lepidium appelianum Al-Shehbaz
Sin.: *Cardaria pubescens* (C.A. Mey.) Jarm., *Hymenophysa pubescens* C.A. Mey.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Ibarra, F. E. & La Porte, J. S., 1947.
Hierba. Perenne. Introducida. 300–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11701* (BAA, BAB, SI)].

Lepidium araucanum Phil. = **Lepidium auriculatum** Regel & Körn.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium argentinum Thell.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 7783* (G)].

Lepidium auriculatum Regel & Körn.
Sin.: *Lepidium araucanum* Phil., *Lepidium bipinnatifidium* Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2395* (SI)].

Lepidium barneoudianum Sukorý
Sin.: *Lepidium brevicaule* Barnéoud, *Nasturtium brevicaule* (Barnéoud) Kuntze
Referencias: Sukorý, K., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 3300–3600 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2406* (SI)].

Lepidium bipinnatifidium Desv. var. *araucanum* (Phil.) Reiche = **Lepidium auriculatum** Regel & Körn.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium bipinnatifidum Desv.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); CHL(V, VI, VII, VIII, X); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (GH)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; URY[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Lepidium bipinnatifidum Desv. var. *curicoanum* (Phil.) Reiche = **Lepidium curicoanum** Phil.

Lepidium bipinnatifidum Desv. var. *tenuifolium* (Phil.) Reiche = **Lepidium nitidum** Nutt. ex Torr. & A. Gray
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium boelckeanum Prina
Referencias: Prina, A. O., 1993; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 8193* (BACP, SRFA)].

Lepidium boelckei Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989a.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8859* (US).

Lepidium bonariense L.
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *pseudovirginicum* Thell.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1986; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VIII, IJF, RME); PRY(AMA, CEN, COA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, ROC, SAO, SJO, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5441* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 37660* (CTES)]; CHL[*Garaventa, A. 2398* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 19781* (CTES)]; URY[*Hertel, R. 241* (SI)].

Lepidium bonariense L. var. *gracile* Chodat & Hassl. = **Lepidium gracile** (Chodat & Hassl.) Boelcke
Referencias: Boelcke, O., 1986.

Lepidium bonariense L. var. *pseudovirginicum* Thell. = **Lepidium bonariense** L.

Lepidium bonariense L. var. *stuckertianum* Thell. = **Lepidium stuckertianum** (Thell.) Boelcke
Referencias: Boelcke, O., 1986.

Lepidium brevicaule Barnéoud = **Lepidium barneoudianum** Sukorý
Referencias: Sukorý, K., 2003.

Lepidium burkartii Boelcke
Referencias: Boelcke, O., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3740* (SI)].

Lepidium calycinum Godr. = **Lepidium aletes** J.F. Macbr.

Lepidium calycinum Godr. var. *integrifolium* Thell. = **Lepidium aletes** J.F. Macbr.

Lepidium chalepense L.
Sin.: *Cardaria chalepensis* (L.) Hand.-Mazz., *Cardaria draba* (L.) Desv. var. *chalepensis* (L.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(COR, MEN, NEU, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11505* (BAA)].

Lepidium chichicara Desv.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: CHL(I, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1455* (CONC)].

Lepidium chilense Kunze = **Lepidium nitidum** Nutt. ex Torr. & A. Gray
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz
Sin.: *Cochlearia coronopus* L., *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch., *Lepidium squamatum* Forssk.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, G. 3289* (CONC)].

Lepidium cumingianum Fisch. & C.A. Mey.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 8199* (SI)].

Lepidium curicoanum Phil.
Sin.: *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *curicoanum* (Phil.) Reiche
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Vidal, M. s.n.* (SGO)].

Lepidium densiflorum Schrad.
Referencias: Prina, A. O., 1997; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 8152* (BACP, SRFA)].

Lepidium didymum L.
Sin.: *Coronopus didymus* (L.) Sm.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME); PRY(CEN, COA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 9398* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13078* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2729* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 2985* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 243a* (SI)].

Lepidium draba L.
Sin.: *Cardaria draba* (L.) Desv.
Referencias: Domínguez, E. & Elvebakk, A., 2001; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Anual. Introducida. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SLU, TDF); CHL(I, III, IV, V, XI, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9959* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 18455* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 6619* (MVFA)].

Lepidium filisegmentum C.L. Hitchc.
Sin.: *Lepidium reticulatum* Howell var. *austro-americanum* Thell.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 185* (SI)].

Lepidium gelidum Wedd. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium gracile (Chodat & Hassl.) Boelcke
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *gracile* Chodat & Hassl.
Referencias: Boelcke, O., 1986.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 1413* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7545* (G)].

Lepidium horstii Johow ex Skottsb. = **Lepidium virginicum** L.

Lepidium inclussum O.E. Schulz = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium johnstonii C.L. Hitchc.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945; Prina, A. O., 1995b.
Hierba. Anual. Endémica. 700–1500 m.
Países: ARG(SAL); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 8397* (MCNS)]; CHL[*Worth, C. R. 15845* (UC)].

Lepidium jujuyanum Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 506/7* (GH)];

Lepidium lanatum Barnéoud = **Tropidocarpum lanatum** (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 2001.

Lepidium latifolium L.
Referencias: Boelcke, O., 1984b.
Hierba. Perenne. Introducida.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9427* (BACP, CORD, SI)].

Lepidium marginatum Griseb. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium meyenii Walp.
Sin.: *Lepidium affine* Wedd., hom. illeg., *Lepidium gelidum* Wedd., *Lepidium marginatum* Griseb., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *affine* (Wedd.) Thell., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *gelidum* (Wedd.) Thell., *Lepidium meyenii* Walp. subsp. *marginatum* (Griseb.) Thell., *Lepidium weddellii* J.F. Macbr., hom. illeg.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 165* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 544* (CONC)].

Lepidium meyenii Walp. subsp. *affine* (Wedd.) Thell. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium meyenii Walp. subsp. *gelidum* (Wedd.) Thell. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium meyenii Walp. subsp. *marginatum* (Griseb.) Thell. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium morrisonii C.L. Hitchc.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Endémica. 2900–3100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 17418* (C, MO)].

Lepidium myrianthum Phil.
Sin.: *Lepidium ruderale* var. *myrianthum* (Phil.) Reiche
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1968.
Hierba. Anual. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. s.n.* (SI)].

Lepidium nitidum Nutt. ex Torr. & A. Gray
Sin.: *Lepidium bipinnatifidum* Desv. var. *tenuifolium* (Phil.) Reiche, *Lepidium chilense* Kunze, *Lepidium tenuifolium* Phil.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(V, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Joseph, F. C. 4322* (CONC)].

Lepidium parodii Thell.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5018* (SI)].

Lepidium perfoliatum L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Romanczuk, M. C. 1019* (CONC)].

Lepidium philippianum (Kuntze) Thell.
Sin.: *Lepidium suffruticosum* Phil., hom. illeg., *Nasturtium philippianum* Kuntze
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–3000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Mooney, N. 343* (CONC)].

Lepidium pinnatifidum Ledeb.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez, J. J. 7044* (BAB)].

Lepidium procumbens L. = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek

Lepidium pseudodidymus Thell. ex Druce
Sin.: *Coronopus australis* (Hook. f.) Speg., *Coronopus didymus* (L.) Sm. subsp. *australis* (Hook. f.) Muschl., *Coronopus leptocarpus* Boelcke, *Coronopus leptocarpus* Boelcke var. *microcarpus* Boelcke, *Coronopus pinnatifidus* Dulac var. *australis* (Hook. f.) Reiche, *Lepidium inclussum* O.E. Schulz, *Senebiera australis* Hook. f., *Senebiera pinnatifida* var. *australis* (Hook. f.) De Wild.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1964b; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 12510* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 16550* (SI)].

Lepidium pubescens Desv.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Nativa. 0–900 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2547* (SI)].

Lepidium racemosum Griseb. = **Lepidium spicatum** Desv.

Lepidium rahmeri Phil.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Nativa. 2700–3700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Villagrán, C. 9069* (CONC)].

Lepidium raimondii O.E. Schulz
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Nativa. 3000–4500 m.
Países: CHL(I, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, S. M. 115* (CONC)].

Lepidium reichei Phil. ex Reiche
Referencias: Teillier A., S., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 2100–3400 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (SGO)].

Lepidium reticulatum Howell var. *austro-americanum* Thell. = **Lepidium filisegmentum** C.L. Hitchc.

Lepidium rhytidocarpum (Hook.) Al-Shehbaz
Sin.: *Coronopus rhytidocarpus* (Hook.) Macloskie, *Senebiera rhytidocarpa* Hook.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002; Boelcke, O., 1987; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, SFE); URY(PAY, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 9305* (BAA)]; URY[*Rosengurtt, B. 10320* (BAA)].

Lepidium ruderale var. *myrianthum* (Phil.) Reiche = **Lepidium myrianthum** Phil.
Referencias: Boelcke, O., 1964b.

Lepidium sativum L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1121* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 4590* (SI)].

Lepidium serratum (Poir.) Al-Shehbaz
Sin.: *Coronopus serratus* (Poir.) Desv., *Senebiera serrata* Poir.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002; Boelcke, O., 1987; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 1766* (BAA, NY)]; URY[*Rosengurtt, B. 4447* (BAA, MVFA)].

Lepidium spathulatum Phil.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1600 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Quezada, M. 148* (CONC)].

Lepidium spicatum Desv.
Sin.: *Lepidium racemosum* Griseb., *Lepidium spicatum* Desv. var. *calyx-persistens* Boelcke, *Lepidium spicatum* Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1964b, 1986.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, RNE, SCR, SFE, SLU); CHL(III, VIII, IX, X, XII, RME); URY(CAS, COL, LAV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16558* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 83389* (CONC), *Sparre, B. B. 9934* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 10049* (MVFA)].

Lepidium spicatum Desv. var. *calyx-persistens* Boelcke = **Lepidium spicatum** Desv.

Lepidium spicatum Desv. var. *racemosum* (Griseb.) Boelcke = **Lepidium spicatum** Desv.

Lepidium squamatum Forssk. = **Lepidium coronopus** (L.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004a.

Lepidium strictum (S. Watson) Rattan
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Anual. Endémica. 0–3800 m.
Países: CHL(I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2621* (CONC)].

Lepidium stuckertianum (Thell.) Boelcke
Sin.: *Lepidium bonariense* L. var. *stuckertianum* Thell.
Referencias: Boelcke, O., 1986.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, LPA, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 928* (SI)].

Lepidium subvaginatum Steud. ex Thell.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(V, VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Joseph, F. C. 4323* (CONC)].

Lepidium suffruticosum Phil., hom. illeg. = **Lepidium philippianum** (Kuntze) Thell.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium tandilense Boelcke
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1986.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, RNE); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. s.n.* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10905* (BAA, BACP, MVFA)].

Lepidium tayloriae Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1993.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 10804* (CONC, MO)].

Lepidium tenuifolium Phil. = **Lepidium nitidum** Nutt. ex Torr. & A. Gray
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lepidium virginicum L.
Sin.: *Lepidium horstii* Johow ex Skottsb.
Referencias: Boelcke, O., 1986; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SLU); BRA(PAR); CHL(IDE); PRY(CAU, CEN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1346* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 39237* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1331* (BACP, CTES)].

Lepidium weddellii J.F. Macbr., hom. illeg. = **Lepidium meyenii** Walp.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Lesquerella mendocina (Phil.) A. Gray var. *microcarpa* O.E. Schulz = **Physaria lateralis** O'Kane & Al-Shehbaz
Referencias: O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.

Lesquerella montevidensis (Eichler) S. Watson = **Physaria mendocina** (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Lithodraba Boelcke

Número de especies: 1 endémica

Lithodraba mendocinensis (Hauman) Boelcke
Sin.: *Xerodraba mendocinensis* Hauman
Referencias: Boelcke, O., 1952.
Arbusto. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)].

Lobularia Desv.

Número de especies: 1 introducida

Lobularia maritima (L.) Desv.
Sin.: *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Clypeola maritima* L.
Referencias: Borgen, L., 1987; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU); CHL(I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25938* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 1634* (SI)]; URY[*Felippone, F. 3284* (SI)].

Lunaria L.

Número de especies: 1 introducida

Lunaria annua L.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Hierba. Bianual. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gobbi s.n.* (BCRU)].

Malcolmia R. Br., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Malcolmia africana (L.) R. Br. = **Strigosella africana** (L.) Botsch.
Referencias: Botschantzev, V. P., 1972.

Malcolmia maritima (L.) R. Br.
Sin.: *Cheiranthus maritimus* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, R. A. s.n.* (BAB)].

Mancoa Wedd.

Número de especies: 2, 1 endémica

Mancoa hispida Wedd.
Sin.: *Mancoa minima* Rollins
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Rollins, R. C., 1941.
Hierba. Perenne. Nativa. 3800–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1108* (BAF, CONC, GH, MO, NY, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1008* (BAA, CONC)].

Mancoa minima Rollins = **Mancoa hispida** Wedd.

Mancoa venturii Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990c.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3587* (LIL, SI)].

Mathewsia Hook. & Arn.

Número de especies: 5 endémicas

Mathewsia auriculata Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1966.
Subarbusto. Endémica. 100–2700 m.
Países: CHL(I, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 422* (B, CAS, CONC, E, F, G, GH, K, MO, NY, S, SI, UC)].

Mathewsia boliviana Gilg & Muschl. = **Rorippa nana** (Schltdl.) J.F. Macbr.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Mathewsia collina I.M. Johnst. = **Mathewsia linearifolia** Turcz.

Mathewsia diffusa Rusby = **Rorippa nana** (Schltdl.) J.F. Macbr.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Mathewsia foliosa Hook. & Arn.
Referencias: Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Rollins, R. C., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1296* (BM, CONC, DS, E, G, GH, MO, NY, P)].

Mathewsia incana Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1966.
Subarbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 442* (BAB, BM, G, GH, K, MO, NY, SI, UC, US)].

Mathewsia laciniata Phil. = **Mathewsia linearifolia** Turcz.

Mathewsia linearifolia Turcz.
Sin.: *Mathewsia collina* I.M. Johnst., *Mathewsia laciniata* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.

Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 9779* (CONC, MO, NA)].

Mathewsia nivea (Phil.) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium niveum* Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3773* (CONC, OS)].

Matthiola R. Br.

Número de especies: 1 introducida

Matthiola incana (L.) R. Br.
Sin.: *Cheiranthus incanus* L.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(II, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Teillier A., S. 2880* (SGO)].

Menonvillea DC.

Número de especies: 23 endémicas

Menonvillea alata Rollins = **Menonvillea orbiculata** Phil.

Menonvillea alyssoides Rollins = **Menonvillea patagonica** Speg.

Menonvillea angustifolia C. Presl = **Menonvillea filifolia** Fisch. & C.A. Mey. subsp. **filifolia**

Menonvillea aptera Phil. = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.

Menonvillea arachnoidea O.E. Schulz = **Menonvillea littoralis** (Barnéoud) Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea chilensis (Turcz.) B.D. Jacks.
Sin.: *Cymatoptera chilensis* Turcz., *Menonvillea aptera* Phil., *Menonvillea chilensis* (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera* (Phil.) Rollins, *Menonvillea media* Turcz., *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *parviflora* (Phil.) Reiche, *Menonvillea parviflora* Phil., *Menonvillea parviflora* Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M. Johnst., *Menonvillea parvula* Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 8008* (BACP, SI)].

Menonvillea chilensis (Turcz.) B.D. Jacks. var. *aptera* (Phil.) Rollins = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.

Menonvillea cicatricosa (Phil.) Rollins
Sin.: *Hexaptera cicatricosa* Phil.
Referencias: Prina, A. O. & Alfonso, G. L., 2004; Rollins, R. C., 1955.
Subarbusto. Endémica. 1800–2600 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Prina, A. O. 2395* (CTES, SI, SRFA)]; CHL[*Marticorena, C. 848* (CONC)].

Menonvillea comberi Sandwith
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, T. 914* (E, K)].

Menonvillea constitutionis (F. Phil.) Rollins
Sin.: *Hexaptera constitutionis* F. Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 2734* (CONC)].

Menonvillea crassa Rollins = **Menonvillea flexuosa** Phil.

Menonvillea cuneata (Gillies & Hook.) Rollins
Sin.: *Decaptera trifida* Turcz., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *violacea* (Phil.) Reiche, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud, *Hexaptera jussiaei* Barnéoud var. *tridens* Reiche, *Hexaptera kurtzii* Hosseus, *Hexaptera tridens* Phil., *Hexaptera violacea* Phil., *Menonvillea rigida* Rollins
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Wingenroth, M. 122* (SI)]; CHL[*Wagenknecht, R. 4011* (BAA, BACP, CONC, GH, SI)].

Menonvillea falcata Reiche = **Menonvillea linearis** DC.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea famatinensis (Boelcke) Rollins
Sin.: *Hexaptera famatinensis* Boelcke, *Hexaptera famatinensis* Boelcke var. *sphaerocarpa* Boelcke, *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook. var. *nana* Hieron., nom. nud., *Menonvillea famatinensis* (Boelcke) Rollins var. *sphaerocarpa* (Boelcke) Rollins
Referencias: Boelcke, O., 1951; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. s.n.* (SI)].

Menonvillea famatinensis (Boelcke) Rollins var. *sphaerocarpa* (Boelcke) Rollins = **Menonvillea famatinensis** (Boelcke) Rollins

Menonvillea filifolia Fisch. & C.A. Mey. subsp. **filifolia**
Sin.: *Menonvillea angustifolia* C. Presl, *Menonvillea linearis* DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2725* (BACP, CONC, GH, SI)].

Menonvillea filifolia Fisch. & C.A. Mey. subsp. **marticorenae** Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 8001* (BACP, CONC, SI)].

Menonvillea flexuosa Phil.
Sin.: *Menonvillea crassa* Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 5298* (CONC)].

Menonvillea frigida (Phil.) Rollins
Sin.: *Hexaptera frigida* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 3900–4700 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 94006* (CONC)].

Menonvillea gayi Phil. = **Menonvillea littoralis** (Barnéoud) Rollins

Menonvillea hirsuta Rollins = **Menonvillea scapigera** (Phil.) Rollins subsp. **hirsuta** (Rollins) Prina
Referencias: Prina, A. O., 2001.

Menonvillea hookeri Rollins
Sin.: *Hexaptera pinnatifida* Gillies & Hook., *Menonvillea longipes* Rollins, *Menonvillea perstylosa* Rollins, *Menonvillea scapigera* (Phil.) Rollins subsp. *longipes* (Rollins) Prina
Referencias: Prina, A. O., 2001; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 1400–3300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 609* (GH)]; CHL[*Gillies, J. s.n.* (K)].

Menonvillea linearis DC.
Sin.: *Menonvillea falcata* Reiche, *Menonvillea linearis* DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche, *Menonvillea linearis* DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche, *Menonvillea robustula* Steud., *Menonvillea trifida* Phil., *Menonvillea virgata* Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 28* (E, F, G, GH, MO, S, SI, UC)].

Menonvillea linearis DC. var. *filifolia* (Fisch. & C.A. Mey.) Rollins = **Menonvillea filifolia** Fisch. & C.A. Mey. subsp. **filifolia**

Menonvillea linearis DC. var. *trifida* (Phil.) Reiche = **Menonvillea linearis** DC.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea linearis DC. var. *virgata* (Phil.) Reiche = **Menonvillea linearis** DC.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea littoralis (Barnéoud) Rollins
Sin.: *Hexaptera littoralis* Barnéoud, *Menonvillea arachnoidea* O.E. Schulz, *Menonvillea gayi* Phil.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1675* (BACP, CONC)].

Menonvillea longipes Rollins = **Menonvillea hookeri** Rollins

Menonvillea macrocarpa (I.M. Johnst.) Rollins
Sin.: *Hexaptera macrocarpa* I.M. Johnst.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 6058* (BAA, GH, K)].

Menonvillea media Turcz. = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea minima Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. 1948* (G, SGO)].

Menonvillea nordenskjoeldii (Dusén) Rollins
Sin.: *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. f. *brevifolia* Skottsb., *Hexaptera cuneata* Gillies & Hook. var. *nordenskjoeldii* (Dusén) Gilg & Muschl., *Hexaptera nordenskjoeldii* Dusén
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 2670* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92418* (CONC)].

Menonvillea orbiculata Phil.
Sin.: *Menonvillea alata* Rollins, *Menonvillea orbiculata* Phil. var. *perplexa* Rollins
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Bianual. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 391* (E, F, G, GH, K, MO, NY, S, SI, UC)].

Menonvillea orbiculata Phil. var. *parviflora* (Phil.) Reiche = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea orbiculata Phil. var. *perplexa* Rollins = **Menonvillea orbiculata** Phil.

Menonvillea parviflora Phil. = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea parviflora Phil. var. *aptera* (Phil.) I.M. Johnst. = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea parvula Phil. = **Menonvillea chilensis** (Turcz.) B.D. Jacks.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea patagonica Speg.
Sin.: *Menonvillea alyssoides* Rollins
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11235* (BAA, BAB, SI)].

Menonvillea perstylosa Rollins = **Menonvillea hookeri** Rollins

Menonvillea pinnatifida Barnéoud
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Wagenknecht, R. 4007* (BACP, CONC, GH, SI)].

Menonvillea purpurea (Hastings) Rollins
Sin.: *Hexaptera linearis* Barnéoud, *Hexaptera purpurea* Hastings
Referencias: Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3300 m.
Países: CHL(IV, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3821* (BAA, SI)].

Menonvillea rigida Rollins = **Menonvillea cuneata** (Gillies & Hook.) Rollins

Menonvillea robustula Steud. = **Menonvillea linearis** DC.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea rollinsii Al-Shehbaz & Martic.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Marticorena, C., 1990.
Subarbusto. Endémica. 2600–3400 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 445* (CONC)].

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins subsp. **hirsuta** (Rollins) Prina
Sin.: *Menonvillea hirsuta* Rollins
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Prina, A. O., 2001; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Neumeyer 664* (LIL)].

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins subsp. *longipes* (Rollins) Prina = **Menonvillea hookeri** Rollins

Menonvillea scapigera (Phil.) Rollins subsp. **scapigera**
Sin.: *Hexaptera scapigera* Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Rollins, R. C., 1955; Teillier A., S., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2252* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Teillier A., S. 2518* (CONC)].

Menonvillea spathulata (Gillies & Hook.) Rollins
Sin.: *Hexaptera cuneata* (Gillies & Hook.) Rollins var. *edentula* Kuntze, *Hexaptera pusilla* Phil., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. subsp. *pusilla* (Phil.) Gilg & Muschl., *Hexaptera spathulata* Gillies & Hook. var. *pusilla* (Phil.) Reiche
Referencias: Prina, A. O. & Alfonso, G. L., 2004; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–4300 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 4168* (BAA, BACP)]; CHL[*Garaventa, A. 3508* (BAA, BACP, CONC, GH, SI)].

Menonvillea trifida Phil. = **Menonvillea linearis** DC.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Menonvillea virens (Phil.) Rollins
Sin.: *Hexaptera virens* Phil.
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994; Rollins, R. C., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 377* (G, GH, K, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94156* (CONC)].

Menonvillea virgata Phil. = **Menonvillea linearis** DC.
Referencias: Rollins, R. C., 1955.

Microcardamum tenue (Barnéoud) O.E. Schulz = **Hornungia procumbens** (L.) Hayek
Referencias: Boelcke, O., 1974.

Mostacillastrum O.E. Schulz

Número de especies: 14, 10 endémicas

Mostacillastrum ameghinoi (Speg.) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium ameghinoi* Speg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. 167* (BA)].

Mostacillastrum andinum (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis andina* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium amplexicaule* Phil. var. *corymbosum* (Phil.) Reiche, *Sisymbrium andinum* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil.

f. *dolichocarpum* Hauman, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hossei* O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *latifolium* Phil., *Sisymbrium andinum* Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz, *Sisymbrium consanguineum* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium corymbosum* Phil., *Sisymbrium corymbosum* Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium morenoanum* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium morenoanum* Chodat & Wilczek f. *robustum* Chodat & Wilczek, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 10761* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 3512* (SI)].

Mostacillastrum carolinense (Scappini, C.A. Bianco & Prina) Al-Shehbaz, Scappini, C.A. Bianco & Prina
Sin.: *Sisymbrium carolinense* Scappini, C.A. Bianco & Prina
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–1700 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scappini, E. G. 5316* (RIOC)].

Mostacillastrum commune (Speg.) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium andinum* Phil. var. *exauriculatum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Gilg & Muschl., hom. illeg., *Sisymbrium andinum* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium commune* (Speg.) Romanczuk, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *commune* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *exauriculatum* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *glaucum* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *normalis* Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *pubescens* (Phil.) Speg., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *purpurascens* Speg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Bianual o perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10248* (SI)]; CHL[*Jiles P., C. 2545* (CONC, M)].

Mostacillastrum dianthoides (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium dianthoides* Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 913* (LP)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Mostacillastrum elongatum O.E. Schulz = **Mostacillastrum orbignyanum** (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Mostacillastrum elongatum O.E. Schulz var. *latisiliquum* O.E. Schulz = **Mostacillastrum orbignyanum** (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Mostacillastrum ferreyrae (Förther & Weigend) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium ferreyrae* Förther & Weigend
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Anual. Nativa. 300–1000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 578* (SGO)].

Mostacillastrum gracile (Wedd.) Al-Shehbaz
Sin.: *Heterothrix gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Pennellia gracilis* (Wedd.) O.E. Schulz, *Phlebiophragmus macrorrhizus* (Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium gracile* Wedd., *Thelypodium macrorrhizum* Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990c, 2006b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–3900 m.
Países: CHL(I, II, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 293* (BACP, CONC, SI)].

Mostacillastrum leptocarpum (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis leptocarpa* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz, *Sisymbrium gayanum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium hastatum* Phil., *Sisymbrium leptocarpum* Hook. & Arn.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16659* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (B, GH, M, S, SI, UC, US)].

Mostacillastrum orbignyanum (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Sin.: *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz, *Mostacillastrum elongatum* O.E. Schulz var. *latisiliquum* O.E. Schulz, *Sisymbrium elongatum* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium orbignyanum* E. Fourn.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15580* (BAA, MO, SI)].

Mostacillastrum pectinifolium (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium pectinatifolium* Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2300–3800 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 74* (CONC, SI)].

Mostacillastrum sagittatum (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis sagittata* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium ciliatum* Phil., *Sisymbrium fruticosum* Reiche, *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn., *Sisymbrium sagittatum* Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speg., *Sisymbrium volckmannii* Phil., *Sophia sagittata* (Hook. & Arn.) Macloskie
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–3700 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 858* (B, CAS, G, GH, M, MO, SI, UC, US)].

Mostacillastrum stenophyllum (Gillies ex Hook. & Arn.) O.E. Schulz
Sin.: *Hesperis stenophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium stenophyllum* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20427* (SI)].

Mostacillastrum subscandens (Speg.) Al-Shehbaz
Sin.: *Descurainia subscandens* (Speg.) Gilg & Muschl., *Erucastrum obtusangulum* Hieron., hom. illeg., *Sisymbrium subscandens* Speg., *Sophia subscandens* (Speg.) Macloskie
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Mostacillastrum ventanense (Boelcke) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium perenne* Speg., hom. illeg., *Sisymbrium ventanense* Boelcke
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Boelcke, O., 1967; Romanczuk, M. C., 1982.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)].

Myagrum alyssum Mill. = **Camelina alyssum** (Mill.) Thell.
Referencias: Boelcke, O., 1967.

Myagrum paniculatum L. = **Neslia paniculata** (L.) Desv.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Myagrum rugosum L. = **Rapistrum rugosum** (L.) All.

Myagrum sativum L. = **Camelina sativa** (L.) Crantz

Nasturtium R. Br.

Número de especies: 2 introducidas

Nasturtium anethifolium Phil. = **Werdermannia anethifolia** (Phil.) I.M. Johnst.

Nasturtium bonariense (Poir.) DC. = **Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie var. **bonariensis**

Nasturtium bonariense (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche = **Rorippa chubutica** (O.E. Schulz) Mart.-Laborde

Nasturtium brevicaule (Barnéoud) Kuntze = **Lepidium barneoudianum** Sukorý
Referencias: Sukorý, K., 2003.

Nasturtium clandestinum Spreng. = **Rorippa clandestina** (Spreng.) J.F. Macbr.

Nasturtium clandestinum Spreng. var. *brevistylum* O.E. Schulz = **Rorippa clandestina** (Spreng.) J.F. Macbr.

Nasturtium coxi F. Phil. ex Phil. = **Rorippa coxii** (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas

Nasturtium fontanum (Lam.) Asch. = **Nasturtium officinale** R. Br.

Nasturtium hilarianum (Walp.) Hauman = **Rorippa hilariana** (Walp.) Cabrera

Nasturtium micranthum Phil., hom. illeg. = **Rorippa chubutica** (O.E. Schulz) Mart.-Laborde

Nasturtium microphyllum Boenn. ex Rchb.
Sin.: *Rorippa microphylla* (Boenn. ex Rchb.) Hyl. ex A. Löve & D. Löve, *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek subsp. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) O. Bòlos & Vigo
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 1998; Martínez-Laborde, J. B., 2001.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(ERI); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 7257* (K, NY, UC)]; CHL[*Boelcke, O. 3923* (BAA, SI)].

Nasturtium nanum (Schltdl.) Wedd. = **Rorippa nana** (Schltdl.) J.F. Macbr.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1983c.

Nasturtium nasturtoides (Cambess.) Herter = **Rorippa hilariana** (Walp.) Cabrera
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Nasturtium officinale R. Br.
Sin.: *Nasturtium fontanum* (Lam.) Asch., *Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek, *Sisymbrium nasturtium-aquaticum* L.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 1998; Boelcke, O., 1987; Martínez-Laborde, J. B., 1985; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–4100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, IJF, RME); URY(MON, ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27244* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17616* (BACP)]; CHL[*Garaventa, A. 2720* (BAA, SI)]; URY[*Felippone, F. 3768* (SI)].

Nasturtium palustre (L.) DC. = **Rorippa palustris** (L.) Besser
Referencias: Boelcke, O., 1987.

Nasturtium philippianum Kuntze = **Lepidium philippianum** (Kuntze) Thell.
Referencias: Hitchcock, C. L., 1945.

Nasturtium philippianum Speg., nom. illeg. = **Rorippa chubutica** (O.E. Schulz) Mart.-Laborde

Nasturtium platense Speg. = **Rorippa hilariana** (Walp.) Cabrera

Nasturtium pumilum Cambess. = **Rorippa clandestina** (Spreng.) J.F. Macbr.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Nasturtium sinapis (Burm. f.) O.E. Schulz = **Rorippa dubia** (Pers.) Hara
Referencias: Hara, H., 1955; Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Nasturtium stenophylllum F. Phil. = **Cardamine tenuirostris** Hook. & Arn.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Nasturtium sylvestre (L.) R. Br. = **Rorippa sylvestris** (L.) Besser
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Neslia Desv., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Neslia paniculata (L.) Desv.
Sin.: *Myagrum paniculatum* L., *Vogelia paniculata* (L.) Hornem.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6521* (BA)].

Neuontobotrys O.E. Schulz

Número de especies: 10, 8 endémicas

Neuontobotrys berningeri O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b; Schulz, O. E., 1932.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 57* (BACP, CONC)].

Neuontobotrys choiquense (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium choiquense* Romanczuk
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Arbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 7215* (BAB)].

Neuontobotrys deserticola (Phil.) Al-Shehbaz = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Neuontobotrys elloanensis Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 11552* (MO)].

Neuontobotrys frutescens (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis frutescens* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium catamarcense* Romanczuk, *Sisymbrium frutescens* Gillies ex Hook. & Arn., *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk var. *pauciovulatum* Romanczuk, *Sisymbrium tomentosum* Romanczuk var. *tomentosum*
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Arbusto. Endémica. 800–2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 872* (SI)].

Neuontobotrys grayana (Baheni & J.F. Macbr.) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium grayanum* Baheni & J.F. Macbr., *Sisymbrium amplexicaule* A. Gray, hom. illeg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, C. 78* (SI)]

Neuontobotrys lanata (Walp.) Al-Shehbaz
Sin.: *Arabis lanata* Walp., *Hesperis foliosa* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium andinum* Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche, *Sisymbrium donnarosae* Martic., *Sisymbrium foliosum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz, *Sisymbrium lanatum* (Walp.) O.E. Schulz var. *fragile* (Wedd.) O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz, *Sisymbrium pubescens* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 2400–4100 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1062* (B, CAS, F, G, GH, MO, SI, UC, US)].

Neuontobotrys linearifolia (Kuntze) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis linearifolia* Kuntze, *Neuontobotrys linifolia* O.E. Schulz, *Sisymbrium linifolium* Phil., hom. illeg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b; Schulz, O. E., 1924.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–3800 m.
Países: CHL(I, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1115* (B, BM, CAS, CONC, E, F, GH, K, MO, NY, SI, UC)].

Neuontobotrys linifolia O.E. Schulz = **Neuontobotrys linearifolia** (Kuntze) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b.

Neuontobotrys mendocina (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium mendocinum* Romanczuk
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pujalte, J. C. 66* (SI)]; CHL[*Villagrán, C. 8507* (SGO)].

Neuontobotrys polyphylla (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium polyphyllum* Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(CAT); CHL(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Philippi, F. s.n.* (SGO)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B, CORD, K)].

Neuontobotrys robusta (Chodat & Wilczek) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium robustum* Chodat & Wilczek
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b; Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994; Boelcke, O., 1961.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA, SI)].

Neuontobotrys tarapacana (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Arabis tarapacana* Phil., *Cardamine deserticola* Phil., *Neuontobotrys deserticola* (Phil.) Al-Shehbaz, *Sisymbrium amplexicaule* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium intricatissimum* (Kuntze) O.E. Schulz var. *berningeri* O.E. Schulz, *Sisymbrium intricatissimum* (Kuntze) O.E. Schulz var. *brachycarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium philippianum* I.M. Johnst., *Sisymbrium tarapacanum* Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 1700–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32560* (BACP, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 968* (B, CAS, F, G, GH, K, MO, NY, SI, UC)].

Noccaea Moench

Número de especies: 1 endémica

Noccaea magellanica (Comm. ex Poir.) Holub
Sin.: *Thlaspi alpestre* L. var. *gracile* (Phil.) Gilg & Muschl., *Thlaspi andicola* Hook. & Arn., *Thlaspi commutatum* Reiche, *Thlaspi glaucophylla* Barnéoud, *Thlaspi gracile* Phil., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir., *Thlaspi magellanicum* Comm. ex Poir. var. *andicola* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Koch, M. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(V, VII, VIII, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11240* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Garaventa, A. 3507* (BACP, CONC)].

Onuris Phil.

Número de especies: 5 endémicas

Onuris alismatifolia Gilg ex Skottsb.
Referencias: Boelcke, O., 1984a; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 2788* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 8242* (CONC)].

Onuris graminifolia Phil.
Sin.: *Draba oligosperma* Speg., *Draba spegazziana* Dusén, *Onuris graminifolia* Phil. var. *austroamericana* Boelcke, *Onuris oligosperma* (Speg.) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O., 1984a; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 6340* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 2725* (CONC)].

Onuris graminifolia Phil. var. *austroamericana* Boelcke = **Onuris graminifolia** Phil.

Onuris hatcheriana (Gilg) Gilg & Muschl.
Sin.: *Draba hatcheriana* Gilg ex Macloskie
Referencias: Boelcke, O., 1984a; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1388* (BAB, US)]; CHL[*Landero 730* (CONC)].

Onuris oligosperma (Speg.) Gilg & Muschl. = **Onuris graminifolia** Phil.
Referencias: Boelcke, O., 1984a.

Onuris papillosa O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O., 1984a; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dauber, L. 46* (BAA)]; CHL[*T.B.P.A. 557* (SI)].

Onuris spegazziniana Gilg & Muschl.
Sin.: *Draba graminifolia* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O., 1984a; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 2604* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92553* (CONC)].

Parodiodoxa O.E. Schulz

Número de especies: 1 endémica

Parodiodoxa chionophila (Speg.) O.E. Schulz
Sin.: *Thlaspi chionophilum* Speg.
Referencias: Schulz, O. E., 1929.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–5100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 20859* (BAA, BACP, CORD)].

Pennellia Nieuwl.

Número de especies: 4, 3 endémicas

Pennellia boliviensis (Muschl.) Al-Shehbaz
Sin.: *Streptanthus boliviensis* Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990c.
Hierba. Bianual o perenne. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7191* (GH, SI)].

Pennellia brachycarpa Beilstein & Al-Shehbaz
Referencias: Beilstein, M. & Al-Shehbaz, I. A., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 3600–3700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Beilstein, M. 03-148* (MO)].

Pennellia gracilis (Wedd.) O.E. Schulz
= **Mostacillastrum gracile** (Wedd.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Pennellia lechleri (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Sin.: *Hesperis lechleri* (E. Fourn.) Kuntze, *Hesperis petraea* Kuntze, *Heterothrix petraea* (Phil.) O.E. Schulz, *Pennellia petraea* (Phil.) O.E. Schulz, *Sisymbrium caespitosum* Phil., *Sisymbrium fastigiatum* Phil., *Sisymbrium lechleri* E. Fourn., *Sisymbrium petraeum* Phil., nom. illeg., *Sisymbrium stenophyllum* Schltdl., hom. illeg., *Stenodraba fastigiata* (Phil.) Ravenna, *Stenodraba glareosa* Ravenna, *Stenodraba lechleri* (E. Fourn.) Ravenna, *Weberbauera lechleri* (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004c; Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–2100 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, H. F. 876* (E, K)]; CHL[*Marticorena, C. 736* (BACP, CONC, SI)].

Pennellia parvifolia (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Sin.: *Sisymbrium hispidum* Phil., hom. illeg., *Sisymbrium parvifolium* Phil., *Sisymbrium vestitum* (Ravenna) Al-Shehbaz, *Stenodraba parvifolia* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba vestita* Ravenna, *Weberbauera parvifolia* (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004c; Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2300 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11565* (BAA, SI)]; CHL[*Montero, G. 8155* (SI)].

Pennellia petraea (Phil.) O.E. Schulz = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Perreymondia brongniartii Barnéoud = **Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Perreymondia dentata Barnéoud = **Schizopetalon dentatum** (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Perreymondia multifida Barnéoud = **Schizopetalon dentatum** (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Perreymondia rupestris Barnéoud = **Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Perreymondia viridis Phil. = **Schizopetalon dentatum** (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Petroravenia Al-Shehbaz

Número de especies: 1 endémica

Petroravenia eseptata Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1994a.
Hierba. Perenne. Endémica. 4400–4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31763* (MO, SI)].

Phlebiophragmus macrorrhizus (Muschl.) O.E. Schulz
= **Mostacillastrum gracile** (Wedd.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Phlebolobium O.E. Schulz

Número de especies: 1 endémica

Phlebolobium maclovianum (d'Urv.) O.E. Schulz
Sin.: *Arabis macloviana* (d'Urv.) Hook. f., *Brassica macloviana* d'Urv., *Erysimum maclovianum* (d'Urv.) Gay ex Gaudich.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Green, S. W. s.n.* (SI)];

Physaria (Nutt.) A. Gray

Número de especies: 5, 4 endémicas

Physaria crassistigma O'Kane & Al-Shehbaz
Referencias: O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–2900 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 23145* (BAA)].

Physaria lateralis O'Kane & Al-Shehbaz
Sin.: *Lesquerella mendocina* (Phil.) A. Gray var. *microcarpa* O.E. Schulz
Referencias: O'Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.

Países: ARG(COR, MEN, NEU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Del Vitto, L. A. 2970* (CTES, UNSL)].

Physaria mendocina (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz
Sin.: *Alyssum mendocinum* (Phil.) Kuntze, *Lesquerella montevidensis* (Eichler) S. Watson, *Vesicaria artica* Hook. & Arn., *Vesicaria mendocina* Phil., *Vesicaria montevidensis* Eichler
Referencias: O´Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SLU); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 764* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4193* (BAA)].

Physaria pygmaea O'Kane & Al-Shehbaz
Referencias: O´Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4300 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 189* (ISTC, MO, SI)].

Physaria urbaniana (Muschl.) O'Kane & Al-Shehbaz
Sin.: *Alyssum boliviense* Muschl., *Alyssum urbanianum* Muschl.
Referencias: O´Kane Jr., S. L. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2587* (BAA, LIL, US)].

Polypsecadium O.E. Schulz

Número de especies: 9, 8 endémicas

Polypsecadium arnottianum (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis arnottiana* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8809* (SI)].

Polypsecadium brasiliense (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium brasiliense* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3414* (US)].

Polypsecadium burkartii Romanczuk & Boelcke = **Exhalimolobos burkartii** (Romanczuk & Boelcke) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Polypsecadium gilliesii (Romanczuk) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium gilliesii* Romanczuk
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–4000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16634* (SI)].

Polypsecadium grandiflorum Romanczuk & Boelcke
Referencias: Romanczuk, M. C. & Boelcke, O., 1982.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22111* (SI)].

Polypsecadium harmsianum (Muschl.) O.E. Schulz
Sin.: *Polypsecadium harmsianum* (Muschl.) O.E. Schulz var. *dentatum* (Muschl.) O.E. Schulz, *Sisymbrium ragoneseanum* O.E. Schulz, *Thelypodium harmsianum* Muschl., *Thelypodium harmsianum* Muschl. var. *dentatum* Muschl.
Referencias: Romanczuk, M. C. & Boelcke, O., 1982.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 1000–3200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7862* (CAS, FI, GH, K, MO, SI, UC, US)].

Polypsecadium harmsianum (Muschl.) O.E. Schulz var. *dentatum* (Muschl.) O.E. Schulz = **Polypsecadium harmsianum** (Muschl.) O.E. Schulz
Referencias: Romanczuk, M. C. & Boelcke, O., 1982.

Polypsecadium litorale (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Hesperis litoralis* (Phil.) Kuntze, *Sisymbrium litorale* Phil., *Sisymbrium litorale* Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Polypsecadium magellanicum (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Sin.: *Arabis macloviana* Reiche, hom. illeg., *Arabis magellanica* (Juss. ex Pers.) Dusén, *Brassica antarctica* Molina, *Brassica magellanica* Juss. ex Pers., *Cardamine patagonica* Speg., *Hesperis magellanica* (Juss. ex Pers.) Kuntze, *Schizopetalon fuegianum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *glabrum* Speg., *Sisymbrium fuegianum* (Speg.) Speg. var. *hispidum* Speg., *Sisymbrium maclovianum* Speg., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f., *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *glabrum* (Speg.) O.E. Schulz, *Sisymbrium magellanicum* (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *hispidum* (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 3636* (BAB, MICH, NA, SI, UC)]; CHL[*Pisano, E. 2549* (CONC, SI)].

Polypsecadium tucumanense (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *dolichocarpum* O.E. Schulz, *Sisymbrium arnottianum* Gillies ex Hook. & Arn. var. *tucumanense* O.E. Schulz, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk, *Sisymbrium tucumanense* (O.E. Schulz) Romanczuk var. *rigidocarpum* Romanczuk

Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Romanczuk, M. C., 1982.
Arbusto. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4637* (BAA, CAS, GH, SI)].

Polypsecadium zoellneri Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 4008* (CONC)].

Pterygiosperma O.E. Schulz
Número de especies: 1 endémica

Pterygiosperma tehuelches (Speg.) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium pinnatum* Speg., *Sisymbrium tehuelches* Speg., *Streptanthus tehuelches* (Speg.) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 184* (F, G, GH, K, MO, NY, SI, UC)].

Raphanus L.
Número de especies: 2 introducidas

Raphanus raphanistrum L.
Referencias: Boelcke, O., 1987; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(COA, ITA); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28928* (SI)]; BRA[*Archer, W. A. 4325* (GH)]; CHL[*Villagrán, C. 7083* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 1252* (G)]; URY[*Felippone, F. 3016* (SI)].

Raphanus sativus L.
Referencias: Boelcke, O., 1987; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XII, IJR, RME); PRY(MIE); URY(MON, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 29742* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 36779* (BACP, CTES)]; CHL[*Ricardi, M. 473* (CONC)]; PRY[*Arbo, M. M. 1802* (BACP)]; URY[*Rosengurtt, B. 1607b* (MVFA)].

Raphanus tenellus Pall. = **Chorispora tenella** (Pall.) DC.

Rapistrum Crantz, nom. cons.
Número de especies: 1 introducida

Rapistrum rugosum (L.) All.
Sin.: *Myagrum rugosum* L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Scalon, V. R. & Souza, V. C., 2002.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, RME); PRY(CEN); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 2876* (BAA, SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 37544* (CONC)]; PRY[*Recalde 26* (G)]; URY[*Felippone, F. 5794* (SI)].

Rorippa Scop.
Número de especies: 12, 4 endémicas, 3 introducidas

Rorippa austroamericana Mart.-Laborde
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Martínez-Laborde, J. B., 1983c, 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(V, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14043* (BAA, BAB, BACP, SI)]; CHL[*Boelcke, O. 2444* (BAA)].

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie var. **bonariensis**
Sin.: *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC., *Sisymbrium bonariense* Poir.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985; Teillier A., S., 2003.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–2400 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, MIS, SAL, SFE); CHL(RME); URY(COL, FLA, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 1178* (SI)]; CHL[*Teillier, S. 5185* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 444* (SI)].

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie var. **burkartii** Mart.-Laborde
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29287* (SI)].

Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie var. **chacoensis** Mart.-Laborde
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2960* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 285* (SI)].

Rorippa chubutica (O.E. Schulz) Mart.-Laborde
Sin.: *Descurainia chubutica* O.E. Schulz, *Nasturtium bonariense* (Poir.) DC. var. *micranthum* (Phil.) Reiche, *Nasturtium micranthum* Phil., hom. illeg., *Nasturtium philippianum* Speg., nom. illeg., *Rorippa philippiana* (Speg.) Macloskie, nom. illeg.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985; Scappini, E. G., Bianco, C. A. & Prina, A. O., 2004[2003].
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU, TDF); CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10751* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 636* (CONC)].

Rorippa clandestina (Spreng.) J.F. Macbr.
Sin.: *Cardamine clandestina* (Spreng.) Kuntze, *Nasturtium clandestinum* Spreng., *Nasturtium clandestinum* Spreng. var. *brevistylum* O.E. Schulz, *Nasturtium pumilum* Cambess.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27941* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5360* (K)].

Rorippa coxii (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas
Sin.: *Nasturtium coxi* F. Phil. ex Phil., *Sisymbrium laciniosum* Phil.
Referencias: Navas Bustamante, L. E., 1976.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 2705* (BAA, BACP, SI)].

Rorippa dubia (Pers.) Hara
Sin.: *Nasturtium sinapis* (Burm. f.) O.E. Schulz, *Rorippa sinapis* (Burm. f.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Rorippa sinapis* (Burm. f.) Ohwi & Hara, p.p., *Sisymbrium dubium* Pers., *Sisymbrium sinapis* Burm. f.
Referencias: Hara, H., 1955; Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MIS, TUC); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12951* (BAA, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15826* (GH, K)].

Rorippa hilariana (Walp.) Cabrera
Sin.: *Cardamine hilariana* Walp., *Nasturtium hilarianum* (Walp.) Hauman, *Nasturtium nasturtoides* (Cambess.) Herter, *Nasturtium platense* Speg.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, RNE, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PHA); URY(CAS, MON, PAY, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12871* (BAA, SI)]; BRA[*Ferreira 153* (BACP)]; PRY[*Lindman, C. A. M. s.n.* (S)]; URY[*Rosengurtt, B. 3809b* (BAA)].

Rorippa mandonii (E. Fourn.) Mart.-Laborde
Sin.: *Sisymbrium mandonii* E. Fourn.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Anual. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1014* (SI)].

Rorippa microphylla (Boenn. ex Rchb.) Hyl. ex A. Löve & D. Löve = **Nasturtium microphyllum** Boenn. ex Rchb.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 2001.

Rorippa nana (Schltdl.) J.F. Macbr.
Sin.: *Kardamoglyphos nana* Schltdl., *Mathewsia boliviana* Gilg & Muschl., *Mathewsia diffusa* Rusby, *Nasturtium nanum* (Schltdl.) Wedd.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1983c, 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 2400–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15416* (BAA, LP)].

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek = **Nasturtium officinale** R. Br.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 1998.

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek subsp. *microphyllum* (Boenn. ex Rchb.) O. Bòlos & Vigo = **Nasturtium microphyllum** Boenn. ex Rchb.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 2001.

Rorippa palustris (L.) Besser
Sin.: *Nasturtium palustre* (L.) DC., *Sisymbrium amphibium* var. *palustre* L., *Sisymbrium palustre* (L.) Pollich
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 15314* (BAA, G, SI)]; CHL[*Garaventa, A. 3026* (SI)].

Rorippa philippiana (Speg.) Macloskie, nom. illeg. = **Rorippa chubutica** (O.E. Schulz) Mart.-Laborde

Rorippa sinapis (Burm. f.) J.F. Macbr., comb. superfl. = **Rorippa dubia** (Pers.) Hara
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Rorippa sinapis (Burm. f.) Ohwi & Hara, p.p. = **Rorippa dubia** (Pers.) Hara
Referencias: Hara, H., 1955.

Rorippa sylvestris (L.) Besser
Sin.: *Nasturtium sylvestre* (L.) R. Br., *Sisymbrium sylvestre* L.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–600 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21922* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 8158* (BACP, SI)].

Rorippa ventanensis Boelcke
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7262* (GH, SI)].

Sarcodraba Gilg & Muschl.

Número de especies: 4 endémicas

Sarcodraba andina O.E. Schulz
Sin.: *Ateixa andina* (O.E. Schulz) Ravenna
Referencias: Boelcke, O. & Martínez-Laborde, J. B., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Perrone s.n.* (BA)].

Sarcodraba dusenii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Grammosperma dusenii* O.E. Schulz

Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16746* (BACP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 860041* (CONC)].

Sarcodraba herzogii O.E. Schulz = **Weberbauera herzogii** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Sarcodraba karraikensis (Speg.) Gilg & Muschl.
Sin.: *Draba karraikensis* Speg.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–800 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Garaventa, A. 8129* (SI)].

Sarcodraba subterranea O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3574* (BAA, BAB)].

Schizopetalon Sims

Número de especies: 10 endémicas

Schizopetalon arcuatum Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 200–400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1803* (CONC, F, OS)].

Schizopetalon bipinnatifidum Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 300–2400 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1717* (CONC)].

Schizopetalon biseriatum Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 443* (B, BM, CONC, E, F, G, GH, K, MO, NY, S, SI, US)].

Schizopetalon brachycarpum Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 2100–2300 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schlegel, F. 926* (CONC)].

Schizopetalon brongniartii (Barnéoud) Reiche = **Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Schizopetalon corymbosum Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 44b* (GH)].

Schizopetalon dentatum (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Sin.: *Diplotaxis chilensis* Barnéoud, *Perreymondia dentata* Barnéoud, *Perreymondia multifida* Barnéoud, *Perreymondia viridis* Phil., *Schizopetalon viride* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Anual. Endémica. 600–2300 m.
Países: CHL(III, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 1172* (B, CONC, SI)].

Schizopetalon dentatum (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl. = **Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Schizopetalon fuegianum Speg. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Schizopetalon gayanum Barnéoud = **Schizopetalon maritimum** Barnéoud
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Schizopetalon maritimum Barnéoud
Sin.: *Schizopetalon gayanum* Barnéoud
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1471* (CONC)].

Schizopetalon rupestre (Barnéoud) Reiche
Sin.: *Perreymondia brongniartii* Barnéoud, *Perreymondia rupestris* Barnéoud, *Schizopetalon brongniartii* (Barnéoud) Reiche, *Schizopetalon dentatum* (Barnéoud) Gilg & Muschl. var. *san-romanii* (Phil.) Gilg & Muschl., *Schizopetalon san-romanii* Phil., *Schizopetalon walkeri* Sims var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 1300–4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 9692* (BAA, GH, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 192* (BM, CONC, E, F, G, GH, K, MO, S, SI, UC, US)].

Schizopetalon san-romanii Phil. = **Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Schizopetalon tenuifolium Phil.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 9822* (CONC)].

Schizopetalon viride (Phil.) Reiche = **Schizopetalon dentatum** (Barnéoud) Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Schizopetalon walkeri Sims
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 1786* (BM, CONC, E, F, G, GH, MO, P, S)].

Schizopetalon walkeri Sims var. *brongniartii* (Barnéoud) Gilg & Muschl. = **Schizopetalon rupestre** (Barnéoud) Reiche
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1989b.

Senebiera australis Hook. f. = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Senebiera pinnatifida var. *australis* (Hook. f.) De Wild. = **Lepidium pseudodidymus** Thell. ex Druce
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Senebiera rhytidocarpa Hook. = **Lepidium rhytidocarpum** (Hook.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Senebiera serrata Poir. = **Lepidium serratum** (Poir.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., Appel, O. & Mummenhoff, K., 2002.

Sinapis L.

Número de especies: 2 introducidas

Sinapis alba L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1120* (SI)].

Sinapis arvensis L.
Referencias: Boelcke, O., 1987.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, RNE, TDF); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25304b* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2017* (CTES)].
Notas: Citada para Montevideo, Uruguay, sin indicar ejemplar de referencia (Lombardo, 1982).

Sinapis erucoides L. = **Diplotaxis erucoides** (L.) DC.
Referencias: Martínez-Laborde, J. B. & Méndez, E., 2001.

Sinapis incana L. = **Hirschfeldia incana** (L.) Lagr.-Foss.

Sinapis juncea L. = **Brassica juncea** (L.) Czern.

Sinapis nigra L. = **Brassica nigra** (L.) W.D.J. Koch

Sisymbrium L.

Número de especies: 8, 7 introducidas

Sisymbrium altissimum L.
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arroyo-Leuenberger, S. 12* (SI)]; CHL[*Rodriguez Rios, R. 549* (CONC)].

Sisymbrium ameghinoi Speg. = **Mostacillastrum ameghinoi** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium amphibium var. *palustre* L. = **Rorippa palustris** (L.) Besser

Sisymbrium amplexicaule A. Gray, hom. illeg. = **Neuontobotrys grayana** (Baehni & J.F. Macbr.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium amplexicaule Phil., hom. illeg. = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Sisymbrium amplexicaule Phil. var. *corymbosum* (Phil.) Reiche = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz

Sisymbrium andinum Speg., hom. illeg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz

Sisymbrium andinum Phil. f. *dolichocarpum* Hauman = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *exauriculatum* (Speg.) O.E. Schulz = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *hastatum* (Phil.) O.E. Schulz = **Mostacillastrum leptocarpum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *hossei* O.E. Schulz = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *juncalense* O.E. Schulz = **Mostacillastrum leptocarpum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *latifolium* Phil. = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *morenoanum* (Chodat & Wilczek) O.E. Schulz = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *pubescens* Gilg & Muschl., hom. illeg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium andinum Phil. var. *pubescens* Phil. ex Reiche = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium anomalum Wedd. = **Weberbauera peruviana** (DC.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004c.

Sisymbrium antarcticum E. Fourn. = **Descurainia antarctica** (E. Fourn.) O.E. Schulz

Sisymbrium arnottianum Gillies ex Hook. & Arn. = **Polypsecadium arnottianum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium arnottianum Gillies ex Hook. & Arn. var. *dolichocarpum* O.E. Schulz = **Polypsecadium tucumanense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium arnottianum Gillies ex Hook. & Arn. var. *tucumanense* O.E. Schulz = **Polypsecadium tucumanense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium austriacum Jacq.
Sin.: *Sisymbrium berteroanum* Phil.
Referencias: Boelcke, O., 1977; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(SCR); CHL(IV, V, VI, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 198* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 8149* (SI)].

Sisymbrium bellidifolium Poir. = **Cardamine chenopodiifolia** Pers.
Referencias: Boelcke, O., 1976.

Sisymbrium berteroanum Phil. = **Sisymbrium austriacum** Jacq.

Sisymbrium bonariense Poir. = **Rorippa bonariensis** (Poir.) Macloskie var. **bonariensis**

Sisymbrium brachycarpum Phil. = **Descurainia depressa** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sisymbrium brasiliense O.E. Schulz = **Polypsecadium brasiliense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium caespitosum Phil. = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

[Sisymbrium canescens Nutt.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sisymbrium canescens Nutt. f. *brachysiliquum* Chodat & Wilczek = **Descurainia argentina** O.E. Schulz

Sisymbrium canescens Nutt. var. *appendiculatum* Griseb. = **Descurainia appendiculata** (Griseb.) O.E. Schulz

Sisymbrium carolinense Scappini, C.A. Bianco & Prina = **Mostacillastrum carolinense** (Scappini, C.A. Bianco & Prina) Al-Shehbaz, Scappini, C.A. Bianco & Prina
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium castellanosii O.E. Schulz = **Chilocardamum castellanosii** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium catamarcense Romanczuk = **Neuontobotrys frutescens** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium choiquense Romanczuk = **Neuontobotrys choiquense** (Romanczuk) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium ciliatum Phil. = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium colchaguensis (Barnéoud) E. Fourn. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Sisymbrium commune (Speg.) Romanczuk = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium consanguineum Phil. ex Reiche = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium corymbosum Phil. = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium corymbosum Phil. var. *consanguineum* (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium cumingianum Fisch. & C.A. Mey.
= **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium cumingii J. Presl = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium depressum Phil. = **Descurainia depressa** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sisymbrium deserticola Speg. = **Trichotolinum deserticola** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium dianthoides Phil. = **Mostacillastrum dianthoides** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium donnarosae Martic. = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium dubium Pers. = **Rorippa dubia** (Pers.) Hara
Referencias: Hara, H., 1955.

Sisymbrium elegantulum Phil. = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Sisymbrium elongatum (O.E. Schulz) Romanczuk
= **Mostacillastrum orbignyanum** (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium erysimoides Desf.
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. 3712* (BA)].

Sisymbrium fastigiatum Phil. = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium ferreyrae Förther & Weigend
= **Mostacillastrum ferreyrae** (Förther & Weigend) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium flexicaule Dusén = **Chilocardamum patagonicum** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Schulz, O. E., 1924.

Sisymbrium foliosum Phil., nom. illeg. = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium frutescens Gillies ex Hook. & Arn.
= **Neuontobotrys frutescens** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium fruticosum Reiche = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium fuegianum (Speg.) Speg. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium fuegianum (Speg.) Speg. var. *glabrum* Speg.
= **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium fuegianum (Speg.) Speg. var. *hispidum* Speg.
= **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium gayanum (Hook. & Arn.) Kuntze
= **Mostacillastrum leptocarpum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium geraniifolium Poir. = **Cardamine geraniifolia** (Poir.) DC.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium gilliesii Romanczuk = **Polypsecadium gilliesii** (Romanczuk) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium glabrescens Speg. = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Sisymbrium glaciale G. Forst. = **Cardamine glacialis** (G. Forst.) DC.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium gracile Wedd. = **Mostacillastrum gracile** (Wedd.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium grayanum Baehni & J.F. Macbr.
= **Neuontobotrys grayana** (Baehni & J.F. Macbr.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium hastatum Phil. = **Mostacillastrum leptocarpum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium hispidulum (DC.) Triana & Planch. var. *weddellii* (E. Fourn.) Baehni & J.F. Macbr. = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium hispidum Phil., hom. illeg. = **Pennellia parvifolia** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium imbricatifolium (Barnéoud) Wedd. = **Weberbauera imbricatifolia** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Sisymbrium intricatissimum (Kuntze) O.E. Schulz = **Eremodraba intricatissima** (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990f; Schulz, O. E., 1924.

Sisymbrium intricatissimum (Kuntze) O.E. Schulz var. *berningeri* O.E. Schulz = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium intricatissimum (Kuntze) O.E. Schulz var. *brachycarpum* O.E. Schulz = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium irio L.
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF, TUC); CHL(RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piccinini, B. 2120* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 8151* (SI)]; URY[*Lema 7035* (MVFA)].

Sisymbrium laciniosum Phil. = **Rorippa coxii** (F. Phil. ex Phil.) L.E. Navas

Sisymbrium lanatum (Walp.) O.E. Schulz = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium lanatum (Walp.) O.E. Schulz var. *fragile* (Wedd.) O.E. Schulz = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium lechleri E. Fourn. = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium leptocarpum Hook. & Arn. **Mostacillastrum leptocarpum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium linifolium Phil., hom. illeg. = **Neuontobotrys linearifolia** (Kuntze) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b.

Sisymbrium litorale Phil. = **Polypsecadium litorale** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium litorale Phil. var. *virgatum* O.E. Schulz = **Polypsecadium litorale** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium longistylum Romanczuk = **Chilocardamum longistylum** (Romanczuk) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium maclovianum Speg. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium macrostachyum Phil. = **Werdermannia macrostachya** (Phil.) O.E. Schulz

Sisymbrium magellanicum (Juss. ex Pers.) Hook. f. = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium magellanicum (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *glabrum* (Speg.) O.E. Schulz = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.

Sisymbrium magellanicum (Juss. ex Pers.) Hook. f. f. *hispidum* (Speg.) O.E. Schulz = **Polypsecadium magellanicum** (Juss. ex Pers.) Al-Shehbaz
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.

Sisymbrium mandonii E. Fourn. = **Rorippa mandonii** (E. Fourn.) Mart.-Laborde
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Sisymbrium mendocinum Romanczuk = **Neuontobotrys mendocina** (Romanczuk) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium minutiflorum Phil., hom. illeg. = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sisymbrium morenoanum Chodat & Wilczek = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium morenoanum Chodat & Wilczek f. *robustum* Chodat & Wilczek = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium murale L. = **Diplotaxis muralis** (L.) DC.

Sisymbrium myriophyllum Willd. ex DC. = **Descurainia myriophylla** (Willd. ex DC.) R.E. Fr.

Sisymbrium nasturtium-aquaticum L. = **Nasturtium officinale** R. Br.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 1998.

Sisymbrium niveum Phil. = **Mathewsia nivea** (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Rollins, R. C., 1966.

Sisymbrium nuttalli Colla = **Descurainia nuttallii** (Colla) O.E. Schulz

Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sin.: *Erysimum officinale* L.
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CAS, FLA, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 7245* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3901* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 628* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4949* (MVFA)].

Sisymbrium onuridifolium (Ravenna) Al-Shehbaz = **Chilocardamum onuridifolium** (Ravenna) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium orbignyanum E. Fourn. = **Mostacillastrum orbignyanum** (E. Fourn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium orientale L.
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU); CHL(II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29582* (SI)]; CHL[*Barros, E. 2748* (SI)].

Sisymbrium orophilum Wedd. = **Weberbauera spathulifolia** (A. Gray) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Sisymbrium palustre (L.) Pollich = **Rorippa palustris** (L.) Besser
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Sisymbrium parvifolium Phil. = **Pennellia parvifolia** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium patagonicum Speg. = **Chilocardamum patagonicum** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium pazensis Rusby = **Exhalimolobos pazensis** (Rusby) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium pectinatifolium Al-Shehbaz = **Mostacillastrum pectinifolium** (Al-Shehbaz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium perenne Speg., hom. illeg. = **Mostacillastrum ventanense** (Boelcke) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium peruvianum DC. = **Weberbauera peruviana** (DC.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004c.

Sisymbrium petraeum Phil., nom. illeg. = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium philippianum I.M. Johnst. = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Sisymbrium pimpinellifolium Barnéoud = **Descurainia pimpinellifolia** (Barnéoud) O.E. Schulz

Sisymbrium pinnatum Barnéoud = **Werdermannia pinnata** (Barnéoud) O.E. Schulz

Sisymbrium pinnatum Speg. = **Pterygiosperma tehuelches** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium polyphyllum Phil. = **Neuontobotrys polyphylla** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium pubescens (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium pubescens (Phil. ex Reiche) O.E. Schulz var. *glabrescens* O.E. Schulz = **Neuontobotrys lanata** (Walp.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium punense Romanczuk = **Dictyophragmus punensis** (Romanczuk) Al-Shehbaz

Sisymbrium pusillum Wedd. ex E. Fourn., hom. illeg. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Sisymbrium ragoneseanum O.E. Schulz = **Polypsecadium harmsianum** (Muschl.) O.E. Schulz
Referencias: Romanczuk, M. C. & Boelcke, O., 1982.

Sisymbrium robustum Chodat & Wilczek = **Neuontobotrys robusta** (Chodat & Wilczek) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Sisymbrium rubescens Phil. = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.
Referencias: Boelcke, O., 1977; Romanczuk, M. C., 1982.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16287* (SI)].

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *andinum* (Phil.) Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Romanczuk, M. C., 1982.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *ciliatum* (Phil.) Speg. = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *commune* Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *exauriculatum* Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *glaucum* Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *latifolium* (Phil.) Speg. = **Mostacillastrum andinum** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *normalis* Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *pubescens* (Phil.) Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz

Sisymbrium sagittatum Hook. & Arn. var. *purpurascens* Speg. = **Mostacillastrum commune** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium simpsonii Phil. = **Cardamine variabilis** Phil.

Sisymbrium sinapis Burm. f. = **Rorippa dubia** (Pers.) Hara
Referencias: Hara, H., 1955.

Sisymbrium sophia L. = **Descurainia sophia** (L.) Webb ex Prantl
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium spathulifolium A. Gray = **Weberbauera spathulifolia** (A. Gray) O.E. Schulz

Sisymbrium stenophyllum Gillies ex Hook. & Arn. = **Mostacillastrum stenophyllum** (Gillies ex Hook. & Arn.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium stenophyllum Schltdl., hom. illeg. = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey

Sisymbrium strictum Phil. = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche
Referencias: Schulz, O. E., 1924.

Sisymbrium subscandens Speg. = **Mostacillastrum subscandens** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium suffruticosum (Barnéoud) E. Fourn. = **Weberbauera suffruticosa** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Sisymbrium sylvestre L. = **Rorippa sylvestris** (L.) Besser
Referencias: Martínez-Laborde, J. B., 1985.

Sisymbrium tarapacanum Phil. = **Neuontobotrys tarapacana** (Phil.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004b, 2006b.

Sisymbrium tehuelches Speg. = **Pterygiosperma tehuelches** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium tenuifolium L. = **Diplotaxis tenuifolia** (L.) DC.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sisymbrium tenuissimum Phil. = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Sisymbrium titicacense Walp. = **Descurainia titicacensis** (Walp.) Lillo

Sisymbrium tomentosum Romanczuk var. *pauciovulatum* Romanczuk = **Neuontobotrys frutescens** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium tomentosum Romanczuk var. *tomentosum* = **Neuontobotrys frutescens** (Gillies ex Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium tucumanense (O.E. Schulz) Romanczuk = **Polypsecadium tucumanense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium tucumanense (O.E. Schulz) Romanczuk var. *rigidocarpum* Romanczuk = **Polypsecadium tucumanense** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium umbelliferum Phil. = **Descurainia stricta** (Phil.) Prantl ex Reiche

Sisymbrium ventanense Boelcke = **Mostacillastrum ventanense** (Boelcke) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium vestitum (Ravenna) Al-Shehbaz = **Pennellia parvifolia** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Sisymbrium volckmannii Phil. = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sisymbrium weddelii E. Fourn. = **Exhalimolobos weddellii** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Skottsbergianthus colobanthoides (Skottsb.) Boelcke = **Xerodraba colobanthoides** Skottsb.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.

Skottsbergianthus sorianoi (Boelcke) Boelcke = **Xerodraba colobanthoides** Skottsb.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.

Skottsbergiella colobanthoides (Skottsb.) Boelcke = **Xerodraba colobanthoides** Skottsb.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.

Skottsbergiella sorianoi Boelcke = **Xerodraba colobanthoides** Skottsb.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a.

Sophia deserticola (Speg.) Macloskie = **Trichotolinum deserticola** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sophia glabrescens (Speg.) Macloskie = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sophia heterotricha (Speg.) Macloskie = **Descurainia heterotricha** Speg.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Sophia sagittata (Hook. & Arn.) Macloskie = **Mostacillastrum sagittatum** (Hook. & Arn.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sophia subscandens (Speg.) Macloskie = **Mostacillastrum subscandens** (Speg.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Sophia tenuissima (Phil.) Macloskie = **Descurainia cumingiana** (Fisch. & C.A. Mey.) Prantl

Stenodraba andina (Phil.) O.E. Schulz = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba andina (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E. Schulz = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba andina (Phil.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Phil.) O.E. Schulz = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba andina (Phil.) O.E. Schulz var. *stylosa* O.E. Schulz = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba chillanensis (Phil.) O.E. Schulz = **Weberbauera chillanensis** (Phil.) Al-Shehbaz

Stenodraba colchaguensis (Barnéoud) O.E. Schulz = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz

Stenodraba fastigiata (Phil.) Ravenna = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Stenodraba glareosa Ravenna = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Stenodraba imbricatifolia (Barnéoud) O.E. Schulz = **Weberbauera imbricatifolia** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba imbricatifolia (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz = **Weberbauera imbricatifolia** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba lechleri (E. Fourn.) Ravenna = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Stenodraba parvifolia (Phil.) O.E. Schulz = **Pennellia parvifolia** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Stenodraba patagonica (Phil.) Ravenna = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba pusilla Boelcke, nom. illeg. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz

Stenodraba pusilla Boelcke, nom. illeg. var. *patagonica* (Phil.) Boelcke, nom. illeg. = **Weberbauera colchaguensis** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba stenophylla (Leyb.) O.E. Schulz = **Weberbauera stenophylla** (Leyb.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba stenophylla (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz = **Weberbauera stenophylla** (Leyb.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba suffruticosa (Barnéoud) O.E. Schulz = **Weberbauera suffruticosa** (Barnéoud) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba suffruticosa (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz = **Weberbauera lagunae** (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Stenodraba vestita Ravenna = **Pennellia parvifolia** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Streptanthus boliviensis Muschl. = **Pennellia boliviensis** (Muschl.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990c.

Streptanthus tehuelches (Speg.) Gilg & Muschl. = **Pterygiosperma tehuelches** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Strigosella Boiss.

Número de especies: 1 introducida

Strigosella africana (L.) Botsch.
Sin.: *Hesperis africana* L., *Malcolmia africana* (L.) R. Br.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Botschantzev, V. P., 1972.
Hierba. Anual. Introducida. 0–300 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zardini, E. M. 148* (LP)].

Teesdalia R. Br.

Número de especies: 1 introducida

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.
Sin.: *Iberis nudicaulis* L.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 548* (CONC)].

Thelypodium flexicaule (Dusén) Gilg & Muschl. = **Chilocardamum patagonicum** (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b; Schulz, O. E., 1924.

Thelypodium harmsianum Muschl. = **Polypsecadium harmsianum** (Muschl.) O.E. Schulz
Referencias: Romanczuk, M. C. & Boelcke, O., 1982.

Thelypodium harmsianum Muschl. var. *dentatum* Muschl. = **Polypsecadium harmsianum** (Muschl.) O.E. Schulz
Referencias: Romanczuk, M. C. & Boelcke, O., 1982.

Thelypodium macrorrhizum Muschl. = **Mostacillastrum gracile** (Wedd.) Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006b.

Thlaspi L.

Número de especies: 1 introducida

Thlaspi alpestre L. var. *gracile* (Phil.) Gilg & Muschl. = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub

Thlaspi andicola Hook. & Arn. = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub

Thlaspi arvense L.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Latour, C. M. 2816* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 553* (CONC)].

Thlaspi bursa-pastoris L. = **Capsella bursa-pastoris** (L.) Medik.

Thlaspi chionophilum Speg. = **Parodiodoxa chionophila** (Speg.) O.E. Schulz

Thlaspi commutatum Reiche = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub

Thlaspi glaucophylla Barnéoud = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub

Thlaspi gracile Phil. = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub

Thlaspi magellanicum Comm. ex Poir. = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub
Referencias: Koch, M. & Al-Shehbaz, I. A., 2004.

Thlaspi magellanicum Comm. ex Poir. var. *andicola* (Hook. & Arn.) O.E. Schulz = **Noccaea magellanica** (Comm. ex Poir.) Holub

Thlaspi saxatile L. = **Aethionema saxatile** (L.) R. Br.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Trichotolinum O.E. Schulz

Número de especies: 1 endémica

Trichotolinum deserticola (Speg.) O.E. Schulz
Sin.: *Descurainia deserticola* (Speg.) Speg., *Sisymbrium deserticola* Speg., *Sophia deserticola* (Speg.) Macloskie
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. 143* (BA)].

Tropidocarpum Hook.

Número de especies: 1 endémica

Tropidocarpum lanatum (Barnéoud) Al-Shehbaz & R.A. Price
Sin.: *Agallis lanata* (Barnéoud) Gilg & Muschl. ex O.E. Schulz, *Agallis montana* Phil., *Lepidium lanatum* Barnéoud
Referencias: Al-Shehbaz, I. A. & Price, R. A., 2001; Al-Shehbaz, I. A., 2003.
Hierba. Anual. Endémica. 200–900 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Wagenknecht, R. 3324* (BACP, CONC, SI)].

Urbanodoxa tarapacana Ricardi & Martic. = **Cremolobus chilensis** (Lag. ex DC.) DC.

Vesicaria artica Hook. & Arn. = **Physaria mendocina** (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Vesicaria mendocina Phil. = **Physaria mendocina** (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Vesicaria montevidensis Eichler = **Physaria mendocina** (Phil.) O'Kane & Al-Shehbaz

Vogelia paniculata (L.) Hornem. = **Neslia paniculata** (L.) Desv.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.

Weberbauera Gilg & Muschl.

Número de especies: 10, 6 endémicas

Weberbauera chillanensis (Phil.) Al-Shehbaz
Sin.: *Draba chillanensis* Phil., *Stenodraba chillanensis* (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2900 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10370* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 604* (B, BM, F, G, GH, K, MO, NY, SI, UC)].

Weberbauera colchaguensis (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sin.: *Arabis drabaeformis* Schltdl., *Cardamine colchaguensis* Barnéoud, *Draba andina* Phil., *Draba patagonica* Phil., *Erysimum pusillum* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Sisymbrium colchaguensis* (Barnéoud) E. Fourn., *Sisymbrium pusillum* Wedd. ex E. Fourn., hom. illeg., *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *hirticaulis* O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *patagonica* (Phil.) O.E. Schulz, *Stenodraba andina* (Phil.) O.E. Schulz var. *stylosa* O.E. Schulz, *Stenodraba colchaguensis* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Stenodraba patagonica* (Phil.) Ravenna, *Stenodraba pusilla* Boelcke, nom. illeg., *Stenodraba pusilla* Boelcke, nom. illeg. var. *patagonica* (Phil.) Boelcke, nom. illeg.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b; Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, VII, VIII, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrison, J. L. 16996* (DS, G, K, MO, S, SI, UC)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92368* (CONC)].

Weberbauera densiflora Gilg & Muschl. = **Weberbauera spathulifolia** (A. Gray) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a.

Weberbauera densifolia Al-Shehbaz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 4500–4700 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 6610* (US)].

Weberbauera herzogii (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Sarcodraba herzogii* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 3100–4700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 13/18* (BAA, GH)].

Weberbauera imbricatifolia (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sin.: *Braya imbricatifolia* (Barnéoud) A. Gray, *Draba imbricatifolia* Barnéoud, *Hesperis imbricatifolia* (Barnéoud) Kuntze, *Sisymbrium imbricatifolium* (Barnéoud) Wedd., *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz, *Stenodraba imbricatifolia* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *glabrata* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800–4200 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(III, IV, V, VI, RME).

Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1315* (SI)]; CHL[*Arancio, G. 92138* (CONC, MO, UPS)].

Weberbauera lagunae (O.E. Schulz) Al-Shehbaz
Sin.: *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz var. *lagunae* O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3800–4000 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 262* (B, BM, CONC, E, F, G, GH, K, MO, UC)].

Weberbauera lechleri (E. Fourn.) Al-Shehbaz = **Pennellia lechleri** (E. Fourn.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Weberbauera parvifolia (Phil.) Al-Shehbaz = **Pennellia parvifolia** (Phil.) Al-Shehbaz & C.D. Bailey
Referencias: Bailey, C. D., Al-Shehbaz, I. A. & Rajanikanth, G., 2006.

Weberbauera peruviana (DC.) Al-Shehbaz
Sin.: *Arabis bracteata* Wedd., *Hesperis peruviana* (DC.) Kuntze, *Sisymbrium anomalum* Wedd., *Sisymbrium peruvianum* DC.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2004c.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 2800–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 204* (BACP, MO, P, SI)].

Weberbauera spathulifolia (A. Gray) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium orophilum* Wedd., *Sisymbrium spathulifolium* A. Gray, *Weberbauera densiflora* Gilg & Muschl.
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2721* (BAA, LIL)].

Weberbauera stenophylla (Leyb.) Al-Shehbaz
Sin.: *Draba cauquensis* Phil., *Draba leyboldii* Phil., *Draba stenophylla* Leyb., *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz, *Stenodraba stenophylla* (Leyb.) O.E. Schulz var. *leyboldii* (Phil.) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. 1612* (SGO)].

Weberbauera suffruticosa (Barnéoud) Al-Shehbaz
Sin.: *Draba imbricatifolia* Barnéoud var. *suffruticosa* (Barnéoud) Reiche, *Draba suffruticosa* Barnéoud, *Hesperis suffruticosa* (Barnéoud) Kuntze, *Sisymbrium suffruticosum* (Barnéoud) E. Fourn., *Stenodraba suffruticosa* (Barnéoud) O.E. Schulz
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 1990a, 2004b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3300–4100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 3408* (CONC)].

Werdermannia O.E. Schulz

Número de especies: 4 endémicas

Werdermannia anethifolia (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Nasturtium anethifolium* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 4381* (SI)].

Werdermannia macrostachya (Phil.) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium macrostachyum* Phil.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 803* (B, BM, CAS, E, F, GH, K, MO, S, SI, US)].

Werdermannia mendocina Boelcke & S.C. Arroyo
Referencias: Boelcke, O. & Arroyo, S., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 11452* (SI)].

Werdermannia pinnata (Barnéoud) O.E. Schulz
Sin.: *Sisymbrium pinnatum* Barnéoud
Hierba. Perenne. Endémica. 2800 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 4723* (B, GH, S, US)].

Xerodraba Skottsb.

Número de especies: 7 endémicas

Xerodraba colobanthoides Skottsb.
Sin.: *Eudema colobanthoides* (Skottsb.) O.E. Schulz, *Skottsbergianthus colobanthoides* (Skottsb.) Boelcke, *Skottsbergianthus sorianoi* (Boelcke) Boelcke, *Skottsbergiella colobanthoides* (Skottsb.) Boelcke, *Skottsbergiella sorianoi* Boelcke
Referencias: Al-Shehbaz, I. A., 2006a; Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Boelcke, O., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2161* (BAA, LP)].

Xerodraba glebaria (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya glebaria* Speg., *Eudema glebaria* (Speg.) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (B, K, LP, UPS)].

Xerodraba lycopodioides (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya lycopodioides* Speg., *Braya lycopodioides* Speg. var. *contracta* Speg., *Eudema lycopodioides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba lycopodioides* (Speg.) Skottsb. var. *contracta* (Speg.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)].

Xerodraba lycopodioides (Speg.) Skottsb. var. *contracta* (Speg.) O.E. Schulz = **Xerodraba lycopodioides** (Speg.) Skottsb.

Xerodraba mendocinensis Hauman = **Lithodraba mendocinensis** (Hauman) Boelcke
Referencias: Boelcke, O., 1952.

Xerodraba microphylla (Gilg & Muschl.) Skottsb. = **Xerodraba pycnophylloides** (Speg.) Skottsb.

Xerodraba monantha (Gilg ex Kuntze) Skottsb.
Sin.: *Braya monantha* (Gilg ex Kuntze) Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze, *Eudema monantha* (Gilg ex Kuntze) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Beaufils 599* (B, UPS)].

Xerodraba patagonica (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya patagonica* Speg., *Eudema patagonica* (Speg.) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984; Pisano, E. & Henriquez, J. M., 1992.
Subarbusto. Endémica. 100–3000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 181* (BM, CAS, F, GH, K, MO, S, SI, UC, Z)]; CHL[*Dollenz, O. 947* (HIP)].

Xerodraba pectinata (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya pectinata* Speg., *Eudema pectinata* (Speg.) Gilg & Muschl.
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 2599* (BAA, BAB, BACP, HIP, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 380* (CONC)].

Xerodraba pycnophylloides (Speg.) Skottsb.
Sin.: *Braya pycnophylloides* Speg., *Draba monantha* Gilg ex Kuntze var. *microphylla* Gilg, nom. nud., *Eudema microphylla* Gilg & Muschl., *Eudema pycnophylloides* (Speg.) Gilg & Muschl., *Xerodraba microphylla* (Gilg & Muschl.) Skottsb., *Xerodraba pycnophylloides* (Speg.) Skottsb. var. *microphylla* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz
Referencias: Boelcke, O. & Romanczuk, M. C., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–2600 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*T.B.P.A. 397* (BAB, HIP, SI)].

Xerodraba pycnophylloides (Speg.) Skottsb. var. *microphylla* (Gilg & Muschl.) O.E. Schulz = **Xerodraba pycnophylloides** (Speg.) Skottsb.

BUDDLEJACEAE

Revisor: Norman, E. M.

1 género, 22 especies, 12 especies endémicas.

Buddleja L.

Número de especies: 22, 12 endémicas

Buddleja alata Larrañaga, hom. illeg. = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja albotomentosa R.E. Fr. = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja andina Britton ex Rusby = **Buddleja aromatica** J. Remy
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja angustata Benth. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja araucana Phil.
Sin.: *Buddleja globosa* Hope var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Buddleja nappii* Lorentz
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997.
Arbusto. Endémica. 300–1600 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(III, IV, V, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33007* (SI), *Castellanos, A. 403* (LIL)]; CHL[*Volkmann, H. s.n.* (SGO)].

Buddleja aromatica J. Remy
Sin.: *Buddleja andina* Britton ex Rusby, *Buddleja monocephala* Kraenzl., *Buddleja tiraquiensis* Kuntze
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.
Arbusto. Nativa. 2900–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 15383* (M), *Sleumer, H. O. 3718* (SI)].

Buddleja australis Vell. = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja bangii Kraenzl. = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng. = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng. var. *glazioviana* Gilg = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja brasiliensis Jacq. ex Spreng. subsp. *stachyoides* (Cham. & Schltdl.) E.M. Norman = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja cambara Arechav. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja campestris (Vell.) Walp. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **elegans**
Referencias: Norman, E. M., 2000.

Buddleja campestris (Vell.) Walp. subsp. *magnicarpa* E.M. Norman & L.B. Sm. = **Buddleja kleinii** E.M. Norman & L.B. Sm.
Referencias: Norman, E. M., 2000.

Buddleja canescens Rusby = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja capitata Jacq. = **Buddleja globosa** Hope
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja cestrifolia Cham.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 800–1400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 9390* (U), *Rambo, B. 45379* (SI), *Reitz, P. R. 7998* (US)].

Buddleja chloroleuca Kraenzl. = **Buddleja thyrsoides** Lam. subsp. **thyrsoides**
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja cochabambensis Rusby = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja connata Ruiz & Pav. = **Buddleja globosa** Hope
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja cordobensis Griseb.
Sin.: *Buddleja intermedia* Lorentz
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973f; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Smith, L. B., 1937.
Arbusto. Endémica. 700–1500 m.
Países: ARG(COR, LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 380* (BM, CORD, K), *Nicora, E. G. 1121* (SI)].

Buddleja coroicensis Rusby = **Buddleja diffusa** Ruiz & Pav.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja cuneata Cham.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16316* (HBR, US)].

Buddleja diffusa Ruiz & Pav.
Sin.: *Buddleja coroicensis* Rusby
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997.
Arbusto. Nativa. 1000–2900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2699* (SI)].

Buddleja elegans Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Sin.: *Buddleja angustata* Benth., *Buddleja cambara* Arechav., *Buddleja fiebrigiana* Kraenzl., *Buddleja grisea* Kraenzl., *Buddleja malmei* Kraenzl., *Buddleja vetula* Cham. & Schltdl. var. *angustata* (Benth.) Chodat, *Buddleja vetula* Cham. & Schltdl. var. *major* Schmidt
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19659* (SI), *Krapovickas, A. 26442* (CTES), *Quiroga, H. 18781* (BA, BR, GH)]; BRA[*Henz, E. 35711* (SI), *Rambo, B. 44111* (B, MO, US, W)]; PRY[*Jörgensen, P. 4130* (SI), *Pedersen, T. M. 8537* (L, MO)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (SI)].

Buddleja elegans Cham. & Schltdl. subsp. **elegans**
Sin.: *Buddleja campestris* (Vell.) Walp., *Buddleja reitzii* E.M. Norman & L.B. Sm., *Buddleja vetula* Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 700–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 51373* (SI), *Reitz, P. R. 5503* (NY, US)].

Buddleja fiebrigiana Kraenzl. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja gayana Benth. = **Buddleja suaveolens** Kunth & Bouché
Referencias: Norman, E. M., 2000.

Buddleja globifera Duhamel = **Buddleja globosa** Hope
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja globosa Hope
Sin.: *Buddleja capitata* Jacq., *Buddleja connata* Ruiz & Pav., *Buddleja globifera* Duhamel
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Rossow, R. A., 1999c; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Smith, L. B., 1937.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1780* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20004* (CONC), *Sparre, B. B. 4297* (S), *Werdermann, E. 493* (SI)].

Buddleja globosa Hope var. *araucana* (Phil.) Reiche = **Buddleja araucana** Phil.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl.
Sin.: *Buddleja paludicola* Kraenzl., *Buddleja sancti-leopoldi* Kraenzl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., 1937; Smith, L. B., Guimarães, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 400–1400 m.
Países: ARG(COS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 6356* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9354* (GH, MO, NY, S, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 4999* (MO, S, US)].

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl. var. *foliosa* Chodat & Hassl. = **Buddleja tubiflora** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl. var. *genuina* Chodat & Hassl. = **Buddleja tubiflora** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl. var. *paraguayensis* (Chodat) Chodat & Hassl. = **Buddleja tubiflora** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja grandiflora Cham. & Schltdl. var. *tubiflora* (Benth.) Chodat & Hassl. = **Buddleja tubiflora** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja grisea Kraenzl. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja hatschbachii E.M. Norman & L.B. Sm.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Subarbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15173* (F, MBM, P, US)].

Buddleja hieronymi R.E. Fr.
Sin.: *Buddleja misera* Kraenzl.
Referencias: Bravo, L. D., 1983; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Smith, L. B., 1937.
Arbusto. Nativa. 2500–3900 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27415* (SI), *Fries, R. E. 998* (P, S)].

Buddleja hypoleuca Kraenzl. = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja ignea Kraenzl. = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja inconspicua Kraenzl. = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja intermedia Lorentz = **Buddleja cordobensis** Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973f; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja iresinoides (Griseb.) Hosseus
Sin.: *Buddleja microcephala* Rusby, *Buddleja pendula* R.E. Fr., *Buddleja pendula* R.E. Fr. var. *concolor* L.B. Sm., *Buddleja similis* R.E. Fr., *Lippia iresinoides* Griseb.
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973f; Bravo, L. D., 1983; Carrizo, J. & Isasmendi, S., 1994a; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997.

Arbusto. Nativa. 300–1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27790* (MO, SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 11653* (SI)].

Buddleja kleinii E.M. Norman & L.B. Sm.
Sin.: *Buddleja campestris* (Vell.) Walp. subsp. *magnicarpa* E.M. Norman & L.B. Sm.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 1200–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6991* (L, US)].

Buddleja kurtzii Kraenzl. = **Buddleja mendozensis** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja lucae Niederl. = **Buddleja mendozensis** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja malmei Kraenzl. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja mendozensis Benth.
Sin.: *Buddleja kurtzii* Kraenzl., *Buddleja lucae* Niederl., *Buddleja mendozensis* Benth. var. *tenuifolia* (Griseb.) Hieron., *Buddleja tenuifolia* Griseb.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Smith, L. B., 1937.
Arbusto. Nativa. 600–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26563* (SI, US)].
Notas: Su presencia en Chile es dudosa.

Buddleja mendozensis Benth. var. *tenuifolia* (Griseb.) Hieron. = **Buddleja mendozensis** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja microcephala Rusby = **Buddleja iresinoides** (Griseb.) Hosseus
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja misera Kraenzl. = **Buddleja hieronymi** R.E. Fr.
Referencias: Bravo, L. D., 1983; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja misionum Kraenzl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Smith, L. B., 1937; Smith, L. B., Guimarães, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 15443* (SI)]; BRA[*Bornmüller, J. F. N. 550* (GH, W)]; PRY[*Montes, J. E. 16087* (LIL), *Montes, J. E. 7172* (SI)].

Buddleja monocephala Kraenzl. = **Buddleja aromatica** J. Remy
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja nappii Lorentz = **Buddleja araucana** Phil.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja neemda Link, hom. illeg. = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja oblonga Benth.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Nativa. 1000–2200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 30742* (BH, K, M, MO, UC, US)].

Buddleja otophylla Hassk. = **Buddleja stachyoides** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja paludicola Kraenzl. = **Buddleja grandiflora** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja paraguariensis Chodat = **Buddleja tubiflora** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja pendula R.E. Fr. = **Buddleja iresinoides** (Griseb.) Hosseus
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973f; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja pendula R.E. Fr. var. *concolor* L.B. Sm. = **Buddleja iresinoides** (Griseb.) Hosseus
Referencias: Ariza Espinar, L., 1973f; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja ramboi L.B. Sm.
Referencias: Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimaráes, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 51608* (LIL, US)].

Buddleja reitzii E.M. Norman & L.B. Sm. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **elegans**
Referencias: Norman, E. M., 2000.

Buddleja salicifolia Vahl = **Buddleja thyrsoides** Lam. subsp. **thyrsoides**
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja sancti-leopoldi Kraenzl. = **Buddleja grandiflora** Cham. & Schltdl.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja similis R.E. Fr. = **Buddleja iresinoides** (Griseb.) Hosseus
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.
Sin.: *Buddleja alata* Larrañaga, hom. illeg., *Buddleja albotomentosa* R.E. Fr., *Buddleja australis* Vell., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng., *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. subsp. *stachyoides* (Cham. & Schltdl.) E.M. Norman, *Buddleja brasiliensis* Jacq. ex Spreng. var. *glazioviana* Gilg, *Buddleja neemda* Link, hom. illeg., *Buddleja otophylla* Hassk.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bravo, L. D., 1983; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 515* (SI), *Montes, J. E. 15435* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37383* (SI), *Reitz, P. R. 4875* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 11799* (BM, GH, K, L, NY, S, US), *Pérez, L. 315* (SI), *Rojas, T. 6139* (SI), *Soria, N. 2321* (FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 4108* (GH, US)].

Buddleja suaveolens Kunth & Bouché
Sin.: *Buddleja gayana* Benth.
Referencias: Norman, E. M., 2000.
Arbusto. Endémica. 500–2900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (F, G, GH, K, P, W, WU), *Johnston, I. M. 3684* (GH, US), *Werdermann, E. 171* (SI)].

Buddleja tenuifolia Griseb. = **Buddleja mendozensis** Benth.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **angusticarpa** E.M. Norman & L.B. Sm.
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Smith, L. B., Guimarães, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA, MIE); URY(ART, CLA, COL, DUR, LAV, MAL, RIV, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 9308* (LIL), *Morrone, O. 1763* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 30827* (BH, MICH, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 6541* (GH, K, P, S, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2785* (GH)].

Buddleja thyrsoides Lam. subsp. **thyrsoides**
Sin.: *Buddleja chloroleuca* Kraenzl., *Buddleja salicifolia* Vahl
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., Guimarães, E. F., Pereira, J. F. & Norman, E. M., 1976.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, MIS); BRA(RGS); URY(CAS, MON, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30040* (SI), *Scala, A. C. 168* (GH, NY)]; BRA[*Malme, G. O. A. 233* (S)]; URY[*Herter, W. G. F. 82196* (F, GH, MO, NY, S, SI, US)].

Buddleja tiraquiensis Kuntze = **Buddleja aromatica** J. Remy
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja tubiflora Benth.
Sin.: *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *foliosa* Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *genuina* Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *paraguayensis* (Chodat) Chodat & Hassl., *Buddleja grandiflora* Cham. & Schltdl. var. *tubiflora* (Benth.) Chodat & Hassl., *Buddleja paraguariensis* Chodat
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); PRY(CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 696* (SI), *Kurtz, F. 4459* (CORD), *Pedersen, T. M. 12744* (C, SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 13436* (US, WIS), *Pedersen, T. M. 5202* (SI), *Soria, N. 1875* (FCQ)].

Buddleja tucumanensis Griseb.
Sin.: *Buddleja bangii* Kraenzl., *Buddleja canescens* Rusby, *Buddleja cochabambensis* Rusby, *Buddleja hypoleuca* Kraenzl., *Buddleja ignea* Kraenzl., *Buddleja inconspicua* Kraenzl., *Buddleja tucumanensis* Griseb. var. *serrata* Griseb.

Referencias: Bravo, L. D., 1983; Carrizo, J. & Isasmendi, S., 1994a; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000; Salgado, C. R. & Pire, S. M., 1997; Smith, L. B., 1937.
Arbusto. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2558* (SI), *Lorentz, P. G. 176* (CORD, NY), *Schinini, A. 24528* (CTES)].

Buddleja tucumanensis Griseb. var. *serrata* Griseb. = **Buddleja tucumanensis** Griseb.
Referencias: Bravo, L. D., 1983; Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja vetula Cham. & Schltdl. = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **elegans**
Referencias: Norman, E. M., 2000.

Buddleja vetula Cham. & Schltdl. var. *angustata* (Benth.) Chodat = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

Buddleja vetula Cham. & Schltdl. var. *major* Schmidt = **Buddleja elegans** Cham. & Schltdl. subsp. **angustata** (Benth.) E.M. Norman
Referencias: Norman, E. M. & Ariza Espinar, L., 1995; Norman, E. M., 2000.

BURSERACEAE

2 géneros, 3 especies, 1 especie endémica.

Bursera leptophloeos Mart. = **Commiphora leptophloeos** (Mart.) J. Gillet

Commiphora Jacq.

Número de especies: 1

Commiphora leptophloeos (Mart.) J. Gillet
Sin.: *Bursera leptophloeos* Mart.
Referencias: Pérez, L. & Mereles, F., 2004.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 9043* (CTES, FCQ, G, MO)].

Icica heptaphylla Aubl. = **Protium heptaphyllum** (Aubl.) Marchand
Referencias: Pirani, J. R., 1993a.

Protium Burm. f.

Número de especies: 2, 1 endémica

Protium dusenii Sw. = **Protium kleinii** Cuatrec.
Referencias: Reitz, R., 1981a.

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Sin.: *Icica heptaphylla* Aubl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Pirani, J. R., 1993a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15777* (NY)]; PRY[*Arenas, P. 2581* (SI), *Hassler, E. 1929* (G)].

Protium kleinii Cuatrec.
Sin.: *Protium dusenii* Sw.
Referencias: Cuatrecasas, J., 1961a; Reitz, R., 1981a.
Árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 38* (HBR, US)].

CABOMBACEAE

1 género, 2 especies.

Cabomba Aubl.

Número de especies: 2

Cabomba australis Speg. = **Cabomba caroliniana** A. Gray var. **caroliniana**
Referencias: Ørgaard, M., 1991.

Cabomba caroliniana A. Gray var. **caroliniana**
Sin.: *Cabomba australis* Speg.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Crespo, S., 1984c; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ørgaard, M., 1991.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, RNE, SFE); PRY(APY, PHA); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 1337* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5810* (FCQ)]; URY[*Osten, C. 3171* (SI)].

Cabomba caroliniana A. Gray var. **flavida** Ørgaard
Referencias: Ørgaard, M., 1991.
Hierba acuática. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS, SFE); PRY(CEN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada 836* (C, F, MO), *Burkart, A. 27819* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 639* (SI)].
Notas: Citada para el sur de Brasil sin mencionar ejemplar de referencia (Orgaard, 1991).

Cabomba furcata Schult. & Schult. f.
Referencias: Wiersema, J. H., 2001.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 37959* (MBM)].

CACTACEAE

Autores: Kiesling, R., Larocca, J., Faúndez, L., Metzing, D. & Albesiano, S. (*Wigginsia*)

52 géneros, 399 especies, 285 especies endémicas, 2 especies introducidas.

Acanthocalycium Backeb.

Número de especies: 5 endémicas

Acanthocalycium andreaeanum (Backeb.) Donald, nom. inval. = **Pyrrhocactus kattermannii** R. Kiesling

Acanthocalycium aurantiacum Rausch = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Acanthocalycium brevispinum F. Ritter = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Acanthocalycium catamarcense F. Ritter = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Acanthocalycium chionanthum (Speg.) Backeb. = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Acanthocalycium ferrarii Rausch
Sin.: *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *variiflorum* (Rausch) Donald, *Acanthocalycium variiflorum* Backeb., nom. inval., *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *ferrarii* (Rausch) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *variiflora* (Backeb.) Rausch
Referencias: Rausch, W., 1976.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 572* (W)].

Acanthocalycium formosum (Pfeiff.) Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Acanthocalycium glaucum F. Ritter
Sin.: *Acanthocalycium aurantiacum* Rausch, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *aurantiacum* (Rausch) Donald, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *glaucum* (F. Ritter) Donald, *Echinopsis aurantiaca* (Rausch) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis glaucina* Friedrich & G.D. Rowley, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *aurantiaca* (Rausch) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *glauca* (F. Ritter) Rausch
Referencias: Donald, J. D., 1975b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ritter, M. R. 970* (U)].

Acanthocalycium griseum Backeb. = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Acanthocalycium klimpelianum (Weid. & Werderm.) Backeb.
Sin.: *Acanthocalycium klimpelianum* (Weid. & Werderm.) Backeb. var. *macranthum* (Rausch) J.G. Lamb., *Acanthocalycium peitscherianum* Backeb., *Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.) Backeb. f. *peitscherianum* (Backeb.) Donald, *Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.) Backeb. var. *klimpelianum* (Weid. & Werderm.) Donald, *Echinopsis klimpeliana* Weid. & Werderm., *Echinopsis peitscherana* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, nom. illeg., *Lobivia klimpeliana* (Weid. & Werderm.) A. Berger, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *klimpeliana* (Weid. & Werderm.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *macrantha* Rausch, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *peitscherana* (Backeb.) Rausch, *Spinicalycium klimpelianum* (Weid. & Werderm.) Fric
Referencias: Donald, J. D., 1975a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1275b* (SI)].

Acanthocalycium klimpelianum (Weid. & Werderm.) Backeb. var. *macranthum* (Rausch) J.G. Lamb. = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Acanthocalycium oreopepon (Speg.) Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Acanthocalycium peitscherianum Backeb. = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Acanthocalycium spiniflorum* (K. Schum.) Backeb. f. *violaceum* Donald, *Acanthocalycium violaceum* (Werderm.) Backeb., *Echinocactus spiniflorus* K. Schum., *Echinopsis spiniflora* (K. Schum.) A. Berger, *Echinopsis violacea* Werderm., *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch, *Lobivia spiniflora* (K. Schum.) Rausch var. *violacea* (Werderm.) Rausch, *Spinicalycium spiniflorum* (K. Schum.) Fric, *Spinicalycium violaceum* (Werderm.) Fric
Referencias: Donald, J. D., 1975a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4343* (SI)].

Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum.) Backeb. f. *peitscherianum* (Backeb.) Donald = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum.) Backeb. f. *violaceum* Donald = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Acanthocalycium spiniflorum (K. Schum.) Backeb. var. *klimpelianum* (Weid. & Werderm.) Donald = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb.
Sin.: *Acanthocalycium brevispinum* F. Ritter, *Acanthocalycium catamarcense* F. Ritter, *Acanthocalycium chionanthum* (Speg.) Backeb., *Acanthocalycium griseum* Backeb., *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *brevispinum* (F. Ritter) Donald, *Acanthocalycium thionanthum* (Speg.) Backeb. var. *chionanthum* (Speg.) Hosseus, *Echinocactus chionanthum* Speg., *Echinocactus thionanthum* Speg., *Echinopsis brevispina* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis chionantha* (Speg.) Werderm., *Echinopsis thionantha* (Speg.) Werderm., *Lobivia chionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *brevispina* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *catamarcense* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chionantha* (Speg.) Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *erythrantha* Rausch, *Lobivia thionantha* (Speg.) Britton & Rose var. *munita* Rausch
Referencias: Donald, J. D., 1975b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 24514* (SI)].

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb. var. *aurantiacum* (Rausch) Donald = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb. var. *brevispinum* (F. Ritter) Donald = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb. var. *chionanthum* (Speg.) Hosseus = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb. var. *glaucum* (F. Ritter) Donald = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Acanthocalycium thionanthum (Speg.) Backeb. var. *variiflorum* (Rausch) Donald = **Acanthocalycium ferrarii** Rausch

Acanthocalycium variiflorum Backeb., nom. inval. = **Acanthocalycium ferrarii** Rausch

Acanthocalycium violaceum (Werderm.) Backeb. = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Acanthocephala graessneri (K. Schum.) Backeb. = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Acantholobivia haagei (Fric & Schelle) Y. Ito = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Acanthopetalus mirabilis (Speg.) Y. Ito = **Setiechinopsis mirabilis** (Speg.) de Haas

Acanthorhipsalis houlletiana (Lem.) Volgin = **Rhipsalis houlletiana** Lem.

Acanthorhipsalis monacantha (Griseb.) Britton & Rose = **Rhipsalis monacantha** Griseb.

Arequipa australis F. Ritter = **Oreocereus australis** (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Arequipa hempeliana (Gürke) Kreuz. & Buining = **Oreocereus hempelianus** (Gürke) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Arequipa leucotricha (Phil.) Britton & Rose = **Oreocereus leucotrichus** (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Arequipa rettigii (Quehl) Kreuz. & Buining = **Oreocereus hempelianus** (Gürke) D.R. Hunt

Arequipa soehrensii Kreuz. ex Backeb., nom. inval. = **Oreocereus hempelianus** (Gürke) D.R. Hunt

Arequipa variicolor (Backeb.) Backeb. = **Oreocereus variicolor** Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Arequipa weingartiana (Backeb.) Kreuz. & Buining = **Oreocereus hempelianus** (Gürke) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Arthrocereus mirabilis (Speg.) Marshall = **Setiechinopsis mirabilis** (Speg.) de Haas

Austrocactus Britton & Rose

Número de especies: 4 endémicas

Austrocactus bertinii (Cels) Britton & Rose
Sin.: *Austrocactus gracilis* Backeb., *Cereus bertinii* Cels, *Malacocarpus bertinii* (Cels) Hosseus, *Notocactus bertinii* (Cels) Marshall
Referencias: Kiesling, R., 1988; Méndez, E., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 9346* (BAB)].

[Austrocactus dusenii (F.A.C. Weber) Backeb.]
Sin.: *Cereus dusenii* F.A.C. Weber
Notas: Nombre dudoso.

Austrocactus gracilis Backeb. = **Austrocactus bertinii** (Cels) Britton & Rose

Austrocactus hibernus F. Ritter = **Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Austrocactus patagonicus (F.A.C. Weber) Hosseus
Sin.: *Cereus patagonicus* F.A.C. Weber, *Echinocactus intertextus* Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Kiesling, R., 1988.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IX, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Prina, A. O. 1440bis* (SRFA)]; CHL[*Saldivia, P. s.n.* (SGO)].

Austrocactus philippii (Regel & E. Schmidt) Buxb.
Sin.: *Austrocactus hibernus* F. Ritter, *Cereus philippi* Regel & Schmidt, *Echinocactus philippii* (Regel & E. Schmidt) K. Schum., *Echinopsis philippii* (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson, *Erdisia philippii* (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hunt, D. R., 2006.
Subarbusto suculento. Endémica. 2000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 226* (U)].

Austrocactus spiniflorus (Phil.) F. Ritter
Sin.: *Cereus hypogaeus* F.A.C. Weber ex Regel, *Corryocactus spiniflorus* (Phil.) Hutchison, *Echinocereus clavata* K. Schum., *Echinocereus hypogaeus* Rümpler, *Erdisia spiniflora* (Phil.) Britton & Rose, *Eulychnia clavata* Phil., *Opuntia bicolor* Phil., *Opuntia clavata* Phil., *Opuntia spiniflora* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 3091* (CONC)].

Austrocylindropuntia Backeb.

Número de especies: 4, 1 endémica

Austrocylindropuntia albiflora (K. Schum.) Backeb. = **Opuntia salmiana** Parm.

Austrocylindropuntia clavarioides (Pfeiff.) Backeb. = **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Austrocylindropuntia clavarioides (Pfeiff.) Backeb. var. *ruiz-lealii* (A. Cast.) Backeb. = **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Austrocylindropuntia colubrina (A. Cast.) Backeb. = **Opuntia colubrina** A. Cast.

Austrocylindropuntia humahuacana (Backeb.) Backeb. & F.M. Knuth = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **humahuacana** (Backeb.) R. Kiesling

Austrocylindropuntia hypsophila (Speg.) Backeb. = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Austrocylindropuntia miquelii (Monv.) Backeb.
Sin.: *Cylindropuntia miquelii* (Monv.) Backeb., *Maihueniopsis miquelii* (Monv.) R. Kiesling, *Miqueliopuntia miquelii* (Monv.) F. Ritter, *Opuntia miquelii* Monv.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2971* (CONC)].

Austrocylindropuntia salmiana (Parm.) Backeb. = **Opuntia salmiana** Parm.

Austrocylindropuntia salmiana (Parm.) Backeb. var. *albiflora* (K. Schum.) Backeb. = **Opuntia salmiana** Parm.

Austrocylindropuntia salmiana (Parm.) Backeb. var. *spegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb. = **Opuntia salmiana** Parm.

Austrocylindropuntia schickendantzii (F.A.C. Weber) Backeb. = **Opuntia schickendantzii** F.A.C. Weber

Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. var. **humahuacana** (Backeb.) R. Kiesling
Sin.: *Austrocylindropuntia humahuacana* (Backeb.) Backeb. & F.M. Knuth, *Cylindropuntia humahuacana* Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose var. *humahuacana* (Backeb.) G.D. Rowley
Referencias: Kiesling, R., 1980.
Subarbusto. Nativa. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 2514* (SI)].

Austrocylindropuntia shaferi (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**
Sin.: *Austrocylindropuntia vestita* (Salm-Dyck) Backeb. var. *shaferi* (Britton & Rose) F. Ritter, *Austrocylindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Cylindropuntia weingartiana* (Backeb.) Backeb., *Opuntia shaferi* Britton & Rose, *Opuntia weingartiana* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1980.
Subarbusto. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Shafer 90* (NY, US)].

Austrocylindropuntia spegazzinii (F.A.C. Weber) Backeb. = **Opuntia salmiana** Parm.

Austrocylindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.
Sin.: *Austrocylindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Austrocylindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *hypsophila* (Speg.)

Backeb., *Austrocylindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *longispina* Backeb., *Cylindropuntia hypsophila* (Speg.) Backeb., *Cylindropuntia verschaffeltii* (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia digitalis* F.A.C. Weber, *Opuntia hypsophila* Speg., *Opuntia verschaffeltii* Cels ex F.A.C. Weber, *Opuntia verschaffeltii* Cels ex F.A.C. Weber var. *digitalis* F.A.C. Weber
Referencias: Backeberg, C., 1958.
Subarbusto. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 7213* (LIL)].

Austrocylindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *hypsophila* (Speg.) Backeb. = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Austrocylindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. var. *longispina* Backeb. = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb.
Sin.: *Cylindropuntia vestita* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia vestita* Salm-Dyck
Referencias: Backeberg, C., 1958.
Subarbusto. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3099* (LIL)].

Austrocylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. var. *shaferi* (Britton & Rose) F. Ritter = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

Austrocylindropuntia weingartiana (Backeb.) Backeb. = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

Aylostera deminuta (F.A.C. Weber) Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera deminuta (F.A.C. Weber) Backeb. var. *pseudominuscula* (Speg.) Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera fiebrigii (Gürke) Backeb. = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Aylostera jujuyana (Rausch) W. Haage = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. *albiflora* Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. *albiseta* Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. *grandiflora* Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. *schneideriana* Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera pseudodeminuta (Backeb.) Backeb. var. *schumanniana* (Backeb.) Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera pseudominuscula (Speg.) Speg. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Aylostera spegazziniana (Backeb.) Backeb. = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Aylostera spegazziniana (Backeb.) Backeb. var. *atroviridis* Backeb. = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Aylostera spinosissima (Backeb.) Backeb. = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Blossfeldia Werderm.

Número de especies: 1

Blossfeldia campaniflora Backeb. = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia fechseri Backeb. = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm.
Sin.: *Blossfeldia campaniflora* Backeb., *Blossfeldia fechseri* Backeb., *Blossfeldia liliputana* Werderm. f. *fechseri* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *atroviridis* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *campaniflora* (Backeb.) Krainz, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *formosa* F. Ritter, *Blossfeldia liliputana* Werderm. var. *pedicellata* (F. Ritter) Krainz, nom. illeg., *Blossfeldia pedicellata* F. Ritter, *Parodia liliputana* (Werderm.) N.P. Taylor
Referencias: Barthlott, W. A. & Porembski, S., 1996; Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30536* (SI)].

Blossfeldia liliputana Werderm. f. *fechseri* (Backeb.) Krainz = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm. var. *atroviridis* (Backeb.) Krainz = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm. var. *campaniflora* (Backeb.) Krainz = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm. var. *formosa* F. Ritter = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia liliputana Werderm. var. *pedicellata* (F. Ritter) Krainz, nom. illeg. = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Blossfeldia pedicellata F. Ritter = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Borzicactus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Kimnach = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Borzicactus celsianus (Lem.) Riccob. var. *trollii* (Kupper) G.D. Rowley = **Oreocereus trollii** (Kupper) Backeb.

Borzicactus hendriksenianus (Backeb.) Kimnach = **Oreocereus leucotrichus** (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter

Borzicactus leucotrichus (Phil.) Kimnach = **Oreocereus leucotrichus** (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter

Borzicactus trollii (Kupper) Kimnach = **Oreocereus trollii** (Kupper) Backeb.

Brachycalycium tilcarense (Backeb.) Backeb., nom. illeg. = **Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.

Brasilicactus elachisanthus (F.A.C. Weber) Backeb. = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Brasilicactus graessnerii (K. Schum.) Backeb. = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Brasilicactus haselbergii (F. Haage) Backeb. = **Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Brasiliopuntia A. Berger

Número de especies: 2

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger
Sin.: *Cactus brasiliensis* Willd., *Opuntia argentina* Griseb., *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Opuntia hieronymii* Griseb.
Referencias: Castellanos, A & Lelong, H., 1944.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 31530* (CTES)].

Brasiliopuntia schulzii (A. Cast. & Lelong) Backeb.
Sin.: *Opuntia arborea* Rojas Acosta, *Opuntia argentina* auct. non Griseb., *Opuntia schulzii* A. Cast. & Lelong
Referencias: Castellanos, A & Lelong, H., 1944; Pin, A. B., 1998.
Arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1884* (SI)]; PRY[*Woolston, A. 1140* (SI)].
Notas: Su presencia es probable en el sur de Brasil.

Brasiliparodia alacriportana (Backeb. & Voll) F. Ritter = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Brasiliparodia brevihamata (W. Haage ex Backeb.) F. Ritter = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll

Brasiliparodia bueneckerii (Buining) F. Ritter = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Brasiliparodia catarinensis F. Ritter = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Brasiliparodia rechensis (Buining) F. Ritter = **Parodia rechensis** (Buining) F.H. Brandt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Browningia Britton & Rose

Número de especies: 2

Browningia caineana (Cárdenas) D.R. Hunt
Sin.: *Castellanosia caineana* Cárdenas
Árbol suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Kiesling, R. 9612* (G, PY, SI)].

Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose
Sin.: *Cactus candelaris* (Meyen) Meyen, *Cereus candelaris* Meyen
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Árbol suculento. Nativa. 2000–3000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2794* (CONC)].

Cactus ayrampo Azara = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Cactus berteri auct. non Colla = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson

Cactus berteri Colla = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Cactus brasiliensis Willd. = **Brasiliopuntia brasiliensis** (Willd.) A. Berger
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Cactus candelaris (Meyen) Meyen = **Browningia candelaris** (Meyen) Britton & Rose

Cactus chiloensis Colla = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Cactus coquimbanus Molina = **Trichocereus coquimbanus** (Molina) Britton & Rose

Cactus cruciformis Vell. = **Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Cactus curvispinus Bertero ex Colla = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Cactus dillenii Ker Gawl. = **Opuntia dillenii** (Ker Gawl.) Haw.

Cactus ficus-indica L. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cactus funalis Spreng. = **Rhipsalis grandiflora** Haw.

Cactus gibbosus Haw. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Cactus horridus Bertero ex Colla, nom. illeg. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Cactus linkii Lehm. = **Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1995.

Cactus ottonis Lehm. = **Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor

Cactus pereskia L. = **Pereskia aculeata** Mill.

Cactus phyllantus L. = **Epiphyllum phyllanthus** (L.) Haw.

Cactus schilinzkyanus (F. Haage ex K. Schum.) Kuntze = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cactus tuna L. = **Opuntia tuna** (L.) Mill.

Cactus tunicatus Lehm. = **Cylindropuntia tunicata** (Lehm.) F.M. Knuth
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cactus villosus Monv. = **Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Cassyta baccifera J.S. Muell. = **Rhipsalis baccifera** (J.S. Muell.) Stearn subsp. **baccifera**

Castellanosia caineana Cárdenas = **Browningia caineana** (Cárdenas) D.R. Hunt

Cephalocereus machrisii Y. Dawson = **Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.

Cereus Mill.

Número de especies: 8, 3 endémicas

Cereus aethiops Haw.
Sin.: *Cereus aethiops* Haw. var. *landbeckii* (Phil.) Backeb., *Cereus aethiops* Haw. var. *melanacanthus* (K. Schum.) Backeb., *Cereus azureus* Parm. ex Pfeiff., *Cereus chalibaeus* Salm-Dyck, *Cereus coerulescens* Salm-Dyck, *Cereus coerulescens* Salm-Dyck var. *landbeckii* (Phil.) K. Schum., *Cereus coerulescens* Salm-Dyck var. *melacanthus* K. Schum., *Cereus landbeckii* Phil., *Piptanthocereus aethiops* (Haw.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L. & Fabris, H. A., 1965; Kiesling, R., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 5686* (CTES, LP)].
Notas: Citada para Uruguay sin mencionar localidad o material de referencia (Hunt, 1999).

Cereus aethiops Haw. var. *landbeckii* (Phil.) Backeb. = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus aethiops Haw. var. *melanacanthus* (K. Schum.) Backeb. = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus andalgalensis F.A.C. Weber = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Cereus anisitsii K. Schum. = **Monvillea spegazzinii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus argentinensis Britton & Rose
Sin.: *Cereus platygonus* Speg., hom. illeg.
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3884* (CTES)].

Cereus articulatus Pfeiff. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Cereus atacamensis Phil. = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Cereus azureus Parm. ex Pfeiff. = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus balansae K. Schum. = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus baumannii Lem. = **Cleistocactus baumannii** (Lem.) Lem.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus bertinii Cels = **Austrocactus bertinii** (Cels) Britton & Rose

Cereus bonplandii Pfeiff. = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus brevistylus K. Schum. = **Corryocactus brevistylus** (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cereus candelaris Meyen = **Browningia candelaris** (Meyen) Britton & Rose
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.

Cereus candicans Gillies ex Salm-Dyck = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Cereus candicans Gillies ex Salm-Dyck var. *courantii* K. Schum. = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 1988.

Cereus castaneus (Phil.) K. Schum. = **Eulychnia castanea** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cereus cavendischii Monv. = **Monvillea cavendischii** (Monv.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus celsianus A. Berger = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Cereus chalibaeus Salm-Dyck = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus chiloensis (Colla) DC. = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Cereus coccineus auct. non Salm-Dyck ex DC. = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Cereus coerulescens Salm-Dyck = **Cereus aethiops** Haw.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus coerulescens Salm-Dyck var. *landbeckii* (Phil.) K. Schum. = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus coerulescens Salm-Dyck var. *melacanthus* K. Schum. = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus coquimbanus (Molina) K. Schum. = **Trichocereus coquimbanus** (Molina) Britton & Rose

Cereus coryne Salm-Dyck = **Stetsonia coryne** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Cereus dayami Speg. = **Cereus stenogonus** K. Schum.

Cereus deserticola Werderm. = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Cereus dichroacanthus Mart. ex Pfeiff. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Cereus donkelairii auct. non Salm-Dyck = **Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus dusenii F.A.C. Weber = **Austrocactus dusenii** (F.A.C. Weber) Backeb.

Cereus erythrocephalus (K. Schum.) A. Berger = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Cereus euchlorus F.A.C. Weber ex K. Schum. = **Monvillea euchlora** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb.

Cereus fascicularis Meyen = **Haageocereus fascicularis** (Meyen) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Cereus forbesii Otto ex C.F. Först.
Sin.: *Cereus validus* auct. non Haw., *Piptanthocereus forbesii* (Otto ex C.F. Först.) Riccob., nom. illeg.
Referencias: Backeberg, C., 1960.
Árbol. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 438* (CTES)].

Cereus geminatus Otto = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.

Cereus gibbosus (Haw.) Pfeiff. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Cereus gladiatus Lem. = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Cereus guelichii Speg. = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus haenkeanus F.A.C. Weber ex K. Schum.
Referencias: Kiesling, R., 1999b.
Árbol suculento. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8719* (SI)].

Cereus hassleri K. Schum. = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Cereus hildmannianus K. Schum.
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Árbol suculento. Nativa.
Países: BRA(RGS, SCA).
Notas: Citada para el sur de Brasil sin indicar ejemplar de referencia (Hunt, 2006).

Cereus hildmannianus K. Schum. subsp. *uruguayanus* (R. Kiesling) N.P. Taylor = **Cereus uruguayanus** R. Kiesling

Cereus huascha F.A.C. Weber = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Cereus huascha F.A.C. Weber var. *flaviflora* F.A.C. Weber = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Cereus huascha F.A.C. Weber var. *rubriflorus* F.A.C. Weber = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Cereus hyalacanthus K. Schum. = **Cleistocactus hyalacanthus** (K. Schum.) Gosselin

Cereus hypogaeus F.A.C. Weber ex Regel = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Cereus ianthothele Monv. = **Pfeiffera ianthothele** (Monv.) F.A.C. Weber

Cereus iquiquensis K. Schum. = **Eulychnia iquiquensis** (K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 2000.

Cereus kroenleinii (R. Kiesling) P.J. Braun & Esteves = **Monvillea kroenleini** R. Kiesling

Cereus kroenleinii N.P. Taylor, nom. illeg. = **Monvillea kroenleini** R. Kiesling

Cereus lamprochlorus Lem. = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Cereus lamprochlorus Lem. var. *salinicola* Speg. = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Cereus landbeckii Phil. = **Cereus aethiops** Haw.

Cereus lauterbachii K. Schum. = **Monvillea euchlora** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb.

Cereus leucanthus Pfeiff. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Cereus lindbergianus F.A.C. Weber = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Cereus lindenzweigiana Gürke = **Monvillea lindenzweigiana** (Gürke) Backeb.

Cereus lindmanii F.A.C. Weber = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Cereus litoralis Johow = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **litoralis** (Johow) Faúndez

Cereus lumbricoides Lem. = **Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck
Referencias: Kiesling, R., 2005.

[Cereus macdonaldiae Hook.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cereus marmoratus Zeiss., nom. nud. = **Monvillea spegazzinii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus martinii Labour. = **Harrisia martinii** (Labour.) Britton
Referencias: Kiesling, R., 2005; Leuenberger, B. E., 2000b.

Cereus multiplex (Pfeiff.) Zucc. = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus nigripilis Phil. = **Trichocereus nigripilis** (Phil.) Baker
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 1999.

Cereus nitens Salm-Dyck = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Cereus ovatus Pfeiff., nom. illeg. = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Cereus oxypetalus DC. = **Phyllocactus oxypetalos** (DC.) Link

Cereus panoplaeatus Monv. = **Eulychnia breviflora** Phil.

Cereus paraguayensis K. Schum.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7079* (G)].

Cereus pasacana (F.A.C. Weber) F.A.C. Weber = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Cereus patagonicus F.A.C. Weber = **Austrocactus patagonicus** (F.A.C. Weber) Hosseus
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cereus paxtonianus Monv. = **Monvillea cavendischii** (Monv.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus peruvianus auct. non Mill. = **Cereus uruguayanus** R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus phatnospermus K. Schum. = **Monvillea phatnosperma** (K. Schum.) Britton & Rose

Cereus philippi Regel & Schmidt = **Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cereus platygonus Speg., hom. illeg. = **Cereus argentinensis** Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus pomanensis F.A.C. Weber ex K. Schum. = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Cereus quisco J. Remy ex Gay = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Cereus regelii Weing. = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **regelii** (Weing.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus rhodoleucanthus K. Schum. = **Monvillea cavendischii** (Monv.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus roseiflorus Speg. = **Cereus stenogonus** K. Schum.

Cereus saglionis Lem. = **Rhipsalis cereuscula** Haw.

Cereus santiaguensis Speg. = **Trichocereus santiaguensis** (Speg.) Backeb.

Cereus saxicolus Morong = **Monvillea cavendischii** (Monv.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus schickendantzii F.A.C. Weber = **Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus setaceus Salm-Dyck ex DC. = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Cereus silvestrii Speg. = **Lobivia silvestrii** (Speg.) G.D. Rowley

Cereus smaragdiflorus F.A.C. Weber = **Cleistocactus smaragdiflorus** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus spachianus Lem. = **Trichocereus spachianus** (Lem.) Riccob.

Cereus spegazzinii F.A.C. Weber = **Monvillea spegazzinii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus spegazzinii F.A.C. Weber var. *hassleri* Weing. = **Monvillea spegazzinii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus spinibarbis Pfeiff. = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Cereus squamulosus Salm-Dyck ex DC. = **Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Cereus stenogonus K. Schum.
Sin.: *Cereus dayami* Speg., *Cereus roseiflorus* Speg., *Piptanthocereus dayami* (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Árbol suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL); PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI, SPE); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 17285* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 10042* (MO)].

Cereus strigosus Salm-Dyck = **Trichocereus strigosus** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Cereus syringacantus Pfeiff. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Cereus tarijensis Vaupel = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Cereus teres Vell. = **Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **teres**
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.

Cereus terscheckii Parm. ex Pfeiff. = **Trichocereus terscheckii** (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose

Cereus thelegonoides Speg. = **Trichocereus thelegonoides** (Speg.) Britton & Rose

Cereus thelegonus F.A.C. Weber = **Trichocereus thelegonus** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Cereus tortuosus Forbes ex Otto & D. Dietr. = **Harrisia tortuosa** (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus trollii Kupper = **Oreocereus trollii** (Kupper) Backeb.

Cereus tubiflorus Pfeiff. = **Echinopsis tubiflora** (Pfeiff.) Zucc.

Cereus turbinatus Pfeiff. = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.

Cereus tweediei Hook. = **Cleistocactus baumannii** (Lem.) Lem.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Cereus uruguayanus R. Kiesling
Sin.: *Cereus hildmannianus* K. Schum. subsp. *uruguayanus* (R. Kiesling) N.P. Taylor, *Cereus peruvianus* auct. non Mill., *Piptanthocereus uruguayanus* F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Kiesling, R., 1982a, 2005; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Scheinvar, L., 1985.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, COL, FLA, MAL, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16545* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. s.n.* (HBR)]; URY[*Berro, M. B. 5356* (MVFA)].

Cereus validus auct. non Haw. = **Cereus forbesii** Otto ex C.F. Först.

Chamaecereus grandiflorus (Fric) Britton & Rose = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Chamaecereus silvestrii (Speg.) Britton & Rose = **Lobivia silvestrii** (Speg.) G.D. Rowley

Chilenia jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Chilenia occulta (Phil.) Backeb. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Chileorebutia aerocarpa F. Ritter = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Chileorebutia duripulpa F. Ritter = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Chileorebutia esmeraldana F. Ritter = **Thelocephala esmeraldana** (F. Ritter) F. Ritter

Chileorebutia napina (Phil.) F. Ritter = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Chileorebutia odieri (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Chileorebutia reichei Kreuz., nom. nud. = **Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Chrysocactus schumannianus (Nicolai) Y. Ito = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Cleistocactus Lem.

Número de especies: 4

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem.
Sin.: *Cereus baumannii* Lem., *Cereus tweediei* Hook., *Cleistocactus baumannii* (Lem.) Lem. var. *colubrinus* Riccob.
Referencias: Backeberg, C., 1960; Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920; Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 432* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3112* (FCQ)].

Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. var. *colubrinus* Riccob. = **Cleistocactus baumannii** (Lem.) Lem.

Cleistocactus ferrarii R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1722* (SI)].

Cleistocactus hyalacanthus (K. Schum.) Gosselin
Sin.: *Cereus hyalacanthus* K. Schum., *Cleistocactus jujuyensis* Backeb., *Cleistocactus jujuyensis* Backeb. var. *fulvus* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Cleistocactus jujuyensis Backeb. = **Cleistocactus hyalacanthus** (K. Schum.) Gosselin

Cleistocactus jujuyensis Backeb. var. *fulvus* F. Ritter = **Cleistocactus hyalacanthus** (K. Schum.) Gosselin

Cleistocactus rhodacanthus (Salm-Dyck) Lem. = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Cleistocactus smaragdiflorus (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Cereus smaragdiflorus* F.A.C. Weber
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 895* (SI)];

Copiapoa Britton & Rose

Número de especies: 23, 22 endémicas

Copiapoa ahremephiana N.P. Taylor & G.J. Charles
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ferriman, R. M. F. 53* (K)].

Copiapoa albispina Backeb., nom. nud. = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa alticostata F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa applanata Backeb., nom. inval. = **Copiapoa cinerascens** (Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa atacamensis Middled. = **Copiapoa boliviana** (Pfeiff.) F. Ritter

Copiapoa atacamensis Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa calderana** F. Ritter

Copiapoa boliviana (Pfeiff.) F. Ritter
Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled., *Copiapoa calderana* F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt, *Echinocactus bolivianus* Pfeiff.
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 205* (ZSS)].

Copiapoa bridgesii (Pfeiff.) Backeb. = **Copiapoa marginata** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **bridgesii** (Pfeiff.) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa calderana F. Ritter
Sin.: *Copiapoa atacamensis* Middled. var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa calderana* F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter, *Copiapoa lembckei* Backeb., nom. inval.
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 507* (U)].

Copiapoa calderana F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter = **Copiapoa calderana** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa calderana F. Ritter subsp. *atacamensis* (Middled.) D.R. Hunt = **Copiapoa boliviana** (Pfeiff.) F. Ritter

Copiapoa carrizalensis F. Ritter = **Copiapoa dealbata** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa carrizalensis F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter = **Copiapoa dealbata** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa chaniaralensis F. Ritter = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Copiapoa applanata* Backeb., nom. inval., *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *applanata* F. Ritter, *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *intermedia* F. Ritter, *Echinocactus ambiguus* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus cinerascens* Salm-Dyck
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2907* (CONC)].

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *applanata* F. Ritter = **Copiapoa cinerascens** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa grandiflora** F. Ritter

Copiapoa cinerascens (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *intermedia* F. Ritter = **Copiapoa cinerascens** (Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose f. *albispina* F. Ritter = **Copiapoa eremophila** F. Ritter

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. **cinerea**
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa tenebrosa* F. Ritter, *Echinocactus cinereus* Phil.
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2916* (CONC)].

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. **columna-alba** (F. Ritter) Backeb.
Sin.: *Copiapoa columna-alba* F. Ritter, *Copiapoa columna-alba* F. Ritter var. *nuda* F. Ritter, *Copiapoa melanohystrix* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 530* (SGO, U, ZSS)].

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F. Ritter) Backeb. = **Copiapoa dealbata** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa eremophila** F. Ritter

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor
Sin.: *Copiapoa albispina* Backeb., nom. nud., *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor, *Copiapoa gigantea* Backeb., *Copiapoa gigantea* Backeb. var. *haseltoniana* (Backeb.) F. Ritter, *Copiapoa haseltoniana* Backeb.
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 700–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 207a* (U)].

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. *haseltoniana* (Backeb.) N.P. Taylor = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba = **Copiapoa krainziana** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba = **Copiapoa longistaminea** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa cinerea (Phil.) Britton & Rose var. *tenebrosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **cinerea**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa columna-alba F. Ritter = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **columna-alba** (F. Ritter) Backeb.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa columna-alba F. Ritter var. *nuda* F. Ritter = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **columna-alba** (F. Ritter) Backeb.

Copiapoa conglomerata (Phil.) Lembcke = **Copiapoa solaris** (F. Ritter) F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. *alticostata* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. *armata* F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Sin.: *Copiapoa alticostata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *alticostata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *armata* F. Ritter, *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa coquimbana* (Rümpler) Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter, *Copiapoa pendulina* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Copiapoa pseudocoquimbana* F. Ritter var. *vulgata* F. Ritter, *Copiapoa serenana* Voldan, *Copiapoa vallenarensis* F. Ritter, *Copiapoa wagenknechtii* F. Ritter, *Echinocactus coquimbanus* Rümpler
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2586* (CONC), *Eggli, U. 2673* (CONC)].

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. **fiedleriana** (K. Schum.) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa fiedleriana* (K. Schum.) Backeb., *Copiapoa pepiniana* (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana* Backeb.
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 251* (SGO, ZSS)].

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. *pendulina* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. *pseudocoquimbana* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa coquimbana (Rümpler) Britton & Rose var. *wagenknechtii* F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa cuprea F. Ritter = **Copiapoa echinoides** (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa dealbata F. Ritter
Sin.: *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter, *Copiapoa carrizalensis* F. Ritter var. *gigantea* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *dealbata* (F. Ritter) Backeb., *Copiapoa dealbata* F. Ritter f. *gigantea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa dealbata* F. Ritter var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2599* (CONC)].

Copiapoa dealbata F. Ritter f. *gigantea* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa dealbata** F. Ritter

Copiapoa dealbata F. Ritter var. *carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa dealbata** F. Ritter

Copiapoa decorticans N.P. Taylor & G.J. Charles
Subarbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hoffmann, A. E. s.n.* (K)].

Copiapoa desertorum F. Ritter = **Copiapoa rupestris** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa desertorum F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa rupestris** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa desertorum F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa rupestris** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa desertorum F. Ritter var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa rupestris** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa dura F. Ritter = **Copiapoa echinoides** (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa echinata F. Ritter
Sin.: *Copiapoa echinata* F. Ritter f. *pulla* F. Ritter, *Copiapoa echinata* F. Ritter var. *borealis* F. Ritter, *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa totoralensis* F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 506* (U)].

Copiapoa echinata F. Ritter f. *pulla* F. Ritter = **Copiapoa echinata** F. Ritter

Copiapoa echinata F. Ritter var. *borealis* F. Ritter = **Copiapoa echinata** F. Ritter

Copiapoa echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Copiapoa cuprea* F. Ritter, *Copiapoa dura* F. Ritter, *Copiapoa echinoides* (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinocactus echinoides* Lem. ex Salm-Dyck
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 510* (U)].

Copiapoa echinoides (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *cuprea* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa echinoides** (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa eremophila F. Ritter
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose f. *albispina* F. Ritter, *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *eremophila* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Arbusto suculento. Endémica. 400–1000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 476* (U)].

Copiapoa esmeraldana F. Ritter = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **esmeraldana** (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa ferox Lembcke & Backeb., nom. inval. = **Copiapoa solaris** (F. Ritter) F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa fiedleriana (K. Schum.) Backeb. = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **fiedleriana** (K. Schum.) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa gigantea Backeb. = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa gigantea Backeb. var. *haseltoniana* (Backeb.) F. Ritter = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor

Copiapoa grandiflora F. Ritter
Sin.: *Copiapoa cinerascens* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *grandiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 523* (SGO, U)].

Copiapoa haseltoniana Backeb. = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **gigantea** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa hornilloensis F. Ritter = **Copiapoa rupestris** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **esmeraldana** (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa esmeraldana* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1457* (U, ZSS)].

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **humilis**
Sin.: *Copiapoa humilis* (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. inval., *Copiapoa paposoensis* F. Ritter, nom. inval., *Echinocactus humilis* Phil.
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2928* (CONC)].

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **longispina** (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa longispina* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 505* (SGO, U)].

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. *paposoensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. inval. = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **humilis**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa chaniaralensis* F. Ritter, *Copiapoa taltalensis* (Werderm.) Looser, *Echinocactus taltalensis* Werderm.
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 526* (ZSS)].

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **tenuissima** (F. Ritter) G. Charles
Sin.: *Copiapoa tenuissima* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 600–800 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 540* (SGO, U)].

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **tocopillana** (F. Ritter) G. Charles
Sin.: *Copiapoa tocopillana* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1057* (SGO, U)].

Copiapoa humilis (Phil.) Hutchison var. **varispinata** (F. Ritter) G. Charles
Sin.: *Copiapoa varispinata* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1447* (U, ZSS)].

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. *barquitensis* F. Ritter = **Copiapoa hypogaea** F. Ritter var. **hypogaea**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. **hypogaea**
Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *barquitensis* F. Ritter, *Copiapoa mollicula* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2893* (CONC)].

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. *laui* (L. Diers) A. Hoffm. = **Copiapoa laui** L. Diers
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa hypogaea F. Ritter var. **montana** (F. Ritter) G. Charles
Sin.: *Copiapoa montana* F. Ritter, *Copiapoa olivana* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 211a* (ZSS)].

Copiapoa krainziana F. Ritter
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *krainziana* (F. Ritter) Slaba, *Copiapoa krainziana* F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 300–900 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2926* (CONC)].

Copiapoa krainziana F. Ritter var. *scopulina* F. Ritter = **Copiapoa krainziana** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa laui L. Diers
Sin.: *Copiapoa hypogaea* F. Ritter var. *laui* (L. Diers) A. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2911* (CONC)].

Copiapoa lembckei Backeb., nom. inval. = **Copiapoa calderana** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa longispina F. Ritter = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **longispina** (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa longistaminea F. Ritter
Sin.: *Copiapoa cinerea* (Phil.) Britton & Rose var. *longistaminea* (F. Ritter) Slaba
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 531* (SGO, U, ZSS)].

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **bridgesii** (Pfeiff.) A.E. Hoffm.
Sin.: *Copiapoa bridgesii* (Pfeiff.) Backeb., *Echinocactus bridgesii* Pfeiff.
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 200–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 245* (ZSS)].

Copiapoa marginata (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**
Sin.: *Copiapoa streptocaulon* (Hook.) Oosten, *Echinocactus columnaris* Pfeiff., *Echinocactus marginatus* Salm-Dyck, *Echinocactus streptocaulon* Hook.
Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2908* (CONC)].

Copiapoa megarhiza Britton & Rose
Sin.: *Copiapoa megarhiza* Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter

Referencias: Graham, C., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 200–800 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2626* (CONC)].

Copiapoa megarhiza Britton & Rose var. *echinata* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Copiapoa echinata** F. Ritter

Copiapoa megarhiza Britton & Rose var. *microrhiza* F. Ritter = **Copiapoa megarhiza** Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa melanohystrix F. Ritter = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **columna-alba** (F. Ritter) Backeb.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa mollicula F. Ritter = **Copiapoa hypogaea** F. Ritter var. **hypogaea**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa montana F. Ritter = **Copiapoa hypogaea** F. Ritter var. **montana** (F. Ritter) G. Charles
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa olivana F. Ritter = **Copiapoa hypogaea** F. Ritter var. **montana** (F. Ritter) G. Charles
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa paposoensis F. Ritter, nom. inval. = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **humilis**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa pendulina F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

[Copiapoa pepiniana (K. Schum.) Backeb., nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso.

Copiapoa pepiniana (K. Schum.) Backeb. var. *fiedleriana* Backeb. = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **fiedleriana** (K. Schum.) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa pseudocoquimbana F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa pseudocoquimbana F. Ritter var. *chaniarensis* F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa pseudocoquimbana F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa pseudocoquimbana F. Ritter var. *vulgata* F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa rarissima F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1452* (U, ZSS)].

Copiapoa rubriflora F. Ritter = **Copiapoa rupestris** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa rupestris F. Ritter
Sin.: *Copiapoa desertorum* F. Ritter, *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *hornilloensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rubriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa desertorum* F. Ritter var. *rupestris* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Copiapoa hornilloensis* F. Ritter, *Copiapoa rubriflora* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2645* (CONC), *Eggli, U. 2924* (CONC)].

Copiapoa serenana Voldan = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Ritter, F., 1980.

Copiapoa serpentisulcata F. Ritter
Sin.: *Copiapoa serpentisulcata* F. Ritter var. *castanea* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2898* (CONC)].

Copiapoa serpentisulcata F. Ritter var. *castanea* F. Ritter = **Copiapoa serpentisulcata** F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa solaris (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Copiapoa conglomerata* (Phil.) Lembcke, *Copiapoa ferox* Lembcke & Backeb., nom. inval., *Echinocactus conglomeratus* Phil., *Pilocopiapoa solaris* F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.
Arbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2852* (CONC)].

Copiapoa streptocaulon (Hook.) Oosten = **Copiapoa marginata** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa taltalensis (Werderm.) Looser = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa tenebrosa F. Ritter = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **cinerea**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa tenuissima F. Ritter = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **tenuissima** (F. Ritter) G. Charles
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa tocopillana F. Ritter = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **tocopillana** (F. Ritter) G. Charles
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa totoralensis F. Ritter = **Copiapoa echinata** F. Ritter

Copiapoa vallenarensis F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa varispinata F. Ritter = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **varispinata** (F. Ritter) G. Charles
Referencias: Graham, C., 1998.

Copiapoa wagenknechtii F. Ritter = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Corryocactus Britton & Rose

Número de especies: 1

Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose
Sin.: *Cereus brevistylus* K. Schum., *Corryocactus krausii* Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Árbol suculento. Nativa. 2000–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2805* (CONC)].

Corryocactus krausii Backeb. = **Corryocactus brevistylus** (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose

Corryocactus spiniflorus (Phil.) Hutchison = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cumulopuntia F. Ritter

Número de especies: 3

Cumulopuntia berteri (Colla) F. Ritter, nom. inval. = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez

Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez

Cumulopuntia dactylifera (Vaupel) E.F. Anderson
Sin.: *Cumulopuntia pentlandii* (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter, *Opuntia dactylifera* Vaupel
Hierba suculenta. Perenne. Nativa.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 65c* (SGO, ZSS)].

Cumulopuntia echinacea (F. Ritter) F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez

Cumulopuntia famatinensis F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Cumulopuntia hystrix F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cumulopuntia ignescens (Vaupel) F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cumulopuntia pampana F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Cumulopuntia pentlandii (Salm-Dyck) F. Ritter
Sin.: *Cumulopuntia rossiana* (Heinr. & Backeb.) F. Ritter, *Maihueniopsis pentlandii* (Salm-Dyck) R. Kiesling, *Opuntia pentlandii* Salm-Dyck, *Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus pentlandii* (Salm-Dyck) Backeb. var. *rossianus* Heinr. & Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CHA, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. s.n.* (BACP)].

Cumulopuntia pentlandii (Salm-Dyck) F. Ritter var. *dactylifera* (Vaupel) F. Ritter = **Cumulopuntia dactylifera** (Vaupel) E.F. Anderson

Cumulopuntia recurvata Gilmer & H.P. Thomas = **Maihueniopsis recurvata** (Gilmer & H.P. Thomas) R. Kiesling

Cumulopuntia rossiana (Heinr. & Backeb.) F. Ritter = **Cumulopuntia pentlandii** (Salm-Dyck) F. Ritter

Cumulopuntia sphaerica (C.F. Först.) E.F. Anderson
Sin.: *Cactus berteri* auct. non Colla, *Cumulopuntia berteri* (Colla) F. Ritter, nom. inval., *Cumulopuntia tubercularis* F. Ritter, *Echinocactus berteri* auct. non (Colla) Gay, *Opuntia leucophaea* Phil., *Opuntia sphaerica* C.F. Först., *Tephrocactus dimorphus* (C.F. Först.) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2789* (CONC)].

Cumulopuntia subterranea (R.E. Fr.) F. Ritter = **Puna subterranea** (R.E. Fr.) R. Kiesling

Cumulopuntia ticnamarensis F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cumulopuntia tortispina F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cumulopuntia tubercularis F. Ritter = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cylindropuntia (Engelm.) F.M. Knuth
Número de especies: 1 introducida

Cylindropuntia clavarioides (Pfeiff.) F.M. Knuth = **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Cylindropuntia humahuacana Backeb. = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **humahuacana** (Backeb.) R. Kiesling

Cylindropuntia hypsophila (Speg.) Backeb. = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Cylindropuntia miquelii (Monv.) Backeb. = **Austrocylindropuntia miquelii** (Monv.) Backeb.

Cylindropuntia schickendantzii (F.A.C. Weber) Backeb. = **Opuntia schickendantzii** F.A.C. Weber

Cylindropuntia spegazzinii (F.A.C. Weber) Backeb. = **Opuntia salmiana** Parm.

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M. Knuth
Sin.: *Cactus tunicatus* Lehm., *Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) Knuth var. *chilensis* F. Ritter, *Opuntia puelchana* A. Cast., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff. var. *chilensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Referencias: Backeberg, C., 1958; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Introducida. 500–3500 m.
Países: ARG(LPA, MEN); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20568* (SI)]; CHL[*Eggli, U. 2929* (CONC)].

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) Knuth var. *chilensis* F. Ritter = **Cylindropuntia tunicata** (Lehm.) F.M. Knuth
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Cylindropuntia verschaffeltii (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb. = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Cylindropuntia vestita (Salm-Dyck) Backeb. = **Austrocylindropuntia vestita** (Salm-Dyck) Backeb.

Cylindropuntia weingartiana (Backeb.) Backeb. = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

Cylindrorebutia einsteinii (Fric) Donald = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Dactylanthocactus graessneri (K. Schum.) Y. Ito = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Delaetia woutersiana Backeb., nom. inval. = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Denmoza Britton & Rose
Número de especies: 1 endémica

Denmoza erythrocephala (K. Schum.) A. Berger = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Denmoza rhodacantha (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus erythrocephalus* (K. Schum.) A. Berger, *Cleistocactus rhodacanthus* (Salm-Dyck) Lem., *Denmoza erythrocephala* (K. Schum.) A. Berger, *Echinocactus rhodacanthus* Salm-Dyck, *Echinopsis rhodacantha* (Salm-Dyck) C.F. Först., *Pilocereus erytrocephalus* K. Schum., *Pilocereus rhodacanthus* (Salm-Dyck) Speg.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1922; Leuenberger, B. E., 1993.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Leuenberger, B. E. 4793* (SI)].

Digitorebutia carmeniana Rausch = **Lobivia nigricans** Wessner

Digitorebutia euanthema (Backeb.) Buining = **Lobivia euanthema** Backeb.

Digitorebutia haagei (Fric & Schelle) Fric = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Digitorebutia mudanensis Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Digitorebutia nazarenoensis Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Digitorebutia nigricans (Wessner) Buining = **Lobivia nigricans** Wessner

Discocactus Pfeiff.

Número de especies: 1

Discocactus hartmanii (K. Schum.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus hartmanii* K. Schum.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 500–800 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4438* (G)].

Echinocactus acutissima Otto & Dietr. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Echinocactus ambiguus Hildm. ex K. Schum. = **Copiapoa cinerascens** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinocactus andreae Boed. = **Gymnocalycium andreae** (Boed.) Backeb.

Echinocactus anisitsii K. Schum. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Echinocactus apricus Arechav. = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Echinocactus arechavaletae Speg. = **Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus aspillagae Söhrens = **Pyrrhocactus aspillagae** (Söhrens) F. Ritter

Echinocactus auratus Pfeiff. = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**

Echinocactus baldianus Speg. = **Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg.

Echinocactus berteri auct. non (Colla) Gay = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Echinocactus bodenbenderianus Hosseus ex A. Berger = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Echinocactus bolivianus Pfeiff. = **Copiapoa boliviana** (Pfeiff.) F. Ritter

Echinocactus brachyanthum Gürke = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Echinocactus brachypetalus (Speg.) Werderm. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus bridgesii Pfeiff. = **Copiapoa marginata** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **bridgesii** (Pfeiff.) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus buchheimianus Quehl = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Echinocactus bulbocalyx Werderm. = **Pyrrhocactus bulbocalyx** (Werderm.) Backeb.

Echinocactus calochlorus Boed. = **Gymnocalycium calochlorum** (Boed.) Y. Ito

Echinocactus capillaensis Schick = **Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus

Echinocactus castaneoides Cels ex Salm-Dyck = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Echinocactus catamarcensis Speg., nom. illeg. = **Pyrrhocactus pachacoensis** Rausch

Echinocactus catamarcensis Speg. var. *obscura* Speg. = **Pyrrhocactus catamarcensis** (Speg.) F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 2003b.

Echinocactus catamarcensis Speg. var. *pallida* Speg. = **Pyrrhocactus catamarcensis** (Speg.) F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 2003b.

Echinocactus cataphractus Dams = **Frailea cataphracta** (Dams) Britton & Rose

Echinocactus chilensis Hildm. ex K. Schum. = **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**

Echinocactus chionanthum Speg. = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Echinocactus chrysacanthion K. Schum. = **Parodia chrysacanthion** (K. Schum.) Backeb.

Echinocactus cinerascens Salm-Dyck = **Copiapoa cinerascens** (Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus cinereus Phil. = **Copiapoa cinerea** (Phil.) Britton & Rose var. **cinerea**
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus columnaris Pfeiff. = **Copiapoa marginata** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus concinnus Monv. = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Echinocactus conglomeratus Phil. = **Copiapoa solaris** (F. Ritter) F. Ritter

Echinocactus coquimbanus Rümpler = **Copiapoa coquimbana** (Rümpler) Britton & Rose var. **coquimbana**
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus corynodes Otto ex Pfeiff. = **Wigginsia corynodes** (Otto ex Pfeiff.) D.M. Porter

Echinocactus dadakii Fric = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Echinocactus damsii K. Schum. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Echinocactus delaetii K. Schum. = **Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **delaetii** (K. Schum.) Backeb.

Echinocactus denudatus Link & Otto = **Gymnocalycium denudatum** (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *andersohnianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *anisitsii* Fric = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *bruennowianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *delaetianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *golzianus* Mundt = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *heuschkelianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *meiklejohnianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *paraguayensis* F. Haage, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *roseiflorus* K. Schum. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *scheidelianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *wagnerianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus denudatus Link & Otto var. *wieditzianus* F. Haage = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus echinoides Lem. ex Salm-Dyck = **Copiapoa echinoides** (Lem. ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus erubescens Osten = **Parodia erubescens** (Osten) D.R. Hunt

Echinocactus escayachensis Vaupel = **Parodia maassii** (Heese) A. Berger

Echinocactus eyriesii Turpin = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus famatinensis Speg. = **Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Echinocactus fiebrigii W.R. Guerke = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Echinocactus floricomus Arechav. = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus formosus Pfeiff. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *cerebriformis* Speg. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *chubutensis* Speg. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *cristatus* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *ferox* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *leonensis* Hildm. ex K. Schum. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *leucacanthus* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *leucodictyus* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *nobilis* Lem. = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *platensis* Speg. = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **platense** (Speg.) R. Kiesling

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *pluricostatus* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *polygonus* K. Schum. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *schlumbergeri* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus gibbosus (Haw.) DC. var. *ventanicola* Speg. = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**

Echinocactus gracillimus Lem. = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Echinocactus graessneri K. Schum. = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Echinocactus grahlianus F. Haage ex K. Schum. = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus grossei K. Schum. = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Echinocactus guerkeanum Heese = **Gymnocalycium uruguayense** (Arechav.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus haematanthus Speg. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinocactus hartmanii K. Schum. = **Discocactus hartmanii** (K. Schum.) Britton & Rose

Echinocactus haselbergii F. Haage ex Rümpler = **Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Echinocactus horridus (Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Echinocactus hossei F. Haage = **Gymnocalycium hossei** (F. Haage) A. W. Hill

Echinocactus humilis Phil. = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **humilis**
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus hyptiacanthus Lem. = **Gymnocalycium hyptiacanthum** (Lem.) Britton & Rose

Echinocactus intertextus Phil. = **Austrocactus patagonicus** (F.A.C. Weber) Hosseus

Echinocactus islayensis C.F. Först. = **Islaya islayensis** (C.F. Först.) Backeb.

Echinocactus joossensianum Boed. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Echinocactus kurtzianum Gürke = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Echinocactus lafaldensis Berger = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii**

Echinocactus leeanus Hook. = **Gymnocalycium leeanum** (Hook.) Britton & Rose

Echinocactus leninghausii K. Schum. = **Parodia leninghausii** (K. Schum.) F.H. Brandt

Echinocactus leucanthus Gillies ex Salm-Dyck = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinocactus leucodictyus Salm-Dyck = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Echinocactus leucotrichus Phil. = **Oreocereus leucotrichus** (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Echinocactus linkii (Lehm.) Pfeiff. = **Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1995.

Echinocactus loricatus Speg., nom. illeg. = **Gymnocalycium spegazzinii** Britton & Rose

Echinocactus maassii Heese = **Parodia maassii** (Heese) A. Berger

Echinocactus mammulosus Lem. = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus mammulosus Lem. var. *pampeana* Speg. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Echinocactus mammulosus Lem. var. *submammamulosus* (Lem.) Speg. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Echinocactus marginatus Salm-Dyck = **Copiapoa marginata** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus mazanensis Backeb. = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Echinocactus microspermus F.A.C. Weber var. *erythranthus* Speg. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Echinocactus microspermus F.A.C. Weber var. *thionanthus* Speg. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Echinocactus mihanovichii Fric ex Gürke = **Gymnocalycium mihanovichii** (Fric ex Gürke) Britton & Rose

Echinocactus monvillei Lem. = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Echinocactus mostii Gürke = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Echinocactus multiflorus Hook. = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Echinocactus multiflorus Hook. var. *albispinus* K. Schum. = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Echinocactus multiflorus Hook. var. *hybopleurus* K. Schum. = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Echinocactus multiflorus Hook. var. *parisiense* K. Schum. = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Echinocactus napinus Phil. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Echinocactus netrelianum Labour. = **Gymnocalycium netrelianum** (Labour.) Britton & Rose

[Echinocactus netrelianus Monv.]
Notas: Nombre dudoso.

Echinocactus neumannianus Backeb., nom. nud. = **Weingartia neumanniana** (Backeb.) Werderm.

Echinocactus nidus Söhrens ex K. Schum. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Echinocactus nigrispinus K. Schum. = **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Echinocactus occultus Phil. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Echinocactus odieri Lem. ex Salm-Dyck = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Echinocactus ottonis (Lehm.) Link & Otto = **Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor

Echinocactus oxygonus Link = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus pampeanus Speg. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Echinocactus paraguayensis K. Schum. ex Chodat & Hassl. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Echinocactus parvulum Speg. = **Gymnocalycium parvulum** (Speg.) Speg.

Echinocactus pauciareolatus Arechav. = **Wigginsia pauciareolata** (Arechav.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus philippii (Regel & E. Schmidt) K. Schum. = **Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.

Echinocactus platensis Speg. = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **platense** (Speg.) R. Kiesling

Echinocactus platensis Speg. var. *leptanthus* Speg. = **Gymnocalycium leptanthum** (Speg.) Speg.

Echinocactus platensis Speg. var. *parvula* (Speg.) Speg. = **Gymnocalycium parvulum** (Speg.) Speg.

Echinocactus platensis Speg. var. *quehlianus* (F. Haage ex Quehl) Speg. = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Echinocactus prolifer Backeb. = **Gymnocalycium calochlorum** (Boed.) Y. Ito

Echinocactus pulcherrimus Arechav. = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Echinocactus pumilus Lem. = **Frailea pumila** (Lem.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus pygmaeus Speg. = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Echinocactus pygmaeus Speg. var. *phaeodisca* Speg. = **Frailea phaeodisca** (Speg.) Backeb.

Echinocactus quehlianus F. Haage ex Quehl = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Echinocactus rhodacanthus Salm-Dyck = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose
Referencias: Leuenberger, B. E., 1993.

Echinocactus rhodantherus Boed. = **Gymnocalycium rhodantherum** (Boed.) Backeb.

Echinocactus saglionis Cels = **Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **saglionis**

Echinocactus sanguiniflorus Werderm. = **Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg.

Echinocactus sanjuanensis Speg. = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Echinocactus schickendantzii F.A.C. Weber = **Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**

Echinocactus schilinzkyanus F. Haage ex K. Schum. = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus schumannianus Nicolai = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Echinocactus scopa Spreng. = **Parodia scopa** (Spreng.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Echinocactus senilis Phil., nom. illeg. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Echinocactus sessiliflorus Hook. = **Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M. Porter

Echinocactus sigelianum Schick = **Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus

Echinocactus spiniflorus K. Schum. = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Echinocactus stellatus Speg., hom. illeg. = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Echinocactus strausianus K. Schum. = **Pyrrhocactus strausianus** (K. Schum.) A. Berger

Echinocactus streptocaulon Hook. = **Copiapoa marginata** (Salm-Dyck) Britton & Rose var. **marginata**
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus stuckertii Speg. = **Gymnocalycium stuckertii** (Speg.) Britton & Rose

Echinocactus stuemeri Werderm. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Echinocactus subgibbosus Haw. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Echinocactus submammulosus Lem. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Echinocactus sutterianum Schick = **Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus

Echinocactus tabularis Ruempler = **Parodia tabularis** (Ruempler) D.R. Hunt

Echinocactus taltalensis Werderm. = **Copiapoa humilis** (Phil.) Hutchison var. **taltalensis** (Werderm.) A.E. Hoffm.
Referencias: Graham, C., 1998.

Echinocactus tephracanthus Link & Otto = **Wigginsia tephracantha** (Link & Otto) D.M. Porter

Echinocactus tetracanthus Lem. = **Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M. Porter

Echinocactus thionanthum Speg. = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Echinocactus tuberisulcatus Jacobi = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Echinocactus umadeave Werderm. = **Pyrrhocactus umadeave** (Werderm.) Backeb.

Echinocactus uruguayense Arechav. = **Gymnocalycium uruguayense** (Arechav.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinocactus villosus (Monv.) Labour. = **Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Echinocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Rümpler = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinocereus clavata K. Schum. = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Echinocereus hypogaeus Rümpler = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Echinocereus lamprochlorus (Lem.) Rümpler = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Echinopsis Zucc.

Número de especies: 8, 7 endémicas

Echinopsis adolphofriedrichii G. Moser = **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.

Echinopsis amblayensis (Rausch) Friedrich = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinopsis ancistrophora Speg.
Sin.: *Echinopsis ancistrophora* Speg. var. *kratochviliana* (Backeb.) Rausch, *Echinopsis ancistrophora* Speg. var. *polyancistra* (Backeb.) Rausch, *Echinopsis hamatacantha* Backeb., *Echinopsis hamatispina* Werderm., *Echinopsis kratochviliana* Backeb., *Echinopsis leucorhodantha* Backeb., *Echinopsis lobivioides* Backeb., *Echinopsis pelecyrhachys* Backeb., *Echinopsis polyancistra* Backeb., *Lobivia graulichii* Fric, *Mesechinopsis hamatacantha* (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis leucorhodantha* (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis lobivioides* (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis pelecyrhachys* (Backeb.) Y. Ito, *Mesechinopsis polyancistra* (Backeb.) Y. Ito, *Neolobivia kratochviliana* (Backeb.) Y. Ito, *Pseudolobivia ancistrophora* (Speg.) Backeb., *Pseudolobivia hamatacantha* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia kratochviliana* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia leucorhodantha* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia lobivioides* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia pelecyrhachys* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia pelecyrhachys* (Backeb.) Backeb. var. *lobivioides* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia polyancistra* (Backeb.) Backeb.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920; Hilgert, N. I. & Kiesling, R., 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8742* (SI)].

Echinopsis ancistrophora Speg. var. *kratochviliana* (Backeb.) Rausch = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis ancistrophora Speg. var. *polyancistra* (Backeb.) Rausch = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis angelesiae (R. Kiesling) G.D. Rowley = **Trichocereus angelesiae** R. Kiesling

Echinopsis arboricola (Kimnach) Mottram = **Trichocereus arboricola** Kimnach

Echinopsis atacamensis (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Echinopsis atacamensis (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *pasacana* (F.A.C. Weber) G. Navarro = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Echinopsis aurantiaca (Rausch) Friedrich & G.D. Rowley = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Echinopsis aurea Britton & Rose var. **albiflora** (Rausch) J. Ullmann
Sin.: *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *albiflora* (Rausch) J.G. Lamb., *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *albiflora* Rausch
Referencias: Lambert, J. G., 1998.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 710* (ZSS)].

Echinopsis aurea Britton & Rose var. **aurea**
Sin.: *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *leucomalla* (Wessner) Rausch, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *quinesensis* Rausch, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *sierragrandensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis cylindracea* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *cylindrica* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis quinesensis* (Rausch) Friedrich & Glaetzle, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *cylindrica* (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia quinesensis* (Rausch) F. Ritter, *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *grandiflora* Backeb., nom. inval., *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *sierragrandensis* Rausch, *Lobivia cylindracea* Backeb., *Lobivia cylindrica* Backeb., *Lobivia leucomalla* Wessner, *Lobivia shaferi* Britton & Rose subsp. *leucomalla* (Wessner) E. Herzog, *Pseudolobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *elegans* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *grandiflora* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Salpingolobivia aurea* (Britton & Rose) Y. Ito, *Salpingolobivia aurea* (Britton & Rose) Y. Ito var. *grandiflora* (Backeb.) Y. Ito, nom. illeg.
Referencias: Lambert, J. G., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, LRI, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 1201* (CORD)].

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *callochrysea* (F. Ritter) J. Ullmann = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *catamarcensis* (F. Ritter) J. Ullmann = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *depressicostata* (F. Ritter) J. Ullmann = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis aurea Britton & Rose var. **dobeana** (Dölz) J. Ullmann
Sin.: *Echinopsis dobeana* (Dölz) J.G. Lamb., *Lobivia dobeana* Dölz
Referencias: Lambert, J. G., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta variedad.

Echinopsis aurea Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann
Sin.: *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *callochrysea* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *catamarcensis* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *depressicostata* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *lariojensis* (F. Ritter) J. Ullmann, *Echinopsis aurea* Britton & Rose var. *tortuosa* (Rausch) J. Ullmann, *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich, *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *callochrysea* (F. Ritter) Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *catamarcensis* (F. Ritter) Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *depressicostata* (F. Ritter) Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *schaferi* (Britton & Rose) J.G. Lamb., *Echinopsis fallax* (Oehme) Friedrich var. *tortuosa* (Rausch) J.G. Lamb., *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *callochrysea* F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *catamarcensis* F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *depressicostata* F. Ritter, *Hymenorebutia aurea* (Britton & Rose) F. Ritter var. *lariojensis* F. Ritter, *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *robustior* Backeb., *Lobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *tortuosa* Rausch, *Lobivia fallax* Oehme, *Lobivia fallax* Oehme subsp. *aurea* (Britton & Rose) Herz, nom. illeg., *Lobivia shaferi* Britton & Rose, *Lobivia shaferi* Britton & Rose subsp. *fallax* (Oehme) Herz, *Pseudolobivia aurea* (Britton & Rose) Backeb. var. *fallax* (Oehme) Backeb.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia, M. 11* (SI)].

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *lariojensis* (F. Ritter) J. Ullmann = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *leucomalla* (Wessner) Rausch = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *quinesensis* Rausch = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *sierragrandensis* (Rausch) J.G. Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Echinopsis aurea Britton & Rose var. *tortuosa* (Rausch) J. Ullmann = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis baldiana Speg. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis bolligeriana Mächler & H.E. Walter = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **litoralis** (Johow) Faúndez

Echinopsis brevispina (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Echinopsis bruchii (Britton & Rose) A. Cast. & Lelong = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Echinopsis cabrerae (R. Kiesling) G.D. Rowley = **Trichocereus cabrerae** R. Kiesling

Echinopsis cachensis Speg. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Echinopsis campylacantha Pfeiff. & Otto = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis campylacantha Pfeiff. & Otto var. *leucantha* Labour. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis campylacantha Pfeiff. & Otto var. *stylodes* Monv. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis candicans (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinopsis candicans (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *gladiata* (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinopsis candicans (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *tenuispina* (Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

[Echinopsis catamarcensis F.A.C. Weber]
Notas: Nombre dudoso.

Echinopsis chacoana Schütz = **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.

Echinopsis chamacereus Friedrich & Glaetzle = **Lobivia silvestrii** (Speg.) G.D. Rowley

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *litoralis* (Johow) Lowry = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **litoralis** (Johow) Faúndez

Echinopsis chionantha (Speg.) Werderm. = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Echinopsis chrysantha Werderm. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Echinopsis chrysochete Werderm. = **Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**

Echinopsis coquimbana (Molina) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus coquimbanus** (Molina) Britton & Rose

Echinopsis cordobensis Speg. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis courantii (K. Schum.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinopsis crassicaulis (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle = **Lobivia crassicaulis** Backeb. ex R. Kiesling

Echinopsis cylindracea (Backeb.) Friedrich = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Echinopsis deminuta F.A.C. Weber = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Echinopsis densispina Werderm. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Echinopsis densispina Werderm. var. *pectinifera* (Wessner) J.G. Lamb. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Echinopsis deserticola (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Echinopsis deserticola (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Echinopsis dobeana (Dölz) J.G. Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **dobeana** (Dölz) J. Ullmann

Echinopsis dulci-pauli (Fric) Kraenzl., hom. illeg. = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Echinopsis eyriesii (Turpin) Zucc. ex Pfeiff. & Otto = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinopsis fabrisii (R. Kiesling) G.D. Rowley = **Trichocereus fabrisii** R. Kiesling

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *albiflora* (Rausch) J.G. Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **albiflora** (Rausch) J. Ullmann

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *callochrysea* (F. Ritter) Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *catamarcensis* (F. Ritter) Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *cylindrica* (Backeb.) J.G. Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *depressicostata* (F. Ritter) Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *schaferi* (Britton & Rose) J.G. Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis fallax (Oehme) Friedrich var. *tortuosa* (Rausch) J.G. Lamb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Echinopsis famatinensis (Speg.) Werderm. = **Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Echinopsis ferox (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Echinopsis formosa (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Echinopsis friedrichii G.D. Rowley = **Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Echinopsis geminata (Otto) K. Schum. = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.

Echinopsis glauca (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley f. *pendens* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus glaucus** F. Ritter f. **pendens** F. Ritter

Echinopsis glaucina Friedrich & G.D. Rowley = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Echinopsis grandis (Britton & Rose) Friedrich = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Echinopsis haematantha (Speg.) D.R. Hunt = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinopsis haematantha (Speg.) D.R. Hunt var. *chorrillosensis* (Rausch) J.G. Lamb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Echinopsis haematantha (Speg.) D.R. Hunt var. *elongata* (Backeb.) J.G. Lamb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinopsis haematantha (Speg.) D.R. Hunt var. *hualfinensis* (Rausch) J.G. Lamb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinopsis haematantha (Speg.) D.R. Hunt var. *jasimanensis* (Rausch) J.G. Lamb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinopsis haematantha (Speg.) D.R. Hunt var. *kuehnrichii* (Fric) J.G. Lamb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Echinopsis hahniana (Backeb.) R.S. Wallace = **Harrisia hahniana** (Backeb.) Kimnach & Hutchison ex Kimnach

Echinopsis hamatacantha Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis hamatispina Werderm. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis hempelianus Gürke = **Oreocereus hempelianus** (Gürke) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Echinopsis hossei Werderm. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Echinopsis hualfinensis (Rausch) Friedrich & Glaetzle = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Echinopsis huascha (F.A.C. Weber) G.D. Rowley = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Echinopsis huascha (F.A.C. Weber) G.D. Rowley var. *rubriflora* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Echinopsis ingens (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Echinopsis intricatisima Speg. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis kermesina (Krainz) Krainz = **Echinopsis mamillosa** Gürke

Echinopsis klimpeliana Weid. & Werderm. = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Echinopsis korethroides Werderm. = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Echinopsis kratochviliana Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis kuehnrichii (Fric) Friedrich & Glaetzle = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Echinopsis lamprochlora (Lem.) F.A.C. Weber ex Friedrich & Glaetzle = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Echinopsis lecoriensis Cárdenas = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Echinopsis leucantha (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.
Sin.: *Cereus leucanthus* Pfeiff., *Echinocactus leucanthus* Gillies ex Salm-Dyck, *Echinopsis baldiana* Speg., *Echinopsis campylacantha* Pfeiff. & Otto, *Echinopsis campylacantha* Pfeiff. & Otto var. *leucantha* Labour., *Echinopsis campylacantha* Pfeiff. & Otto var. *stylodes* Monv., *Echinopsis cordobensis* Speg., *Echinopsis intricatisima* Speg., *Echinopsis melanopotamica* Speg., *Echinopsis molesta* Speg., *Echinopsis polyacantha* Monv., *Echinopsis robinsoniana* Werderm., *Echinopsis salpigophora* (Lem.) Salm-Dyck, *Echinopsis salpingantha* Y. Ito, *Echinopsis schaferi* Britton & Rose, *Echinopsis simplex* Nied., *Echinopsis spegazziniana* Britton & Rose, *Echinopsis xiphacantha* Y. Ito, *Echinyctanthus leucanthus* Lem.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sanzin, R. 616* (SI)].

Echinopsis leucorhodantha Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis litoralis (Johow) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **litoralis** (Johow) Faúndez

Echinopsis lobivioides Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis longispina (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Echinopsis mamillosa Gürke
Sin.: *Echinopsis kermesina* (Krainz) Krainz, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *flexilis* Rausch, *Echinopsis mamillosa* Gürke var. *kermesina* (Krainz) Friedrich, *Echinopsis ritteri* Boed., *Neolobivia ritteri* (Boed.) Y. Ito, *Pseudolobivia kermesina* Krainz
Referencias: Backeberg, C., 1959a.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cárdenas, H. M. 5022* (LIL)].

Echinopsis mamillosa Gürke var. *flexilis* Rausch = **Echinopsis mamillosa** Gürke

Echinopsis mamillosa Gürke var. *kermesina* (Krainz) Friedrich = **Echinopsis mamillosa** Gürke

Echinopsis manguinii (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus manguinii** Backeb.

Echinopsis marsoneri Werderm. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Echinopsis melanopotamica Speg. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis microspermus F.A.C. Weber = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Echinopsis minuana Speg. = **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinopsis mirabilis Speg. = **Setiechinopsis mirabilis** (Speg.) de Haas

Echinopsis molesta Speg. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Pfeiff. & Otto = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinopsis nealeana (Backeb.) Friedrich = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis nigra Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Echinopsis nigripilis (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus nigripilis** (Phil.) Baker
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 1999.

Echinopsis oreopepon (Speg.) Werderm. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Echinopsis oxygona (Link) Zucc.
Sin.: *Cereus geminatus* Otto, *Cereus multiplex* (Pfeiff.) Zucc., *Cereus turbinatus* Pfeiff., *Echinocactus eyriesii* Turpin, *Echinocactus oxygonus* Link, *Echinopsis eyriesii* (Turpin) Zucc. ex Pfeiff. & Otto, *Echinopsis geminata* (Otto) K. Schum., *Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Pfeiff. & Otto, *Echinopsis paraguayensis* F. Ritter, *Echinopsis turbinata* Pfeiff. & Otto

Referencias: Kiesling, R., 2005; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); BRA(RGS); PRY(GUA); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1603* (SI)]; BRA[*Gerloff, N. 180* (*)]; URY[*Nyffeler, R. 1476* (MVJB)].

Echinopsis paraguayensis F. Ritter = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.

Echinopsis pasacana (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Echinopsis peitscherana (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, nom. illeg. = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Echinopsis pelecyrhachys Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis philippii (Regel & E. Schmidt) G. Nicholson = **Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.

Echinopsis poco (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Echinopsis polyacantha Monv. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis polyancistra Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Echinopsis pseudocachensis (Backeb.) Friedrich = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis pseudocandicans (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle = **Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling

Echinopsis pseudominuscula Speg. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Echinopsis pugionacantha Rose & Boed. = **Lobivia pugionacantha** (Rose & Boed.) Backeb.

Echinopsis purpureopilosa (Weing.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Echinopsis pygmaea R.E. Fr. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Echinopsis quinesensis (Rausch) Friedrich & Glaetzle = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Echinopsis rebutioides (Backeb.) Friedrich = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Echinopsis rhodacantha (Salm-Dyck) C.F. Först. = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinopsis rhodotricha K. Schum.
Sin.: *Echinopsis adolphofriedrichii* G. Moser, *Echinopsis chacoana* Schütz, *Echinopsis minuana* Speg., *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. subsp. *chacoana* (Schütz) P.J. Braun & Esteves, *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. var. *brevispina* F. Ritter, *Echinopsis rhodotricha* K. Schum. var. *rosiflora* K. Schum.
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); PRY(APY, CON, COA); URY(PAY, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 433* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4249* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Hunt, 1999).

Echinopsis rhodotricha K. Schum. var. *brevispina* F. Ritter = **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.

Echinopsis rhodotricha K. Schum. var. *rosiflora* K. Schum. = **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.

Echinopsis rhodotricha K. Schum. subsp. *chacoana* (Schütz) P.J. Braun & Esteves = **Echinopsis rhodotricha** K. Schum.

Echinopsis ritteri Boed. = **Echinopsis mamillosa** Gürke

Echinopsis robinsoniana Werderm. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis rowleyi Friedrich = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Echinopsis rubinghiana (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus thelegonoides** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis salpigophora (Lem.) Salm-Dyck = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis salpingantha Y. Ito = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis saltensis Speg. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis saltensis Speg. var. *nealeana* (Backeb.) J.G. Lamb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis saltensis Speg. var. *pseudocachensis* (Backeb.) J.G. Lamb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis sanguiniflora (Backeb.) D.R. Hunt = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Echinopsis schaferi Britton & Rose = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis schickendantzii F.A.C. Weber = **Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Echinopsis schreiteri (A. Cast.) Werderm. ex Backeb. = **Lobivia schreiteri** A. Cast. var. **schreiteri**

Echinopsis silvestrii Speg.
Referencias: Backeberg, C., 1959a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8873* (SI)].

Echinopsis simplex Nied. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis skottsbergii (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus skottsbergii** Backeb.

Echinopsis smrziana Backeb. = **Trichocereus smrzianus** (Backeb.) Backeb.

Echinopsis spachiana (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus spachianus** (Lem.) Riccob.

Echinopsis spegazziniana Britton & Rose = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinopsis spinibarbis (Pfeiff.) A.E. Hoffm. = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Echinopsis spiniflora (K. Schum.) A. Berger = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Echinopsis stilowiana (Backeb.) J.G. Lamb. = **Lobivia schreiteri** A. Cast. var. **schreiteri**

Echinopsis strigosa (Salm-Dyck) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus strigosus** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Echinopsis tarijensis (Vaupel) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Echinopsis terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus terscheckii** (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose

Echinopsis thelegona (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus thelegonus** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Echinopsis thelegonoides (Speg.) Friedrich & G.D. Rowley = **Trichocereus thelegonoides** (Speg.) Britton & Rose

Echinopsis thionantha (Speg.) Werderm. = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Echinopsis tubiflora (Pfeiff.) Zucc.
Sin.: *Cereus tubiflorus* Pfeiff.
Referencias: Backeberg, C., 1959a.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. s.n.* (SI), *Schreiter, R. 1679* (LIL)].

Echinopsis turbinata Pfeiff. & Otto = **Echinopsis oxygona** (Link) Zucc.

Echinopsis uebelmanniana (Lembcke & Backeb.) A.E. Hoffm., nom. inval. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Echinopsis vatteri (R. Kiesling) G.D. Rowley = **Trichocereus vatteri** R. Kiesling

Echinopsis violacea Werderm. = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Echinopsis walteri (R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle = **Lobivia walteri** R. Kiesling

Echinopsis xiphacantha Y. Ito = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Echinyctanthus leucanthus Lem. = **Echinopsis leucantha** (Gillies ex Salm-Dyck) Walp.

Epiphyllum Haw.

Número de especies: 1

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.
Sin.: *Cactus phyllantus* L., *Epiphyllum phyllanthus* (L.) Haw. var. *paraguayense* (F.A.C. Weber) Backeb., *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link, *Phyllocactus phyllanthus* (L.) Link var. *paraguayense* F.A.C. Weber
Referencias: Castellanos, A & Lelong, H., 1943; Mereles, F., 2001; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2203* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45966* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 632* (SI)].

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. var. *paraguayense* (F.A.C. Weber) Backeb. = **Epiphyllum phyllanthus** (L.) Haw.

Epiphyllum platycarpum Zucc. = **Rhipsalis platycarpa** (Zucc.) Pfeiff.

Erdisia philippii (Regel & E. Schmidt) Britton & Rose = **Austrocactus philippii** (Regel & E. Schmidt) Buxb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Erdisia spiniflora (Phil.) Britton & Rose = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eriocactus claviceps F. Ritter = **Parodia claviceps** (F. Ritter) F.H. Brandt
Referencias: Larroca, J., 1998.

Eriocactus grossei (K. Schum.) Backeb. var. *aureispinus* F. Ritter = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Eriocactus leninghausii (K. Schum.) Backeb. = **Parodia leninghausii** (K. Schum.) F.H. Brandt

Eriocactus magnificus F. Ritter = **Parodia magnifica** (F. Ritter) F.H. Brandt

Eriocactus nigrispinus (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval. = **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Eriocactus schumannianus (Nicolai) Backeb., nom. illeg. = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Eriocactus warasii F. Ritter = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Eriocephala grossei (K. Schum.) Y. Ito = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Eriocephala schumanniana (Nicolai) Backeb., nom. inval. = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Eriocereus bonplandii (Pfeiff.) Riccob. = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Eriocereus guelichii (Speg.) A. Berger = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose

Eriocereus martinii (Labour.) Riccob. = **Harrisia martinii** (Labour.) Britton
Referencias: Kiesling, R., 2005; Leuenberger, B. E., 2000b.

Eriocereus polyacanthus F. Ritter = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Eriocereus pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) A. Berger = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Eriocereus regelii (Weing.) Backeb. = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **regelii** (Weing.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Eriocereus tarijensis F. Ritter = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Eriocereus tortuosus (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Riccob. = **Harrisia tortuosa** (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Eriosyce Phil.

Número de especies: 5 endémicas

Eriosyce aerocarpa (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce algarrobensis F. Ritter = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eriosyce andreana Katt. = **Pyrrhocactus kattermannii** R. Kiesling

Eriosyce aspillagae (Söhrens) Katt. = **Pyrrhocactus aspillagae** (Söhrens) F. Ritter

Eriosyce aspillagae (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter = **Pyrrhocactus aspillagae** (Söhrens) F. Ritter

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**
Sin.: *Echinocactus auratus* Pfeiff., *Eriosyce algarrobensis* F. Ritter, *Eriosyce ceratistes* Britton & Rose, *Eriosyce ihotzkyana* F. Ritter var. *ausseliana* (F. Ritter) F. Ritter, *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Eriosyce sandillon* (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2590* (CONC)].

Eriosyce aurata (Pfeiff.) Backeb. var. **spinibarbis** (F. Ritter) Katt.
Sin.: *Eriosyce spinibarbis* F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 2000–2500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 534* (SGO, U)].

Eriosyce bruchii (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Eriosyce bulbocalyx (Werderm.) Katt. = **Pyrrhocactus bulbocalyx** (Werderm.) Backeb.

Eriosyce caligophila R. Pinto = **Islaya caligophila** (R. Pinto) Faúndez

Eriosyce ceratistes Britton & Rose = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**

Eriosyce chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. = **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**

Eriosyce chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. **albidiflorus** F. Ritter

Eriosyce confinis (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus confinis** F. Ritter

Eriosyce crispa (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus crispus** F. Ritter

Eriosyce crispa (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce crispa (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce crispa (F. Ritter) Katt. var. *totoralensis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce crispa (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Eriosyce curvispina (Bertero ex Colla) Katt. var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Eriosyce engleri (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus engleri** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman var. *totoralensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce eriosyzoides (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce esmeraldana (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala esmeraldana** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce garaventae (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus garaventai** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce heinrichiana (Backeb.) Katt. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Eriosyce heinrichiana (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Eriosyce heinrichiana (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Eriosyce heinrichiana (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus simulans** F. Ritter

Eriosyce ihotzkyana F. Ritter
Arbusto suculento. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 253* (SGO, ZSS)].

Eriosyce ihotzkyana F. Ritter var. *ausseliana* (F. Ritter) F. Ritter = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**

Eriosyce iquiquensis (F. Ritter) Ferryman = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Eriosyce islayensis (C.F. Först.) Katt. = **Islaya islayensis** (C.F. Först.) Backeb.

Eriosyce korethtoides (Wessner) Backeb. = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Eriosyce krausii (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala krausii** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce kunzei auct. non (C.F. Först.) Katt. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce kunzei (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce lapampaensis F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 200–2500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 255* (SGO, ZSS)].

Eriosyce laui Luthy = **Islaya laui** (Luthy) Faúndez

Eriosyce limariensis (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce marksiana (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Eriosyce marksiana (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce marksiana (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Eriosyce megacarpa F. Ritter
Subarbusto suculento. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 514* (SGO, U, ZSS)].

Eriosyce napina (Phil.) Katt. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce napina (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce napina (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa* (F. Ritter) Ferryman = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce napina (Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim & I. Schaub = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce napina (Phil.) Katt. subsp. *lembckei* Katt. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce occulta Katt. = **Pyrrhocactus philippianus** Faúndez

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt. = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *glabrescens* (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala glabrescens** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce paucicostata (F. Ritter) Ferryman = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce recondita (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus reconditus** F. Ritter

Eriosyce recondita (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Eriosyce rodentiophila F. Ritter
Sin.: *Eriosyce rodentiophila* F. Ritter var. *lanata* F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 100–600 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 264* (U)].

Eriosyce rodentiophila F. Ritter var. *lanata* F. Ritter = **Eriosyce rodentiophila** F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eriosyce sandillon (Gay) Phil. = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eriosyce sandillon (Gay) Phil. var. *algarrobensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**

Eriosyce sandillon (Gay) Phil. var. *mollensis* (Backeb.) A.E. Hoffm. = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**

Eriosyce sandillon (Gay) Phil. var. *vallenarensis* (Backeb.) A.E. Hoffm. = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **aurata**

Eriosyce senilis (Backeb.) Katt. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Eriosyce senilis (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Eriosyce senilis (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Eriosyce simulans (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus simulans** F. Ritter

Eriosyce sociabilis (F. Ritter) Katt. = **Neoporteria sociabilis** F. Ritter

Eriosyce spectabilis A.E. Hoffm. & H.E. Walter, nom. nud. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Eriosyce spinibarbis F. Ritter = **Eriosyce aurata** (Pfeiff.) Backeb. var. **spinibarbis** (F. Ritter) Katt.

Eriosyce strausiana (K. Schum.) Katt. = **Pyrrhocactus strausianus** (K. Schum.) A. Berger

Eriosyce strausiana (K. Schum.) Katt. var. *pachacoensis* (Rausch) Katt. = **Pyrrhocactus pachacoensis** Rausch

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. var. *castanea* (F. Ritter) Katt. = **Neoporteria castanea** F. Ritter

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Eriosyce subgibbosa (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. = **Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison) F. Ritter

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus floccosus** F. Ritter

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus echinus** F. Ritter

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. *pauciscostata* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Eriosyce taltalensis (Hutchison) Katt. subsp. *pilispina* (F. Ritter) Katt. = **Pyrrhocactus pilispinus** F. Ritter

Eriosyce tenebrica (F. Ritter) Katt. = **Thelocephala tenebrica** F. Ritter

Eriosyce umadeave (Werderm.) Katt. = **Pyrrhocactus umadeave** (Werderm.) Backeb.

Eriosyce vertongenii (J.G. Lamb.) D.R. Hunt = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Eriosyce villicumensis (Rausch) Katt. = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Eriosyce villosa (Monv.) Katt. = **Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Eulychnia Phil.

Número de especies: 6 endémicas

Eulychnia acida Phil.
Sin.: *Eulychnia acida* Phil. var. *elata* F. Ritter, *Eulychnia acida* Phil. var. *procumbens* F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Árbol suculento. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2583* (CONC), *Landbeck, L. s.n.* (SGO)].

Eulychnia acida Phil. var. *elata* F. Ritter = **Eulychnia acida** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eulychnia acida Phil. var. *procumbens* F. Ritter = **Eulychnia acida** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eulychnia aricensis F. Ritter
Referencias: Muñoz-Schick, M., Pinto, R. & Mesa, A., 2001.
Árbol suculento. Endémica. 400–700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 197* (ZSS)].

Eulychnia barquitensis F. Ritter = **Eulychnia breviflora** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eulychnia breviflora Phil.
Sin.: *Cereus panoplaeatus* Monv., *Eulychnia barquitensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *taltalensis* F. Ritter, *Eulychnia breviflora* Phil. var. *tenuis* F. Ritter, *Eulychnia saint-pieana* F. Ritter var. *barquitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 2000.
Árbol suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2868* (CONC)].

Eulychnia breviflora Phil. var. *taltalensis* F. Ritter = **Eulychnia breviflora** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eulychnia breviflora Phil. var. *tenuis* F. Ritter = **Eulychnia breviflora** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eulychnia breviflora Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt = **Eulychnia iquiquensis** (K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Eulychnia castanea Phil.
Sin.: *Cereus castaneus* (Phil.) K. Schum., *Philippicereus castaneus* (Phil.) Backeb.
Referencias: Eggli, U. & Leuenberger, B. E., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 2000.
Arbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 3083* (B, CONC, SGO)].

Eulychnia clavata Phil. = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Eulychnia iquiquensis (K. Schum.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus iquiquensis* K. Schum., *Eulychnia breviflora* Phil. subsp. *iquiquensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, *Eulychnia iquiquensis* (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Árbol suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 1755* (B, SGO), *Eggli, U. 2835* (CONC)].

Eulychnia iquiquensis (K. Schum.) Britton & Rose var. *pullilana* F. Ritter = **Eulychnia iquiquensis** (K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

[Eulychnia morromorenoensis F. Ritter]
Notas: Nombre dudoso.

Eulychnia saint-pieana F. Ritter
Árbol suculento. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2661* (CONC)].

Eulychnia saint-pieana F. Ritter var. *barquitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Eulychnia breviflora** Phil.

Eulychnia spinibarbis (Pfeiff.) Britton & Rose = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Frailea Britton & Rose

Número de especies: 11, 9 endémicas

Frailea alacriportana Backeb. & Voll = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea albiareolata Buining & Brederoo = **Frailea pumila** (Lem.) Britton & Rose

Frailea albicolumnaris F. Ritter = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **albicolumnaris** (F. Ritter) Hofacker

Frailea albifusca F. Ritter = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea alexanderi Metzing
Referencias: Kiesling, R. & Metzing, D., 2006a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Metzing, D. 38* (HBG)].

Frailea asperispina F. Ritter = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Frailea asteroides Werderm. = **Frailea castanea** Backeb.
Referencias: Kiesling, R. & Metzing, D., 2006a; Kiesling, R., 2005.

Frailea aureispina F. Ritter = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Frailea bruchii Speg. = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii**

Frailea buenekeri W.R. Abraham
Sin.: *Frailea buenekeri* W.R. Abraham subsp. *densispina* Hofacker & K. Herm, *Frailea densispina* (Hofacker & K. Herm) N. Gerloff
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bünecker, R. W. s.n.* (KOELN)].

Frailea buenekeri W.R. Abraham subsp. *densispina* Hofacker & K. Herm = **Frailea buenekeri** W.R. Abraham

Frailea caespitosa (Speg.) Britton & Rose = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Frailea carminifilamentosa Backeb. = **Frailea pumila** (Lem.) Britton & Rose

Frailea castanea Backeb.
Sin.: *Frailea asteroides* Werderm.
Referencias: Kiesling, R. & Metzing, D., 2006a; Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Meregalli, M. 212* (HBG)]; URY[*Kiesling, R. 9318* (SI)].
Notas: Citada para la provincia de Entre Ríos, Argentina, sin mencionar ejemplar de herbario (Castellanos (1966–1967).

Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus cataphractus* Dams, *Frailea cataphracta* (Dams) Britton & Rose subsp. *tuyensis* (Buining & G. Moser) Braun & Esteves, *Frailea tuyensis* Buining & G. Moser
Referencias: Castellanos, A., 1968; Metzing, D., 1994, 2006; Pin, A. B. & Simon, J., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 305* (U)].

Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose subsp. *tuyensis* (Buining & G. Moser) Braun & Esteves = **Frailea cataphracta** (Dams) Britton & Rose

Frailea chrysacantha Hrabe, nom. inval. = **Frailea pumila** (Lem.) Britton & Rose

Frailea concepcionensis Buining & G. Moser = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose

Frailea curvispina Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 322* (U)].

Frailea dadakii (Fric) A. Berger = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Frailea densispina (Hofacker & K. Herm) N. Gerloff = **Frailea buenekeri** W.R. Abraham

Frailea friedrichii Buining & G. Moser = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose

Frailea fulviseta Buining & Brederoo = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **fulviseta** (Buining & G. Moser) Braun & Esteves

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus gracillimus* Lem., *Frailea alacriportana* Backeb. & Voll, *Frailea albifusca* F. Ritter, *Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *alacriportana* (Backeb. & Voll) N. Gerloff, *Frailea gracillima* (Lem.) Britton & Rose subsp. *albifusca* (F. Ritter) Braun & E. Pereira, *Frailea horstii* F. Ritter, *Frailea lepida* Buining & Brederoo, *Frailea pseudogracillima* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(ART, CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ritter, F. 948* (SGO, U, ZSS)]; URY[*Ritter, F. 1392* (SGO, U)].

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose subsp. *alacriportana* (Backeb. & Voll) N. Gerloff = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea gracillima (Lem.) Britton & Rose subsp. *albifusca* (F. Ritter) Braun & E. Pereira = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea grahliana (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Frailea horstii F. Ritter = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea ignacionensis Buining & G. Moser = **Frailea schilinzkyana** (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose

Frailea lepida Buining & Brederoo = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea mammifera Buining & Brederoo subsp. **angelae** R. Kiesling & Metzing
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5930* (SI)].

Frailea mammifera Buining & Brederoo subsp. **mammifera**
Referencias: Kiesling, R. & Metzing, D., 2006a, b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 345* (ZSS)].

Frailea perbella Prestle = **Frailea phaeodisca** (Speg.) Backeb.

Frailea phaeodisca (Speg.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus pygmaeus* Speg. var. *phaeodisca* Speg., *Frailea perbella* Prestle, *Frailea pygmaea* (Speg.) Britton & Rose var. *phaeodisca* Speg.
Referencias: Castellanos, A., 1968.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CLA, DUR, LAV, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Ritter, F. 1362* (ZSS)].

Frailea pseudogracillima F. Ritter = **Frailea gracillima** (Lem.) Britton & Rose

Frailea pulcherrima (Arechav.) Speg. = **Frailea pygmaea** (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**

Frailea pumila (Lem.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus pumilus* Lem., *Frailea albiareolata* Buining & Brederoo, *Frailea carminifilamentosa* Backeb., *Frailea chrysacantha* Hrabe, nom. inval.
Referencias: Castellanos, A., 1968; Kiesling, R. & Metzing, D., 2006a, b; Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); PRY(APY); URY(ART, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2189* (SI)]; BRA[*Meregalli, M. 223* (HBG)]; URY[*Osten, C. 15728* (MVM)].

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose var. *phaeodisca* Speg. = **Frailea phaeodisca** (Speg.) Backeb.

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **albicolumnaris** (F. Ritter) Hofacker
Sin.: *Frailea albicolumnaris* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. s.n.* (U)].

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **fulviseta** (Buining & G. Moser) Braun & Esteves
Sin.: *Frailea fulviseta* Buining & Brederoo
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 352* (U)].

Frailea pygmaea (Speg.) Britton & Rose subsp. **pygmaea**
Sin.: *Echinocactus dadakii* Fric, *Echinocactus pulcherrimus* Arechav., *Echinocactus pygmaeus* Speg., *Frailea asperispina* F. Ritter, *Frailea aureispina* F. Ritter, *Frailea dadakii* (Fric) A. Berger, *Frailea pulcherrima* (Arechav.) Speg.
Referencias: Castellanos, A., 1968; Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC,TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27312* (SI)]; BRA[*Ritter, F. 1386* (U)]; URY[*Nyffeler, R. 1539* (MVJB)].

Frailea schilinzkyana (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose
Sin.: *Cactus schilinzkyanus* (F. Haage ex K. Schum.) Kuntze, *Echinocactus grahlianus* F. Haage ex K. Schum., *Echinocactus schilinzkyanus* F. Haage ex K. Schum., *Frailea concepcionensis* Buining & G. Moser, *Frailea friedrichii* Buining & G. Moser, *Frailea grahliana* (F. Haage ex K. Schum.) Britton & Rose, *Frailea ignacionensis* Buining & G. Moser
Referencias: Castellanos, A., 1968; Kiesling, R., 2005; Metzing, D., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); PRY(CON, PAI); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 185* (SI)]; PRY[*Friedrich, H. C. s.n.* (ZSS)].

Frailea tuyensis Buining & G. Moser = **Frailea cataphracta** (Dams) Britton & Rose

Friesia umadeave Fric ex Kreuz., nom. inval. = **Pyrrhocactus umadeave** (Werderm.) Backeb.

Furiolobivia dulcis-pauli (Fric) Y. Ito, nom. illeg. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Furiolobivia ferox (Britton & Rose) Y. Ito = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Furiolobivia longispina (Britton & Rose) Y. Ito = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Furiolobivia nigra (Backeb.) Y. Ito = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Gymnocalycium Pfeiff. & Mittler

Número de especies: 53, 50 endémicas

Gymnocalycium achirasense H. Till & Schatzl ex H. Till = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **achirasense** (H. Till & Schatzl ex H. Till) H. Till

Gymnocalycium acorrugatum J.G. Lamb. = **Gymnocalycium castellanosii** Backeb. subsp. **acorrugatum** (J.G. Lamb.) R. Kiesling & Metzing
Referencias: Kiesling, R. & Meglioli, S., 2003.

Gymnocalycium albiareolatum Rausch
Sin.: *Gymnocalycium albiareolatum* Rausch var. *ramosum* Rausch
Referencias: Rausch, W., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch, W. 716* (ZSS)].

Gymnocalycium albiareolatum Rausch var. *ramosum* Rausch = **Gymnocalycium albiareolatum** Rausch

Gymnocalycium albispinum Backeb. = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **niveum** Rausch

Gymnocalycium ambatoense Piltz = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium amerhauseri H. Till
Referencias: Till, H., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Till, S. 1725* (WU)].

Gymnocalycium andreae (Boed.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus andreae* Boed., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. f. *svecianum* Pazout ex H. Till, *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. var. *grandiflorum* Krainz & Andreae
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. 1-80* (SI)].

Gymnocalycium andreae (Boed.) Backeb. f. *svecianum* Pazout ex H. Till = **Gymnocalycium andreae** (Boed.) Backeb.

Gymnocalycium andreae (Boed.) Backeb. var. *grandiflorum* Krainz & Andreae = **Gymnocalycium andreae** (Boed.) Backeb.

Gymnocalycium andreae (Boed.) Backeb. subsp. *carolinense* Neuhuber = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii**

Gymnocalycium angelae Meregalli
Referencias: Meregalli, M., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. s.n.* (TO)].

Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus anisitsii* K. Schum., *Echinocactus damsii* K. Schum., *Echinocactus joossensianum* Boed., *Gymnocalycium anisitsii* (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *multiproliferum* (P.J. Braun) P.J. Braun, *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose, *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *centrispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *multiproliferum* P.J. Braun, *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *rotundulum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *torulosum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium damsii* (K. Schum.) Britton & Rose var. *tucavocense* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium joossensianum* (Boed.) Britton & Rose
Referencias: Pin, A. B. & Simon, J., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Kiesling, R. 9601* (G, PY, SI)].

Gymnocalycium anisitsii (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *multiproliferum* (P.J. Braun) P.J. Braun = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium antherostele F. Ritter = **Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**

Gymnocalycium artigas Herter = **Gymnocalycium uruguayense** (Arechav.) Britton & Rose

Gymnocalycium asterium A. Cast., nom. illeg. = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium asterium A. Cast. var. *minimum* Pazout, nom. inval. = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium asterium A. Cast. var. *paucispinum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg.
Sin.: *Echinocactus baldianus* Speg., *Echinocactus sanguiniflorus* Werderm., *Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg. f. *venturianum* (Fric ex Backeb.) J.G. Lamb., *Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg. var. *albiflorum* C.A.L. Bercht, *Gymnocalycium sanguiniflorum* (Werderm.) Werderm., *Gymnocalycium venturianum* Fric ex Backeb.
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg. f. *venturianum* (Fric ex Backeb.) J.G. Lamb. = **Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg.

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg. var. *albiflorum* C.A.L. Bercht = **Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg.

Gymnocalycium bayrianum H. Till
Sin.: *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *bayrianum* (H. Till) Halda
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 9385* (LIL)].

Gymnocalycium berchtii Neuhuber = **Gymnocalycium parvulum** (Speg.) Speg.

Gymnocalycium bicolor Schütz = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium bodenbenderianum (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium bodenbenderianum (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill subsp. *intertextum* (Backeb. ex H. Till) H. Till = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium borthii Koop ex H. Till = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium bozsingianum Schütz
= **Gymnocalycium castellanosii** Backeb. var. **bozsingianum** (Schütz) Piltz

Gymnocalycium brachyanthum (Gürke) Britton & Rose
= **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Gymnocalycium brachypetalum Speg. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. **brigittae** Piltz
Referencias: Piltz, G., 1987.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piltz, G. 214* (KOELN)].

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. **bruchii**
Sin.: *Echinocactus lafaldensis* Berger, *Frailea bruchii* Speg., *Gymnocalycium andreae* (Boed.) Backeb. subsp. *carolinense* Neuhuber, *Gymnocalycium bruchii* (Speg.) Hosseus var. *enorme* (Oehme) Backeb., *Gymnocalycium bruchii* (Speg.) Hosseus var. *hossei* Backeb., *Gymnocalycium lafaldense* Vaupel
Referencias: Oehme, H., 1941.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. 12-82* (SI)].

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. *enorme* (Oehme) Backeb. = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii**

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. *hossei* Backeb. = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii**

Gymnocalycium bruchii (Speg.) Hosseus var. **niveum** Rausch
Sin.: *Gymnocalycium albispinum* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1989.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. 77-77* (SI)].

Gymnocalycium bueneckeri (Buining) Swales
Sin.: *Gymnocalycium horstii* Buining var. *bueneckeri* Buining
Referencias: Swales, G. J., 1978.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Swales, G. 261* (K)].

Gymnocalycium calochlorum (Boed.) Y. Ito
Sin.: *Echinocactus calochlorus* Boed., *Echinocactus prolifer* Backeb., *Gymnocalycium calochlorum* (Boed.) Y. Ito var. *proliferum* (Backeb.) Backeb., *Gymnocalycium papschii* H. Till
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 125* (BA)].

Gymnocalycium calochlorum (Boed.) Y. Ito var. *proliferum* (Backeb.) Backeb. = **Gymnocalycium calochlorum** (Boed.) Y. Ito

Gymnocalycium capillense (Schick) Hosseus
Sin.: *Echinocactus capillaensis* Schick, *Echinocactus sigelianum* Schick, *Echinocactus sutterianum* Schick, *Gymnocalycium deezianum* Dölz, *Gymnocalycium sigelianum* (Schick) Hosseus, *Gymnocalycium sutterianum* (Schick) Hosseus
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium carminanthum Borth & Koop
= **Gymnocalycium oenanthemum** Backeb.

Gymnocalycium castellanosii Backeb. var. **bozsingianum** (Schütz) Piltz
Sin.: *Gymnocalycium bozsingianum* Schütz
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium castellanosii Backeb. var. **castellanosii**
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium castellanosii Backeb. subsp. **acorrugatum** (J.G. Lamb.) R. Kiesling & Metzing
Sin.: *Gymnocalycium acorrugatum* J.G. Lamb.
Referencias: Kiesling, R. & Meglioli, S., 2003.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9400* (SI)].

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till, p.p.
= **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till f. *belenense* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium pugionacanthum** Backeb. ex H. Till

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till f. *encispinum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium pugionacanthum** Backeb. ex H. Till

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till f. *montanum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium pugionacanthum** Backeb. ex H. Till

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till f. *schmidianum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium pugionacanthum** Backeb. ex H. Till

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till subsp. *acinacispinum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium catamarcense H. Till & W. Till subsp. *schmidianum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium chubutense (Speg.) Speg. = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose var. *centrispinum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose var. *multiproliferum* P.J. Braun = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose var. *rotundulum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose var. *torulosum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium damsii (K. Schum.) Britton & Rose var. *tucavocense* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium deezianum Dölz = **Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus

Gymnocalycium delaetii (K. Schum.) Hosseus = **Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **delaetii** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler
Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto
Referencias: Gerloff, N. & Metzing, D., 2002; Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); URY(ART, CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ritter, F. 1373* (SGO)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar ejemplar de referencia (Spegazzini, 1925).

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *andersohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *delaetianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *golzianum* (Mundt) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *heuschelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* F. Haage, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *roseiflorum* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *scheidelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium denudatum (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *wieditzianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium erinaceum J.G. Lamb.
Referencias: Lambert, J. G., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lambert, J. G. 40* (U)].

Gymnocalycium erolesii Neuhuber & C.A.L. Bercht = **Gymnocalycium schroederianum** Osten subsp. **boessii** R. Kiesling, Marchesi & O. Ferrari

Gymnocalycium eurypleurum F. Ritter
Referencias: Metzing, D., 1994; Pin, A. B. & Simon, J., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 17823* (CTES)].

Gymnocalycium eytianum Cárdenas = **Gymnocalycium megatae** Y. Ito

Gymnocalycium ferrarii Rausch = **Gymnocalycium mucidum** Oehme

Gymnocalycium fleischerianum Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium fleischerianum Backeb. var. *andersohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium fleischerianum Backeb. var. *anoplum* Y. Ito, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium fleischerianum Backeb. var. *heuschkelianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium fleischerianum Backeb. var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval. = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium fricianum Plesnik, nom. inval. = **Gymnocalycium megatae** Y. Ito

Gymnocalycium friedrichii (Werderm.) Pazout, nom. inval. = **Gymnocalycium stenopleurum** F. Ritter

Gymnocalycium gaponi Neuhuber = **Gymnocalycium taningaense** Piltz

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler
Sin.: *Cactus gibbosus* Haw., *Cereus gibbosus* (Haw.) Pfeiff., *Echinocactus brachypetalus* (Speg.) Werderm., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *cerebriformis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *chubutensis* Speg., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *cristatus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ferox* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leonensis* Hildm. ex K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucacanthus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *leucodictyus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *pluricostatus* Rümpler, *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *polygonus* K. Schum., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *schlumbergeri* Rümpler, *Echinocactus leucodictyus* Salm-Dyck, *Gymnocalycium borthii* Koop ex H. Till, *Gymnocalycium brachypetalum* Speg., *Gymnocalycium chubutense* (Speg.) Speg., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *brachypetalum* (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsianus* (Labour.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsianus* Rümpler, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *chubutense* (Speg.) Papsch, *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage ex Quehl) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *ferox* (Labour.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium striglianum* Rausch
Referencias: Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995; Papsch, W., 1997.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *brachypetalum* (Speg.) Papsch = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsianus* (Labour.) Y. Ito, nom. inval.
= **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *celsianus* Rümpler = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *chubutense* (Speg.) Papsch = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage ex Quehl) Y. Ito, nom. inval.
= **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *fennellii* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval.
= **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *ferox* (Labour.) Y. Ito, nom. inval.
= **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium gibbosum (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *nobile* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval.
= **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**

Gymnocalycium glaucum F. Ritter = **Gymnocalycium mucidum** Oehme

Gymnocalycium grandiflorum Backeb.
= **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose var. **grandiflorum** (Backeb.) H. Till

Gymnocalycium guachinense Schütz = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Gymnocalycium guerkeanum (Heese) Britton & Rose
= **Gymnocalycium uruguayense** (Arechav.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Gymnocalycium horridispinum G. Frank ex H. Till
= **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **horridispinum** (G. Frank ex H. Till) H. Till

Gymnocalycium horrispinum G. Frank ex H. Till var. *achirasense* (H. Till & Schatzl ex H. Till) Lodé
= **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **achirasense** (H. Till & Schatzl ex H. Till) H. Till

Gymnocalycium horstii Buining
Referencias: Buining, A. F. H.. 1970.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 79* (U)].

Gymnocalycium horstii Buining var. *bueneckeri* Buining
= **Gymnocalycium bueneckeri** (Buining) Swales

[Gymnocalycium hossei (F. Haage) A. W. Hill]
Sin.: *Echinocactus hossei* F. Haage
Notas: Nombre dudoso.

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus multiflorus* Hook. var. *hybopleurus* K. Schum., *Gymnocalycium ambatoense* Piltz, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till subsp. *acinacispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till subsp. *schmidianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till, p.p., *Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.) Backeb. var. *breviflorum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.) Backeb. var. *centrispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.) Backeb. var. *euchlorum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.) Backeb. var. *ferocior* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium hybopleurum* (K. Schum.) Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium nigriareolatum* Backeb.
Referencias: Till, H. & Till, W., 1994, 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Erb s.n.* (BA)].

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var. *breviflorum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var. *centrispinum* Backeb., nom. inval.
= **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var. *euchlorum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var. *ferocior* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium hybopleurum (K. Schum.) Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium hyptiacanthum (Lem.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus hyptiacanthus* Lem.
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(ERI); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 2193* (SI)]; URY[*Kiesling, R. 8505* (SI)].

Gymnocalycium inmemoratum A. Cast. & Lelong = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium intertextum Backeb. ex H. Till = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium joossensianum (Boed.) Britton & Rose = **Gymnocalycium anisitsii** (K. Schum.) Britton & Rose

Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari f. **albiareolatum** O. Ferrari
Referencias: Ferrari, O., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. s.n.* (SI)];

Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari f. **castaneum** O. Ferrari
Referencias: Ferrari, O., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. s.n.* (SI)].

Gymnocalycium kieslingii O. Ferrari f. **kieslingii**
Referencias: Ferrari, O., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. 19-1980* (SI)].

Gymnocalycium knebelii Fric, nom. nud. = **Gymnocalycium marsoneri** Fric ex Y. Ito

Gymnocalycium kozelskyanum Schütz, nom. inval. = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium kroenleinii R. Kiesling, Rausch & O. Ferrari
Referencias: Kiesling, R., Rausch, W. & Ferrari, O., 2000.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1200–1400 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9304* (SI)].

Gymnocalycium kurtzianum (Gürke) Britton & Rose = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium lafaldense Vaupel = **Gymnocalycium bruchii** (Speg.) Hosseus var. **bruchii**

[Gymnocalycium leeanum (Hook.) Britton & Rose]
Sin.: *Echinocactus leeanus* Hook.
Notas: Nombre dudoso.

Gymnocalycium leptanthum (Speg.) Speg.
Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var. *leptanthus* Speg.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SDE).
Notas: No ha sido posible localizar el ejemplar tipo ni material adicional de referencia.

Gymnocalycium marquezii Cárdenas var. *argentinense* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium pflanzii** (Vaupel) Werderm. subsp. **argentinense** H. Till & W. Till

Gymnocalycium marsoneri Fric ex Y. Ito
Sin.: *Gymnocalycium knebelii* Fric, nom. nud.
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8724* (SI)].

Gymnocalycium mazanense (Backeb.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus mazanensis* Backeb., *Gymnocalycium guachinense* Schütz, *Gymnocalycium mazanense* (Backeb.) Backeb. var. *breviflorum* Backeb., *Gymnocalycium mazanense* (Backeb.) Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium nidulans* Fric ex Backeb., *Gymnocalycium weissianum* Backeb., *Gymnocalycium weissianum* Backeb. var. *atroroseum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium weissianum* Backeb. var. *cinerascens* Backeb., nom. inval.
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium mazanense (Backeb.) Backeb. var. *breviflorum* Backeb. = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Gymnocalycium mazanense (Backeb.) Backeb. var. *ferox* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Gymnocalycium megatae Y. Ito
Sin.: *Gymnocalycium eytianum* Cárdenas, *Gymnocalycium fricianum* Plesnik, nom. inval., *Gymnocalycium tudae* Y. Ito
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Nicora, E. G. 9764* (SI)].

Gymnocalycium mesopotamicum R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1980.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cutler, D. 126-552* (K, SI)].

Gymnocalycium michoga Fric ex Y. Ito = **Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**

Gymnocalycium mihanovichii (Fric ex Gürke) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus mihanovichii* Fric ex Gürke
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Daguerre, J. B. 1934* (BA)]; PRY[*Mereles, F. 4789* (FCQ)].

Gymnocalycium mihanovichii (Fric ex Gürke) Britton & Rose var. *friedrichii* Werderm. = **Gymnocalycium stenopleurum** F. Ritter

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton & Rose var. *grandiflorum* (Backeb.) H. Till = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton & Rose subsp. **achirasense** (H. Till & Schatzl ex H. Till) H. Till
Sin.: *Gymnocalycium achirasense* H. Till & Schatzl ex H. Till, *Gymnocalycium horrispinum* G. Frank ex H. Till var. *achirasense* (H. Till & Schatzl ex H. Till) Lodé
Referencias: Till, H., 1993.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton & Rose subsp. *brachyanthum* (Gürke) H. Till = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton & Rose subsp. **horridispinum** (G. Frank ex H. Till) H. Till
Sin.: *Gymnocalycium horridispinum* G. Frank ex H. Till
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fechser, H. s.n.* (WU)].

Gymnocalycium monvillei (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**
Sin.: *Echinocactus brachyanthum* Gürke, *Echinocactus monvillei* Lem., *Echinocactus multiflorus* Hook., *Echinocactus multiflorus* Hook. var. *albispinus* K. Schum., *Echinocactus multiflorus* Hook. var. *parisiense* K. Schum., *Gymnocalycium brachyanthum* (Gürke) Britton & Rose, *Gymnocalycium monvillei* (Lem.) Britton & Rose subsp. *brachyanthum* (Gürke) H. Till, *Gymnocalycium monvillei* (Lem.) Britton & Rose var. *grandiflorum* (Backeb.) H. Till, *Gymnocalycium multiflorum* (Hook.) Britton & Rose, *Gymnocalycium multiflorum* (Hook.) Britton & Rose var. *albispinum* K. Schum., *Gymnocalycium multiflorum* (Hook.) Britton & Rose var. *parisiense* (K. Schum.) Backeb., *Gymnocalycium schuetzianum* H. Till & Schatzl
Referencias: Till, H., 1993.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4243* (SI)].

Gymnocalycium mosseri anum Schütz, nom. inval. = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus kurtzianum* Gürke, *Echinocactus mostii* Gürke, *Gymnocalycium bicolor* Schütz, *Gymnocalycium inmemoratum* A. Cast. & Lelong, *Gymnocalycium kurtzianum* (Gürke) Britton & Rose, *Gymnocalycium mostii* (Gürke) Britton & Rose var. *kurtzianum* (Gürke) Backeb., *Gymnocalycium tobuschianum* Schick, *Gymnocalycium valnicekianum* Jajó, *Gymnocalycium valnicekianum* Jajó var. *polycentralis* Schütz
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995; Till, H. & Amerhauser, H., 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3366* (SI)].

Gymnocalycium mostii (Gürke) Britton & Rose var. *kurtzianum* (Gürke) Backeb. = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium mucidum Oehme
Sin.: *Gymnocalycium ferrarii* Rausch, *Gymnocalycium glaucum* F. Ritter
Referencias: Piltz, G., Metzing, D. & Schweitzer, B., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4339* (SI)].

Gymnocalycium multiflorum (Hook.) Britton & Rose = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Gymnocalycium multiflorum (Hook.) Britton & Rose var. *albispinum* K. Schum. = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Gymnocalycium multiflorum (Hook.) Britton & Rose var. *parisiense* (K. Schum.) Backeb. = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

[Gymnocalycium netrelianum (Labour.) Britton & Rose]
Sin.: *Echinocactus netrelianum* Labour.
Notas: Nombre dudoso.

Gymnocalycium neuhuberi H. Till & W. Till
Referencias: Till, H. & Till, W., 1992.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Neuhuber 88-77/179* (WU)].

Gymnocalycium neumannianum (Backeb.) Hutch. = **Weingartia neumanniana** (Backeb.) Werderm.

Gymnocalycium nidulans Fric ex Backeb.
= **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Gymnocalycium nigriareolatum Backeb.
= **Gymnocalycium hybopleurum** (K. Schum.) Backeb.

Gymnocalycium obductum Piltz = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium occultum Fric ex Schütz, nom. inval.
= **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. var. *altautinense* Papsch = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **vatteri** (Buining) Papsch

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. var. *cinereum* Backeb. = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. var. *polygonum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. var. *scoparium* H. Till & Neuhuber = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. var. *tenuispinum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. var. *variispinum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. subsp. *herbsthoferianum* H. Till & Neuhuber = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **ochoterenae**

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. subsp. **ochoterenae**
Sin.: *Gymnocalycium bodenbenderianum* (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill subsp. *intertextum* (Backeb. ex H. Till) H. Till, *Gymnocalycium intertextum* Backeb. ex H. Till, *Gymnocalycium kozelskyanum* Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium mosserianum* Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. subsp. *herbsthoferianum* H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *cinereum* Backeb., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *polygonum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *scoparium* H. Till & Neuhuber, *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *tenuispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *variispinum* Backeb., nom. inval.
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9070* (SI)].

Gymnocalycium ochoterenae Backeb. subsp. **vatteri** (Buining) Papsch
Sin.: *Gymnocalycium ochoterenae* Backeb. var. *altautinense* Papsch, *Gymnocalycium vatteri* Buining
Referencias: Papsch, W., 1993.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9068* (SI)].

Gymnocalycium oenanthemum Backeb.
Sin.: *Gymnocalycium carminanthum* Borth & Koop, *Gymnocalycium tillianum* Rausch
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hessling s.n.* (LIL)].

Gymnocalycium paediophilum F. Ritter, nom. illeg.
= **Gymnocalycium paediophilum** F. Ritter ex Schütz

Gymnocalycium paediophilum F. Ritter ex Schütz
Sin.: *Gymnocalycium paediophilum* F. Ritter, nom. illeg.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 21183* (CTES)].

Gymnocalycium papschii H. Till = **Gymnocalycium calochlorum** (Boed.) Y. Ito

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **fleischerianum** Meregalli, Metzing & R. Kiesling
Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *andersohnianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *heuschkelianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *meiklejohnianus* F. Haage, *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *andersohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *heuschelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *andersohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *anoplum* Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *heuschkelianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb. var. *meiklejohnianum* (F. Haage) Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium fleischerianum* Backeb., nom. inval.
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Metzing, D. 4* (SI)].

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Sin.: *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *anisitsii* Fric, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *bruennowianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *delaetianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *golzianus* Mundt, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *paraguayensis* F. Haage, nom. inval., *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *roseiflorus* K. Schum., *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *scheidelianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *wagnerianus* F. Haage, *Echinocactus denudatus* Link & Otto var. *wieditzianus* F. Haage, *Echinocactus paraguayensis* K. Schum. ex Chodat & Hassl., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *delaetianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *golzianum* (Mundt) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *paraguayense* F. Haage, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *roseiflorum* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *scheidelianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium denudatum* (Link & Otto) Pfeiff. ex Mittler var. *wieditzianum* (F. Haage) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *roseiflorum* (K. Schum.) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *scheidelianum* (F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wagnerianum* (F. Haage) Schütz, *Gymnocalycium paraguayense* (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wieditzianum* (F. Haage) Schütz
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6693* (G)].

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *roseiflorum* (K. Schum.) Schütz = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *scheidelianum* (F. Haage) Schütz = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wagnerianum* (F. Haage) Schütz = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium paraguayense (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus var. *wieditzianum* (F. Haage) Schütz = **Gymnocalycium paraguayense** (K. Schum. ex Chodat & Hassl.) Hosseus f. **paraguayense**
Referencias: Meregalli, M., Metzing, D., Kiesling, R., Tosatto, S. & Caramiello, R., 2002.

Gymnocalycium parvulum (Speg.) Speg.
Sin.: *Echinocactus parvulum* Speg., *Echinocactus platensis* Speg. var. *parvula* (Speg.) Speg., *Gymnocalycium berchtii* Neuhuber
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium pflanzii (Vaupel) Werderm. subsp. **argentinense** H. Till & W. Till
Sin.: *Gymnocalycium marquezii* Cárdenas var. *argentinense* Backeb., nom. inval.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Till, H. & Till, W., 1988.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 6472* (LIL)]; PRY[*Mereles, F. 6209* (FCQ)].

Gymnocalycium piltziorum Schütz = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium platense (Speg.) Britton & Rose = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **platense** (Speg.) R. Kiesling

Gymnocalycium platense (Speg.) Britton & Rose var. *ventanicola* (Speg.) R. Kiesling = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**

Gymnocalycium pugionacanthum Backeb. ex H. Till
Sin.: *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *belenense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *encispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *montanum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium catamarcense* H. Till & W. Till f. *schmidianum* H. Till & W. Till
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Doghertii s.n.* (LIL)].

Gymnocalycium pungens Fleischer = **Gymnocalycium schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus
Sin.: *Echinocactus platensis* Speg. var. *quehlianus* (F. Haage ex Quehl) Speg., *Echinocactus quehlianus* F. Haage ex Quehl, *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *minimum* Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *albispinus* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *flavispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *rolfianum* Schick, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *zantnerianum* Schick, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *flavispinum* Bozsing ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *kleinianum* Rausch ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. var. *zantnerianum* (Schick) H. Till & W. Till
Referencias: Metzing, D., Kiesling, R. & Meregali, M., 1999; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8711* (SI)].

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *albispinus* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *flavispinum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *rolfianum* Schick = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *stellatum* Dölz = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium quehlianum (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *zantnerianum* Schick = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium ragonesei A. Cast.
Referencias: Castellanos, A., 1950.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 16120* (LIL)].

[Gymnocalycium rauschii H. Till & W. Till]
Notas: Nombre dudoso.

Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiff. & Otto var. **platense** (Speg.) R. Kiesling
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *platensis* Speg., *Echinocactus platensis* Speg., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 1982d.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3356* (SI)].

Gymnocalycium reductum (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**
Sin.: *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *nobilis* Lem., *Echinocactus gibbosus* (Haw.) DC. var. *ventanicola* Speg., *Gymnocalycium gibbosum* (Haw.) Pfeiff. ex Mittler var. *nobile* (K. Schum.) Y. Ito, nom. inval., *Gymnocalycium platense* (Speg.) Britton & Rose var. *ventanicola* (Speg.) R. Kiesling, *Gymnocalycium schatzlianum* Strigl & W. Till
Referencias: Kiesling, R., 1982d.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. s.n.* (BA)].

[Gymnocalycium rhodantherum (Boed.) Backeb.]
Sin.: *Echinocactus rhodantherus* Boed.
Notas: Nombre dudoso.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till var. *guasayense* Strigl = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till var. *guthianum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till var. *mirandaense* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till var. *pipanacoense* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till var. *platygonum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till var. *sanjuanense* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till subsp. *kozelskyanum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till subsp. *paucispinum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium riojense Fric ex H. Till & W. Till subsp. *piltziorum* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium ritterianum Rausch
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 126* (ZSS)].

Gymnocalycium robustum R. Kiesling, O. Ferrari & Metzing
Referencias: Kiesling, R., Ferrari, O. & Metzing, D., 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9883* (SI)].

[Gymnocalycium rosae H. Till]
Notas: Nombre dudoso.

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.
Sin.: *Brachycalycium tilcarense* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose subsp. *tilcarense* (Backeb.) H. Till & W. Till, nom. illeg., *Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose var. *tilcarense* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium tilcarensis* Backeb.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose var. **saglionis**
Sin.: *Echinocactus saglionis* Cels
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose var. *tilcarense* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose subsp. *tilcarense* (Backeb.) H. Till & W. Till, nom. illeg. = **Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.

Gymnocalycium sanguiniflorum (Werderm.) Werderm. = **Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg.

Gymnocalycium schatzlianum Strigl & W. Till = **Gymnocalycium reductum** (Link) Pfeiff. & Otto var. **reductum**

Gymnocalycium schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **delaetii** (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus delaetii* K. Schum., *Gymnocalycium delaetii* (K. Schum.) Hosseus
Referencias: Backeberg, C., 1959b; Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **schickendantzii**
Sin.: *Echinocactus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Gymnocalycium antherostele* F. Ritter, *Gymnocalycium michoga* Fric ex Y. Ito, *Gymnocalycium pungens* Fleischer
Referencias: Meregalli, M., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. **bayense** R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1987.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4324* (SI)].

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. **boessii** R. Kiesling, Marchesi & O. Ferrari
Sin.: *Gymnocalycium erolesii* Neuhuber & C.A.L. Bercht
Referencias: Kiesling, R., Marchesi, E. & Ferrari, O., 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 10020* (SI)].

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. **paucicostatum** R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1987, 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 21678* (SI)].

Gymnocalycium schroederianum Osten subsp. **schroederianum**
Referencias: Kiesling, R., 1987, 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Doello Jurado, M. 11933* (BA)]; URY[*Osten, C. 16873* (BA, MVM)].

Gymnocalycium schuetzianum H. Till & Schatzl = **Gymnocalycium monvillei** (Lem.) Britton & Rose subsp. **monvillei**

Gymnocalycium sigelianum (Schick) Hosseus = **Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus

Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus loricatus* Speg., nom. illeg., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *major* Backeb., *Gymnocalycium spegazzinii* Britton & Rose var. *punillense* H. Till & W. Till
Referencias: Kiesling, R. & Metzing, D., 1996.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 12607* (LIL)].

Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose var. *bayrianum* (H. Till) Halda = **Gymnocalycium bayrianum** H. Till

Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose var. *major* Backeb. = **Gymnocalycium spegazzinii** Britton & Rose

Gymnocalycium spegazzinii Britton & Rose var. *punillense* H. Till & W. Till = **Gymnocalycium spegazzinii** Britton & Rose

Gymnocalycium stellatum Speg.
Sin.: *Echinocactus bodenbenderianus* Hosseus ex A. Berger, *Echinocactus stellatus* Speg., hom. illeg., *Gymnocalycium asterium* A. Cast. var. *paucispinum* Backeb., nom. inval., *Gymnocalycium asterium* A. Cast., nom. illeg., *Gymnocalycium bodenbenderianum* (Hosseus ex A. Berger) A. W. Hill, *Gymnocalycium obductum* Piltz, *Gymnocalycium occultum* Fric ex Schütz, nom. inval., *Gymnocalycium piltziorum* Schütz, *Gymnocalycium quehlianum* (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus var. *stellatum* Dölz, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *kozelskyanum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *paucispinum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till subsp. *piltziorum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guasayense* Strigl, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *guthianum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *mirandaense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *pipanacoense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *platygonum* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium riojense* Fric ex H. Till & W. Till var. *sanjuanense* H. Till & W. Till, *Gymnocalycium stellatum* Speg. subsp. *occultum* Fric ex H. Till & W. Till, *Gymnocalycium triacanthum* Backeb., nom. inval.
Referencias: Meregalli, M., 1985; Metzing, D., Meregalli, M. & Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 13229* (BA)].

Gymnocalycium stellatum Speg. var. *flavispinum* Bozsing ex H. Till & W. Till = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium stellatum Speg. var. *kleinianum* Rausch ex H. Till & W. Till = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium stellatum Speg. var. *zantnerianum* (Schick) H. Till & W. Till = **Gymnocalycium quehlianum** (F. Haage ex Quehl) Vaupel ex Hosseus

Gymnocalycium stellatum Speg. subsp. *occultum* Fric ex H. Till & W. Till = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium stenopleurum F. Ritter
Sin.: *Gymnocalycium friedrichii* (Werderm.) Pazout, nom. inval., *Gymnocalycium mihanovichii* (Fric ex Gürke) Britton & Rose var. *friedrichii* Werderm.
Referencias: Metzing, D., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 21070* (CTES)].

Gymnocalycium striglianum Rausch = **Gymnocalycium gibbosum** (Haw.) Pfeiff. ex Mittler

Gymnocalycium stuckertii (Speg.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus stuckertii* Speg.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1922.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4310* (SI)].

Gymnocalycium sutterianum (Schick) Hosseus = **Gymnocalycium capillense** (Schick) Hosseus

Gymnocalycium taningaense Piltz
Sin.: *Gymnocalycium gaponi* Neuhuber
Referencias: Piltz, G., 1990.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Piltz, G. 212* (KOELN)].

Gymnocalycium tilcarensis Backeb. = **Gymnocalycium saglionis** (Cels) Britton & Rose var. **jujuyense** Backeb.

Gymnocalycium tillianum Rausch = **Gymnocalycium oenanthemum** Backeb.

Gymnocalycium tobuschianum Schick = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium triacanthum Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium stellatum** Speg.

Gymnocalycium tudae Y. Ito = **Gymnocalycium megatae** Y. Ito

Gymnocalycium uebelmannianum Rausch
Referencias: Meregalli, M., 1985; Rausch, W., 1972.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(LRI).

Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. s.n.* (SI)].

Gymnocalycium uruguayense (Arechav.) Britton & Rose
Sin.: *Echinocactus guerkeanum* Heese, *Echinocactus uruguayense* Arechav., *Gymnocalycium artigas* Herter, *Gymnocalycium guerkeanum* (Heese) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zanin, A. 66* (SI)]; URY[*Osten, C. 15726* (*)].

Gymnocalycium valnicekianum Jajó = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium valnicekianum Jajó var. *polycentralis* Schütz = **Gymnocalycium mostii** (Gürke) Britton & Rose

Gymnocalycium vatteri Buining = **Gymnocalycium ochoterenae** Backeb. subsp. **vatteri** (Buining) Papsch

Gymnocalycium venturianum Fric ex Backeb. = **Gymnocalycium baldianum** (Speg.) Speg.

Gymnocalycium weissianum Backeb. = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Gymnocalycium weissianum Backeb. var. *atroroseum* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Gymnocalycium weissianum Backeb. var. *cinerascens* Backeb., nom. inval. = **Gymnocalycium mazanense** (Backeb.) Backeb.

Haageocereus Backeb.

Número de especies: 2, 1 endémica

Haageocereus australis Backeb.
Sin.: *Haageocereus australis* Backeb. f. *subtilispinus* F. Ritter, *Haageocereus multicolorispinus* Buining
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 126* (ZSS)].

Haageocereus australis Backeb. f. *subtilispinus* F. Ritter = **Haageocereus australis** Backeb.

Haageocereus fascicularis (Meyen) F. Ritter
Sin.: *Cereus fascicularis* Meyen, *Trichocereus fascicularis* (Meyen) Britton & Rose, *Weberbauerocereus fascicularis* (Meyen) Backeb.
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Arbusto suculento. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2804* (CONC)].

Haageocereus multicolorispinus Buining = **Haageocereus australis** Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Harrisia Britton

Número de especies: 5, 2 endémicas

Harrisia balansae (K. Schum.) N.P. Taylor = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Harrisia bonplandii auct. non (Pfeiff.) Britton & Rose = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Harrisia bonplandii (Pfeiff.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus balansae* K. Schum., *Cereus bonplandii* Pfeiff., *Cereus guelichii* Speg., *Eriocereus bonplandii* (Pfeiff.) Riccob., *Eriocereus guelichii* (Speg.) A. Berger, *Harrisia balansae* (K. Schum.) N.P. Taylor, *Harrisia guelichii* (Speg.) Britton & Rose, *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *bonplandii* (Pfeiff.) Braun & E. Pereira
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Kiesling, R., 1996a; Leuenberger, B. E., 2001a.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2228* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 10043* (MO, SI)].

Harrisia guelichii (Speg.) Britton & Rose = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Harrisia hahniana (Backeb.) Kimnach & Hutchison ex Kimnach
Sin.: *Echinopsis hahniana* (Backeb.) R.S. Wallace, *Mediocactus hahnianus* Backeb.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 8499* (MO, US)].

Harrisia martinii (Labour.) Britton
Sin.: *Cereus martinii* Labour., *Eriocereus martinii* (Labour.) Riccob.
Referencias: Kiesling, R., 1996a, 2005; Leuenberger, B. E., 2000b; Scarpa, G. F. & Arenas, P., 2002.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); PRY(CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5069* (CTES, SI)]; PRY[*Hassler, E. 7388* (G)].

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *bonplandii* (Pfeiff.) Braun & E. Pereira = **Harrisia bonplandii** (Pfeiff.) Britton & Rose

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**
Sin.: *Cereus pomanensis* F.A.C. Weber ex K. Schum., *Eriocereus polyacanthus* F. Ritter, *Eriocereus pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) A. Berger, *Eriocereus tarijensis* F. Ritter, *Harrisia bonplandii* auct. non (Pfeiff.) Britton & Rose, *Harrisia pomanensis* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *tarijensis* (F. Ritter) Braun & E. Pereira
Referencias: Kiesling, R., 1996a; Leuenberger, B. E., 2001a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1366* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2743* (G)].

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **regelii** (Weing.) R. Kiesling
Sin.: *Cereus regelii* Weing., *Eriocereus regelii* (Weing.) Backeb., *Harrisia regelii* (Weing.) Borg
Referencias: Kiesling, R., 1996a, 2005; Leuenberger, B. E., 2000a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, SFE); URY(ART, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1688* (SI)]; URY[*Osten, C. 16720* (MVM)].

Harrisia pomanensis (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. *tarijensis* (F. Ritter) Braun & E. Pereira = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **pomanensis**

Harrisia regelii (Weing.) Borg = **Harrisia pomanensis** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Britton & Rose subsp. **regelii** (Weing.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Harrisia tortuosa (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus tortuosus* Forbes ex Otto & D. Dietr., *Eriocereus tortuosus* (Forbes ex Otto & D. Dietr.) Riccob.
Referencias: Kiesling, R., 1996a, 2005.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); PRY(APY, COA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1412* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 19789* (MO)].

Hatiora Britton & Rose

Número de especies: 3

Hatiora clavata (F.A.C. Weber) Moran = **Rhipsalis clavata** F.A.C. Weber
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Hatiora clavata (F.A.C. Weber) Moran var. *delicatula* (Loefgr.) A. Cast. = **Rhipsalis clavata** F.A.C. Weber

Hatiora gaertneri (Regel) Barthlott
Sin.: *Rhipsalidopsis gaertneri* (Regel) Moran
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1157* (HBR)].

Hatiora prismatica Lem. = **Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **prismatica** (Lem.) Barthlott & N.P. Taylor

Hatiora rosea (Lagerh.) Barthlott
Sin.: *Rhipsalidopsis rosea* (Lagerh.) Britton & Rose, *Rhipsalis rosea* Lagerh.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10402* (HBR)].

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose
Sin.: *Rhipsalis salicornioides* Haw.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 1995* (MBM)].

Helianthocereus atacamensis (Phil.) Backeb. = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Helianthocereus crassicaulis Backeb., nom. inval. = **Lobivia crassicaulis** Backeb. ex R. Kiesling

Helianthocereus grandiflorus (Britton & Rose) Backeb. = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Helianthocereus huascha (F.A.C. Weber) Backeb. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Helianthocereus huascha (F.A.C. Weber) Backeb. var. *auricolor* (Backeb.) Backeb. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Helianthocereus huascha (F.A.C. Weber) Backeb. var. *macranthus* Backeb. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Helianthocereus huascha (F.A.C. Weber) Backeb. var. *roseiflorus* (Y. Ito) Backeb. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Helianthocereus huascha (F.A.C. Weber) Backeb. var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb. = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Helianthocereus hyalacanthus (Speg.) Backeb. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Helianthocereus pasacana (F.A.C. Weber) Backeb. = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Helianthocereus pecheretianus Backeb., nom. inval. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **pecheretianus** Backeb. ex R. Kiesling

Helianthocereus pecheretianus Backeb. var. *viridior* Backeb. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **pecheretianus** Backeb. ex R. Kiesling

Helianthocereus poco (Backeb.) Backeb. = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Helianthocereus poco (Backeb.) Backeb. var. *albiflorus* Cárdenas = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Helianthocereus poco (Backeb.) Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb. = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Helianthocereus pseudocandicans Backeb., nom. inval. = **Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling

Helianthocereus pseudocandicans Backeb. var. *flaviflorus* (Backeb.) Backeb., nom. illeg. = **Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling

Helianthocereus pseudocandicans Backeb. var. *roseoflorus* (Backeb.) Backeb., nom. illeg. = **Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling

Helianthocereus tarijensis (Vaupel) Backeb. = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Horridocactus aconcaguensis (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Horridocactus atroviridis (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Horridocactus carrizalensis (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Horridocactus choapensis (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Horridocactus crispus (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus crispus** F. Ritter

Horridocactus curvispinus (Bertero ex Colla) Backeb. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Horridocactus engleri F. Ritter = **Pyrrhocactus engleri** (F. Ritter) F. Ritter

Horridocactus eriosyzoides F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Horridocactus garaventai F. Ritter = **Pyrrhocactus garaventai** (F. Ritter) F. Ritter

Horridocactus paucicostatus F. Ritter = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) R. Bauer = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Hymenorebutia albolanata Buining = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter var. *callochrysea* F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter var. *catamarcensis* F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter var. *cylindrica* (Backeb.) F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter var. *depressicostata* F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Hymenorebutia aurea (Britton & Rose) F. Ritter var. *lariojensis* F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Hymenorebutia chlorogona (Wessner) F. Ritter = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Hymenorebutia chrysantha (Werderm.) F. Ritter = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Hymenorebutia densispina (Werderm.) Buining = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Hymenorebutia drijveriana (Backeb.) F. Ritter = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Hymenorebutia kuehnrichii (Fric) F. Ritter = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Hymenorebutia pectinifera (Wessner) Donald = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Hymenorebutia quinesensis (Rausch) F. Ritter = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Hymenorebutia rebutioides Fric & Kreuz. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Islaya Backeb.

Número de especies: 4, 3 endémicas

Islaya caligophila (R. Pinto) Faúndez
Sin.: *Eriosyce caligophila* R. Pinto
Referencias: Pinto, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 600–700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pinto, R. 157665* (CONC)].

Islaya iquiquensis (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling
Sin.: *Eriosyce iquiquensis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt. subsp. *iquiquensis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia iquiquensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria aricensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria iquiquensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria residua* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus aricensis* (F. Ritter) Backeb., *Pyrrhocactus floribundus* (Backeb.) F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus residuus* F. Ritter & Buining, *Pyrrhocactus saxifragus* F. Ritter
Referencias: Muñoz-Schick, M., Pinto, R. & Mesa, A., 2001.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 600–1000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 201* (ZSS)].

Islaya islayensis (C.F. Först.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus islayensis* C.F. Först., *Eriosyce islayensis* (C.F. Först.) Katt., *Islaya krainziana* F. Ritter, *Neoporteria krainziana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Perenne. Nativa.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 200* (ZSS)].

Islaya krainziana F. Ritter = **Islaya islayensis** (C.F. Först.) Backeb.

Islaya laui (Luthy) Faúndez
Sin.: *Eriosyce laui* Luthy, *Rimacactus laui* (Luthy) Mottram
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–700 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lau, A. B. 1541* (ZSS)].

Lepismium aculeatum (F.A.C. Weber) Barthlott = **Rhipsalis aculeata** F.A.C. Weber
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Lepismium cavernosum Lindb. = **Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Lepismium cruciformis (Vell.) Miq. = **Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Lepismium dissimilis G. Lindb. = **Rhipsalis dissimilis** (G. Lindb.) K. Schum. f. **dissimilis**
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Lepismium epiphyllanthoides Backeb. = **Rhipsalis dissimilis** (G. Lindb.) K. Schum. f. **epiphyllanthoides** (Backeb.) Barthlott & N.P. Taylor
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.

Lepismium gibberulum (F.A.C. Weber) Backeb. = **Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott = **Rhipsalis houlletiana** Lem.

Lepismium ianthothele (Monv.) Barthlott = **Pfeiffera ianthothele** (Monv.) F.A.C. Weber

Lepismium linearis (K. Schum.) Barthlott = **Rhipsalis warmingiana** K. Schum.

Lepismium lorentzianum (Griseb.) Barthlott = **Rhipsalis lorentziana** Griseb.

Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott = **Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott f. *aculeatum* Barthlott & N.P. Taylor = **Rhipsalis aculeata** F.A.C. Weber
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Lepismium monacanthum (Griseb.) Barthlott = **Rhipsalis monacantha** Griseb.

Lepismium paradoxum Salm-Dyck ex Pfeiff. = **Rhipsalis paradoxa** (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Lepismium puniceo-discus (G. Lindb.) Backeb. = **Rhipsalis puniceo-discus** G. Lindb.
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Lepismium trigonum (Pfeiff.) Backeb. = **Rhipsalis trigona** Pfeiff.
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Lepismium tucumanensis (F.A.C. Weber) Backeb.
= **Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **tucumanensis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor

Lepismium warmingianum (K. Schum.) Barthlott
= **Rhipsalis warmingiana** K. Schum.

Lobivia Britton & Rose

Número de especies: 24, 20 endémicas

Lobivia albolanata (Buining) Krainz = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia amblayensis Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Lobivia amblayensis Rausch var. *albispina* Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **amblayensis** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley

Lobivia andalgalensis (F.A.C. Weber) Britton & Rose = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Lobivia auranitida Wessner = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *albiflora* Rausch = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **albiflora** (Rausch) J. Ullmann

Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *grandiflora* Backeb., nom. inval. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *robustior* Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *sierragrandensis* Rausch = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *tortuosa* Rausch = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Lobivia breviflora Backeb. = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Lobivia bruchii Britton & Rose
Sin.: *Echinopsis bruchii* (Britton & Rose) A. Cast. & Lelong, *Echinopsis grandis* (Britton & Rose) Friedrich, *Eriosyce bruchii* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *bruchii* (Britton & Rose) Rausch, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *grandis* (Britton & Rose) Rausch, *Lobivia grandis* Britton & Rose, *Pseudolobivia grandis* (Britton & Rose) Krainz, *Soehrensia bruchii* (Britton & Rose) Backeb., *Soehrensia grandis* (Britton & Rose) Backeb., *Trichocereus bruchii* (Britton & Rose) F. Ritter, *Trichocereus bruchii* (Britton & Rose) F. Ritter var. *brevispinus* F. Ritter, *Trichocereus grandis* (Britton & Rose) F. Ritter
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920.
Subarbusto suculento. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1300* (SI)].

Lobivia bruchii Britton & Rose var. *nivalis* (Fric) Rausch = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Lobivia buiningiana F. Ritter = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia cachensis (Speg.) Britton & Rose = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia chionantha (Speg.) Britton & Rose = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia chlorogona Wessner = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia chorrillosensis Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**
Sin.: *Echinopsis chrysantha* Werderm., *Echinopsis hossei* Werderm., *Hymenorebutia chrysantha* (Werderm.) F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *janseniana* Backeb., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. var. *leucantha* (Backeb.) Backeb., *Lobivia dragai* Fric, *Lobivia hanseniana* Backeb., *Lobivia hossei* (Werderm.) Backeb., *Lobivia janseniana* Backeb., *Lobivia klusacekii* Fric, *Lobivia polaskiana* Backeb., *Lobivia schuldtii* Fric, *Lobivia staffenii* Fric
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta variedad.

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. *hossei* (Werderm.) Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. **hypocyrta** Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 161* (W)].

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. *janseniana* Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. var. *leucantha* (Backeb.) Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. subsp. *jajoiana* (Backeb.) G.D. Rowley = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia chrysantha (Werderm.) Backeb. subsp. *marsoneri* (Werderm.) G.D. Rowley = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia chrysochete (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**
Sin.: *Echinopsis chrysochete* Werderm., *Lobivia chrysochete* (Werderm.) Wessner var. *markusii* (Rausch) Rausch, *Lobivia chrysochete* (Werderm.) Wessner var. *subtilis* Rausch, *Lobivia hystrix* F. Ritter, *Lobivia markusi* Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8925* (SI)].

Lobivia chrysochete (Werderm.) Wessner var. *markusii* (Rausch) Rausch = **Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**

Lobivia chrysochete (Werderm.) Wessner var. **minutiflora** Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 512* (ZSS)].

Lobivia chrysochete (Werderm.) Wessner var. *subtilis* Rausch = **Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**

Lobivia columnaris Wessner = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia conoidea Wessner = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia crassicaulis Backeb. ex R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis crassicaulis* (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus crassicaulis* Backeb., nom. inval., *Trichocereus catamarcensis* F. Ritter, nom. inval.
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1505* (SI)].

Lobivia cylindracea Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia cylindrica Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia densispina (Werderm.) Buining
Sin.: *Echinopsis densispina* Werderm., *Echinopsis densispina* Werderm. var. *pectinifera* (Wessner) J.G. Lamb., *Echinopsis rebutioides* (Backeb.) Friedrich, *Hymenorebutia albolanata* Buining, *Hymenorebutia chlorogona* (Wessner) F. Ritter, *Hymenorebutia densispina* (Werderm.) Buining, *Hymenorebutia pectinifera* (Wessner) Donald, *Hymenorebutia rebutioides* Fric & Kreuz., *Lobivia albolanata* (Buining) Krainz, *Lobivia chlorogona* Wessner, *Lobivia densispina* (Werderm.) Buining var. *blossfeldii* Wessner, *Lobivia densispina* (Werderm.) Buining var. *sanguinea* Wessner, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *densispina* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *densispina* (Werderm.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *rebutioides* (Backeb.) Rausch, *Lobivia napina* Pazout, *Lobivia pectinifera* Wessner, *Lobivia rebutioides* Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb. var. *citriniflora* Backeb., *Lobivia rebutioides* Backeb. var. *krausiana* Backeb., *Lobivia scoparia* Werderm., *Lobivia sublimiflora* Backeb., *Lobivia wessneriana* Fritzen, *Salpingolobivia densispina* (Werderm.) Y. Ito
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8911* (SI)].

Lobivia densispina (Werderm.) Buining var. *blossfeldii* Wessner = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia densispina (Werderm.) Buining var. *sanguinea* Wessner = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia digitiformis Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia dobeana Dölz = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **dobeana** (Dölz) J. Ullmann

Lobivia dragai Fric = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia drijveriana Backeb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia drijveriana Backeb. var. *astranthema* Backeb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia drijveriana Backeb. var. *aurantiaca* Backeb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia drijveriana Backeb. var. *nobilis* Backeb.
= **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

[Lobivia ducis-paulii Fric]
Notas: Nombre dudoso.

Lobivia duursmaiana Backeb. = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Lobivia einsteinii (Fric) Rausch
Sin.: *Cylindrorebutia einsteinii* (Fric) Donald, *Lobivia auranitida* Wessner, *Lobivia columnaris* Wessner, *Lobivia conoidea* Wessner, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *atrospinosa* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *aureiflora* Rausch, *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *elegans* (Backeb.) Rausch, *Lobivia schniedcheniana* J. Köhler, *Mediolobivia auranitida* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia auranitida* (Wessner) Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Mediolobivia aureiflora* Backeb., *Mediolobivia boedekeriana* Backeb., *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz, *Mediolobivia conoidea* (Wessner) Krainz var. *columnaris* (Wessner) Backeb., *Mediolobivia duursmaiana* Backeb., *Mediolobivia elegans* Backeb., *Mediolobivia rubelliflora* Backeb., *Mediolobivia rubriflora* Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz, *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *einsteinii* (Fric) Backeb., nom. illeg., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *karreri* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *rubriviridis* (Fric) Backeb., *Mediolobivia schmiedcheniana* (U. Köhler) Krainz var. *steineckei* (Fric) Backeb., *Rebulobivia einsteinii* (Fric) Kreuz., *Rebulobivia nicolai* Fric & Kreuz., *Rebulobivia rubriviride* Fric & Kreuz., *Rebutia aureiflora* Backeb., *Rebutia blossfeldii* Werderm., *Rebutia einsteinii* Fric, *Rebutia einsteinii* Fric var. *atrospinosa* (Rausch) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric var. *karrei* (Fric ex Backeb.) Sida, *Rebutia einsteinii* Fric var. *rubroviridis* (Backeb.) Buining & Donald, *Rebutia sarothroides* Werderm., *Rebutia schmiedcheniana* (U. Köhler) W.T. Marshall
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8234* (SI)].

Lobivia einsteinii (Fric) Rausch var. *atrospinosa* Rausch
= **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia einsteinii (Fric) Rausch var. *aureiflora* Rausch
= **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia einsteinii (Fric) Rausch var. *elegans* (Backeb.) Rausch = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia einsteinii (Fric) Rausch var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald = **Lobivia gonjianii** (R. Kiesling) R. Kiesling

Lobivia elongata Backeb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Lobivia emmae Backeb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia emmae Backeb. var. *brevispina* Backeb.
= **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia euanthema Backeb.
Sin.: *Digitorebutia euanthema* (Backeb.) Buining, *Lobivia euanthema* Backeb. var. *tilcarensis* Rausch, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz, *Mediolobivia euanthema* (Backeb.) Krainz var. *oculata* (Werderm.) Krainz, *Rebutia oculata* Werderm., *Rebutia pilifera* Fric
Referencias: Rausch, W., 1985.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 700* (ZSS)].

Lobivia euanthema Backeb. var. *tilcarensis* Rausch
= **Lobivia euanthema** Backeb.

Lobivia fallax Oehme = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann
Referencias:

Lobivia fallax Oehme subsp. *aurea* (Britton & Rose) Herz, nom. illeg. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**
Sin.: *Chileorebutia reichei* Kreuz., nom. nud., *Echinocactus famatinensis* Speg., *Echinopsis famatinensis* (Speg.) Werderm., *Lobivia famatimensis* (Speg.) Britton & Rose var. *jachalensis* Rausch, *Rebutia famatinensis* (Speg.) Speg., *Reicheocactus pseudoreichianus* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton & Rose var. *jachalensis* Rausch = **Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Lobivia famatimensis (Speg.) Britton & Rose var. **sanjuanensis** Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch, W. 557* (ZSS)].

Lobivia ferox Britton & Rose = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. *bruchii* (Britton & Rose) Rausch = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**
Sin.: *Acanthocalycium formosum* (Pfeiff.) Backeb., *Acanthocalycium oreopepon* (Speg.) Backeb., *Echinocactus formosus* Pfeiff., *Echinopsis formosa* (Pfeiff.) Jacobi ex Salm-Dyck, *Echinopsis ingens* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis oreopepon* (Speg.) Werderm., *Echinopsis uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) A.E. Hoffm., nom. inval., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) Rausch, *Lobivia oreopepon* Speg., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb. var. *maxima* Backeb., *Soehrensia formosa* (Pfeiff.) Backeb. var. *polycephala* Backeb., *Soehrensia ingens* Backeb., *Soehrensia oreopepon* (Speg.) Backeb., *Soehrensia uebelmanniana* Lembcke & Backeb., nom. inval., *Trichocereus formosus* (Pfeiff.) F. Ritter, *Trichocereus ingens* (Backeb.) F. Ritter, *Trichocereus uebelmannianus* (Lembcke & Backeb.) F. Ritter
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1922; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4022* (SI)]; CHL[*Eggli, U. 2727* (CONC)].

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. *grandis* (Britton & Rose) Rausch = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. *kieslingii* (Rausch) Rausch = **Lobivia kieslingii** Rausch

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. *nivalis* (Fric) Rausch = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. **rosarioana** (Rausch) Rausch
Sin.: *Lobivia rosarioana* Rausch
Referencias: Rausch, W., 1985.
Subarbusto suculento. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 129* (ZSS)].

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds var. *uebelmanniana* (Lembcke & Backeb.) Rausch = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Lobivia formosa (Pfeiff.) Dodds subsp. *tarijensis* (Vaupel) Rausch = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Lobivia glauca Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **paucicostata** (Rausch) Rausch

Lobivia glauca Rausch var. *paucicostata* Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **paucicostata** (Rausch) Rausch

Lobivia gonjianii (R. Kiesling) R. Kiesling
Sin.: *Lobivia einsteinii* (Fric) Rausch var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald, *Rebutia einsteinii* Fric var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald, *Rebutia fleischreiana* Slaba, *Rebutia gonjianii* R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1973.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gonjian 2* (LP)].

Lobivia grandiflora Britton & Rose = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Lobivia grandiflora Britton & Rose var. *lobivioides* (F. Ritter) Rausch = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Lobivia grandiflora Britton & Rose var. *longispina* Rausch = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Lobivia grandis Britton & Rose = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Lobivia graulichii Fric = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Lobivia gregeri Kreuz. = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia haageana Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haageana Backeb. var. *albihepatica* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haageana Backeb. var. *bicolor* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haageana Backeb. var. *chrysantha* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haageana Backeb. var. *croceantha* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haageana Backeb. var. *durispina* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haageana Backeb. var. *grandiflora-stellata* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia haagei (Fric & Schelle) Wessner = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia haagei (Fric & Schelle) Wessner var. *elegantula* Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia haagei (Fric & Schelle) Wessner var. *mazaroensis* Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia haagei (Fric & Schelle) Wessner var. *mudanensis* (Rausch) Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia haagei (Fric & Schelle) Wessner var. *pelzliana* Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **amblayensis** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley
Sin.: *Lobivia amblayensis* Rausch var. *albispina* Rausch
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch, W. 19* (W)].

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *chorrillosensis* (Rausch) G.D. Rowley = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *densispina* (Werderm.) Rausch = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *elongata* (Backeb.) Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley
Sin.: *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *hualfimensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia hualfinensis* Rausch, *Lobivia hualfinensis* Rausch var. *fechseri* Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch, W. 230* (W)].

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**
Sin.: *Echinocactus haematanthus* Speg., *Echinopsis amblayensis* (Rausch) Friedrich, *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt, *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *elongata* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *hualfinensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *jasimanensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis hualfinensis* (Rausch) Friedrich & Glaetzle, *Lobivia amblayensis* Rausch, *Lobivia elongata* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *elongata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *jasimanensis* Rausch, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *viridis* Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 230* (W)].

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *hualfimensis* (Rausch) Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *jasimanensis* Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch
Sin.: *Echinopsis cachensis* Speg., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *chorrillosensis* (Rausch) J.G. Lamb., *Echinopsis haematantha* (Speg.) D.R. Hunt var. *kuehnrichii* (Fric) J.G. Lamb., *Echinopsis kuehnrichii* (Fric) Friedrich & Glaetzle, *Hymenorebutia drijveriana* (Backeb.) F. Ritter, *Hymenorebutia kuehnrichii* (Fric) F. Ritter, *Lobivia cachensis* (Speg.) Britton & Rose, *Lobivia chorrillosensis* Rausch, *Lobivia drijveriana* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *astranthema* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *aurantiaca* Backeb., *Lobivia drijveriana* Backeb. var. *nobilis* Backeb., *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose subsp. *kuehnrichii* (Fric) G.D. Rowley, *Lobivia haematantha* (Speg.) Britton & Rose var. *chorrillosensis* (Rausch) G.D. Rowley, *Lobivia kuehnrichii* Fric, *Lobivia nigrispina* Backeb., *Lobivia nigrispina* Backeb. var. *rubiflora* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 157* (W)].

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *rebutioides* (Backeb.) Rausch = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose var. *viridis* Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **haematantha**

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose subsp. *densispina* (Werderm.) G.D. Rowley = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia haematantha (Speg.) Britton & Rose subsp. *kuehnrichii* (Fric) G.D. Rowley = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia hanseniana Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia hastisfera Werderm. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Lobivia horrida F. Ritter = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Lobivia hossei (Werderm.) Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia hualfinensis Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley

Lobivia hualfinensis Rausch var. *fechseri* Rausch = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **fechseri** (Rausch) Rausch ex G.D. Rowley

Lobivia huascha (F.A.C. Weber) Marshall = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Lobivia huascha (F.A.C. Weber) Marshall var. *andalgalensis* (F.A.C. Weber) Rausch = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Lobivia huascha (F.A.C. Weber) W.T. Marshall var. *walteri* (R. Kiesling) Rausch = **Lobivia walteri** R. Kiesling

Lobivia hyalacantha Speg. = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Lobivia hystrix F. Ritter = **Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**

Lobivia iridescens Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **iridescens** (Backeb.) Rausch

Lobivia jajoiana Backeb. var. *aurata* Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. *carminantha* Wessner = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. *caspalensis* Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. *elegans* Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. *fleischeriana* Backeb. = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. **jajoiana**
Sin.: *Lobivia buiningiana* F. Ritter, *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *jajoiana* (Backeb.) G.D. Rowley, *Lobivia gregeri* Kreuz., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *aurata* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *carminantha* Wessner, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *caspalensis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *elegans* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *fleischeriana* Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nidularis* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *nigrostoma* (Kreuz. & Buining) Backeb., *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *pungens* Rausch, *Lobivia jajoiana* Backeb. var. *splendens* Wessner, *Lobivia nigrostoma* Kreuz. & Buining, *Lobivia vatteri* Krainz, *Lobivia vatteri* Krainz var. *robusta* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8915* (SI)].

Lobivia jajoiana Backeb. var. *nidularis* Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. *nigrostoma* (Kreuz. & Buining) Backeb. = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. **paucicostata** (Rausch) Rausch
Sin.: *Lobivia glauca* Rausch, *Lobivia glauca* Rausch var. *paucicostata* Rausch, *Lobivia minatinigra* F. Ritter
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 217* (W)].

Lobivia jajoiana Backeb. var. *pungens* Rausch = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia jajoiana Backeb. var. *splendens* Wessner = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia janseniana Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia kieslingii Rausch
Sin.: *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *kieslingii* (Rausch) Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch, W. 573* (ZSS)].

Lobivia klimpeliana (Weid. & Werderm.) A. Berger = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Lobivia klusacekii Fric = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia korethroides (Werderm.) Werderm.
Sin.: *Echinopsis dulci-pauli* (Fric) Kraenzl., hom. illeg., *Echinopsis korethroides* Werderm., *Eriosyce korethtoides* (Wessner) Backeb., *Lobivia bruchii* Britton & Rose var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds var. *nivalis* (Fric) Rausch, *Soehrensia korethroides* (Werderm.) Backeb., *Trichocereus korethroides* (Werderm.) F. Ritter
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Subarbusto suculento. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vattuone, I. C. 200* (LIL)].

Lobivia kuehnrichii Fric = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia leucomalla Wessner = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia longispina Britton & Rose
Sin.: *Echinopsis ferox* (Britton & Rose) Backeb., *Echinopsis lecoriensis* Cárdenas, *Echinopsis longispina* (Britton & Rose) Backeb., *Echinopsis nigra* Backeb., *Furiolobivia dulcis-pauli* (Fric) Y. Ito, nom. illeg., *Furiolobivia ferox* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia longispina* (Britton & Rose) Y. Ito, *Furiolobivia nigra* (Backeb.) Y. Ito, *Lobivia ferox* Britton & Rose, *Lobivia hastisfera* Werderm., *Lobivia horrida* F. Ritter, *Lobivia pictiflora* F. Ritter, *Lobivia varispina* F. Ritter, *Pseudolobivia dulcis-pauli* (Fric) Krainz, hom. illeg., *Pseudolobivia ferox* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb., *Pseudolobivia longispina* (Britton & Rose) Backeb. var. *nigra* (Backeb.) Backeb., *Pseudolobivia nigra* (Backeb.) Backeb.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920; Pinto Bahamonde, R., 2002.
Subarbusto suculento. Nativa. 2000–3800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8725* (SI)]; CHL[*Pinto Bahamonde, R. 155293* (CONC)].

Lobivia markusi Rausch = **Lobivia chrysochete** (Werderm.) Wessner var. **chrysochete**

Lobivia marsoneri (Werderm.) Backeb. var. **iridescens** (Backeb.) Rausch
Sin.: *Lobivia iridescens* Backeb., *Lobivia muhriae* Backeb., *Lobivia muhriae* Backeb. var. *flaviflora* Backeb., *Lobivia uitewaaleana* Buining
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta variedad.

Lobivia marsoneri (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**
Sin.: *Echinopsis marsoneri* Werderm., *Lobivia chrysantha* (Werderm.) Backeb. subsp. *marsoneri* (Werderm.) G.D. Rowley, *Lobivia haageana* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *albihepatica* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *bicolor* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *chrysantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *croceantha* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *durispina* Backeb., *Lobivia haageana* Backeb. var. *grandiflora-stellata* Backeb., *Lobivia rubescens* Backeb., *Lobivia rubescens* Backeb. var. *tenuispina* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta variedad.

Lobivia minatinigra F. Ritter = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **paucicostata** (Rausch) Rausch

[Lobivia mirabunda Backeb.]
Notas: Nombre dudoso.

Lobivia muhriae Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **iridescens** (Backeb.) Rausch

Lobivia muhriae Backeb. var. *flaviflora* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **iridescens** (Backeb.) Rausch

Lobivia napina Pazout = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia nealeana Backeb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia neohaageana Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia neohaageana Backeb. var. *flavovirens* Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia nigricans Wessner
Sin.: *Digitorebutia carmeniana* Rausch, *Digitorebutia nigricans* (Wessner) Buining, *Lobivia nigricans* Wessner var. *albispina* Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *carmeniana* (Rausch) Rausch, *Lobivia nigricans* Wessner var. *petersenii* (Fric) Rausch, *Mediolobivia nigricans* (Wessner) Krainz, *Rebutia nigricans* (Wessner) D.R. Hunt
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 771* (ZSS)].

Lobivia nigricans Wessner var. *albispina* Rausch = **Lobivia nigricans** Wessner

Lobivia nigricans Wessner var. *carmeniana* (Rausch) Rausch = **Lobivia nigricans** Wessner

Lobivia nigricans Wessner var. *petersenii* (Fric) Rausch = **Lobivia nigricans** Wessner

Lobivia nigrispina Backeb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia nigrispina Backeb. var. *rubiflora* Backeb. = **Lobivia haematantha** (Speg.) Britton & Rose var. **kuehnrichii** (Fric) Rausch

Lobivia nigrostoma Kreuz. & Buining = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia oreopepon Speg. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Lobivia pectinifera Wessner = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia pictiflora F. Ritter = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Lobivia polaskiana Backeb. = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia polycephala Backeb. = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Lobivia pseudocachensis Backeb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia pseudocachensis Backeb. var. *cinnabarina* Backeb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia pseudocachensis Backeb. var. *sanguinea* Backeb. = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia pugionacantha (Rose & Boed.) Backeb.
Sin.: *Echinopsis pugionacantha* Rose & Boed., *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *corrugata* Rausch, *Lobivia pugionacantha* (Rose & Boed.) Backeb. var. *flaviflora* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8926* (SI)].

Lobivia pugionacantha (Rose & Boed.) Backeb. var. *corrugata* Rausch = **Lobivia pugionacantha** (Rose & Boed.) Backeb.

Lobivia pugionacantha (Rose & Boed.) Backeb. var. *flaviflora* Backeb. = **Lobivia pugionacantha** (Rose & Boed.) Backeb.

Lobivia purpureominiata F. Ritter = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

Lobivia pygmaea (R.E. Fr.) Backeb.
Sin.: *Acantholobivia haagei* (Fric & Schelle) Y. Ito, *Digitorebutia haagei* (Fric & Schelle) Fric, *Digitorebutia mudanensis* Rausch, *Digitorebutia nazarenoensis* Rausch, *Echinopsis pygmaea* R.E. Fr., *Lobivia digitiformis* Backeb., *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *elegantula* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mazaroensis* Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *mudanensis* (Rausch) Rausch, *Lobivia haagei* (Fric & Schelle) Wessner var. *pelzliana* Rausch, *Lobivia neohaageana* Backeb., *Lobivia neohaageana* Backeb. var. *flavovirens* Backeb., *Lobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *tafiensis* Rausch, *Mediolobivia eos* Rausch, *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Mediolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *atrovirens* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pectinata* (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *digitiformis* (Backeb.) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (Fric) Backeb., *Mediolobivia pygmaea* (R.E. Fr.) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb., *Pygmaeolobivia haagei* (Fric & Schelle) Backeb., *Rebutia haagei* Fric & Schelle, *Rebutia nazarenoensis* (Rausch) B. Fearn & Pearcy, *Rebutia pygmaea* (R.E. Fr.) Britton & Rose, *Reolobivia haagei* (Fric & Schelle) Fric
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8230* (SI)].

Lobivia pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. var. *tafiensis* Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Lobivia rebutioides Backeb. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia rebutioides Backeb. var. *citriniflora* Backeb. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia rebutioides Backeb. var. *krausiana* Backeb. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia rosarioana Rausch = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **rosarioana** (Rausch) Rausch

Lobivia rubescens Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia rubescens Backeb. var. *tenuispina* Backeb. = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **marsoneri**

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose
Sin.: *Echinopsis nealeana* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis pseudocachensis* (Backeb.) Friedrich, *Echinopsis saltensis* Speg., *Echinopsis saltensis* Speg. var. *nealeana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Echinopsis saltensis* Speg. var. *pseudocachensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Lobivia emmae* Backeb., *Lobivia emmae* Backeb. var. *brevispina* Backeb., *Lobivia nealeana* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb. var. *cinnabarina* Backeb., *Lobivia pseudocachensis* Backeb. var. *sanguinea* Backeb., *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *multicostata* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *nealeana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *pseudocachensis* (Backeb.) Rausch, *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *zapallarensis* Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 16* (ZSS)].

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose var. *multicostata* (Backeb.) Rausch = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose var. *nealeana* (Backeb.) Rausch = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose var. *pseudocachensis* (Backeb.) Rausch = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose var. *schreiteri* (A. Cast.) Rausch = **Lobivia schreiteri** A. Cast. var. **schreiteri**

Lobivia saltensis (Speg.) Britton & Rose var. *zapallarensis* Rausch = **Lobivia saltensis** (Speg.) Britton & Rose

Lobivia sanguiniflora Backeb.
Sin.: *Echinopsis sanguiniflora* (Backeb.) D.R. Hunt, *Lobivia breviflora* Backeb., *Lobivia duursmaiana* Backeb., *Lobivia polycephala* Backeb., *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *breviflora* (Backeb.) Rausch, *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *duursmaiana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia sanguiniflora* Backeb. var. *pseudolateritia* Backeb.
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Lobivia sanguiniflora Backeb. var. *breviflora* (Backeb.) Rausch = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Lobivia sanguiniflora Backeb. var. *duursmaiana* (Backeb.) Rausch = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Lobivia sanguiniflora Backeb. var. *pseudolateritia* Backeb. = **Lobivia sanguiniflora** Backeb.

Lobivia schniedcheniana J. Köhler = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Lobivia schreiteri A. Cast. var. **riolarensis** Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch 793* (ZSS)].

Lobivia schreiteri A. Cast. var. **schreiteri**
Sin.: *Echinopsis schreiteri* (A. Cast.) Werderm. ex Backeb., *Echinopsis stilowiana* (Backeb.) J.G. Lamb., *Lobivia saltensis* (Speg.) Britton & Rose var. *schreiteri* (A. Cast.) Rausch, *Lobivia schreiteri* A. Cast. var. *stilowiana* (Backeb.) Rausch, *Lobivia stilowiana* Backeb.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 12* (SI)].

Lobivia schreiteri A. Cast. var. *stilowiana* (Backeb.) Rausch = **Lobivia schreiteri** A. Cast. var. **schreiteri**

Lobivia schuldtii Fric = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia scoparia Werderm. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia shaferi Britton & Rose = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Lobivia shaferi Britton & Rose subsp. *fallax* (Oehme) Herz = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Lobivia shaferi Britton & Rose subsp. *leucomalla* (Wessner) E. Herzog = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Lobivia silvestrii (Speg.) G.D. Rowley
Sin.: *Cereus silvestrii* Speg., *Chamaecereus silvestrii* (Speg.) Britton & Rose, *Echinopsis chamacereus* Friedrich & Glaetzle
Referencias: Rausch, W., 1986a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Lobivia spiniflora (K. Schum.) Rausch = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Lobivia spiniflora (K. Schum.) Rausch var. *klimpeliana* (Weid. & Werderm.) Rausch = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Lobivia spiniflora (K. Schum.) Rausch var. *macrantha* Rausch = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Lobivia spiniflora (K. Schum.) Rausch var. *peitscherana* (Backeb.) Rausch = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Lobivia spiniflora (K. Schum.) Rausch var. *violacea* (Werderm.) Rausch = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Lobivia staffenii Fric = **Lobivia chrysantha** (Werderm.) Backeb. var. **chrysantha**

Lobivia steinmannii (Salm-Dyck) Backeb. var. *christinae* (Rausch) Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Lobivia stilowiana Backeb. = **Lobivia schreiteri** A. Cast. var. **schreiteri**

Lobivia sublimiflora Backeb. = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *aurantiaca* (Rausch) Rausch = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *brevispina* (F. Ritter) Rausch = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *catamarcense* (F. Ritter) Rausch = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *chionantha* (Speg.) Rausch = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *erythrantha* Rausch = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *ferrarii* (Rausch) Rausch = **Acanthocalycium ferrarii** Rausch

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *glauca* (F. Ritter) Rausch = **Acanthocalycium glaucum** F. Ritter

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *munita* Rausch = **Acanthocalycium thionanthum** (Speg.) Backeb.

Lobivia thionantha (Speg.) Britton & Rose var. *variiflora* (Backeb.) Rausch = **Acanthocalycium ferrarii** Rausch

Lobivia uitewaaleana Buining = **Lobivia marsoneri** (Werderm.) Backeb. var. **iridescens** (Backeb.) Rausch

Lobivia varispina F. Ritter = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Lobivia vatteri Krainz = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia vatteri Krainz var. *robusta* Backeb. = **Lobivia jajoiana** Backeb. var. **jajoiana**

Lobivia walteri R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis walteri* (R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) W.T. Marshall var. *walteri* (R. Kiesling) Rausch, *Trichocereus walteri* (R. Kiesling) J.G. Lamb.
Referencias: Font, F. & Picca, P., 2001; Kiesling, R., 1976.
Subarbusto suculento. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1109* (SI)].

Lobivia wessneriana Fritzen = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Maihuenia (F.A.C. Weber) K. Schum.

Número de especies: 2 endémicas

Maihuenia albolanata F. Ritter = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihuenia andicola Comber = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihuenia brachydelphys K. Schum. = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihuenia cumulata F. Ritter = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihuenia latispina F. Ritter = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihuenia patagonica (Phil.) Britton & Rose
Sin.: *Maihuenia albolanata* F. Ritter, *Maihuenia andicola* Comber, *Maihuenia brachydelphys* K. Schum., *Maihuenia cumulata* F. Ritter, *Maihuenia latispina* F. Ritter, *Maihuenia tehuelches* Speg., *Maihuenia valentinii* Speg., *Opuntia patagonica* Phil.
Referencias: Kiesling, R., 1988; Leuenberger, B. E., 1997.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19467* (LP)]; CHL[*Saldivia, P. s.n.* (SGO)].

Maihuenia philippii (F.A.C. Weber) K. Schum. = **Maihuenia poeppigii** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Maihuenia poeppigii (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Sin.: *Maihuenia philippii* (F.A.C. Weber) K. Schum., *Opuntia maihuen* J. Remy, *Opuntia poeppigii* Otto & Pfeiff., *Pereskia philippii* F.A.C. Weber, *Pereskia poeppigii* Salm-Dyck
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989; Kiesling, R., 1988; Leuenberger, B. E., 1997.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 2014* (BAB)]; CHL[*Leuenberger, B. E. 4025* (CONC)].

Maihuenia tehuelches Speg. = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihuenia valentinii Speg. = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Maihueniopsis Speg.

Número de especies: 16, 13 endémicas

Maihueniopsis albomarginata F. Ritter = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Maihueniopsis archiconoidea F. Ritter
Sin.: *Opuntia archiconoidea* (F. Ritter) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 1200–1800 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 256* (U)].

Maihueniopsis atacamensis (Phil.) F. Ritter
Sin.: *Opuntia atacamensis* Phil., *Tephrocactus atacamensis* (Phil.) F. Ritter
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 4100 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 94025* (ULS)].

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter, *Cumulopuntia famatinensis* F. Ritter, *Cumulopuntia pampana* F. Ritter, *Opuntia boliviana* Salm-Dyck, *Tephrocactus bolivianus* (Salm-Dyck) Backeb., *Tephrocactus flexispinus* Backeb., nom. inval., *Tephrocactus melanacanthus* Backeb., nom. inval.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BAB)].

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *echinacea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Cumulopuntia echinacea* (F. Ritter) F. Ritter, *Opuntia echinacea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Tephrocactus echinaceus* F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 2600–4000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 198* (U)].

Maihueniopsis boliviana (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez
Sin.: *Cumulopuntia boliviana* (Salm-Dyck) F. Ritter subsp. *ignescens* (Vaupel) D.R. Hunt, *Cumulopuntia hystrix* F. Ritter, *Cumulopuntia ignescens* (Vaupel) F. Ritter, *Cumulopuntia ticnamarensis* F. Ritter, *Cumulopuntia tortispina* F. Ritter, *Opuntia ignescens* Vaupel, *Tephrocactus ignescens* (Vaupel) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 3300–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2776* (CONC)].

Maihueniopsis bonnieae (D.K. Ferguson & R. Kiesling) E.F. Anderson = **Puna bonniae** D.J. Ferguson & R. Kiesling

Maihueniopsis camachoi (Espinosa) F. Ritter
Sin.: *Opuntia camachoi* Espinosa, *Tephrocactus camachoi* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus chilensis* Backeb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 3900 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arancio, G. 10436* (ULS)].

Maihueniopsis clavarioides (Pfeiff.) E.F. Anderson = **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Maihueniopsis colorea (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Opuntia colorea* (F. Ritter) D.R. Hunt, *Tephrocactus coloreus* F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 1300–3500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2618* (CONC)].

Maihueniopsis conoidea (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Maihueniopsis crassispina F. Ritter
Sin.: *Opuntia crassispina* (F. Ritter) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 721* (U)].

Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F. Ritter var. **darwinii**
Sin.: *Opuntia darwinii* Hensl., *Tephrocactus darwinii* (Hensl.) Backeb. ex Fric
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2729* (BAB)].

Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis albomarginata* F. Ritter, *Maihueniopsis neuquensis* (Borg) F. Ritter, *Opuntia hickenii* Britton & Rose, *Opuntia neuquensis* Borg, *Opuntia platyacantha* Pfeiff., *Tephrocactus hickenii* (Britton & Rose) Speg., *Tephrocactus neuquensis* (Borg) Backeb., *Tephrocactus platycanthus* (Pfeiff.) Lem., *Tephrocactus platycanthus* (Pfeiff.) Lem. var. *neoplatyacanthus* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3249* (SI)].

Maihueniopsis domeykoensis F. Ritter
Sin.: *Opuntia domeykoensis* (F. Ritter) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1093* (U, ZSS)].

Maihueniopsis glomerata (Haw.) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) F. Ritter, *Maihueniopsis hypogaea* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueniopsis leoncito* (Werderm.) F. Ritter, *Maihueniopsis leptoclada* F. Ritter, *Maihueniopsis molfinoi* Speg., *Maihueniopsis tarapacana* (Phil.) F. Ritter, *Opuntia conoidea* (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley, *Opuntia glomerata* Haw., *Opuntia hypogaea* Werderm., *Opuntia leoncito* Werderm., *Opuntia molfinoi* (Speg.) Werderm., *Opuntia ovallei* Gay, *Opuntia tarapacana* Phil., *Tephrocactus conoideus* F. Ritter ex Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *andicola* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *atratospinus* Backeb., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *fulvispinus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus leoncito* (Werderm.) Backeb., *Tephrocactus reicheanus* (Espinosa) Backeb., *Tephrocactus tarapacanus* (Phil.) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dell'Arciprete, A. s.n.* (BACP)]; CHL[*Werdermann, E. 944* (SI)].

Maihueniopsis grandiflora F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 1700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 720* (SGO, U)].

Maihueniopsis hypogaea (Werderm.) F. Ritter
= **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Maihueniopsis leoncito (Werderm.) F. Ritter
= **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Maihueniopsis leptoclada F. Ritter = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Maihueniopsis mandragora (Backeb.) F. Ritter, nom. illeg. = **Maihueniopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling

Maihueniopsis minuta (Backeb.) R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis mandragora* (Backeb.) F. Ritter, nom. illeg., *Opuntia mandragora* (Backeb.) G.D. Rowley, nom. illeg., *Opuntia minuta* (Backeb.) A. Cast., *Tephrocactus mandragora* Backeb., *Tephrocactus minutus* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 640* (LP)].

Maihueniopsis miquelii (Monv.) R. Kiesling
= **Austrocylindropuntia miquelii** (Monv.) Backeb.

Maihueniopsis molfinoi Speg. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Maihueniopsis molinensis (Speg.) F. Ritter
= **Tephrocactus molinensis** (Speg.) Backeb.

Maihueniopsis neuquensis (Borg) F. Ritter
= **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Maihueniopsis nigrispina (K. Schum.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia nigrispina* K. Schum., *Opuntia purpurea* R.E. Fr., *Platyopuntia nigrispina* (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg., *Tephrocactus nigrispinus* (K. Schum.) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. s.n.* (BACP)]; CHL[*Pinto, R. 30* (CONC)].

Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter
Sin.: *Maihueniopsis ovata* (Pfeiff.) F. Ritter f. *calva* F. Ritter, *Opuntia ovata* Pfeiff., *Opuntia russellii* Britton & Rose, *Tephrocactus ovatus* (Pfeiff.) Backeb., *Tephrocactus russellii* (Britton & Rose) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 12029* (MERL)]; CHL[*sin colector s.n.* (E)].

Maihueniopsis ovata (Pfeiff.) F. Ritter f. *calva* F. Ritter
= **Maihueniopsis ovata** (Pfeiff.) F. Ritter

Maihueniopsis pentlandii (Salm-Dyck) R. Kiesling
= **Cumulopuntia pentlandii** (Salm-Dyck) F. Ritter

Maihueniopsis rahmeri (Phil.) F. Ritter
Sin.: *Opuntia rahmerii* Phil.
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rahmer, C. s.n.* (SGO)].

Maihueniopsis recurvata (Gilmer & H.P. Thomas) R. Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia recurvata* Gilmer & H.P. Thomas, *Tephrocactus curvispinus* Backeb., nom. inval.
Referencias: Kiesling, R. & Meglioli, S., 2003.
Subarbusto suculento. Endémica. 800–2400 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Márquez, J. s.n.* (SI)].

Maihueniopsis subterranea (R.E. Fr.) E.F. Anderson
= **Puna subterranea** (R.E. Fr.) R. Kiesling

Maihueniopsis tarapacana (Phil.) F. Ritter
= **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Maihueniopsis wagenknechtii F. Ritter
Sin.: *Opuntia wagenknechtii* (F. Ritter) D.R. Hunt
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 719* (SGO, U)].

Malacocarpus arechavaletai (K. Schum. ex Speg.) Berg
= **Wigginsia corynodes** (Otto ex Pfeiff.) D.M. Porter

Malacocarpus bertinii (Cels) Hosseus = **Austrocactus bertinii** (Cels) Britton & Rose

Malacocarpus catamarcensis (Speg.) Britton & Rose
= **Pyrrhocactus pachacoensis** Rausch

Malacocarpus graessneri (K. Schum.) Britton & Rose
= **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Malacocarpus grossei (K. Schum.) Britton & Rose
= **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Malacocarpus haselbergii (F. Haage) Britton & Rose
= **Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Malacocarpus nigrispinus (K. Schum.) Britton & Rose
= **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Malacocarpus ottonis (Lehm.) Britton & Rose = **Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor

Malacocarpus pauciareolatus (Arechav.) A. Berger
= **Wigginsia pauciareolata** (Arechav.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Malacocarpus schumannianus (Nicolai) Britton & Rose
= **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Malacocarpus sessiliflorus (Hook.) Backeb. = **Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M. Porter

Malacocarpus stegmannii Backeb., nom. inval.
= **Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M. Porter

Malacocarpus straussianus (K. Schum.) Britton & Rose
= **Pyrrhocactus strausianus** (K. Schum.) A. Berger

Malacocarpus tephracanthus (Link & Otto) K. Schum.
= **Wigginsia tephracantha** (Link & Otto) D.M. Porter

Malacocarpus tetracanthus Lem. = **Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M. Porter

Mediocactus coccineus auct. non (Salm-Dyck ex DC.) Britton & Rose = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Mediocactus hahnianus Backeb. = **Harrisia hahniana** (Backeb.) Kimnach & Hutchison ex Kimnach

Mediocactus hassleri (K. Schum.) Backeb.
= **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Mediocactus lindmanii (F.A.C. Weber) Backeb.
= **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Mediocactus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Borg
= **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Mediolobivia auranitida (Wessner) Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia auranitida (Wessner) Backeb. var. *flaviflora* Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia aureiflora Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia boedekeriana Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia conoidea (Wessner) Krainz = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia conoidea (Wessner) Krainz var. *columnaris* (Wessner) Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia duursmaiana Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia elegans Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia eos Rausch = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz = **Lobivia euanthema** Backeb.

Mediolobivia euanthema (Backeb.) Krainz var. *oculata* (Werderm.) Krainz = **Lobivia euanthema** Backeb.

Mediolobivia haagei (Fric & Schelle) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Mediolobivia haagei (Fric & Schelle) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

[Mediolobivia kesselringiane Culm.]
Notas: Nombre dudoso.

Mediolobivia nigricans (Wessner) Krainz = **Lobivia nigricans** Wessner

Mediolobivia pectinata (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *atrovirens* (Backeb.) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Mediolobivia pectinata (Backeb.) Backeb. ex Krainz var. *digitiformis* (Backeb.) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Mediolobivia pygmaea (Fric) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Mediolobivia pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. var. *flavovirens* (Backeb.) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Mediolobivia rubelliflora Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia rubriflora Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia schmiedcheniana (U. Köhler) Krainz = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia schmiedcheniana (U. Köhler) Krainz var. *einsteinii* (Fric) Backeb., nom. illeg. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia schmiedcheniana (U. Köhler) Krainz var. *karreri* (Fric) Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia schmiedcheniana (U. Köhler) Krainz var. *rubriviridis* (Fric) Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Mediolobivia schmiedcheniana (U. Köhler) Krainz var. *steineckei* (Fric) Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

[Mediolobivia spiralisepala Schütz]
Notas: Nombre dudoso.

Mesechinopsis hamatacantha (Backeb.) Y. Ito = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Mesechinopsis leucorhodantha (Backeb.) Y. Ito = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Mesechinopsis lobivioides (Backeb.) Y. Ito = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Mesechinopsis pelecyrhachys (Backeb.) Y. Ito = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Mesechinopsis polyancistra (Backeb.) Y. Ito = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Miqueliopuntia miquelii (Monv.) F. Ritter = **Austrocylindropuntia miquelii** (Monv.) Backeb.

Monvillea Britton & Rose

Número de especies: 5, 1 endémica

Monvillea alticostata F. Ritter = **Monvillea euchlora** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb.

Monvillea cavendischii (Monv.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus cavendischii* Monv., *Cereus paxtonianus* Monv., *Cereus rhodoleucanthus* K. Schum., *Cereus saxicolus* Morong, *Praecereus saxicolus* (Morong) N.P. Taylor
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920; Heath, P. V., 1992; Hunt, D. R., 1988; Kiesling, R., 2005.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 440* (CTES)]; PRY[*Soria, N. 2159* (FCQ)].

Monvillea euchlora (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Cereus euchlorus* F.A.C. Weber ex K. Schum., *Cereus lauterbachii* K. Schum., *Monvillea alticostata* F. Ritter, *Praecereus euchlorus* (F.A.C. Weber ex K. Schum.) N.P. Taylor
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CEN, COA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1613* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 20251* (MO)].

Monvillea kroenleini R. Kiesling
Sin.: *Cereus kroenleinii* (R. Kiesling) P.J. Braun & Esteves, *Cereus kroenleinii* N.P. Taylor, nom. illeg., *Monvillea phatnosperma* (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) P.J. Braun
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Nicora, E. G. 9761* (SI)].

[Monvillea lindenzweigiana (Gürke) Backeb.]
Sin.: *Cereus lindenzweigiana* Gürke
Notas: Nombre dudoso.

Monvillea marmorata (Zeiss.) Fric & Kreuz. = **Monvillea spegazzinii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Monvillea phatnosperma (K. Schum.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus phatnospermus* K. Schum.
Arbusto suculento. Nativa. 100–400 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Kiesling, R. 9606* (G, PY, SI)].

Monvillea phatnosperma (K. Schum.) Britton & Rose subsp. *kroenleinii* (N.P. Taylor) P.J. Braun
= **Monvillea kroenleini** R. Kiesling

Monvillea spegazzinii (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Cereus anisitsii* K. Schum., *Cereus marmoratus* Zeiss., nom. nud., *Cereus spegazzini* F.A.C. Weber var. *hassleri* Weing., *Cereus spegazzinii* F.A.C. Weber, *Monvillea marmorata* (Zeiss.) Fric & Kreuz.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1920; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 452* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 16439* (CTES)].

Neochilenia aerocarpa (F. Ritter) Backeb.
= **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neochilenia andreana Backeb., nom. inval.
= **Pyrrhocactus kattermannii** R. Kiesling

Neochilenia chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Backeb.
= **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**

Neochilenia confinis (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus confinis** F. Ritter

Neochilenia duripulpa (F. Ritter) Backeb.
= **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neochilenia esmeraldana (F. Ritter) Backeb.
= **Thelocephala esmeraldana** (F. Ritter) F. Ritter

Neochilenia huascensis (F. Ritter) Backeb.
= **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neochilenia iquiquensis (F. Ritter) Backeb. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neochilenia lembckei Backeb. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neochilenia napina (Phil.) Backeb. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neochilenia napina (Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neochilenia odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb.
= **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Neochilenia paucicostata (F. Ritter) Backeb.
= **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neochilenia recondita (F. Ritter) Backeb.
= **Pyrrhocactus reconditus** F. Ritter

Neochilenia simulans (F. Ritter) Backeb. = **Pyrrhocactus simulans** F. Ritter

Neochilenia taltalensis (Hutchison) Backeb.
= **Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison) F. Ritter

Neochilenia totoralensis (F. Ritter) Backeb.
= **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neochilenia transitensis (F. Ritter) Backeb.
= **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neolobivia kratochviliana (Backeb.) Y. Ito = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Neolobivia ritteri (Boed.) Y. Ito = **Echinopsis mamillosa** Gürke

Neoporteria Britton & Rose

Número de especies: 6 endémicas

Neoporteria andreana (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg. = **Pyrrhocactus kattermannii** R. Kiesling

Neoporteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
= **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neoporteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floribunda* (Backeb.) A.E. Hoffm. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neoporteria aricensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *saxifraga* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neoporteria aspillagae (Söhrens) Backeb.
= **Pyrrhocactus aspillagae** (Söhrens) F. Ritter

Neoporteria atrispinosa Backeb. = **Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Neoporteria atroviridis (F. Ritter) Ferryman
= **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria bulbocalyx (Werderm.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus bulbocalyx** (Werderm.) Backeb.

Neoporteria calderana (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
= **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria carrizalensis (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria carrizalensis (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *totoralensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria castanea F. Ritter
Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *castanea* (F. Ritter) Katt.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 236* (U, ZSS)].

Neoporteria castanea F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Neoporteria chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose = **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**

Neoporteria choapensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Neoporteria chorosensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.
Sin.: *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *nigrihorrida* (Backeb.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *vallenarensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *wagenknechtii* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm., *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. f. *grandiflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter, *Neoporteria clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *graciana* F. Ritter, *Neoporteria microsperma* F. Ritter var. *serenana* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* (Backeb.) Backeb. f. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *napina* F. Ritter, *Neoporteria wagenknechtii* F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 482* (ZSS)].

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. f. *grandiflora* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *nigrihorrida* (Backeb.) A.E. Hoffm. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *parviflora* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria clavata (Söhrens ex K. Schum.) Werderm. var. *procera* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria coimasensis F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria coimasensis F. Ritter f. *crassispina* F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria coimasensis F. Ritter f. *tenuispina* F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria coimasensis F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria confinis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus confinis** F. Ritter

Neoporteria crispa (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus crispus** F. Ritter

Neoporteria curvispina (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Neoporteria curvispina (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Neoporteria curvispina (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus engleri** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria curvispina (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus garaventai** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria curvispina (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Neoporteria curvispina (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Neoporteria deherdtiana (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria dimorpha (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria dubia (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg. = **Pyrrhocactus dubius** Backeb., nom. inval.

Neoporteria engleri (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus engleri** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria eriocephala (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval. = **Pyrrhocactus floccosus** F. Ritter

Neoporteria eriosyzoides (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria esmeraldana (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Thelocephala esmeraldana** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria esmeraldana (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *malleolata* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Thelocephala krausii** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria fusca (Muehlenpf.) Britton & Rose = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria garaventae (F. Ritter) Ferryman = **Pyrrhocactus garaventai** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria gerocephala Y. Ito = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria haenkeana (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria horrida (Gay) D.R. Hunt = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Neoporteria horrida (Gay) D.R. Hunt var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Neoporteria horrida (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus aspillagae** (Söhrens) F. Ritter

Neoporteria horrida (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Neoporteria horrida (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Neoporteria horrida (Gay) D.R. Hunt var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Neoporteria huascensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pilispinus** F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria intermedia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria iquiquensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria krainziana (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Islaya islayensis** (C.F. Först.) Backeb.

Neoporteria kunzei (C.F. Först.) Backeb. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria kunzei (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus confinis** F. Ritter

Neoporteria laniceps F. Ritter = **Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Neoporteria litoralis F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Neoporteria litoralis F. Ritter var. *intermedia* F. Ritter = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Neoporteria marksiana (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Neoporteria microsperma F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria microsperma F. Ritter var. *graciana* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria microsperma F. Ritter var. *serenana* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria monte-amargensis (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval. = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Neoporteria multicolor F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. f. *glabrescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. f. *nuda* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. var. *duripulpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Thelocephala tenebrica** F. Ritter

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. var. *lembckei* (Backeb.) A.E. Hoffm. = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Neoporteria neohankeana (F. Ritter) Ferryman = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria nidus (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Sin.: *Echinocactus nidus* Söhrens ex K. Schum., *Echinocactus senilis* Phil., nom. illeg., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *coimasensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce senilis* (Backeb.) Katt. subsp. *elquiensis* Katt., *Neoporteria coimasensis* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter f. *crassispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter f. *tenuispina* F. Ritter, *Neoporteria coimasensis* F. Ritter var. *robusta* (F. Ritter) F. Ritter, *Neoporteria gerocephala* Y. Ito, *Neoporteria multicolor* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter, *Neoporteria nidus* (Söhrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria robusta* F. Ritter, *Neoporteria senilis* Backeb., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–500 m.

Países: CHL(IV).

Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 221* (ZSS)].

Neoporteria nidus (Söhrens) Britton & Rose var. *coimasensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria nidus (Söhrens) Britton & Rose var. *gerocephala* (Y. Ito) F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria nidus (Söhrens) Britton & Rose var. *matancillana* F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria nidus (Söhrens) Britton & Rose var. *multicolor* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria nigrihorrida Backeb. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria nigrihorrida (Backeb.) Backeb. f. *crassispina* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria occulta (Phil.) Britton & Rose = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria odieri (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb. = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus echinus** F. Ritter

Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus floccosus** F. Ritter

Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus echinus** F. Ritter

Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria paucicostata (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria pilispina (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus pilispinus** F. Ritter

Neoporteria recondita (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus reconditus** F. Ritter

Neoporteria recondita (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *residua* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neoporteria recondita (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus reconditus** F. Ritter

Neoporteria reichei (K. Schum.) Backeb. = **Thelocephala odieri** (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter

Neoporteria residua (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Neoporteria ritteri Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria robusta F. Ritter = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria rupicola (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison) F. Ritter

Neoporteria sanjuanensis (Speg.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Neoporteria scoparia (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria senilis Backeb. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria setiflora (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg. = **Pyrrhocactus setiflorus** Backeb., nom. inval.

Neoporteria setosiflora (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Neoporteria simulans (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus simulans** F. Ritter

Neoporteria sociabilis F. Ritter
Sin.: *Eriosyce sociabilis* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria sociabilis* F. Ritter var. *napina* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 655* (U)].

Neoporteria sociabilis F. Ritter var. *napina* F. Ritter = **Neoporteria sociabilis** F. Ritter

Neoporteria strausiana (K. Schum.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus strausianus** (K. Schum.) A. Berger

Neoporteria subaiana (Backeb.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus garaventai** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose
Sin.: *Cactus berteri* Colla, *Cereus dichroacanthus* Mart. ex Pfeiff., *Echinocactus acutissima* Otto & Dietr., *Echinocactus castaneoides* Cels ex Salm-Dyck, *Echinocactus subgibbosus* Haw., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt., *Eriosyce subgibbosa* (Haw.) Katt. var. *litoralis* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria castanea* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Neoporteria litoralis* F. Ritter

var. *intermedia* F. Ritter, *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *litoralis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria subgibbosa* (Haw.) Britton & Rose var. *orientalis* F. Ritter
Referencias: Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 224* (ZSS)].

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose var. *intermedia* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose var. *litoralis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose var. *orientalis* F. Ritter = **Neoporteria subgibbosa** (Haw.) Britton & Rose

Neoporteria subgibbosa (Haw.) Britton & Rose var. *robusta* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria nidus** (Söhrens ex K. Schum.) Britton & Rose

Neoporteria taltalensis Hutchison = **Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison) F. Ritter

Neoporteria taltalensis Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Neoporteria totoralensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria totoralensis (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria tuberisulcata (Jacobi) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Neoporteria umadeave (Werderm.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus umadeave** (Werderm.) Backeb.

Neoporteria umadeave (Werderm.) Donald & G.D. Rowley var. *marayesensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Neoporteria vallenarensis (F. Ritter) A. Hoffm., nom. illeg. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria vallenarensis (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria vallenarensis (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus crispus** F. Ritter

Neoporteria vallenarensis (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria vallenarensis (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Neoporteria villicumensis (Rausch) Donald = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Neoporteria villosa (Monv.) A. Berger
Sin.: *Cactus villosus* Monv., *Echinocactus villosus* (Monv.) Labour., *Eriosyce villosa* (Monv.) Katt., *Neoporteria atrispinosa* Backeb., *Neoporteria laniceps* F. Ritter, *Neoporteria villosa* (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 250* (SGO, ZSS)].

Neoporteria villosa (Monv.) A. Berger var. *laniceps* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria villosa** (Monv.) A. Berger

Neoporteria volliana (Backeb.) Donald & G.D. Rowley = **Pyrrhocactus vollianus** Backeb.

Neoporteria wagenknechtii F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria wagenknechtii F. Ritter var. *microsperma* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria wagenknechtii F. Ritter var. *napina* F. Ritter = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria wagenknechtii F. Ritter var. *vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Neoporteria clavata** (Söhrens ex K. Schum.) Werderm.

Neoporteria woutersiana (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval. = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Neowerdermannia Fric

Número de especies: 2, 1 endémica

Neowerdermannia chilensis Backeb.
Sin.: *Sulcorebutia chilensis* (Backeb.) F.H. Brandt, *Weingartia chilensis* (Backeb.) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2830* (CONC)].

Neowerdermannia vorwerkii Fric
Sin.: *Sulcorebutia vorwerkii* (Fric) Brand, nom. illeg., *Weingartia vorwerkii* (Fric) Backeb.
Referencias: Castellanos, A & Lelong, H., 1943.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8928* (SI)].

Notocactus alacriportanus (Backeb. & Voll) Buxb. = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus allosiphon Marchesi = **Parodia allosiphon** (Marchesi) N.P. Taylor

Notocactus apricus (Arechav.) A. Berger = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus arachnitis F. Ritter = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus arechavaletae (Speg.) Herter = **Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor

Notocactus bertinii (Cels) Marshall = **Austrocactus bertinii** (Cels) Britton & Rose

Notocactus bommeljei Vliet = **Parodia tabularis** (Ruempler) D.R. Hunt

Notocactus brederooianus Prestle = **Parodia tabularis** (Ruempler) D.R. Hunt

Notocactus brevihamatus (W. Haage ex Backeb.) Buxb. = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus bueneckerii (Buining) Krainz = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus buiningii Buxb. = **Parodia buiningii** (Buxb.) N.P. Taylor

Notocactus caespitosum (Speg.) Backeb. = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus carambeiensis Buining & Brederoo = **Parodia carambeiensis** (Buining & Brederoo) Hofacker
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus claviceps (F. Ritter) Krainz = **Parodia claviceps** (F. Ritter) F.H. Brandt
Referencias: Larroca, J., 1998.

Notocactus concinnioides Prauser = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus crassigibus F. Ritter = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus curvispinus F. Ritter = **Parodia curvispina** (F. Ritter) D.R. Hunt

Notocactus eremiticus F. Ritter = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus eugeniae Vliet = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus ferrugieneus Schlosser = **Parodia wedermanniana** (Herter) N.P. Taylor

Notocactus floricomus (Arechav.) Backeb. = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Notocactus gibberulus Prestle = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus glomeratus N. Gerloff = **Parodia rudibuenekeri** (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus graessneri (K. Schum.) A. Berger = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Notocactus grossei (K. Schum.) Fric = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Notocactus grossei (K. Schum.) Fric f. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun. ex Havlicek = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Notocactus grossei (K. Schum.) Fric var. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun. = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Notocactus gutierrezii W.R. Abraham = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus haselbergii (F. Haage ex Rümpler) A. Berger = **Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Notocactus herteri (Werderm.) Buining & Kreuz. = **Parodia herteri** (Werderm.) N.P. Taylor

Notocactus horstii F. Ritter = **Parodia horstii** (F. Ritter) N.P. Taylor

Notocactus joadii (Hook. f.) Herter = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus leninghausii (K. Schum.) Backeb. = **Parodia leninghausii** (K. Schum.) F.H. Brandt

Notocactus linkii (Lehm.) Herter = **Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1995.

Notocactus linkii (Lehm.) Herter f. *multiflorus* (Fric ex Buining) F. Ritter = **Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling

Notocactus magnificus (F. Ritter) N.P. Taylor = **Parodia magnifica** (F. Ritter) F.H. Brandt

Notocactus mammulosus (Lem.) A. Berger = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Notocactus mammulosus (Lem.) A. Berger var. *pampeanus* (Speg.) A. Cast. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Notocactus megapotamicus (Osten) Herter = **Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling

Notocactus meonacanthus Prestle = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus minimus Fric & Kreuz. ex Buining = **Parodia tenuicylindrica** (F. Ritter) D.R. Hunt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus mueller-melchersii Backeb. = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus mueller-moelleri Backeb. & F.M. Knuth = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Notocactus nigrispinus (K. Schum.) Buining, nom. inval. = **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Notocactus nigrispinus (K. Schum.) G. Schaeff. = **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Notocactus olimarensis Prestle = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus ottonis (Lehm.) A. Berger = **Parodia ottonis** (Lehm.) N.P. Taylor
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Notocactus ottonis (Lehm.) A. Berger var. *megapotamicus* (Osten) Buining = **Parodia linkii** (Lehm.) R. Kiesling

Notocactus oxicostatus Buining & Brederoo = **Parodia oxicostata** (Buining & Brederoo) Hofacker
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus pampeanus (Speg.) Backeb. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Notocactus paulus Schlosser & Brederoo = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Notocactus pseudoherteri Buining = **Parodia herteri** (Werderm.) N.P. Taylor

Notocactus purpureus F. Ritter = **Parodia horstii** (F. Ritter) N.P. Taylor

Notocactus rauschii Vliet = **Parodia notorauschii** D.R. Hunt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus rechensis Buining = **Parodia rechensis** (Buining) F.H. Brandt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus roseiflorus Schloss. & Brederoo = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus roseoluteus Vliet = **Parodia mammulosa** (Lem.) N.P. Taylor
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Notocactus rubriflorus Berger = **Parodia herteri** (Werderm.) N.P. Taylor

Notocactus rubrigemmatus W.R. Abraham = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor

Notocactus rudibuenekeri W.R. Abraham = **Parodia rudibuenekeri** (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus rutilans Däniker & Krainz = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor

Notocactus schumannianus (Nicolai) Fric = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Notocactus schumannianus (Nicolai) Fric f. *nigrispinus* (K. Schum.) Neduchal = **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Notocactus schumannianus (Nicolai) Fric var. *nigrispinus* (K. Schum.) Y. Ito = **Parodia nigrispina** (K. Schum.) F.H. Brandt

Notocactus scopa (Spreng.) Backeb. = **Parodia scopa** (Spreng.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Notocactus soldtianus Vliet = **Parodia scopa** (Spreng.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Notocactus spinibarbis F. Ritter = **Parodia notorauschii** D.R. Hunt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus stockingeri Prestle = **Parodia stockingeri** (Prestle) Hofacker & P.J. Braun
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus submammulosus (Lem.) Backeb. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Notocactus submammulosus (Lem.) Backeb. var. *pampeanus* (Speg.) Backeb. = **Parodia submammulosa** (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**

Notocactus tabularis (Ruempler) D.R. Hunt = **Parodia tabularis** (Ruempler) D.R. Hunt
Referencias: Hunt, D. R., 1999.

Notocactus tenuicylindricus F. Ritter = **Parodia tenuicylindrica** (F. Ritter) D.R. Hunt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus turecekianus (R. Kiesling) W.R. Abraham = **Parodia turecekiana** R. Kiesling

Notocactus uebelmannianus Buining = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor

Notocactus uebelmannianus Buining var. *pleiocephalus* N. Gerloff & G. König = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus vanvlietii Rausch = **Parodia wedermanniana** (Herter) N.P. Taylor

Notocactus veenianus Vliet = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus villa-velhensis (Backeb. & Voll) Slaba = **Parodia carambeiensis** (Buining & Brederoo) Hofacker
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Notocactus warasii (F. Ritter) Hewitt & Donald = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Notocactus wedermannianus Herter = **Parodia wedermanniana** (Herter) N.P. Taylor

Notocactus winkleri Vliet = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Opuntia Mill.

Número de especies: 16, 3 endémicas, 1 introducida

Opuntia albiflora K. Schum. = **Opuntia salmiana** Parm.

Opuntia alcerrecensis (F. Ritter) Iliff, nom. illeg. = **Tunilla chilensis** (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia alexanderi Britton & Rose = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

Opuntia alexanderi Britton & Rose var. *bruchii* (Speg.) G.D. Rowley = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

Opuntia amyclaea Ten. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle

Opuntia anacantha Speg. var. **anacantha**
Sin.: *Opuntia canina* Speg.
Referencias: Kiesling, R., 1998.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 17233* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 2646* (FCQ, SI)].

Opuntia anacantha Speg. var. **kiska-loro** (Speg.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia bispinosa* Backeb., nom. inval., *Opuntia kiska-loro* Speg., *Platyopuntia kiska-loro* (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Kiesling, R., 1998.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 19454* (SI)].
Notas: Probablemente crezca en Paraguay.

Opuntia anacantha Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia fuscolineata* Starmühler & Muncher, *Opuntia retrorsa* Speg., *Platyopuntia retrorsa* (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Kiesling, R., 1998.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PAI, PHA); URY(PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1039* (LP)]; PRY[*Hahn, W. J. 2153* (G, SI)].

Opuntia anacantha Speg. var. **utkilio** (Speg.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia utkilio* Speg.
Referencias: Kiesling, R., 1998.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25760* (SI)]; PRY[*Nicora, E. G. 9733* (FCQ, SI)].

Opuntia aoracantha Lem. = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Opuntia arborea Rojas Acosta = **Brasiliopuntia schulzii** (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Opuntia archiconoidea (F. Ritter) D.R. Hunt = **Maihueniopsis archiconoidea** F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia arechavaletae Speg.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Britton, N. L. & Rose, J. N., 1919; Kiesling, R., 2005; Scheinvar, L., 1985.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MAL, MON, RNO, ROC, SJO, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 17911* (SI)]; BRA[*Kiesling, R. 9319* (CTES)]; URY[*Alonso Paz, E. 3661* (MVFQ)].

Opuntia argentina auct. non Griseb. = **Brasiliopuntia schulzii** (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Opuntia argentina Griseb. = **Brasiliopuntia brasiliensis** (Willd.) A. Berger

[Opuntia armanta Backeb., nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia articulata (Pfeiff.) D.R. Hunt = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Opuntia assumptionis K. Schum.
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 7336* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 12560* (SI)]; PRY[*Anisits, J. D. 63* (B)].

Opuntia atacamensis Phil. = **Maihueniopsis atacamensis** (Phil.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

[Opuntia atrovirens Speg.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia aulacothele F.A.C. Weber = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia aurantiaca Lindl.
Sin.: *Opuntia maldonaensis* Arechav., *Opuntia montevidensis* Speg.
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(MAL, MON, PAY, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24993* (SI)]; URY[*Herter, G. 84349* (MO)].

Opuntia australis F.A.C. Weber = **Pterocactus australis** (F.A.C. Weber) Backeb.

[Opuntia berteri (Colla) A.E. Hoffm.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia bicolor Phil. = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Opuntia bispinosa Backeb., nom. inval. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **kiska-loro** (Speg.) R. Kiesling

Opuntia boliviana Salm-Dyck = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Opuntia bonaerensis Speg. = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **elata**

Opuntia bonnieae (D.J. Ferguson & R. Kiesling) Halda & Janeba = **Puna bonniae** D.J. Ferguson & R. Kiesling

Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. = **Brasiliopuntia brasiliensis** (Willd.) A. Berger
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Opuntia bruchii Speg. = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

[Opuntia brunneogemmia (F. Ritter) Schlindwein]
Sin.: *Opuntia monacantha* Haw. subsp. *brunneogemmia* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves, *Platyopuntia brunneogemmia* F. Ritter
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia brunnescens Britton & Rose = **Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.

Opuntia camachoi Espinosa = **Maihueniopsis camachoi** (Espinosa) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia canina Speg. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **anacantha**

[Opuntia canterae Arechav.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia cardiosperma K. Schum. = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia cedegreniana Backeb. = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia chakensis Speg. = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia clavarioides Pfeiff. = **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Opuntia clavata Phil. = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter

Opuntia colorea (F. Ritter) D.R. Hunt = **Maihueniopsis colorea** (F. Ritter) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia colubrina A. Cast.
Sin.: *Austrocylindropuntia colubrina* (A. Cast.) Backeb.
Referencias: Castellanos, A., 1955; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9722* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5514* (FCQ)].

Opuntia conoidea (F. Ritter ex Backeb.) G.D. Rowley = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia cordobensis Speg. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle

Opuntia corrugata Salm-Dyck = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia crassispina (F. Ritter) D.R. Hunt = **Maihueniopsis crassispina** F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia dactylifera Vaupel = **Cumulopuntia dactylifera** (Vaupel) E.F. Anderson

Opuntia darwinii Hensl. = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **darwinii**

[Opuntia decumana Haw.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Opuntia delaetiana (F.A.C. Weber) Vaupel = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia diademata Lem. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Opuntia diademata Lem. var. *inermis* Speg. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Opuntia diademata Lem. var. *oligacantha* Speg. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Opuntia diademata Lem. var. *polyacantha* Speg. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Opuntia digitalis F.A.C. Weber = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

[Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw.]
Sin.: *Cactus dillenii* Ker Gawl.
Notas: Nombre dudoso.

[Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. var. reitzii Scheinvar]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia discolor Britton & Rose
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SDE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3349* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 49762* (AS, MO)].

Opuntia distans Britton & Rose = **Opuntia quimilo** K. Schum.

Opuntia domeykoensis (F. Ritter) D.R. Hunt = **Maihueniopsis domeykoensis** F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia echinacea (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez

Opuntia elata Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling
Sin.: *Opuntia cardiosperma* K. Schum., *Opuntia chakensis* Speg., *Opuntia delaetiana* (F.A.C. Weber) Vaupel, *Opuntia elata* Salm-Dyck var. *delaetiana* F.A.C. Weber
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Leuenberger, B. E., 2001b.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 412* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3113* (FCQ)].

Opuntia elata Salm-Dyck var. *delaetiana* F.A.C. Weber = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **cardiosperma** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia elata Salm-Dyck var. **elata**
Sin.: *Opuntia bonaerensis* Speg., *Opuntia mieckleyi* K. Schum., *Opuntia paraguayensis* auct. non K. Schum., *Opuntia prasina* Speg.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Kiesling, R., 2005; Leuenberger, B. E., 2001c.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); PRY(PHA); URY(CAS, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25763* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4963* (FCQ)]; URY[*Nyffeler, R. 1421* (MVJB)].

Opuntia erectoclada Backeb. = **Tunilla erectoclada** (Backeb.) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle
Sin.: *Opuntia amyclaea* Ten., *Opuntia cordobensis* Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *amyclaea* (Ten.) A. Berger, *Opuntia megacantha* Salm-Dyck, *Opuntia streptacantha* Lem., *Platyopuntia cordobensis* (Speg.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Kiesling, R., 1999a.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, LRI, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. f. **ficus-indica**
Sin.: *Cactus ficus-indica* L., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *decumana* (Willd.) Speg., *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. var. *gymnocarpa* F.A.C. Weber, *Opuntia fusicaulis* Griff., *Opuntia paraguayensis* K. Schum., *Opuntia tuna-blanca* Speg.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1919; Kiesling, R., 1999a, 2005; Leuenberger, B. E., 2001c.
Arbusto suculento. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 2497* (SI)]; BRA[*Hunt, D. R. 6363* (NY)]; PRY[*Mereles, F. 4173* (FCQ, G)].

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. var. *amyclaea* (Ten.) A. Berger = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. var. *decumana* (Willd.) Speg. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. var. *gymnocarpa* F.A.C. Weber = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**

Opuntia fuscolineata Starmühler & Muncher = **Opuntia anacantha** Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling

Opuntia fusicaulis Griff. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**

Opuntia geometrica A. Cast. = **Tephrocactus geometricus** (A. Cast.) Backeb.

Opuntia glomerata Haw. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia glomerata Haw. f. *oligacantha* (Speg.) A. Cast. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Opuntia glomerata Haw. var. *inermis* (Speg.) A. Cast. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

[Opuntia grosseana F.A.C. Weber ex Rol.-Goss.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia guerkei Schelle = **Tephrocactus molinensis** (Speg.) Backeb.

Opuntia halophila Speg. = **Tephrocactus halophilus** (Speg.) Backeb.

[Opuntia heteromorpha Phil.]
Sin.: *Tephrocactus heteromorphus* (Phil.) Backeb.
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia hickenii Britton & Rose = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Opuntia hieronymii Griseb. = **Brasiliopuntia brasiliensis** (Willd.) A. Berger

Opuntia hildmannii Fric = **Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **hildmannii** (Fric) Backeb.

Opuntia hossei (Krainz & Gräser) G.D. Rowley = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Opuntia hypogaea Werderm. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Opuntia hypsophila Speg. = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Opuntia ianthinantha (F. Ritter) Iliff = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia ignescens Vaupel = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez

Opuntia kiska-loro Speg. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **kiska-loro** (Speg.) R. Kiesling

Opuntia leoncito Werderm. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

[Opuntia leonina Rümpler]
Sin.: *Tephrocactus leoninus* (Rümpler) Backeb., nom. inval.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Opuntia leucophaea Phil. = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson

[Opuntia limitata (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves]
Sin.: *Platyopuntia limitata* F. Ritter
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia longispina auct. non Haw. = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff
Referencias: Kiesling, R., 2003b.

Opuntia longispina Haw. var. *brevispina* Backeb. = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia longispina Haw. var. *corrugata* (Salm-Dyck) Backeb. = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia longispina Haw. var. *flavidispina* Backeb. = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia longispina Haw. var. *intermedia* Backeb. = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia maculacantha C.F. Först. = **Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.

Opuntia maihuen J. Remy = **Maihuenia poeppigii** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia maldonaensis Arechav. = **Opuntia aurantiaca** Lindl.

Opuntia mandragora (Backeb.) G.D. Rowley, nom. illeg. = **Maihueniopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling

Opuntia megacantha Salm-Dyck = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle

Opuntia megapotamica Arechav.
Sin.: *Opuntia salagria* A. Cast.
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, SFE, SLU); URY(CLA, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28016* (SI)].

Opuntia microdisca F.A.C. Weber = **Tunilla microdisca** (F.A.C. Weber) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia mieckleyi K. Schum. = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **elata**
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia minuta (Backeb.) A. Cast. = **Maihueniopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling

Opuntia miquelii Monv. = **Austrocylindropuntia miquelii** (Monv.) Backeb.

Opuntia molfinoi (Speg.) Werderm. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Opuntia molinensis Speg. = **Tephrocactus molinensis** (Speg.) Backeb.

Opuntia monacantha Haw.
Referencias: Leuenberger, B. E., 2002.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 26* (CTES)].
Notas: Citada para Uruguay sin mencionar localidad o ejemplar de referencia (Osten, 1941).

Opuntia monacantha Haw. subsp. *brunneogemmia* (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves = **Opuntia brunneogemmia** (F. Ritter) Schlindwein

Opuntia montevidensis Speg. = **Opuntia aurantiaca** Lindl.

Opuntia mucheri Starmühler = **Opuntia salmiana** Parm.

Opuntia multiareolata Backeb. = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia neuquensis Borg = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Opuntia nigrispina K. Schum. = **Maihueniopsis nigrispina** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia obliqua Backeb. = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia ovallei Gay = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia ovata Pfeiff. = **Maihueniopsis ovata** (Pfeiff.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia paediophila A. Cast. = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Opuntia pampeana Speg. = **Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.

Opuntia papyracantha Phil. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Opuntia paraguayensis auct. non K. Schum. = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **elata**

Opuntia paraguayensis K. Schum. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**
Referencias: Kiesling, R., 2005; Leuenberger, B. E., 2001c.

Opuntia patagonica Phil. = **Maihuenia patagonica** (Phil.) Britton & Rose

Opuntia penicilligera Speg.
Referencias: Kiesling, R., 1988.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bernasconi, P. s.n.* (BA)].

Opuntia pentlandii Salm-Dyck = **Cumulopuntia pentlandii** (Salm-Dyck) F. Ritter

Opuntia picardoii Marn.-Lap., nom. inval. = **Tunilla picardonii** D.R. Hunt & Iliff

[Opuntia pituitosa (F. Ritter) J. Iliff]
Sin.: *Platyopuntia pituitosa* F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia platyacantha Pfeiff. = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Opuntia poeppigii Otto & Pfeiff. = **Maihuenia poeppigii** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Opuntia prasina Speg. = **Opuntia elata** Salm-Dyck var. **elata**
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia puelchana A. Cast. = **Cylindropuntia tunicata** (Lehm.) F.M. Knuth

Opuntia purpurea R.E. Fr. = **Maihueniopsis nigrispina** (K. Schum.) R. Kiesling

[Opuntia pyrrhantha (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves]
Sin.: *Platyopuntia pyrrhantha* F. Ritter
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia quimilo K. Schum.
Sin.: *Opuntia distans* Britton & Rose, *Platyopuntia quimilo* (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Arbusto suculento. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biurrun, F. 1191* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5504* (FCQ)].

Opuntia rahmerii Phil. = **Maihueniopsis rahmeri** (Phil.) F. Ritter
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

[Opuntia reicheana Espinosa]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia retrorsa Speg. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling

[Opuntia riojana Hosseus]
Notas: Nombre dudoso.

[Opuntia robusta J.C. Wendl.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Opuntia ruiz-lealii A. Cast. = **Puna clavarioides** (Pfeiff.) R. Kiesling

Opuntia russellii Britton & Rose = **Maihueniopsis ovata** (Pfeiff.) F. Ritter

Opuntia salagria A. Cast. = **Opuntia megapotamica** Arechav.
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Opuntia salmiana Parm.
Sin.: *Austrocylindropuntia albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (Parm.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (Parm.) Backeb. var. *albiflora* (K. Schum.) Backeb., *Austrocylindropuntia salmiana* (Parm.) Backeb. var. *spegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Austrocylindropuntia spegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia spegazzinii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Opuntia albiflora* K. Schum., *Opuntia mucheri* Starmühler, *Opuntia spegazzinii* F.A.C. Weber, *Opuntia wagneri* F.A.C. Weber ex Rol.-Goss., *Platyopuntia salmiana* (Parm.) F. Ritter, nom. illeg., *Salmiopuntia salmiana* (Parm.) Kreuz.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1919; Kiesling, R., 2005.
Subarbusto suculento. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 664* (SI)].
Notas: La descripción original menciona esta especie para Brasil; posiblemente se trate de un error (Kiesling, 2005).

Opuntia schickendantzii F.A.C. Weber
Sin.: *Austrocylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Cylindropuntia schickendantzii* (F.A.C. Weber) Backeb.
Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1919.
Subarbusto suculento. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8315* (SI)].

Opuntia schulzii A. Cast. & Lelong = **Brasiliopuntia schulzii** (A. Cast. & Lelong) Backeb.

Opuntia schumannii Speg. = **Tephrocactus molinensis** (Speg.) Backeb.

[Opuntia securigera Borg]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia shaferi Britton & Rose = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

Opuntia shaferi Britton & Rose var. *humahuacana* (Backeb.) G.D. Rowley = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **humahuacana** (Backeb.) R. Kiesling

Opuntia skottsbergii Britton & Rose = **Pterocactus hickenii** Britton & Rose

Opuntia soehrensii Britton & Rose = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia spegazzinii F.A.C. Weber = **Opuntia salmiana** Parm.

Opuntia sphaerica C.F. Först. = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia spiniflora Phil. = **Austrocactus spiniflorus** (Phil.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia spinulifera Salm-Dyck
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Arbusto suculento. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1692* (SI)].

[Opuntia stenarthra K. Schum.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia streptacantha Lem. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle

Opuntia strobiliformis A. Berger = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

[Opuntia subsphaerocarpa Speg.]
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia subterranea R.E. Fr. = **Puna subterranea** (R.E. Fr.) R. Kiesling

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **hildmannii** (Fric) Backeb.
Sin.: *Opuntia hildmannii* Fric, *Opuntia vulpina* F.A.C. Weber
Referencias: Backeberg, C., 1959b.
Subarbusto suculento. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schultes, R. E. 26* (SI)].

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **pampeana** (Speg.) Backeb.
Sin.: *Opuntia brunnescens* Britton & Rose, *Opuntia maculacantha* C.F. Först., *Opuntia pampeana* Speg.
Referencias: Castellanos, A., 1957.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SDE, SFE); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4793* (LP)].

Opuntia sulphurea Gillies ex Salm-Dyck var. **sulphurea**
Sin.: *Platyopuntia sulphurea* (Gillies ex Salm-Dyck) F. Ritter
Referencias: Castellanos, A., 1957.
Subarbusto suculento. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 10973* (CORD, MCNS)].

Opuntia tarapacana Phil. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Opuntia tilcarensis Backeb. = **Tunilla tilcarensis** (Backeb.) D.R. Hunt & J. Iliff

Opuntia tilcarensis Backeb. var. *rubellispina* Backeb. = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Opuntia tuberosa Pfeiff. = **Pterocactus tuberosus** (Pfeiff.) Britton & Rose f. **tuberosus**

[Opuntia tuna (L.) Mill.]
Sin.: *Cactus tuna* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Opuntia tuna-blanca Speg. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **ficus-indica**

Opuntia tunicata (Lehm.) Pfeiff. = **Cylindropuntia tunicata** (Lehm.) F.M. Knuth
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia tunicata (Lehm.) Pfeiff. var. *chilensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. = **Cylindropuntia tunicata** (Lehm.) F.M. Knuth

Opuntia turpinii Lem. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Opuntia utkilio Speg. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **utkilio** (Speg.) R. Kiesling

Opuntia verschaffeltii Cels ex F.A.C. Weber = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Opuntia verschaffeltii Cels ex F.A.C. Weber var. *digitalis* F.A.C. Weber = **Austrocylindropuntia verschaffeltii** (Cels ex F.A.C. Weber) Backeb.

Opuntia vestita Salm-Dyck = **Austrocylindropuntia vestita** (Salm-Dyck) Backeb.

[Opuntia viridirubra (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves]
Sin.: *Platyopuntia viridirubra* F. Ritter
Notas: Nombre dudoso.

Opuntia vulpina F.A.C. Weber = **Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **hildmannii** (Fric) Backeb.

Opuntia wagenknechtii (F. Ritter) D.R. Hunt = **Maihueniopsis wagenknechtii** F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Opuntia wagneri F.A.C. Weber ex Rol.-Goss. = **Opuntia salmiana** Parm.

Opuntia weberi Speg. = **Tephrocactus weberi** (Speg.) Backeb. var. **weberi**

Opuntia weberi Speg. var. *dispar* A. Cast. = **Tephrocactus weberi** (Speg.) Backeb. var. **weberi**

Opuntia weberi Speg. var. *setiger* (Backeb.) Backeb. = **Tephrocactus weberi** (Speg.) Backeb. var. **weberi**

Opuntia weingartiana Backeb. = **Austrocylindropuntia shaferi** (Britton & Rose) Backeb. var. **shaferi**

[Opuntia wetmorei Britton & Rose]
Notas: Nombre dudoso, posiblemente represente una forma anormal de *Maihueniopsis glomerata*.

Oreocereus (A. Berger) Riccob.

Número de especies: 6, 1 endémica

Oreocereus australis (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Sin.: *Arequipa australis* F. Ritter
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E., 1989.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1080* (SGO, U)].

Oreocereus bruennowii (Britton & Rose) Backeb. = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.
Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Kimnach, *Cereus celsianus* A. Berger, *Oreocereus bruennowii* (Britton & Rose) Backeb., *Oreocereus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. var. *bruennowii* Britton & Rose, *Oreocereus maximus* Backeb., *Oreocereus neocelsianus* Backeb., *Pilocereus celsianus* Lem. ex Salm-Dyck
Referencias: Backeberg, C., 1959b.
Arbusto suculento. Nativa. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 119* (LP)].

Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob. var. *bruennowii* Britton & Rose = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Oreocereus hempelianus (Gürke) D.R. Hunt
Sin.: *Arequipa hempeliana* (Gürke) Kreuz. & Buining, *Arequipa rettigii* (Quehl) Kreuz. & Buining, *Arequipa soehrensii* Kreuz. ex Backeb., nom. inval., *Arequipa weingartiana* (Backeb.) Kreuz. & Buining, *Echinopsis hempelianus* Gürke
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Arbusto suculento. Nativa. 2400–3700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2807* (CONC)].

Oreocereus hendriksenianus Backeb. = **Oreocereus leucotrichus** (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn. ex F. Ritter
Sin.: *Arequipa leucotricha* (Phil.) Britton & Rose, *Borzicactus hendriksenianus* (Backeb.) Kimnach, *Borzicactus leucotrichus* (Phil.) Kimnach, *Echinocactus leucotrichus* Phil., *Oreocereus hendriksenianus* Backeb.
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Arbusto suculento. Nativa. 2400–3500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2829* (CONC)].

Oreocereus maximus Backeb. = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Oreocereus neocelsianus Backeb. = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Oreocereus trollii (Kupper) Backeb.
Sin.: *Borzicactus celsianus* (Lem.) Riccob. var. *trollii* (Kupper) G.D. Rowley, *Borzicactus trollii* (Kupper) Kimnach, *Cereus trollii* Kupper
Referencias: Backeberg, C., 1959a.
Subarbusto suculento. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Marsoner, O. s.n.* (BA)].

Oreocereus variicolor Backeb.
Sin.: *Arequipa variicolor* (Backeb.) Backeb.
Referencias: Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J., Hoffmann, A. E., Muñoz-Schick, M. & Teillier A., S., 1998; Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Arbusto suculento. Nativa. 3000–3500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 123b* (ZSS)].

Parodia Speg.

Número de especies: 37, 35 endémicas

Parodia aconquijaensis Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia alacriportana Backeb. & Voll
Sin.: *Brasiliparodia alacriportana* (Backeb. & Voll) F. Ritter, *Brasiliparodia brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) F. Ritter, *Brasiliparodia buneckerii* (Buining) F. Ritter, *Brasiliparodia catarinensis* F. Ritter, *Notocactus alacriportanus* (Backeb. & Voll) Buxb., *Notocactus brevihamatus* (W. Haage ex Backeb.) Buxb., *Notocactus buneckerii* (Buining) Krainz, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia alacriportana* Backeb. & Voll subsp. *buneckerii* (Buining) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia*

alacriportana Backeb. & Voll subsp. *catarinensis* (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun, *Parodia brevihamata* W. Haage ex Backeb., *Parodia bueneckerii* Buining, *Parodia catarinensis* (F. Ritter) F.H. Brandt
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Parodia alacriportana Backeb. & Voll subsp. *brevihamata* (W. Haage ex Backeb.) Hofacker & P.J. Braun = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia alacriportana Backeb. & Voll subsp. *bueneckerii* (Buining) Hofacker & P.J. Braun = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll

Parodia alacriportana Backeb. & Voll subsp. *catarinensis* (F. Ritter) Hofacker & P.J. Braun = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia albofuscata F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia allosiphon (Marchesi) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus allosiphon* Marchesi
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Marchesi, E. 649* (MVFA)].

Parodia argerichana Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia atroviridis Backeb., nom. illeg. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia aureicentra Backeb.
Sin.: *Parodia aureicentra* Backeb. var. *muhrii* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *rauschii* (Backeb.) J.G. Lamb., *Parodia aureicentra* Backeb. var. *variicolor* (F. Ritter) J.G. Lamb., *Parodia muhrii* F.H. Brandt, *Parodia rauschii* Backeb., *Parodia uhligiana* Backeb., *Parodia variicolor* F. Ritter, *Parodia variicolor* F. Ritter var. *robustispina* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 137* (LP)].

Parodia aureicentra Backeb. var. *muhrii* (F.H. Brandt) J.G. Lamb. = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia aureicentra Backeb. var. *rauschii* (Backeb.) J.G. Lamb. = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia aureicentra Backeb. var. *variicolor* (F. Ritter) J.G. Lamb. = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia aureispina Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia aureispina Backeb. var. *australis* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia aureispina Backeb. var. *elegans* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia aureispina Backeb. var. *erythrostaminea* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia aureispina Backeb. var. *rubiflora* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia aureispina Backeb. var. *vulgaris* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia belenencis Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia betaniana F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia brevihamata W. Haage ex Backeb. = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia bueneckerii Buining = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia buiningii (Buxb.) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus buiningii* Buxb.
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: BRA[*Buining, A. F. H. 90* (U)].

Parodia caespitosa (Speg.) N.P. Taylor = **Parodia concinna** (Monv.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia campestris F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia capillitaensis F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia carambeiensis (Buining & Brederoo) Hofacker
Sin.: *Notocactus carambeiensis* Buining & Brederoo, *Notocactus villa-velhensis* (Backeb. & Voll) Slaba
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hort, F. J. A. 140a* (U)].

Parodia carapariana F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia carminata Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia catamarcensis Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia catamarcensis Backeb. var. *riojensis* (F. Ritter & Weskamp) J.G. Lamb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia catamarcensis Backeb. var. *rubriflora* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia catarinensis (F. Ritter) F.H. Brandt = **Parodia alacriportana** Backeb. & Voll
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia cebilarensis Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia chlorocarpa F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia chrysacanthion (K. Schum.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus chrysacanthion* K. Schum.
Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stümer 6131* (BA)].

Parodia claviceps (F. Ritter) F.H. Brandt
Sin.: *Eriocactus claviceps* F. Ritter, *Notocactus claviceps* (F. Ritter) Krainz
Referencias: Larroca, J., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Parodia concinna (Monv.) N.P. Taylor
Sin.: *Echinocactus apricus* Arechav., *Echinocactus concinnus* Monv., *Frailea caespitosa* (Speg.) Britton & Rose, *Notocactus apricus* (Arechav.) A. Berger, *Notocactus caespitosum* (Speg.) Backeb., *Notocactus concinnioides* Prauser, *Notocactus eremiticus* F. Ritter, *Notocactus gibberulus* Prestle, *Notocactus joadii* (Hook. f.) Herter, *Notocactus olimarensis* Prestle, *Notocactus rubrigemmatus* W.R. Abraham, *Parodia caespitosa* (Speg.) N.P. Taylor
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 15730* (MVFA)].

Parodia crassigiba (F. Ritter) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus arachnitis* F. Ritter, *Notocactus crassigibus* F. Ritter, *Notocactus meonacanthus* Prestle, *Notocactus uebelmannianus* Buining, *Notocactus uebelmannianus* Buining var. *pleiocephalus* N. Gerloff & G. König, *Parodia meonacantha* (Prestle) Hofacker, *Parodia werneri* Hofacker, *Parodia werneri* Hofacker subsp. *pleiocephala* (N. Gerloff & G. König) Hofacker
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ritter, F. 1394* (U)].

Parodia crucinigricentra Subík = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

[Parodia curvispina (F. Ritter) D.R. Hunt]
Sin.: *Notocactus curvispinus* F. Ritter
Notas: Nombre dudoso.

Parodia dextrohamata Backeb., nom. inval. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia dextrohamata Backeb. var. *stenopetala* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia dichroacantha F.H. Brandt & Weskamp, nom. inval. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia elachisantha (F.A.C. Weber) F.H. Brandt = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Parodia elegans Fechser ex Backeb., nom. inval. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

[Parodia erubescens (Osten) D.R. Hunt]
Sin.: *Echinocactus erubescens* Osten
Notas: Nombre dudoso.

Parodia erythrantha (Speg.) Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia erythrantha (Speg.) Backeb. var. *thionantha* (Speg.) Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

[Parodia faustiana Backeb.]
Notas: Nombre dudoso.

[Parodia faustiana Backeb. var. tenuispina Backeb.]
Notas: Nombre dudoso.

Parodia fechseri Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia formosa F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia friciana F.H. Brandt = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia fuscato-viridis Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia gigantea Krainz = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia glischrocarpa F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia graessneri (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Acanthocephala graessneri* (K. Schum.) Backeb., *Brasilicactus elachisanthus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Brasilicactus graessnerii* (K. Schum.) Backeb., *Dactylanthocactus graessneri* (K. Schum.) Y. Ito, *Echinocactus graessneri* K. Schum., *Malacocarpus graessneri* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus graessneri* (K. Schum.) A. Berger, *Parodia elachisantha* (F.A.C. Weber) F.H. Brandt, *Parodia haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt subsp. *graessneri* (K. Schum.) Hofacker & P.J. Braun
Referencias: Larroca, J., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: BRA(RGS).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Parodia grossei (K. Schum.) F.H. Brandt = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Parodia grossei (K. Schum.) F.H. Brandt var. *aureispina* (F. Ritter) F.H. Brandt = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Parodia gutekunstiana Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia haselbergii (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt
Sin.: *Brasilicactus haselbergii* (F. Haage) Backeb., *Echinocactus haselbergii* F. Haage ex Rümpler, *Malacocarpus haselbergii* (F. Haage) Britton & Rose, *Notocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) A. Berger, *Sericocactus haselbergii* (F. Haage ex Rümpler) Y. Ito
Referencias: Larroca, J., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Parodia haselbergii (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt subsp. *graessneri* (K. Schum.) Hofacker & P.J. Braun = **Parodia graessneri** (K. Schum.) F.H. Brandt

Parodia herteri (Werderm.) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus herteri* (Werderm.) Buining & Kreuz., *Notocactus pseudoherteri* Buining, *Notocactus rubriflorus* Berger
Referencias: Backeberg, C., 1959b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mueller s.n.* (MO)]; URY[*Herter, G. 94976* (MO)].

Parodia herzogii Rausch = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia heteracantha F. Ritter & Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia horrida F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia horstii (F. Ritter) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus horstii* F. Ritter, *Notocactus purpureus* F. Ritter
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 1269* (*)].

Parodia hummeliana A.B. Lau & Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia jujuyana Fric = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia kilianana Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia kilianana Backeb. var. *rigida* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia lembckeri Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia leninghausii (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Echinocactus leninghausii* K. Schum., *Eriocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb., *Notocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb.
Referencias: Larroca, J., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Parodia liliputana (Werderm.) N.P. Taylor = **Blossfeldia liliputana** Werderm.

Parodia linkii (Lehm.) R. Kiesling
Sin.: *Cactus linkii* Lehm., *Echinocactus linkii* (Lehm.) Pfeiff., *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter, *Notocactus linkii* (Lehm.) Herter f. *multiflorus* (Fric ex Buining) F. Ritter, *Notocactus megapotamicus* (Osten) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger var. *megapotamicus* (Osten) Buining
Referencias: Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA, PAI); URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 1815* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 7986* (HBR)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar ejemplar de referencia (Kiesling, 1995).

Parodia lohaniana A.B. Lau & Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia maassii (Heese) A. Berger
Sin.: *Echinocactus escayachensis* Vaupel, *Echinocactus maassii* Heese, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *carminatiflora* F. Ritter, *Parodia maassii* (Heese) A. Berger var. *schaferi* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990b.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 9432* (LP)].

Parodia maassii (Heese) A. Berger var. *carminatiflora* F. Ritter = **Parodia maassii** (Heese) A. Berger

Parodia maassii (Heese) A. Berger var. *schaferi* F. Ritter = **Parodia maassii** (Heese) A. Berger

Parodia macrancistra (K. Schum.) Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia magnifica (F. Ritter) F.H. Brandt
Sin.: *Eriocactus magnificus* F. Ritter, *Notocactus magnificus* (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Larroca, J., 1998.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 1270* (U)].

Parodia malyana Rausch = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia malyana Rausch var. *rubriflora* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia mammulosa (Lem.) N.P. Taylor
Sin.: *Echinocactus floricomus* Arechav., *Echinocactus mammulosus* Lem., *Notocactus floricomus* (Arechav.) Backeb., *Notocactus mammulosus* (Lem.) A. Berger, *Notocactus mueller-moelleri* Backeb. & F.M. Knuth, *Notocactus paulus* Schlosser & Brederoo, *Notocactus roseoluteus* Vliet
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(ART, CAS, CLA, DUR, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zanin, A. 42* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 721* (SI)].

Parodia mammulosa (Lem.) N.P. Taylor subsp. *eugeniae* (Vliet) Hofacker = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia meonacantha (Prestle) Hofacker = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor

Parodia mercedesiana Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia mesembrina F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia mesembrina F.H. Brandt var. *juanensis* Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *aurantiaca* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *cafayatensis* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *erytrantha* (Speg.) Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *macrancistra* (K. Schum.) Borg = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *microthele* (Backeb.) Krainz = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *opulenta* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *rigidissima* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. var. *weberiana* (F.H. Brandt) J.G. Lamb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Sin.: *Parodia dextrohamata* Backeb., nom. inval., *Parodia dichroacantha* F.H. Brandt & Weskamp, nom. inval., *Parodia fuscato-viridis* Backeb., *Parodia gutekunstiana* Backeb., *Parodia heteracantha* F. Ritter & Weskamp, *Parodia horrida* F.H. Brandt, *Parodia hummeliana* A.B. Lau & Weskamp, *Parodia kilianana* Backeb., *Parodia kilianana* Backeb. var. *rigida* F.H. Brandt, *Parodia lohaniana* A.B. Lau & Weskamp, *Parodia piltziorum* Weskamp, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt, *Parodia rigida* Backeb., *Parodia tolombana* Weskamp

Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990a.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Sin.: *Echinocactus microspermus* F.A.C. Weber var. *erythranthus* Speg., *Echinocactus microspermus* F.A.C. Weber var. *thionanthus* Speg., *Echinopsis microspermus* F.A.C. Weber, *Parodia aconquijaensis* Weskamp, *Parodia albofuscata* F.H. Brandt, *Parodia argerichana* Weskamp, *Parodia atroviridis* Backeb., nom. illeg., *Parodia aureispina* Backeb., *Parodia aureispina* Backeb. var. *australis* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *elegans* Backeb., *Parodia aureispina* Backeb. var. *erythrostaminea* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *rubiflora* F.H. Brandt, *Parodia aureispina* Backeb. var. *vulgaris* F.H. Brandt, *Parodia belenencis* Weskamp, *Parodia betaniana* F. Ritter, *Parodia campestris* F.H. Brandt, *Parodia capillitaensis* F.H. Brandt, *Parodia carapariana* F.H. Brandt, *Parodia carminata* Backeb., *Parodia catamarcensis* Backeb., *Parodia catamarcensis* Backeb. var. *riojensis* (F. Ritter & Weskamp) J.G. Lamb., *Parodia catamarcensis* Backeb. var. *rubriflora* Backeb., *Parodia cebilarensis* Weskamp, *Parodia chlorocarpa* F. Ritter, *Parodia dextrohamata* Backeb. var. *stenopetala* Backeb., *Parodia elegans* Fechser ex Backeb., nom. inval., *Parodia erythrantha* (Speg.) Backeb., *Parodia erythrantha* (Speg.) Backeb. var. *thionantha* (Speg.) Backeb., *Parodia fechseri* Backeb., *Parodia formosa* F. Ritter, *Parodia glischrocarpa* F. Ritter, *Parodia herzogii* Rausch, *Parodia lembckeri* Weskamp, *Parodia macrancistra* (K. Schum.) Backeb., *Parodia malyana* Rausch, *Parodia malyana* Rausch var. *rubriflora* F.H. Brandt, *Parodia mercedesiana* Weskamp, *Parodia mesembrina* F.H. Brandt, *Parodia mesembrina* F.H. Brandt var. *juanensis* Weskamp, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *aurantiaca* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *cafayatensis* Backeb., *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *erytrantha* (Speg.) Weskamp, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *macrancistra* (K. Schum.) Borg, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *microthele* (Backeb.) Krainz, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *opulenta* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *rigidissima* F.H. Brandt, *Parodia microsperma* (F.A.C. Weber) Speg. var. *weberiana* (F.H. Brandt) J.G. Lamb., *Parodia microthele* Backeb., *Parodia minima* Rausch, nom. illeg., *Parodia minuscula* Rausch, *Parodia mutabilis* Backeb., *Parodia mutabilis* Backeb. var. *carneospinosa* Backeb., *Parodia mutabilis* Backeb. var. *sanguiniflora* (Backeb.) F.H. Brandt, *Parodia nana* Weskamp, *Parodia pachysa* F.H. Brandt, *Parodia papagayana* F.H. Brandt, *Parodia parvula* F.H. Brandt, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt var. *erythroflora* F.H. Brandt, *Parodia pluricentralis* F.H. Brandt var. *xanthoflora* F.H. Brandt, *Parodia pusilla* F.H. Brandt, *Parodia riojensis* F. Ritter & Weskamp, *Parodia rubellihamata* Backeb. var. *aureiflora* Backeb., *Parodia rubellihamata* Backeb., nom. inval., *Parodia rubriflora* Backeb., nom. inval., *Parodia rubristraminea* F. Ritter, *Parodia saint-pieana* Backeb., *Parodia sanagasta* Weing., *Parodia sanagasta* Weing. var. *saltensis* F.H. Brandt, *Parodia sanagasta* Weing. var. *viridior* Backeb., *Parodia sanguiniflora* Backeb., *Parodia sanguiniflora* Backeb. var. *comata* F. Ritter, *Parodia scopaoides* Backeb., *Parodia setifera* Backeb., *Parodia setifera* Backeb. var. *longihamata* Werderm., *Parodia setifera* Backeb. var. *nigricentra* Backeb., *Parodia spanisa* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt, *Parodia spegazziniana* F.H. Brandt var. *aurea* F.H. Brandt, *Parodia superba* F.H. Brandt, *Parodia tafiensis* Backeb., *Parodia talaensis* F.H. Brandt, *Parodia thionantha* F.H. Brandt, *Parodia tuberculosi-costata* Backeb., *Parodia tuberculosi-costata* Backeb. var. *amblayana* F.H. Brandt, *Parodia tucumanensis* Weskamp, *Parodia uebelmanniana* F. Ritter, *Parodia wagneriana* Weskamp, *Parodia weberiana* F.H. Brandt, *Parodia weskampiana* Krasucka & Spanoswski, *Parodia winbergii* Weskamp

Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990a.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9331* (SI)].

Parodia microthele Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia minima Rausch, nom. illeg. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia minuscula Rausch = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia mueller-melchersii (Backeb.) N.P. Taylor

Sin.: *Notocactus eugeniae* Vliet, *Notocactus gutierrezii* W.R. Abraham, *Notocactus mueller-melchersii* Backeb., *Notocactus roseiflorus* Schloss. & Brederoo, *Notocactus rutilans* Däniker & Krainz, *Notocactus veenianus* Vliet, *Notocactus winkleri* Vliet, *Parodia mammulosa* (Lem.) N.P. Taylor subsp. *eugeniae* (Vliet) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *gutierrezii* (W.R. Abraham) Hofacker, *Parodia mueller-melchersii* (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *winkleri* (Vliet) Hofacker, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor, *Parodia rutilans* (Däniker & Krainz) N.P. Taylor subsp. *veeniana* (Vliet) Hofacker

Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(RGS); URY(MON, RIV, TAC).

Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Parodia mueller-melchersii (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *gutierrezii* (W.R. Abraham) Hofacker = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia mueller-melchersii (Backeb.) N.P. Taylor subsp. *winkleri* (Vliet) Hofacker = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia muhrii F.H. Brandt = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia mutabilis Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia mutabilis Backeb. var. *carneospinosa* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia mutabilis Backeb. var. *sanguiniflora* (Backeb.) F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia nana Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia nigrispina (K. Schum.) F.H. Brandt
Sin.: *Echinocactus nigrispinus* K. Schum., *Eriocactus nigrispinus* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval., *Malacocarpus nigrispinus* (K. Schum.) Britton & Rose, *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) Buining, nom. inval., *Notocactus nigrispinus* (K. Schum.) G. Schaeff., *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric f. *nigrispinus* (K. Schum.) Neduchal, *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric var. *nigrispinus* (K. Schum.) Y. Ito
Referencias: Metzing, D., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: PRY(COA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 21253* (CTES, SI)].

Parodia nivosa Backeb.
Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrari, O. 46/86* (SI)].

Parodia notorauschii D.R. Hunt
Sin.: *Notocactus rauschii* Vliet, *Notocactus spinibarbis* F. Ritter
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(RIV).
Ejemplares de referencia: URY[*Rausch, W. 34* (U)].

Parodia ottonis (Lehm.) N.P. Taylor
Sin.: *Cactus ottonis* Lehm., *Echinocactus arechavaletae* Speg., *Echinocactus ottonis* (Lehm.) Link & Otto, *Malacocarpus ottonis* (Lehm.) Britton & Rose, *Notocactus arechavaletae* (Speg.) Herter, *Notocactus ottonis* (Lehm.) A. Berger
Referencias: Kiesling, R., 1995, 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15288* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13515* (HBR, US)]; PRY[*Kiesling, R. 9857* (PY, SI)]; URY[*Nyffeler, R. 1474* (MVJB)].

Parodia oxicostata (Buining & Brederoo) Hofacker
Sin.: *Notocactus oxicostatus* Buining & Brederoo
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 229* (U)].

Parodia pachysa F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia papagayana F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia parvula F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia penicillata Fechser & Steeg
Sin.: *Parodia penicillata* Fechser & Steeg var. *fulviceps* Backeb., *Parodia penicillata* Fechser & Steeg var. *nivosa* Fechser
Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Parodia penicillata Fechser & Steeg var. *fulviceps* Backeb. = **Parodia penicillata** Fechser & Steeg

Parodia penicillata Fechser & Steeg var. *nivosa* Fechser = **Parodia penicillata** Fechser & Steeg

Parodia piltziorum Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia pluricentralis F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia pluricentralis F.H. Brandt var. *erythroflora* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia pluricentralis F.H. Brandt var. *xanthoflora* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia pseudostuemeri Backeb. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia pusilla F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia rauschii Backeb. = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia rechensis (Buining) F.H. Brandt
Sin.: *Brasiliparodia rechensis* (Buining) F. Ritter, *Notocactus rechensis* Buining
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bueneker s.n.* (U)].

Parodia rigida Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

[Parodia rigidispina Krainz]
Notas: Nombre dudoso.

Parodia riojensis F. Ritter & Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia rubellihamata Backeb., nom. inval. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia rubellihamata Backeb. var. *aureiflora* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia rubricentra Backeb. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia rubriflora Backeb., nom. inval. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia rubristraminea F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia rudibuenekeri (W.R. Abraham) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus glomeratus* N. Gerloff, *Notocactus rudibuenekeri* W.R. Abraham
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bueneker 355* (KOELN)].

Parodia rutilans (Däniker & Krainz) N.P. Taylor = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia rutilans (Däniker & Krainz) N.P. Taylor subsp. *veeniana* (Vliet) Hofacker = **Parodia mueller-melchersii** (Backeb.) N.P. Taylor

Parodia saint-pieana Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia sanagasta Weing. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia sanagasta Weing. var. *saltensis* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia sanagasta Weing. var. *viridior* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia sanguiniflora Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia sanguiniflora Backeb. var. *comata* F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia schuetziana Jajó = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia schumanniana (Nicolai) F.H. Brandt
Sin.: *Chrysocactus schumannianus* (Nicolai) Y. Ito, *Echinocactus buchheimianus* Quehl, *Echinocactus grossei* K. Schum., *Echinocactus schumannianus* Nicolai, *Eriocactus grossei* (K. Schum.) Backeb. var. *aureispinus* F. Ritter, *Eriocactus schumannianus* (Nicolai) Backeb., nom. illeg., *Eriocactus warasii* F. Ritter, *Eriocephala grossei* (K. Schum.) Y. Ito, *Eriocephala schumanniana* (Nicolai) Backeb., nom. inval., *Malacocarpus grossei* (K. Schum.) Britton & Rose, *Malacocarpus schumannianus* (Nicolai) Britton & Rose, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric f. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun. ex Havlicek, *Notocactus grossei* (K. Schum.) Fric var. *aureispinus* (F. Ritter) J. Theun., *Notocactus schumannianus* (Nicolai) Fric, *Notocactus warasii* (F. Ritter) Hewitt & Donald, *Parodia grossei* (K. Schum.) F.H. Brandt, *Parodia grossei* (K. Schum.) F.H. Brandt var. *aureispina* (F. Ritter) F.H. Brandt, *Parodia warasii* (F. Ritter) F.H. Brandt
Referencias: Kiesling, R., 1995; Metzing, D., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; PRY[*Brunner, D. R. 1268* (SI)].

Parodia scopa (Spreng.) N.P. Taylor
Sin.: *Echinocactus scopa* Spreng., *Notocactus scopa* (Spreng.) Backeb., *Notocactus soldtianus* Vliet
Referencias: Hunt, D. R., 1999.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 15729* (MVFA)].

Parodia scopaoides Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia scoparia F. Ritter = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia setifera Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia setifera Backeb. var. *longihamata* Werderm. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia setifera Backeb. var. *nigricentra* Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia setosa Backeb. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia spanisa F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia spegazziniana F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia spegazziniana F.H. Brandt var. *aurea* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia stockingeri (Prestle) Hofacker & P.J. Braun
Sin.: *Notocactus stockingeri* Prestle
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Stockinger 141* (U)].

Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus stuemeri* Werderm., *Parodia crucinigricentra* Subík, *Parodia friciana* F.H. Brandt, *Parodia gigantea* Krainz, *Parodia jujuyana* Fric, *Parodia pseudostuemeri* Backeb., *Parodia rubricentra* Backeb., *Parodia schuetziana* Jajó, *Parodia scoparia* F. Ritter, *Parodia setosa* Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.) Backeb. var. *robustior* Backeb., *Parodia stuemeri* (Werderm.) Backeb. var. *tilcarensis* Werderm. & Backeb., *Parodia tilcarensis* (Werderm. & Backeb.) Backeb.
Referencias: Kiesling, R. & Ferrari, O., 1990b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4017* (SI)].

Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb. var. *robustior* Backeb. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia stuemeri (Werderm.) Backeb. var. *tilcarensis* Werderm. & Backeb. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia submammulosa (Lem.) R. Kiesling subsp. **minor** R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4704* (SI)].

Parodia submammulosa (Lem.) R. Kiesling subsp. **submammulosa**
Sin.: *Echinocactus mammulosus* Lem. var. *pampeana* Speg., *Echinocactus mammulosus* Lem. var. *submammamulosus* (Lem.) Speg., *Echinocactus pampeanus* Speg., *Echinocactus submammulosus* Lem., *Notocactus mammulosus* (Lem.) A. Berger var. *pampeanus* (Speg.) A. Cast., *Notocactus pampeanus* (Speg.) Backeb., *Notocactus submammulosus* (Lem.) Backeb., *Notocactus submammulosus* (Lem.) Backeb. var. *pampeanus* (Speg.) Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1995.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Parodia superba F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia tabularis (Ruempler) D.R. Hunt
Sin.: *Echinocactus tabularis* Ruempler, *Notocactus bommeljei* Vliet, *Notocactus brederooianus* Prestle, *Notocactus tabularis* (Ruempler) D.R. Hunt, *Parodia tabularis* (Ruempler) D.R. Hunt subsp. *bommeljei* (Vliet) Hofacker
Referencias: Hunt, D. R., 1999.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 16886* (MVM)].

Parodia tabularis (Ruempler) D.R. Hunt subsp. *bommeljei* (Vliet) Hofacker = **Parodia tabularis** (Ruempler) D.R. Hunt

Parodia tafiensis Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia talaensis F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia tenuicylindrica (F. Ritter) D.R. Hunt
Sin.: *Notocactus minimus* Fric & Kreuz. ex Buining, *Notocactus tenuicylindricus* F. Ritter
Referencias: Hunt, D. R., 2006.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 1361* (U)].

Parodia thionantha F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia tilcarensis (Werderm. & Backeb.) Backeb. = **Parodia stuemeri** (Werderm.) Backeb.

Parodia tolombana Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **horrida** (F.H. Brandt) R. Kiesling & O. Ferrari

Parodia tuberculosi-costata Backeb. = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia tuberculosi-costata Backeb. var. *amblayana* F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia tucumanensis Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia turecekiana R. Kiesling
Sin.: *Notocactus turecekianus* (R. Kiesling) W.R. Abraham
Referencias: Kiesling, R., 1995, 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5933* (SI)].
Notas: Citada para Uruguay sin mencionar ejemplar de referencia (Kiesling, 2005).

Parodia uebelmanniana F. Ritter = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia uhligiana Backeb. = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia variicolor F. Ritter = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia variicolor F. Ritter var. *robustispina* F. Ritter = **Parodia aureicentra** Backeb.

Parodia wagneriana Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia warasii (F. Ritter) F.H. Brandt = **Parodia schumanniana** (Nicolai) F.H. Brandt

Parodia weberiana F.H. Brandt = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia wedermanniana (Herter) N.P. Taylor
Sin.: *Notocactus ferrugieneus* Schlosser, *Notocactus vanvlietii* Rausch, *Notocactus wedermannianus* Herter
Referencias: Hunt, D. R., 1999.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(DUR, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Walther, K. 16012* (MVM)].

Parodia werneri Hofacker = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia werneri Hofacker subsp. *pleiocephala* (N. Gerloff & G. König) Hofacker = **Parodia crassigiba** (F. Ritter) N.P. Taylor
Referencias: Hunt, D. R., 2006.

Parodia weskampiana Krasucka & Spanoswski = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Parodia winbergii Weskamp = **Parodia microsperma** (F.A.C. Weber) Speg. subsp. **microsperma**

Pereskia Mill.

Número de especies: 3

Pereskia aculeata Mill.
Sin.: *Cactus pereskia* L., *Pereskia pereskia* (L.) H. Karst., nom. illeg.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Kiesling, R., 2005; Leuenberger, B. E., 1986; Scheinvar, L., 1985.
Arbusto suculento. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1070* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 47549* (CTES)]; PRY[*Aguayo, A. 484* (SI)].

Pereskia amapola F.A.C. Weber = **Pereskia nemorosa** Rojas Acosta

Pereskia amapola F.A.C. Weber var. *argentina* (F.A.C. Weber) Weing. = **Pereskia nemorosa** Rojas Acosta

Pereskia argentina F.A.C. Weber = **Pereskia nemorosa** Rojas Acosta

Pereskia nemorosa Rojas Acosta
Sin.: *Pereskia amapola* F.A.C. Weber, *Pereskia amapola* F.A.C. Weber var. *argentina* (F.A.C. Weber) Weing., *Pereskia argentina* F.A.C. Weber
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Kiesling, R., 2005; Leuenberger, B. E., 1986.
Arbusto suculento. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(APY, APA, AMA, CEN, COA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 142* (BAB, SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 910* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 976* (NY)].

Pereskia pereskia (L.) H. Karst., nom. illeg. = **Pereskia aculeata** Mill.

Pereskia pflanzii Vaupel = **Quiabentia verticillata** (Vaupel) Borg

Pereskia philippii F.A.C. Weber = **Maihuenia poeppigii** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Pereskia poeppigii Salm-Dyck = **Maihuenia poeppigii** (Otto ex Pfeiff.) K. Schum.
Referencias: Hoffmann, A. E., 1989.

Pereskia sacharosa Griseb.
Sin.: *Rhodocactus sacharosa* (Griseb.) Backeb.
Referencias: Leuenberger, B. E., 1986.
Arbusto suculento. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 734* (CORD, MCNS)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 4392* (G, SI)].

Pereskia verticillata Vaupel = **Quiabentia verticillata** (Vaupel) Borg

Pfeiffera Salm-Dyck
Número de especies: 1

Pfeiffera cereiformis Salm-Dyck = **Pfeiffera ianthothele** (Monv.) F.A.C. Weber

Pfeiffera ianthothele (Monv.) F.A.C. Weber
Sin.: *Cereus ianthothele* Monv., *Lepismium ianthothele* (Monv.) Barthlott, *Pfeiffera cereiformis* Salm-Dyck, *Rhipsalis cereiformis* (Salm-Dyck) C.F. Först., *Rhipsalis ianthothele* (Monv.) F.H. Brandt
Referencias: Castellanos, A & Lelong, H., 1943.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3353* (SI)].

Pfeiffera monacantha (Griseb.) P.V. Heath = **Rhipsalis monacantha** Griseb.

Philippicereus castaneus (Phil.) Backeb. = **Eulychnia castanea** Phil.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

[Phyllocactus oxypetalos (DC.) Link]
Sin.: *Cereus oxypetalus* DC.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Phyllocactus phyllanthus (L.) Link = **Epiphyllum phyllanthus** (L.) Haw.

Phyllocactus phyllanthus (L.) Link var. *paraguayense* F.A.C. Weber = **Epiphyllum phyllanthus** (L.) Haw.

Pilocereus celsianus Lem. ex Salm-Dyck = **Oreocereus celsianus** (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob.

Pilocereus erytrocephalus K. Schum. = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Pilocereus jauruensis Buining & Brederoo = **Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.

Pilocereus machrisii (Y. Dawson) Backeb. = **Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.

Pilocereus paraguayensis F. Ritter = **Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.

Pilocereus pasacana F.A.C. Weber = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Pilocereus rhodacanthus (Salm-Dyck) Speg. = **Denmoza rhodacantha** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Pilocereus terscheckii Parm. ex Pfeiff. = **Trichocereus terscheckii** (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose

Pilocopiapoa solaris F. Ritter = **Copiapoa solaris** (F. Ritter) F. Ritter
Referencias: Graham, C., 1998.

Pilosocereus Byles & G.D. Rowley
Número de especies: 1

Pilosocereus jauruensis (Buining & Brederoo) P.J. Braun = **Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.

Pilosocereus machrisii (Y. Dawson) Backeb.
Sin.: *Cephalocereus machrisii* Y. Dawson, *Pilocereus jauruensis* Buining & Brederoo, *Pilocereus machrisii* (Y. Dawson) Backeb., *Pilocereus paraguayensis* F. Ritter, *Pilosocereus jauruensis* (Buining & Brederoo) P.J. Braun, *Pseudopilocereus machrisii* (Y. Dawson) Buxb.
Arbusto suculento. Nativa. 0–700 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Nicora, E. G. 9807* (G, SI)].

Piptanthocereus aethiops (Haw.) F. Ritter, nom. illeg. = **Cereus aethiops** Haw.

Piptanthocereus dayami (Speg.) F. Ritter, nom. illeg. = **Cereus stenogonus** K. Schum.

Piptanthocereus forbesii (Otto ex C.F. Först.) Riccob., nom. illeg. = **Cereus forbesii** Otto ex C.F. Först.

Piptanthocereus uruguayanus F. Ritter, nom. illeg. = **Cereus uruguayanus** R. Kiesling

Platyopuntia brunneogemmia F. Ritter = **Opuntia brunneogemmia** (F. Ritter) Schlindwein

Platyopuntia chilensis F. Ritter, nom. illeg. = **Tunilla chilensis** (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Platyopuntia cordobensis (Speg.) F. Ritter, nom. illeg. = **Opuntia ficus-indica** (L.) Mill. f. **amyclaea** (Ten.) Schelle

Platyopuntia corrugata (Salm-Dyck) F. Ritter, nom. illeg. = **Tunilla corrugata** (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff

Platyopuntia ianthinantha F. Ritter, nom. illeg. = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

Platyopuntia kiska-loro (Speg.) F. Ritter, nom. illeg. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **kiska-loro** (Speg.) R. Kiesling

Platyopuntia limitata F. Ritter = **Opuntia limitata** (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves

Platyopuntia nigrispina (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg. = **Maihueniopsis nigrispina** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Platyopuntia pituitosa F. Ritter, nom. illeg. = **Opuntia pituitosa** (F. Ritter) J. Iliff

Platyopuntia pyrrhantha F. Ritter = **Opuntia pyrrhantha** (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves

Platyopuntia quimilo (K. Schum.) F. Ritter, nom. illeg. = **Opuntia quimilo** K. Schum.

Platyopuntia retrorsa (Speg.) F. Ritter, nom. illeg. = **Opuntia anacantha** Speg. var. **retrorsa** (Speg.) R. Kiesling

Platyopuntia salmiana (Parm.) F. Ritter, nom. illeg. = **Opuntia salmiana** Parm.

Platyopuntia soehrensii (Britton & Rose) F. Ritter, nom. illeg. = **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Platyopuntia soehrensii (Britton & Rose) F. Ritter, nom. illeg. var. *tilcarensis* (Backeb.) F. Ritter = **Tunilla tilcarensis** (Backeb.) D.R. Hunt & J. Iliff

Platyopuntia sulphurea (Gillies ex Salm-Dyck) F. Ritter = **Opuntia sulphurea** Gillies ex Salm-Dyck var. **sulphurea**

Platyopuntia viridirubra F. Ritter = **Opuntia viridirubra** (F. Ritter) P.J. Braun & Esteves

Praecereus euchlorus (F.A.C. Weber ex K. Schum.) N.P. Taylor = **Monvillea euchlora** (F.A.C. Weber ex K. Schum.) Backeb.

Praecereus saxicolus (Morong) N.P. Taylor = **Monvillea cavendischii** (Monv.) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Pseudolobivia ancistrophora (Speg.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Pseudolobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *elegans* (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Pseudolobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *fallax* (Oehme) Backeb. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **fallax** (Oehme) J. Ullmann

Pseudolobivia aurea (Britton & Rose) Backeb. var. *grandiflora* (Backeb.) Backeb., nom. illeg. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Pseudolobivia dulcis-pauli (Fric) Krainz, hom. illeg. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Pseudolobivia ferox (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Pseudolobivia grandis (Britton & Rose) Krainz = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Pseudolobivia hamatacantha (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia kermesina Krainz = **Echinopsis mamillosa** Gürke

Pseudolobivia kratochviliana (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia leucorhodantha (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia lobivioides (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia longispina (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Pseudolobivia longispina (Britton & Rose) Backeb. var. *nigra* (Backeb.) Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Pseudolobivia nigra (Backeb.) Backeb. = **Lobivia longispina** Britton & Rose

Pseudolobivia pelecyrhachys (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia pelecyrhachys (Backeb.) Backeb. var. *lobivioides* (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudolobivia polyancistra (Backeb.) Backeb. = **Echinopsis ancistrophora** Speg.

Pseudopilocereus machrisii (Y. Dawson) Buxb. = **Pilosocereus machrisii** (Y. Dawson) Backeb.

Pterocactus K. Schum.

Número de especies: 9 endémicas

Pterocactus araucanus A. Cast.
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 16812* (BA)].

Pterocactus australis (F.A.C. Weber) Backeb.
Sin.: *Opuntia australis* F.A.C. Weber
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 8986* (BA)]; CHL[*Saldivia, P. s.n.* (SGO)].

Pterocactus decipiens Gürke = **Pterocactus tuberosus** (Pfeiff.) Britton & Rose f. **tuberosus**

Pterocactus fischeri Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. s.n.* (NY)].

Pterocactus gonjianii R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 307* (LP)];

Pterocactus hickenii Britton & Rose
Sin.: *Opuntia skottsbergii* Britton & Rose, *Pterocactus skottsbergii* (Britton & Rose) Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Kiesling, R., 1982c, 2002.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 3284* (SI)]; CHL[*Kiesling, R. 9972* (CONC, SI)].

Pterocactus kuntzei K. Schum. = **Pterocactus tuberosus** (Pfeiff.) Britton & Rose f. **tuberosus**

Pterocactus kuntzei K. Schum. f. *lelongii* Ruiz Leal ex R. Kiesling = **Pterocactus tuberosus** (Pfeiff.) Britton & Rose f. **lelongii** (Ruiz Leal ex R. Kiesling) R. Kiesling

Pterocactus megliolii R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Volponi, C. R. 157* (LP)].

Pterocactus pumilus Britton & Rose = **Pterocactus valentinii** Speg.

Pterocactus reticulatus R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1073* (SI)].

Pterocactus skottsbergii (Britton & Rose) Backeb. = **Pterocactus hickenii** Britton & Rose

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose f. **lelongii** (Ruiz Leal ex R. Kiesling) R. Kiesling
Sin.: *Pterocactus kuntzei* K. Schum. f. *lelongii* Ruiz Leal ex R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 3828* (MERL)].

Pterocactus tuberosus (Pfeiff.) Britton & Rose f. **tuberosus**
Sin.: *Opuntia tuberosa* Pfeiff., *Pterocactus decipiens* Gürke, *Pterocactus kuntzei* K. Schum.
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9333* (SI)].

Pterocactus valentinii Speg.
Sin.: *Pterocactus pumilus* Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 1982c.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 3286* (SI)].

Puna R. Kiesling

Número de especies: 3, 2 endémicas

Puna bonniae D.J. Ferguson & R. Kiesling
Sin.: *Maihueniopsis bonnieae* (D.K. Ferguson & R. Kiesling) E.F. Anderson, *Opuntia bonnieae* (D.J. Ferguson & R. Kiesling) Halda & Janeba
Referencias: Ferguson, D. K. & Kiesling, R., 1997.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8710* (SI)].

Puna clavarioides (Pfeiff.) R. Kiesling
Sin.: *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb., *Austrocylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) Backeb. var. *ruiz-lealii* (A. Cast.) Backeb., *Cylindropuntia clavarioides* (Pfeiff.) F.M. Knuth, *Maihueniopsis clavarioides* (Pfeiff.) E.F. Anderson, *Opuntia clavarioides* Pfeiff., *Opuntia ruiz-lealii* A. Cast.
Referencias: Kiesling, R., 1982b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5608* (SI)].

Puna subterranea (R.E. Fr.) R. Kiesling
Sin.: *Cumulopuntia subterranea* (R.E. Fr.) F. Ritter, *Maihueniopsis subterranea* (R.E. Fr.) E.F. Anderson, *Opuntia subterranea* R.E. Fr., *Tephrocactus subterraneus* (R.E. Fr.) Backeb., *Tephrocactus variiflorus* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1982b.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 139* (LP)].

Pygmaeolobivia haagei (Fric & Schelle) Backeb. = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Pyrrhocactus A. Berger

Número de especies: 27 endémicas

Pyrrhocactus aconcaguensis F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus andicola (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus andicola (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus andicola (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus andicola (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus andreanus (Backeb.) F. Ritter, nom. illeg. = **Pyrrhocactus kattermannii** R. Kiesling

Pyrrhocactus aricensis (F. Ritter) Backeb. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Pyrrhocactus armatus F. Ritter = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus aspillagae (Söhrens) F. Ritter
Sin.: *Echinocactus aspillagae* Söhrens, *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt., *Eriosyce aspillagae* (Söhrens) Katt. subsp. *maechleri* H.E. Walter, *Neoporteria aspillagae* (Söhrens) Backeb., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *aspillagae* (Söhrens) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 237* (ZSS)].

[Pyrrhocactus atrospinosus Backeb., nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso.

Pyrrhocactus atroviridis F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus bulbocalyx (Werderm.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus bulbocalyx* Werderm., *Eriosyce bulbocalyx* (Werderm.) Katt., *Neoporteria bulbocalyx* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley
Referencias: Kattermann, F., 1994.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9067* (SI)].

Pyrrhocactus carrizalensis F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus catamarcensis (Speg.) F. Ritter
Sin.: *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *obscura* Speg., *Echinocactus catamarcensis* Speg. var. *pallida* Speg., *Pyrrhocactus melanaeanthus* Backeb., nom. inval.
Referencias: Kiesling, R., 2003b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9325* (SI)].

Pyrrhocactus chaniarensis F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. **albidiflorus** F. Ritter
Sin.: *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt. var. *albidiflorus* (F. Ritter) Katt.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 599* (SGO, U, ZSS)].

Pyrrhocactus chilensis (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**
Sin.: *Echinocactus chilensis* Hildm. ex K. Schum., *Eriosyce chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Katt., *Neochilenia chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Backeb., *Neoporteria chilensis* (Hildm. ex K. Schum.) Britton & Rose, *Pyrrhocactus krausii* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 599a* (ZSS)].

Pyrrhocactus choapensis F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus coliguayensis F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus confinis F. Ritter
Sin.: *Eriosyce confinis* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia confinis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria confinis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb. var. *confinis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 494* (SGO, U)].

Pyrrhocactus crispus F. Ritter
Sin.: *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus crispus* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria crispa* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *crispa* (F. Ritter) A.E. Hoffm.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 491* (U)].

Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.
Sin.: *Cactus curvispinus* Bertero ex Colla, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *choapensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *limariensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce limariensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *gracilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt. var. *lissocarpa* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus*

aconcaguensis (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus choapensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus curvispinus* (Bertero ex Colla) Backeb., *Neoporteria choapensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *aconcaguensis* (F. Ritter & Buining) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *coliguayensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *limariensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria litoralis* F. Ritter, *Pyrrhocactus aconcaguensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *descendens* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *mollensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus andicola* (F. Ritter) F. Ritter var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus choapensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus coliguayensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus grandiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus limariensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter, *Pyrrhocactus lissocarpus* F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pamaensis* F. Ritter

Referencias: Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 219* (SGO, U, ZSS)].

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. australis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. campanensis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. combarbalensis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. felipensis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger var. fusciflorus F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. mostazalensis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. nidularis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. santiagensis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus curvispinus (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb. var. tilamensis F. Ritter, nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Eriosyce*.

[Pyrrhocactus dubius Backeb., nom. inval.]
Sin.: *Neoporteria dubia* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Pyrrhocactus echinus F. Ritter
Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *echinus* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *echinus* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *glaucescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus glaucescens* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 400–800 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 537* (SGO, U, ZSS)].

Pyrrhocactus engleri (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Eriosyce engleri* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus engleri* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *engleri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria engleri* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1900 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 235* (SGO, ZSS)].

Pyrrhocactus eriosyzoides (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *carrizalensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *huascensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce crispa* (F. Ritter) Katt. var. *totoralensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman subsp. *atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *carrizalensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *huascensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *totoralensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce eriosyzoides* (F. Ritter) Ferryman var. *transitensis* (F. Ritter) A. Hoffm. & H. Walter, *Eriosyce kunzei* (C.F. Först.) Katt. var. *transitensis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce kunzei* auct. non (C.F. Först.) Katt., *Horridocactus atroviridis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus carrizalensis* (F. Ritter) Backeb., *Horridocactus eriosyzoides* F. Ritter, *Neochilenia*

huascensis (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia totoralensis* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia transitensis* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria atroviridis* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria carrizalensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *totoralensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria eriosyzoides* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria huascensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *huascensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria kunzei* (C.F. Först.) Backeb., *Neoporteria totoralensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria totoralensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *carrizalensis* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A. Hoffm., nom. illeg., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *atroviridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *domeykoensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria vallenarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm. var. *transitensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus atroviridis* F. Ritter, *Pyrrhocactus carrizalensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus eriosyzoides* (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus huascensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus kunzei* (C.F. Först.) Y. Ito, *Pyrrhocactus totoralensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus transiens* F. Ritter

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 3017* (CONC), *Ritter, F. 493* (U)].

Pyrrhocactus eriosyzoides (F. Ritter) F. Ritter var. *domeykoensis* F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus floccosus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *floccosa* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria eriocephala* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *floccosa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus floccosus* F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 545* (U, ZSS)].

Pyrrhocactus floccosus F. Ritter var. *minor* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus floccosus** F. Ritter

Pyrrhocactus floribundus (Backeb.) F. Ritter, nom. inval. = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Pyrrhocactus garaventai (F. Ritter) F. Ritter

Sin.: *Eriosyce garaventae* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus garaventai* F. Ritter, *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *garaventae* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria garaventae* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria subaiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 467* (U, ZSS)].

Pyrrhocactus glaucescens F. Ritter = **Pyrrhocactus echinus** F. Ritter

Pyrrhocactus gracilis F. Ritter = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Pyrrhocactus grandiflorus F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus heinrichianus (Backeb.) F. Ritter

Sin.: *Chilenia jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Backeb., *Chilenia occulta* (Phil.) Backeb., *Echinocactus occultus* Phil., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *intermedia* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. var. *setosiflora* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria chorosensis* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria deherdtiana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria dimorpha* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose, *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chaniarensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *chorosensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *dimorpha* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *setosiflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *trapichensis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *wagenknechtii* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria occulta* (Phil.) Britton & Rose, *Neoporteria ritteri* Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria setosiflora* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus chaniarensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Pyrrhocactus jussieui* (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spinosior* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus setosiflorus* F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter, *Pyrrhocactus trapichensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus wagenknechtii* F. Ritter

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 3080* (CONC)].

Pyrrhocactus horridus Backeb., nom. inval. = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus horridus (Gay) Backeb. f. *vegasanus* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus horridus (Gay) Backeb. var. *aconcaguensis* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus horridus (Gay) Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus horridus (Gay) Backeb. var. *orientalis* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus horridus (Gay) Backeb. var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus huascensis F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Pyrrhocactus jussieui (Monv. ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *spinosior* F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Pyrrhocactus kattermannii R. Kiesling
Sin.: *Acanthocalycium andreaeanum* (Backeb.) Donald, nom. inval., *Eriosyce andreana* Katt., *Neochilenia andreana* Backeb., nom. inval., *Neoporteria andreana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg., *Pyrrhocactus andreanus* (Backeb.) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Kattermann, F., 1994.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9383* (SI)].

Pyrrhocactus krausii F. Ritter = **Pyrrhocactus chilensis** (Hildm. ex K. Schum.) F. Ritter var. **chilensis**

Pyrrhocactus kunzei (C.F. Först.) Y. Ito = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus limariensis F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus lissocarpus F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus lissocarpus F. Ritter var. *gracilis* F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus marayesensis (Backeb.) J.G. Lamb. = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Pyrrhocactus marksianus F. Ritter
Sin.: *Eriosyce marksiana* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *lissocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria curvispina* (Bertero ex Colla) Donald & G.D. Rowley var. *marksiana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria marksiana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus marksianus* F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter, *Pyrrhocactus truncatipetalus* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 234* (U, ZSS)].

Pyrrhocactus marksianus F. Ritter var. *tunensis* F. Ritter = **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Pyrrhocactus megliolii Rausch = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Pyrrhocactus melanaeanthus Backeb., nom. inval. = **Pyrrhocactus catamarcensis** (Speg.) F. Ritter

Pyrrhocactus neohankeanus F. Ritter = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus neohankeanus F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus neohankeanus F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus neohankeanus F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus occultus F. Ritter, nom. inval. = **Pyrrhocactus philippianus** Faúndez

Pyrrhocactus occultus F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter, nom. inval. = **Pyrrhocactus philippianus** Faúndez

Pyrrhocactus odoriflorus F. Ritter = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus pachacoensis Rausch
Sin.: *Echinocactus catamarcensis* Speg., nom. illeg., *Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt. var. *pachacoensis* (Rausch) Katt., *Malacocarpus catamarcensis* (Speg.) Britton & Rose
Referencias: Kattermann, F., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31154* (SI)].

Pyrrhocactus pamaensis F. Ritter = **Pyrrhocactus curvispinus** (Bertero ex Colla) A. Berger ex Backeb.

Pyrrhocactus paucicostatus (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Delaetia woutersiana* Backeb., nom. inval., *Eriosyce paucicostata* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pauciscostata* (F. Ritter) Katt., *Horridocactus paucicostatus* F. Ritter, *Neochilenia paucicostata* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria fusca* (Muehlenpf.) Britton & Rose, *Neoporteria haenkeana* (C.F. Först.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria neohankeana* (F. Ritter) Ferryman, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *neohankeana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria paucicostata* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *viridis* (F. Ritter) A.E. Hoffm.,

Neoporteria woutersiana (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *densispinus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *elongatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus neohankeanus* F. Ritter var. *flaviflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus paucicostatus* (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 212* (ZSS)].

Pyrrhocactus paucicostatus (F. Ritter) F. Ritter var. *viridis* (F. Ritter) F. Ritter = **Pyrrhocactus paucicostatus** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus philippianus Faúndez

Sin.: *Eriosyce occulta* Katt., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter var. *spinosior* F. Ritter, nom. inval., *Pyrrhocactus occultus* F. Ritter, nom. inval.

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 267* (ZSS)].

Pyrrhocactus pilispinus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. subsp. *pilispina* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pilispina* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria pilispina* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 217* (SGO, ZSS)].

Pyrrhocactus platyacanthus F. Ritter = **Pyrrhocactus strausianus** (K. Schum.) A. Berger

Pyrrhocactus pulchellus F. Ritter = **Pyrrhocactus pygmaeus** F. Ritter

Pyrrhocactus pygmaeus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt. var. *pygmaea* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria calderana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *gracilis* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley f. *pygmaea* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *calderana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *pulchella* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria intermedia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *scoparia* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria scoparia* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison var. *transiens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus gracilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus pulchellus* F. Ritter

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 212c* (SGO)].

Pyrrhocactus reconditus F. Ritter

Sin.: *Eriosyce recondita* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia recondita* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria recondita* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *vexata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Pyrrhocactus vexatus* F. Ritter

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 400–1000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 204* (U)].

Pyrrhocactus residuus F. Ritter & Buining = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

Pyrrhocactus robustus F. Ritter = **Pyrrhocactus tuberisulcatus** (Jacobi) A. Berger

Pyrrhocactus rupiculus F. Ritter = **Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison) F. Ritter

Pyrrhocactus sanjuanensis (Speg.) Backeb.

Sin.: *Echinocactus sanjuanensis* Speg., *Eriosyce vertongenii* (J.G. Lamb.) D.R. Hunt, *Eriosyce villicumensis* (Rausch) Katt., *Neoporteria sanjuanensis* (Speg.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria umadeave* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley var. *marayesensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria villicumensis* (Rausch) Donald, *Pyrrhocactus marayesensis* (Backeb.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus megliolii* Rausch, *Pyrrhocactus strausianus* (K. Schum.) A. Berger var. *sanjuanensis* (Speg.) J.G. Lamb., *Pyrrhocactus umadeave* Werderm. var. *marayesensis* Backeb., *Pyrrhocactus vertongenii* J.G. Lamb., *Pyrrhocactus villicumensis* Rausch

Referencias: Kiesling, R., 2003b.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9325* (SI)].

Pyrrhocactus saxifragus F. Ritter = **Islaya iquiquensis** (F. Ritter) Faúndez & R. Kiesling

[Pyrrhocactus setiflorus Backeb., nom. inval.]

Sin.: *Neoporteria setiflora* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. illeg.

Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Pyrrhocactus setosiflorus F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Pyrrhocactus setosiflorus F. Ritter var. *intermedius* F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Pyrrhocactus simulans F. Ritter

Sin.: *Eriosyce heinrichiana* (Backeb.) Katt. subsp. *simulans* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce simulans* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia simulans* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria simulans* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 488* (U)].

Pyrrhocactus strausianus (K. Schum.) A. Berger
Sin.: *Echinocactus strausianus* K. Schum., *Eriosyce strausiana* (K. Schum.) Katt., *Malacocarpus straussianus* (K. Schum.) Britton & Rose, *Neoporteria strausiana* (K. Schum.) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus platyacanthus* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14166* (SI)].

Pyrrhocactus strausianus (K. Schum.) A. Berger var. *sanjuanensis* (Speg.) J.G. Lamb. = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Pyrrhocactus taltalensis (Hutchison) F. Ritter
Sin.: *Eriosyce taltalensis* (Hutchison) Katt., *Neochilenia taltalensis* (Hutchison) Backeb., *Neoporteria rupicola* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley, *Neoporteria taltalensis* Hutchison, *Pyrrhocactus rupiculus* F. Ritter, *Pyrrhocactus tenuis* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 500–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2654* (CONC)].

Pyrrhocactus tenuis F. Ritter = **Pyrrhocactus taltalensis** (Hutchison) F. Ritter

Pyrrhocactus totoralensis F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus transiens F. Ritter = **Pyrrhocactus eriosyzoides** (F. Ritter) F. Ritter

Pyrrhocactus trapichensis F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Pyrrhocactus truncatipetalus F. Ritter = **Pyrrhocactus marksianus** F. Ritter

Pyrrhocactus tuberisulcatus (Jacobi) A. Berger
Sin.: *Cactus horridus* Bertero ex Colla, nom. illeg., *Echinocactus horridus* (Bertero ex Colla) J. Remy ex Gay, *Echinocactus tuberisulcatus* Jacobi, *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *armata* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *mutabilis* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *robusta* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce curvispina* (Bertero ex Colla) Katt. var. *tuberisulcata* (Jacobi) Katt., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt, *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *armata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria horrida* (Gay) D.R. Hunt var. *odoriflora* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria tuberisulcata* (Jacobi) Donald & G.D. Rowley, *Pyrrhocactus armatus* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. f. *vegasanus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *mutabilis* F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* (Gay) Backeb. var. *robustus* (F. Ritter) F. Ritter, *Pyrrhocactus horridus* Backeb., nom. inval., *Pyrrhocactus odoriflorus* F. Ritter, *Pyrrhocactus robustus* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 223* (ZSS)].

Pyrrhocactus umadeave (Werderm.) Backeb.
Sin.: *Echinocactus umadeave* Werderm., *Eriosyce umadeave* (Werderm.) Katt., *Friesia umadeave* Fric ex Kreuz., nom. inval., *Neoporteria umadeave* (Werderm.) Donald & G.D. Rowley
Referencias: Kattermann, F., 1994.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8720* (SI)].

Pyrrhocactus umadeave Werderm. var. *marayesensis* Backeb. = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Pyrrhocactus vertongenii J.G. Lamb. = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

Pyrrhocactus vexatus F. Ritter = **Pyrrhocactus reconditus** F. Ritter

Pyrrhocactus villicumensis Rausch = **Pyrrhocactus sanjuanensis** (Speg.) Backeb.

[Pyrrhocactus vollianus Backeb.]
Sin.: *Neoporteria volliana* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley
Notas: Nombre dudoso.

Pyrrhocactus wagenknechtii F. Ritter = **Pyrrhocactus heinrichianus** (Backeb.) F. Ritter

Quiabentia Britton & Rose

Número de especies: 1

Quiabentia chacoensis Backeb. = **Quiabentia verticillata** (Vaupel) Borg

Quiabentia chacoensis Backeb. var. *jujuyensis* Backeb. = **Quiabentia verticillata** (Vaupel) Borg

Quiabentia pflanzii (Vaupel) Vaupel = **Quiabentia verticillata** (Vaupel) Borg

Quiabentia verticillata (Vaupel) Borg
Sin.: *Pereskia pflanzii* Vaupel, *Pereskia verticillata* Vaupel, *Quiabentia chacoensis* Backeb., *Quiabentia chacoensis* Backeb. var. *jujuyensis* Backeb., *Quiabentia pflanzii* (Vaupel) Vaupel
Referencias: Castellanos, A., 1951b; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Arbusto suculento. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20158* (SI)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 4354* (G, SI)].

Rebulobivia einsteinii (Fric) Kreuz. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebulobivia nicolai Fric & Kreuz. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebulobivia rubriviride Fric & Kreuz. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia K. Schum.

Número de especies: 5, 4 endémicas

Rebutia aureiflora Backeb. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia blossfeldii Werderm. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia buiningiana Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia calliantha Bewer. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia calliantha Bewer. var. *berylioides* Buining & Donald = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia calliantha Bewer. var. *breviseta* Backeb. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia christinae Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia chrysacantha Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia chrysacantha Backeb. var. *elegans* (Backeb.) Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia chrysacantha Backeb. var. *kesselringiana* (Bewer.) Donald = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia dasyphrissa Werderm. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia deminuta (F.A.C. Weber) A. Berger

Sin.: *Aylostera deminuta* (F.A.C. Weber) Backeb., *Aylostera deminuta* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *pseudominuscula* (Speg.) Backeb., *Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb., *Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb. var. *albiflora* Backeb., *Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb. var. *albiseta* Backeb., *Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb. var. *grandiflora* Backeb., *Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb. var. *schneideriana* Backeb., *Aylostera pseudodeminuta* (Backeb.) Backeb. var. *schumanniana* (Backeb.) Backeb., *Aylostera pseudominuscula* (Speg.) Speg., *Echinopsis deminuta* F.A.C. Weber, *Echinopsis pseudominuscula* Speg., *Rebutia deminuta* (F.A.C. Weber) A. Berger var. *pseudominuscula* (Speg.) Donald, *Rebutia pseudodeminuta* Backeb., *Rebutia pseudodeminuta* Backeb. var. *longiseta* Backeb., *Rebutia pseudodeminuta* Backeb. var. *schumanniana* Backeb., *Rebutia pseudominuscula* (Speg.) Britton & Rose

Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.

Países: ARG(SAL, TUC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Rebutia deminuta (F.A.C. Weber) A. Berger var. *pseudominuscula* (Speg.) Donald = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Rebutia einsteinii Fric = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia einsteinii Fric var. *atrospinosa* (Rausch) Sida = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia einsteinii Fric var. *gonjianii* (R. Kiesling) Donald = **Lobivia gonjianii** (R. Kiesling) R. Kiesling

Rebutia einsteinii Fric var. *karrei* (Fric ex Backeb.) Sida = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia einsteinii Fric var. *rubroviridis* (Backeb.) Buining & Donald = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia einsteinii Fric var. *schniedcheniana* (J. Köhler) Buining & Don = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia fabrisii Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia fabrisii Rausch var. *aureiflora* Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia fabrisii Rausch var. *nana* Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia famatinensis (Speg.) Speg. = **Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Rebutia fiebrigii (W.R. Guerke) Britton & Rose

Sin.: *Aylostera fiebrigii* (Gürke) Backeb., *Aylostera jujuyana* (Rausch) W. Haage, *Aylostera spegazziniana* (Backeb.) Backeb., *Aylostera spegazziniana* (Backeb.) Backeb. var. *atroviridis* Backeb., *Aylostera spinosissima* (Backeb.) Backeb., *Echinocactus fiebrigii* W.R. Guerke, *Lobivia steinmannii* (Salm-Dyck) Backeb. var. *christinae* (Rausch) Rausch, *Rebutia buiningiana* Rausch, *Rebutia christinae* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch var. *aureiflora* Rausch, *Rebutia fabrisii* Rausch var. *nana* Rausch, *Rebutia fiebrigii* (W.R. Guerke) Britton & Rose var. *densiseta* (Cullman) Oeser, *Rebutia hoffmannii* L. Diers & Rausch, *Rebutia jujuyana* Rausch, *Rebutia kieslingii* Rausch, *Rebutia spegazziniana* Backeb., *Rebutia spinosissima* Backeb., *Rebutia walteri* L. Diers

Referencias: Britton, N. L. & Rose, J. N., 1922.

Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.

Países: ARG(JUJ, SAL).

Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8909* (SI)].

Rebutia fiebrigii (W.R. Guerke) Britton & Rose var. *densiseta* (Cullman) Oeser = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia fleischreiana Slaba = **Lobivia gonjianii** (R. Kiesling) R. Kiesling

Rebutia gonjianii R. Kiesling = **Lobivia gonjianii** (R. Kiesling) R. Kiesling

Rebutia graciliflora Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia grandiflora Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia haagei Fric & Schelle = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Rebutia hoffmannii L. Diers & Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia hyalacantha (Backeb.) Backeb. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia jujuyana Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia kieslingii Rausch = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia knuthiana Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia krainziana Kesselr. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia krainziana Kesselr. var. *breviseta* (Backeb.) Donald = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia krainziana Kesselr. var. *wessneriana* (Bewer.) Krainz & Haarm. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia margarethae Rausch
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8929* (SI)].

Rebutia marsoneri Werderm.
Sin.: *Rebutia calliantha* Bewer., *Rebutia calliantha* Bewer. var. *berylioides* Buining & Donald, *Rebutia calliantha* Bewer. var. *breviseta* Backeb., *Rebutia hyalacantha* (Backeb.) Backeb., *Rebutia krainziana* Kesselr., *Rebutia krainziana* Kesselr. var. *breviseta* (Backeb.) Donald, *Rebutia krainziana* Kesselr. var. *wessneriana* (Bewer.) Krainz & Haarm., *Rebutia marsoneri* Werderm. var. *spathula* (Backeb.) Donald, *Rebutia marsoneri* Werderm. var. *vatteri* (Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula* K. Schum. var. *marsoneri* (Werderm.) E. Scholz, *Rebutia permutata* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *hyalacantha* Backeb., *Rebutia wessneriana* Bewer., *Rebutia wessneriana* Bewer. var. *berylioides* (Buining & Donald) Donald, *Rebutia wessneriana* Bewer. var. *calliantha* (Bewer.) Donald
Referencias: Backeberg, C., 1958.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8901* (SI)].

Rebutia marsoneri Werderm. var. *spathula* (Backeb.) Donald = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia marsoneri Werderm. var. *vatteri* (Backeb.) Donald = **Rebutia marsoneri** Werderm.

[Rebutia mavieae L. Fisher & Halda]
Notas: Nombre dudoso.

Rebutia minuscula K. Schum.
Sin.: *Rebutia chrysacantha* Backeb., *Rebutia chrysacantha* Backeb. var. *elegans* (Backeb.) Backeb., *Rebutia chrysacantha* Backeb. var. *kesselringiana* (Bewer.) Donald, *Rebutia dasyphrissa* Werderm., *Rebutia graciliflora* Backeb., *Rebutia grandiflora* Backeb., *Rebutia knuthiana* Backeb., *Rebutia minuscula* K. Schum. subsp. *grandiflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula* K. Schum. subsp. *violaciflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia minuscula* K. Schum. var. *grandiflora* (Backeb.) Krainz, *Rebutia senilis* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *aurescens* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *breviseta* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *chrysacantha* (Backeb.) Donald, *Rebutia senilis* Backeb. var. *iseliniana* Krainz, *Rebutia senilis* Backeb. var. *kesselringiana* Bewer., *Rebutia senilis* Backeb. var. *lilacino-rosea* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *schieliana* Bewer., *Rebutia senilis* Backeb. var. *semperflorens* Poind., *Rebutia senilis* Backeb. var. *sieperdaiana* Backeb., *Rebutia senilis* Backeb. var. *stuemeri* Backeb., *Rebutia violaciflora* Backeb., *Rebutia violaciflora* Backeb. var. *knuthiana* (Backeb.) Donald, *Rebutia xanthocarpa* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *citricarpa* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *coerulescens* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *dasyphrissa* (Werderm.) Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *graciliflora* (Backeb.) Donald, *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *luteirosea* Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *salmonea* Fric ex Backeb., *Rebutia xanthocarpa* Backeb. var. *violaciflora* (Backeb.) Backeb.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13162* (SI)].

Rebutia minuscula K. Schum. var. *grandiflora* (Backeb.) Krainz = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia minuscula K. Schum. var. *marsoneri* (Werderm.) E. Scholz = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia minuscula K. Schum. subsp. *grandiflora* (Backeb.) Donald = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia minuscula K. Schum. subsp. *violaciflora* (Backeb.) Donald = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia nazarenoensis (Rausch) B. Fearn & Pearcy = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Rebutia neumanniana (Backeb.) D.R. Hunt = **Weingartia neumanniana** (Backeb.) Werderm.

Rebutia nigricans (Wessner) D.R. Hunt = **Lobivia nigricans** Wessner

Rebutia oculata Werderm. = **Lobivia euanthema** Backeb.

Rebutia permutata Backeb. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia pilifera Fric = **Lobivia euanthema** Backeb.

Rebutia pseudodeminuta Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Rebutia pseudodeminuta Backeb. var. *longiseta* Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Rebutia pseudodeminuta Backeb. var. *schumanniana* Backeb. = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Rebutia pseudominuscula (Speg.) Britton & Rose = **Rebutia deminuta** (F.A.C. Weber) A. Berger

Rebutia pygmaea (R.E. Fr.) Britton & Rose = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Rebutia sarothroides Werderm. = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia schmiedcheniana (U. Köhler) W.T. Marshall = **Lobivia einsteinii** (Fric) Rausch

Rebutia senilis Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *aurescens* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *breviseta* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *chrysacantha* (Backeb.) Donald = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *hyalacantha* Backeb. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia senilis Backeb. var. *iseliniana* Krainz = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *kesselringiana* Bewer. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *lilacino-rosea* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *schieliana* Bewer. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *semperflorens* Poind. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *sieperdaiana* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia senilis Backeb. var. *stuemeri* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia spegazziniana Backeb. = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia spinosissima Backeb. = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia violaciflora Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia violaciflora Backeb. var. *knuthiana* (Backeb.) Donald = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia walteri L. Diers = **Rebutia fiebrigii** (W.R. Guerke) Britton & Rose

Rebutia wessneriana Bewer. = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia wessneriana Bewer. var. *berylioides* (Buining & Donald) Donald = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia wessneriana Bewer. var. *calliantha* (Bewer.) Donald = **Rebutia marsoneri** Werderm.

Rebutia xanthocarpa Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *citricarpa* Fric ex Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *coerulescens* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *dasyphrissa* (Werderm.) Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *graciliflora* (Backeb.) Donald = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *luteirosea* Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *salmonea* Fric ex Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Rebutia xanthocarpa Backeb. var. *violaciflora* (Backeb.) Backeb. = **Rebutia minuscula** K. Schum.

Reicheocactus pseudoreichianus Backeb. = **Lobivia famatimensis** (Speg.) Britton & Rose var. **famatimensis**

Reolobivia haagei (Fric & Schelle) Fric = **Lobivia pygmaea** (R.E. Fr.) Backeb.

Rhipsalidopsis gaertneri (Regel) Moran = **Hatiora gaertneri** (Regel) Barthlott

Rhipsalidopsis rosea (Lagerh.) Britton & Rose = **Hatiora rosea** (Lagerh.) Barthlott

Rhipsalis Gaertn.

Número de especies: 24, 1 endémica

Rhipsalis aculeata F.A.C. Weber
Sin.: *Lepismium aculeatum* (F.A.C. Weber) Barthlott, *Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott f. *aculeatum* Barthlott & N.P. Taylor
Referencias: Castellanos, A., 1925b; Kiesling, R., 2005.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonpland, A. J. A. 1833* (P)]; PRY[*Arenas, P. 1596* (BACF)].

Rhipsalis agudoensis N.P. Taylor
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS). 0–700 m.
Ejemplares de referencia: BRA[*Horst, L. 821* (K)].

Rhipsalis albolanata F. Ritter = **Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **teres**

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn subsp. **baccifera**
Sin.: *Cassyta baccifera* J.S. Muell., *Rhipsalis cassitta* Gaertn.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Scheinvar, L., 1985; Stutz, L. C., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1883* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 46906* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 7368* (SI)].

Rhipsalis baccifera (J.S. Muell.) Stearn subsp. **shaferi** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis shaferi* Britton & Rose
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, APA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 21331* (G), *Shafer 134* (US)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar localidad o material de referencia (Barthlott & N. P. Taylor, 1995).

Rhipsalis burchellii Britton & Rose
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3101* (HBR)].

Rhipsalis campos-portoana Loefgr.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rose, J. N. 20612* (US)].

Rhipsalis capilliformis F.A.C. Weber = **Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **capilliformis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor

Rhipsalis cassitta Gaertn. = **Rhipsalis baccifera** (J.S. Muell.) Stearn subsp. **baccifera**

Rhipsalis cavernosa (Lindb.) K. Schum. = **Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Rhipsalis cereiformis (Salm-Dyck) C.F. Först. = **Pfeiffera ianthothele** (Monv.) F.A.C. Weber

Rhipsalis cereuscula Haw.
Sin.: *Cereus saglionis* Lem., *Rhipsalis penduliflora* N.E. Br., *Rhipsalis saglionis* (Lem.) Otto
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Castellanos, A., 1925b; Kiesling, R., 2005; Scheinvar, L., 1985; Stutz, L. C., 1983.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7021* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 61073* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 23179* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15323* (MVFA)].

Rhipsalis clavata F.A.C. Weber
Sin.: *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran, *Hatiora clavata* (F.A.C. Weber) Moran var. *delicatula* (Loefgr.) A. Cast., *Rhipsalis clavata* F.A.C. Weber var. *delicatula* Loefgr.
Referencias: Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2922a* (HBR)].

Rhipsalis clavata F.A.C. Weber var. *delicatula* Loefgr. = **Rhipsalis clavata** F.A.C. Weber
Referencias: Scheinvar, L., 1985.

Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast.
Sin.: *Cactus cruciformis* Vell., *Cereus squamulosus* Salm-Dyck ex DC., *Lepismium cavernosum* Lindb., *Lepismium cruciformis* (Vell.) Miq., *Rhipsalis cavernosa* (Lindb.) K. Schum., *Rhipsalis squamulosa* (Salm-Dyck) K. Schum.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Taylor, N., 1994.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2919* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 45789* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 15981* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2060* (MVFA)].

Rhipsalis dissimilis (G. Lindb.) K. Schum. f. **dissimilis**
Sin.: *Lepismium dissimilis* G. Lindb.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2904* (HBR)].

Rhipsalis dissimilis (G. Lindb.) K. Schum. f. **epiphyllanthoides** (Backeb.) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Lepismium epiphyllanthoides* Backeb.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta forma.

Rhipsalis elliptica G. Lindb.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6616* (HBR, M)].

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **hohenauensis** (F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis hohenauensis* F. Ritter
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, GUA, SPE); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6993* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 7844* (HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5801* (G, SI)]; URY[*Bonifacino, M. 27638* (MVFA)].

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Lepismium gibberulum* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis gibberula* F.A.C. Weber, *Rhipsalis pulvinigera* G. Lindb.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); URY (RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 8855* (HBR)].

Rhipsalis floccosa Pfeiff. subsp. **tucumanensis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Lepismium tucumanensis* (F.A.C. Weber) Backeb., *Rhipsalis tucumanensis* F.A.C. Weber
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 32903* (CTES)].

Rhipsalis gibberula F.A.C. Weber = **Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor

Rhipsalis grandiflora Haw.
Sin.: *Cactus funalis* Spreng.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7857* (HBR)].

Rhipsalis heteroclada Britton & Rose = **Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **heteroclada** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor

Rhipsalis hohenauensis F. Ritter = **Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **hohenauensis** (F. Ritter) Barthlott & N.P. Taylor
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.

Rhipsalis houlletiana Lem.
Sin.: *Acanthorhipsalis houlletiana* (Lem.) Volgin, *Lepismium houlletianum* (Lem.) Barthlott
Referencias: Castellanos, A., 1925b; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2547* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3949* (SI)].
Notas: Probablemente crezca en las selvas del oriente Paraguayo (Kiesling, com. pers.).

Rhipsalis ianthothele (Monv.) F.H. Brandt = **Pfeiffera ianthothele** (Monv.) F.A.C. Weber

Rhipsalis leucorhaphis K. Schum. = **Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck
Referencias: Kiesling, R., 2005.

Rhipsalis linearis K. Schum. = **Rhipsalis warmingiana** K. Schum.

Rhipsalis lorentziana Griseb.
Sin.: *Lepismium lorentzianum* (Griseb.) Barthlott
Referencias: Castellanos, A., 1925b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7534* (SI)].

Rhipsalis lumbricoides (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck
Sin.: *Cereus donkelairii* auct. non Salm-Dyck, *Cereus lumbricoides* Lem., *Lepismium lumbricoides* (Lem.) Barthlott, *Rhipsalis leucorhaphis* K. Schum., *Rhipsalis sarmentacea* Otto & D. Dietr.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Castellanos, A., 1925b; Kiesling, R., 2005.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE); URY(ART, CLA, FLA, MAL, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8936* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 38212* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 4665* (FCQ, MO)]; URY[*Olano 8783* (MVFA)].

Rhipsalis monacantha Griseb.
Sin.: *Acanthorhipsalis monacantha* (Griseb.) Britton & Rose, *Lepismium monacanthum* (Griseb.) Barthlott, *Pfeiffera monacantha* (Griseb.) P.V. Heath
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Castellanos, A., 1925b.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4509* (SI)].

Rhipsalis neves-armondii K. Schum.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Glaziou, A. F. M. 14868* (C, K)].

Rhipsalis pachyptera Pfeiff.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2444* (HBR)].

Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck
Sin.: *Lepismium paradoxum* Salm-Dyck ex Pfeiff.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reite, R. 3115* (HBR)].

Rhipsalis penduliflora N.E. Br. = **Rhipsalis cereuscula** Haw.

[Rhipsalis pentaptera Pfeiff.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Rhipsalis pilocarpa Loefgr.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

[Rhipsalis platycarpa (Zucc.) Pfeiff.]
Sin.: *Epiphyllum platycarpum* Zucc.
Notas: Nombre dudoso.

Rhipsalis prismatica (Lem.) Ruempler = **Rhipsalis teres** (Vell.) Steud. f. **prismatica** (Lem.) Barthlott & N.P. Taylor

Rhipsalis pulvinigera G. Lindb. = **Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **pulvinigera** (G. Lindb.) Barthlott & N.P. Taylor

Rhipsalis puniceo-discus G. Lindb.
Sin.: *Lepismium puniceo-discus* (G. Lindb.) Backeb.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5237* (HBR)].

[Rhipsalis rhombea Pfeiff.]
Notas: Nombre dudoso.

Rhipsalis rosea Lagerh. = **Hatiora rosea** (Lagerh.) Barthlott

Rhipsalis saglionis (Lem.) Otto = **Rhipsalis cereuscula** Haw.

Rhipsalis salicornioides Haw. = **Hatiora salicornioides** (Haw.) Britton & Rose

Rhipsalis sarmentacea Otto & D. Dietr. = **Rhipsalis lumbricoides** (Lem.) Lem. ex Salm-Dyck

Rhipsalis shaferi Britton & Rose = **Rhipsalis baccifera** (J.S. Muell.) Stearn subsp. **shaferi** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.

Rhipsalis squamulosa (Salm-Dyck) K. Schum. = **Rhipsalis cruciforme** (Vell.) A. Cast.

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f. **capilliformis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis capilliformis* F.A.C. Weber
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4778* (HBR)].

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f. **heteroclada** (Britton & Rose) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Rhipsalis heteroclada* Britton & Rose
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2971* (MEXU)].

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f. **prismatica** (Lem.) Barthlott & N.P. Taylor
Sin.: *Hatiora prismatica* Lem., *Rhipsalis prismatica* (Lem.) Ruempler
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2965* (HBR)].

Rhipsalis teres (Vell.) Steud. f. **teres**
Sin.: *Cereus teres* Vell., *Rhipsalis albolanata* F. Ritter
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ritter, F. 1286* (U)].

Rhipsalis trigona Pfeiff.
Sin.: *Lepismium trigonum* (Pfeiff.) Backeb.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995; Scheinvar, L., 1985.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 7969* (FLOR, HBR)].

Rhipsalis tucumanensis F.A.C. Weber = **Rhipsalis floccosa** Pfeiff. subsp. **tucumanensis** (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor

Rhipsalis warmingiana K. Schum.
Sin.: *Lepismium linearis* (K. Schum.) Barthlott, *Lepismium warmingianum* (K. Schum.) Barthlott, *Rhipsalis linearis* K. Schum.
Referencias: Barthlott, W. A. & Taylor, N. P., 1995.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7019* (SI)]; BRA[*Waechter, J. L. 1483* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 13989* (SI)].

Rhodocactus sacharosa (Griseb.) Backeb. = **Pereskia sacharosa** Griseb.

Rimacactus laui (Luthy) Mottram = **Islaya laui** (Luthy) Faúndez

Salmiopuntia salmiana (Parm.) Kreuz. = **Opuntia salmiana** Parm.

Salpingolobivia andalgalensis (F.A.C. Weber) Y. Ito = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Salpingolobivia aurea (Britton & Rose) Y. Ito = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Salpingolobivia aurea (Britton & Rose) Y. Ito var. *grandiflora* (Backeb.) Y. Ito, nom. illeg. = **Echinopsis aurea** Britton & Rose var. **aurea**

Salpingolobivia densispina (Werderm.) Y. Ito = **Lobivia densispina** (Werderm.) Buining

Salpingolobivia huascha (F.A.C. Weber) Y. Ito = **Trichocereus huascha** (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**

Salpingolobivia shaferi (Britton & Rose) Y. Ito = **Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Selenicereus (A. Berger) Britton & Rose

Número de especies: 1

Selenicereus macdonaldiae (Hook.) Britton & Rose = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Selenicereus rizzinii Scheinvar = **Selenicereus setaceus** (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.

Selenicereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Werderm.
Sin.: *Cereus coccineus* auct. non Salm-Dyck ex DC., *Cereus hassleri* K. Schum., *Cereus lindbergianus* F.A.C. Weber, *Cereus lindmanii* F.A.C. Weber, *Cereus setaceus* Salm-Dyck ex DC., *Hylocereus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) R. Bauer, *Mediocactus coccineus* auct. non (Salm-Dyck ex DC.) Britton & Rose, *Mediocactus hassleri* (K. Schum.) Backeb., *Mediocactus lindmanii* (F.A.C. Weber) Backeb., *Mediocactus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) Borg, *Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton & Rose, *Selenicereus rizzinii* Scheinvar
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Britton, N. L. & Rose, J. N., 1922; Hunt, D. R., 1989.
Hierba epífita. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brunner, D. R. 955* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 9808* (FCQ, MO, SI)].

Sericocactus haselbergii (F. Haage ex Rümpler) Y. Ito = **Parodia haselbergii** (F. Haage ex Rümpler) F.H. Brandt

Setiechinopsis (Backeb.) de Haas

Número de especies: 1 endémica

Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas
Sin.: *Acanthopetalus mirabilis* (Speg.) Y. Ito, *Arthrocereus mirabilis* (Speg.) Marshall, *Echinopsis mirabilis* Speg., *Setiechinopsis mirabilis* (Speg.) de Haas var. *gracilior* Backeb.
Referencias: Backeberg, C., 1959a.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SDE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9321* (SI)].

Setiechinopsis mirabilis (Speg.) de Haas var. *gracilior* Backeb. = **Setiechinopsis mirabilis** (Speg.) de Haas

Soehrensia bruchii (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Soehrensia formosa (Pfeiff.) Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Soehrensia formosa (Pfeiff.) Backeb. var. *maxima* Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Soehrensia formosa (Pfeiff.) Backeb. var. *polycephala* Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Soehrensia grandis (Britton & Rose) Backeb. = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Soehrensia ingens Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Soehrensia korethroides (Werderm.) Backeb. = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Soehrensia oreopepon (Speg.) Backeb. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Soehrensia smrziana (Backeb.) Backeb. = **Trichocereus smrzianus** (Backeb.) Backeb.

Soehrensia uebelmanniana Lembcke & Backeb., nom. inval. = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Spegazzinia neumanniana Backeb. = **Weingartia neumanniana** (Backeb.) Werderm.

Spinicalycium klimpelianum (Weid. & Werderm.) Fric = **Acanthocalycium klimpelianum** (Weid. & Werderm.) Backeb.

Spinicalycium spiniflorum (K. Schum.) Fric = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Spinicalycium violaceum (Werderm.) Fric = **Acanthocalycium spiniflorum** (K. Schum.) Backeb.

Stetsonia Britton & Rose

Número de especies: 1

Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus coryne* Salm-Dyck
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Kiesling, R., 1996b.
Árbol suculento. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8718* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 14954* (SI)].

Sulcorebutia chilensis (Backeb.) F.H. Brandt = **Neowerdermannia chilensis** Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Sulcorebutia vorwerkii (Fric) Brand, nom. illeg. = **Neowerdermannia vorwerkii** Fric

Tephrocactus Lem.

Número de especies: 7 endémicas

Tephrocactus alexanderi (Britton & Rose) Backeb.
Sin.: *Opuntia alexanderi* Britton & Rose, *Opuntia alexanderi* Britton & Rose var. *bruchii* (Speg.) G.D. Rowley, *Opuntia bruchii* Speg., *Tephrocactus alexanderi* (Britton & Rose) Backeb. var. *bruchii* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus alexanderi* (Britton & Rose) Backeb. var. *subsphaericus* (Backeb.) Backeb., nom. inval., *Tephrocactus bruchii* (Speg.) Speg., *Tephrocactus subsphaericus* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Alexander, W. B. s.n.* (NY)].

Tephrocactus alexanderi (Britton & Rose) Backeb. var. *bruchii* (Speg.) Backeb. = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

Tephrocactus alexanderi (Britton & Rose) Backeb. var. *subsphaericus* (Backeb.) Backeb., nom. inval. = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

Tephrocactus aoracanthus (Lem.) Lem.
Sin.: *Cereus ovatus* Pfeiff., nom. illeg., *Opuntia aoracantha* Lem., *Opuntia hossei* (Krainz & Gräser) G.D. Rowley, *Opuntia paediophila* A. Cast., *Tephrocactus aoracanthus* (Lem.) Lem. var. *paediophilus* (A. Cast.) J.G. Lamb., *Tephrocactus hossei* Krainz & Gräser, *Tephrocactus paediophilus* (A. Cast.) F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 12757* (MERL)].

Tephrocactus aoracanthus (Lem.) Lem. var. *paediophilus* (A. Cast.) J.G. Lamb. = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**
Sin.: *Cereus articulatus* Pfeiff., *Opuntia articulata* (Pfeiff.) D.R. Hunt, *Opuntia diademata* Lem. var. *inermis* Speg., *Opuntia glomerata* Haw. var. *inermis* (Speg.) A. Cast., *Opuntia strobiliformis* A. Berger, *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *calvus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *diadematus* (Lem.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *inermis* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus calvus* Lem.
Referencias: Kiesling, R., 1984.

Subarbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 2588* (MERL)].

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. *calvus* (Lem.) Backeb. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. *diadematus* (Lem.) Backeb. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. *inermis* (Speg.) Backeb. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.
Sin.: *Cereus syringacantus* Pfeiff., *Opuntia diademata* Lem., *Opuntia diademata* Lem. var. *oligacantha* Speg., *Opuntia diademata* Lem. var. *polyacantha* Speg., *Opuntia glomerata* Haw. f. *oligacantha* (Speg.) A. Cast., *Opuntia papyracantha* Phil., *Opuntia turpinii* Lem., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *papyracanthus* (Phil.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *polyacanthus* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus articulatus* (Pfeiff.) Backeb. var. *syringacanthus* (Speg.) Backeb., *Tephrocactus diadematus* (Lem.) Lem., *Tephrocactus glomeratus* (Haw.) Backeb. var. *oligacanthus* Speg.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 2589* (MERL)].

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. *papyracanthus* (Phil.) Backeb. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. *polyacanthus* (Speg.) Backeb. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Tephrocactus articulatus (Pfeiff.) Backeb. var. *syringacanthus* (Speg.) Backeb. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Tephrocactus atacamensis (Phil.) F. Ritter = **Maihueniopsis atacamensis** (Phil.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus bolivianus (Salm-Dyck) Backeb. = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Tephrocactus bruchii (Speg.) Speg. = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

Tephrocactus calvus Lem. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **articulatus**

Tephrocactus camachoi (Espinosa) Backeb. = **Maihueniopsis camachoi** (Espinosa) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus chilensis Backeb. = **Maihueniopsis camachoi** (Espinosa) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus coloreus F. Ritter = **Maihueniopsis colorea** (F. Ritter) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus conoideus F. Ritter ex Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus curvispinus Backeb., nom. inval. = **Maihueniopsis recurvata** (Gilmer & H.P. Thomas) R. Kiesling
Referencias: Kiesling, R. & Meglioli, S., 2003.

Tephrocactus darwinii (Hensl.) Backeb. ex Fric = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **darwinii**

Tephrocactus diadematus (Lem.) Lem. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Tephrocactus dimorphus (C.F. Först.) Backeb. = **Cumulopuntia sphaerica** (C.F. Först.) E.F. Anderson

Tephrocactus echinaceus F. Ritter = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **echinacea** (F. Ritter) Faúndez

Tephrocactus flexispinus Backeb., nom. inval. = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Tephrocactus geometricus (A. Cast.) Backeb.
Sin.: *Opuntia geometrica* A. Cast.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)];

Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backeb. var. *andicola* (Pfeiff.) Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backeb. var. *atratospinus* Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backeb. var. *fulvispinus* (Lem.) Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Tephrocactus glomeratus (Haw.) Backeb. var. *oligacanthus* Speg. = **Tephrocactus articulatus** (Pfeiff.) Backeb. var. **oligacanthus** (Speg.) Backeb.

Tephrocactus halophilus (Speg.) Backeb.
Sin.: *Opuntia halophila* Speg.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9234* (SI)].

Tephrocactus heteromorphus (Phil.) Backeb. = **Opuntia heteromorpha** Phil.

Tephrocactus hickenii (Britton & Rose) Speg. = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Tephrocactus hossei Krainz & Gräser = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

Tephrocactus ignescens (Vaupel) Backeb. = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **ignescens** (Vaupel) Faúndez

Tephrocactus leoncito (Werderm.) Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus leoninus (Rümpler) Backeb., nom. inval. = **Opuntia leonina** Rümpler

Tephrocactus mandragora Backeb. = **Maihueniopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling

Tephrocactus melanacanthus Backeb., nom. inval. = **Maihueniopsis boliviana** (Salm-Dyck) R. Kiesling subsp. **boliviana**

Tephrocactus minutus Backeb. = **Maihueniopsis minuta** (Backeb.) R. Kiesling

Tephrocactus molinensis (Speg.) Backeb.
Sin.: *Maihueniopsis molinensis* (Speg.) F. Ritter, *Opuntia guerkei* Schelle, *Opuntia molinensis* Speg., *Opuntia schumannii* Speg.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Tephrocactus neuquensis (Borg) Backeb. = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Tephrocactus nigrispinus (K. Schum.) Backeb. = **Maihueniopsis nigrispina** (K. Schum.) R. Kiesling
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus ovatus (Pfeiff.) Backeb. = **Maihueniopsis ovata** (Pfeiff.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Tephrocactus paediophilus (A. Cast.) F. Ritter = **Tephrocactus aoracanthus** (Lem.) Lem.

[Tephrocactus parvisetus Backeb., nom. inval.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Opuntia*.

Tephrocactus pentlandii (Salm-Dyck) Backeb. = **Cumulopuntia pentlandii** (Salm-Dyck) F. Ritter

Tephrocactus pentlandii (Salm-Dyck) Backeb. var. *rossianus* Heinr. & Backeb. = **Cumulopuntia pentlandii** (Salm-Dyck) F. Ritter

Tephrocactus platycanthus (Pfeiff.) Lem. = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Tephrocactus platycanthus (Pfeiff.) Lem. var. *neoplatyacanthus* Backeb. = **Maihueniopsis darwinii** (Hensl.) F. Ritter var. **hickenii** (Britton & Rose) R. Kiesling

Tephrocactus reicheanus (Espinosa) Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Tephrocactus russellii (Britton & Rose) Backeb. = **Maihueniopsis ovata** (Pfeiff.) F. Ritter

Tephrocactus setiger Backeb. = **Tephrocactus weberi** (Speg.) Backeb. var. **weberi**

Tephrocactus subsphaericus Backeb. = **Tephrocactus alexanderi** (Britton & Rose) Backeb.

Tephrocactus subterraneus (R.E. Fr.) Backeb. = **Puna subterranea** (R.E. Fr.) R. Kiesling

Tephrocactus tarapacanus (Phil.) Backeb. = **Maihueniopsis glomerata** (Haw.) R. Kiesling

Tephrocactus variiflorus Backeb. = **Puna subterranea** (R.E. Fr.) R. Kiesling

Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb. var. **deminutus** Rausch
Referencias: Rausch, W., 1986b.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rausch s.n.* (SI)].

Tephrocactus weberi (Speg.) Backeb. var. **weberi**
Sin.: *Opuntia weberi* Speg., *Opuntia weberi* Speg. var. *dispar* A. Cast., *Opuntia weberi* Speg. var. *setiger* (Backeb.) Backeb., *Tephrocactus setiger* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1984.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Holmberg, E. L. s.n.* (BAF, LP, US)].

Thelocephala Y. Ito

Número de especies: 6 endémicas

Thelocephala aerocarpa (F. Ritter) F. Ritter
= **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Thelocephala duripulpa (F. Ritter) F. Ritter
= **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Thelocephala esmeraldana (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Chileorebutia esmeraldana* F. Ritter, *Eriosyce esmeraldana* (F. Ritter) Katt., *Neochilenia esmeraldana* (F. Ritter) Backeb., *Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 518* (U)].

Thelocephala fankhauseri F. Ritter = **Thelocephala tenebrica** F. Ritter

Thelocephala fulva F. Ritter = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Thelocephala glabrescens (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *glabrescens* (F. Ritter) Katt.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 710* (U)].

Thelocephala krausii (F. Ritter) F. Ritter
Sin.: *Eriosyce krausii* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria esmeraldana* (F. Ritter) Donald & G.D. Rowley var. *malleolata* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala longirapa* F. Ritter, *Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala malleolata* (F. Ritter) F. Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 502* (SGO, U)].

Thelocephala lembckei (Backeb.) F. Ritter
= **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Thelocephala longirapa F. Ritter = **Thelocephala krausii** (F. Ritter) F. Ritter

Thelocephala malleolata (F. Ritter) F. Ritter
= **Thelocephala krausii** (F. Ritter) F. Ritter

Thelocephala malleolata (F. Ritter) F. Ritter var. *solitaria* (F. Ritter) F. Ritter = **Thelocephala krausii** (F. Ritter) F. Ritter

Thelocephala napina (Phil.) Y. Ito
Sin.: *Chileorebutia aerocarpa* F. Ritter, *Chileorebutia duripulpa* F. Ritter, *Chileorebutia napina* (Phil.) F. Ritter, *Echinocactus napinus* Phil., *Eriosyce aerocarpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *aerocarpa* (F. Ritter) Ferryman, *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *challensis* R. Keim & I. Schaub, *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. subsp. *lembckei* Katt., *Eriosyce napina* (Phil.) Katt. var. *duripulpa* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. subsp. *fulva* (F. Ritter) Katt., *Eriosyce spectabilis* A.E. Hoffm. & H.E. Walter, nom. nud., *Neochilenia aerocarpa* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia duripulpa* (F. Ritter) Backeb., *Neochilenia lembckei* Backeb., *Neochilenia napina* (Phil.) Backeb., *Neochilenia napina* (Phil.) Backeb. var. *mitis* (Phil.) Backeb., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. f. *glabrescens* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. f. *nuda* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *aerocarpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *duripulpa* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *lembckei* (Backeb.) A.E. Hoffm., *Thelocephala aerocarpa* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala duripulpa* (F. Ritter) F. Ritter, *Thelocephala fulva* F. Ritter, *Thelocephala lembckei* (Backeb.) F. Ritter, *Thelocephala nuda* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–600 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 249* (SGO)].

Thelocephala nuda F. Ritter = **Thelocephala napina** (Phil.) Y. Ito

Thelocephala odieri (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter
Sin.: *Chileorebutia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) F. Ritter, *Echinocactus odieri* Lem. ex Salm-Dyck, *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt., *Eriosyce odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Katt. var. *monte-amargensis* Katt., *Neochilenia odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Neoporteria monte-amargensis* (Backeb.) Donald & G.D. Rowley, nom. inval., *Neoporteria odieri* (Lem. ex Salm-Dyck) Backeb., *Neoporteria reichei* (K. Schum.) Backeb.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 499* (U, ZSS)].

Thelocephala tenebrica F. Ritter
Sin.: *Eriosyce tenebrica* (F. Ritter) Katt., *Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. var. *fankhauseri* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Thelocephala fankhauseri* F. Ritter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 100–600 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 1092* (U)].

Trichocereus (A. Berger) Riccob.

Número de especies: 25, 20 endémicas

Trichocereus andalgalensis (F.A.C. Weber) Hosseus
Sin.: *Cereus andalgalensis* F.A.C. Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber var. *rubriflorus* F.A.C. Weber, *Echinopsis huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley var. *rubriflora* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb., *Lobivia andalgalensis* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) Marshall var. *andalgalensis* (F.A.C. Weber) Rausch, *Salpingolobivia andalgalensis* (F.A.C. Weber) Y. Ito, *Trichocereus auricolor* Backeb., *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1058* (SI)].

Trichocereus angelesiae R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis angelesiae* (R. Kiesling) G.D. Rowley
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1302* (SI)].

Trichocereus arboricola Kimnach
Sin.: *Echinopsis arboricola* (Kimnach) Mottram
Referencias: Hilgert, N. I. & Kiesling, R., 2002; Kimnach, M. W., 1990.
Hierba epífita. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hilgert, N. 1510* (SI)].

Trichocereus atacamensis (Phil.) Backeb.
Sin.: *Cereus atacamensis* Phil., *Cereus pasacana* (F.A.C. Weber) F.A.C. Weber, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis atacamensis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *pasacana* (F.A.C. Weber) G. Navarro, *Echinopsis pasacana* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus atacamensis* (Phil.) Backeb., *Helianthocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Backeb., *Pilocereus pasacana* F.A.C. Weber, *Trichocereus pasacana* (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 1978; Ritter, F., 1980.
Arbusto suculento. Nativa. 2000–3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16340* (LP)]; CHL[*Ritter, F. 555* (SGO, ZSS)].

Trichocereus auricolor Backeb. = **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Trichocereus bruchii (Britton & Rose) F. Ritter = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Trichocereus bruchii (Britton & Rose) F. Ritter var. *brevispinus* F. Ritter = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Trichocereus cabrerae R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis cabrerae* (R. Kiesling) G.D. Rowley
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Arbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1208* (SI)].

Trichocereus callianthus F. Ritter = **Trichocereus vatteri** R. Kiesling

Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus candicans* Gillies ex Salm-Dyck, *Cereus candicans* Gillies ex Salm-Dyck var. *courantii* K. Schum., *Cereus gladiatus* Lem., *Cereus lamprochlorus* Lem. var. *salinicola* Speg., *Echinocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Rümpler, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *gladiata* (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) D.R. Hunt var. *tenuispina* (Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis courantii* (K. Schum.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *gladiatus* Backeb., *Trichocereus courantii* (K. Schum.) Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Arbusto suculento. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15966* (SI)].

Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose f. *rubriflorus* F. Ritter = **Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling

Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *gladiatus* Backeb. = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Trichocereus candicans (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *roseoflorus* Backeb., nom. inval. = **Trichocereus pseudocandicans** Backeb. ex R. Kiesling

Trichocereus catamarcensis F. Ritter, nom. inval. = **Lobivia crassicaulis** Backeb. ex R. Kiesling

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. inval. = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval. = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose subsp. **chiloensis**
Sin.: *Cactus chiloensis* Colla, *Cereus chiloensis* (Colla) DC., *Cereus quisco* J. Remy ex Gay, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *australis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *borealis* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *conjungens* F. Ritter, *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *eburneus* F. Ritter, nom. inval., *Trichocereus chiloensis* (Colla) Britton & Rose var. *panhoplites* (K. Schum.) F. Ritter, nom. inval.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 0–1700 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2548* (CONC)].

Trichocereus chiloensis (Colla) Britton & Rose subsp. **litoralis** (Johow) Faúndez
Sin.: *Cereus litoralis* Johow, *Echinopsis bolligeriana* Mächler & H.E. Walter, *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *litoralis* (Johow) Lowry, *Echinopsis litoralis* (Johow) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus litoralis* (Johow) Looser
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 248* (ZSS)].

Trichocereus coquimbanus (Molina) Britton & Rose
Sin.: *Cactus coquimbanus* Molina, *Cereus coquimbanus* (Molina) K. Schum., *Echinopsis coquimbana* (Molina) Friedrich & G.D. Rowley
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Hoffmann, A. E., 1989.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 533* (SGO, U, ZSS)].

Trichocereus coquimbanus (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg = **Trichocereus nigripilis** (Phil.) Baker
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 1999.

Trichocereus courantii (K. Schum.) Backeb. = **Trichocereus candicans** (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose

Trichocereus deserticola (Werderm.) Looser
Sin.: *Cereus deserticola* Werderm., *Cereus spinibarbis* Pfeiff., *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis deserticola* (Werderm.) Friedrich & G.D. Rowley var. *fulvilana* (F. Ritter) A.E. Hoffm., *Echinopsis spinibarbis* (Pfeiff.) A.E. Hoffm., *Eulychnia spinibarbis* (Pfeiff.) Britton & Rose, *Trichocereus fulvilanus* F. Ritter, *Trichocereus spinibarbis* (Pfeiff.) F. Ritter
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004; Nyffeler, R. & Eggli, U., 2000.
Arbusto suculento. Endémica. 400–800 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Eggli, U. 2653* (B, CONC, SGO), *Eggli, U. 2915* (CONC), *Werdermann, E. 869* (SI)].

Trichocereus fabrisii R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis fabrisii* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus volcanensis* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6203* (LP)].

Trichocereus fascicularis (Meyen) Britton & Rose = **Haageocereus fascicularis** (Meyen) F. Ritter

Trichocereus formosus (Pfeiff.) F. Ritter = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Trichocereus fulvilanus F. Ritter = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Trichocereus glaucus F. Ritter f. **pendens** F. Ritter
Sin.: *Echinopsis glauca* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley f. *pendens* (F. Ritter) Friedrich & G.D. Rowley
Arbusto suculento. Endémica. 400–600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 270a* (SGO)].

Trichocereus grandis (Britton & Rose) F. Ritter = **Lobivia bruchii** Britton & Rose

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **huascha**
Sin.: *Cereus huascha* F.A.C. Weber, *Cereus huascha* F.A.C. Weber var. *flaviflora* F.A.C. Weber, *Echinopsis huascha* (F.A.C. Weber) G.D. Rowley, *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *auricolor* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *macranthus* Backeb., *Helianthocereus huascha* (F.A.C. Weber) Backeb. var. *roseiflorus* (Y. Ito) Backeb., *Helianthocereus hyalacanthus* (Speg.) Backeb., *Lobivia huascha* (F.A.C. Weber) Marshall, *Lobivia hyalacantha* Speg., *Salpingolobivia huascha* (F.A.C. Weber) Y. Ito
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 6452* (BA, LIL)].

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. **pecheretianus** Backeb. ex R. Kiesling
Sin.: *Helianthocereus pecheretianus* Backeb. var. *viridior* Backeb., *Helianthocereus pecheretianus* Backeb., nom. inval.
Referencias: Kiesling, R., 1978.

Subarbusto suculento. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 804* (LP)].

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose var. *rubriflorus* (F.A.C. Weber) Backeb.
= **Trichocereus andalgalensis** (F.A.C. Weber) Hosseus

Trichocereus ingens (Backeb.) F. Ritter = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Trichocereus korethroides (Werderm.) F. Ritter = **Lobivia korethroides** (Werderm.) Werderm.

Trichocereus lamprochlorus (Lem.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus lamprochlorus* Lem., *Cereus nitens* Salm-Dyck, *Echinocereus lamprochlorus* (Lem.) Rümpler, *Echinopsis lamprochlora* (Lem.) F.A.C. Weber ex Friedrich & Glaetzle, *Echinopsis purpureopilosa* (Weing.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus neolamprochlorus* Backeb., *Trichocereus purpureopilosus* Weing.
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20438* (SI)].

Trichocereus litoralis (Johow) Looser = **Trichocereus chiloensis** (Colla) Britton & Rose subsp. **litoralis** (Johow) Faúndez

Trichocereus lobivioides F. Ritter = **Trichocereus rowleyi** (Friedrich) R. Kiesling

[Trichocereus manguinii Backeb.]
Sin.: *Echinopsis manguinii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley
Notas: Nombre dudoso.

Trichocereus neolamprochlorus Backeb. = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Trichocereus nigripilis (Phil.) Baker
Sin.: *Cereus nigripilis* Phil., *Echinopsis nigripilis* (Phil.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus coquimbanus* (Molina) Britton & Rose var. *nigripilis* (Phil.) Borg
Referencias: Leuenberger, B. E. & Eggli, U., 1999.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Trichocereus pasacana (F.A.C. Weber) Britton & Rose = **Trichocereus atacamensis** (Phil.) Backeb.

Trichocereus poco Backeb. = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Trichocereus poco Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb. = **Trichocereus tarijensis** (Vaupel) Werderm.

Trichocereus pseudocandicans Backeb. ex R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis pseudocandicans* (Backeb. ex R. Kiesling) Friedrich & Glaetzle, *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var. *flaviflorus* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb. var. *roseoflorus* (Backeb.) Backeb., nom. illeg., *Helianthocereus pseudocandicans* Backeb., nom. inval., *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose f. *rubriflorus* F. Ritter, *Trichocereus candicans* (Gillies ex Salm-Dyck) Britton & Rose var. *roseoflorus* Backeb., nom. inval.
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 807* (LP)].

Trichocereus purpureopilosus Weing. = **Trichocereus lamprochlorus** (Lem.) Britton & Rose

Trichocereus rowleyi (Friedrich) R. Kiesling
Sin.: *Chamaecereus grandiflorus* (Fric) Britton & Rose, *Echinopsis rowleyi* Friedrich, *Helianthocereus grandiflorus* (Britton & Rose) Backeb., *Lobivia grandiflora* Britton & Rose, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *lobivioides* (F. Ritter) Rausch, *Lobivia grandiflora* Britton & Rose var. *longispina* Rausch, *Lobivia purpureominiata* F. Ritter, *Trichocereus lobivioides* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1283* (CORD)].

Trichocereus rubinghianus Backeb. = **Trichocereus thelegonoides** (Speg.) Britton & Rose

[Trichocereus santiaguensis (Speg.) Backeb.]
Sin.: *Cereus santiaguensis* Speg.
Notas: Nombre dudoso.

Trichocereus schickendantzii (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Cereus schickendantzii* F.A.C. Weber, *Echinopsis friedrichii* G.D. Rowley, *Echinopsis schickendantzii* F.A.C. Weber, *Salpingolobivia shaferi* (Britton & Rose) Y. Ito, *Trichocereus shaferi* Britton & Rose
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 6450* (LIL)].

Trichocereus shaferi Britton & Rose = **Trichocereus schickendantzii** (F.A.C. Weber) Britton & Rose

Trichocereus skottsbergii Backeb.
Sin.: *Echinopsis skottsbergii* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Arbusto suculento. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 229* (ZSS)].

Trichocereus smrzianus (Backeb.) Backeb.
Sin.: *Echinopsis smrziana* Backeb., *Soehrensia smrziana* (Backeb.) Backeb.
Referencias: Font, F. & Picca, P., 2001; Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1110* (SI)].

[Trichocereus spachianus (Lem.) Riccob.]
Sin.: *Cereus spachianus* Lem., *Echinopsis spachiana* (Lem.) Friedrich & G.D. Rowley
Notas: Nombre dudoso.

Trichocereus spinibarbis (Pfeiff.) F. Ritter = **Trichocereus deserticola** (Werderm.) Looser

Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose
Sin.: *Cereus strigosus* Salm-Dyck, *Echinopsis strigosa* (Salm-Dyck) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus strigosus* (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *flaviflorus* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 806* (LP)].

Trichocereus strigosus (Salm-Dyck) Britton & Rose var. *flaviflorus* F. Ritter = **Trichocereus strigosus** (Salm-Dyck) Britton & Rose

Trichocereus tarijensis (Vaupel) Werderm.
Sin.: *Cereus tarijensis* Vaupel, *Echinopsis poco* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis tarijensis* (Vaupel) Friedrich & G.D. Rowley, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb., *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *albiflorus* Cárdenas, *Helianthocereus poco* (Backeb.) Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb., *Helianthocereus tarijensis* (Vaupel) Backeb., *Lobivia formosa* (Pfeiff.) Dodds subsp. *tarijensis* (Vaupel) Rausch, *Trichocereus poco* Backeb., *Trichocereus poco* Backeb. var. *sanguiniflorus* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Arbusto suculento. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3135* (LIL, SI)].

Trichocereus terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus terscheckii* Parm. ex Pfeiff., *Echinopsis terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Friedrich & G.D. Rowley, *Pilocereus terscheckii* Parm. ex Pfeiff., *Trichocereus terscheckii* (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose var. *montanus* Backeb.
Referencias: Kiesling, R., 2003b.
Árbol suculento. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8958* (SI)].

Trichocereus terscheckii (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose var. *montanus* Backeb. = **Trichocereus terscheckii** (Parm. ex Pfeiff.) Britton & Rose

Trichocereus thelegonoides (Speg.) Britton & Rose
Sin.: *Cereus thelegonoides* Speg., *Echinopsis rubinghiana* (Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley, *Echinopsis thelegonoides* (Speg.) Friedrich & G.D. Rowley, *Trichocereus rubinghianus* Backeb.
Referencias: Hilgert, N. I. & Kiesling, R., 2002; Kiesling, R., 1978.
Arbusto suculento. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1216* (SI)].

Trichocereus thelegonus (F.A.C. Weber) Britton & Rose
Sin.: *Cereus thelegonus* F.A.C. Weber, *Echinopsis thelegona* (F.A.C. Weber) Friedrich & G.D. Rowley
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Arbusto suculento. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1113* (SI)].

Trichocereus uebelmannianus (Lembcke & Backeb.) F. Ritter = **Lobivia formosa** (Pfeiff.) Dodds var. **formosa**

Trichocereus vatteri R. Kiesling
Sin.: *Echinopsis vatteri* (R. Kiesling) G.D. Rowley, *Trichocereus callianthus* F. Ritter
Referencias: Kiesling, R., 1978.
Subarbusto suculento. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24568* (SI)].

Trichocereus volcanensis F. Ritter = **Trichocereus fabrisii** R. Kiesling

Trichocereus walteri (R. Kiesling) J.G. Lamb. = **Lobivia walteri** R. Kiesling

Tunilla D.R. Hunt & Iliff

Número de especies: 4, 2 endémicas

Tunilla chilensis (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff
Sin.: *Opuntia alcerrecensis* (F. Ritter) Iliff, nom. illeg., *Platyopuntia chilensis* F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ritter, F. 562* (U)].

Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R. Hunt & Iliff
Sin.: *Opuntia aulacothele* F.A.C. Weber, *Opuntia corrugata* Salm-Dyck, *Opuntia longispina* auct. non Haw., *Opuntia longispina* Haw. var. *brevispina* Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *corrugata* (Salm-Dyck) Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *flavidispina* Backeb., *Opuntia longispina* Haw. var. *intermedia* Backeb., *Platyopuntia corrugata* (Salm-Dyck) F. Ritter, nom. illeg.
Referencias: Kiesling, R., 2003b.
Subarbusto suculento. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9448* (SI)].

[Tunilla erectoclada (Backeb.) D.R. Hunt & Iliff]
Sin.: *Opuntia erectoclada* Backeb.
Notas: Nombre dudoso.

Tunilla ianthinantha (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff
= **Tunilla soehrensii** (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff

[Tunilla microdisca (F.A.C. Weber) D.R. Hunt & Iliff]
Sin.: *Opuntia microdisca* F.A.C. Weber
Notas: Nombre dudoso.

[Tunilla picardonii D.R. Hunt & Iliff]
Sin.: *Opuntia picardoii* Marn.-Lap., nom. inval.
Notas: Nombre dudoso.

Tunilla soehrensii (Britton & Rose) D.R. Hunt & Iliff
Sin.: *Cactus ayrampo* Azara, *Opuntia cedegreniana* Backeb., *Opuntia ianthinantha* (F. Ritter) Iliff, *Opuntia multiareolata* Backeb., *Opuntia obliqua* Backeb., *Opuntia soehrensii* Britton & Rose, *Opuntia tilcarensis* Backeb. var. *rubellispina* Backeb., *Platyopuntia ianthinantha* F. Ritter, nom. illeg., *Platyopuntia soehrensii* (Britton & Rose) F. Ritter, nom. illeg., *Tunilla ianthinantha* (F. Ritter) D.R. Hunt & Iliff
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.
Subarbusto suculento. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3292* (SI)]; CHL[*Eggli, U. 2831* (CONC)].

Tunilla tilcarensis (Backeb.) D.R. Hunt & J. Iliff
Sin.: *Opuntia tilcarensis* Backeb., *Platyopuntia soehrensii* (Britton & Rose) F. Ritter, nom. illeg. var. *tilcarensis* (Backeb.) F. Ritter
Referencias: Backeberg, C., 1958.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 2000–2700 m.
Países: ARG(JUJ).
Notas: No se ha podido observar material de herbario de esta especie.

Weberbauerocereus fascicularis (Meyen) Backeb.
= **Haageocereus fascicularis** (Meyen) F. Ritter

Weingartia Werderm.

Número de especies: 1 endémica

Weingartia chilensis (Backeb.) Backeb.
= **Neowerdermannia chilensis** Backeb.
Referencias: Hoffmann, A. E. & Walter, H. E., 2004.

Weingartia neumanniana (Backeb.) Werderm.
Sin.: *Echinocactus neumannianus* Backeb., nom. nud., *Gymnocalycium neumannianum* (Backeb.) Hutch., *Rebutia neumanniana* (Backeb.) D.R. Hunt, *Spegazzinia neumanniana* Backeb.
Referencias: Backeberg, C., 1958.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8921* (SI)].

Weingartia vorwerkii (Fric) Backeb.
= **Neowerdermannia vorwerkii** Fric

Wigginsia D.M. Porter

Número de especies: 6, 3 endémicas

Wigginsia arechavaletai (K. Schum. ex Speg.) D.M. Porter
= **Wigginsia corynodes** (Otto ex Pfeiff.) D.M. Porter

Wigginsia corynodes (Otto ex Pfeiff.) D.M. Porter
Sin.: *Echinocactus corynodes* Otto ex Pfeiff., *Malacocarpus arechavaletai* (K. Schum. ex Speg.) Berg, *Wigginsia arechavaletai* (K. Schum. ex Speg.) D.M. Porter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Osten, C. 16842* (MVM)].

Wigginsia erinacea (Haw.) D.M. Porter
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6381* (MBM)].

Wigginsia pauciareolata (Arechav.) R. Kiesling
Sin.: *Echinocactus pauciareolatus* Arechav., *Malacocarpus pauciareolatus* (Arechav.) A. Berger
Referencias: Kiesling, R., 2005.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22023* (SI)].

Wigginsia sessiliflora (Hook.) D.M. Porter
Sin.: *Echinocactus sessiliflorus* Hook., *Echinocactus tetracanthus* Lem., *Malacocarpus sessiliflorus* (Hook.) Backeb., *Malacocarpus stegmannii* Backeb., nom. inval., *Malacocarpus tetracanthus* Lem., *Wigginsia stegmannii* (Backeb.) D.M. Porter, nom. illeg.
Referencias: Kiesling, R., 1988.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE); URY(RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 13209* (SI)].

Wigginsia shaeferiana W.R. Abraham & S. Theun.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 21709* (SI)].

Wigginsia stegmannii (Backeb.) D.M. Porter, nom. illeg.
= **Wigginsia sessiliflora** (Hook.) D.M. Porter

Wigginsia tephracantha (Link & Otto) D.M. Porter
Sin.: *Echinocactus tephracanthus* Link & Otto, *Malacocarpus tephracanthus* (Link & Otto) K. Schum.
Referencias: Kiesling, R., 1988.
Hierba suculenta. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 6414* (SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 11593* (SI)].

Yavia R. Kiesling & Piltz

Número de especies: 1 endémica

Yavia cryptocarpa R. Kiesling & Piltz
Referencias: Kiesling, R. & Piltz, J., 2001.
Hierba suculenta. Perenne. Endémica. 3600–3800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 9882* (SI)].

CALCEOLARIACEAE

2 géneros, 86 especies, 66 especies endémicas.

Calceolaria L.

Número de especies: 83, 63 endémicas

Calceolaria aberrans Kraenzl. = **Calceolaria inamoena** Kraenzl.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria abscondita Witasek = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **subincisa** (Benth.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

[Calceolaria aconcaguina Phil.]
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria acutifolia Witasek = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria aiseniana Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, b, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, J. 2679* (CONC, MSB, SGO)].

Calceolaria alba Ruiz & Pav.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 95719* (MSB)].

[Calceolaria algarrobensis Phil.]
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria alicahuensis M. Muñoz = **Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **alicahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.

[Calceolaria ambigua Phil.]
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria andicola Witasek = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **meyeniana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

[Calceolaria andina Benth. var. andicola (Witasek) Reiche]
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria andina Benth.
Sin.: *Calceolaria secunda* Witasek
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ehrhart, C., 2005.
Subarbusto. Endémica. 800–3000 m.
Países: CHL(V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994965* (CONC)].

Calceolaria angustifolia (Lindl.) Sweet
Sin.: *Calceolaria berteri* Colla, *Calceolaria integrifolia* L. var. *angustifolia* Lindl., *Calceolaria salicariifolia* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–2600 m.
Países: CHL(V, VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 961090* (MSB)].

Calceolaria arachnoidea Graham var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer = **Calceolaria arachnoidea** Graham subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria arachnoidea Graham var. *viridis* Benth. = **Calceolaria arachnoidea** Graham subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria arachnoidea Graham subsp. **arachnoidea**
Referencias: Ehrhart, C., 1994, 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–2600 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 597* (BM, E, F, K, S, US)].

Calceolaria arachnoidea Graham subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *lanata* Meyen ex Walp. & Schauer, *Calceolaria arachnoidea* Graham var. *viridis* Benth., *Calceolaria nubigena* Poepp.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2525* (CONC)].

Calceolaria araucana Phil. = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **araucana** (Phil.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria ascendens Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl. = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **dentata**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria ascendens Lindl. var. *coquimbensis* Benth. = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **collina**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria ascendens Lindl. var. *pristiphylla* (Phil.) Kraenzl. = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **pristiphylla** (Phil.) C. Ehrh.

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **ascendens**
Sin.: *Calceolaria uspallatensis* Kraenzl.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–1900 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 822* (CONC)].

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria bipartita* Phil., *Calceolaria exigua* Witasek, *Calceolaria glandulifera* Witasek, *Calceolaria miserrima* Kraenzl., *Calceolaria parvifolia* Phil., nom. illeg.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 800–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1058* (CONC, M)].

Calceolaria ascendens Lindl. subsp. **pristiphylla** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *pristiphylla* (Phil.) Kraenzl., *Calceolaria pristiphylla* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 500–1800 m.
Países: CHL(IV, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2303* (CONC, M)].

Calceolaria asperula Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.*(SGO)];

Calceolaria atrovirens Witasek = **Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **glandulosa**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria auriculata Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2005.
Subarbusto. Endémica. 200 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94569* (MSB)].

Calceolaria bellidifolia Benth. = **Calceolaria brunellifolia** Phil.

Calceolaria bellidifolia Benth. var. *angustifolia* Speg. = **Calceolaria brunellifolia** Phil.

Calceolaria benthami Phil. = **Calceolaria volckmannii** Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

[Calceolaria bergii Hieron.]
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria berteri Colla = **Calceolaria angustifolia** (Lindl.) Sweet
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria biflora Lam.
Sin.: *Calceolaria falklandica* (S. Moore) Kraenzl., *Calceolaria plantaginea* Sm., *Fagelia falklandica* S. Moore
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Ehrhart, C., 2000; Moore, D. M., 1968; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2469* (CORD)]; CHL[*Moore, D. 2170* (K)].

Calceolaria bigemina Phil. = **Calceolaria volckmannii** Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria bipartita Phil. = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria bipinnatifida Phil. = **Calceolaria pinnata** L.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria borchersi Phil. = **Calceolaria verbascifolia** Bertero ex Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria borsinii Rossow
Referencias: Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 1002* (BAB)].

Calceolaria brevistyla Clos = **Calceolaria undulata** Benth.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria bridgesii Kunze = **Calceolaria thyrsiflora** Graham
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1907.

Calceolaria brunellifolia Phil.
Sin.: *Calceolaria bellidifolia* Benth., *Calceolaria bellidifolia* Benth. var. *angustifolia* Speg.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15254* (SI)].

Calceolaria campanae Phil.
Sin.: *Calceolaria gnaphaliifolia* Kraenzl.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94363* (MSB)].

Calceolaria camptoclada Kraenzl. = **Calceolaria elatior** Griseb.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria cana Cav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ehrhart, C., 1994, 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 3305* (CONC)].

Calceolaria cana Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche = **Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **luxurians** (Witasek) C. Ehrh.

Calceolaria catamarcae Kraenzl. = **Calceolaria polyclada** Kraenzl.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria cavanillesii Phil.
Sin.: *Calceolaria recta* Witasek
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2100 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2341* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Ehrhart, C. 94110* (MSB)].

Calceolaria cheiranthoides Reiche ex Witasek = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **cheiranthoides** (Witasek) C. Ehrh.

Calceolaria chelidonioides Kunth
Sin.: *Calceolaria glutinosa* Heer & Regel, *Calceolaria lilloi* Descole & Borsini, *Fagelia chelidonioides* (Kunth) Kuntze, *Fagelia diversifolia* Pennell
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3846* (SI)].
Notas: Cita dudosa para Brasil (cfr. Ichaso & Barroso 1970: 58–60).

Calceolaria chiloensis Lindl. = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **dentata**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria chubutensis Skottsb. = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria collina Phil. subsp. **collina**
Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *coquimbensis* Benth., *Calceolaria coquimbensis* (Benth.) Kraenzl.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 899* (BM, G, K)].

Calceolaria collina Phil. subsp. **conferta** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria conferta* Witasek, *Calceolaria fulva* Witasek f. *viscosa* Witasek
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 400–1600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 5055* (M)].

Calceolaria collina Phil. subsp. **subincisa** (Benth.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria abscondita* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth., *Calceolaria quadriradiata* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 200–800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 1344* (BM, E, G, K, P)].

Calceolaria compacta Phil. = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **dentata**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria conferta Witasek = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **conferta** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria connata Hook. ex Graham = **Calceolaria petioalaris** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria coquimbensis (Benth.) Kraenzl. = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **collina**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria cordata Phil. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **corymbosa**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. **corymbosa**
Sin.: *Calceolaria cordata* Phil., *Calceolaria herbertiana* Lindl., *Calceolaria herbertiana* Lindl. var. *parviflora* Lindl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ehrhart, C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1775* (M, S)].

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. **floccosa** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria floccosa* Witasek
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–2700 m.
Países: ARG(MEN, RNE); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2434* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Ehrhart, C. 94163* (MSB)].

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. **mimuloides** (Clos) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria mimuloides* Clos, *Calceolaria oligantha* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 2759* (M)].

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. **montana** (Cav.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria montana* Cav., *Calceolaria villosa* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3100 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 839* (CONC, G)].

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. **santiagina** C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–2300 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94452* (CONC, M, SGO)].

Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. **tetraphylla** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria tetraphylla* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1600 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (BM, F, K, P, SGO, W)].

Calceolaria crassifolia Phil. = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **crassifolia** (Phil.) C. Ehrh.

Calceolaria crenatiflora Cav.
Sin.: *Calceolaria cunninghamii* Vatke, *Calceolaria hollermayeri* Kraenzl., *Calceolaria pendula* Sweet
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 2000; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2435* (CORD, SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 476* (CONC, M, W)].

Calceolaria crocea Phil. = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **meyeniana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria cummingiana Witasek = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **cumingiana** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria cunninghamii Vatke = **Calceolaria crenatiflora** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria cuspidata Phil. = **Calceolaria petioalaris** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria cymbiflora Sandwith = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria darwinii Benth. = **Calceolaria uniflora** Lam.

Calceolaria densifolia Phil. subsp. **densifolia**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 1200–1300 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 533* (BM, E, G, K)].

Calceolaria densifolia Phil. subsp. **laxa** C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 1300–1700 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Sandeman 316* (BM, K)].

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.) Reiche = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **dentata**

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. var. *cumingiana* (Witasek) Reiche = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **cumingiana** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. var. *subincisa* Benth. = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **subincisa** (Benth.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. **araucana** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria araucana* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6128* (NY)]; CHL[*Gay, C. s.n.*(SGO)].

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. **cumingiana** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cummingiana* Witasek, *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *cumingiana* (Witasek) Reiche
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94575* (MSB)].

Calceolaria dentata Ruiz & Pav. subsp. **dentata**
Sin.: *Calceolaria ascendens* Lindl. var. *chiloensis* (Lindl.) Kraenzl., *Calceolaria chiloensis* Lindl., *Calceolaria compacta* Phil., *Calceolaria dentata* Ruiz & Pav. var. *compacta* (Phil.) Reiche, *Calceolaria laetevirens* Kraenzl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Pennell, F. W., 1944.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2425* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20113* (CONC, SGO)].

Calceolaria dumetorum Phil. = **Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **alicahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria effusa Phil. = **Calceolaria petioalaris** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000; Kraenzlin, F. W. L., 1907.

Calceolaria elatior Griseb.
Sin.: *Calceolaria camptoclada* Kraenzl., *Calceolaria leiophylla* Kraenzl.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7852* (SI)].

Calceolaria elliptica Wedd. = **Calceolaria parvifolia** Wedd.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria exigua Witasek = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

[Calceolaria extensa Benth.]
Sin.: *Calceolaria flacca* Molau
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Calceolaria fabrisii Botta & Cabrera
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1986, 1993.
Hierba o subarbusto. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4844* (SI)].

Calceolaria falklandica (S. Moore) Kraenzl. = **Calceolaria biflora** Lam.

Calceolaria fiebrigiana Kraenzl. = **Calceolaria plectranthifolia** Walp.

Calceolaria filicaulis Clos subsp. **filicaulis**
Sin.: *Calceolaria flabellifolia* Kraenzl., *Calceolaria palenae* Phil.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Nativa. 1400–2700 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2158* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Marticorena, C. 846* (CONC)].

Calceolaria filicaulis Clos subsp. **luxurians** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cana* Cav. var. *pannosa* (Phil.) Reiche, *Calceolaria luxurians* Witasek, *Calceolaria pannosa* Phil.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3100 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7997* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 1754* (F)].

Calceolaria flabellifolia Kraenzl. = **Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **filicaulis**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria flacca Molau = **Calceolaria extensa** Benth.

Calceolaria flavovirens C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 2200–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 961047* (CONC, M, SGO)].

Calceolaria floccosa Witasek = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **floccosa** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria foliosa Phil. = **Calceolaria undulata** Benth.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria fothergillii Sol.
Sin.: *Calceolaria uniflora* Lam. var. *minima* (Witasek) Reiche
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Skottsberg, C. J. F. 29* (BA)].

[Calceolaria fulva Witasek]
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria fulva Witasek f. *viscosa* Witasek = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **conferta** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria georgiana F. Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2005.
Arbusto. Endémica. 400–700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94701* (MSB)].

Calceolaria germainii Witasek
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 2000; Witasek, J. A., 1906.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SLU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2298* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Germain, P. s.n.*(BM, G, P, W)].

Calceolaria glabrata Phil. = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **glabrata** (Phil.) C. Ehrh.

Calceolaria glabrata Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **meyeniana**

Calceolaria glacialis Wedd.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988; Novara, L. J. & Juárez de Varela, F. C., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2471* (SI)].

Calceolaria glandulifera Witasek = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

[Calceolaria glandulosa Poepp. var. argentina Hicken]
Notas: Nombre dudoso.

[Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. var. thyrsiformis Clos]
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. subsp. **alicahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria alicahuensis* M. Muñoz, *Calceolaria dumetorum* Phil., *Calceolaria glutinosa* Meigen, nom. illeg.

Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–2100 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles P., C. 1903* (CONC, S)].

Calceolaria glandulosa Poepp. ex Benth. subsp. **glandulosa**
Sin.: *Calceolaria atrovirens* Witasek, *Calceolaria kingii* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94334* (MSB)].

Calceolaria glutinosa Heer & Regel = **Calceolaria chelidonioides** Kunth
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria glutinosa Meigen, nom. illeg. = **Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **alicahuensis** (M. Muñoz) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria gmelinii Phil. = **Calceolaria viscosissima** (Hook.) Lindl.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria gnaphaliifolia Kraenzl. = **Calceolaria campanae** Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria grisebachii Kraenzl. = **Calceolaria polyclada** Kraenzl.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria herbertiana Lindl. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **corymbosa**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria herbertiana Lindl. var. *parviflora* Lindl. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **corymbosa**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria hieronymi Kraenzl. = **Calceolaria plectranthifolia** Walp.

Calceolaria hollermayeri Kraenzl. = **Calceolaria crenatiflora** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria hypericina Poepp. ex Benth.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Arbusto. Endémica. 1800–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94469* (MSB)].

Calceolaria hypoleuca Kuntze, nom. nud. = **Calceolaria morisii** Walp.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria inamoena Kraenzl.
Sin.: *Calceolaria aberrans* Kraenzl., *Calceolaria pulchella* Phil., hom. illeg.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000; Molau, U., 1988.
Arbusto. Nativa. 3500–3800 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ruthsatz, B. 7980* (MSB)].

Calceolaria integrifolia L.
Sin.: *Calceolaria rugosa* Ruiz & Pav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000, 2005; Kraenzlin, F. W. L., 1907; Rossow, R. A., 1999h.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2329* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Ehrhart, C. 95718* (BM, K, MSB, SGO, US)].

Calceolaria integrifolia L. var. *angustifolia* Lindl. = **Calceolaria angustifolia** (Lindl.) Sweet

Calceolaria integrifolia L. var. *viscosissima* Hook. = **Calceolaria viscosissima** (Hook.) Lindl.

Calceolaria jujuyensis Botta
Referencias: Botta, S. M., 1981; Molau, U., 1988.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000–1700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32134* (SI)].

[Calceolaria juncalensis Kraenzl.]
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria kingii Phil. = **Calceolaria glandulosa** Poepp. ex Benth. subsp. **glandulosa**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria laetevirens Kraenzl. = **Calceolaria dentata** Ruiz & Pav. subsp. **dentata**

Calceolaria lagunae-blancae Kraenzl.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2468* (CORD)].

Calceolaria lanceolata Cav. = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria lanceolata Cav. f. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.

Calceolaria lanceolata Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.

Calceolaria lanceolata Cav. var. *glabrata* Speg. = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.

Calceolaria lanceolata Cav. var. *pusilla* (Witasek) Reiche = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria landbecki Phil. = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **meyeniana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria lanigera Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–1500 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 655* (CONC)].

Calceolaria latifolia Benth.
Sin.: *Calceolaria latifolia* Benth. var. *longepetiolata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria longepetiolata* Phil., *Calceolaria stachydifolia* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1100 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Meudt, H. M. 029* (CORD, TEX)].

Calceolaria latifolia Benth. var. *longepetiolata* (Phil.) Reiche = **Calceolaria latifolia** Benth.

Calceolaria lechioides Rusby = **Calceolaria parvifolia** Wedd.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria leiophylla Kraenzl. = **Calceolaria elatior** Griseb.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria lepida Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Subarbusto. Endémica. 1800 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 83329* (CONC)].

Calceolaria lepidota Kraenzl.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 564* (CORD)].

Calceolaria lilloi Descole & Borsini = **Calceolaria chelidonioides** Kunth
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria llaimae Kraenzl. = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria longepetiolata Phil. = **Calceolaria latifolia** Benth.

Calceolaria looseni Kraenzl. = **Calceolaria santolinoides** Kraenzl.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria lorentzii Griseb. = **Calceolaria umbellata** Wedd.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria luxurians Witasek = **Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **luxurians** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria mendocina Phil. = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. **cheiranthoides** (Witasek) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria cheiranthoides* Reiche ex Witasek
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94643* (MSB)].

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. **glabrata** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria glabrata* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94676* (MSB)].

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. **meyeniana**
Sin.: *Calceolaria andicola* Witasek, *Calceolaria crocea* Phil., *Calceolaria glabrata* Phil. var. *meyeniana* (Phil.) Reiche, *Calceolaria landbecki* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Arbusto. Endémica. 600–2300 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94350* (MSB)].

Calceolaria meyeniana Phil. subsp. **nahuelbutae** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria nahuelbutae* Phil., *Calceolaria vernicosa* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 800–1300 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 95741* (MSB)].

Calceolaria mimuloides Clos = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **mimuloides** (Clos) C. Ehrh.

Calceolaria minima Witasek = **Calceolaria uniflora** Lam.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1907.

Calceolaria miserrima Kraenzl. = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria mollisima Walp. & Schauer
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).

Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10965* (BAB)].
Notas: Ehrhart (2000) considera que esta especie podría ser un sinónimo de *Calceolaria corymbosa* subsp. *montana*.

Calceolaria montana Cav. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **montana** (Cav.) C. Ehrh.

Calceolaria morisii Walp.
Sin.: *Calceolaria hypoleuca* Kuntze, nom. nud., *Calceolaria polyphylla* Kraenzl., *Calceolaria salviaefolia* Colla, nom. illeg., *Calceolaria wettsteiniana* Witasek
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94685* (MSB)].

Calceolaria nahuelbutae Phil. = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **nahuelbutae** (Phil.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria nana Sm. = **Calceolaria uniflora** Lam.

Calceolaria nitida Colla
Sin.: *Calceolaria pseudoglandulosa* Clos
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Subarbusto. Endémica. 400–500 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20026* (CONC)].

Calceolaria nubigena Poepp. = **Calceolaria arachnoidea** Graham subsp. **nubigena** (Poepp.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria nudicaulis Benth.
Sin.: *Calceolaria pratensis* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1800 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 523* (E, G, K)].

Calceolaria obtusifolia (Clos) Witasek = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria oligantha Phil. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **mimuloides** (Clos) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria oreas Phil. = **Calceolaria verbascifolia** Bertero ex Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria palenae Phil. = **Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **filicaulis**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria pallida Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 1600–2200 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94181* (MSB)].

Calceolaria pannosa Phil. = **Calceolaria filicaulis** Clos subsp. **luxurians** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria paposana Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000; Molau, U., 1988.
Subarbusto. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 847* (B, F, G, K, NY, P, US)].

Calceolaria paralia Cav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–2300 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3214* (CONC)].

Calceolaria parviflora Benth.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Marchesi, E., 1997.
Hierba. Bianual. Endémica. 200–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LRI, MEN, SDE, SLU, TUC); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1683* (CORD)]; URY[*Berro, M. B. 1793* (MVFA)].

Calceolaria parvifolia Phil., nom. illeg. = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **glandulifera** (Witasek) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria parvifolia Wedd.
Sin.: *Calceolaria elliptica* Wedd., *Calceolaria lechioides* Rusby, *Fagelia bangii* Rusby
Referencias: Molau, U., 1988.
Hierba o subarbusto. Nativa. 3300–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21485* (CTES)].

Calceolaria patagonica Kraenzl. = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria paucifolia Edwin & Wooden = **Calceolaria plectranthifolia** Walp.

Calceolaria pendula Sweet = **Calceolaria crenatiflora** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria pennellii Descole & Borsini
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 1358* (BAB)].

Calceolaria petioalaris Cav.
Sin.: *Calceolaria connata* Hook. ex Graham, *Calceolaria cuspidata* Phil., *Calceolaria effusa* Phil., *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *latifolia* Clos, *Calceolaria petioalaris* Cav. var. *oblongifolia* Clos
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Meudt, H. M. 026* (CORD, TEX)].

Calceolaria petioalaris Cav. var. *cuspidata* (Phil.) Reiche = **Calceolaria petioalaris** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria petioalaris Cav. var. *latifolia* Clos = **Calceolaria petioalaris** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria petioalaris Cav. var. *oblongifolia* Clos = **Calceolaria petioalaris** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria picta Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 4726* (CONC)].

Calceolaria pinifolia Cav.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2600–4300 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU); CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2555* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Ruthsatz, B. 5166* (MSB)].

Calceolaria pinnata L.
Sin.: *Calceolaria bipinnatifida* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000; Molau, U., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5420* (PH, S)].

Calceolaria plantaginea Sm. = **Calceolaria biflora** Lam.

[Calceolaria plantaginea Sm. var. magellanica Clos]
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria plantaginea Sm. var. *obtusifolia* Clos = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria plectranthifolia Walp.
Sin.: *Calceolaria fiebrigiana* Kraenzl., *Calceolaria hieronymi* Kraenzl., *Calceolaria paucifolia* Edwin & Wooden, *Fagelia plectranthifolia* (Walp.) Kuntze
Referencias: Molau, U., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32541* (SI)].

Calceolaria poeppigiana Phil. = **Calceolaria volckmannii** Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria poikilanthes Sandwith
Referencias: Ehrhart, C., 1996, 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Comber, T. 487* (E)]; CHL[*Ehrhart, C. 95754* (MSB)].

Calceolaria polifolia Hook.
Sin.: *Calceolaria spatellifolia* Kraenzl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Kraenzlin, F. W. L., 1907.
Arbusto. Endémica. 0–2300 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 95355* (MSB)].

Calceolaria polyclada Kraenzl.
Sin.: *Calceolaria catamarcae* Kraenzl., *Calceolaria grisebachii* Kraenzl.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7823* (SI)].

Calceolaria polyphylla Kraenzl. = **Calceolaria morisii** Walp.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria polyrrhiza Cav.
Sin.: *Calceolaria acutifolia* Witasek, *Calceolaria chubutensis* Skottsb., *Calceolaria cymbiflora* Sandwith, *Calceolaria lanceolata* Cav., *Calceolaria lanceolata* Cav. f. *acutifolia* (Witasek) W. Bowden, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *acutifolia* (Witasek) Reiche, *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *glabrata* Speg., *Calceolaria lanceolata* Cav. var. *pusilla* (Witasek) Reiche, *Calceolaria mendocina* Phil., *Calceolaria patagonica* Kraenzl., *Calceolaria prichardii* (Rendle) Kraenzl., *Calceolaria pusilla* Witasek, *Fagelia prichardii* Rendle
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 2000; Pennell, F. W., 1944; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2509* (CORD)]; CHL[*Werdermann, E. 1352* (CONC)].

Calceolaria pratensis Phil. = **Calceolaria nudicaulis** Benth.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria prichardii (Rendle) Kraenzl. = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria pristiphylla Phil. = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **pristiphylla** (Phil.) C. Ehrh.

[Calceolaria psammophila Skottsb.]
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria pseudoglandulosa Clos = **Calceolaria nitida** Colla
Referencias: Ehrhart, C., 1997a.

Calceolaria pubescens Phil. = **Calceolaria viscosissima** (Hook.) Lindl.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria pulchella Phil., hom. illeg. = **Calceolaria inamoena** Kraenzl.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria puncticulata Phil. = **Jovellana punctata** Ruiz & Pav.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1907.

Calceolaria purpurea Graham
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 900–2300 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94327* (MSB)].

Calceolaria pusilla Witasek = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria quadriradiata Phil. = **Calceolaria collina** Phil. subsp. **subincisa** (Benth.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

[Calceolaria quinamavidensis Kraenzl.]
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria racemosa Cav.
Referencias: Dawson, G., 1952.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cano, E. 123* (BAB)].

Calceolaria recta Witasek = **Calceolaria cavanillesii** Phil.

Calceolaria rinconada Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 1997b, 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–600 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 2863* (SGO)].

Calceolaria rivularis Kraenzl.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 1800–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 686* (SI)].

Calceolaria robusta A. Dietr. = **Calceolaria viscosissima** (Hook.) Lindl.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria rubiginosa C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.
Subarbusto. Endémica. 400–700 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94264* (MSB)].

Calceolaria rugosa Ruiz & Pav. = **Calceolaria integrifolia** L.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a.

Calceolaria ruiz-leali Descole & Borsini
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2228* (CORD, CTES, SI)].

Calceolaria ruiz-pavonii Descole & Borsini = **Calceolaria teucrioides** Griseb.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria rupicola F. Meigen = **Calceolaria stellariifolia** Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria salicariifolia Phil. = **Calceolaria angustifolia** (Lindl.) Sweet
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

[Calceolaria salicifolia Ruiz & Pav.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Calceolaria salviaefolia Colla, nom. illeg. = **Calceolaria morisii** Walp.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria santolinoides Kraenzl.
Sin.: *Calceolaria looseni* Kraenzl.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba o subarbusto. Nativa. 3400–4300 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 418* (SI)].

Calceolaria schikendantziana Kraenzl.
Referencias: Molau, U., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30422* (SI)].

Calceolaria secunda Witasek = **Calceolaria andina** Benth.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.

Calceolaria segethii Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000.

Subarbusto. Endémica. 800–2200 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Segeths.n.*(SGO)].

[Calceolaria sessilis Ruiz & Pav.]
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Calceolaria skottsbergii Gand. = **Calceolaria tenella** Poepp. & Endl.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria spatellifolia Kraenzl. = **Calceolaria polifolia** Hook.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria spathulata Witasek
Referencias: Ehrhart, C., 2000; Witasek, J. A., 1906.
Hierba. Perenne. Endémica. 1900–2000 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 5311* (CONC)].

Calceolaria stachydifolia Phil. = **Calceolaria latifolia** Benth.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria stellariifolia Phil.
Sin.: *Calceolaria rupicola* F. Meigen
Referencias: Ehrhart, C., 2000; Molau, U., 1988.
Subarbusto. Endémica. 2700–4300 m.
Países: CHL(I, II, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arancio, G. 421* (CONC)].

Calceolaria talcana Grau & Ehr. Bayer
Referencias: Ehrhart, C., 2005.
Arbusto. Endémica. 500–1300 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gardner, G. 74* (CONC)].

Calceolaria tenella Poepp. & Endl.
Sin.: *Calceolaria skottsbergii* Gand.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Rossow, R. A., 1999b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2488* (CORD)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92318* (CONC, SGO)].

Calceolaria tenera Phil. = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria tenerifolia Phil. = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria tetraphylla Phil. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **tetraphylla** (Phil.) C. Ehrh.

Calceolaria teucrioides Griseb.
Sin.: *Calceolaria ruiz-pavonii* Descole & Borsini, *Calceolaria teucrioides* Griseb. var. *pumila* Griseb.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba o subarbusto. Nativa. 1000–3600 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 155* (SI)].

Calceolaria teucrioides Griseb. var. *pumila* Griseb. = **Calceolaria teucrioides** Griseb.
Referencias: Molau, U., 1988.

Calceolaria thyrsiflora Graham
Sin.: *Calceolaria bridgesii* Kunze, *Calceolaria thyrsiflora* Graham var. *alliacea* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Kraenzlin, F. W. L., 1907.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94188* (MSB)].

Calceolaria thyrsiflora Graham var. *alliacea* Phil. = **Calceolaria thyrsiflora** Graham
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria tripartita Ruiz & Pav.
Referencias: Molau, U., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 24396* (MICH, MO, NY, US)].

Calceolaria tucumana Descole
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988; Novara, L. J. & Juárez de Varela, F. C., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–3900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2685* (CORD, CTES, SI)].

Calceolaria umbellata Wedd.
Sin.: *Calceolaria lorentzii* Griseb.
Referencias: Botta, S. M. & Cabrera, A. L., 1993; Molau, U., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1600* (SI)].

Calceolaria undulata Benth.
Sin.: *Calceolaria brevistyla* Clos, *Calceolaria foliosa* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.
Arbusto. Endémica. 1300–2200 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2316* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Meudt, H. M. 015* (CORD, TEX)].

Calceolaria uniflora Lam.
Sin.: *Calceolaria darwinii* Benth., *Calceolaria minima* Witasek, *Calceolaria nana* Sm., *Calceolaria uniflora* Lam. var. *darwinii* (Kuntze) Witasek ex Reiche, *Fagelia darwinii* Kuntze

Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 1997a, 2000; Moore, D. M., 1968; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2511* (CORD, CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92356* (CONC)].

Calceolaria uniflora Lam. var. *darwinii* (Kuntze) Witasek ex Reiche = **Calceolaria uniflora** Lam.

Calceolaria uniflora Lam. var. *minima* (Witasek) Reiche = **Calceolaria fothergillii** Sol.

Calceolaria uspallatensis Kraenzl. = **Calceolaria ascendens** Lindl. subsp. **ascendens**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria valdiviana Phil. subsp. **crassifolia** (Phil.) C. Ehrh.
Sin.: *Calceolaria crassifolia* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ehrhart, C., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Montero, O. 2273* (CONC)].

Calceolaria valdiviana Phil. subsp. **valdiviana**
Sin.: *Calceolaria llaimae* Kraenzl., *Calceolaria obtusifolia* (Clos) Witasek, *Calceolaria plantaginea* Sm. var. *obtusifolia* Clos, *Calceolaria tenera* Phil., *Calceolaria tenerifolia* Phil., *Calceolaria werdermannii* Kraenzl.
Referencias: Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1800 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lourteig, A. 235* (US)]; CHL[*Ehrhart, C. 95750* (MSB)].

Calceolaria verbascifolia Bertero ex Phil.
Sin.: *Calceolaria borchersi* Phil., *Calceolaria oreas* Phil.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500–1300 m.
Países: CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 961087* (MSB)].

Calceolaria vernicosa Phil. = **Calceolaria meyeniana** Phil. subsp. **nahuelbutae** (Phil.) C. Ehrh.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria villosa Phil. = **Calceolaria corymbosa** Ruiz & Pav. subsp. **montana** (Cav.) C. Ehrh.

Calceolaria violacea Cav. = **Jovellana violacea** (Cav.) G. Don
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1907.

Calceolaria viscosissima (Hook.) Lindl.
Sin.: *Calceolaria gmelinii* Phil., *Calceolaria integrifolia* L. var. *viscosissima* Hook., *Calceolaria pubescens* Phil., *Calceolaria robusta* A. Dietr.
Referencias: Ehrhart, C., 2005.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 971449* (M)].

Calceolaria volckmannii Phil.
Sin.: *Calceolaria benthami* Phil., *Calceolaria bigemina* Phil., *Calceolaria poeppigiana* Phil.
Referencias: Descole, H. R. & Borsini, O. H., 1954; Ehrhart, C., 2000; Kraenzlin, F. W. L., 1907; Rossow, R. A., 1999h.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cocucci, A. A. 2447* (CORD)]; CHL[*Baeza, C. M. 3360* (CONC)].

Calceolaria werdermannii Kraenzl. = **Calceolaria valdiviana** Phil. subsp. **valdiviana**
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria wettsteiniana Witasek = **Calceolaria morisii** Walp.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Calceolaria williamsii Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Ehrhart, C., 1997a, 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2400–2700 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94165* (CONC, MSB)].

Fagelia bangii Rusby = **Calceolaria parvifolia** Wedd.
Referencias: Molau, U., 1988.

Fagelia chelidonioides (Kunth) Kuntze = **Calceolaria chelidonioides** Kunth
Referencias: Molau, U., 1988.

Fagelia darwinii Kuntze = **Calceolaria uniflora** Lam.

Fagelia diversifolia Pennell = **Calceolaria chelidonioides** Kunth
Referencias: Molau, U., 1988.

Fagelia falklandica S. Moore = **Calceolaria biflora** Lam.

Fagelia plectranthifolia (Walp.) Kuntze = **Calceolaria plectranthifolia** Walp.

Fagelia prichardii Rendle = **Calceolaria polyrrhiza** Cav.
Referencias: Ehrhart, C., 2000.

Jovellana Ruiz & Pav.

Número de especies: 3 endémicas

Jovellana guentheri Kraenzl.
Referencias: Kraenzlin, F. W. L., 1929.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Günther, E. 28* (B)].

Jovellana punctata Ruiz & Pav.
Sin.: *Calceolaria puncticulata* Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kraenzlin, F. W. L., 1907.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grau, J. s.n.*(MSB)].

Jovellana violacea (Cav.) G. Don
Sin.: *Calceolaria violacea* Cav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Ehrhart, C., 1997a; Kraenzlin, F. W. L., 1907.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ehrhart, C. 94100* (MSB)].

CALLITRICHACEAE

1 género, 9 especies, 4 especies endémicas, 1 especie introducida.

Callitriche L.

Número de especies: 9, 4 endémicas, 1 introducida

Callitriche albomarginata Fassett
Referencias: Fassett, N. C., 1951; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 2700 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reiche, C. F. s.n.* (GH)].

Callitriche antarctica Engelm. ex Hegelm.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b, 1999a; Fassett, N. C., 1951; Greene, S. W., 1964; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 7334* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Pisano, E. 8194* (CONC)].

Callitriche austinii Engelm. = **Callitriche terrestris** Raf. subsp. **subsessilis** (Fassett) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b.

Callitriche berteroniana Steud. = **Callitriche lechleri** (Hegelm.) Fassett var. **berteroana** (Hegelm.) Fassett
Referencias: Fassett, N. C., 1951.

Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b; Fassett, N. C., 1951; Mereles, F. & Degen, R., 1993b; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX); PRY(CEN); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25990* (SI), *Troncoso, N. S. 1993* (SI)]; BRA[*Jönsson, G. 1044a* (GH, MO, NY, SI, US)]; CHL[*Marticorena, C. 80* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 19* (CTES), *Woolston, A. L. 545* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4947* (SI)].

Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm. var. *austinii* (Engelm.) Hegelm. = **Callitriche terrestris** Raf. subsp. **subsessilis** (Fassett) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b.

Callitriche deflexa A. Braun ex Hegelm. var. *subsessilis* Fassett = **Callitriche terrestris** Raf. subsp. **subsessilis** (Fassett) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b.

Callitriche heterophylla Pursh
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b; Fassett, N. C., 1951.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22639 bis* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 56* (CONC)].

Callitriche heteropoda Engelm. ex Hegelm.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b; Fassett, N. C., 1951; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba acuática. Anual. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(COR, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sparre, B. B. 8586* (LIL)].

Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett var. **berteroana** (Hegelm.) Fassett
Sin.: *Callitriche berteroniana* Steud., *Callitriche marginata* Torr. var. *berteroana* Hegelm.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1999a; Fassett, N. C., 1951.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(CHU, RNE, TDF); CHL(V, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5667* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Bertero, C. L. G. 141* (GH, MO)].

Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett var. **lechleri**
Sin.: *Callitriche marginata* Torr. var. *lechleri* Hegelm., *Callitriche oblongicarpa* Fassett
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b, 1999a; Fassett, N. C., 1951; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba acuática. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VI, VIII, IX, X, XII, IJF, RME); URY(LAV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5607* (SI), *Hicken, C. M. 57* (SI)]; CHL[*Pfister, A. 11863* (SI)]; URY[*Crespo, S. s.n.* (SI)].

Callitriche marginata Torr. var. *berteroana* Hegelm. = **Callitriche lechleri** (Hegelm.) Fassett var. **berteroana** (Hegelm.) Fassett
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1999a; Fassett, N. C., 1951.

Callitriche marginata Torr. var. *lechleri* Hegelm. = **Callitriche lechleri** (Hegelm.) Fassett var. **lechleri**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.

Callitriche oblongicarpa Fassett = **Callitriche lechleri** (Hegelm.) Fassett var. **lechleri**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b.

[Callitriche palustris L.]
Sin.: *Callitriche verna* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Callitriche rimosa Fassett
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b, 1999a; Fassett, N. C., 1951; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, TDF); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(MIE); URY(CAS, FLA, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1187* (SI)]; BRA[*Smith Jr., C. E. 12548* (SI), *Smith, L. B. 13090* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 6536* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 695a* (SI)].

Callitriche terrestris Raf. subsp. **subsessilis** (Fassett) Bacigalupo
Sin.: *Callitriche austinii* Engelm., *Callitriche deflexa* A. Braun ex Hegelm. var. *austinii* (Engelm.) Hegelm., *Callitriche deflexa* A. Braun ex Hegelm. var. *subsessilis* Fassett
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b; Bittrich, V., 2002; Fassett, N. C., 1951; Mereles, F. & Degen, R., 1993b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28858* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12826* (G), *Jörgensen, P. 4509* (SI)].

Callitriche terrestris Raf. subsp. **turfosa** (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo
Sin.: *Callitriche turfosa* Bertero
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Fassett, N. C., 1951; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(II, V, VIII, IX, X, XI, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27982* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 5187* (GH, US)].

Callitriche truncata Guss.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979b, 1999a; Philbrick, C. T. & Bernardello, L. M., 1992; Schotsman, H. D., 1967.
Hierba acuática. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. s.n.* (CONC)].

Callitriche turfosa Bertero = **Callitriche terrestris** Raf. subsp. **turfosa** (Bertero emend. Hegelm.) Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1979a, b.

Callitriche verna L. = **Callitriche palustris** L.

CALYCERACEAE

Autores: Zanotti, C. & Pozner, R.
Revisor: Jørgensen, P. M.

6 géneros, 54 especies, 49 especies endémicas.

Acarpha australis (Decne.) Griseb. = **Boopis australis** Decne.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Acicarpha Juss.

Número de especies: 5, 2 endémicas

[Acicarpha bonariensis (Pers.) Herter]
Sin.: *Buphthalmum bonariense* Pers.
Referencias: Herter, W. G. F., 1943c.
Notas: Nombre dudoso.

Acicarpha bupleuroides Less. = **Boopis bupleuroides** (Less.) C.A. Muell.
Referencias: Reitz, R., 1988a.

Acicarpha crassifolia Miers = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Acicarpha lanata Lag. = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Acicarpha laxa R.E. Fr. = **Acicarpha tribuloides** Juss.
Referencias: Pontiroli, A., 1993a.

Acicarpha obtusisepala Marchesi
Referencias: Delfino, L. & Masciadri, S., 2005; Marchesi, E., 1987.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(ROC).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 10839* (MVFA)].

Acicarpha pinnatifida Miers = **Acicarpha tribuloides** Juss.
Referencias: Pontiroli, A., 1963; Reitz, R., 1988a.

Acicarpha procumbens Less.
Sin.: *Acicarpha procumbens* Less. var. *viridiflora* C.A. Muell.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Pontiroli, A., 1963; Reitz, R., 1988a; Sorarú, S. B., 1974a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CLA, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21436* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 12813* (CTES)]; URY[*Lema 8122* (MVFA)].

Acicarpha procumbens Less. var. *viridiflora* C.A. Muell. = **Acicarpha procumbens** Less.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Acicarpha rosulata N.E. Br. = **Moschopsis rosulata** (N.E. Br.) Dusén
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Acicarpha runcinata Miers
Referencias: Herter, W. G. F., 1943c.
Hierba. Endémica. 0–500 m.

Países: URY(FLO).
Ejemplares de referencia: URY[*Tweedie, J. s.n.* (K)].

Acicarpha spathulata R. Br.
Sin.: *Cryptocarpha spathulata* (R. Br.) Cass.
Referencias: Reitz, R., 1988a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 475* (HBR)].

Acicarpha tribuloides Juss.
Sin.: *Acicarpha laxa* R.E. Fr., *Acicarpha pinnatifida* Miers, *Acicarpha tribuloides* Juss. var. *dentata* Kuntze, *Acicarpha tribuloides* Juss. var. *pinnatifida* (Miers) Kuntze, *Cryptocarpha tribuloides* (Juss.) Cass.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Chiapella, J., 1999b; Fernández Casas, F. J. & Molero Briones, J., 1982; Lombardo, A., 1983; Pontiroli, A., 1963, 1965f, 1993a; Reitz, R., 1988a; Sorarú, S. B., 1974a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(MIE, PAI); URY(MON, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 16099* (LP)]; BRA[*Reitz, P. R. 7695* (HBR)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5241* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 86a* (SI)].

Acicarpha tribuloides Juss. var. *dentata* Kuntze = **Acicarpha tribuloides** Juss.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Acicarpha tribuloides Juss. var. *pinnatifida* (Miers) Kuntze = **Acicarpha tribuloides** Juss.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Anomocarpus axillaris Miers = **Calycera sessiliflora** Phil. var. **axillaris** (Miers) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Anomocarpus eryngioides (J. Remy) Miers = **Calycera eryngioides** J. Remy
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Anomocarpus leucanthemus (Poepp. ex Less.) Miers = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Anomocarpus pulvinatus (J. Remy) Miers = **Calycera pulvinata** J. Remy f. **pulvinata**
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Anomocarpus subsessiliflorus Miers = **Calycera sessiliflora** Phil. var. **sessiliflora**
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Anomocarpus tenuifolius Miers = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Anomocarpus tenuis Miers = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Boopis Juss.

Número de especies: 13 endémicas

Boopis acaulis Phil. = **Nastanthus acaulis** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Boopis agglomeratus (Miers) Hauman, nom. illeg. = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**
Referencias: Chiapella, J., 1999b.

Boopis alpina Poepp. ex Less. = **Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen
Referencias: Hansen, H. V., 1992.

Boopis alpina Speg., hom. illeg. = **Boopis patagonica** Speg.
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Boopis ameghinoi Speg. = **Moschopsis ameghinoi** (Speg.) Dusén
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis angustifolia Phil. = **Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen

Boopis anthemoides Juss. f. *patagonica* Hieron. = **Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis anthemoides Juss. var. **andina** Hieron.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3140* (SI)].

Boopis anthemoides Juss. var. **anthemoides**
Sin.: *Boopis anthemoides* Juss. f. *patagonica* Hieron., *Boopis anthemoides* Juss. var. *rigidula* (Miers) Griseb., *Boopis anthemoides* Juss. var. *subscandens* Speg., *Boopis rigidula* Miers, *Boopis rigidula* Miers var. *patagonica* Hieron., *Gamocarpha angustifolia* Phil.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Sorarú, S. B., 1974a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 958* (SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar localidad ni ejemplar de referencia (Reiche, 1902b).

Boopis anthemoides Juss. var. *rigidula* (Miers) Griseb. = **Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis anthemoides Juss. var. **subintegrifolia** Hicken
Referencias: Hicken, C. M., 1916; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, MEN, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7145* (SI)].

Boopis anthemoides Juss. var. *subscandens* Speg. = **Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis araucana Phil. = **Nastanthus araucanus** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Boopis australis Decne.
Sin.: *Acarpha australis* (Decne.) Griseb., *Boopis australis* Decne. var. *hickenii* Pontiroli, *Boopis australis* Decne. var. *leptophylla* (Speg.) Hicken, *Boopis leptophylla* Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Moore, D. M., 1983; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14342* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Pisano, E. 3213* (CONC)].

Boopis australis Decne. var. *hickenii* Pontiroli = **Boopis australis** Decne.
Referencias: Chiapella, J., 1999b.

Boopis australis Decne. var. *leptophylla* (Speg.) Hicken = **Boopis australis** Decne.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis australis Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli

Boopis bellidifolia Phil. = **Nastanthus spathulatus** (Phil.) Miers var. **bellidifolius** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis bicolor Phil. = **Boopis gracilis** Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis breviflora Phil. = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Boopis breviscapa Phil. = **Gamocarpha gilliesii** Miers var. **gilliesii**

Boopis bupleuroides (Less.) C.A. Muell.
Sin.: *Acicarpha bupleuroides* Less.
Referencias: Reitz, R., 1988a.
Hierba. Anual. Endémica. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 15595* (HBR, US)].

Boopis caespitosa Phil. = **Nastanthus caespitosus** (Phil.) Reiche
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis castillonii (Hicken) Pontiroli
Sin.: *Calycera castillonii* Hicken
Referencias: Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 2053* (SI)].

Boopis chubutensis Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Spegazzini, C. L., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerling, G. F. 210* (SI)].

Boopis compacta Phil. = **Nastanthus compactus** (Phil.) Miers
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Boopis crassifolia (Miers) A. Gray = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis crassifolia (Miers) A. Gray var. *spinuligera* Speg. = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken
Referencias: Chiapella, J., 1999b.

Boopis diazi Phil. = **Nastanthus diazi** (Phil.) Phil. ex Reiche
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis dubia Phil. = **Nastanthus spathulatus** (Phil.) Miers var. **spathulatus**
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Boopis filifolia Speg.
Sin.: *Boopis prichardii* S. Moore
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Domínguez, E., Marticorena, C., Elvebakk, A. & Pauchard, A., 2004; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 24048* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 23* (CONC)].

Boopis gayana Phil. = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Boopis gilliesi (Miers) Hauman = **Gamocarpha gilliesii** Miers var. **gilliesii**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis gracilis Phil.
Sin.: *Boopis bicolor* Phil., *Boopis gracilis* Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek, *Boopis gracilis* Phil. var. *pozoaeformis* (Phil.) Hicken, *Boopis pozoaeformis* Phil.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b; Roquero, M. J., 1969.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SLU); CHL(VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6323* (SI)]; CHL[*Schlegel, F. 3615* (CONC)].

Boopis gracilis Phil. var. *decumbens* Chodat & Wilczek = **Boopis gracilis** Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis gracilis Phil. var. *pozoaeformis* (Phil.) Hicken = **Boopis gracilis** Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis graminea Phil. var. **bracteata** Reiche
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6182* (LP)].
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (Reiche, 1902b).

Boopis graminea Phil. var. **graminea**
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14122* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 5684* (CONC)].

Boopis integrifolia Phil. = **Calycera integrifolia** (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Boopis jürgensii Pilg.
Referencias: Pilger, R. K. F., 1931.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Jürgens, C. 378* (B)].

Boopis laciniata (Miers) Ball = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Boopis leptophylla Speg. = **Boopis australis** Decne.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis leucanthema Poepp. ex Less. = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Boopis miersii Phil. = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Boopis monocephala Phil. = **Moschopsis monocephala** (Phil.) Reiche
Referencias: Pontiroli, A., 1963, 1993a.

Boopis multicaulis Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (P)].

[Boopis multicaulis Phil. var. patagonica Kuntze]
Referencias: Hicken, C. M., 1916.
Notas: Nombre dudoso.

[Boopis oocaulis Kuntze]
Referencias: Chiapella, J., 1999c; Pontiroli, A., 1963.
Notas: Nombre dudoso.

Boopis patagonica Speg.
Sin.: *Boopis alpina* Speg., hom. illeg.
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Chiapella, J., 1999b; Domínguez, E., Marticorena, C., Elvebakk, A. & Pauchard, A., 2004; Hicken, C. M., 1916; Moore, D. M., 1983; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LP)]; CHL[*Domínguez, E. 374* (CONC)].

Boopis pozoaeformis Phil. = **Boopis gracilis** Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis prichardii S. Moore = **Boopis filifolia** Speg.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis pusilla Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica. 1600 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].

Boopis raffaellii Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Raffaelli, A. s.n.* (BAF)].

Boopis reichei Phil. = **Nastanthus spathulatus** (Phil.) Miers var. **spathulatus**
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Boopis rigidula Miers = **Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis rigidula Miers var. *patagonica* Hieron. = **Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis sanjuanina Hieron. = **Nastanthus caespitosus** (Phil.) Reiche
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis scapigera J. Remy = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999b, c.

Boopis scapigera J. Remy var. *ventosus* (Meyen) Wedd. = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers

Boopis spathulata Phil. = **Nastanthus spathulatus** (Phil.) Miers var. **spathulatus**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Boopis squarrosa Miers = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli

Boopis ventosa (Meyen) Kuntze = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Boopis viridiflora Miers, Chodat & Hassl. = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Buphthalmum bonariense Pers. = **Acicarpha bonariensis** (Pers.) Herter
Referencias: Herter, W. G. F., 1943c.

Calycera Cav.

Número de especies: 14, 13 endémicas

Calycera andina Miers, nom. nud. = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**
Referencias: Chiapella, J., 1999b.

Calycera balsamitaefolia Rich. = **Calycera sympaganthera** (Ruiz & Pav.) Kuntze
Referencias: Hansen, H. V., 1992.

Calycera boopidea Hicken
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Hicken, C. M., 1916; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 184* (SI)].

Calycera calcitrapa Griseb.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 27277* (SI)].

Calycera castillonii Hicken = **Boopis castillonii** (Hicken) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Calycera cavanillesi Rich. = **Calycera herbacea** Cav. var. **herbacea**
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963.

Calycera crassifolia (Miers) Hicken
Sin.: *Acicarpha crassifolia* Miers, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray, *Boopis crassifolia* (Miers) A. Gray var. *spinuligera* Speg., *Calycera crassifolia* (Miers) Hicken var. *spinuligera* (Speg.) Hicken, *Calycera foliosa* Phil.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Chiapella, J., 1999b; Cunquero, H., 1984; Delfino, L. & Masciadri, S., 2005; Lombardo, A., 1983; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1963, 1965f.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE); URY(CAS, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 4259* (SI)]; URY[*Cabrera, A. 32314* (SI)].
Notas: Citada para Brasil y Chile sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Pontiroli, 1965f).

Calycera crassifolia (Miers) Hicken var. *spinuligera* (Speg.) Hicken = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken
Referencias: Chiapella, J., 1999b.

Calycera crenata R.E. Fr. = **Calycera pulvinata** J. Remy f. **pulvinata**
Referencias: Chiapella, J., 1999c; Pontiroli, A., 1963.

Calycera eryngioides J. Remy
Sin.: *Anomocarpus eryngioides* (J. Remy) Miers
Referencias: Hicken, C. M., 1916; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Philippi, R. A. s.n.* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 1558* (CONC)].

Calycera foliosa Phil. = **Calycera crassifolia** (Miers) Hicken
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera herbacea Cav. var. **herbacea**
Sin.: *Calycera cavanillesi* Rich.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, TUC); CHL(IV, V, VII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4720* (SI)]; CHL[*Teillier A., S. 4539* (CONC)].

Calycera herbacea Cav. var. *sinuata* (Miers) Pontiroli = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera herbacea Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Sin.: *Boopis australis* Decne. var. *squarrosa* (Miers) Reiche, *Boopis squarrosa* Miers, *Boopis viridiflora* Miers, Chodat & Hassl., *Calycera herbacea* Cav. var. *sinuata* (Miers) Pontiroli, *Calycera nudicaulis* Phil., *Calycera sinuata* Miers, *Calycera squarrosa* Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *sinuata* (Miers) Hicken, *Calycera viridiflora* (Phil.) Miers f. *squarrosa* (Miers) Hicken, *Gymnocaulus viridiflorus* Phil.
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1968; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU, TUC); CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Böcher, T. W. 1014* (LP)]; CHL[*Grandjot, G. F. 3588* (SI)].

Calycera horrida Hicken
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Hicken, C. M., 1912a; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pastore, F. 76* (SI)].

Calycera integrifolia (Phil.) Reiche
Sin.: *Boopis integrifolia* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schönemann, O. s.n.* (SGO)].

Calycera intermedia Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963, 1993a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3132* (SI)].
Notas: Citada para la Región Metropolitana, Chile, sin indicar ejemplar de referencia (Reiche, 1902b).

Calycera involucrata Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 3339* (LIL)].
Notas: Citada para la Región Metropolitana, Chile, sin indicar ejemplar de referencia (Reiche, 1902b).

Calycera lanata Benth. & Hook. f. = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche

Calycera leucanthema (Poepp. ex Less.) Reiche
Sin.: *Acicarpha lanata* Lag., *Anomocarpus leucanthemus* (Poepp. ex Less.) Miers, *Anomocarpus tenuifolius* Miers, *Anomocarpus tenuis* Miers, *Boopis leucanthema* Poepp. ex Less., *Calycera lanata* Benth. & Hook. f., *Leucocera annua* Turcz.
Referencias: Hicken, C. M., 1916; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 552* (SI)].
Notas: Cita dudosa para Neuquén, Argentina.

Calycera neuquenensis Suess. = **Calycera spinulosa** Gillies ex Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c; Hansen, H. V., 1992.

Calycera nudicaulis Phil. = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Calycera pulvinata J. Remy f. **cauligera** Hicken
Referencias: Hicken, C. M., 1916; Pontiroli, A., 1963, 1993a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabezas, V. 48* (SI)].

Calycera pulvinata J. Remy f. *crenata* (R.E. Fr.) Hicken = **Calycera pulvinata** J. Remy f. **pulvinata**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Calycera pulvinata J. Remy f. **pulvinata**
Sin.: *Anomocarpus pulvinatus* (J. Remy) Miers, *Calycera crenata* R.E. Fr., *Calycera pulvinata* J. Remy f. *crenata* (R.E. Fr.) Hicken
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Pontiroli, A., 1963, 1993a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SJU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8389* (LP)]; CHL[*Martin, H. C. 458* (SI)].

Calycera sessiliflora Phil. var. **axillaris** (Miers) Reiche
Sin.: *Anomocarpus axillaris* Miers
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 664* (K)].

Calycera sessiliflora Phil. var. **sessiliflora**
Sin.: *Anomocarpus subsessiliflorus* Miers
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica. 1600 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16784* (SI)].

Calycera sinuata Miers = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera spinulosa Gillies ex Miers
Sin.: *Calycera neuquenensis* Suess., *Calycera spinulosa* Gillies ex Miers var. *serratifolia* Miers
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1968; Chiapella, J., 1999c; Hansen, H. V., 1992; Pontiroli, A., 1963; Suessenguth, K., 1942.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 32822* (SI)].

Calycera spinulosa Gillies ex Miers var. *serratifolia* Miers = **Calycera spinulosa** Gillies ex Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera squarrosa Miers = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera sympaganthera (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. superfl. = **Calycera sympaganthera** (Ruiz & Pav.) Kuntze

Calycera sympaganthera (Ruiz & Pav.) Kuntze
Sin.: *Calycera balsamitaefolia* Rich., *Calycera sympaganthera* (Ruiz & Pav.) Martic. & Quezada, comb. superfl., *Scabiosa sympaganthera* Ruiz & Pav.
Referencias: Hansen, H. V., 1992.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 5358* (CONC)].

Calycera ventosa Meyen = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera viridiflora (Phil.) Miers = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Calycera viridiflora (Phil.) Miers f. *sinuata* (Miers) Hicken = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Calycera viridiflora (Phil.) Miers f. *squarrosa* (Miers) Hicken = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Cryptocarpha spathulata (R. Br.) Cass. = **Acicarpha spathulata** R. Br.
Referencias: Reitz, R., 1988a.

Cryptocarpha tribuloides (Juss.) Cass. = **Acicarpha tribuloides** Juss.
Referencias: Pontiroli, A., 1963; Reitz, R., 1988a.

Gamocarpha DC.

Número de especies: 6 endémicas

Gamocarpha alpina (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen
Sin.: *Boopis alpina* Poepp. ex Less., *Boopis angustifolia* Phil., *Gamocarpha ligulata* Miers, *Gamocarpha poeppigii* DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche, *Gamocarpha poeppigii* DC., hom. illeg.
Referencias: Hansen, H. V., 1992; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9637* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SI)].

Gamocarpha ameghinoi (Speg.) Speg. = **Moschopsis ameghinoi** (Speg.) Dusén
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Gamocarpha angustifolia Phil. = **Boopis anthemoides** Juss. var. **anthemoides**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Gamocarpha breviscapa Phil. = **Gamocarpha gilliesii** Miers var. **gilliesii**
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Gamocarpha caleofuensis Speg. = **Moschopsis caleofuensis** (Speg.) Dusén
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Gamocarpha dentata Phil.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 958* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 5792* (CONC)].

[Gamocarpha dentata Phil. var. glaucescens (Speg.) Hicken]
Sin.: *Gamocarpha subandina* Speg. var. *glaucescens* Speg.
Referencias: Hicken, C. M., 1916.
Notas: Nombre dudoso.

Gamocarpha gilliesii Miers var. **gerthi** Hicken
Referencias: Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gerth, E. 88* (SI)].

Gamocarpha gilliesii Miers var. **gilliesii**
Sin.: *Boopis breviscapa* Phil., *Boopis gilliesi* (Miers) Hauman, *Gamocarpha breviscapa* Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–2500 m.
Países: ARG(MEN); CHL(I, V, VI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Böcher, T. W. 1955* (LP)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Gamocarpha ligulata Miers = **Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen

Gamocarpha patagonica Speg. = **Gamocarpha selliana** Reiche
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Gamocarpha poeppigii DC., hom. illeg. = **Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen
Referencias: Hansen, H. V., 1992.

Gamocarpha poeppigii DC. var. *angustifolia* (Phil.) Reiche = **Gamocarpha alpina** (Poepp. ex Less.) H.V. Hansen

Gamocarpha polycephala Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Solís Obando, M. A. s.n.* (SGO)].

Gamocarpha pumila Miers
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (K)].
Notas: Cita dudosa para Argentina (Pontiroli, 1963).

Gamocarpha rosulata (N.E. Br.) Skottsb. = **Moschopsis rosulata** (N.E. Br.) Dusén
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Gamocarpha selliana Reiche
Sin.: *Gamocarpha patagonica* Speg., *Gamocarpha selliana* Reiche var. *multicaulis* Dusén
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Platen, L. 5* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14380* (BAB)].

Gamocarpha selliana Reiche var. *multicaulis* Dusén = **Gamocarpha selliana** Reiche
Referencias: Chiapella, J., 1999b.

Gamocarpha subandina Speg. = **Moschopsis subandina** (Speg.) Dusén
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1991; Pontiroli, A., 1963.

Gamocarpha subandina Speg. var. *glaucescens* Speg. = **Gamocarpha dentata** Phil. var. **glaucescens** (Speg.) Hicken
Referencias: Hicken, C. M., 1916.

Gymnocaulus viridiflorus Phil. = **Calycera herbacea** Cav. var. **viridiflora** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Leucocera annua Turcz. = **Calycera leucanthema** (Poepp. ex Less.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Moschopsis Phil.

Número de especies: 7, 6 endémicas

Moschopsis ameghinoi (Speg.) Hicken, comb. superfl. = **Moschopsis ameghinoi** (Speg.) Dusén

Moschopsis ameghinoi (Speg.) Dusén
Sin.: *Boopis ameghinoi* Speg., *Gamocarpha ameghinoi* (Speg.) Speg., *Moschopsis ameghinoi* (Speg.) Hicken, comb. superfl.
Referencias: Chiapella, J., 1999c; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Anual. Endémica. 200–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Moschopsis caleofuensis (Speg.) Dusén
Sin.: *Gamocarpha caleofuensis* Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 991* (SI)].

Moschopsis leyboldii Phil.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 4086* (SI)]; CHL[*Barrientos, R. s.n.* (CONC)].

Moschopsis monocephala (Phil.) Reiche
Sin.: *Boopis monocephala* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Pontiroli, A., 1963, 1993a; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Anual. Nativa. 4000–5000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31855* (SI)]; CHL[*Martin, H. C. 218* (SI)].

Moschopsis rosulata (N.E. Br.) Dusén
Sin.: *Acicarpha rosulata* N.E. Br., *Gamocarpha rosulata* (N.E. Br.) Skottsb., *Moschopsis spathulata* Dusén
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Chiapella, J., 1999b; Hansen, H. V., 1992; Moore, D. M., 1983; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–2500 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Witte, L. 59* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92091* (CONC, SGO)].

Moschopsis spathulata Dusén = **Moschopsis rosulata** (N.E. Br.) Dusén
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Moschopsis subandina (Speg.) Dusén
Sin.: *Gamocarpha subandina* Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Hansen, H. V., 1992; Marticorena, C. & Quezada, M., 1991; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Illin, N. 64* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. s.n.* (CONC)].

Moschopsis trilobata Dusén
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963; Ricardi, M. & Marticorena, C., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. s.n.* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 388* (CONC)].

Nastanthus Miers

Número de especies: 9 endémicas

[Nastanthus acaulis (Phil.) Reiche]
Sin.: *Boopis acaulis* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Notas: Nombre dudoso.

Nastanthus agglomeratus Miers var. **agglomeratus**
Sin.: *Boopis agglomeratus* (Miers) Hauman, nom. illeg., *Boopis breviflora* Phil., *Boopis gayana* Phil., *Calycera andina* Miers, nom. nud., *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gayanus* (Phil.) Reiche, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *gilliesii* (Miers) Reiche, *Nastanthus andina* (Miers) H.V. Hansen, nom. inval., *Nastanthus gayanus* (Phil.) Miers, *Nastanthus gilliesii* Miers
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1968; Chiapella, J., 1999c; Hansen, H. V., 1992; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3200 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tellechea, M. 2* (LIL)]; CHL[*Ricardi, M. 2908* (CONC)].

Nastanthus agglomeratus Miers var. *breviflorus* (Phil.) Reiche = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Nastanthus agglomeratus Miers var. *gayanus* (Phil.) Reiche = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Nastanthus agglomeratus Miers var. *gilliesii* (Miers) Reiche = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Nastanthus agglomeratus Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Nastanthus agglomeratus Miers var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche
Sin.: *Boopis laciniata* (Miers) Ball, *Nastanthus agglomeratus* Miers var. *laciniatus* (Miers) Reiche, *Nastanthus laciniatus* Miers, *Nastanthus pinnatifidus* Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b; Ruíz Leal, R. A., 1975[1972].
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13753* (BAB)]; CHL[*Marticorena, C. 42* (CONC)].

Nastanthus andina (Miers) H.V. Hansen, nom. inval. = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

[Nastanthus araucanus (Phil.) Reiche]
Sin.: *Boopis araucana* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Notas: Nombre dudoso.

Nastanthus bellidifolius (Phil.) Reiche = **Nastanthus spathulatus** (Phil.) Miers var. **bellidifolius** (Phil.) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Nastanthus bellidifolius (Phil.) Reiche var. *chubutensis* (Speg.) Hicken = **Nastanthus chubutensis** Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963.

Nastanthus caespitosus (Phil.) Reiche
Sin.: *Boopis caespitosa* Phil., *Boopis sanjuanina* Hieron., *Nastanthus sanjuaninus* (Hieron.) Hieron.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Chiapella, J., 1999b; Hansen, H. V., 1992; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–4300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, RNE, SJU); CHL(II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8579* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 946* (SI)].

Nastanthus caespitosus (Phil.) Reiche var. *ventosus* (Meyen) Pontiroli = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Nastanthus chubutensis Speg.
Sin.: *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche var. *chubutensis* (Speg.) Hicken
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 8038* (BAB)].
Notas: Su presencia en Tierra del Fuego, Argentina, es dudosa (Moore, 1970).

Nastanthus compactus (Phil.) Miers
Sin.: *Boopis compacta* Phil.
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Bianual. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, F. s.n.* (SGO)].

Nastanthus diazi (Phil.) Phil. ex Reiche
Sin.: *Boopis diazi* Phil.
Referencias: Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Díaz, W. s.n.* (SI)].

Nastanthus falklandicus D.M. Moore
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Hansen, H. V., 1992; Moore, D. M., 1967.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 707* (LP)].
Notas: Según Hansen (1992) podría ser ubicado en el género *Boopis*.

Nastanthus gayanus (Phil.) Miers = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Nastanthus gilliesii Miers = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **agglomeratus**

Nastanthus laciniatus Miers = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Nastanthus patagonicus Speg.
Referencias: Chiapella, J., 1999b; Hansen, H. V., 1992; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2297* (SI)].

Nastanthus pinnatifidus Miers = **Nastanthus agglomeratus** Miers var. **pinnatifidus** (Miers) Reiche
Referencias: Chiapella, J., 1999b, c.

Nastanthus sanjuaninus (Hieron.) Hieron. = **Nastanthus caespitosus** (Phil.) Reiche
Referencias: Pontiroli, A., 1963.

Nastanthus scapiger Miers = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.

Nastanthus scapigerus (J. Remy) Miers
Sin.: *Boopis miersii* Phil., *Boopis scapigera* J. Remy, *Boopis scapigera* J. Remy var. *ventosus* (Meyen) Wedd., *Boopis ventosa* (Meyen) Kuntze, *Calycera ventosa* Meyen, *Nastanthus caespitosus* (Phil.) Reiche var. *ventosus* (Meyen) Pontiroli, *Nastanthus scapiger* Miers, *Nastanthus ventosus* (Meyen) Miers
Referencias: Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1968; Chiapella, J., 1999b; Marticorena, C., com. pers.; Pontiroli, A., 1963.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR); CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11624* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Germain, P. s.n.* (K)].

Nastanthus spathulatus (Phil.) Miers var. **bellidifolius** (Phil.) Pontiroli
Sin.: *Boopis bellidifolia* Phil., *Nastanthus bellidifolius* (Phil.) Reiche
Referencias: Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].
Notas: Cita dudosa para la Argentina (Pontiroli, 1963).

Nastanthus spathulatus (Phil.) Miers var. **spathulatus**
Sin.: *Boopis dubia* Phil., *Boopis reichei* Phil., *Boopis spathulata* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Böcher, T. W., Hjerting, J. P. K. & Rahn, K., 1968; Chiapella, J., 1999b; Hansen, H. V., 1992; Pontiroli, A., 1963; Reiche, C. F., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3800 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14163* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].
Notas: Su presencia en Tierra del Fuego, Argentina, es dudosa (Moore, 1970).

Nastanthus ventosus (Meyen) Miers = **Nastanthus scapigerus** (J. Remy) Miers
Referencias: Chiapella, J., 1999c.

Scabiosa sympaganthera Ruiz & Pav. = **Calycera sympaganthera** (Ruiz & Pav.) Kuntze

CAMPANULACEAE

Autor: Lammers, T. G.

9 géneros, 49 especies, 17 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Bolelia humilis Greene = **Downingia pusilla** (G. Don ex A. DC.) Torr.
Referencias: McVaugh, R., 1941; Wimmer, F. E., 1953.

Bolelia pusilla (Poepp.) Greene = **Downingia pusilla** (G. Don ex A. DC.) Torr.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Campanula L.

Número de especies: 1 introducida

Campanula arida Kunth = **Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Campanula biflora Ruiz & Pav. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Campanula chilensis Molina = **Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Campanula linarioides Lam. = **Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Campanula ludoviciana Torr. ex A. Gray, nom. nud. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Campanula montevidensis Spreng. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Campanula rotundifolia L.
Referencias: Chiapella, J., 1999a; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1206* (SI)].

Centropogon argentinus Griseb. = **Siphocampylus argentinus** (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **argentinus**
Referencias: Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.

[Centropogon cornutus (L.) Druce]
Sin.: *Lobelia cornuta* L.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Clintonia pusilla G. Don ex A. DC. = **Downingia pusilla** (G. Don ex A. DC.) Torr.
Referencias: McVaugh, R., 1941; Wimmer, F. E., 1953.

Cyphocarpus Miers

Número de especies: 3 endémicas

Cyphocarpus innocuus Sandwith
Referencias: Sandwith, N. Y., 1931.
Hierba. Anual. Endémica. 1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Elliott, C. 98* (K)].

Cyphocarpus psammophilus Ricardi
Referencias: Ricardi, M., 1959.
Hierba. Anual. Endémica. 800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4460* (CONC)].

Cyphocarpus rigescens Miers
Sin.: *Cyphocarpus rigescens* Miers f. *glabratus* Phil. ex E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1968.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Wagenknecht, R. 18580* (G)].

Cyphocarpus rigescens Miers f. *glabratus* Phil. ex E. Wimm. = **Cyphocarpus rigescens** Miers

Dortmannia anceps (L. f.) Kuntze = **Lobelia anceps** L. f.

Dortmannia aquatica (Cham.) Kuntze = **Lobelia aquatica** Cham.
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia arguta (Lindl.) Kuntze = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia berteroi (A. DC.) Kuntze = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia besseriana (C. Presl) Kuntze = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia bicalcarata Kuntze = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia blanda (D. Don) Kuntze = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia bracteosa (C. Presl) Kuntze = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia bridgesii (Hook. & Arn.) Kuntze = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia camporum (Pohl) Kuntze = **Lobelia camporum** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia cliffortiana (L.) Kuntze var. *xalapensis* (Kunth) Kuntze = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia cordigera (Cav.) Kuntze = **Lobelia cordigera** Cav.
Referencias: Thompson, S. W. & Lammers, T. G., 1997.

Dortmannia cymbalaria (Griseb.) Kuntze = **Lobelia nana** Kunth var. **flagelliformis** Wedd.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia exaltata (Pohl) Kuntze = **Lobelia exaltata** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia excelsa (Bonpl.) Kuntze = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia fastigiata (Kunth) Kuntze = **Lobelia fastigiata** Kunth
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia gardneriana (Kanitz) Kuntze = **Lobelia fastigiata** Kunth

Dortmannia hyssopifolia (C. Presl) Kuntze = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia lucaeana (C. Presl) Kuntze = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia mollis (Graham) Kuntze = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia monticola (Kunth) Kuntze = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia mucronata (Cav.) Kuntze = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia nana (Kunth) Kuntze = **Lobelia nana** Kunth var. **nana**
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia nummularioides (Cham.) Kuntze = **Lobelia nummularioides** Cham. var. **nummularioides**
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia ocimoides (Kunze) Kuntze = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia philippiana Kuntze = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia polyphylla (Hook. & Arn.) Kuntze = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia purpurea (G. Don) Kuntze = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia subdentata (C. Presl) Kuntze = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Dortmannia tupa (L.) Kuntze = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Dortmannia valdiviana (Phil.) Kuntze = **Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.
Referencias: Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.

Downingia Torr.

Número de especies: 1

Downingia humilis (Greene) Greene = **Downingia pusilla** (G. Don ex A. DC.) Torr.
Referencias: McVaugh, R., 1941; Wimmer, F. E., 1953.

Downingia pusilla (G. Don ex A. DC.) Torr.
Sin.: *Bolelia humilis* Greene, *Bolelia pusilla* (Poepp.) Greene, *Clintonia pusilla* G. Don ex A. DC., *Downingia humilis* (Greene) Greene, *Lobelia pusilla* Poepp.
Referencias: Chiapella, J., 1999a; McVaugh, R., 1941; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 1019* (SI)]; CHL[*Joseph, F. C. 2725* (US)].

Dysmicodon californicum Nutt. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Dysmicodon ovatum Nutt. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Euphorbia masafuerae Phil. = **Wahlenbergia masafuerae** (Phil.) Skottsb.

Haynaldia exaltata (Pohl) Kanitz = **Lobelia exaltata** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Haynaldia exaltata (Pohl) Kanitz var. *ramosa* Kanitz = **Lobelia exaltata** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Hippobroma G. Don

Número de especies: 1 introducida

Hippobroma longiflora (L.) G. Don
Sin.: *Isotoma longiflora* (L.) C. Presl, *Laurentia longiflora* (L.) Endl., *Lobelia longiflora* L.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14008* (SI)].

Howellia limosa Greene = **Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.
Referencias: Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.

Howellia valdiviana (Phil.) E. Wimm. = **Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.
Referencias: Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.

Hypsela atacamensis (Phil.) F. Phil. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Hypsela longiflora (Hook. f.) F. Phil. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Hypsela oligophylla (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Hypsela reniformis (Kunth) C. Presl = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Hypsela subsessilis (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Isotoma longiflora (L.) C. Presl = **Hippobroma longiflora** (L.) G. Don

Laurentia longiflora (L.) Endl. = **Hippobroma longiflora** (L.) G. Don

Legenere McVaugh

Número de especies: 1

Legenere limosa (Greene) McVaugh = **Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.
Referencias: Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.

Legenere valdiviana (Phil.) E. Wimm.
Sin.: *Dortmannia valdiviana* (Phil.) Kuntze, *Howellia limosa* Greene, *Howellia valdiviana* (Phil.) E. Wimm., *Legenere limosa* (Greene) McVaugh, *Lobelia valdiviana* (Phil.) Vatke, *Mezleria valdiviana* Phil.
Referencias: Chiapella, J., 1999a; Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.
Hierba. Anual. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(CHU); CHL(X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. L. 3613* (BAB)]; CHL[*Hollermayer, A. 639* (CONC)].

Legouzia biflora Britton = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Lobelia L.

Número de especies: 17, 7 endémicas, 1 introducida

Lobelia alata Labill. = **Lobelia anceps** L. f.

Lobelia anceps L. f.
Sin.: *Dortmannia anceps* (L. f.) Kuntze, *Lobelia alata* Labill., *Lobelia rupincola* Bertero ex Colla, *Rapuntium alatum* (Labill.) C. Presl, *Rapuntium anceps* (L. f.) C. Presl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA); CHL(II, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6598* (HBR, R)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].

Lobelia aquatica Cham.
Sin.: *Dortmannia aquatica* (Cham.) Kuntze, *Lobelia bracteolata* Vatke, *Lobelia domingensis* A. DC., *Rapuntium aquaticum* (Cham.) C. Presl
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 815* (CTES)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 7574* (G)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4741* (G)].

Lobelia arguta Lindl. = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia axilliflora (Phil.) Reiche = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia betulaefolia Cham. = **Siphocampylus betulaefolius** (Cham.) G. Don
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia bicalcarata (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia blanda (D. Don) Heynh. = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia bracteolata Vatke = **Lobelia aquatica** Cham.
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia bridgesii Hook. & Arn.
Sin.: *Dortmannia blanda* (D. Don) Kuntze, *Dortmannia bridgesii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmannia lucaeana* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia blanda* (D. Don) Heynh., *Lobelia lucaeana* (C. Presl) A. DC., *Rapuntium blandum* (D. Don) C. Presl, *Rapuntium bridgesii* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium lucaeanum* C. Presl, *Tupa blanda* D. Don, *Tupa bridgesii* (Hook. & Arn.) A. DC.
Referencias: Lammers, T. G. & Hensold, N., 1992; Lammers, T. G., 1993, 2000; Wimmer, F. E., 1953.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 663* (K, W)].

Lobelia camporum Pohl
Sin.: *Dortmannia camporum* (Pohl) Kuntze, *Lobelia camporum* Pohl f. *angustifolia* E. Wimm., *Lobelia camporum* Pohl var. *lundiana* A. DC., *Lobelia paulista* E. Wimm., *Rapuntium camporum* (Pohl) C. Presl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Nativa. 700–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Maruñak, V. 95* (CTES, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13480* (SI)].

Lobelia camporum Pohl f. *angustifolia* E. Wimm. = **Lobelia camporum** Pohl

Lobelia camporum Pohl var. *lundiana* A. DC. = **Lobelia camporum** Pohl

Lobelia cliffortiana L. = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia cliffortiana L. var. *xalapensis* (Kunth) A. Gray = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia convolvulacea Cham. = **Siphocampylus convolvulaceus** (Cham.) G. Don
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

[Lobelia cordigera Cav.]
Sin.: *Dortmannia cordigera* (Cav.) Kuntze, *Rapuntium cordigera* (Cav.) C. Presl
Referencias: Thompson, S. W. & Lammers, T. G., 1997.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Lobelia cornuta L. = **Centropogon cornutus** (L.) Druce

Lobelia cymbalaria Griseb. = **Lobelia nana** Kunth var. **flagelliformis** Wedd.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia domingensis A. DC. = **Lobelia aquatica** Cham.
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia exaltata Pohl
Sin.: *Dortmannia exaltata* (Pohl) Kuntze, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz, *Haynaldia exaltata* (Pohl) Kanitz var. *ramosa* Kanitz, *Rapuntium exaltatum* (Pohl) C. Presl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1000 m.

Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (SI)].

Lobelia excelsa Bonpl.
Sin.: *Dortmannia arguta* (Lindl.) Kuntze, *Dortmannia excelsa* (Bonpl.) Kuntze, *Lobelia arguta* Lindl., *Lobelia gigantea* auct. non Cav., *Lobelia neriifolia* Moris, *Lobelia salicifolia* Sweet, *Rapuntium excelsum* (Bonpl.) C. Presl, *Tupa arguta* (Lindl.) G. Don, *Tupa glaucescens* Phil., *Tupa salicifolia* (Sweet) G. Don
Referencias: Lammers, T. G. & Hensold, N., 1992; Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lammers, T. G. 7604* (CONC, F, OS, US)].

Lobelia fastigiata Kunth
Sin.: *Dortmannia fastigiata* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia gardneriana* (Kanitz) Kuntze, *Lobelia gardneriana* Kanitz, *Rapuntium fastigiatum* (Kunth) C. Presl
Referencias: Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 2151* (G)].

Lobelia feuillei (G. Don) Voss, nom. illeg. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia gardneriana Kanitz = **Lobelia fastigiata** Kunth

Lobelia gigantea auct. non Cav. = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia hassleri Zahlbr.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Molfino, J. F., 1922d; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Endémica. 200–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 176* (SI)]; BRA[*Henz, E. 35747* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5921* (SI)].

Lobelia hederacea Cham. var. **elliptica** Hook. & Arn.
Sin.: *Pratia elliptica* (A. DC.) Hook. f., *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don var. *elliptica* A. DC., *Pratia odorata* Graham, *Pratia serpyllacea* C. Presl
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Chiapella, J., 1999a; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1957.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, RNE); BRA(RGS, SCA); URY(LAV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 13742* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 4456* (HBR)]; URY[*Berro, M. B. 5251* (G)].

Lobelia hederacea Cham. var. **hederacea**
Sin.: *Pratia hederacea* (Cham.) G. Don
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974a; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Wimmer, F. E., 1935, 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1652* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12876* (HBR, R)]; PRY[*Hassler, E. 162* (SI), *Marín, G. 274* (BM, PY)].

Lobelia hyssopifolia (C. Presl) Gay = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia langeana Dusén
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (SI)].

Lobelia longiflora L. = **Hippobroma longiflora** (L.) G. Don
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Lobelia lucaeana (C. Presl) A. DC. = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia lycioides Cham. = **Siphocampylus lycioides** (Cham.) G. Don
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia mollis Graham = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

[Lobelia monadelpha Larrañaga]
Referencias: Wimmer, F. E., 1957.
Notas: Nombre dudoso.

Lobelia monticola Kunth = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia mucronata Cav. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia mucronata Cav. f. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia mucronata Cav. f. *ovalifolia* E. Wimm. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia mucronata Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia nana Kunth var. **flagelliformis** Wedd.
Sin.: *Dortmannia cymbalaria* (Griseb.) Kuntze, *Lobelia cymbalaria* Griseb.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32142* (SI)].

Lobelia nana Kunth var. **nana**
Sin.: *Dortmannia nana* (Kunth) Kuntze, *Rapuntium nanum* (Kunth) C. Presl
Referencias: Juárez de Varela, F. C., 2000; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 1900–2400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 1192* (SI)].

Lobelia neriifolia Moris = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia nummularioides Cham. var. **nummularioides**
Sin.: *Dortmannia nummularioides* (Cham.) Kuntze, *Rapuntium nummularioides* (Cham.) C. Presl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Anual. Nativa. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(COA, GUA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14131* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 6413* (G), *Pedersen, T. M. 4400* (SI)].

Lobelia nummularioides Cham. var. **prostrata** (Zahlbr.) E. Wimm
Sin.: *Lobelia prostata* Zahlbr.
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAN, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2964* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1762* (BM, CTES, PY)].

Lobelia ocimoides Kunze = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia oligophylla (Wedd.) Lammers
Sin.: *Hypsela atacamensis* (Phil.) F. Phil., *Hypsela longiflora* (Hook. f.) F. Phil., *Hypsela oligophylla* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Hypsela reniformis* (Kunth) C. Presl, *Hypsela subsessilis* (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Zahlbr., *Lobelia pratiana* Gaudich. ex Lammers, *Lysipomia reniformis* Kunth, *Pratia atacamensis* Phil., *Pratia longiflora* Hook. f., *Pratia oligophylla* Wedd., *Pratia pencana* Phil., *Pratia repens* Gaudich., *Pratia subsessilis* Wedd.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Chiapella, J., 1996, 1999a; Lammers, T. G., 1999; Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. 3872* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. s.n.* (SI)].

Lobelia ovata Reiche = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia palmaris Willd. = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia paulista E. Wimm. = **Lobelia camporum** Pohl

Lobelia pedicellaris C. Presl = **Siphocampylus longepedunculatus** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia poeppigiana Kunze ex A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn.
Sin.: *Dortmannia besseriana* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia bracteosa* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia hyssopifolia* (C. Presl) Kuntze, *Dortmannia polyphylla* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Dortmannia purpurea* (G. Don) Kuntze, *Dortmannia subdentata* (C. Presl) Kuntze, *Lobelia axilliflora* (Phil.) Reiche, *Lobelia hyssopifolia* (C. Presl) Gay, *Lobelia ovata* Reiche, *Lobelia poeppigiana* Kunze ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. f. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC., *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche, *Lobelia polyphylla* Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh., *Lobelia purpurea* auct. non Breiter, *Rapuntium besserianum* C. Presl, *Rapuntium bracteosum* C. Presl, *Rapuntium hyssopifolium* C. Presl, *Rapuntium poeppigianum* (Kunze ex A. DC.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium polyphyllum* (Hook. & Arn.) C. Presl var. *angustifolium* (Hook. & Arn.) C. Presl, *Rapuntium purpureum* (G. Don) C. Presl, *Rapuntium subdentatum* C. Presl, *Tupa atropurpurea* Vis., *Tupa axilliflora* Phil., *Tupa besseriana* (C. Presl) A. DC., *Tupa bracteosa* (C. Presl) A. DC., *Tupa coquimbana* Phil., *Tupa gayana* Phil., *Tupa hyssopifolia* (C. Presl) A. DC., *Tupa linearifolia* Phil., *Tupa ovata* Phil., *Tupa poeppigiana* Phil., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC., *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var.

coquimbana Vatke, *Tupa polyphylla* (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC., *Tupa purpurea* G. Don, *Tupa serrata* Phil., *Tupa subdentata* (C. Presl) A. DC.
Referencias: Lammers, T. G. & Hensold, N., 1992; Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 30* (SI)].

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. f. *bracteosa* (C. Presl) E. Wimm. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. f. *hyssopifolia* (C. Presl) E. Wimm. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. f. *linearifolia* (Phil.) E. Wimm. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. f. *subdentata* (C. Presl) E. Wimm. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. var. *angustifolia* (Hook. & Arn. ex A. DC.) Heynh. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. var. *angustifolia* Hook. & Arn. ex A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. var. *besseriana* (C. Presl) Reiche = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. var. *bracteosa* (C. Presl) Reiche = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. var. *coquimbana* (Vatke) Reiche = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia polyphylla Hook. & Arn. var. *latifolia* (A. DC.) Heynh. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia pratiana Gaudich. ex Lammers = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Lobelia prostata Zahlbr. = **Lobelia nummularioides** Cham. var. **prostrata** (Zahlbr.) E. Wimm
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Wimmer, F. E., 1935, 1953.

Lobelia purpurea auct. non Breiter = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia pusilla Poepp. = **Downingia pusilla** (G. Don ex A. DC.) Torr.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia reniformis Cham.
Sin.: *Pratia reniformis* (Cham.) Kanitz, *Rapuntium reniforme* (Cham.) C. Presl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1957.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9133* (HBR, R, US)].

Lobelia rupincola Bertero ex Colla = **Lobelia anceps** L. f.

Lobelia salicifolia Sweet = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia scabra C. Presl = **Siphocampylus longepedunculatus** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia serrata Meyen = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia tupa L.
Sin.: *Dortmannia berteroi* (A. DC.) Kuntze, *Dortmannia bicalcarata* Kuntze, *Dortmannia mucronata* (Cav.) Kuntze, *Dortmannia philippiana* Kuntze, *Dortmannia tupa* (L.) Kuntze, *Lobelia bicalcarata* (Kuntze) Zahlbr. ex K. Schum., *Lobelia feuillei* (G. Don) Voss, nom. illeg., *Lobelia mucronata* Cav., *Lobelia mucronata* Cav. f. *hookeri* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. f. *ovalifolia* E. Wimm., *Lobelia mucronata* Cav. var. *berteroi* (A. DC.) E. Wimm., *Lobelia serrata* Meyen, *Lobelia tupa* L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm., *Lobelia tupa* L. var. *montana* Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche, *Lobelia tupa* L. var. *pavonii* E. Wimm., *Rapuntium mucronatum* (Cav.) C. Presl, *Rapuntium tupa* (L.) C. Presl, *Tupa berteroi* A. DC., *Tupa cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Tupa feuillei* G. Don, *Tupa feuillei* G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *macrophylla* Vatke, *Tupa feuillei* G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke, *Tupa montana* auct. non C. Wright ex Griseb., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC., *Tupa mucronata* (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Lammers, T. G. & Hensold, N., 1992; Lammers, T. G., 2000; Matthews, V. A., 1988; Wimmer, F. E., 1953.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 10625* (SI)].

Lobelia tupa L. var. *berteroi* (A. DC.) Reiche = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia tupa L. var. *bicalcarata* (Kuntze) E. Wimm. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia tupa L. var. *montana* Reiche = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia tupa L. var. *mucronata* (Cav.) Reiche = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia tupa L. var. *pavonii* E. Wimm. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Lobelia umbellata Kunth = **Siphocampylus umbellatus** (Kunth) G. Don
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia valdiviana (Phil.) Vatke = **Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.
Referencias: Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.

Lobelia verticillata Cham. = **Siphocampylus verticillatus** (Cham.) G. Don
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Lobelia xalapensis Kunth
Sin.: *Dortmannia cliffortiana* (L.) Kuntze var. *xalapensis* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia mollis* (Graham) Kuntze, *Dortmannia monticola* (Kunth) Kuntze, *Dortmannia ocimoides* (Kunze) Kuntze, *Lobelia cliffortiana* L., *Lobelia cliffortiana* L. var. *xalapensis* (Kunth) A. Gray, *Lobelia mollis* Graham, *Lobelia monticola* Kunth, *Lobelia ocimoides* Kunze, *Lobelia palmaris* Willd., *Rapuntium monticulum* (Kunth) C. Presl, *Rapuntium xalapense* (Kunth) C. Presl
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2193* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12624* (HBR, R, US)]; PRY[*Basualdo, I. 1608* (FCQ), *Hassler, E. 223* (SI)].

Lysipomia reniformis Kunth = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Mezleria valdiviana Phil. = **Legenere valdiviana** (Phil.) E. Wimm.
Referencias: Ruiz de Ciolfi, E. N., 1976.

Pentagonia biflora (Ruiz & Pav.) Kuntze = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Pratia atacamensis Phil. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Pratia elliptica (A. DC.) Hook. f. = **Lobelia hederacea** Cham. var. **elliptica** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1957.

Pratia hederacea (Cham.) G. Don = **Lobelia hederacea** Cham. var. **hederacea**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974a; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1957.

Pratia hederacea (Cham.) G. Don var. *elliptica* A. DC. = **Lobelia hederacea** Cham. var. **elliptica** Hook. & Arn.

Pratia longiflora Hook. f. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Pratia odorata Graham = **Lobelia hederacea** Cham. var. **elliptica** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1957.

Pratia oligophylla Wedd. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Pratia pencana Phil. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Pratia reniformis (Cham.) Kanitz = **Lobelia reniformis** Cham.

Pratia repens Gaudich. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Pratia serpyllacea C. Presl = **Lobelia hederacea** Cham. var. **elliptica** Hook. & Arn.
Referencias: Cabrera, A. L. & Zardini, E. M., 1979[1978]; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1957.

Pratia subsessilis Wedd. = **Lobelia oligophylla** (Wedd.) Lammers
Referencias: Lammers, T. G., 1999.

Rapuntium alatum (Labill.) C. Presl = **Lobelia anceps** L. f.

Rapuntium anceps (L. f.) C. Presl = **Lobelia anceps** L. f.

Rapuntium aquaticum (Cham.) C. Presl = **Lobelia aquatica** Cham.
Referencias: Chiapella, J. & Tressens, S. G., 1997; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium besserianum C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium blandum (D. Don) C. Presl = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium bracteosum C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium bridgesii (Hook. & Arn.) C. Presl = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium camporum (Pohl) C. Presl = **Lobelia camporum** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium cordigera (Cav.) C. Presl = **Lobelia cordigera** Cav.
Referencias: Thompson, S. W. & Lammers, T. G., 1997.

Rapuntium exaltatum (Pohl) C. Presl = **Lobelia exaltata** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium excelsum (Bonpl.) C. Presl = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium fastigiatum (Kunth) C. Presl = **Lobelia fastigiata** Kunth
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium hyssopifolium C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium lucaeanum C. Presl = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium monticulum (Kunth) C. Presl = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium mucronatum (Cav.) C. Presl = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium nanum (Kunth) C. Presl = **Lobelia nana** Kunth var. **nana**
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium nummularioides (Cham.) C. Presl = **Lobelia nummularioides** Cham. var. **nummularioides**
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium poeppigianum (Kunze ex A. DC.) C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.

Rapuntium polyphyllum (Hook. & Arn.) C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium polyphyllum (Hook. & Arn.) C. Presl var. *angustifolium* (Hook. & Arn.) C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.

Rapuntium purpureum (G. Don) C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium reniforme (Cham.) C. Presl = **Lobelia reniformis** Cham.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1957.

Rapuntium subdentatum C. Presl = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Rapuntium tupa (L.) C. Presl = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Rapuntium xalapense (Kunth) C. Presl = **Lobelia xalapensis** Kunth
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Siphocampylus Pohl

Número de especies: 16, 2 endémicas

Siphocampylus argentinus (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **argentinus**
Sin.: *Centropogon argentinus* Griseb., *Siphocampylus argentinus* (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. *cuspidatus* (E. Wimm.) E. Wimm., *Siphocampylus cuspidatus* E. Wimm.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32123* (SI)].

Siphocampylus argentinus (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. *cuspidatus* (E. Wimm.) E. Wimm.
= **Siphocampylus argentinus** (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **argentinus**
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Siphocampylus argentinus (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **hirticorollinus** E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 305* (W)].

Siphocampylus betulaefolius (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia betulaefolia* Cham.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Nativa. 500–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7747* (HBR)].

[Siphocampylus betulaefolius (Cham.) G. Don var. uleanus E. Wimm.]
Notas: Nombre dudoso.

[Siphocampylus boliviensis Zahlbr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Siphocampylus capribarba E. Wimm.]
Notas: Nombre dudoso.

Siphocampylus convolvulaceus (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia convolvulacea* Cham.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Arbusto o liana. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 12126* (SI)].

Siphocampylus cuspidatus E. Wimm. = **Siphocampylus argentinus** (Griseb.) Hieron. ex E. Wimm var. **argentinus**
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Siphocampylus densidentatus E. Wimm.
= **Siphocampylus fimbriatus** Regel
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Siphocampylus fiebrigii E. Wimm.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 4223* (SI)].

Siphocampylus fimbriatus Regel
Sin.: *Siphocampylus densidentatus* E. Wimm., *Siphocampylus fulgens* Lebas, *Siphocampylus humboldtianum* Hook.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Nativa. 700–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 589* (SI)].

Siphocampylus foliosus Griseb. var. **diversifolius** (Hicken) Pontiroli
Sin.: *Siphocampylus tupaeformis* Zahlbr. var. *diversifolius* Hicken
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.
Subarbusto. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*de la Sota, E. R. 2974* (LP)].

Siphocampylus foliosus Griseb. var. **foliosus**
Referencias: Juárez de Varela, F. C., 2000; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8310* (SI)].

Siphocampylus foliosus Griseb. var. **glabratus** E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 10536* (G)].

Siphocampylus foliosus Griseb. var. **lessenii** E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lessen, W. 32* (F)].

Siphocampylus foliosus Griseb. var. **minor** Zahlbr.
Referencias: Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Stuckert, T. J. V. 10816* (G)].

Siphocampylus foliosus Griseb. var. **subcanus** E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1777* (SI)].

Siphocampylus fulgens Lebas = **Siphocampylus fimbriatus** Regel
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Siphocampylus humboldtianum Hook. = **Siphocampylus fimbriatus** Regel
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Siphocampylus hypopogon E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 5667* (W)].
Notas: Citada para Brasil por Wimmer (1935) sin mencionar localidad o ejemplar de referencia.

Siphocampylus longepedunculatus Pohl
Sin.: *Lobelia pedicellaris* C. Presl, *Lobelia scabra* C. Presl, *Siphocampylus scaber* (C. Presl) A. DC.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Arbusto o liana. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4646* (HBR)].

Siphocampylus lorentzii E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 697* (B)].

Siphocampylus lycioides (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia lycioides* Cham.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35463* (SI)].

Siphocampylus nemoralis Griseb.
Sin.: *Siphocampylus nemoralis* Griseb. f. *hieronymi* E. Wimm., *Siphocampylus nemoralis* Griseb. var. *grisebachii* E. Wimm.
Referencias: Juárez de Varela, F. C., 2000; Pontiroli, A., 1993b; Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2896* (SI)].

Siphocampylus nemoralis Griseb. f. *hieronymi* E. Wimm. = **Siphocampylus nemoralis** Griseb.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Siphocampylus nemoralis Griseb. var. *grisebachii* E. Wimm. = **Siphocampylus nemoralis** Griseb.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Siphocampylus orbignyanus A. DC.
Sin.: *Siphocampylus volubilis* Britton
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.
Subarbusto. Nativa. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34055* (SI)].

Siphocampylus scaber (C. Presl) A. DC. = **Siphocampylus longepedunculatus** Pohl
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Siphocampylus sulphureus E. Wimm.
Sin.: *Siphocampylus verticillatus* auct. non (Cham.) G. Don
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3709* (HBR)].

Siphocampylus tupaeformis Zahlbr. var. *diversifolius* Hicken = **Siphocampylus foliosus** Griseb. var. **diversifolius** (Hicken) Pontiroli
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Siphocampylus umbellatus (Kunth) G. Don
Sin.: *Lobelia umbellata* Kunth
Referencias: Wimmer, F. E., 1968.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2953* (W), *Hatschbach, G. 32605* (SI)].

Siphocampylus verticillatus auct. non (Cham.) G. Don = **Siphocampylus sulphureus** E. Wimm.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1953.

Siphocampylus verticillatus (Cham.) G. Don
Sin.: *Lobelia verticillata* Cham., *Siphocampylus verticillatus* (Cham.) G. Don var. *grandiflorens* E. Wimm.
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Wimmer, F. E., 1935, 1953.
Subarbusto. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gamerro, J. C. 104* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3760* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5793* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8064b* (MVFA)].

Siphocampylus verticillatus (Cham.) G. Don var. *grandiflorens* E. Wimm. = **Siphocampylus verticillatus** (Cham.) G. Don
Referencias: Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989.

Siphocampylus volubilis Britton = **Siphocampylus orbignyanus** A. DC.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.

Siphocampylus yerbalensis E. Wimm.
Referencias: Wimmer, F. E., 1953.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1294* (SI)].

Specularia biflora (Ruiz & Pav.) Fisch. & A. Gray = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Specularia californica (Nutt.) Vatke = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Specularia ovata (Nutt.) Vatke = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Specularia perfoliata (L.) A. DC. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Specularia perfoliata (L.) A. DC. f. *ramosa* Arechav. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Specularia perfoliata (L.) A. DC. f. *rigida* Arechav. = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Triodanis Raf.

Número de especies: 1

Triodanis biflora (Ruiz & Pav.) Greene = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Referencias: Bradley, T. R., 1975.

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley = **Triodanis perfoliata** (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers

Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. subsp. **biflora** (Ruiz & Pav.) Lammers
Sin.: *Campanula biflora* Ruiz & Pav., *Campanula ludoviciana* Torr. ex A. Gray, nom. nud., *Campanula montevidensis* Spreng., *Dysmicodon californicum* Nutt., *Dysmicodon ovatum* Nutt., *Legouzia biflora* Britton, *Pentagonia biflora* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Specularia biflora* (Ruiz & Pav.) Fisch. & A. Gray, *Specularia californica* (Nutt.) Vatke, *Specularia ovata* (Nutt.) Vatke, *Specularia perfoliata* (L.) A. DC., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *ramosa* Arechav., *Specularia perfoliata* (L.) A. DC. f. *rigida* Arechav., *Triodanis biflora* (Ruiz & Pav.) Greene, *Triodanis perfoliata* (L.) Nieuwl. var. *biflora* (Ruiz & Pav.) T.R. Bradley
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974a; Bradley, T. R., 1975; Chiapella, J., 1999a; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Lammers, T. G., 2006; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1993b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II, V, VIII, X); PRY(APA, PAI); URY(CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 554* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12550* (HBR, R, US)]; CHL[*Garaventa, A. 6586* (CONC)]; PRY[*Rojas, T. 14001* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 2153* (MVFA)].

Tupa arguta (Lindl.) G. Don = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa atropurpurea Vis. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa axilliflora Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa berteroi A. DC. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa besseriana (C. Presl) A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa blanda D. Don = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa bracteosa (C. Presl) A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa bridgesii (Hook. & Arn.) A. DC. = **Lobelia bridgesii** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Tupa cavanillesiana G. Don, nom. illeg. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa coquimbana Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.

Tupa feuillei G. Don = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Tupa feuillei G. Don var. *berteroi* (A. DC.) Vatke = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa feuillei G. Don var. *macrophylla* Vatke = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa feuillei G. Don var. *mucronata* (Cav.) Vatke = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa gayana Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa glaucescens Phil. = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Tupa hyssopifolia (C. Presl) A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa linearifolia Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa montana auct. non C. Wright ex Griseb. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa mucronata (Cav.) A. DC. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa mucronata (Cav.) A. DC. var. *hookeri* A. DC. = **Lobelia tupa** L.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa ovata Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa poeppigiana Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don var. *angustifolia* (Hook. & Arn.) A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don var. *besseriana* (C. Presl) Vatke = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don var. *bracteosa* (C. Presl) Vatke = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don var. *coquimbana* Vatke = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa polyphylla (Hook. & Arn.) G. Don var. *latifolia* A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa purpurea G. Don = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa salicifolia (Sweet) G. Don = **Lobelia excelsa** Bonpl.
Referencias: Lammers, T. G., 2000; Wimmer, F. E., 1953.

Tupa serrata Phil. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Tupa subdentata (C. Presl) A. DC. = **Lobelia polyphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Lammers, T. G., 2000.

Wahlenbergia Schrad. ex Roth

Número de especies: 8, 5 endémicas

Wahlenbergia arida (Kunth) Griseb. = **Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Wahlenbergia berteroi Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9101* (CONC)].

Wahlenbergia calycina Schltdl. ex Griseb.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5814* (SI)].

Wahlenbergia fernandeziana A. DC.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5159* (CONC)].

Wahlenbergia grahamae Hemsl.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 400–600 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9027* (CONC)].

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC.
Sin.: *Campanula arida* Kunth, *Campanula chilensis* Molina, *Campanula linarioides* Lam., *Wahlenbergia arida* (Kunth) Griseb., *Wahlenbergia linarioides* (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974a; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Chiapella, J., 1999a; Fontana, J. L., 1998; Fromm Trinta, E. & Santos, E., 1989; Pontiroli, A., 1993b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X); PRY(APA, CAU, CAA, CEN, GUA, PAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1180* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1542* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 2958* (CONC)]; PRY[*Hassler, E. 1363* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 480a* (SI)].

Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC. var. *arida* (Kunth) A. DC. = **Wahlenbergia linarioides** (Lam.) A. DC.
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.

Wahlenbergia masafuerae (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Euphorbia masafuerae* Phil.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 9317* (CONC)].

Wahlenbergia peruviana A. Gray
Referencias: Pontiroli, A., 1993b.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3659* (SI)].

Wahlenbergia tuberosa Hook. f.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Stuessy, T. F. 5036* (CONC)].

CANELLACEAE

2 géneros, 2 especies, 1 especie endémica.

Canella axillaris Nees ex Mart. = **Cinnamodendron axillare** (Nees ex Mart.) Endl. ex Walp.
Referencias: Reitz, R., 1988b.

Capsicodendron Hoehne

Número de especies: 1

Capsicodendron dinisii (Schwacke) Occhioni
Sin.: *Capsicodendron pimenteira* Hoehne, *Cinnamodendron dinisii* Schwacke
Referencias: Reitz, R., 1988b.
Árbol. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35536* (SI), *Smith, L. B. 12847* (HBR, US)].

Capsicodendron pimenteira Hoehne = **Capsicodendron dinisii** (Schwacke) Occhioni
Referencias: Reitz, R., 1988b.

Cinnamodendron Endl.

Número de especies: 1 endémica

Cinnamodendron axillare (Nees ex Mart.) Endl. ex Walp.
Sin.: *Canella axillaris* Nees ex Mart.
Referencias: Reitz, R., 1988b.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 1033a* (SI), *Klein, R. M. 154* (HBR)].

Cinnamodendron dinisii Schwacke = **Capsicodendron dinisii** (Schwacke) Occhioni
Referencias: Reitz, R., 1988b.

CANNABACEAE

1 género, 2 especies introducidas.

Antidesma scandens Lour. = **Humulus scandens** (Lour.) Merr.

Humulus L.

Número de especies: 2 introducidas

Humulus japonicus Siebold & Zucc. = **Humulus scandens** (Lour.) Merr.
Referencias: Boelcke, O., 1992.

Humulus lupulus L.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Enredadera. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Chiapella, J. s.n.* (BCRU)].

Humulus scandens (Lour.) Merr.
Sin.: *Antidesma scandens* Lour., *Humulus japonicus* Siebold & Zucc.
Referencias: Boelcke, O., 1992; Dawson, G., 1967a; Miller, N. G., 1970; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Enredadera. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Steibel, P. 8623* (SRFA)].

CAPPARACEAE

Autor: Costa e Silva, M. B.

4 géneros, 25 especies, 4 especies endémicas.

Atamisquea emarginata Miers ex Hook. & Arn. = **Capparis atamisquea** Kuntze
Referencias: Pérez-Moreau, R. L., 1984b; Troncoso, N. S., 1987c.

Capparis L.

Número de especies: 7

Capparis atamisquea Kuntze
Sin.: *Atamisquea emarginata* Miers ex Hook. & Arn.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pérez-Moreau, R. L., 1984b; Troncoso, N. S., 1987c.
Arbusto. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 585* (BAB), *Rotman, A. D. 968* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5795* (CTES, FCQ, MO)].

[Capparis brasiliana DC.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Capparis brasiliana DC. var. *puberula* Hieron., nom. nud. = **Capparis humilis** Hassl.
Referencias: Hauman, L. L., 1925b.

Capparis cynophallophora L. var. *cuneata* Malme = **Capparis retusa** Griseb. var. **retusa**
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Capparis cynophallophora L. var. *cynophallophora* = **Capparis flexuosa** (L.) L. var. **flexuosa**
Referencias: Ruiz Zapata, T. & Iltis, H. H., 1998.

Capparis cynophallophora L. var. *pubescens* Hassl. = **Capparis flexuosa** (L.) L. var. **pubescens** (Hassl.) H.H. Iltis

Capparis cynophallophora L. var. *retusa* (Griseb.) Kuntze = **Capparis retusa** Griseb. var. **retusa**
Referencias: Troncoso, N. S., 1987c.

Capparis flexuosa (L.) L. var. **flexuosa**
Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cynophallophora*, *Morisonia flexuosa* L.
Referencias: Ruiz Zapata, T. & Iltis, H. H., 1998.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL); BRA(RGS, SCA); PRY(CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4118* (SI)]; BRA[*Stienstra, B. H. 191* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 135a* (SI), *Zardini, E. M. 8113* (FCQ, MO)].

Capparis flexuosa (L.) L. var. **pubescens** (Hassl.) H.H. Iltis
Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *pubescens* Hassl.
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(CEN, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2676* (BA), *Meyer, T. 62bis* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1255* (G), *Pedersen, T. M. 9275* (SI)].

Capparis humilis Hassl.
Sin.: *Capparis brasiliana* DC. var. *puberula* Hieron., nom. nud.
Referencias: Gómez, S. A., 1953.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 647* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 5612* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 11432* (G), *Montes, J. E. 7154* (SI)].

Capparis malmeana Gilg = **Capparis speciosa** Griseb.

Capparis pruinosa Griseb. = **Capparis speciosa** Griseb.
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Capparis retusa Griseb. var. **retusa**
Sin.: *Capparis cynophallophora* L. var. *cuneata* Malme, *Capparis cynophallophora* L. var. *retusa* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez, S. A., 1953; Troncoso, N. S., 1987c.
Arbusto. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 262* (SI)]; PRY[*Kiesling, R. 9594* (G, PY, SI), *Schinini, A. 4175* (SI)].

Capparis retusa Griseb. var. **velutina** Hauman
Referencias: Gómez, S. A., 1953.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 146* (SI), *Venturi, S. 5525* (SI)].

Capparis salicifolia Griseb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SDE); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 1208* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5782* (CTES, FCQ, MO)].

Capparis speciosa Griseb.
Sin.: *Capparis malmeana* Gilg, *Capparis pruinosa* Griseb., *Capparis speciosa* Griseb. var. *normalis* Kuntze, *Capparis speciosa* Griseb. var. *pruinosa* (Griseb.) Hassl., *Capparis speciosa* Griseb. var. *vera* Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31924* (SI), *Venturi, S. 5415* (LIL)]; PRY[*Mereles, F. 5829* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 2078* (SI)].

Capparis speciosa Griseb. var. *normalis* Kuntze = **Capparis speciosa** Griseb.
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Capparis speciosa Griseb. var. *pruinosa* (Griseb.) Hassl. = **Capparis speciosa** Griseb.
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Capparis speciosa Griseb. var. *vera* Hassl. = **Capparis speciosa** Griseb.
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Capparis tweediana Eichler
Referencias: Angely, J. A., 1965; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez, S. A., 1953; Pontiroli, A., 1967a; Troncoso, N. S., 1987c.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25937* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 49243* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3188* (CTES, FCQ, MO), *Schinini, A. 18091* (SI)].

Cleome L.

Número de especies: 16, 4 endémicas

Cleome aculeata L. var. **aculeata**
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Hierba. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SFE, SJU, SLU); PRY(CEN, CON, COA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castiglioni, J. A. 6711* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3462* (SI), *Zardini, E. M. 21181* (AS, MO)].

Cleome aculeata L. var. **cordobensis** (Eichler & Griseb.) Kuntze
Sin.: *Cleome cordobensis* Eichler ex Griseb.
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Hierba. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 370* (SI)].

Cleome bicolor Gardner = **Cleome rosea** Vahl ex DC.

Cleome brasiliensis Weinm. = **Cleome parviflora** Kunth

Cleome chilensis DC.
Sin.: *Cleome chilensis* DC. var. *pubescens* DC.
Referencias: Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 300–700 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 10727* (MO), *Werdermann, E. 765* (SI)].

[Cleome chilensis DC. var. glabra DC.]
Notas: Nombre dudoso.

Cleome chilensis DC. var. *pubescens* DC. = **Cleome chilensis** DC.

Cleome chodatiana H.H. Iltis
Sin.: *Physostemon hasslerianum* Chodat
Referencias: Iltis, H. H., 1959; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 400–600 m.
Países: PRY(CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4434* (BM)].

Cleome cordobensis Eichler ex Griseb. = **Cleome aculeata** L. var. **cordobensis** (Eichler & Griseb.) Kuntze
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Cleome crenopetala DC.
Hierba. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7365* (GH, L, MO, NY)].

Cleome eosina J.F. Macbr.
Sin.: *Cleome microcarpa* Hassl., hom. illeg.
Referencias: Costa e Silva, M. B., 2000.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11013* (G), *Rojas, T. 2077* (SI)].

Cleome flexuosa Griseb., nom. illeg. = **Cleome tucumanensis** H.H. Iltis
Referencias: Iltis, H. H., 1960; Zapater, M. A., 1992.

Cleome friesii Heilborn = **Cleome viridiflora** Schreb.
Referencias: Ruiz Zapata, T. & Iltis, H. H., 1998.

Cleome gigantea L. = **Cleome viridiflora** Schreb.
Referencias: Chávez de Michel, L. R., 1993; Ruiz Zapata, T. & Iltis, H. H., 1998.

Cleome guaranitica (Chodat & Hassl.) Briq.
Sin.: *Cleome rosea* Vahl ex DC. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6423* (G)].

Cleome hassleriana Chodat
Sin.: *Cleome houtteana* Schltdl., *Cleome spinosa* auct. non Jacq.
Referencias: Costa e Silva, M. B., Giulietti, A. M., Stam, G. P. & Sztutman, M., 2002; Troncoso, N. S., 1987c.
Hierba. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CEN, ITA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21197* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 2493* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6492* (SI)].

Cleome houtteana Schltdl. = **Cleome hassleriana** Chodat

Cleome inermis Malme = **Cleome rosea** Vahl ex DC.

[Cleome lanceolata (Mart. & Zucc.) H.H. Iltis var. lanceolata]
Sin.: *Physostemon lanceolatum* Mart. & Zucc.
Referencias: Iltis, H. H., 1959.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Cleome lanceolata (Mart. & Zucc.) H.H. Iltis var. **paraguarensis** H.H. Iltis
Referencias: Iltis, H. H., 1959.
Hierba. Nativa. 100–600 m.
Países: PRY(AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 2598* (GH, MO, P, SI)].
Notas: Cita dudosa para la Argentina (Iltis, 1959).

Cleome lilloi S.A. Gómez
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 658* (SI), *Pierotti, A. 12* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 2076* (SI)].

Cleome microcarpa Hassl., hom. illeg. = **Cleome eosina** J.F. Macbr.
Referencias: Costa e Silva, M. B., 2000.

Cleome montevidense Arechav. = **Cleome titubans** Speg.
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Pontiroli, A., 1967a; Troncoso, N. S., 1987c.

Cleome paludosa Willd. ex Eichler = **Cleome serrata** Jacq. subsp. **paludosa** (Willd. ex Eichler) H.H. Iltis
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Cleome paludosa Willd. ex Eichler var. *brevipes* Hauman = **Cleome serrata** Jacq. subsp. **paludosa** (Willd. ex Eichler) H.H. Iltis
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

Cleome parviflora Kunth
Sin.: *Cleome brasiliensis* Weinm., *Cleome parviflora* Kunth subsp. *psoraleaefolia* (DC.) H.H. Iltis, nom. illeg., *Cleome psoraleaefolia* DC., *Cleome villosa* Gardner
Referencias: Angely, J. A., 1965; Costa e Silva, M. B., Giulietti, A. M., Stam, G. P. & Sztutman, M., 2002; Gómez, S. A., 1953; Iltis, H. H., 1999; Troncoso, N. S., 1987c.

Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, COA, GUA, SPE); URY(ART, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2146* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 14034* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5776* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 3352* (MVFA)].

Cleome parviflora Kunth subsp. *psoraleaefolia* (DC.) H.H. Iltis, nom. illeg. = **Cleome parviflora** Kunth
Referencias: Iltis, H. H., 1999.

Cleome psoraleaefolia DC. = **Cleome parviflora** Kunth
Referencias: Iltis, H. H., 1999.

Cleome psoraleaefolia DC. var. *trachycarpa* (Klotzsch ex Eichler) Kuntze = **Cleome trachycarpa** Klotzsch ex Eichler
Referencias: Gómez, S. A., 1953.

[Cleome pubescens Sims]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Cleome pungens Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cleome rosea Vahl ex DC.
Sin.: *Cleome bicolor* Gardner, *Cleome inermis* Malme
Referencias: Costa e Silva, M. B., Giulietti, A. M., Stam, G. P. & Sztutman, M., 2002; Gómez, S. A., 1953.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10848* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3030* (PACA, WIS)].

Cleome rosea Vahl ex DC. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Cleome guaranitica** (Chodat & Hassl.) Briq.

Cleome serrata Jacq. subsp. **paludosa** (Willd. ex Eichler) H.H. Iltis
Sin.: *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler, *Cleome paludosa* Willd. ex Eichler var. *brevipes* Hauman
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3264* (SI), *Schultz 181* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9392* (SI), *Zardini, E. M. 41617* (AS, MO)].

[Cleome spinifolia Larrañaga]
Notas: Nombre dudoso.

[Cleome spinosa Jacq.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto. Citada para Argentina sobre la base de material no perteneciente a esta especie.

[Cleome spinosa Rojas Acosta, hom. illeg.]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Cleome spinosa auct. non Jacq. = **Cleome hassleriana** Chodat

Cleome titubans Speg.
Sin.: *Cleome montevidense* Arechav.
Referencias: Alonso Paz, E., 1997; Gómez, S. A., 1953; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1967a; Troncoso, N. S., 1987c.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CLA, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2550* (SI)]; BRA[*Esposito, E. 350* (PACA, PEL)]; URY[*Felippone, F. 5381* (SI)].

Cleome trachycarpa Klotzsch ex Eichler
Sin.: *Cleome psoraleaefolia* DC. var. *trachycarpa* (Klotzsch ex Eichler) Kuntze
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Iltis, H. H., 1967; Pontiroli, A., 1967a; Troncoso, N. S., 1987c.
Hierba. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, CON, PHA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29894* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 41441* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 35611* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 259b* (MVFA)].

Cleome tucumanensis H.H. Iltis
Sin.: *Cleome flexuosa* Griseb., nom. illeg.
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Iltis, H. H., 1960; Zapater, M. A., 1992.
Hierba. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 10956* (LIL), *Venturi, S. 654* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 798* (MO)].

Cleome villosa Gardner = **Cleome parviflora** Kunth

Cleome viridiflora Schreb.
Sin.: *Cleome friesii* Heilborn, *Cleome gigantea* L.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Chávez de Michel, L. R., 1993; Costa e Silva, M. B., Giulietti, A. M., Stam, G. P. & Sztutman, M., 2002; Ruiz Zapata, T. & Iltis, H. H., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6723* (SI)]; BRA[*Cervi, A. C. 6073* (MBM, NY, UPCB)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6109* (SI)].

Crateva L.

Número de especies: 1

Crateva tapia L.
Referencias: Chávez de Michel, L. R., 1993; Costa e Silva, M. B., Giulietti, A. M., Stam, G. P. & Sztutman, M., 2002; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, SFE); BRA(PAR); PRY(CEN, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2547* (SI)]; BRA [*Pott, A. 1431* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 26771* (SI)].

Dactylaena Schrad. ex Schult. f.

Número de especies: 1

Dactylaena pauciflora Griseb.
Referencias: Gómez, S. A., 1953; Legname, P. R., 1972.
Hierba. Nativa. 500–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2711* (LIL)].

Morisonia flexuosa L. = **Capparis flexuosa** (L.) L. var. **flexuosa**
Referencias: Ruiz Zapata, T. & Iltis, H. H., 1998.

Physostemon hasslerianum Chodat = **Cleome chodatiana** H.H. Iltis
Referencias: Iltis, H. H., 1959.

Physostemon lanceolatum Mart. & Zucc. = **Cleome lanceolata** (Mart. & Zucc.) H.H. Iltis var. **lanceolata**
Referencias: Iltis, H. H., 1959.

CAPRIFOLIACEAE

2 géneros, 2 especies introducidas.

Lonicera L.

Número de especies: 1 introducida

Lonicera brachypoda DC. var. *repens* Siebold = **Lonicera japonica** Thunb. var. **repens** (Siebold) Rehder
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974b.

Lonicera japonica Thunb. var. **japonica**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974b; Juárez de Varela, F. C., 1996; Reitz, R., 1985; Solbrig, O. T., 1960–1961.
Enredadera. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, JUJ, NEU, RNE, SAL); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24954* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3228* (HBR, US)]; URY[*Lombardo, A. 4146* (MVJB)].

Lonicera japonica Thunb. var. **repens** (Siebold) Rehder
Sin.: *Lonicera brachypoda* DC. var. *repens* Siebold
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1974b; Rehder, A., 1926.
Enredadera. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 17844* (SI)].

Symphoricarpos Duhamel

Número de especies: 1 introducida

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
Sin.: *Vaccinium album* L.
Referencias: Ezcurra, C., 1999c.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 10026* (BAB)].

Vaccinium album L. = **Symphoricarpos albus** (L.) S.F. Blake
Referencias: Ezcurra, C., 1999c.

CARDIOPTERIDACEAE

1 género, 6 especies, 1 especie endémica.

Cassine gongonha Mart. = **Citronella gongonha** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Citronella D. Don

Número de especies: 6, 1 endémica

Citronella apogon (Griseb.) R.A. Howard
Sin.: *Emmotum apogon* Griseb.
Referencias: Howard, R. A., 1942; Legname, P. R., 1973a; Sleumer, H. O., 1953b.
Árbol. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 1507* (SI), *Lorentz, P. G. 438* (CORD, GOET)].

Citronella engleriana (Loes.) R.A. Howard
Sin.: *Villaresia engleriana* Loes.
Referencias: Howard, R. A., 1940.
Arbusto. Nativa. 1300–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cordeiro, J. 1765* (MBM)].

Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard
Sin.: *Cassine gongonha* Mart., *Ilex gongonha* (Mart.) D. Don, *Myginda gongonha* (Mart.) DC., *Villaresia cuspidata* Miers, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers, *Villaresia mucronata* auct. non Ruiz & Pav.
Referencias: Duno de Stefano, R., 2002a; Howard, R. A., 1942; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Sleumer, H. O., 1953b.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 535* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 17165* (G), *Kummrow, R. 2801* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 4594* (G), *Jörgensen, P. 4498* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1624* (FM, G, SI)].

Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don
Sin.: *Patagua chilensis* Poepp. ex Neger, *Villaresia chilensis* Stuntz, *Villaresia gongonha* (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl., *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav., *Villaresia mucronata* Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers, *Villaresia pungens* Miers

Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Howard, R. A., 1942.
Árbol. Endémica. 800–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994939* (CONC, SGO)].

Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard
Sin.: *Citronella paraguariensis* (Hassl.) R.A. Howard, *Leonia paniculata* Mart., *Leretia paniculata* (Mart.) Miq., *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers, *Villaresia paniculata* (Mart.) Miers var. *intermedia* Hassl., *Villaresia paraguariensis* Hassl., *Villaresia ramiflora* Miers, *Villaresia virescens* Miers
Referencias: Duno de Stefano, R., 2002a; Howard, R. A., 1942; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Sleumer, H. O., 1953b.
Árbol. Nativa. 200–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, COA, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25552* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11971* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 11872* (A, G, US), *Woolston, A. L. 713* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Citronella paraguariensis (Hassl.) R.A. Howard = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Duno de Stefano, R., 2002a.

Citronella toledoi Hashim.
Referencias: Hashimoto, G., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 2456* (MBM, SI)].

Emmotum apogon Griseb. = **Citronella apogon** (Griseb.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Ilex gongonha (Mart.) D. Don = **Citronella gongonha** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Leonia paniculata Mart. = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Leretia paniculata (Mart.) Miq. = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Myginda gongonha (Mart.) DC. = **Citronella gongonha** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Patagua chilensis Poepp. ex Neger = **Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Howard, R. A., 1942.

Villaresia chilensis Stuntz = **Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Howard, R. A., 1942.

Villaresia cuspidata Miers = **Citronella gongonha** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia engleriana Loes. = **Citronella engleriana** (Loes.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1940.

Villaresia gongonha (Mart.) Miers = **Citronella gongonha** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia gongonha (Mart.) Miers var. *pungens* (Miers) Engl. = **Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Howard, R. A., 1942.

Villaresia mucronata auct. non Ruiz & Pav. = **Citronella gongonha** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia mucronata Ruiz & Pav. = **Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Howard, R. A., 1942.

Villaresia mucronata Ruiz & Pav. var. *laeta* Miers = **Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Howard, R. A., 1942.

Villaresia paniculata (Mart.) Miers = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia paniculata (Mart.) Miers var. *intermedia* Hassl. = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia paraguariensis Hassl. = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia pungens Miers = **Citronella mucronata** (Ruiz & Pav.) D. Don
Referencias: Howard, R. A., 1942.

Villaresia ramiflora Miers = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

Villaresia virescens Miers = **Citronella paniculata** (Mart.) R.A. Howard
Referencias: Howard, R. A., 1942; Sleumer, H. O., 1953b.

CARICACEAE

2 géneros, 6 especies, 1 especie endémica.

Carica L.

Número de especies: 4, 1 endémica

Carica chilensis (Planch. ex A. DC.) Solms
Sin.: *Carica pyriformis* auct. non Willd., *Papaya chilensis* (Planch. ex A. DC.) Kuntze, *Vasconcellea chilensis* Planch. ex A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bridges, T. C. 114* (BM, K, W), *Jiles, C. 219* (SI)].

Carica dodecaphylla Vell. = **Jacaratia spinosa** (Aubl.) A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Carica glandulosa Pav. ex A. DC.
Sin.: *Carica gossypiifolia* Griseb., *Carica triplisecta* Herzog, *Papaya gossypiifolia* (Griseb.) Kuntze, *Vasconcellea glandulosa* Pav. ex A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 1151* (LP, SI)].

Carica gossypiifolia Griseb. = **Carica glandulosa** Pav. ex A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993.

Carica jimenezii (Bertoni) Bertoni = **Carica papaya** L.
Referencias: Fernández Casas, F. J., 1987.

Carica lanceolata (A. DC.) Hieron. = **Carica quercifolia** (A. St.-Hil.) Hieron.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Carica papaya L.
Sin.: *Carica jimenezii* (Bertoni) Bertoni, *Carica papaya* L. var. *jimenezii* Bertoni
Referencias: Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fernández Casas, F. J., 1987, 1988; Santos, E., 1970.
Arbolito. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1881* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 8149* (FLOR, HBR)]; PRY[*Hassler, E. 12412* (BM, G, MO, NY)].
Notas: Según Santos (1970) es cultivada en Santa Catarina y Rio Grande do Sul, Brasil.

Carica papaya L. var. *jimenezii* Bertoni = **Carica papaya** L.
Referencias: Badillo, V. M., 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

Carica pyriformis auct. non Willd. = **Carica chilensis** (Planch. ex A. DC.) Solms
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron.
Sin.: *Carica lanceolata* (A. DC.) Hieron., *Papaya lanceolata* (A. DC.) Kuntze, *Papaya quercifolia* (A. St.-Hil.) Kuntze, *Vasconcellea lanceolata* A. DC., *Vasconcellea quercifolia* A. St.-Hil.
Referencias: Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993, 1997; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Fernández Casas, F. J., 1987, 1988; Santos, E., 1970; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(CLA, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 22334* (SI), *Horovitz, S. 1111* (B, G, MY, SI)]; BRA[*Rambo, B. 49107* (LIL, W), *Sehnem, A. 2252* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 2197* (G, K), *Rojas, T. 2014* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1866* (SI), *Rosengurtt, B. 15395* (U)].

Carica spinosa Aubl. = **Jacaratia spinosa** (Aubl.) A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

Carica triplisecta Herzog = **Carica glandulosa** Pav. ex A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Jacaratia A. DC.

Número de especies: 2

Jacaratia corumbensis Kuntze
Sin.: *Jacaratia hassleriana* Chodat, *Jacaratia heptaphylla* (Vell.) A. DC. f. *inermis* Kuntze
Referencias: Arenas, P. & Giberti, G. C. C., 1993; Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fernández Casas, F. J., 1987.
Arbusto. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20186* (SI), *Schreiter, R. 9127* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 304* (SI), *Hassler, E. 7362* (BM, G, K, MO, NY)].

Jacaratia dodecaphylla (Vell.) A. DC. = **Jacaratia spinosa** (Aubl.) A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

Jacaratia dodecaphylla (Vell.) A. DC. f. *longiflora* Hassl. = **Jacaratia spinosa** (Aubl.) A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

Jacaratia dodecaphylla (Vell.) A. DC. var. *lucida* Hassl. = **Jacaratia spinosa** (Aubl.) A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

Jacaratia hassleriana Chodat = **Jacaratia corumbensis** Kuntze
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

Jacaratia heptaphylla (Vell.) A. DC. f. *inermis* Kuntze = **Jacaratia corumbensis** Kuntze
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
Sin.: *Carica dodecaphylla* Vell., *Carica spinosa* Aubl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A. DC., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A. DC. f. *longiflora* Hassl., *Jacaratia dodecaphylla* (Vell.) A. DC. var. *lucida* Hassl.
Referencias: Badillo, V. M., 1967, 1971, 1993; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Fernández Casas, F. J., 1987, 1988.
Árbol. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8673* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 49101* (LIL)]; PRY[*Balansa, B. 2196* (G), *Woolston, A. 892* (SI)].

Papaya chilensis (Planch. ex A. DC.) Kuntze = **Carica chilensis** (Planch. ex A. DC.) Solms
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Papaya gossypiifolia (Griseb.) Kuntze = **Carica glandulosa** Pav. ex A. DC.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Papaya lanceolata (A. DC.) Kuntze = **Carica quercifolia** (A. St.-Hil.) Hieron.
Referencias: Badillo, V. M., 1993.

Papaya quercifolia (A. St.-Hil.) Kuntze = **Carica quercifolia** (A. St.-Hil.) Hieron.
Referencias: Badillo, V. M., 1993.

Vasconcellea chilensis Planch. ex A. DC. = **Carica chilensis** (Planch. ex A. DC.) Solms
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Vasconcellea glandulosa Pav. ex A. DC. = **Carica glandulosa** Pav. ex A. DC.

Vasconcellea lanceolata A. DC. = **Carica quercifolia** (A. St.-Hil.) Hieron.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993.

Vasconcellea quercifolia A. St.-Hil. = **Carica quercifolia** (A. St.-Hil.) Hieron.
Referencias: Badillo, V. M., 1971, 1993; Fernández Casas, F. J., 1987.

CARYOCARACEAE

Autor: Prance, G. T.

1 género, 1 especie.

Caryocar L.

Número de especies: 1

Caryocar brasiliense Cambess. f. *dentata* Chodat & Hassl. = **Caryocar brasiliense** Cambess. subsp. **intermedium** (Wittm.) Prance & M.F. Silva
Referencias: Prance, G. T. & Silva, M. F., 1973.

Caryocar brasiliense Cambess. subsp. **brasiliense**
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Prance, G. T. & Silva, M. F., 1973.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9633* (S)]; PRY[*Jiménez, B. 1612* (BM, CTES, MO, PY)].

Caryocar brasiliense Cambess. subsp. **intermedium** (Wittm.) Prance & M.F. Silva
Sin.: *Caryocar brasiliense* Cambess. f. *dentata* Chodat & Hassl., *Caryocar intermedium* Wittm.
Referencias: Prance, G. T. & Silva, M. F., 1973.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15968* (MO, NY, P, UC)]; PRY[*Hassler, E. 5311* (G), *Múlgura de Romero, M. E. 3726* (CTES, FCQ, SI)].

Caryocar intermedium Wittm. = **Caryocar brasiliense** Cambess. subsp. **intermedium** (Wittm.) Prance & M.F. Silva
Referencias: Prance, G. T. & Silva, M. F., 1973.

CARYOPHYLLACEAE

29 géneros, 171 especies, 80 especies endémicas, 38 especies introducidas.

Acanthonychia polycnemoides (Schltdl.) Rohrb. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Acanthonychia ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Acanthonychia ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. var. *rosetta* (Cambess.) Rohrb. = **Cardionema rosetta** (Cambess.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Achyranthes corymbosa L. = **Polycarpaea corymbosa** (L.) Lam. var. **corymbosa**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Agrostemma L.

Número de especies: 1 introducida

Agrostemma coronaria L. = **Lychnis coronaria** (L.) Desr.

Agrostemma githago L.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SJU, TDF); CHL(VIII, IX); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Clos, E. C. 1236* (BAB)]; CHL[*Kunkel, G. W. H. 2391* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 5363* (MVFA)].

[Agrostemma githago L. var. nicaeensis Willd.]
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Parodi, L. R., 1926b.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Alsine acutiflora Fenzl = **Minuartia acutiflora** (Fenzl) Mattf.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine axillaris (Phil.) Macloskie = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine bocconii Scheele = **Spergula bocconii** (Scheele) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine cherleriae Fenzl var. *andina* Kuntze = **Stellaria cryptopetala** Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Alsine chubutensis (Speg.) Macloskie = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine debile (d'Urv.) Macloskie = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine lanceolata (Poir.) Macloskie = **Stellaria lanceolata** Poir.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Alsine media L. = **Stellaria media** (L.) Cirillo var. **media**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Alsine minuta (Naudin) Rohrb. = **Minuartia acutiflora** (Fenzl) Mattf.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine nemorum (L.) Macloskie = **Stellaria nemorum** L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Alsine pallida Dumort. = **Stellaria pallida** (Dumort.) Piré
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine platensis (Cambess.) House = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Alsine rotundifolia (Poir.) Macloskie = **Drymaria rotundifolia** (Poir.) Har.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Arenaria L.

Número de especies: 13, 8 endémicas, 2 introducidas

Arenaria achalensis Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7763* (SI)].

Arenaria alba villosa Larrañaga = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Arenaria alsinoides Willd. ex Schltdl. = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Arenaria andicola Gillies = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria andicola Gillies var. *caespitosa* (Phil.) Hauman = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria andicola Gillies var. *major* Gillies = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria apetala Larrañaga = **Sagina apetala** Ard. var. **apetala**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Arenaria berteroana Phil. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria bisulca (Bartl.) Fenzl & Rohrb.
Sin.: *Cherleria bisulca* Bartl.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Volponi, C. R., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4789* (SI)].

Arenaria bocconii Soleirol ex Merino, nom. nud. = **Spergula bocconii** (Scheele) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Arenaria bonariensis Gillies ex Hook. & Arn. = **Spergula laevis** (Cambess.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

[Arenaria brachyphylla Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Arenaria caespitosa Phil. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria catamarcensis Pax
Referencias: Volponi, C. R., 1985, 1994, 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26596* (SI)].

Arenaria cerviana Cham. & Schltdl. = **Spergula cerviana** (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

[Arenaria chilensis DC.]
Notas: Nombre dudoso.

Arenaria denticulata Phil. = **Spergularia denticulata** (Phil.) Phil.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria depauperata Naudin = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Arenaria diandra Guss. = **Spergula diandra** (Guss.) Murb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

[Arenaria dicranoides Kunth]
Referencias: Volponi, C. R., 1985.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Arenaria diffusa Elliot = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **diffusa** Rohrb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Arenaria diffusa Elliot var. *tucumanensis* Griseb. = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**

Arenaria digyna D.K.F. Schltdl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–4200 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 203* (CONC)].

Arenaria fastigiata Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Arenaria floribunda Gay = **Spergularia floribunda** (Gay) Rohrb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria grandis (Pers.) Kunth = **Spergula grandis** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Arenaria jussiaei Cambess. ex A. St.-Hil.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 2786 c2* (P)].

[Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. diffusa Rohrb.]
Sin.: *Arenaria diffusa* Elliot
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. **ensifolia** Rohrb.
Referencias: Volponi, C. R., 2004.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20794* (LP)].

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. *genuina* Rohrb., nom. inval. = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**
Sin.: *Arenaria alsinoides* Willd. ex Schltdl., *Arenaria diffusa* Elliot var. *tucumanensis* Griseb., *Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. var. *genuina* Rohrb., nom. inval., *Arenaria lanuginosa* (Michx.) Rohrb. var. *tucumanensis* (Griseb.) Pax, *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N. Williams var. *tucumanensis* (Griseb.) F. N. Williams, *Spergulastrum lanuginosum* Michx.
Referencias: Volponi, C. R., 1985, 1994, 1998, 2004.
Hierba. Anual. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 799* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34717* (SI)].

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. **megalantha** Rohrb.
Sin.: *Arenaria megalantha* (Rohrb.) F. N. Williams
Referencias: Volponi, C. R., 1985, 2004.
Hierba. Anual. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Liebman 3678* (C)].

Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. var. *tucumanensis* (Griseb.) Pax = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**

[Arenaria leptoclados Boiss. var. viscidula (Rouy & Foucaud) F. N. Williams]
Sin.: *Arenaria serpyllifolia* L. var. *viscidula* Rouy & Foucaud
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Arenaria lignosa Phil. = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria littoralis Phil. = **Spergularia media** (L.) C. Presl ex Griseb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria marginata DC. = **Spergularia media** (L.) C. Presl ex Griseb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria marina Sm. = **Spergularia media** (L.) C. Presl ex Griseb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria media L. = **Spergularia media** (L.) C. Presl ex Griseb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria megalantha (Rohrb.) F. N. Williams = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **megalantha** Rohrb.

Arenaria megalantha (Rohrb.) F. N. Williams var. *tucumanensis* (Griseb.) F. N. Williams = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**

Arenaria microphylla Phil. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria minuta Naudin = **Minuartia acutiflora** (Fenzl) Mattf.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

[Arenaria multicaulis Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Arenaria oligosperma Naudin
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Arenaria palustris Naudin = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria palustris Naudin var. *humilior* Ces. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria palustris Naudin var. *patagonica* (Phil.) Reiche = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria patagonica Phil. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

[Arenaria peploides L. var. angustifolia Arechav.]
Notas: Nombre dudoso.

Arenaria pissisi Phil. = **Spergula pissisi** (Phil.) Volponi

Arenaria pleurantha Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Delfín, F. s.n.* (SGO)].

Arenaria polyantha Phil. = **Spergula cerviana** (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria pycnophylloides Pax
Referencias: Volponi, C. R., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(LRI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 372* (CORD)].

[Arenaria pycnophylloides Pax var. compacta Pax]
Referencias: Volponi, C. R., 1985.
Notas: Nombre dudoso.

Arenaria rivularis Phil.
Referencias: Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999; Volponi, C. R., 1985, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SJU, TUC); CHL(II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7966* (SI)]; CHL[*Luebert B., F. 115* (EIF)].

Arenaria rubra L. = **Spergula rubra** (L.) D. Dietr.

Arenaria rubra L. var. *marina* L. = **Spergula salina** (J. Presl & C. Presl) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Arenaria rubra L. var. *polyphylla* Phil. = **Spergularia confertiflora** Steud.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria serpens Kunth
Sin.: *Arenaria andicola* Gillies, *Arenaria andicola* Gillies var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria andicola* Gillies var. *major* Gillies, *Arenaria caespitosa* Phil., *Arenaria microphylla* Phil., *Arenaria palustris* Naudin, *Arenaria palustris* Naudin var. *humilior* Ces., *Arenaria palustris* Naudin var. *patagonica* (Phil.) Reiche, *Arenaria patagonica* Phil., *Arenaria serpens* Kunth var. *andicola* (Gillies) Rohrb., *Arenaria serpens* Kunth var. *caespitosa* (Phil.) Hauman, *Arenaria serpens* Kunth var. *microphylla* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *palustris* (Naudin) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *patagonica* (Phil.) Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *robusta* Speg., *Arenaria serpens* Kunth var. *serpylloides* (Naudin) Speg., *Arenaria serpylloides* Naudin, *Arenaria serpylloides* Naudin var. *andicola* (Gillies) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1985, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, TDF, TUC); CHL(II, IV, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14525* (CTES, SI)]; CHL[*Werdermann, E. 605* (SI)].

Arenaria serpens Kunth var. *andicola* (Gillies) Rohrb. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpens Kunth var. *caespitosa* (Phil.) Hauman = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpens Kunth var. *microphylla* (Phil.) Speg. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpens Kunth var. *palustris* (Naudin) Speg. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpens Kunth var. *patagonica* (Phil.) Speg. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpens Kunth var. *robusta* Speg. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpens Kunth var. *serpylloides* (Naudin) Speg. = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpyllifolia L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1985.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SCR, SLU); CHL(IV, VII, XII, RME); URY(PAY, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5506* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996093* (CONC)]; URY[*Izaguirre, P. 18434* (MVFA)].

[Arenaria serpyllifolia L. var. viscida DC.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Arenaria serpyllifolia L. var. *viscidula* Rouy & Foucaud = **Arenaria leptoclados** Boiss. var. **viscidula** (Rouy & Foucaud) F. N. Williams
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Arenaria serpylloides Naudin = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria serpylloides Naudin var. *andicola* (Gillies) Reiche = **Arenaria serpens** Kunth
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Arenaria stenocarpa Phil. = **Spergularia stenocarpa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Arenaria teretifolia Phil. = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Balardia platensis Cambess. = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Behen vulgaris Moench = **Silene vulgaris** (Moench) Garcke
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Bryopsis andicola Reiche = **Reicheella andicola** (Phil.) Pax

Buda grandis (Pers.) Kuntze = **Spergula grandis** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Buda marina (L.) Dum. Cours. = **Spergularia marina** (L.) Griseb.

Buda platensis (Cambess.) Kuntze = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Cardionema DC.

Número de especies: 5, 3 endémicas

Cardionema andinum (Phil.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Sin.: *Pentacaena andina* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 301* (CONC)].

Cardionema burkartii Subils
Referencias: Subils, R., 1979; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4432* (SI)].

Cardionema kurtzii Subils
Referencias: Subils, R., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2600 m.
Países: ARG(COR, MEN); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 11534* (CORD)]; CHL[*Ricardi, S. M. 2062* (LIL)].

Cardionema ramosissima (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Sin.: *Acanthonychia polycnemoides* (Schltdl.) Rohrb., *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr., *Loeflingia ramosissima* Weinm., *Paronychia confertissima* D. Parodi, *Paronychia pauciflora* Larrañaga, *Paronychia polycnemoides* Schltdl., *Paronychia ramosissima* (Weinm.) DC., *Pentacaena polycnemoides* (Schltdl.) Walp., *Pentacaena polycnemoides* Bartl., nom. illeg., *Pentacaena ramosissima* (Weinm.) Hook. & Arn.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–3600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, RME); PRY(CEN); URY(MON).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10760* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 38984* (SI)]; CHL[*Nee s.n.* (C)]; PRY[*Krapovickas, A. 45638* (CTES)]; URY[*Commerson, C. s.n.* (C, P)].

Cardionema rosetta (Cambess.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Sin.: *Acanthonychia ramosissima* (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. var. *rosetta* (Cambess.) Rohrb., *Paronychia rosetta* Cambess., *Pentacaena rosetta* (Cambess.) Walp.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); PRY(COA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5439* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 22833* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 3702* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 5731* (MVFA)].

Cerastium L.

Número de especies: 15, 6 endémicas, 3 introducidas

[Cerastium alpinum L.]
Sin.: *Cerastium arvense* L. var. *alpinum* (L.) Benth.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Cerastium andinum Phil., hom. illeg. = **Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet

Cerastium argentinum (Pax) F. N. Williams
Sin.: *Cerastium nutans* Raf. var. *argentinum* Pax
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1246* (CORD)].

Cerastium arvense L.
Sin.: *Cerastium arvense* L. f. *glandulosum* (Wedd.) Rohrb., *Cerastium arvense* L. var. *fueguianum* Hook. f., *Cerastium arvense* L. var. *montanum* (Gay) Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *nervosum* Reiche, *Cerastium arvense* L. var. *parviflora* Dusén, *Cerastium arvense* L. var. *rigidum* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *verticillare* Naudin, *Cerastium arvense* L. var. *vestitum* Naudin, *Cerastium arvensiforme* Wedd. var. *glandulosum* Wedd., *Cerastium colsmannii* Lehm. ex Spreng., *Cerastium diazii* Phil., *Cerastium fuegianum* Albov, *Cerastium grahamii* Gillies ex Griseb., *Cerastium lineare* auct. non Pers., *Cerastium magellanicum* Phil., *Cerastium mendozinense* Gillies ex Griseb., *Cerastium montanum* Naudin, *Cerastium nervosum* Naudin
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1991[1990]; Volponi, C. R., 1994, 1998.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SJU, SLU, TDF, TUC); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31130* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6095* (SI)].

Cerastium arvense L. f. *glandulosum* (Wedd.) Rohrb. = **Cerastium arvense** L.

Cerastium arvense L. var. *alpinum* (L.) Benth. = **Cerastium alpinum** L.

Cerastium arvense L. var. *fueguianum* Hook. f. = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvense L. var. *montanum* (Gay) Reiche = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvense L. var. *nervosum* Reiche = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvense L. var. *parviflora* Dusén = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvense L. var. *rigidum* Naudin = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvense L. var. *verticillare* Naudin = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvense L. var. *vestitum* Naudin = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium arvensiforme Wedd. var. *glandulosum* Wedd. = **Cerastium arvense** L.

[Cerastium berteroanum Colla]
Notas: Nombre dudoso.

Cerastium caespitosum Gilib., nom. illeg. = **Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet

Cerastium catharinense L.B. Sm. & Downs = **Cerastium rivulare** Cambess. emend. Möschl
Referencias: Möschl, W. & Pedersen, L. B., 1970.

[Cerastium chilense Bartl.]
Notas: Nombre dudoso.

Cerastium colsmannii Lehm. ex Spreng. = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium commersonianum DC. var. **commersonianum**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1991[1990]).
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2659* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11409* (CTES)]; URY[*Commerson, P. s.n.* (LP, P)].

Cerastium commersonianum DC. var. **darwinianum** F. N. Williams
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Pedersen, T. M., 1987b; Volponi, C. R., 1991[1990].
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 14903* (LP)].

Cerastium diazii Phil. = **Cerastium arvense** L.

Cerastium dicrotrichum Fenzl ex Rohrb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, SCA); URY(LAV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 3757* (CORD)]; BRA[*Smith, L. B. 13013* (NY)]; URY[*Rosengurtt, B. 2145b* (MVFA)].
Notas: Probablemente crezca en la provincia de Entre Ríos, Argentina.

Cerastium fontanum Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet
Sin.: *Cerastium andinum* Phil., hom. illeg., *Cerastium caespitosum* Gilib., nom. illeg., *Cerastium holosteoides* Fr., *Cerastium holosteoides* Fr. f. *glandulosum* Möschl, *Cerastium triviale* Link, *Cerastium vulgare* Hartmann
Referencias: Jalas, A. J. J. & Suominen, P., 1983; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1991[1990].
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1101* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Cerastium fuegianum Albov = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium glabrum Larrañaga = **Cerastium humifusum** Cambess.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium glomeratum Thuill.
Sin.: *Cerastium obovatum* Larrañaga, *Cerastium viscosum* L., p.p., *Cerastium vulgatum* L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1991[1990], 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5286* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37396* (SI)]; CHL[*Hollermayer, A. 1370* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 233* (SI)].

Cerastium glutinosum Kunth, nom. illeg. = **Cerastium kunthii** Briq.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Cerastium grahamii Gillies ex Griseb. = **Cerastium arvense** L.

Cerastium hieronymi Pax
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pax, F. A., 1893.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schickendantz, F. 312* (CORD)].

Cerastium holosteoides Fr. = **Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium holosteoides Fr. f. *glandulosum* Möschl = **Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet

Cerastium humifusum Cambess.
Sin.: *Cerastium glabrum* Larrañaga, *Cerastium latifolium* L. var. *glabrum* Hook. & Arn., *Cerastium montioides* Naudin
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Añón, D. S. C., 1967; Pedersen, T. M., 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Volponi, C. R., 1991[1990], 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, SFE, SJU); BRA(RGS); CHL(II, IV, V, RME); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gomez Molina, E. 10015* (SI)]; BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 1871catal. c2* (LP, P)]; CHL[*Gay, C. 489* (LP, P), *Worth, C. R. 16566* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1743pe* (MVFA)].

Cerastium junceum Möschl
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1991[1990].
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, MIS, RNE, SCR, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 127* (K)]; BRA[*Hagelund, K. 10484* (CTES)].
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Pedersen, 1984b, 1987b).

Cerastium kunthii Briq.
Sin.: *Cerastium glutinosum* Kunth, nom. illeg.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwabe, H. 431* (LP)].

Cerastium latifolium L. var. *glabrum* Hook. & Arn. = **Cerastium humifusum** Cambess.

Cerastium lineare auct. non Pers. = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Cerastium magellanicum Phil. = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium mendozinense Gillies ex Griseb. = **Cerastium arvense** L.

Cerastium mollissimum Poir. var. **lorentzii** Pax
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pax, F. A., 1893.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23427* (SI)].

[Cerastium mollissimum Poir. var. minimum Kuntze]
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Nombre dudoso.

Cerastium mollissimum Poir. var. **mollissimum**
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Volponi, C. R., 1991[1990].
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5276* (SI)]; URY[*Grela, I. 1170* (MVJB)].

Cerastium montanum Naudin = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium montioides Naudin = **Cerastium humifusum** Cambess.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium nervosum Naudin = **Cerastium arvense** L.
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium nutans Raf. var. *argentinum* Pax = **Cerastium argentinum** (Pax) F. N. Williams
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Cerastium obovatum Larrañaga = **Cerastium glomeratum** Thuill.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

[Cerastium pauciflorum Phil., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

[Cerastium racemosum Bartl.]
Notas: Nombre dudoso.

Cerastium rivulare Cambess. emend. Möschl
Sin.: *Cerastium catharinense* L.B. Sm. & Downs
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Möschl, W. & Pedersen, L. B., 1970; Pedersen, T. M., 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Volponi, C. R., 1991[1990].
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAN, GUA, ITA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Keller, H. A. 227* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 59216* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5438* (SI)].

Cerastium rivulariastrum Möschl & Pedersen
Referencias: Möschl, W. & Pedersen, L. B., 1970; Pedersen, T. M., 1987b; Volponi, C. R., 1991[1990], 1998.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CAN, CEN, GUA, MIE, PAI); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 258* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1480* (SI)]; PRY[*Pérez, B. 431* (AS, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 440a* (F, G, SI, UC)].

[Cerastium selloi Schltdl. ex Rohrb.]
Notas: Nombre dudoso.

[Cerastium semidecandrum L.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cerastium soratense Rohrb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pax, F. A., 1893.
Hierba. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 369* (*)].

[Cerastium strictum L.]
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Cerastium subspicatum Wedd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cerastium triviale Link = **Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Cerastium tucumanense Pax
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 217* (SI)].

[Cerastium vidali Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Cerastium viscosum L., p.p. = **Cerastium glomeratum** Thuill.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Cerastium vulgare Hartmann = **Cerastium fontanum** Baumg. subsp. **vulgare** (Hartmann) Greuter & Burdet
Referencias: Volponi, C. R., 1991[1990].

Cerastium vulgatum L. = **Cerastium glomeratum** Thuill.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

[Cerastium vulgatum L. var. peruvianum A. Gray]
Notas: Nombre dudoso.

Cherleria bisulca Bartl. = **Arenaria bisulca** (Bartl.) Fenzl & Rohrb.
Referencias: Volponi, C. R., 1985.

Colobanthus Bartl.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Colobanthus alatus Pax = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus aretioides Gillies ex Hook. & Arn. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus benthamianus Fenzl = **Colobanthus subulatus** (d'Urv.) Hook. f.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus billardieri Fenzl = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus cherlerioides Hook. f. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus crassifolius (d'Urv.) Hook. f. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus crassifolius (d'Urv.) Hook. f. var. *aretioides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Colobanthus lechleri Phil. = **Colobanthus lycopodioides** Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus lycopodioides Griseb.
Sin.: *Colobanthus lechleri* Phil., *Colobanthus muscoides* auct. non Hook., *Colobanthus patagonicus* Hieron. ex De Wild., *Colobanthus polycnemoides* Hieron., *Drudea lycopodioides* (Griseb.) Griseb.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Germain, P. & Volponi, C. R., 2003; Pedersen, T. M., 1984b.
Subarbusto. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33109* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92170* (CONC, SGO)].

Colobanthus maclovianus Gand. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus meigeni Phil. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus muscoides auct. non Hook. = **Colobanthus lycopodioides** Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Colobanthus patagonicus Hieron. ex De Wild. = **Colobanthus lycopodioides** Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Colobanthus polycnemoides Hieron. = **Colobanthus lycopodioides** Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl.
Sin.: *Colobanthus alatus* Pax, *Colobanthus aretioides* Gillies ex Hook. & Arn., *Colobanthus billardieri* Fenzl, *Colobanthus cherlerioides* Hook. f.. *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook. f., *Colobanthus crassifolius* (d'Urv.) Hook. f. var. *aretioides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Macloskie, *Colobanthus maclovianus* Gand., *Colobanthus meigeni* Phil., *Colobanthus quitensis* (Kunth) Bartl. var. *alatus* (Pax) Hosseus, *Colobanthus saginoides* Bartl., *Sagina crassifolia* d'Urv., *Sagina quitensis* Kunth
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, NEU, SCR, SJU, TDF); CHL(I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8535* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1452* (S)].

Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. var. *alatus* (Pax) Hosseus = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.

Colobanthus saginoides Bartl. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.

Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook. f.
Sin.: *Colobanthus benthamianus* Fenzl, *Colobanthus subulatus* (d'Urv.) Hook. f. var. *darwinii* Hook. f., *Sagina subulata* d'Urv.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3700 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Luti 10042* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92372* (CONC)].

Colobanthus subulatus (d'Urv.) Hook. f. var. *darwinii* Hook. f. = **Colobanthus subulatus** (d'Urv.) Hook. f.

Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. = **Lychnis flos-cuculi** L.

Corrigiola L.

Número de especies: 3 endémicas

Corrigiola collina Poepp., nom. nud. = **Corrigiola squamosa** Hook. & Arn. var. **poeppigii** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Corrigiola crassifolia Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (Z)].

Corrigiola deltoides Hook. & Arn. = **Calandrinia monandra** (Ruiz & Pav.) DC.

Corrigiola glomeruliflora Steud. = **Corrigiola squamosa** Hook. & Arn. var. **poeppigii** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Corrigiola latifolia Gay = **Corrigiola squamosa** Hook. & Arn. var. **latifolia** (Gay) Skottsb.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Corrigiola propinqua Gay
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, VI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 22* (E, G, GH, SI, U, UC, Z)].

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. **latifolia** (Gay) Skottsb.
Sin.: *Corrigiola latifolia* Gay
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. **poeppigii** Chaudhri
Sin.: *Corrigiola collina* Poepp., nom. nud., *Corrigiola glomeruliflora* Steud.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Blese, W. 1924* (LIL)].

Corrigiola squamosa Hook. & Arn. var. **squamosa**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Cuming, H. 689* (E, FI, K), *Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].

Dianthus L.

Número de especies: 2 introducidas

Dianthus armeria L.
Referencias: Nicora, E. G. & Rúgolo de Agrasar, Z. E., 1997.
Hierba. Anual o bianual. Introducida.
Países: ARG(CHU); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 10205* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 1298* (CONC)].

Dianthus deltoides L.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Hierba. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dinni s.n.* (BCRU)].

Dianthus dubius Raf. = **Petrorhagia dubia** (Raf.) G. López & Romo

Dianthus nanteuilii Burnat = **Petrorhagia nanteuilii** (Burnat) Ball & Heywood
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Dianthus prolifer L. = **Petrorhagia prolifera** (L.) P.W. Ball & Heywood

Drudea lycopodioides (Griseb.) Griseb. = **Colobanthus lycopodioides** Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Drymaria Willd. ex Roem. & Schult.

Número de especies: 6, 1 endémica

[Drymaria apetala Bartl.]
Referencias: Duke, J. A., 1961.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
Sin.: *Drymaria cordata* (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush., *Holosteum cordatum* L.
Referencias: Duke, J. A., 1961; Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC); CHL(II); PRY(CEN, COA, GUA, PAI); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 550* (CORD), *Guaglianone, E. R. 1855* (SI)]; CHL[*Jaffuel, F. 1025* (CONC)]; PRY[*Balansa, B. 2273* (*)]; URY[*Bartlett, H. H. 21026* (*)].

Drymaria cordata (L.) Willd. ex Roem. & Schult. var. *pacifica* Mizush. = **Drymaria cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: Duke, J. A., 1961.

Drymaria devia Baehni & J.F. Macbr. = **Drymaria engleriana** (Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var. **devia** (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke
Referencias: Duke, J. A., 1961.

Drymaria engleriana (Muschl.) Baehni & J.F. Macbr. var. **devia** (Baehni & J.F. Macbr.) J.A. Duke
Sin.: *Drymaria devia* Baehni & J.F. Macbr.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 198* (CONC)].

Drymaria glandulosa Bartl.
Referencias: Duke, J. A., 1961; Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Olea, D. s.n.* (SI)].

[Drymaria grandiflora Bartl.]
Referencias: Duke, J. A., 1961.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.
Referencias: Duke, J. A., 1961; Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Anual. Nativa. 1000–1500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3616* (SI)].

Drymaria paposana Phil.
Referencias: Duke, J. A., 1961.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

[Drymaria rotundifolia (Poir.) Har.]
Sin.: *Alsine rotundifolia* (Poir.) Macloskie, *Stellaria rotundifolia* Poir.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Drymaria villosa Cham. & Schltdl.
Referencias: Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Anual. Nativa. 1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 1893* (MCNS)].

[Gypsophila chilensis Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

[Gypsophila elegans M. Bieb.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto, presente sólo como cultivada.

[Gypsophila muralis L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto, presente sólo como cultivada.

Herniaria L.

Número de especies: 3, 2 introducidas

Herniaria austroamericana Chaudhri & Rutish.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1987.
Hierba. Nativa. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. 439/7* (ISL, Z)].

Herniaria cinerea DC.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4991* (BAB)]; CHL[*Marticorena, A. 1613* (CONC)].

Herniaria hirsuta L.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6780* (LP)].

Herniaria payco Molina = **Chenopodium multifidum** L.

Herniaria setigera Gillies ex Hook. & Arn. = **Paronychia setigera** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Holosteum L.

Número de especies: 1 introducida

Holosteum cordatum L. = **Drymaria cordata** (L.) Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: Duke, J. A., 1961.

Holosteum umbellatum L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 3824* (BAB)].

Lepigonum arenarium Kindb. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Lepigonum depauperatum (Naudin) Kindb. = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Lepigonum floribundum (Gay) Kindb. = **Spergularia floribunda** (Gay) Rohrb.

Lepigonum grande (Pers.) Kindb. = **Spergula grandis** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Lepigonum grandiflorum Kindb. = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Rossbach, R. P., 1943.

Lepigonum laeve (Cambess.) Kindb. = **Spergula laevis** (Cambess.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Lepigonum liebmannianum Lange = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Lepigonum marinum (L.) Wahlenb. = **Spergularia marina** (L.) Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Lepigonum medium (L.) Fr. = **Spergularia media** (L.) C. Presl ex Griseb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Lepigonum purpureum Kindb. var. *firmum* Kindb. = **Spergula cerviana** (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Lepigonum villosum (Pers.) Kindb. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Rossbach, R. P., 1940.

Loeflingia ramosissima Weinm. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Lyallia andicola Phil. = **Reicheella andicola** (Phil.) Pax
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Lychnis L.

Número de especies: 1 introducida

Lychnis alba Mill. = **Silene pratensis** (Raf.) Godr. & Gren.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Lychnis andicola (Gillies ex Hook. & Arn.) Rusby = **Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Lychnis antarctica Kuntze = **Silene antarctica** (Kuntze) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Lychnis argentina Speg. = **Silene argentina** (Pax) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Lychnis chilensis Naudin = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Lychnis chubutensis Speg. = **Silene chubutensis** (Speg.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Lychnis coronaria (L.) Desr.
Sin.: *Agrostemma coronaria* L., *Silene coronaria* (L.) Clairv.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–800 m.
Países: BRA(SCA); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 38282* (MBM)]; CHL[*Behn, K. s.n.* (CONC)].

Lychnis dioica L. = **Silene dioica** (L.) Clairv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

[Lychnis flos-cuculi L.]
Sin.: *Coronaria flos-cuculi* (L.) A. Br.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Lychnis graminea Molina, nom. nud. = **Silene magellanica** (Desr.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Lychnis magellanica Desr. = **Silene magellanica** (Desr.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Lychnis patagonica Speg. = **Silene patagonica** (Speg.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Lychnis patagonica Speg. f. *glabrisucula* H. Ross = **Silene patagonica** (Speg.) Bocquet

Lychnis pratensis Raf. = **Silene pratensis** (Raf.) Godr. & Gren.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Lychnis terminalis Naudin = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium album (Mill.) Garcke = **Silene pratensis** (Raf.) Godr. & Gren.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium alpestre Dusén = **Silene antarctica** (Kuntze) Pedersen
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. = **Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium argentinum Pax = **Silene argentina** (Pax) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium chilense (Naudin) Rohrb. = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium chilense (Naudin) Rohrb. var. *argentinense* Hosseus = **Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium chilense (Naudin) Rohrb. var. *cucubaloides* (Fenzl) Hosseus = **Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium chilense (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus = **Silene plutonica** Naudin
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium chubutense (Speg.) Speg. = **Silene chubutensis** (Speg.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium cucubaloides Fenzl ex Rohrb. = **Silene andicola** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium densifolium Dusén = **Silene patagonica** (Speg.) Bocquet
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium echegarayi Hieron. = **Silene echegarayi** (Hieron.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium filifolium Dusén = **Silene filifolia** (Dusén) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium friesii Hauman = **Silene haumanii** Bocquet var. **haumanii**
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium hieronymi Pax, p.p. = **Silene bersieri** Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969.

Melandrium hieronymi Pax, p.p. = **Silene mandonii** (Rohrb.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969.

Melandrium koslowsky Dusén = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium magellanicum (Desr.) Fenzl ex Rohrb. = **Silene magellanica** (Desr.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium magellanicum (Desr.) Fenzl ex Rohrb. var. *robustum* Hosseus = **Silene filifolia** (Dusén) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984a.

Melandrium mandonii Rohrb. = **Silene mandonii** (Rohrb.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium patagonicum (Speg.) Speg. = **Silene patagonica** (Speg.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium plutonicum (Naudin) Reiche = **Silene plutonica** Naudin
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium rimbachii Mattf. = **Silene mandonii** (Rohrb.) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Melandrium sylvestre (Schkuhr) Röhl. = **Silene dioica** (L.) Clairv.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Melandrium terminale (Naudin) Reiche = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Microphyes Phil.

Número de especies: 3, 2 endémicas

Microphyes lanuginosus Phil. = **Microphyes minima** (Miers ex Colla) Briq.

Microphyes litoralis Phil.
Referencias: Ricardi, M., 1958.
Hierba. Anual. Nativa. 0–800 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 162* (SI)].

Microphyes minima (Miers ex Colla) Briq.
Sin.: *Microphyes lanuginosus* Phil., *Talinum minimum* Miers ex Colla
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 3066* (SI)].

Microphyes robusta Ricardi var. **pallida** Ricardi
Referencias: Ricardi, M., 1958.
Hierba. Anual. Endémica. 500–900 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2315* (CONC)].

Microphyes robusta Ricardi var. **robusta**
Referencias: Ricardi, M., 1958.
Hierba. Anual. Endémica. 800–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4383* (CONC)].

Minuartia L.

Número de especies: 1 endémica

Minuartia acutiflora (Fenzl) Mattf.
Sin.: *Alsine acutiflora* Fenzl, *Alsine minuta* (Naudin) Rohrb., *Arenaria minuta* Naudin, *Minuartia minuta* (Naudin) Roquero
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero s.n.* (P)].

Minuartia minuta (Naudin) Roquero = **Minuartia acutiflora** (Fenzl) Mattf.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Mollugo tetraphylla L. = **Polycarpon tetraphyllum** (L.) L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1994.

Paronychia Mill.

Número de especies: 14, 5 endémicas

Paronychia achyrantha (L.) Desf. = **Alternanthera pungens** Kunth

[Paronychia andina A.Gray]
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Martínez Crovetto, R., 1967; Pax, F. A., 1893.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Paronychia andina Phil., nom. illeg. = **Paronychia setigera** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Pedersen, T. M., 1984b.

Paronychia appressa Phil. = **Paronychia coquimbensis** Gay var. **appressa** (Phil.) Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia arbuscula Gay = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Rossbach, R. P., 1943.

Paronychia australis Gillies = **Paronychia setigera** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia bonariensis DC. = **Paronychia brasiliana** DC. var. **brasiliana**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia brasiliana DC. var. **brasiliana**
Sin.: *Paronychia bonariensis* DC., *Paronychia punctoria* Larrañaga
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Chaudhri, M. N., 1968; Pedersen, T. M., 1987b; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8767* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 232* (SI, U, UC)].

Paronychia brasiliana DC. var. **pubescens** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9182a* (SI)].

Paronychia cabrerae Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 2800–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27382* (SI)].

Paronychia camphorosmoides Cambess.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 700–2000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1061* (GH, S)].

Paronychia chilensis DC. var. *andina* (Phil.) Reiche = **Paronychia setigera** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**

Paronychia chilensis DC. var. *coquimbensis* (Gay) Reiche = **Paronychia coquimbensis** Gay var. **coquimbensis**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

[Paronychia chilensis DC. var. cordobensis Kuntze]
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Nombre dudoso.

Paronychia chilensis DC. var. *hieronymi* (Pax) Hosseus = **Paronychia hieronymi** Pax var. **hieronymi**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Martínez Crovetto, R., 1967.

Paronychia chilensis DC. var. **mutica** (Phil.) Reiche
Sin.: *Paronychia mutica* Phil.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*LandBeck, S. G. s.n.* (SGO)].

[Paronychia chilensis DC. var. penicillata Chodat & Wilczek]
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Nombre dudoso.

Paronychia chilensis DC. var. *subandina* (Phil.) Reiche = **Paronychia chilensis** DC. subsp. **subandina** (Phil.) Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia chilensis DC. subsp. **chilensis**
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Chaudhri, M. N., 1968; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, RNE, SCR, TUC); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4463* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 2688* (CTES)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996110* (CONC)].

Paronychia chilensis DC. subsp. **subandina** (Phil.) Chaudhri
Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var. *subandina* (Phil.) Reiche, *Paronychia subandina* Phil.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Paronychia communis Cambess. f. **subglabra** Chodat & Hassl.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, MIS); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rojas, T. 11840* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 4439* (G, GH, S)].

Paronychia communis Cambess. var. **chicligastensis** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 14120* (LIL)].

Paronychia communis Cambess. var. **communis** Cambess.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortiz, M., 1994; Chaudhri, M. N., 1968; Pedersen, T. M., 1987b; Volponi, C. R., 1994, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–3200 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, PAI); URY(ART, RNO, RIV, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5576* (SI)]; BRA[*Bornmüller, A. 563* (GH, U)]; PRY[*Hassler, E. 1545* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4835* (MVFA)].

Paronychia communis Cambess. var. **pungentifolia** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 43913* (LIL)].

Paronychia confertissima D. Parodi = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Martínez Crovetto, R., 1967.

Paronychia coquimbensis Gay var. **appressa** (Phil.) Chaudhri
Sin.: *Paronychia appressa* Phil.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*LandBeck, S. G. s.n.* (SGO)].

Paronychia coquimbensis Gay var. **coquimbensis**
Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var. *coquimbensis* (Gay) Reiche
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Paronychia franciscana Eastw.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–1500 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VIII, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lechler, W. 242* (FI, G)].

Paronychia hieronymi Pax var. **hieronymi**
Sin.: *Paronychia chilensis* DC. var. *hieronymi* (Pax) Hosseus
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2882* (LIL)].

Paronychia hieronymi Pax var. **jujuyensis** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 2715* (LIL)].

Paronychia johnstonii Chaudhri var. **johnstonii**
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5184* (GH, S)].

Paronychia johnstonii Chaudhri var. **scabrida** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5356* (GH)].

Paronychia lanuginosa Poir. = **Gossypianthus lanuginosus** (Poir.) Moq.

Paronychia microphylla Phil.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Subarbusto. Endémica. 2200–3500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1061* (GH, U)].

Paronychia muschleri Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 4282* (MCNS)].

Paronychia mutica Phil. = **Paronychia chilensis** DC. var. **mutica** (Phil.) Reiche
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia paranensis Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6483* (L, LIL)].

Paronychia pauciflora Larrañaga = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Paronychia polycnemoides Schltdl. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia punctoria Larrañaga = **Paronychia brasiliana** DC. var. **brasiliana**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Paronychia ramosissima (Weinm.) DC. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia revoluta C.E. Carneiro & A. Furlan
Referencias: Carneiro, C. E. & Furlan, A., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Queiroz, L. P. 470* (ALCB, HRCB, HUEFS)].

Paronychia rosetta Cambess. = **Cardionema rosetta** (Cambess.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. var. **longiseta** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sparre, B. B. 276a* (S)]; BRA[*Palacios 168* (LIL)]; URY[*Bartlett, H. H. 21060* (GH)].

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. var. **subglabra** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(COR, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 5248* (LIL)].

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **argillicola** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22980* (SI)].

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **cordobensis** Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, ERI, MEN, SDE, SFE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7178* (GH, SI)].

Paronychia setigera (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**
Sin.: *Herniaria setigera* Gillies ex Hook. & Arn., *Paronychia andina* Phil., nom. illeg., *Paronychia australis* Gillies, *Paronychia chilensis* DC. var. *andina* (Phil.) Reiche, *Paronychia subandina* Gand., nom. illeg.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1994, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, MIS, RNE, SCR, SJU, SLU); BRA(RGS); CHL(V); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 760* (CORD)]; CHL[*Jaffuel, F. 332* (GH)]; URY[*Rosengurtt, B. 11596* (MVFA)].

Paronychia subandina Gand., nom. illeg. = **Paronychia setigera** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Herm. subsp. **setigera**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Paronychia subandina Phil. = **Paronychia chilensis** DC. subsp. **subandina** (Phil.) Chaudhri
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968.

Pentacaena andina Phil. = **Cardionema andinum** (Phil.) A. Nelson & J.F. Macbr.

Pentacaena polycnemoides (Schltdl.) Walp. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967.

Pentacaena polycnemoides Bartl., nom. illeg. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Pentacaena ramosissima (Weinm.) Hook. & Arn. = **Cardionema ramosissima** (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b; Subils, R., 1979.

Pentacaena rosetta (Cambess.) Walp. = **Cardionema rosetta** (Cambess.) A. Nelson & J.F. Macbr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Petrorhagia (Ser.) Link

Número de especies: 3 introducidas

Petrorhagia dubia (Raf.) G. López & Romo
Sin.: *Dianthus dubius* Raf., *Petrorhagia velutina* (Guss.) P.W. Ball & Heywood
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000].
Hierba. Anual. Introducida. 0–1600 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 996270* (CONC)].

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) Ball & Heywood
Sin.: *Dianthus nanteuilii* Burnat
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 2171* (SI), *Villamil, C. B. 2578* (SI)].

Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood
Sin.: *Dianthus prolifer* L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 200–600 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4709* (CONC)].

Petrorhagia velutina (Guss.) P.W. Ball & Heywood = **Petrorhagia dubia** (Raf.) G. López & Romo

Pharnaceum depressum L. = **Polycarpon depressum** (L.) Rohrb.

Philippiella Speg.

Número de especies: 1 endémica

Philippiella patagonica Speg.
Referencias: Chaudhri, M. N., 1968; Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 6618* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 841021* (CONC)].

Polycarpaea Lam.

Número de especies: 2, 1 endémica

Polycarpaea brasiliensis Cambess. = **Polycarpaea corymbosa** (L.) Lam. var. **brasiliensis** (Cambess.) Chodat & Hassl.

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. var. **brasiliensis** (Cambess.) Chodat & Hassl.
Sin.: *Polycarpaea brasiliensis* Cambess.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5238* (AS, MO)].

Polycarpaea corymbosa (L.) Lam. var. **corymbosa**
Sin.: *Achyranthes corymbosa* L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2139b* (SI)].

Polycarpaea hassleriana Chodat
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4015* (SI)].

Polycarpon Loefl. ex L.

Número de especies: 4, 1 endémica, 1 introducida

Polycarpon anomalum Hassl. = **Polycarpon suffruticosum** Griseb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Polycarpon apurense Kunth
Referencias: Gereau, R. E. & Marticorena, C., 1995; Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 1181* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 3964* (SI)].

Polycarpon australis Britton = **Polycarpon suffruticosum** Griseb.
Referencias: Gereau, R. E. & Marticorena, C., 1995.

Polycarpon coquimbense Gereau & Martic.
Referencias: Gereau, R. E. & Marticorena, C., 1995.
Arbusto. Endémica. 1200–1700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1802* (CONC, OS)].

[Polycarpon depressum (L.) Rohrb.]
Sin.: *Pharnaceum depressum* L.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Polycarpon suffruticosum Griseb.
Sin.: *Polycarpon anomalum* Hassl., *Polycarpon australis* Britton, *Polycarpon suffruticosum* Griseb. var. *virens* Griseb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gereau, R. E. & Marticorena, C., 1995; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 72* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5574* (CTES, FCQ, MO)].

Polycarpon suffruticosum Griseb. var. *virens* Griseb. = **Polycarpon suffruticosum** Griseb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Sin.: *Mollugo tetraphylla* L.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Añón, D. S. C., 1967; Gereau, R. E. & Marticorena, C., 1995; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1994, 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3221* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 13492* (CTES)]; CHL[*Boelcke, O. 374* (SI)]; URY[*Bartlett, H. H. 20764* (SI)].

Pycnophyllopsis Skottsb.

Número de especies: 1 endémica

Pycnophyllopsis muscosa Skottsb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muniez, A. A. 1914* (BAF)].

Pycnophyllum J. Remy

Número de especies: 9, 2 endémicas

Pycnophyllum argentinum Pax
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Mattfeld, J., 1922; Pax, F. A., 1893.
Hierba. Nativa.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lierner 807* (LP)].

Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb.
Sin.: *Stichophyllum bryoides* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Perenne. Nativa. 4100–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8645* (LP)]; CHL[*Arancio, G. 10412* (ULS)].

Pycnophyllum convexum Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Mattfeld, J., 1922.
Hierba. Endémica. 4000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Werner, T. B. 895* (LP)].

Pycnophyllum glomeratum Mattf.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Nativa. 4200–4500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, A. 117* (CONC)].

Pycnophyllum macropetalum Mattf.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Mattfeld, J., 1922.
Hierba. Perenne. Nativa. 4000–4800 m.
Países: ARG(SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8657* (LP)]; CHL[*Ricardi, M. 3407* (CONC)].

Pycnophyllum molle J. Remy
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8611* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 247* (CONC)].

Pycnophyllum mucronulatum Mattf.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Mattfeld, J., 1922.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11652* (SI)].

Pycnophyllum spathulatum Mattf.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1988[1987].
Hierba. Nativa. 4000–5000 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Schlegel, F. 5119* (CONC)].

Pycnophyllum tetrastichum J. Remy
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Mattfeld, J., 1922.
Hierba. Nativa. 3300–4600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 862* (SI)].

Reicheella Pax

Número de especies: 1 endémica

Reicheella andicola (Phil.) Pax
Sin.: *Bryopsis andicola* Reiche, *Lyallia andicola* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1475* (CONC)].
Notas: Cita dudosa para la Argentina (Martínez Crovetto 1967: 232).

Sagina L.

Número de especies: 4, 1 endémica, 1introducida

Sagina apetala Ard. var. **apetala**
Sin.: *Arenaria apetala* Larrañaga, *Sagina apetala* Ard. var. *imberbis* Fenzl, *Sagina apetala* Ard. var. *urbica* (Phil.) Reiche, *Sagina ciliata* R.E. Fr., *Sagina urbica* Phil.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22528* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 24233* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 1862* (SI)].

Sagina apetala Ard. var. *imberbis* Fenzl = **Sagina apetala** Ard. var. **apetala**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Sagina apetala Ard. var. *melanopotamica* Speg. = **Sagina procumbens** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Sagina apetala Ard. var. **pachyrrhiza** (Phil.) Reiche
Sin.: *Sagina pachyrrhiza* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Sagina apetala Ard. var. *paludosa* Speg. = **Sagina procumbens** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

[Sagina apetala Ard. var. pubescens Arechav.]
Notas: Nombre dudoso.

Sagina apetala Ard. var. *urbica* (Phil.) Reiche = **Sagina apetala** Ard. var. **apetala**

Sagina apetala Ard. var. **valdiviana** (Phil.) Reiche
Sin.: *Sagina valdiviana* Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Krause s.n.* (SGO)].

Sagina chilensis Naudin
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS); CHL(VI, IJF, RME); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 17957* (SI)]; CHL[*Bertero, C. L. G. s.n.* (P)]; URY[*Herter, W. G. F. 1862a* (SI)].

Sagina ciliata R.E. Fr. = **Sagina apetala** Ard. var. **apetala**

Sagina crassifolia d'Urv. = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

[Sagina haenkeana Gay]
Notas: Nombre dudoso.

Sagina humifusa (Cambess.) Fenzl & Rohrb.
Sin.: *Spergula humifusa* Cambess.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2309* (SI)]; URY[*Felippone, F. 5945* (SI)].

Sagina pachyrrhiza Phil. = **Sagina apetala** Ard. var. **pachyrrhiza** (Phil.) Reiche

Sagina procumbens L.
Sin.: *Sagina apetala* Ard. var. *melanopotamica* Speg., *Sagina apetala* Ard. var. *paludosa* Speg.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 24004* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17597* (SI)].

Sagina quitensis Kunth = **Colobanthus quitensis** (Kunth) Bartl.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Sagina subulata d'Urv. = **Colobanthus subulatus** (d'Urv.) Hook. f.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1994.

Sagina urbica Phil. = **Sagina apetala** Ard. var. **apetala**

Sagina valdiviana Phil. = **Sagina apetala** Ard. var. **valdiviana** (Phil.) Reiche

Saponaria L.

Número de especies: 1 introducida

Saponaria officinalis L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(V, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, FLA, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14505* (CTES, SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 81-645* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 4382* (MVFA)].

Saponaria segetalis Neck. = **Vaccaria pyramidata** Medik.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Saponaria vaccaria L. = **Vaccaria pyramidata** Medik.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Scleranthus L.

Número de especies: 1 introducida

Scleranthus annuus L.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Añón, D. S. C., 1967; Nicora, E. G., 1961; Pedersen, T. M., 1984b; Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000].
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2340* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996008* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 6598* (MVFA)].

Silene L.

Número de especies: 25, 16 endémicas, 8 introducidas

Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause = **Silene pratensis** (Raf.) Godr. & Gren.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Silene andicola Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Lychnis andicola* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rusby, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb., *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *argentinense* Hosseus, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *cucubaloides* (Fenzl) Hosseus, *Melandrium cucubaloides* Fenzl ex Rohrb.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VI, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6222* (SI)]; CHL[*Gillies, J. s.n.* (K)].

Silene anglica L. = **Silene gallica** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene antarctica (Kuntze) Pedersen
Sin.: *Lychnis antarctica* Kuntze, *Melandrium alpestre* Dusén
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 5906* (SI)]; CHL[*Donat, A. 355a* (SI)].

Silene antirrhina L. f. *albiflora* Chodat & Hassl. = **Silene antirrhina** L. var. **antirrhina**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Silene antirrhina L. f. *roseiflora* Chodat & Hassl. = **Silene antirrhina** L. var. **antirrhina**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Silene antirrhina L. var. **antirrhina**
Sin.: *Silene antirrhina* L. f. *albiflora* Chodat & Hassl., *Silene antirrhina* L. f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Silene antirrhina* L. var. *pteroneura* Ball, *Silene pteroneura* F. N. Williams
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS); PRY(APA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2765* (LP, SI)]; BRA[*Hagelund, K. 13065* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 27272* (CTES)]; URY[*Felippone, F. 3260* (SI)].

Silene antirrhina L. var. **divaricata** Robinson
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 33429* (CTES)].

Silene antirrhina L. var. *pteroneura* Ball = **Silene antirrhina** L. var. **antirrhina**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene argentina (Pax) Bocquet
Sin.: *Lychnis argentina* Speg., *Melandrium argentinum* Pax
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Bocquet, G. F., 1967.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 778* (SI)].

Silene argentinensis Hauman
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Hauman, L. L., 1925b; Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, MEN, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1608* (GH, MO, SI, UC, US)].

Silene armeria L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(COR, NEU, RNE); BRA(PAR); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saint, J. B. s.n.* (SI)]; BRA[*Brites, R. H. 1171* (MBM)]; CHL[*Gunckel, L. H. 49130* (CONC)].

Silene bersieri Bocquet
Sin.: *Melandrium hieronymi* Pax, p.p.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2947* (G, LIL)].

Silene chilensis (Naudin) Bocquet
Sin.: *Lychnis chilensis* Naudin, *Lychnis terminalis* Naudin, *Melandrium andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Rohrb. var. *nubigenum* (Phil.) Reiche, *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb., *Melandrium koslowsky* Dusén, *Melandrium terminale* (Naudin) Reiche, *Silene nubigena* Phil.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koslowsky, J. 91* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14384* (CTES, SI)].

Silene chubutensis (Speg.) Bocquet
Sin.: *Lychnis chubutensis* Speg., *Melandrium chubutense* (Speg.) Speg.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moyano, C. s.n.* (SI)]; CHL[*Behn, F. s.n.* (CONC)].

Silene cisplatensis Cambess. = **Silene pendula** L.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967.

Silene coronaria (L.) Clairv. = **Lychnis coronaria** (L.) Desr.

Silene cucubalus Wibel, nom. illeg. = **Silene vulgaris** (Moench) Garcke
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene cuspidata Pedersen f. **cuspidata**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–2000 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6245* (LP)].

Silene cuspidata Pedersen f. **inuncta** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rossow, R. A. 1192* (BAB)].

Silene densifolia (Dusén) Bocquet = **Silene patagonica** (Speg.) Bocquet
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene dioica A. DC. = **Silene pratensis** (Raf.) Godr. & Gren.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene dioica (L.) Clairv.
Sin.: *Lychnis dioica* L., *Melandrium sylvestre* (Schkuhr) Röhl.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1108* (SI)].

Silene echegarayi (Hieron.) Bocquet
Sin.: *Melandrium echegarayi* Hieron.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4703* (SI)].

Silene filifolia (Dusén) Bocquet
Sin.: *Melandrium filifolium* Dusén, *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb. var. *robustum* Hosseus
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Blake, J. 384* (SI)].

[Silene fuscata Link]
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Silene gallica L.
Sin.: *Silene anglica* L., *Silene spatulata* Larrañaga
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LRI, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU); BRA(PAR, RGS); CHL(V, IX); URY(LAV, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32959* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1536* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 840* (SI)]; URY[*Felippone, F. 2532* (SI)].

[Silene glaucina F. N. Williams]
Notas: Nombre dudoso.

Silene glutinosa Walp., nom. nud. = **Silene plutonica** Naudin
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.

Silene haumanii Bocquet var. **densa** Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9170* (BAB)].

Silene haumanii Bocquet var. **haumanii**
Sin.: *Melandrium friesii* Hauman
Referencias: Bocquet, G. F., 1967.
Hierba. Perenne. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8726* (LP)].

Silene inflata Sm. = **Silene vulgaris** (Moench) Garcke
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene inflata Sm. var. *patagonica* Speg. = **Silene melanopotamica** Pedersen subsp. **melanopotamica**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene magellanica (Desr.) Bocquet
Sin.: *Lychnis graminea* Molina, nom. nud., *Lychnis magellanica* Desr., *Melandrium magellanicum* (Desr.) Fenzl ex Rohrb.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giussani, L. M. 295* (SI)]; CHL[*Eyerdam, W. J. 24169* (SI)].

Silene mandonii (Rohrb.) Bocquet
Sin.: *Melandrium hieronymi* Pax, p.p., *Melandrium mandonii* Rohrb., *Melandrium rimbachii* Mattf.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Marticorena, A., Pardo, V., Peñaloza, A., Negritto, M. A., Cavieres, L. & Parada, M., 2004; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 4081* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 214* (CONC)].

Silene margaritae Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 607* (CORD, SI)].

Silene maritima With.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini s.n.* (BA)].

Silene maritima With. var. *patagonica* Hauman = **Silene melanopotamica** Pedersen subsp. **melanopotamica**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene melanopotamica Pedersen subsp. **agrostophylla** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 7052* (BAB)].

Silene melanopotamica Pedersen subsp. **melanopotamica**
Sin.: *Silene inflata* Sm. var. *patagonica* Speg., *Silene maritima* With. var. *patagonica* Hauman
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonifacino, M. 779* (SI)].

Silene melanopotamica Pedersen subsp. **nivosimontana** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–2800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15972* (BAB)].

Silene nubigena Phil. = **Silene chilensis** (Naudin) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Silene patagonica (Speg.) Bocquet
Sin.: *Lychnis patagonica* Speg., *Lychnis patagonica* Speg. f. *glabrisucula* H. Ross, *Melandrium densifolium* Dusén, *Melandrium patagonicum* (Speg.) Speg., *Silene densifolia* (Dusén) Bocquet
Referencias: Bocquet, G. F., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koslowsky, J. 92* (SI)].

Silene pendula L.
Sin.: *Silene cisplatensis* Cambess.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1967.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini s.n.* (BA, LPS)]; [*Lombardo, A. 2746* (MVJB)].
Notas: Citada para Brasil sin mencionar ejemplar de referencia (Añón, 1967).

Silene plutonica Naudin
Sin.: *Melandrium chilense* (Naudin) Rohrb. var. *plutonicum* (Naudin) Hosseus, *Melandrium plutonicum* (Naudin) Reiche, *Silene glutinosa* Walp., nom. nud.
Referencias: Bocquet, G. F., 1967, 1969; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(RNE); CHL(VI, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Philippi, O. 159* (SGO)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (G, K, P)].

Silene pratensis (Raf.) Godr. & Gren.
Sin.: *Lychnis alba* Mill., *Lychnis pratensis* Raf., *Melandrium album* (Mill.) Garcke, *Silene alba* (Mill.) E.H.L. Krause, *Silene dioica* A. DC.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Silene pteroneura F. N. Williams = **Silene antirrhina** L. var. **antirrhina**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Silene spatulata Larrañaga = **Silene gallica** L.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sin.: *Behen vulgaris* Moench, *Silene cucubalus* Wibel, nom. illeg., *Silene inflata* Sm.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, NEU, RNE); CHL(IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 462* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17504* (SI)].

Spergula L.

Número de especies: 13, 7 endémicas, 3 introducidas

Spergula arvensis L.
Sin.: *Spergula vulgaris* Boenn., *Spergularia arvensis* (L.) Cambess.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MIS, NEU, RNE, SCR, TDF); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, RME); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2009* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 10326* (CTES)]; CHL[*Hollermayer, A. 1571* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5156* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Felippone, F. 2758* (SI)].

Spergula bocconii (Scheele) Pedersen
Sin.: *Alsine bocconii* Scheele, *Arenaria bocconii* Soleirol ex Merino, nom. nud., *Spergularia bocconei* (Scheele) Graebn., *Spergularia bocconii* Foucaud ex Merino, nom. nud.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SFE); CHL(V, VIII, IX, RME); URY(ART, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1824* (SI)]; CHL[*Jaffuel, F. 2912* (G)]; URY[*Lema 6449* (MVFA)].

Spergula calva Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 3975* (SI)].

Spergula cerviana (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.
Sin.: *Arenaria cerviana* Cham. & Schltdl., *Arenaria polyantha* Phil., *Lepigonum purpureum* Kindb. var. *firmum* Kindb., *Spergularia cerviana* (Cham. & Schltdl.) G. Don, *Spergularia firma* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia polyantha* Phil.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Briones, N. 1887* (G, SGO)].

Spergula depauperata (Naudin) Pedersen
Sin.: *Arenaria depauperata* Naudin, *Lepigonum depauperatum* (Naudin) Kindb., *Lepigonum grandiflorum* Kindb., *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb., *Spergularia depauperata* (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.) Hauman & Irigoyen, *Spergularia grandiflora* (Kindb.) Rohrb., *Spergularia rengifoi* Phil., *Spergularia tenella* Phil., *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche, *Tissa depauperata* (Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Hauman
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3800 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SJU); CHL(V, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schajowskoy, S. s.n.* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].

Spergula diandra (Guss.) Murb.
Sin.: *Arenaria diandra* Guss., *Spergularia diandra* (Guss.) Boiss.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 575* (SI)].

Spergula grandis Pers.
Sin.: *Arenaria grandis* (Pers.) Kunth, *Buda grandis* (Pers.) Kuntze, *Lepigonum grande* (Pers.) Kindb., *Spergularia grandis* (Pers.) Cambess., *Tissa grandis* (Pers.) Britton

Referencias: Hassler, E., 1909a; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE); BRA(RGS); PRY(PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1270* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34716* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 212* (*)]; URY[*Berro, M. B. 1534* (MVFA)].

Spergula humifusa Cambess. = **Sagina humifusa** (Cambess.) Fenzl & Rohrb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Spergula laevis (Cambess.) D. Dietr.
Sin.: *Arenaria bonariensis* Gillies ex Hook. & Arn., *Lepigonum laeve* (Cambess.) Kindb., *Spergularia bonariensis* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken, *Spergularia laevis* Cambess.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SCR, SFE); BRA(RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9839* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4838* (MVFA)].

[Spergula maritima (All.) Pedersen]
Sin.: *Spergularia marginata* (Cambess.) Kitt., nom. illeg.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Spergula pissisi (Phil.) Volponi
Sin.: *Arenaria pissisi* Phil., *Spergularia pissisii* (Phil.) I.M. Johnst., *Tissa pissisi* (Phil.) Reiche
Referencias: Rossbach, R. P., 1943; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Beorchia, A. 11* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 255* (G, UC, US)].

Spergula platensis (Cambess.) Shinners var. **balansae** (R. Rossbach) Pedersen
Sin.: *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *balansae* R. Rossbach
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 25928* (SI)].

Spergula platensis (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Sin.: *Alsine platensis* (Cambess.) House, *Balardia platensis* Cambess., *Buda platensis* (Cambess.) Kuntze, *Spergularia angolensis* Phil., *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl, *Spergularia platensis* (Cambess.) Fenzl var. *septentrionalis* (Hassl.) Hauman & Irigoyen, *Tissa platensis* (Cambess.) Hassl., *Tissa platensis* (Cambess.) Hassl. subsp. *septentrionalis* Hassl., *Tissa platensis* (Cambess.) Hassl. var. *septentrionalis* (Hassl.) Hassl.
Referencias: Hassler, E., 1909a; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Rossbach, R. P., 1943; Volponi, C. R., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, RNE, SAL, SCR, SFE, TUC); CHL(VIII, IX, RME); PRY(PHA); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2887* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. 2284* (G, SGO)]; PRY[*Rojas, T. 399* (*)]; URY[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. s.n.* (P)].
Notas: Introducida en Chile.

Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr. subsp. **ramosa**
Sin.: *Spergularia ramosa* Cambess., *Spergularia ramosa* Cambess. var. *diffusa* Rossbach
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1994, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA); PRY(APY, PHA); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 152* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. s.n.* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 3445* (FCQ)]; URY[*Gómez Sosa, E. V. 286* (SI)].

Spergula ramosa (Cambess.) D. Dietr. subsp. **rossbachiae** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, NEU, RNE, SCR); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15909* (SI), *Correa, M. N. 5021* (BAB)]; URY[*Osten, C. 3640* (SI)].

[Spergula rubra (L.) D. Dietr.]
Sin.: *Arenaria rubra* L., *Spergularia campestris* (L.) Asch., *Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Spergula salina (J. Presl & C. Presl) D. Dietr.
Sin.: *Arenaria rubra* L. var. *marina* L., *Spergularia salina* J. Presl & C. Presl
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, JUJ, MEN, SCR, SFE, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 4122* (BAB)].

Spergula villosa Pers.
Sin.: *Arenaria alba villosa* Larrañaga, *Arenaria berteroana* Phil., *Lepigonum arenarium* Kindb., *Lepigonum liebmannianum* Lange, *Lepigonum villosum* (Pers.) Kindb., *Spergularia aprica* Phil., *Spergularia liebmanniana* (Lange) Rohrb., *Spergularia remotiflora* Steud., *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess., *Spergularia villosa* (Pers.) Cambess. var. *berteroana* (Phil.) Rohrb., *Tissa villosa* (Pers.) Britton
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Rossbach, R. P., 1943; Volponi, C. R., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LRI, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, X, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33366* (SI)]; CHL[*Fraga, A. 14* (SI)]; [*Berro, M. B. 7686* (MVFA)].

Spergula vulgaris Boenn. = **Spergula arvensis** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia (Pers.) J. Presl & C. Presl

Número de especies: 14, 10 endémicas, 3 introducidas

Spergularia aberrans I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 3631* (G)].

[Spergularia andina Rohrb.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Spergularia angolensis Phil. = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia aprica Phil. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Rossbach, R. P., 1943.

[Spergularia araucana Phil.]
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Notas: Nombre dudoso.

Spergularia arbuscula (Gay) I.M. Johnst.
Sin.: *Arenaria lignosa* Phil., *Arenaria teretifolia* Phil., *Paronychia arbuscula* Gay, *Spergularia fruticosa* Phil., *Spergularia lignosa* (Phil.) Rohrb., *Spergularia teretifolia* (Phil.) Phil., *Tissa lignosa* (Phil.) Reiche, *Tissa teretifolia* (Phil.) Reiche
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 385* (B, FM, G, NY, SI, UC, US)].

Spergularia arvensis (L.) Cambess. = **Spergula arvensis** L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Spergularia bocconei (Scheele) Graebn. = **Spergula bocconii** (Scheele) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia bocconii Foucaud ex Merino, nom. nud. = **Spergula bocconii** (Scheele) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia bonariensis (Gillies ex Hook. & Arn.) Hicken = **Spergula laevis** (Cambess.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Spergularia borchersi Phil. = **Spergularia stenocarpa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia campestris (L.) Asch. = **Spergula rubra** (L.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

[Spergularia cerastoides Foucaud]
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Notas: Nombre dudoso.

Spergularia cerviana (Cham. & Schltdl.) G. Don = **Spergula cerviana** (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.

Spergularia confertiflora Steud.
Sin.: *Arenaria rubra* L. var. *polyphylla* Phil., *Spergularia confertiflora* Steud. var. *polyphylla* (Phil.) Skottsb., *Spergularia polyphylla* (Phil.) Rohrb., *Tissa polyphylla* (Phil.) Reiche
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IDE, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero 1431* (K)].

Spergularia confertiflora Steud. var. *polyphylla* (Phil.) Skottsb. = **Spergularia confertiflora** Steud.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia coquimbensis Phil. = **Spergularia floribunda** (Gay) Rohrb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia cremnophila I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5683* (FM, G, US)].

Spergularia denticulata (Phil.) Phil.
Sin.: *Arenaria denticulata* Phil., *Tissa denticulata* (Phil.) Reiche
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16166* (SI)].

Spergularia depauperata (Naudin) Rohrb. = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen

Spergularia depauperata (Naudin) Rohrb. var. *tenella* (Phil.) Hauman & Irigoyen = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia diandra (Guss.) Boiss. = **Spergula diandra** (Guss.) Murb.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia dillenii Lebel
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Anual o bianual. Introducida.
Países: CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 874* (B, FM, G, NY, US)].

Spergularia fasciculata Phil.
Sin.: *Spergularia stuebellii* (Hieron.) I.M. Johnst., *Tissa fasciculata* (Phil.) Reiche, *Tissa stuebellii* Hieron.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Hierba. Perenne. Nativa. 3000–3800 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1841* (B)].

Spergularia firma (Kindb.) Rohrb. = **Spergula cerviana** (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia floribunda (Gay) Rohrb.
Sin.: *Arenaria floribunda* Gay, *Lepigonum floribundum* (Gay) Kindb., *Spergularia coquimbensis* Phil., *Tissa floribunda* (Gay) Reiche
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (G, K)].

Spergularia fruticosa Phil. = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia grandiflora (Kindb.) Rohrb. = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia grandis (Pers.) Cambess. = **Spergula grandis** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Spergularia laevis Cambess. = **Spergula laevis** (Cambess.) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Pedersen, T. M., 1987b.

Spergularia larrañagae Phil. = **Spergularia stenocarpa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia liebmanniana (Lange) Rohrb. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia lignosa (Phil.) Rohrb. = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia macrotheca Heynh. = **Spergularia media** (L.) C. Presl ex Griseb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia marginata (Cambess.) Kitt., nom. illeg. = **Spergula maritima** (All.) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia marina (L.) Griseb.
Sin.: *Buda marina* (L.) Dum. Cours., *Lepigonum marinum* (L.) Wahlenb.
Referencias: Añón, D. S. C., 1967; Broughton, D. A., Adam, J. H. M. & Brännström, R., 2000.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(BAI, TDF); CHL(IV, VIII, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8579* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 75* (CONC)].

Spergularia masafuerana Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 411* (S)].

Spergularia media (L.) C. Presl ex Griseb.
Sin.: *Arenaria littoralis* Phil., *Arenaria marginata* DC., *Arenaria marina* Sm., *Arenaria media* L., *Lepigonum medium* (L.) Fr., *Spergularia macrotheca* Heynh.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IDE, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pennell, F. W. 12908* (FM, G)].
Notas: Cita dudosa para Argentina y Uruguay.

[Spergularia oligantha Phil.]
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Notas: Nombre dudoso.

Spergularia pissisii (Phil.) I.M. Johnst. = **Spergula pissisi** (Phil.) Volponi
Referencias: Volponi, C. R., 1994.

Spergularia platensis (Cambess.) Fenzl = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Spergularia platensis (Cambess.) Fenzl var. *balansae* R. Rossbach = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **balansae** (R. Rossbach) Pedersen
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b.

Spergularia platensis (Cambess.) Fenzl var. *septentrionalis* (Hassl.) Hauman & Irigoyen = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b.

Spergularia polyantha Phil. = **Spergula cerviana** (Cham. & Schltdl.) D. Dietr.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia polyphylla (Phil.) Rohrb. = **Spergularia confertiflora** Steud.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia pycnantha R. Rossbach
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jaffuel, F. 1164* (G)].

Spergularia ramosa Cambess. = **Spergula ramosa** (Cambess.) D. Dietr. subsp. **ramosa**
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Spergularia ramosa Cambess. var. *diffusa* Rossbach = **Spergula ramosa** (Cambess.) D. Dietr. subsp. **ramosa**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

Spergularia remotiflora Steud. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia rengifoi Phil. = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl = **Spergula rubra** (L.) D. Dietr.

Spergularia rupestris Cambess.
Arbustillo. Endémica. 0–500 m.
Países: URY (LAV, MAL, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Del Puerto, O. 9688* (MVFA)].

Spergularia salina J. Presl & C. Presl = **Spergula salina** (J. Presl & C. Presl) D. Dietr.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia stenocarpa (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Arenaria stenocarpa* Phil., *Spergularia borchersi* Phil., *Spergularia larrañagae* Phil., *Tissa borchersi* (Phil.) Reiche
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 799* (B, FM, G, SI, UC, US)].

Spergularia stuebellii (Hieron.) I.M. Johnst. = **Spergularia fasciculata** Phil.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia tenella Phil. = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1984b.

Spergularia teretifolia (Phil.) Phil. = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Spergularia villosa (Pers.) Cambess. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Spergularia villosa (Pers.) Cambess. var. *berteroana* (Phil.) Rohrb. = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Spergulastrum lanuginosum Michx. = **Arenaria lanuginosa** (Michx.) Rohrb. var. **lanuginosa**
Referencias: Volponi, C. R., 1985, 1995.

Stellaria L.

Número de especies: 20, 8 endémicas, 4 introducidas

Stellaria abortiva Naudin = **Stellaria pallida** (Dumort.) Piré
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria alsine Grimm
Sin.: *Stellaria uliginosa* Murr
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Roivainen, H. s.n.* (H)].

Stellaria antoniana Volponi
Referencias: Volponi, C. R., 1986a, 1993.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–2900 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 26593* (CTES, LP, SI)].

Stellaria aphanantha Griseb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1983.
Hierba. Endémica.
Países: ARG(CAT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schickendantz, F. 117* (GOET, LP)].

Stellaria arvalis Fenzl ex F. Phil.
Sin.: *Stellaria cuspidata* Schltdl. var. *alsineformis* Naudin
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Pedersen, T. M., 1983, 1984b; Volponi, C. R., 1986a, b, 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(I, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5654* (SI)]; CHL[*Pennell, F. W. 12538* (S, SGO)].

Stellaria axillaris Phil. = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

[Stellaria borealis Bigelow]
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Stellaria celsa Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2006a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2500–2700 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5340* (BA)].

Stellaria chilensis Pedersen
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Pedersen, T. M., 1983; Volponi, C. R., 1993.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3400 m.
Países: CHL(I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16433* (S, SI)].

Stellaria chubutensis Speg. = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria circinata Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005a.
Hierba. Endémica.

Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 4082* (BA, CONC, P)].

Stellaria concinna Ravenna
Referencias: Ravenna, P. F., 2005l.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–1700 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ravenna, P. F. 5190* (BA, CONC, CTES)].

Stellaria cryptopetala Griseb.
Sin.: *Alsine cherleriae* Fenzl var. *andina* Kuntze
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b; Martínez Crovetto, R., 1967; Volponi, C. R., 1983, 1986a.
Hierba. Endémica. 2500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10540* (SI)].

Stellaria cuspidata Schltdl.
Referencias: Volponi, C. R., 1983, 1986b, 1993.
Hierba. Anual. Nativa. 600–2600 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, NEU, RNE, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4633* (BA, LP)].

Stellaria cuspidata Schltdl. var. *alsineformis* Naudin = **Stellaria arvalis** Fenzl ex F. Phil.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1993.

Stellaria cuspidata Schltdl. var. *sessilifolia* Wedd. = **Stellaria weddellii** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1983.

Stellaria debilis d'Urv.
Sin.: *Alsine axillaris* (Phil.) Macloskie, *Alsine chubutensis* (Speg.) Macloskie, *Alsine debile* (d'Urv.) Macloskie, *Stellaria axillaris* Phil., *Stellaria chubutensis* Speg., *Stellaria debilis* d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen, *Stellaria stenopetala* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman, *Stellaria stenopetala* Phil. var. *magellanica* Phil., *Stellaria stenopetala* Phil. var. *typica* Hauman, nom. inval., *Stellaria xanthospora* Chodat & Wilczek
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983, 1986a, 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, MEN, RNE, SCR, SJU, TDF); CHL(IV, VIII, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 766* (SI)]; CHL[*Pedersen, T. M. 14406* (CTES, SI)].

Stellaria debilis d'Urv. var. *condensata* (A. Gray ex Macloskie) Hauman & Irigoyen = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria glabra Raunk. = **Stellaria media** (L.) Cirillo var. **gymnocalyx** Trautv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Stellaria graminea L.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Green, S. W. 3193* (K)].

Stellaria hiemalis (Bég.) Raunk. = **Stellaria media** (L.) Cirillo var. **media**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Stellaria lanceolata Poir.
Sin.: *Alsine lanceolata* (Poir.) Macloskie
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Commerson, P. s.n.* (P)].

Stellaria media (L.) Vill., comb. superfl. = **Stellaria media** (L.) Cirillo var. **media**

Stellaria media (L.) Cirillo f. *malachioides* Macloskie = **Stellaria media** (L.) Cirillo var. **media**
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Stellaria media (L.) Cirillo var. **gymnocalyx** Trautv.
Sin.: *Stellaria glabra* Raunk.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6227* (SI)].

Stellaria media (L.) Cirillo var. **media**
Sin.: *Alsine media* L., *Stellaria hiemalis* (Bég.) Raunk., *Stellaria media* (L.) Cirillo f. *malachioides* Macloskie, *Stellaria media* (L.) Cirillo var. *normalis* Speg., nom. inval., *Stellaria media* (L.) Vill., comb. superfl.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Martínez Crovetto, R., 1967; Pedersen, T. M., 1987b; Volponi, C. R., 1986a, 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC); BRA(RGS); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5286a* (SI)]; CHL[*Pastore, F. 20* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4665* (SI)].

Stellaria media (L.) Cirillo var. *normalis* Speg., nom. inval. = **Stellaria media** (L.) Cirillo var. **media**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

[Stellaria nemorum L.]
Sin.: *Alsine nemorum* (L.) Macloskie
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

[Stellaria oligosperma (Naudin) Rohrb.]
Notas: Nombre dudoso.

Stellaria pallida (Dumort.) Piré
Sin.: *Alsine pallida* Dumort., *Stellaria abortiva* Naudin
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b; Volponi, C. R., 1983, 1986a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, DFE, ERI, RNE); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 6226* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 35577* (CONC)].

Stellaria parva Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Volponi, C. R., 1983, 1986a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE); PRY(CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26059* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. 12465* (LP)].

Stellaria parviflora Banks & Sol. ex Hook. f. subsp. **ignis** Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Moore, D. M. 1948* (BAB, K)]; CHL[*Pisano, E. 5144* (RNG)].

Stellaria pedersenii Volponi
Referencias: Volponi, C. R., 1986a, 1993.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 1571* (MCNS)].

Stellaria rotundifolia Poir. = **Drymaria rotundifolia** (Poir.) Har.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Stellaria stenopetala Phil. = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria stenopetala Phil. var. *axillaris* (Phil.) Hauman = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Volponi, C. R., 1983.

Stellaria stenopetala Phil. var. *chubutensis* (Speg.) Hauman = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria stenopetala Phil. var. *magellanica* Phil. = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria stenopetala Phil. var. *typica* Hauman, nom. inval. = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b; Volponi, C. R., 1983.

Stellaria uliginosa Murr = **Stellaria alsine** Grimm
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Stellaria weddellii Pedersen
Sin.: *Stellaria cuspidata* Schltdl. var. *sessilifolia* Wedd.
Referencias: Pedersen, T. M., 1983; Volponi, C. R., 1986a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3100–4500 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruthsatz, B. s.n.* (SI)]; CHL[*Marticorena, A. 97* (CONC)].

Stellaria xanthospora Chodat & Wilczek = **Stellaria debilis** d'Urv.
Referencias: Volponi, C. R., 1983.

Stellaria yungasensis Rusby
Referencias: Volponi, C. R., 1992, 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 1524* (MCNS)].

Stichophyllum bryoides Phil. = **Pycnophyllum bryoides** (Phil.) Rohrb.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1967.

Talinum minimum Miers ex Colla = **Microphyes minima** (Miers ex Colla) Briq.

Tissa borchersi (Phil.) Reiche = **Spergularia stenocarpa** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa denticulata (Phil.) Reiche = **Spergularia denticulata** (Phil.) Phil.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa depauperata (Naudin) Reiche = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Tissa depauperata (Naudin) Reiche var. *tenella* (Phil.) Hauman = **Spergula depauperata** (Naudin) Pedersen
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b.

Tissa fasciculata (Phil.) Reiche = **Spergularia fasciculata** Phil.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa floribunda (Gay) Reiche = **Spergularia floribunda** (Gay) Rohrb.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa grandis (Pers.) Britton = **Spergula grandis** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Tissa lignosa (Phil.) Reiche = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa pissisi (Phil.) Reiche = **Spergula pissisi** (Phil.) Volponi
Referencias: Volponi, C. R., 1994.

Tissa platensis (Cambess.) Hassl. = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Tissa platensis (Cambess.) Hassl. var. *septentrionalis* (Hassl.) Hassl. = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Tissa platensis (Cambess.) Hassl. subsp. *septentrionalis* Hassl. = **Spergula platensis** (Cambess.) Shinners var. **platensis**
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Tissa polyphylla (Phil.) Reiche = **Spergularia confertiflora** Steud.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa stuebellii Hieron. = **Spergularia fasciculata** Phil.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa teretifolia (Phil.) Reiche = **Spergularia arbuscula** (Gay) I.M. Johnst.
Referencias: Rossbach, R. P., 1943.

Tissa villosa (Pers.) Britton = **Spergula villosa** Pers.
Referencias: Pedersen, T. M., 1987b.

Vaccaria Medik.

Número de especies: 1 introducida

Vaccaria pyramidata Medik.
Sin.: *Saponaria segetalis* Neck., *Saponaria vaccaria* L., *Vaccaria segetalis* (Neck.) Garcke ex Asch.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, NEU, RNE, SFE, TUC); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*León, R. 194* (SI)]; URY[*Rosendahl, H. V. 11698* (MVFA)].

Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke ex Asch. = **Vaccaria pyramidata** Medik.
Referencias: Pedersen, T. M., 1984b, 1987b.

CECROPIACEAE

Autor: Berg, C. C.

3 géneros, 4 especies.

Cecropia Loefl.

Número de especies: 2

Cecropia adenopus Mart. ex Miq. = **Cecropia pachystachya** Trécul
Referencias: Bernardi, L., 1985; Rotman, A. D., 1987b.

Cecropia adenopus Mart. ex Miq. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassl. = **Cecropia pachystachya** Trécul
Referencias: Bernardi, L., 1985.

Cecropia adenopus Mart. ex Miq. var. *macrophylla* Hassl. = **Cecropia pachystachya** Trécul
Referencias: Bernardi, L., 1985.

Cecropia adenopus Mart. ex Miq. var. *vulgaris* Hassl., nom. inval. = **Cecropia pachystachya** Trécul
Referencias: Bernardi, L., 1985.

[Cecropia ambaci Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Cecropia catarinensis Cuatrec. = **Cecropia pachystachya** Trécul

Cecropia cinerea Miq. = **Cecropia pachystachya** Trécul

[Cecropia concolor Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cecropia glauca Rojas Acosta = **Cecropia pachystachya** Trécul

Cecropia glaziovii Snethl.
Referencias: Berg, C. C. & Roselli, P. F., 2005; Berg, C. C., 1996.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Waechter, J. L. 1516* (GUA, ICN)].

Cecropia lyratiloba Miq. = **Cecropia pachystachya** Trécul
Referencias: Bernardi, L., 1985.

[Cecropia obtusa Trécul]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cecropia pachystachya Trécul
Sin.: *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *lyratiloba* (Miq.) Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *macrophylla* Hassl., *Cecropia adenopus* Mart. ex Miq. var. *vulgaris* Hassl., nom. inval., *Cecropia catarinensis* Cuatrec., *Cecropia cinerea* Miq., *Cecropia glauca* Rojas Acosta, *Cecropia lyratiloba* Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Roselli, P. F., 2005; Berg, C. C., 1996; Bernardi, L., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1435* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 41973* (C, GB, INPA, MG, MICH, US)]; PRY[*Burkart, A. 18583* (SI), *Hassler, E. 617a* (G), *Zardini, E. M. 24843* (SI), *Zardini, E. M. 7162* (FCQ, MO)].

[Cecropia sciadophylla Mart.]
Referencias: Spichiger, R., Méroz, J., Loizeau, P. A. & Stutz de Ortega, L., 1989.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Coussapoa Aubl.

Número de especies: 1

Coussapoa fontanesiana Trécul = **Coussapoa microcarpa** (Schott) Rizzini
Referencias: Berg, C. C., Akkermans, R. W. A. P. & van Heusden, E. C. H., 1990.

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini
Sin.: *Coussapoa fontanesiana* Trécul, *Coussapoa schottii* Miq., *Coussapoa schottii* Miq. var. *lanceolata* Miq., *Coussapoa schottii* Miq. var. *longifolia* Miq.
Referencias: Berg, C. C., Akkermans, R. W. A. P. & van Heusden, E. C. H., 1990.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 38421* (SI), *Reitz, P. R. 975* (NY, S)].

Coussapoa schottii Miq. = **Coussapoa microcarpa** (Schott) Rizzini
Referencias: Berg, C. C., Akkermans, R. W. A. P. & van Heusden, E. C. H., 1990.

Coussapoa schottii Miq. var. *lanceolata* Miq. = **Coussapoa microcarpa** (Schott) Rizzini
Referencias: Berg, C. C., Akkermans, R. W. A. P. & van Heusden, E. C. H., 1990.

Coussapoa schottii Miq. var. *longifolia* Miq. = **Coussapoa microcarpa** (Schott) Rizzini
Referencias: Berg, C. C., Akkermans, R. W. A. P. & van Heusden, E. C. H., 1990.

Pourouma Aubl.

Número de especies: 1

Pourouma guianensis Aubl.
Referencias: Berg, C. C., Akkermans, R. W. A. P. & van Heusden, E. C. H., 1990.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 89* (US)].

CELASTRACEAE

Autor: Simmons, M. P.

4 géneros, 19 especies, 8 especies endémicas.

Austroplenckia microcarpa (Lundell) Lundell = **Plenckia microcarpa** Lundell
Referencias: Loesener, L. E. T., 1942.

Austroplenckia populnea (Reissek) Lundell = **Plenckia populnea** Reissek
Referencias: Loesener, L. E. T., 1942.

Boaria chilensis Phil. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Boaria molinae A. DC. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Cassine magellanica Lam. = **Maytenus magellanica** (Lam.) Hook. f.
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Celastrus megellanicus (Lam.) DC. = **Maytenus magellanica** (Lam.) Hook. f.
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Celastrus moya (Griseb.) Loes. = **Moya spinosa** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Celastrus spinifolium Larrañaga = **Maytenus ilicifolia** Mart. ex Reissek
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Celastrus uncinatus Ruiz & Pav. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Gymnosporia boliviana Loes. = **Moya scutioides** Griseb.
Referencias: Jordaan, M. & van Wyk, A. E., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Gymnosporia establei Herter = **Moya spinosa** Griseb.
Referencias: Jordaan, M. & van Wyk, A. E., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Gymnosporia spinosa (Griseb.) Loes. ex Hicken = **Moya spinosa** Griseb.
Referencias: Jordaan, M. & van Wyk, A. E., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus Molina

Número de especies: 13, 6 endémicas

Maytenus andina Phil. = **Maytenus magellanica** (Lam.) Hook. f.
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Maytenus angustifolia Mattos & N.F. Mattos
Referencias: Mattos, J. R., 1978.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (*)]; BRA[*Mattos, J. R. 4354* (IPRN)].

Maytenus aquifolium Mart. = **Maytenus ilicifolia** Mart. ex Reissek
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus boaria Molina
Sin.: *Boaria chilensis* Phil., *Boaria molinae* A. DC., *Celastrus uncinatus* Ruiz & Pav., *Maytenus boaria* Molina var. *angustifolia* Turcz., *Maytenus chilensis* DC., *Maytenus chilensis* DC. var. *angustifolius* DC.,

Maytenus crenulatus C. Presl, *Maytenus magellanica* auct. non (Lam.) Hook. f.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Lourteig, A., 1988a.
Árbol. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(CHU, COR, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU, TDF); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 2112* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 15829* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 309* (SI)].

Maytenus boaria Molina var. *angustifolia* Turcz. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus cassineformis Reissek
Referencias: Reissek, S., 1861; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(sin localidad); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 2327* (B)]; URY[*Escudero s.n.* (MVFA)].

Maytenus chilensis DC. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Maytenus chilensis DC. var. *angustifolius* DC. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus chubutensis (Speg.) Lourteig, O'Donell & Sleumer
Sin.: *Pernettya chubutensis* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Lourteig, A., 1988a.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 43* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20136* (CONC)].

Maytenus crenulatus C. Presl = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Maytenus cuezzoi Legname
Referencias: Legname, P. R., 1973b.
Arbolito o árbol. Endémica. 1500–1800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Novara, L. J. 7102* (SI), *Vervoorst, F. B. 7618* (LIL)].

Maytenus dasyclados Mart.
Arbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hagelund, K. 14320* (MO)]; URY[*Marchesi, E. 18938* (MVFA)].

Maytenus disticha (Hook. f.) Urb.
Sin.: *Myginda disticha* Hook. f., *Rhacoma disticha* (Hook. f.) Loes.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Lourteig, A., 1988a; Moore, D. M., 1983.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2430* (SI), *Sleumer, H. O. 1578* (LIL)]; CHL[*Werdermann, E. 1266* (GH, LIL, MO, NY, SI, US)].

Maytenus hassleri Briq. = **Maytenus ilicifolia** Mart. ex Reissek
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek
Sin.: *Celastrus spinifolium* Larrañaga, *Maytenus aquifolium* Mart., *Maytenus hassleri* Briq., *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek f. *angustior* Briq., *Maytenus pilcomayensis* Briq.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA); URY(CAS, COL, DUR, FLA, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29446* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34573* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18801* (SI), *Hassler, E. 198* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 922* (SI)].

Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek f. *angustior* Briq. = **Maytenus ilicifolia** Mart. ex Reissek
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus littoralis R.M. Carvalho-Okano
Referencias: Carvalho-Okano, R. M., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 44954* (MBM)].

Maytenus lorentzii Briq. = **Maytenus vitis-idaea** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus magellanica auct. non (Lam.) Hook. f. = **Maytenus boaria** Molina
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Maytenus magellanica (Lam.) Hook. f.
Sin.: *Cassine magellanica* Lam., *Celastrus megellanicus* (Lam.) DC., *Maytenus andina* Phil.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Moore, D. M., 1983.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 815* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1282* (SI)].

Maytenus paraguariensis Briq. = **Maytenus vitis-idaea** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus paraguariensis Briq. var. *genuina* Briq., nom. inval. = **Maytenus vitis-idaea** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus paraguariensis Briq. var. *grandifolia* Briq. = **Maytenus vitis-idaea** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus pilcomayensis Briq. = **Maytenus ilicifolia** Mart. ex Reissek
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus robusta Reissek
Árbol. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 1329* (MBM, SI)].

Maytenus scutioides (Griseb.) Lourteig & O´Donell = **Moya scutioides** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & O´Donell = **Moya spinosa** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Maytenus viscifolia Griseb.
Referencias: Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.
Árbol. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 657* (GOET), *Múlgura de Romero, M. E. 906* (SI)].

Maytenus vitis-idaea Griseb.
Sin.: *Maytenus lorentzii* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq., *Maytenus paraguariensis* Briq. var. *genuina* Briq., nom. inval., *Maytenus paraguariensis* Briq. var. *grandifolia* Briq.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Lourteig, A., 1988a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA); URY(RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 378a* (GOET), *Venturi, S. 1904* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 1925* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 3342* (MVFA)].

Moya Griseb.

Número de especies: 2, 1 endémica

Moya boliviana (Loes.) Loes. = **Moya scutioides** Griseb.
Referencias: Jordaan, M. & van Wyk, A. E., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Moya scutioides Griseb.
Sin.: *Gymnosporia boliviana* Loes., *Maytenus scutioides* (Griseb.) Lourteig & O´Donell, *Moya boliviana* (Loes.) Loes.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Jordaan, M. & van Wyk, A. E., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 608* (GOET), *Rodríguez, D. 1103* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 2378* (SI)].

Moya spinosa Griseb.
Sin.: *Celastrus moya* (Griseb.) Loes., *Gymnosporia establei* Herter, *Gymnosporia spinosa* (Griseb.) Loes. ex Hicken, *Maytenus spinosa* (Griseb.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Jordaan, M. & van Wyk, A. E., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Marchesi, E., 2004.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1* (GOET), *Venturi, S. 10639* (SI)].

Myginda disticha Hook. f. = **Maytenus disticha** (Hook. f.) Urb.
Referencias: Lourteig, A., 1988a.

Pernettya chubutensis Speg. = **Maytenus chubutensis** (Speg.) Lourteig, O'Donell & Sleumer
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Plenckia Reissek

Número de especies: 3

Plenckia integerrima Lundell
Sin.: *Viposia integerrima* (Lundell) Lundell
Referencias: Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Lundell, C. L., 1938, 1939.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1936* (A, SI)].

Plenckia microcarpa Lundell
Sin.: *Austroplenckia microcarpa* (Lundell) Lundell
Referencias: Lundell, C. L., 1938.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 4477* (K)].

Plenckia populnea Reissek
Sin.: *Austroplenckia populnea* (Reissek) Lundell
Referencias: Angely, J. A., 1965; Reissek, S., 1861; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Mendonça, A. M. 24* (NY)]; PRY[*Soria, N. 2781* (FCQ)].

Rhacoma disticha (Hook. f.) Loes. = **Maytenus disticha** (Hook. f.) Urb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Lourteig, A., 1988a.

Schaefferia Jacq.

Número de especies: 1 endémica

Schaefferia argentinensis Speg.
Sin.: *Schaefferia diemonis* Herter, *Schaefferia uruguayensis* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1957c; Herter, W. G. F., 1940; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(APY, CON, GUA, PHA, SPE); URY(ART, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 11917* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1451* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1173* (SI)].

Schaefferia diemonis Herter = **Schaefferia argentinensis** Speg.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Schaefferia uruguayensis Speg. = **Schaefferia argentinensis** Speg.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

Viposia integerrima (Lundell) Lundell = **Plenckia integerrima** Lundell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1955.

CELTIDACEAE

Autor: Berg, C. C.

2 géneros, 5 especies.

Celtis L.

Número de especies: 4

Celtis aculeata Sw. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

[Celtis azcurrensis D. Parodi]
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Celtis boliviensis Planch. = **Celtis brasiliensis** (Gardner) Planch.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis bonplandiana Planch. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.
Sin.: *Celtis boliviensis* Planch., *Celtis flexuosa* (Wedd.) Miq., *Mertensia brasiliensis* Gardner, *Momisia flexuosa* Wedd.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Carauta, J. P. P., 1974.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4035* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9604* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 48500* (AS, MO)].

Celtis chichape (Wedd.) Miq.
Sin.: *Celtis pallida* Torr. subsp. *sericea* (Romanczuk) Romanczuk, *Celtis pallida* Torr. var. *discolor* Hunz. & Dottori, *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng. var. *chichape* Baehni, *Celtis sericea* Romanczuk, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *velutina* Herzog, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *chichape* (Wedd.) Planch., *Momisia chichape* Wedd.
Referencias: Baehni, C., 1937; Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Dottori, N. M. & Hunziker, A. T., 1994a; Hunziker, A. T. & Dottori, N. M., 1976; Romanczuk, M. C. & Del Pero de Martínez, M., 1978.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PAI); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27532* (SI), *Fortunato, R. H. 7589* (BAB, CORD), *Morrone, O. 4145* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 3129* (FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 10348* (B)].

Celtis diffusa Planch. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

[Celtis disticha D. Parodi]
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm.
Sin.: *Celtis bonplandiana* Planch., *Celtis flexuosa* (Wedd.) Miq. var. *glabrifolia* Griseb., *Celtis integrifolia* Lam., *Celtis lancifolia* (Wedd.) Miq., *Celtis pallida* Torr. var. *pallida*, *Celtis sellowiana* Miq., *Celtis sellowiana* Miq. f. *praecox* Lorentz, nom. nud., *Celtis spinosa* Spreng. var. *pallida* (Torr.) M.C. Johnst., *Celtis spinosa* Spreng. var. *weddelliana* (Planch.) Baehni, *Celtis tala* Gillies ex Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *obtusata* Chodat & Hassl., *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *subpilosa* Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. f. *subtomentosa* Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *gaudichaudiana* Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *gilliesiana* Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *pallida* (Torr.) Planch., *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *sellowiana* (Miq.) Kuntze, *Celtis tala* Gillies ex Planch. var. *weddelliana* Planch., *Celtis weddelliana* (Planch.) Romanczuk, *Momisia ehrenbergiana* Klotzsch, *Momisia integrifolia* Wedd., *Momisia lancifolia* Wedd.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Hunziker, A. T. & Dottori, N. M., 1976; Kiesling, R., 1994j; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Romanczuk, M. C., 1987; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI, PHA); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 24763* (SI), *Lorentz, P. G. 483* (GOET)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1732* (P)]; PRY[*Hassler, E. 7295* (G, MPU, NY, P)]; URY[*Del Puerto, O. 2433* (MVFA)].

Celtis flexuosa (Wedd.) Miq. = **Celtis brasiliensis** (Gardner) Planch.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis flexuosa (Wedd.) Miq. var. *glabrifolia* Griseb. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

[Celtis fuscata Rojas Acosta]
Referencias: Krapovickas, A., 1970d.
Notas: Nombre dudoso.

Celtis glycycarpa Mart. ex Miq. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.
Sin.: *Celtis aculeata* Sw., *Celtis diffusa* Planch., *Celtis glycycarpa* Mart. ex Miq., *Celtis morifolia* Planch., *Celtis pubescens* (Kunth) Spreng., *Celtis spinosa* Spreng., *Celtis spinosissima* (Wedd.) Miq., *Celtis triflora* (Klotzsch) Miq., *Mertensia aculeata* (Wedd.) Schult., *Mertensia iguanaea* (Jacq.) Schult., *Mertensia pubescens* Kunth, *Momisia aculeata* (Sw.) Klotzsch, *Momisia iguanaea* (Jacq.) Rose & Standl., *Momisia pubescens* (Kunth) F.G. Dietr., *Momisia spinosissima* Wedd., *Momisia tarijensis* Wedd., *Momisia triflora* Ruiz ex Klotzsch, *Rhamnus iguanaeus* Jacq.
Referencias: Baehni, C., 1937; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Carauta, J. P. P., 1974; Dottori, N. M. & Hunziker, A. T., 1994a; Marchioretto, M. S., 1988; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ragonese, A. E., 1941; Romanczuk, M. C. & Del Pero de Martínez, M., 1978; Romanczuk, M. C., 1987; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA); URY(MAL, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1676* (SI), *Deginani, N. B. 1038* (SI)]; BRA[*Pedralli, G. A. 17* (ICN), *Sehnem, A. 2135* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1432* (SI), *Kiesling, R. 9569* (G, PY, SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 64* (B), *Del Puerto, O. 2382* (SI), *Izaguirre de Artuccio, P. 2289* (MVFA)].

Celtis integrifolia Lam. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

[Celtis lanceolata D. Parodi]
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Celtis lancifolia (Wedd.) Miq. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis micrantha (L.) Sw. = **Trema micrantha** (L.) Blume
Referencias: Carauta, J. P. P., 1974; Dottori, N. M. & Hunziker, A. T., 1994a.

Celtis morifolia Planch. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis pallida Torr. var. *discolor* Hunz. & Dottori = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis pallida Torr. var. *pallida* = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis pallida Torr. subsp. *sericea* (Romanczuk) Romanczuk = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis pubescens (Kunth) Spreng. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis pubescens (Kunth) Spreng. var. *chichape* Baehni = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

[Celtis rigida D. Parodi]
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Celtis sellowiana Miq. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis sellowiana Miq. f. *praecox* Lorentz, nom. nud. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis sericea Romanczuk = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis spinosa Spreng. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis spinosa Spreng. var. *pallida* (Torr.) M.C. Johnst. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis spinosa Spreng. var. *weddelliana* (Planch.) Baehni = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis spinosissima (Wedd.) Miq. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. f. *obtusata* Chodat & Hassl. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. f. *subpilosa* Kuntze = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. f. *subtomentosa* Kuntze = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. f. *velutina* Herzog = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. var. *chichape* (Wedd.) Planch. = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. var. *gaudichaudiana* Planch. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. var. *gilliesiana* Planch. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. var. *pallida* (Torr.) Planch. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. var. *sellowiana* (Miq.) Kuntze = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis tala Gillies ex Planch. var. *weddelliana* Planch. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis triflora (Klotzsch) Miq. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Celtis weddelliana (Planch.) Romanczuk = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Mertensia aculeata (Wedd.) Schult. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Carauta, J. P. P., 1974.

Mertensia brasiliensis Gardner = **Celtis brasiliensis** (Gardner) Planch.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Carauta, J. P. P., 1974.

Mertensia iguanaea (Jacq.) Schult. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Mertensia pubescens Kunth = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia aculeata (Sw.) Klotzsch = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Carauta, J. P. P., 1974.

Momisia chichape Wedd. = **Celtis chichape** (Wedd.) Miq.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia ehrenbergiana Klotzsch = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia flexuosa Wedd. = **Celtis brasiliensis** (Gardner) Planch.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia iguanaea (Jacq.) Rose & Standl. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Carauta, J. P. P., 1974.

Momisia integrifolia Wedd. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia lancifolia Wedd. = **Celtis ehrenbergiana** (Klotzsch) Liebm.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia pubescens (Kunth) F.G. Dietr. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

[Momisia spinifera Rojas Acosta]
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.
Notas: Nombre dudoso.

Momisia spinosissima Wedd. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia tarijensis Wedd. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Momisia triflora Ruiz ex Klotzsch = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001.

Rhamnus iguanaeus Jacq. = **Celtis iguanaea** (Jacq.) Sarg.
Referencias: Berg, C. C. & Dahlberg, S. V., 2001; Johnston, M. C. & Johnston, L. A., 1978.

Rhamnus micranthus L. = **Trema micrantha** (L.) Blume
Referencias: Dottori, N. M. & Hunziker, A. T., 1994a; Johnston, M. C. & Johnston, L. A., 1978; Marchioretto, M. S., 1988.

Sponia micrantha (L.) Decne. = **Trema micrantha** (L.) Blume
Referencias: Carauta, J. P. P., 1974.

Trema L.

Número de especies: 1

Trema micrantha (L.) Blume
Sin.: *Celtis micrantha* (L.) Sw., *Rhamnus micranthus* L., *Sponia micrantha* (L.) Decne.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Carauta, J. P. P., 1974; Dottori, N. M. & Hunziker, A. T., 1994a; Marchioretto, M. S., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11014* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37845* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 2483* (FCQ, MO)].

CERATOPHYLLACEAE

Autor: Les, D. H.

1 género, 2 especies.

Ceratophyllum L.

Número de especies: 2

Ceratophyllum apiculatum Cham. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986a; Lowden, R. M., 1978.

Ceratophyllum aquaticum H.C. Watson = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum australe Griseb. = **Ceratophyllum muricatum** Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les
Referencias: Les, D. H., 1988; Tur, N. M., 1995.

Ceratophyllum chilense Leyb. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum cornutum Rich. ex Gray = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum cristatum Spruce ex K. Schum. = **Ceratophyllum muricatum** Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les
Referencias: Les, D. H., 1988.

Ceratophyllum demersum L.
Sin.: *Ceratophyllum apiculatum* Cham., *Ceratophyllum aquaticum* H.C. Watson, *Ceratophyllum chilense* Leyb., *Ceratophyllum cornutum* Rich. ex Gray, *Ceratophyllum demersum* L. var. *apiculatum* (Cham.) Garcke ex K. Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var. *inerme* Gay ex Radcl.-Sm., *Ceratophyllum demersum* L. var. *inflatum* R.E. Fr., *Ceratophyllum demersum* L. var. *laeve* Crepin, *Ceratophyllum demersum* L. var. *oxycanthum* (Cham.) K. Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var. *oxycarpum* (Cham.) Kuntze, *Ceratophyllum indicum* Willd. ex Cham., *Ceratophyllum oxyacanthum* Cham., *Ceratophyllum tricuspidatum* Dumort., *Ceratophyllum tuberculatum* Cham., *Ceratophyllum verticillatum* Roxb., *Ceratophyllum vulgare* Schleid., *Ceratophyllum vulgare* Schleid. var. *oxyacanthum* (Cham.) Schleid.
Referencias: Les, D. H., 1986a, b, 1988; Lowden, R. M., 1978; Ruiz, E., 2001c; Tur, N. M., 1987a, 1995.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, RNE, SAL, SFE); BRA(RGS, SCA); CHL(V, VIII, RME); PRY(APY); URY(CLA, COL, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27694* (SI)]; BRA[*Sacco, J. C. 804* (F)]; CHL[*Montero, G. 12623* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 2393* (CTES)]; URY[*Felippone, F. 2507* (SI)].

Ceratophyllum demersum L. var. *apiculatum* (Cham.) Garcke ex K. Schum. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum demersum L. var. *cristatum* K. Schum. = **Ceratophyllum muricatum** Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les
Referencias: Les, D. H., 1988.

Ceratophyllum demersum L. var. *inerme* Gay ex Radcl.-Sm. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum demersum L. var. *inflatum* R.E. Fr. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum demersum L. var. *laeve* Crepin = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum demersum L. var. *oxycanthum* (Cham.) K. Schum. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986a; Lowden, R. M., 1978.

Ceratophyllum demersum L. var. *oxycarpum* (Cham.) Kuntze = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum floridanum Fassett = **Ceratophyllum muricatum** Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les
Referencias: Les, D. H., 1988.

Ceratophyllum indicum Willd. ex Cham. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

Ceratophyllum llerenae Fassett = **Ceratophyllum muricatum** Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les
Referencias: Les, D. H., 1988.

Ceratophyllum muricatum Cham. subsp. **australe** (Griseb.) Les
Sin.: *Ceratophyllum australe* Griseb., *Ceratophyllum cristatum* Spruce ex K. Schum., *Ceratophyllum demersum* L. var. *cristatum* K. Schum., *Ceratophyllum floridanum* Fassett, *Ceratophyllum llerenae* Fassett
Referencias: Les, D. H., 1988, 2001; Tur, N. M., 1995.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, SFE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 547* (CORD, GOET, K)].

Ceratophyllum oxyacanthum Cham. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Crespo, S., 1984a; Lowden, R. M., 1978; Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum tricuspidatum Dumort. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum tuberculatum Cham. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Lowden, R. M., 1978; Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum verticillatum Roxb. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum vulgare Schleid. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Ruiz, E., 2001c.

Ceratophyllum vulgare Schleid. var. *oxyacanthum* (Cham.) Schleid. = **Ceratophyllum demersum** L.
Referencias: Les, D. H., 1986b.

CHENOPODIACEAE

Autores: Múlgura, M. E. & Marticorena, A.

14 géneros, 121 especies, 59 especies endémicas, 35 especies introducidas.

Allenrolfea Kuntze

Número de especies: 2 endémicas

Allenrolfea patagonica (Moq.) Kuntze
Sin.: *Halopeplis patagonica* (Moq.) Ung.-Sternb., *Halostachys patagonica* Moq., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Benth. & Hook., nom. superfl., *Spirostachys patagonica* (Moq.) Griseb.
Referencias: Soriano, A., 1947b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1569* (CORD), *Burkart, A. 12923* (SI)].

Allenrolfea vaginata (Griseb.) Kuntze
Sin.: *Spirostachys vaginata* Griseb.
Referencias: Giusti, L., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soriano, A., 1947b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 802* (CORD), *Bartlett, H. H. 20576* (SI)].

Ambrina ambrosioides (L.) Spach = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Simón, L. E., 1996.

Ambrina andicola Phil. = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Ambrina anthelmintica Spach = **Chenopodium ambrosioides** L.

Ambrina carinata (R. Br.) Moq. = **Chenopodium carinatum** R. Br.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Ambrina chilensis (Schrad.) Spach = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Simón, L. E., 1996.

Ambrina denudata Phil. = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Ambrina incisa Moq. = **Chenopodium ambrosioides** L.

Ambrina obovata Moq. = **Chenopodium retusum** (Moq.) Moq.

Ambrina parvula Phil. = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Ambrina pinnatisecta Spach = **Chenopodium multifidum** L.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Ambrina retusa Moq. = **Chenopodium retusum** (Moq.) Moq.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Ambrina tenuis Moq. = **Chenopodium multifidum** L.

Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Atriplex L.

Número de especies: 50, 34 endémicas, 9 introducidas

Atriplex ameghinoi Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. 10* (SI)].

Atriplex andina R.E. Fr. = **Atriplex myriophylla** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex angustifolia Phil. = **Atriplex repanda** Phil.
Referencias: Rosas, M., 1989.

Atriplex arenicola Hauman = **Atriplex rosea** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1982.

Atriplex arenicola Hauman var. *albescens* Hauman = **Atriplex rosea** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1982.

Atriplex argentina Speg.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1181* (SI)].

Atriplex atacamensis Phil.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Endémica. 200–3000 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

Atriplex axillaris Phil. = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex boecheri Aellen
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. s.n.* (SI)].

Atriplex braunii A. Soriano
Referencias: Giusti, L., 1984, 1997; Múlgura, M. E., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1450* (SI)].

Atriplex ceratophylla Kuntze = **Atriplex lampa** (Moq.) D. Dietr.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a, 1984.

Atriplex chapinii I.M. Johnst.
Referencias: Rosas, M., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Chapin 1106* (CONC)].

Atriplex chenopodioides Aellen, hom. illeg. = **Atriplex oreophila** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex chilensis Colla
Referencias: Rosas, M., 1989; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(V, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 3686* (SI), *Rosas, M. R. 94* (CONC)].

Atriplex chizae Rosas
Referencias: Rosas, M., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Belmonte 89001* (CONC)].

[Atriplex cinerea Poir.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Atriplex clivicola I.M. Johnst.
Sin.: *Atriplex clivicola* I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst., *Obione clivicola* (I.M. Johnst.) Ulbr.
Referencias: Rosas, M., 1989.
Arbusto. Endémica. 200–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4642* (CONC)].

Atriplex clivicola I.M. Johnst. var. *lopholepis* I.M. Johnst. = **Atriplex clivicola** I.M. Johnst.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex coquimbana Phil.
Referencias: Rosas, M., 1989.
Arbusto. Endémica. 300–500 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pisano, E. 1053* (CONC)].

Atriplex cordobensis Gand. & Stuck. subsp. **cordobensis**
Sin.: *Atriplex hjertingii* Aellen
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 200–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4657* (SI)].

Atriplex cordobensis Gand. & Stuck. subsp. **grandibracteata** Múlgura
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30770* (SI)].

Atriplex costellata Phil.
Referencias: Rosas, M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

Atriplex crenatifolia Chodat & Wilczek
Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *macrophylla* Speg.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, MEN, NEU, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4829* (SI)].

[Atriplex cristata Humb. & Bonpl. ex Willd.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.
Notas: Nombre dudoso.

Atriplex cristata Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *depauperata* Kuntze = **Atriplex myriophylla** Phil.

Atriplex cristata Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *pulvinata* Kuntze = **Atriplex myriophylla** Phil.

Atriplex densifolia Phil. = **Atriplex leuca** Phil.
Referencias: Rosas, M., 1989.

Atriplex deserticola Phil.
Sin.: *Atriplex podocarpa* Phil., *Atriplex trasandina* I.M. Johnst.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Múlgura, M. E., 1981a; Rosas, M., 1989.
Subarbusto. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 236* (SI), *Cialdella, A. M. 400* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

Atriplex eximia A. Soriano
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 904* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 16580* (SI)].

Atriplex flavescens Speg., hom. illeg. = **Atriplex spegazzinii** A. Soriano ex Múlgura
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex foliolosum Phil. = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **foliolosa** (Phil.) Rosas
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex frigida Speg.
Referencias: Giusti, L., 1984, 1997; Múlgura, M. E., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 597* (SI)].

[Atriplex gardneri (Moq.) D. Dietr.]
Sin.: *Obione gardneri* Moq.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Atriplex glaucescens Phil.
Sin.: *Atriplex polyphylla* Phil.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Endémica. 1300–3700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3519* (CONC)].

Atriplex grisebachii Kurtz ex Gand. = **Atriplex montevidense** Spreng.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

[Atriplex hastata L.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Atriplex hastata auct. non L. = **Atriplex prostrata** Boucher ex DC.
Referencias: Múlgura, M. E., 1994a.

Atriplex hastata L. var. *salinum* Green & Godr. = **Atriplex prostrata** Boucher ex DC.
Referencias: Múlgura, M. E., 1994a.

Atriplex herzogii Standl. = **Atriplex myriophylla** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex heterosperma Bunge
Referencias: Múlgura, M. E., 1982.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 16143* (SI)].

Atriplex hjertingii Aellen = **Atriplex cordobensis** Gand. & Stuck. subsp. **cordobensis**
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex hortensis L.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1982.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN); CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20394* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 26745* (CONC)].

Atriplex humilis Phil., hom. illeg. = **Atriplex oreophila** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex hypsophila Phil. = **Atriplex oreophila** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex hystrix Phil. = **Atriplex mucronata** Phil.
Referencias: Rosas, M., 1989.

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. **foliolosa** (Phil.) Rosas
Sin.: *Atriplex foliolosum* Phil., *Atriplex sanambrosiana* Sparre
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Simpson s.n.* (SGO)].

Atriplex imbricata (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**
Sin.: *Atriplex axillaris* Phil., *Atriplex microphylla* Phil., *Atriplex salaris* Phil., *Obione axillaris* (Phil.) Ulbr., *Obione imbricata* Moq.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a; Rosas, M. R., 1989.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 3500–3800 m.
Países: ARG(CAT, SAL); CHL(I, II, III).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31793* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 94081* (CONC)].

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr.
Sin.: *Atriplex ceratophylla* Kuntze, *Atriplex lampa* (Moq.) D. Dietr. f. *latifolia* Hauman, nom. nud., *Obione lampa* Moq.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1183* (SI)].

Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. f. *latifolia* Hauman, nom. nud. = **Atriplex lampa** (Moq.) D. Dietr.

[Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr. var. angustifolia Ball]
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.
Notas: Nombre dudoso.

Atriplex leuca Phil.
Sin.: *Atriplex densifolia* Phil.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4865* (CONC)].

Atriplex lilloi Hauman = **Atriplex myriophylla** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex lithophila A. Soriano
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 9543* (SI)].

[Atriplex lorentzii Kuntze]
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.
Notas: Nombre dudoso.

Atriplex macrostyla Speg. = **Atriplex vulgatissima** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex madariagae Phil.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Endémica. 200–2700 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 348* (CONC)].

Atriplex mendozensis Speg.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 7* (SI)].

Atriplex microphylla Phil. = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex montevidense Spreng.
Sin.: *Atriplex grisebachii* Kurtz ex Gand., *Atriplex montevidense* Spreng. f. *conferta* Hicken, *Obione montevidensis* (Spreng.) DC.
Referencias: Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, RNE, SDE, SFE); PRY(CEN, PHA); URY(MON, RNO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 16030* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 34564* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Atriplex montevidense Spreng. f. *conferta* Hicken = **Atriplex montevidense** Spreng.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex mucronata Phil.
Sin.: *Atriplex hystrix* Phil., *Obione hystrix* (Phil.) Ulbr., *Obione mucronata* (Phil.) Ulbr.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

Atriplex myriophylla Phil.
Sin.: *Atriplex andina* R.E. Fr., *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *depauperata* Kuntze, *Atriplex cristata* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *pulvinata* Kuntze, *Atriplex herzogii* Standl., *Atriplex lilloi* Hauman, *Atriplex pusilla* (Wedd.) Phil., nom. illeg., *Atriplex serpyllifollium* Herzog, *Obione myriophylla* (Phil.) Ulbr., *Obione pusilla* Wedd., hom. illeg.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1984; Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 404* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 4155* (CONC)].

[Atriplex nitens Schkuhr]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Atriplex nitrophiloides A. Soriano ex Múlgura
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1984.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–3700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 605* (SI)].

Atriplex nummularia Lindl.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(II, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 9522* (CONC)].

Atriplex oreophila Phil.
Sin.: *Atriplex chenopodioides* Aellen, hom. illeg., *Atriplex humilis* Phil., hom. illeg., *Atriplex hypsophila* Phil.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1984; Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(I, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 3225* (SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO, SI)].

Atriplex pamparum Griseb.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Giusti, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8487* (LP, SI)]; PRY[*Mereles, F. 5838* (FCQ, MO)].

Atriplex patagonica (Moq.) D. Dietr.
Sin.: *Obione patagonica* Moq.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15971* (SI)].

Atriplex patula L.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1982; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SFE); CHL(IX, X, XII); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 3516* (SI)]; CHL[*Villagrán, C. 6555* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 10872* (MVFA)].

Atriplex patula L. var. *hastata* auct. non (L.) A. Gray = **Atriplex prostrata** Boucher ex DC.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex patula L. subsp. *hastata* H.M. Hall & Clem. = **Atriplex prostrata** Boucher ex DC.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex peruviana Moq.
Sin.: *Chenopodium cinereum* Moq.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1900 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 27* (CONC)].

Atriplex philippii R.E. Fr.
Sin.: *Atriplex prostratum* Phil., hom. illeg.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 100–1000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 351* (SI)].

Atriplex platensis Speg. = **Atriplex prostrata** Boucher ex DC.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Atriplex podocarpa Phil. = **Atriplex deserticola** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a; Rosas, M. R., 1989.

Atriplex polyphylla Phil. = **Atriplex glaucescens** Phil.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Sin.: *Atriplex hastata* auct. non L., *Atriplex hastata* L. var. *salinum* Green & Godr., *Atriplex patula* L. subsp. *hastata* H.M. Hall & Clem., *Atriplex patula* L. var. *hastata* auct. non (L.) A. Gray, *Atriplex platensis* Speg., *Atriplex triangularis* Willd.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Múlgura, M. E., 1994a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rosas, M. R., 1989; Turland, N., 1996.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SFE, SJU); CHL(IV, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1184* (SI)]; CHL[*Villagrán, C. 7514* (CONC)].

Atriplex prostratum Phil., hom. illeg. = **Atriplex philippii** R.E. Fr.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex pusilla (Wedd.) Phil., nom. illeg. = **Atriplex myriophylla** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1994a.

Atriplex quixadensis Del Vitto, Múlgura & Petenatti
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Del Vitto, L. A., Múlgura de Romero, M. E. & Petenatti, E. M., 1993; Giusti, L., 1997.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Del Vitto, L. A. 5821* (SI, UNSL)].

Atriplex reichii Volkens ex Dusén = **Atriplex vulgatissima** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex repanda Phil.
Sin.: *Atriplex angustifolia* Phil.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

[Atriplex retusa J. Remy]
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.
Notas: Nombre dudoso.

Atriplex rosea L.
Sin.: *Atriplex arenicola* Hauman, *Atriplex arenicola* Hauman var. *albescens* Hauman, *Atriplex spatiosa* A. Nelson
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1982; Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Anual. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, SLU); CHL(IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1945* (CORD)]; CHL[*Jiles, C. 1480* (CONC)].

Atriplex sagittifolia Speg.
Sin.: *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *heterophylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *microphylla* Speg., *Atriplex sagittifolia* Speg. var. *typica* Speg., nom. inval.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15926* (SI)].

Atriplex sagittifolia Speg. var. *heterophylla* Speg. = **Atriplex sagittifolia** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex sagittifolia Speg. var. *macrophylla* Speg. = **Atriplex crenatifolia** Chodat & Wilczek
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex sagittifolia Speg. var. *microphylla* Speg. = **Atriplex sagittifolia** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex sagittifolia Speg. var. *typica* Speg., nom. inval. = **Atriplex sagittifolia** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Atriplex salaris Phil. = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex sanambrosiana Sparre = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **foliolosa** (Phil.) Rosas
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex semibaccata R. Br.
Sin.: *Atriplex semibaccata* R. Br. var. *melanocarpa* Aellen, *Atriplex stuckertii* Gand.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1982.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); CHL(II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 401* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3630* (CONC)].

Atriplex semibaccata R. Br. var. *melanocarpa* Aellen = **Atriplex semibaccata** R. Br.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex serpyllifollium Herzog = **Atriplex myriophylla** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Atriplex sorianoi Múlgura
Referencias: Giusti, L., 1997.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29542* (SI)].

Atriplex spatiosa A. Nelson = **Atriplex rosea** L.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Atriplex spegazzinii A. Soriano ex Múlgura
Sin.: *Atriplex flavescens* Speg., hom. illeg.
Referencias: Giusti, L., 1997.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1182* (SI)].

Atriplex stuckertii Gand. = **Atriplex semibaccata** R. Br.
Referencias: Múlgura, M. E., 1982.

Atriplex suberecta I. Verd.
Referencias: Múlgura, M. E., 1982; Rosas, M. R., 1989.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20448* (SI)]; CHL[*Rosas, M. R. 159* (CONC)].

Atriplex taltalensis I.M. Johnst.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, K. 4426* (SI)].

Atriplex tatarica L.
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1982.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, RNE, SCR); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 3799* (SI)]; CHL[*Navas Bustamante, L. E. 683* (CONC)].

Atriplex trasandina I.M. Johnst. = **Atriplex deserticola** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Atriplex triangularis Willd. = **Atriplex prostrata** Boucher ex DC.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

[Atriplex trigonophylla Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Atriplex undulata (Moq.) D. Dietr.
Sin.: *Obione undulata* Moq.
Referencias: Del Pero Martínez, M. A., Martínez, A. & Múlgura, M. E., 2002; Múlgura, M. E., 1981a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1116* (SI)].

Atriplex vallenarensis Rosas
Referencias: Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 372* (CONC)].

[Atriplex veris Hassl.]
Referencias: Hassler, E., 1909a.
Notas: Nombre dudoso.

Atriplex vulgatissima Speg.
Sin.: *Atriplex macrostyla* Speg., *Atriplex reichii* Volkens ex Dusén
Referencias: Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1981a; Rosas, M. R., 1989.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 4521* (CONC)].

Bassia All.

Número de especies: 2 introducidas

Bassia hyssopifolia (Pall.) Kuntze
Sin.: *Echinopsilon hyssopifolium* (Pall.) Moq., *Salsola hyssopifolia* Pall.
Referencias: Giusti, L., 1967, 1984, 1997; Scott, A. J., 1978.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15899* (SI)].

Bassia scoparia (L.) A.J. Scott
Sin.: *Chenopodium scoparium* L., *Kochia parodii* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *contracta* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *densa* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *elongata* Aellen, *Kochia parodii* Aellen var. *glabrescens* Aellen, *Kochia scoparia* (L.) Schrad., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *densa* (Aellen) A. Soriano, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *densiflora* Moq., *Kochia scoparia* (L.) Schrad. f. *remotiflora* Beck, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *pubescens* Fenzl, *Kochia scoparia* (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Graebn.
Referencias: Scott, A. J., 1978; Soriano, A., 1945.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SCR, SFE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 22* (CORD), *Nicora, E. G. 4144* (SI)].

Beta L.

Número de especies: 1 introducida

Beta maritima L. = **Beta vulgaris** L. subsp. **maritima** (L.) Arcang.
Referencias: Ball, P. W. & Akeroyd, J. R., 1993.

Beta vulgaris L. var. *cicla* (L.) W. Koch = **Beta vulgaris** L. subsp. **vulgaris**

Beta vulgaris L. var. *perennis* L. = **Beta vulgaris** L. subsp. **maritima** (L.) Arcang.
Referencias: Ball, P. W. & Akeroyd, J. R., 1993.

Beta vulgaris L. subsp. *cicla* (L.) W. Koch = **Beta vulgaris** L. subsp. **vulgaris**

Beta vulgaris L. subsp. **maritima** (L.) Arcang.
Sin.: *Beta maritima* L., *Beta vulgaris* L. var. *perennis* L.
Referencias: Ball, P. W. & Akeroyd, J. R., 1993; Giusti, L., 1967, 1984; Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, RNE); CHL(III, IJF, RME); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1684* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 48777* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 7847* (MVFA)].

Beta vulgaris L. subsp. **vulgaris**
Sin.: *Beta vulgaris* L. subsp. *cicla* (L.) W. Koch, *Beta vulgaris* L. var. *cicla* (L.) W. Koch
Referencias: Ball, P. W. & Akeroyd, J. R., 1993; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–2700 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE, SFE, TUC); CHL(I).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3068* (SI)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Blitum antarcticum Hook. f. = **Chenopodium antarcticum** (Hook. f.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Giusti, L., 1984.

Blitum carinatum (R. Br.) Moq. = **Chenopodium carinatum** R. Br.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Blitum chenopodioides Nutt., hom. illeg. = **Monolepis nuttalliana** (Schult.) Green
Referencias: Giusti, L., 1997.

Blitum nuttallianum Schult. = **Monolepis nuttalliana** (Schult.) Green
Referencias: Giusti, L., 1997.

Blitum rubrum (L.) C.A. Mey. var. *crassicaule* Moq. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **macrospermum**
Referencias: Giusti, L., 1997.

[Blitum rubrum (L.) C.A. Mey. var. hypoleuca Speg.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Blitum rubrum (L.) C.A. Mey. var. *macrosperma* (Hook. f.) Speg. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **macrospermum**
Referencias: Giusti, L., 1997.

Blitum rubrum (L.) C.A. Mey. var. *vulgaris* auct. non Moq. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. f. **subviride** Thell.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943.

Blitum salsum Phil. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **salsum** (Phil.) A. Troncoso
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium L.

Número de especies: 43, 14 endémicas, 14 introducidas

Chenopodium album L.
Sin.: *Chenopodium album* L. var. *polymorphum* Aellen
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giusti, L., 1967, 1984.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); PRY(PHA); URY(COL, MON, PAY, RNO, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1456* (SI)]; CHL[*Benove, A. 114* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 377* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6761* (MVFA)].

Chenopodium album L. var. *andina* J. Remy = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Giusti, L., 1997; Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Chenopodium album L. var. *leptophyllum* Nutt. ex Moq. = **Chenopodium leptophyllum** (Nutt. ex Moq.) S.Watson
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943.

Chenopodium album L. var. *polymorphum* Aellen = **Chenopodium album** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium altissimum L. = **Suaeda altissima** (L.) Pall.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium amaranticolor Coste & Reyn. = **Chenopodium giganteum** D. Don
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium ambiguum R. Br. = **Chenopodium glaucum** L.
Referencias: Zizka, G., 1991.

Chenopodium ambrosioides L.
Sin.: *Ambrina ambrosioides* (L.) Spach, *Ambrina anthelmintica* Spach, *Ambrina incisa* Moq., *Ambrina parvula* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *dentatum* (Fenzl) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *genuinum* (Willk.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *integrifolium* (Fenzl) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *pinnatifidum* (Willk.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *rotundantum* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *euambrosioides* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *dentata* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *genuinum* Willk., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *integrifolium* Fenzl, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *pinnatifidum* Willk., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *suffruticosum* (Willd.) Asch. & Graebn., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *typica* Speg., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *typicum* (Speg.) Aellen, *Chenopodium suffruticosum* Willd., *Chenopodium suffruticosum* Willd. subsp. *remotum* Vorosh., *Teloxys ambrosioides* (L.) W.A. Weber
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Giusti, L., 1997; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 8867* (SI)]; BRA[*Bueno, O. L. 2375* (CTES)]; CHL[*Burkart, A. 9339* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 39782* (MO, SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 55a* (SI)].

Chenopodium ambrosioides L. f. *angustatum* (Moq.) Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. f. *angustifolium* (Moq.) Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.

Chenopodium ambrosioides L. f. *dentatum* (Fenzl) Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. f. *denudatum* (Phil.) Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. f. *genuinum* (Willk.) Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Aellen, P., 1973.

Chenopodium ambrosioides L. f. *integrifolium* (Fenzl) Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. f. *normale* Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943.

Chenopodium ambrosioides L. f. *pinnatifidum* (Willk.) Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. f. *rotundantum* Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. var. *andicola* (Phil.) Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. var. *anthelminticum* (L.) Aellen = **Chenopodium anthelminticum** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb. = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. var. *dentata* Fenzl = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. var. *euchilense* Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.

Chenopodium ambrosioides L. var. *genuinum* Willk. = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. var. *graveolens* (Willd.) Speg. = **Chenopodium graveolens** Willd. var. **graveolens**
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Chenopodium ambrosioides L. var. *integrifolium* Fenzl = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. var. *oblanceolata* Speg. = **Chenopodium oblanceolatum** (Speg.) Giusti
Referencias: Giusti, L., 1984.

Chenopodium ambrosioides L. var. *obovata* (Moq.) Speg. = **Chenopodium retusum** (Moq.) Moq.

Chenopodium ambrosioides L. var. *pinnatifidum* Willk. = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. var. *suffruticosum* (Willd.) Asch. & Graebn. = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Wilson, P. G., 1984.

Chenopodium ambrosioides L. var. *typica* Speg. = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. var. *typicum* (Speg.) Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.

Chenopodium ambrosioides L. subsp. *burkartii* Aellen = **Chenopodium burkartii** (Aellen) Vorosch.
Referencias: Giusti, L., 1987.

Chenopodium ambrosioides L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium ambrosioides L. subsp. *euambrosioides* Aellen = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Giusti, L., 1984.

Chenopodium ambrosioides L. subsp. *retusum* (Juss. ex Moq.) Aellen = **Chenopodium retusum** (Moq.) Moq.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Chenopodium ambrosioides L. subsp. *venturii* Aellen = **Chenopodium venturii** (Aellen) Aellen ex Vorosh.
Referencias: Giusti, L., 1997.

[Chenopodium ameghinoi Speg.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Chenopodium antarcticum (Hook. f.) Speg., comb. superfl. = **Chenopodium antarcticum** (Hook. f.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium antarcticum (Hook. f.) Benth. & Hook. f.
Sin.: *Blitum antarcticum* Hook. f., *Chenopodium antarcticum* (Hook. f.) Speg., comb. superfl., *Chenopodium botrys* auct. non L.
Referencias: Giusti, L., 1984, 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Marelli, C. A. 73* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 3624* (CONC)].

[Chenopodium anthelminticum L.]
Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. var. *anthelminticum* (L.) Aellen
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Chenopodium anthelminticum L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb. = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium australe R. Br. = **Lerchea maritima** (L.) Kuntze var. **australis** (R. Br.) Kuntze

Chenopodium bolivianum Murr, p.p. = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium bonariense (Hook. f.) Hauman & Irigoyen, comb. superfl. = **Chenopodium haumanii** Ulbr.
Referencias: Giusti, L., 1987.

Chenopodium bonariense Ten. = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Giusti, L., 1967.

[Chenopodium bonus-henricus L.]
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.
Notas: Especie excluida para el área del proyecto.

Chenopodium borbasii Murr
Sin.: *Chenopodium zobelii* A. Ludw. & Aellen, nom. illeg.
Referencias: Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SDE, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morello, J. 4032* (SI)].

Chenopodium botrys auct. non L. = **Chenopodium antarcticum** (Hook. f.) Benth. & Hook. f.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium burkartii (Aellen) Vorosch.
Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *burkartii* Aellen, *Chenopodium dunosum* L. Simón
Referencias: Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1987, 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE); PRY(ITA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 787* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 46172* (MO, SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Chenopodium canihua O.F. Cook = **Chenopodium quinoa** Willd. var. **quinoa**

Chenopodium carinatum R. Br.
Sin.: *Ambrina carinata* (R. Br.) Moq., *Blitum carinatum* (R. Br.) Moq., *Salsola carinata* (R. Br.) Spreng.
Referencias: Giusti, L., 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LRI, MIS, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 1108* (CORD)].

Chenopodium carnosulum Moq.
Sin.: *Chenopodium fuegianum* Speg., *Chenopodium vulvaria* auct. non L.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Giusti, L., 1984, 1997; Moore, D. M., 1974; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, JUJ, SAL, SCR, TDF, TUC); CHL(V, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33165* (SI)]; CHL[*Hicken 127* (SI)].

Chenopodium carnosulum Moq. var. *patagonicum* (Phil.) Wahl = **Chenopodium philippianum** Aellen

Chenopodium caudatum Jacq. = **Amaranthus viridis** L.

Chenopodium chilense Schrad.
Sin.: *Ambrina andicola* Phil., *Ambrina chilensis* (Schrad.) Spach, *Ambrina denudata* Phil., *Chenopodium ambrosioides* L. f. *angustatum* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *angustifolium* (Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *denudatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. f. *normale* Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *chilense* (Schrad.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *andicola* (Phil.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium ambrosioides* L. var. *euchilense* Aellen, *Chenopodium anthelminticum* L. var. *chilense* (Schrad.) Griseb., *Chenopodium chilense* Schrad. var. *angustifolium* Moq., *Chenopodium sooianum* Aellen, *Chenopodium vagans* Standl.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Giusti, L., 1967, 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU); CHL(II, IV, V, VI, VIII, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1340* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 155* (SI)].

Chenopodium chilense Schrad. var. *angustifolium* Moq. = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium cinereum Moq. = **Atriplex peruviana** Moq.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Chenopodium citriodorum Steud. = **Chenopodium multifidum** L.

Chenopodium cordobense Aellen
Referencias: Giusti, L., 1967, 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, NEU, SDE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9955* (SI)].

Chenopodium crusoeanum Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 227* (C)].

Chenopodium dessicatum A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl
Sin.: *Chenopodium leptophyllum* (Nutt. ex Moq.) S.Watson var. *leptophylloides* (Murr) Thell. & Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth var. *leptophylloides* Murr, *Chenopodium pratericola* Rydb., *Chenopodium pratericola* Rydb. subsp. *eupratericola* Allem, nom. inval., *Chenopodium pratericola* Rydb. var. *leptophylloides* (Murr) Aellen
Referencias: Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 1203b* (SI)].

Chenopodium dunosum L. Simón = **Chenopodium burkartii** (Aellen) Vorosch.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium exocarpum Griseb. = **Holmbergia tweedii** (Moq.) Speg.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Chenopodium farinosum (S. Watson) Standl. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **salsum** (Phil.) A. Troncoso
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium ficifolium Sm.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Matthei, O. R., 1995b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–2700 m.
Países: CHL(V, X, XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2911* (CONC)].

Chenopodium ficifolium auct. non Sm. = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Chenopodium foetidum auct. non Schrad. = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

Chenopodium foetidum Schrad. var. *pumilum* R.E. Fr. = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

Chenopodium fremonti auct. non S. Watson = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium frigidum Phil.
Sin.: *Chenopodium hypsophilum* Hauman
Referencias: Aellen, P., 1929; Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Giusti, L., 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Endémica. 3200–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(I, II, III, IV, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2422* (SI)]; CHL[*Muñoz-Schick, M. 3859* (SGO)].

Chenopodium fruticosum L. = **Suaeda fruticosa** (L.) Forssk.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium fuegianum Speg. = **Chenopodium carnosulum** Moq.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium giganteum D. Don
Sin.: *Chenopodium amaranticolor* Coste & Reyn.
Referencias: Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 12* (CORD)].

Chenopodium glaucum L.
Sin.: *Chenopodium ambiguum* R. Br., *Chenopodium glaucum* L. f. *paschale* Fuentes, *Chenopodium glaucum* L. subsp. *ambiguum* (R. Br.) Murr & Thell.
Referencias: Moore, D. M., 1983.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, SDE, TDF); CHL(XI, XII, IDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 121* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 4317* (CONC)].

Chenopodium glaucum L. f. *paschale* Fuentes = **Chenopodium glaucum** L.
Referencias: Zizka, G., 1991.

Chenopodium glaucum L. var. *divaricatum* auct. non Moq. = **Chenopodium glaucum** L. var. **microphyllum** Hook. f.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

[Chenopodium glaucum L. var. microphyllum Hook. f.]
Sin.: *Chenopodium glaucum* L. var. *divaricatum* auct. non Moq.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Chenopodium glaucum L. subsp. *ambiguum* (R. Br.) Murr & Thell. = **Chenopodium glaucum** L.
Referencias: Zizka, G., 1991.

Chenopodium glaucum L. subsp. *parodii* (Aellen) Aellen = **Chenopodium parodii** Aellen
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium graveolens Willd. f. *pumilum* (R.E. Fr.) Aellen = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

Chenopodium graveolens Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

[Chenopodium graveolens Willd. var. graveolens]
Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. var. *graveolens* (Willd.) Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Chenopodium halophilum Phil.
Referencias: Troncoso, A. A., 1974.
Hierba. Anual. Nativa. 0–100 m.
Países: CHL(X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Fonk, F. s.n.* (SGO)].

Chenopodium halophilum auct. non Phil. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **salsum** (Phil.) A. Troncoso
Sin.: *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium macrospermum* Hook. f. var. *halophilum* (Phil.) Standl.

Chenopodium hastatum Phil. = **Chenopodium petiolare** Kunth

Chenopodium haumanii Ulbr.
Sin.: *Chenopodium bonariense* (Hook. f.) Hauman & Irigoyen, comb. superfl., *Roubieva bonariensi* Hook. f.
Referencias: Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1987, 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22960* (SI)]; URY[*Bayce, D. s.n.* (MVFA)].

Chenopodium hircinum Schrad. f. *angustifolium* A. Ludw. = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium hircinum Schrad. f. *deminutum* A. Ludw. = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium hircinum Schrad. f. *microphyllum* Thell. ex Parodi = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium hircinum Schrad. f. *multidentatum* A. Ludw. = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium hircinum Schrad. var. *andinum* Aellen = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**

Chenopodium hircinum Schrad. var. *typicum* A. Ludw. & Aellen, nom. inval. = **Chenopodium hircinum** Schrad. subsp. **hircinum**
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium hircinum Schrad. subsp. **catamarcensis** Aellen
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 500–3500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4702* (LIL)].

Chenopodium hircinum Schrad. subsp. **hircinum**
Sin.: *Chenopodium bonariense* Ten., *Chenopodium ficifolium* auct. non Sm., *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *angustifolium* A. Ludw., *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *deminutum* A. Ludw., *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *microphyllum* Thell. ex Parodi, *Chenopodium hircinum* Schrad. f. *multidentatum* A. Ludw., *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *andinum* Aellen, *Chenopodium hircinum* Schrad. var. *typicum* A. Ludw. & Aellen, nom. inval.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, X, RME); PRY(COA); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 1203a* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 38585* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 19726* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 58* (SI)].

Chenopodium hypsophilum Hauman = **Chenopodium frigidum** Phil.
Referencias: Aellen, P., 1929.

Chenopodium incisum Poir. var. *bangii* Murr = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

[Chenopodium leptophyllum (Nutt. ex Moq.) S.Watson]
Sin.: *Chenopodium album* L. var. *leptophyllum* Nutt. ex Moq.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chenopodium leptophyllum (Nutt. ex Moq.) S.Watson var. *leptophylloides* (Murr) Thell. & Aellen = **Chenopodium dessicatum** A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

[Chenopodium macrospermum Hook. f. f. subviride Thell.]
Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A. Mey. var. *vulgaris* auct. non Moq., *Chenopodium rubrum* L. var. *vulgaris* auct. non Wallr.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Chenopodium macrospermum Hook. f. var. *halophilum* (Phil.) Standl. = **Chenopodium halophilum** Phil.

Chenopodium macrospermum Hook. f. subsp. *crassicaule* (Moq.) Aellen = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **macrospermum**
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium macrospermum Hook. f. subsp. *halophilum* (Phil.) Aellen = **Chenopodium halophilum** Phil.

Chenopodium macrospermum Hook. f. subsp. **macrospermum**
Sin.: *Blitum rubrum* (L.) C.A. Mey. var. *crassicaule* Moq., *Blitum rubrum* (L.) C.A. Mey. var. *macrosperma* (Hook. f.) Speg., *Chenopodium macrospermum* Hook. f. subsp. *crassicaule* (Moq.) Aellen, *Chenopodium rubrum* auct. non L.
Referencias: Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1997; Moore, D. M., 1983.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(II, V, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fischer, W. 176* (SI)]; CHL[*Benove, A. 108* (SI)].

Chenopodium macrospermum Hook. f. subsp. **salsum** (Phil.) A. Troncoso
Sin.: *Blitum salsum* Phil., *Chenopodium farinosum* (S. Watson) Standl., *Chenopodium halophilum* auct. non Phil., *Chenopodium murale* L. var. *farinosum* S.Watson
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1994a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Troncoso, A. A., 1974.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SFE, SJU); CHL(II, VI, VII, RME); PRY(PHA); URY(CAS, MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 3790* (SI)]; CHL[*Sanjurgo, L. s.n.* (SGO)]; PRY[*Spichiger, R. 2143* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 1348* (MVFA)].

Chenopodium mandonii (S. Watson) Aellen
Sin.: *Chenopodium foetidum* auct. non Schrad., *Chenopodium foetidum* Schrad. var. *pumilum* R.E. Fr., *Chenopodium graveolens* Willd. f. *pumilum* (R.E. Fr.) Aellen, *Chenopodium graveolens* Willd. var. *bangii* (Murr) Aellen, *Chenopodium incisum* Poir. var. *bangii* Murr, *Chenopodium rigidum* Lingelsh., *Teloxys mandonii* S.Watson
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Giusti, L., 1997; Múlgura, M. E., 1994a; Planchuelo, A. M., 1975; Simón, L. E., 1996.

Hierba. Anual. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4370* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 38585* (CONC)].

Chenopodium maritimum L. = **Suaeda maritima** (L.) Dumort.
Referencias: Soriano, A., 1942.

Chenopodium microcarpum (Phil.) A. Troncoso
Sin.: *Chenopodium multifidum* L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche, *Chenopodium zoellneri* Aellen, *Roubieva microcarpa* Phil.
Referencias: Troncoso, A. A., 1977.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Chenopodium multifidum L.
Sin.: *Ambrina pinnatisecta* Spach, *Ambrina tenuis* Moq., *Chenopodium citriodorum* Steud., *Chenopodium multifidum* L. f. *intermedium* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *latisectum* Bontea & Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *spatulathum* Aellen, *Chenopodium multifidum* L. f. *typicum* Aellen, nom. inval., *Herniaria payco* Molina, *Roubieva multifida* (L.) Moq., *Teloxys multifida* (L.) W.A. Weber
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1967, 1997.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, RNE, SFE, SJU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(PAY, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28168* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 40a* (SI)]; URY[*Bonifacino, M. 1133* (MVFA)].

Chenopodium multifidum L. f. *intermedium* Aellen = **Chenopodium multifidum** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium multifidum L. f. *latisectum* Bontea & Aellen = **Chenopodium multifidum** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium multifidum L. f. *spatulathum* Aellen = **Chenopodium multifidum** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium multifidum L. f. *typicum* Aellen, nom. inval. = **Chenopodium multifidum** L.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium multifidum L. var. *microcarpum* (Phil.) Reiche = **Chenopodium microcarpum** (Phil.) A. Troncoso
Referencias: Troncoso, A. A., 1977.

Chenopodium murale L.
Referencias: Giusti, L., 1967, 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, MEN, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); URY(MAL, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 11* (CORD), *Kiesling, R. 4922* (SI)]; CHL[*Looser, G. 921* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1899* (MVFA)].

Chenopodium murale L. var. *farinosum* S.Watson = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **salsum** (Phil.) A. Troncoso

Chenopodium nesodendron Skottsb.
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921.
Arbusto. Endémica. 300–500 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landero, A. 8471* (CONC)].

Chenopodium nuttalliae Saff. = **Chenopodium quinoa** Willd. var. **quinoa**

Chenopodium oblanceolatum (Speg.) Giusti
Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. var. *oblanceolata* Speg.
Referencias: Giusti, L., 1984, 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Valla, J. J. s.n.* (BAA)].

Chenopodium obovatum (Moq.) Moq. = **Chenopodium retusum** (Moq.) Moq.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Chenopodium obscurum Aellen
Referencias: Aellen, P., 1959; Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 18416* (SI)].

Chenopodium pallidicaule Aellen
Referencias: Giusti, L., 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Nativa. 4000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9882* (SI)].

Chenopodium paniculatum Hook. = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium paniculatum Hook. var. *incanum* Murr = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Brako, L., 1993d.

Chenopodium papulosum Moq.
Sin.: *Chenopodium papulosum* Moq. var. *hastatum* Kurtz, *Chenopodium rafaelense* Chodat & Wilczek
Referencias: Aellen, P., 1929; Giusti, L., 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, MEN, SJU, SLU); CHL(III, IV, V, X).

Ejemplares de referencia: ARG[*Bodenbender, W. s.n.* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 10049* (CONC)].

Chenopodium papulosum Moq. var. *hastatum* Kurtz = **Chenopodium papulosum** Moq.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium parodii Aellen
Sin.: *Chenopodium glaucum* L. subsp. *parodii* (Aellen) Aellen
Referencias: Aellen, P., 1929; Giusti, L., 1984, 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2436* (BAB)].

Chenopodium patagonicum Phil. = **Chenopodium philippianum** Aellen

Chenopodium petiolare Kunth
Sin.: *Chenopodium album* L. var. *andina* J. Remy, *Chenopodium bolivianum* Murr, p.p., *Chenopodium fremonti* auct. non S. Watson, *Chenopodium hastatum* Phil., *Chenopodium paniculatum* Hook., *Chenopodium paniculatum* Hook. var. *incanum* Murr, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *hastatum* (Phil.) Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *incanum* (Murr) Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *scutatum* Aellen, *Chenopodium petiolare* Kunth f. *trilobium* Aellen, *Chenopodium sparsiflorum* Phil.
Referencias: Giusti, L., 1997; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ); CHL(I, II, III, IV, V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 32* (LIL)]; CHL[*Matthei, O. R. 261* (CONC)].

Chenopodium petiolare Kunth f. *hastatum* (Phil.) Aellen = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Brako, L., 1993d.

Chenopodium petiolare Kunth f. *incanum* (Murr) Aellen = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Brako, L., 1993d.

Chenopodium petiolare Kunth f. *scutatum* Aellen = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Brako, L., 1993d.

Chenopodium petiolare Kunth f. *trilobium* Aellen = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Brako, L., 1993d.

Chenopodium petiolare Kunth var. *leptophylloides* Murr = **Chenopodium dessicatum** A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium philippianum Aellen
Sin.: *Chenopodium carnosulum* Moq. var. *patagonicum* (Phil.) Wahl, *Chenopodium patagonicum* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Giusti, L., 1984, 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11309* (BAB)]; CHL[*Ricardi, M. 3242* (CONC)].

Chenopodium pilcomayense Aellen
Referencias: Cuadrado, G. A., 1993; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–5000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Flossdorf, A. 10* (SI)]; PRY[*Spichiger, R. 2099* (SI)].

Chenopodium pratericola Rydb. = **Chenopodium dessicatum** A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium pratericola Rydb. var. *leptophylloides* (Murr) Aellen = **Chenopodium dessicatum** A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium pratericola Rydb. subsp. *euprattericola* Allem, nom. inval. = **Chenopodium dessicatum** A. Nelson var. **leptophylloides** (Murr) Wahl
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium pumilio R. Br.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Giusti, L., 1967, 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MIS, TUC); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 28299* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 42716* (MO, SI)].

Chenopodium purpurascens B. Juss. ex Jacq.
Referencias: Aellen, P., 1929; Dvorák, F., 1992; Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Buchtien, O. 552* (SI)].

Chenopodium quinoa Willd. f. *purpurascens* Aellen = **Chenopodium quinoa** Willd. var. **quinoa**

Chenopodium quinoa Willd. var. **melanospermum** Hunz.
Sin.: *Chenopodium quinoa* Willd. subsp. *milleanum* Aellen
Referencias: Giusti, L., 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cámara Hernández, J. A. 661* (SI)].

Chenopodium quinoa Willd. var. **quinoa**
Sin.: *Chenopodium canihua* O.F. Cook, *Chenopodium nuttalliae* Saff., *Chenopodium quinoa* Willd. f. *purpurascens* Aellen

Referencias: Brako, L., 1993d.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3800 m.
Países: ARG(COR); CHL(I, II, VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 25108* (CORD)]; CHL[*Junge, C. 271* (CONC)].

Chenopodium quinoa Willd. subsp. *milleanum* Aellen = **Chenopodium quinoa** Willd. var. **melanospermum** Hunz.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium rafaelense Chodat & Wilczek = **Chenopodium papulosum** Moq.
Referencias: Aellen, P., 1929.

Chenopodium retusum (Moq.) Moq.
Sin.: *Ambrina obovata* Moq., *Ambrina retusa* Moq., *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *retusum* (Juss. ex Moq.) Aellen, *Chenopodium ambrosioides* L. var. *obovata* (Moq.) Speg., *Chenopodium obovatum* (Moq.) Moq.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1967, 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA); BRA(RGS); URY(COL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5023* (MU, SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 37705* (CTES)]; URY[*Herter, W. G. F. 59c* (SI)].

Chenopodium rigidum Lingelsh. = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

[Chenopodium rubrum L.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Chenopodium rubrum auct. non L. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. subsp. **macrospermum**
Referencias: Moore, D. M., 1983.

Chenopodium rubrum L. var. *vulgaris* auct. non Wallr. = **Chenopodium macrospermum** Hook. f. f. **subviride** Thell.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943.

Chenopodium ruiz-lealii Aellen
Referencias: Aellen, P., 1965; Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4424* (SI)].

Chenopodium sanctae-clarae Johow
Referencias: Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Skottsberg, C. J. F., 1921.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Swenson, U. 360* (CONC)].

Chenopodium sancti-ambrosii Skottsb.
Referencias: Skottsberg, C. J. F., 1951a.
Arbusto. Endémica. 300–500 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Lundborg, G. 7* (GB)].

Chenopodium scabricaule Speg.
Sin.: *Chenopodium scabricaule* Speg. f. *megalosperma* Speg., *Chenopodium scabricaule* Speg. f. *pusilla* Speg., *Chenopodium scabricaule* Speg. f. *robusta* Speg.
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Giusti, L., 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 8081* (SI)].

Chenopodium scabricaule Speg. f. *megalosperma* Speg. = **Chenopodium scabricaule** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium scabricaule Speg. f. *pusilla* Speg. = **Chenopodium scabricaule** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium scabricaule Speg. f. *robusta* Speg. = **Chenopodium scabricaule** Speg.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Chenopodium scoparium L. = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1978.

Chenopodium sooianum Aellen = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium sparsiflorum Phil. = **Chenopodium petiolare** Kunth
Referencias: Giusti, L., 1997.

[Chenopodium stuckertii Gand.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Chenopodium suffruticosum Willd. = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Wilson, P. G., 1984.

Chenopodium suffruticosum Willd. subsp. *remotum* Vorosh. = **Chenopodium ambrosioides** L.
Referencias: Wilson, P. G., 1984.

[Chenopodium trifurcatum Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Chenopodium tweedii Moq. = **Holmbergia tweedii** (Moq.) Speg.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium urbicum L.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 7072* (CONC)].

Chenopodium vagans Standl. = **Chenopodium chilense** Schrad.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943.

Chenopodium venturii (Aellen) Cabrera, comb. superfl. = **Chenopodium venturii** (Aellen) Aellen ex Vorosh.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium venturii (Aellen) Aellen ex Vorosh.
Sin.: *Chenopodium ambrosioides* L. subsp. *venturii* Aellen, *Chenopodium venturii* (Aellen) Cabrera, comb. superfl.
Referencias: Aellen, P. & Just, T. K., 1943; Cabrera, A. L., 1957b; Giusti, L., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4435* (LIL)].

Chenopodium vulvaria L.
Referencias: Giusti, L., 1984, 1997; Planchuelo, A. M., 1975.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(I, II, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 2350* (BAB)]; CHL[*Werdermann, E. 756* (CONC)].

Chenopodium vulvaria auct. non L. = **Chenopodium carnosulum** Moq.
Referencias: Moore, D. M., 1974.

Chenopodium zobelii A. Ludw. & Aellen, nom. illeg. = **Chenopodium borbasii** Murr
Referencias: Giusti, L., 1997.

Chenopodium zoellneri Aellen = **Chenopodium microcarpum** (Phil.) A. Troncoso
Referencias: Troncoso, A. A., 1977.

Cycloloma Moq.

Número de especies: 1 introducida

Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult.
Sin.: *Cycloloma platyphylla* Moq., *Salsola atriplicifolia* Spreng.
Referencias: Giusti, L., 1967, 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ibarra, F. E. 3479* (BAA)].

Cycloloma platyphylla Moq. = **Cycloloma atriplicifolium** (Spreng.) Coult.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Echinopsilon hyssopifolium (Pall.) Moq. = **Bassia hyssopifolia** (Pall.) Kuntze
Referencias: Giusti, L., 1997.

Enchylaena tamariscina (Lindl.) Druce = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson

Glaux atacamensis Phil. = **Nitrophila atacamensis** (Phil.) Hieron. ex Ulbr.

Glaux densiflora Phil. = **Nitrophila australis** Chodat & Wilczek var. **australis**

Glaux mucronata Phil. = **Nitrophila australis** Chodat & Wilczek var. **australis**

Halocnemum ritterianum Moq. = **Heterostachys ritteriana** (Moq.) Ung.-Sternb.
Referencias: Giusti, L., 1984.

Halopeplis gilliesii Griseb. = **Heterostachys ritteriana** (Moq.) Ung.-Sternb.
Referencias: Giusti, L., 1984.

Halopeplis patagonica (Moq.) Ung.-Sternb. = **Allenrolfea patagonica** (Moq.) Kuntze
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Halostachys patagonica Moq. = **Allenrolfea patagonica** (Moq.) Kuntze
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Halostachys ritteriana (Moq.) Moq. = **Heterostachys ritteriana** (Moq.) Ung.-Sternb.
Referencias: Giusti, L., 1984.

Heterostachys Ung.-Sternb.

Número de especies: 2, 1 endémica

Heterostachys olivascens (Speg.) Molfino, comb. superfl. = **Heterostachys olivascens** (Speg.) Speg.
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Heterostachys olivascens (Speg.) Speg.
Sin.: *Heterostachys olivascens* (Speg.) Molfino, comb. superfl., *Spirostachys olivascens* Speg.
Referencias: Soriano, A., 1947b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11892* (SI)].

Heterostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Sternb.
Sin.: *Halocnemum ritterianum* Moq., *Halopeplis gilliesii* Griseb., *Halostachys ritteriana* (Moq.) Moq., *Spirostachys ritteriana* (Moq.) Ung.-Sternb.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giusti, L., 1997; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soriano, A., 1947b.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4757* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 47026* (MO, SI)].

Holmbergia Hicken

Número de especies: 1

Holmbergia exocarpa (Griseb.) Hicken = **Holmbergia tweedii** (Moq.) Speg.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Holmbergia tweedii (Moq.) Speg.
Sin.: *Chenopodium exocarpum* Griseb., *Chenopodium tweedii* Moq., *Holmbergia exocarpa* (Griseb.) Hicken
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Giusti, L., 1967.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, APA, PHA); URY(RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5096* (SI)]; PRY[*Spichiger, R. 2122* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8623* (MVFA)].

Kochia brevifolia R. Br. = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson
Referencias: Teillier A., S. & Taylor, C. M., 1997.

Kochia parodii Aellen = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1978.

Kochia parodii Aellen var. *contracta* Aellen = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia parodii Aellen var. *densa* Aellen = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia parodii Aellen var. *elongata* Aellen = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia parodii Aellen var. *glabrescens* Aellen = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia scoparia (L.) Schrad. = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1978.

Kochia scoparia (L.) Schrad. f. *densa* (Aellen) A. Soriano = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia scoparia (L.) Schrad. f. *densiflora* Moq. = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia scoparia (L.) Schrad. f. *remotiflora* Beck = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia scoparia (L.) Schrad. var. *pubescens* Fenzl = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia scoparia (L.) Schrad. var. *sieversiana* (Pall.) Graebn. = **Bassia scoparia** (L.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Kochia tamariscina (Lindl.) J.M. Black = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson

Kochia thymifolia Lindl. = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson

Lerchea divaricata (Moq.) Speg. = **Suaeda divaricata** Moq.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Lerchea fruticosa (L.) Moench var. *brachyphylla* Speg. = **Suaeda argentinensis** A. Soriano

[Lerchea fruticosa (L.) Moench var. megalosperma Speg.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Lerchea maritima (L.) Kuntze = **Suaeda maritima** (L.) Dumort.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

[Lerchea maritima (L.) Kuntze var. australis (R. Br.) Kuntze]
Sin.: *Chenopodium australe* R. Br.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Lerchea patagonica (Speg.) Speg. = **Suaeda patagonica** Speg.
Referencias: Hauman, L. L. & Irigoyen, L. H., 1923.

Maireana Moq.

Número de especies: 1 introducida

Maireana brevifolia (R. Br.) Paul G. Wilson
Sin.: *Enchylaena tamariscina* (Lindl.) Druce, *Kochia brevifolia* R. Br., *Kochia tamariscina* (Lindl.) J.M. Black, *Kochia thymifolia* Lindl., *Salsola brachyphylla* Spreng., *Suaeda feliciana* A. Hoffm. & Teillier, *Suaeda tamariscina* Lindl.
Referencias: Marticorena, C., 1998; Teillier A., S. & Taylor, C. M., 1997.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(III, IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hoffmann, A. E. 15* (CONC, SGO)].

Monolepis Schrad.

Número de especies: 1 introducida

Monolepis chenopodioides (Nutt.) Moq. = **Monolepis nuttalliana** (Schult.) Green
Referencias: Giusti, L., 1967.

Monolepis nuttalliana (Schult.) Green
Sin.: *Blitum chenopodioides* Nutt., hom. illeg., *Blitum nuttallianum* Schult., *Monolepis chenopodioides* (Nutt.) Moq., *Monolepis patagonica* Ulbr.
Referencias: Giusti, L., 1967, 1984, 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troiani, H. O. 15231* (SI)].

Monolepis patagonica Ulbr. = **Monolepis nuttalliana** (Schult.) Green
Referencias: Giusti, L., 1997.

Nitrophila S.Watson

Número de especies: 2 endémicas

Nitrophila atacamensis (Phil.) Hieron. ex Ulbr.
Sin.: *Glaux atacamensis* Phil.
Referencias: Poblete, V., 1989.
Hierba. Anual. Endémica. 2300–4000 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 1253* (CONC)].

Nitrophila australis Chodat & Wilczek var. **australis**
Sin.: *Glaux densiflora* Phil., *Glaux mucronata* Phil., *Nitrophila densiflora* (Phil.) Ulbr., *Nitrophila mucronata* (Phil.) Ulbr.
Referencias: Giusti, L., 1967, 1997; Soriano, A., 1944a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, JUJ, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33046* (SI)].

Nitrophila australis Chodat & Wilczek var. **kuntzei** (Ulbr.) A. Soriano
Sin.: *Nitrophila kuntzei* Ulbr.
Referencias: Giusti, L., 1984, 1997; Soriano, A., 1944a, 1956.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1422* (SI)].

Nitrophila densiflora (Phil.) Ulbr. = **Nitrophila australis** Chodat & Wilczek var. **australis**

Nitrophila kuntzei Ulbr. = **Nitrophila australis** Chodat & Wilczek var. **kuntzei** (Ulbr.) A. Soriano
Referencias: Giusti, L., 1997.

Nitrophila mucronata (Phil.) Ulbr. = **Nitrophila australis** Chodat & Wilczek var. **australis**

[Nitrophila occidentalis (Moq.) S. Watson]
Sin.: *Banalia occidentalis* Moq.
Referencias: Poblete, V., 1989.
Notas: Nombre dudoso.

[Nitrophila occidentalis (Moq.) S. Watson var. argentina Kurtz]
Notas: Nombre dudoso.

Obione axillaris (Phil.) Ulbr. = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**

Obione clivicola (I.M. Johnst.) Ulbr. = **Atriplex clivicola** I.M. Johnst.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Obione gardneri Moq. = **Atriplex gardneri** (Moq.) D. Dietr.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Obione hystrix (Phil.) Ulbr. = **Atriplex mucronata** Phil.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Obione imbricata Moq. = **Atriplex imbricata** (Moq.) D. Dietr. var. **imbricata**
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Obione lampa Moq. = **Atriplex lampa** (Moq.) D. Dietr.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Obione montevidensis (Spreng.) DC. = **Atriplex montevidense** Spreng.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Obione mucronata (Phil.) Ulbr. = **Atriplex mucronata** Phil.
Referencias: Rosas, M. R., 1989.

Obione myriophylla (Phil.) Ulbr. = **Atriplex myriophylla** Phil.

Obione patagonica Moq. = **Atriplex patagonica** (Moq.) D. Dietr.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Obione pusilla Wedd., hom. illeg. = **Atriplex myriophylla** Phil.
Referencias: Múlgura, M. E., 1984.

Obione undulata Moq. = **Atriplex undulata** (Moq.) D. Dietr.
Referencias: Múlgura, M. E., 1981a.

Roubieva bonariensi Hook. f. = **Chenopodium haumanii** Ulbr.
Referencias: Giusti, L., 1987.

Roubieva microcarpa Phil. = **Chenopodium microcarpum** (Phil.) A. Troncoso
Referencias: Troncoso, A. A., 1977.

Roubieva multifida (L.) Moq. = **Chenopodium multifidum** L.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Salicornia ambigua Michx. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salicornia andina Phil. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Salicornia bergii Lorentz & Niederl. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Salicornia corticosa (Meyen) Walp. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

[Salicornia corticosa (Meyen) Walp. f. procumbens Speg.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

[Salicornia corticosa (Meyen) Walp. f. typica Speg., nom. inval.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Salicornia corticosa (Meyen) Walp. var. *nachtigallii* Niederl. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Salicornia doeringii Lorentz & Niederl. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Salicornia europea L. var. *fruticosa* L. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Salicornia fruticosa (L.) L. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Salicornia fruticosa (L.) L. var. *andina* (Phil.) Gunckel = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Salicornia fruticosa (L.) L. var. *corticosa* (Meyen) Gunckel = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salicornia fruticosa (L.) L. var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Speg. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

[Salicornia fruticosa (L.) L. var. macrostachya Speg.]
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Nombre dudoso.

Salicornia fruticosa (L.) L. var. *peruviana* (Kunth) Ung.-Sternb. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Salicornia gaudichaudiana Moq., hom. illeg. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salicornia magellanica Phil. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Salicornia perennis Mill. = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salicornia peruviana Kunth = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Salicornia peruviana Kunth var. *andina* (Phil.) Reiche = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salicornia peruviana Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salicornia peruviana Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche = **Sarcocornia perennis** (Mill.) A.J. Scott
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Salicornia pulvinata R.E. Fr. = **Sarcocornia pulvinata** (R.E. Fr.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Salsola L.

Número de especies: 2 introducidas

Salsola atriplicifolia Spreng. = **Cycloloma atriplicifolium** (Spreng.) Coult.
Referencias: Giusti, L., 1967.

Salsola brachyphylla Spreng. = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson

Salsola carinata (R. Br.) Spreng. = **Chenopodium carinatum** R. Br.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Salsola hyssopifolia Pall. = **Bassia hyssopifolia** (Pall.) Kuntze
Referencias: Giusti, L., 1984.

Salsola kali L. f. *hirsuta* (Hornem.) Asch. & Graebn. = **Salsola kali** L. var. **hirsuta** Hornem.
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.

Salsola kali L. var. **hirsuta** Hornem.
Sin.: *Salsola kali* L. f. *hirsuta* (Hornem.) Asch. & Graebn.
Referencias: Soriano, A., 1944b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 27* (SI)].

Salsola kali L. var. **kali**
Referencias: Giusti, L., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(MAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15982* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 330* (CONC)]; URY[*García Zorrón, N. 1687* (MVFA)].

Salsola kali L. var. **tragus** (L.) Moq.
Sin.: *Salsola tragus* L.
Referencias: Giusti, L., 1997; Soriano, A., 1944b.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(BAI, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4268* (SI)].

Salsola mendocinensis Gillies = **Suaeda divaricata** Moq.
Referencias: Soriano, A., 1942.

Salsola microphylla Cav. = **Salsola vermiculata** L. var. **microphylla** (Cav.) Moq.

Salsola soda L. var. **pumila** Albert
Referencias: Soriano, A., 1944b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 530* (BAB)].

Salsola soda L. var. **soda**
Referencias: Soriano, A., 1944b.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 531* (BAB)].

Salsola tragus L. = **Salsola kali** L. var. **tragus** (L.) Moq.

[Salsola vermiculata L. var. microphylla (Cav.) Moq.]
Sin.: *Salsola microphylla* Cav.
Referencias: Soriano, A., 1944b.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Sarcocornia A.J. Scott

Número de especies: 3, 2 introducidas

Sarcocornia andina Phil. = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott
Sin.: *Arthrocnemum fruticosum* (L.) Moq., *Salicornia andina* Phil., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp., *Salicornia europea* L. var. *fruticosa* L., *Salicornia fruticosa* (L.) L., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *andina* (Phil.) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *corticosa* (Meyen) Gunckel, *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *peruviana* (Kunth) Ung.-Sternb., *Salicornia gaudichaudiana* Moq., hom. illeg., *Salicornia peruviana* Kunth, *Salicornia peruviana* Kunth var. *andina* (Phil.) Reiche, *Salicornia peruviana* Kunth var. *corticosa* (Meyen) Reiche, *Sarcocornia andina* Phil., *Suaeda corticosa* Meyen
Referencias: Gunckel, L. H., 1978; Marticorena, C., Stuessy, T. F. & Baeza, C. M., 1998; Scott, A. J., 1977.
Subarbusto. Introducida. 0–3000 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2681* (CONC)].

Sarcocornia perennis (Mill.) A.J. Scott
Sin.: *Salicornia ambigua* Michx., *Salicornia bergii* Lorentz & Niederl., *Salicornia corticosa* (Meyen) Walp. var. *nachtigallii* Niederl., *Salicornia doeringii* Lorentz & Niederl., *Salicornia fruticosa* (L.) L. var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Speg., *Salicornia magellanica* Phil., *Salicornia perennis* Mill., *Salicornia peruviana* Kunth var. *doeringii* (Lorentz & Niederl.) Reiche
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Múlgura, M. E., 1994a; Scott, A. J., 1977; Soriano, A., 1947b.
Subarbusto. Introducida. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, FOR, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF); PRY(APY, PHA); URY(ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4869* (SI)]; PRY[*Molas, L. 1025* (SI)]; URY[*Bonifacino, J. M. s.n.* (MVFA)].

Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott
Sin.: *Salicornia pulvinata* R.E. Fr.
Referencias: Faúndez, L. & Macaya, J., 1997; Scott, A. J., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 805* (SI)]; CHL[*Faúndez, L. 208501* (AGUCH)].

Spirostachys olivascens Speg. = **Heterostachys olivascens** (Speg.) Speg.
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Spirostachys patagonica (Moq.) Benth. & Hook., nom. superfl. = **Allenrolfea patagonica** (Moq.) Kuntze
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Spirostachys patagonica (Moq.) Griseb. = **Allenrolfea patagonica** (Moq.) Kuntze
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Spirostachys ritteriana (Moq.) Ung.-Sternb. = **Heterostachys ritteriana** (Moq.) Ung.-Sternb.
Referencias: Giusti, L., 1984.

Spirostachys vaginata Griseb. = **Allenrolfea vaginata** (Griseb.) Kuntze
Referencias: Soriano, A., 1947b.

Suaeda Forssk. ex Scop.

Número de especies: 10, 6 endémicas, 2 introducidas

Suaeda altissima (L.) Pall.
Sin.: *Chenopodium altissimum* L.
Referencias: Giusti, L., 1984.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1234* (BAB)].

Suaeda argentinensis A. Soriano
Sin.: *Lerchea fruticosa* (L.) Moench var. *brachyphylla* Speg., *Suaeda fruticosa* (L.) Forssk. var. *brachyphylla* (Speg.) Reiche
Referencias: Soriano, A., 1942.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23833* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 6741* (CONC)].

Suaeda brevifolia Phil. = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S., 1996.

Suaeda corticosa Meyen = **Sarcocornia fruticosa** (L.) A.J. Scott
Referencias: Scott, A. J., 1977.

Suaeda densiflora A. Soriano ex Giusti
Referencias: Giusti, L., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15914* (SI)].

Suaeda divaricata Moq.
Sin.: *Lerchea divaricata* (Moq.) Speg., *Salsola mendocinensis* Gillies
Referencias: Giusti, L., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 215* (SI)].

Suaeda divaricata Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S., 1996.

Suaeda divaricata Moq. var. *microphylla* F. Phil. = **Suaeda nesophila** I.M. Johnst.
Referencias: Teillier A., S., 1996.

Suaeda divaricata Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S., 1996.

Suaeda divaricata Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Reiche = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S., 1996.

Suaeda feliciana A. Hoffm. & Teillier = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson
Referencias: Teillier A., S. & Taylor, C. M., 1997.

Suaeda foliosa Moq.
Sin.: *Suaeda brevifolia* Phil., *Suaeda divaricata* Moq. var. *brevifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *parvifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda divaricata* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Reiche, *Suaeda foliosa* Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl., *Suaeda parviflora* Phil., *Suaeda tenuifolia* Phil.
Referencias: Teillier A., S., 1996.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 381* (CONC, SI)].

Suaeda foliosa Moq. var. *tenuifolia* (Phil.) Standl. = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S., 1996.

Suaeda fruticosa (L.) Forssk.
Sin.: *Chenopodium fruticosum* L.
Referencias: Soriano, A., 1945.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. 12661* (LP)].

Suaeda fruticosa (L.) Forssk. var. *brachyphylla* (Speg.) Reiche = **Suaeda argentinensis** A. Soriano

[Suaeda maritima (L.) Dumort.]
Sin.: *Chenopodium maritimum* L., *Lerchea maritima* (L.) Kuntze
Referencias: Múlgura, M. E., 1999b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Suaeda multiflora Phil.
Referencias: Teillier A., S., 1996.
Arbusto. Endémica. 0–900 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 3687* (CONC)].

Suaeda nesophila I.M. Johnst.
Sin.: *Suaeda divaricata* Moq. var. *microphylla* F. Phil.
Referencias: Teillier A., S., 1996.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*González, J. s.n.* (CONC)].

Suaeda neuquenensis M.A. Alonso, Conticello & Cerazo
Referencias: Alonso, M. A., Conticello, L. & Cerazo, M. B., 2004.
Hierba. Anual. Endémica. 300–400 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Conticello, L. s.n.* (*)].

Suaeda parviflora Phil. = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S. & Tomé, A., 2004.

Suaeda patagonica Speg.
Sin.: *Lerchea patagonica* (Speg.) Speg., *Suaeda patagonica* Speg. var. *crassiuscula* A. Soriano
Referencias: Cuadrado, G. A., 1993; Giusti, L., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, MEN, RNE, SCR, SFE); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 4170* (SI)]; CHL[*Goodall, N. 2048* (SI)].

Suaeda patagonica Speg. var. *crassiuscula* A. Soriano = **Suaeda patagonica** Speg.
Referencias: Giusti, L., 1997.

Suaeda tamariscina Lindl. = **Maireana brevifolia** (R. Br.) Paul G. Wilson

Suaeda tenuifolia Phil. = **Suaeda foliosa** Moq.
Referencias: Teillier A., S. & Tomé, A., 2004.

Teloxys ambrosioides (L.) W.A. Weber = **Chenopodium ambrosioides** L.

Teloxys mandonii S.Watson = **Chenopodium mandonii** (S. Watson) Aellen
Referencias: Simón, L. E., 1996.

Teloxys multifida (L.) W.A. Weber = **Chenopodium multifidum** L.

CHLORANTHACEAE

1 género, 1 especie.

Hedyosmum Sw.

Número de especies: 1

Hedyosmum acutifolium Cordem. = **Hedyosmum brasiliense** Miq.
Referencias: Reitz, R., 1965c; Todzia, C. A., 1988.

Hedyosmum bonplandianum auct. non Kunth = **Hedyosmum brasiliense** Miq.
Referencias: Reitz, R., 1965c; Todzia, C. A., 1988.

Hedyosmum brasiliense Miq.
Sin.: *Hedyosmum acutifolium* Cordem., *Hedyosmum bonplandianum* auct. non Kunth, *Hedyosmum grandifolium* Occhioni, *Hedyosmum weddellianum* Cordem., *Tafallaea brasiliensis* (Miq.) Kuntze, *Tafallaea weddelliana* (Cordem.) Kuntze
Referencias: Rossi, L., 2002; Todzia, C. A., 1988.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15255* (GH, K, L, MO, S), *Hastings, 2027* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 10081a* (BM, G, K, NY)].

Hedyosmum grandifolium Occhioni = **Hedyosmum brasiliense** Miq.
Referencias: Reitz, R., 1965c; Todzia, C. A., 1988.

Hedyosmum weddellianum Cordem. = **Hedyosmum brasiliense** Miq.
Referencias: Reitz, R., 1965c; Todzia, C. A., 1988.

Tafallaea brasiliensis (Miq.) Kuntze = **Hedyosmum brasiliense** Miq.
Referencias: Todzia, C. A., 1988.

Tafallaea weddelliana (Cordem.) Kuntze = **Hedyosmum brasiliense** Miq.
Referencias: Todzia, C. A., 1988.

CHRYSOBALANACEAE

Autor: Prance, G. T.

4 géneros, 6 especies.

Couepia Aubl.

Número de especies: 2

Couepia formosana Taub. = **Couepia grandiflora** (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Referencias: Prance, G. T., 1972.

Couepia grandiflora (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Sin.: *Couepia formosana* Taub., *Couepia suberosa* Pilg., *Moquilea grandiflora* Mart. & Zucc.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Prance, G. T. & Sothers, C. A., 2003b; Prance, G. T., 1972, 1989.
Árbol. Nativa. 300–1400 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2819* (US)]; PRY[*Brunner, D. R. 946* (K, MO)].

Couepia paraguariensis Hassl. = **Couepia uiti** (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Referencias: Prance, G. T., 1972.

Couepia suberosa Pilg. = **Couepia grandiflora** (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Referencias: Prance, G. T., 1972.

Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Sin.: *Couepia paraguariensis* Hassl., *Moquilea uiti* Mart. & Zucc.
Referencias: Prance, G. T. & Sothers, C. A., 2003b; Prance, G. T., 1972, 1989.
Árbol. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Brunner, D. R. 987* (K, MO), *Fiebrig, K. A. G. 1379* (G, K)].

Hirtella L.

Número de especies: 2

Hirtella burchellii Britton
Sin.: *Hirtella sprucei* Benth. ex Hook. f. subsp. *meridionalis* Hassl.
Referencias: Prance, G. T. & Sothers, C. A., 2003b; Prance, G. T., 1972, 1989.
Árbol. Nativa. 100–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 62420* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 10700* (BM, K, NY, P, W)].

Hirtella gardneri Benth. = **Hirtella hebeclada** Moric. ex DC.
Referencias: Klein, R. M., 1984a; Prance, G. T., 1972.

[Hirtella glandulosa Spreng.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Hirtella hebeclada Moric. ex DC.
Sin.: *Hirtella gardneri* Benth., *Hirtella selloana* Hook. f., *Hirtella tomentella* Schott
Referencias: Klein, R. M., 1984a; Prance, G. T. & Sothers, C. A., 2003b; Prance, G. T., 1972, 1989.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 2304* (HBR, US), *Kummrow, R. 717* (C, SI)].

Hirtella selloana Hook. f. = **Hirtella hebeclada** Moric. ex DC.
Referencias: Klein, R. M., 1984a; Prance, G. T., 1972.

Hirtella sprucei Benth. ex Hook. f. subsp. *meridionalis* Hassl. = **Hirtella burchellii** Britton
Referencias: Prance, G. T., 1972.

Hirtella tomentella Schott = **Hirtella hebeclada** Moric. ex DC.
Referencias: Klein, R. M., 1984a; Prance, G. T., 1972.

Licania Aubl.
Número de especies: 1

Licania humilis Cham. & Schltdl.
Referencias: Prance, G. T. & Sothers, C. A., 2003b; Prance, G. T., 1972, 1989.
Arbusto o arbolito. Nativa. 200–1100 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fernández Casas, F. J. 4065* (NY)].

Moquilea grandiflora Mart. & Zucc. = **Couepia grandiflora** (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Referencias: Prance, G. T., 1972.

Moquilea uiti Mart. & Zucc. = **Couepia uiti** (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.
Referencias: Prance, G. T., 1972.

Parinari Aubl.
Número de especies: 1

Parinari obtusifolia Hook. f.
Referencias: Prance, G. T. & Sothers, C. A., 2003a; Prance, G. T., 1972, 1989.
Arbusto. Nativa. 200–1200 m.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 4117* (US)].

CISTACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Cistus brasiliensis Lam. = **Crocanthemum brasiliense** (Lam.) Spach
Referencias: Hunziker, A. T., 1984c; Reitz, R., 1988c.

Crocanthemum Spach
Número de especies: 1 endémica

Crocanthemum brasiliense (Lam.) Spach
Sin.: *Cistus brasiliensis* Lam., *Halimium brasiliense* (Lam.) Grosser, *Helianthemum brasiliense* (Lam.) Pers., *Helianthemum polygalaefolium* Sweet, *Hudsonia australis* Spreng.
Referencias: Fabris, H. A., 1966b; Grosser, W. C. H., 1903; Hunziker, A. T., 1984c; Janchen, E. E. A., 1925; Parodi, L. R., 1943a; Reitz, R., 1988c.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SJU); BRA(RGS, SCA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2181* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37750* (SI), *Reitz, P. R. 8154* (HBR)]; URY[*Burkart, A. 29007* (SI)].

[Crocanthemum hirsutissimum (C. Presl) Janch.]
Sin.: *Halimium hirsutissimum* (C. Presl) Grosser
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Crocanthemum spartioides (C. Presl) Janch.]
Sin.: *Halimium spartioides* (C. Presl) Grosser, *Helianthemum spartioides* C. Presl
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Halimium brasiliense (Lam.) Grosser = **Crocanthemum brasiliense** (Lam.) Spach
Referencias: Reitz, R., 1988c.

Halimium hirsutissimum (C. Presl) Grosser = **Crocanthemum hirsutissimum** (C. Presl) Janch.

Halimium spartioides (C. Presl) Grosser = **Crocanthemum spartioides** (C. Presl) Janch.

Helianthemum brasiliense (Lam.) Pers. = **Crocanthemum brasiliense** (Lam.) Spach
Referencias: Hunziker, A. T., 1984c; Reitz, R., 1988c.

[Helianthemum chamaecistus Mill.]
Referencias: Hunziker, A. T., 1984c.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Helianthemum hirsutissimum C. Presl = **Crocanthemum hirsutissimum** (C. Presl) Janch.

Helianthemum polygalaefolium Sweet = **Crocanthemum brasiliense** (Lam.) Spach
Referencias: Reitz, R., 1988c.

Helianthemum spartioides C. Presl = **Crocanthemum spartioides** (C. Presl) Janch.

Hudsonia australis Spreng. = **Crocanthemum brasiliense** (Lam.) Spach
Referencias: Reitz, R., 1988c.

CLETHRACEAE

1 género, 2 especies, 1 especie endémica.

Clethra L.
Número de especies: 2, 1 endémica

Clethra brasiliensis auct. non Cham. = **Clethra scabra** Pers. var. **venosa** (Meisn.) Sleumer
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.

Clethra brasiliensis Cham. = **Clethra scabra** Pers. var. **scabra**
Referencias: Cabrera, A. L., 1983a; Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.

Clethra brasiliensis Cham. var. *venosa* Meisn. = **Clethra scabra** Pers. var. **venosa** (Meisn.) Sleumer
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.

Clethra gardneri Turcz. = **Clethra scabra** Pers. var. **laevigata** (Meisn.) Sleumer
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.

Clethra laevigata auct. non Meisn. = **Clethra uleana** Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1967a.

Clethra laevigata Meisn. = **Clethra scabra** Pers. var. **laevigata** (Meisn.) Sleumer
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.

Clethra maromensis Villa = **Clethra scabra** Pers. var. **scabra**
Referencias: Cabrera, A. L., 1983a; Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.

Clethra scabra Pers. var. **laevigata** (Meisn.) Sleumer
Sin.: *Clethra gardneri* Turcz., *Clethra laevigata* Meisn.
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 54133* (HBR)].

Clethra scabra Pers. var. **scabra**
Sin.: *Clethra brasiliensis* Cham., *Clethra maromensis* Villa
Referencias: Cabrera, A. L., 1983a; Hunziker, A. T., 1984f; Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.
Árbol. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3862* (LIL, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6385* (HBR)].

Clethra scabra Pers. var. **venosa** (Meisn.) Sleumer
Sin.: *Clethra brasiliensis* auct. non Cham., *Clethra brasiliensis* Cham. var. *venosa* Meisn.
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967b.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 1037* (SI), *Reitz, P. R. 16604* (HBR)].

Clethra uleana Sleumer
Sin.: *Clethra laevigata* auct. non Meisn.
Referencias: Ichaso, C. L. F. & Guimaráes, E. F., 1975; Sleumer, H. O., 1967a.
Arbusto o árbol. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18200* (HBR)].

CLUSIACEAE

5 géneros, 7 especies.

Calophyllum L.

Número de especies: 1

Calophyllum brasiliense Cambess.
Referencias: Robson, N. K. B., 1999.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 43768* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 10656* (BM)].

Clusia L.

Número de especies: 2

Clusia criuva Cambess.
Referencias: Rosa de Saldías, Y., 1993b.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 12676* (MBM)].

Clusia parviflora Saldanha ex Engl.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 3180* (MBM)].

Garcinia L.

Número de especies: 1

Garcinia brasiliensis Mart. = **Rheedia brasiliensis** (Mart.) Planch. & Triana
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903.

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi
Sin.: *Rheedia gardneriana* Planch. & Triana
Referencias: Zappi, D. C., 1993.
Árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Cervi, A. C. 8741* (MBM)].

Kielmeyera Mart.

Número de especies: 2

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997b.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5360* (MBM)]; PRY[*Soria, N. 7481* (FCQ)].

Kielmeyera paranaensis Saddi = **Kielmeyera variabilis** Mart. & Zucc. var. **paranaensis** (Saddi) Bittrich

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **paranaensis** (Saddi) Bittrich
Sin.: *Kielmeyera paranaensis* Saddi

Referencias: Saddi, N. S., 1984.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20433* (MBM)].

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **stenophylla** Saddi
Referencias: Saddi, N., 1986.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6599* (MBM)].

Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. var. **variabilis**
Referencias: Saddi, N., 1986.
Subarbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5373* (MBM)].

Rheedia L.
Número de especies: 1

[Rheedia brasiliensis Chodat & Hassl., hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana
Sin.: *Garcinia brasiliensis* Mart.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1903; Dimitri, M. J., 1974a; Schulz, A. G., 1963.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(SCA); PRY(AMA, CAN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15339* (SI)]; BRA[*Equipo Ecologia, 9* (NY)]; PRY[*Jörgensen, P. 3439* (SI)].

[Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana var. salicifolia Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Rheedia gardneriana Planch. & Triana = **Garcinia gardneriana** (Planch. & Triana) Zappi
Referencias: Zappi, D. C., 1993.

COCHLOSPERMACEAE

1 género, 2 especies.

Cochlospermum Kunth
Número de especies: 2

Cochlospermum argentinensis (Speg.) Hauman = **Cochlospermum tetraporum** Hallier f.
Referencias: Poppendieck, H. H., 1980, 1981.

Cochlospermum regium (Schrank) Pilg.
Sin.: *Maximilianea regia* Schrank, *Maximilianea regia* Schrank var. *glaberrima* Chodat & Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Poppendieck, H. H., 1980, 1981.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12967* (F, K, M, US)]; PRY[*Hassler, E. 10502* (SI), *Jiménez, B. 1417* (BM, CTES, MO, PY)].

Cochlospermum tetraporum Hallier f.
Sin.: *Cochlospermum argentinensis* (Speg.) Hauman, *Cochlospermum zahlbruckneri* Osterm., *Maximilianea argentinensis* Speg., *Maximilianea tetrapora* (Hallier f.) S.F. Blake
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Legname, P. R., 1982; Meyer, T., 1960; Poppendieck, H. H., 1980.
Árbol. Nativa. 400–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31009* (SI), *Legname, P. R. 5842c* (C)]; PRY[*Mereles, F. 5459* (FCQ)].

Cochlospermum zahlbruckneri Osterm. = **Cochlospermum tetraporum** Hallier f.
Referencias: Poppendieck, H. H., 1980, 1981.

Maximilianea argentinensis Speg. = **Cochlospermum tetraporum** Hallier f.
Referencias: Poppendieck, H. H., 1980, 1981.

Maximilianea regia Schrank = **Cochlospermum regium** (Schrank) Pilg.
Referencias: Poppendieck, H. H., 1980, 1981.

Maximilianea regia Schrank var. *glaberrima* Chodat & Hassl. = **Cochlospermum regium** (Schrank) Pilg.
Referencias: Poppendieck, H. H., 1980, 1981.

Maximilianea tetrapora (Hallier f.) S.F. Blake = **Cochlospermum tetraporum** Hallier f.
Referencias: Poppendieck, H. H., 1980, 1981.

COMBRETACEAE

Autor: Stace, C. A.

4 géneros, 15 especies, 4 especies endémicas, 1 especie introducida.

Buchenavia Eichler
Número de especies: 1

Buchenavia igaratensis N.F. Mattos = **Buchenavia kleinii** Exell
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Buchenavia kleinii Exell
Sin.: *Buchenavia igaratensis* N.F. Mattos
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967; Exell, A. W. & Stace, C. A., 1963.
Árbol. Nativa. 200–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 22* (BM, HBR, S)].

Chuncoa brasiliensis Cambess. = **Terminalia glabrescens** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Chuncoa triflora Griseb. = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Exell, A. W., 1939.

Combretum Loefl., nom. cons.

Número de especies: 6

Combretum anfractuosum Mart. var. *macrostachyum* Hassl. = **Combretum duarteanum** Cambess.
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum bugi Cambess. = **Combretum laxum** Jacq.
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum duarteanum Cambess.
Sin.: *Combretum anfractuosum* Mart. var. *macrostachyum* Hassl.
Referencias: Exell, A. W., 1953.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4041* (BM, G, K, L, M)].

Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz
Sin.: *Combretum micropetalum* DC., *Combretum occidentale* L., nom. illeg., *Combretum secundum* Jacq., *Gaura fruticosa* Loefl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967; Exell, A. W., 1939, 1953; Guaglianone, E. R., 1998, 2005; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, GUA, PAI, PHA); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 961* (SI)]; BRA[*Henz, E. 35719* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5857* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1066b* (BM)].

Combretum hasslerianum Chodat = **Combretum leprosum** Mart.
Referencias: Exell, A. W., 1953; Guaglianone, E. R., 1998.

Combretum jacquinii Griseb., nom. illeg. = **Combretum laxum** Jacq.
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum lanceolatum Pohl ex Eichler
Referencias: Exell, A. W., 1953.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7181* (BM, G, K, P)].

Combretum laxum Jacq.
Sin.: *Combretum bugi* Cambess., *Combretum jacquinii* Griseb., nom. illeg., *Combretum mexicanum* Humb. & Bonpl., *Combretum mexicanum* Humb. & Bonpl. var. *obovata* DC., *Combretum variabile* Mart.
Referencias: Exell, A. W., 1939, 1953; Guaglianone, E. R., 1998.
Arbusto o liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA, CEN, CON, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3026* (SI), *Lillo, M. 10057* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 13337* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 7304* (BM, K, P), *Schinini, A. 13334* (SI)].

Combretum leprosum Mart.
Sin.: *Combretum hasslerianum* Chodat
Referencias: Exell, A. W., 1953; Guaglianone, E. R., 1998; Molfino, J. F., 1923b.
Arbusto o liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villa, A. s.n.* (BAF)]; PRY[*Hassler, E. 7617* (BM, C, G, K, P, SI, W)].

Combretum mellifluum Eichler
Sin.: *Combretum mellifluum* Eichler var. *cuspidatum* Hassl.
Referencias: Eichler, A. W., 1872; Exell, A. W., 1953; Guaglianone, E. R., 1998; Molfino, J. F., 1923b; da Silva Ferreira, N. M., 1995.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Muniez, A. A. s.n.* (BAF)]; PRY[*Hassler, E. 10737* (BM, G)].

Combretum mellifluum Eichler var. *cuspidatum* Hassl. = **Combretum mellifluum** Eichler
Referencias: Exell, A. W., 1953; Guaglianone, E. R., 1998.

Combretum mexicanum Humb. & Bonpl. = **Combretum laxum** Jacq.
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum mexicanum Humb. & Bonpl. var. *obovata* DC. = **Combretum laxum** Jacq.
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum micropetalum DC. = **Combretum fruticosum** (Loefl.) Stuntz
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum occidentale L., nom. illeg. = **Combretum fruticosum** (Loefl.) Stuntz
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum secundum Jacq. = **Combretum fruticosum** (Loefl.) Stuntz
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Combretum variabile Mart. = **Combretum laxum** Jacq.
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Conocarpus racemosa L. = **Laguncularia racemosa** (L.) C.F. Gaertn.
Referencias: Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967.

Gaura fruticosa Loefl. = **Combretum fruticosum** (Loefl.) Stuntz
Referencias: Exell, A. W., 1953.

Laguncularia C.F. Gaertn.

Número de especies: 1

Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.
Sin.: *Conocarpus racemosa* L.
Referencias: Eichler, A. W., 1872; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 870* (SI), *Klein, R. M. 6014* (BM, HBR)].

Myrobalanus argentea (Mart.) Kuntze = **Terminalia argentea** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Myrobalanus australis (Cambess.) Kuntze = **Terminalia australis** Cambess.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Myrobalanus balansae Kuntze = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Exell, A. W., 1939.

Myrobalanus biscutella (Eichler) Kuntze = **Terminalia argentea** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Myrobalanus glabrescens (Mart.) Kuntze = **Terminalia glabrescens** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Myrobalanus triflora (Griseb.) Kuntze = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Guaglianone, E. R. & Novara, L. J., 1999.

Terminalia L., nom. cons.

Número de especies: 7, 4 endémicas, 1 introducida

Terminalia argentea Mart.
Sin.: *Myrobalanus argentea* (Mart.) Kuntze, *Myrobalanus biscutella* (Eichler) Kuntze, *Terminalia biscutella* Eichler, *Terminalia modesta* Eichler, hom. illeg., *Terminalia sericea* Cambess.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Eichler, A. W., 1872; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967.
Arbusto o arbolito. Endémica. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6271* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 7243* (BM, C, G, GH, K, MO, NY, P, S, US), *Laes, 5236* (SI)].
Notas: Cita dudosa para la Argentina.

Terminalia australis Cambess.
Sin.: *Myrobalanus australis* (Cambess.) Kuntze
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Eichler, A. W., 1872; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967; Exell, A. W., 1939; Guaglianone, E. R., 1998; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA); URY(COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 5382* (BAA, BAB, SI)]; BRA[*Rambo, B. 38008* (C, DBN, P, SI, US)]; PRY[*Rojas, T. 10824* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1013* (A, F, G, GH, LE, M, N, SI, US)].

Terminalia balansae (Kuntze) Hassl., comb. superfl. = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia balansae (Kuntze) K. Schum. = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia biscutella Eichler = **Terminalia argentea** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia catappa L.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967.
Árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2715* (HBR)].
Notas: Procedente de Asia, árbol muy frecuente en la costa marítima del Brasil.

Terminalia glabrescens Mart.
Sin.: *Chuncoa brasiliensis* Cambess., *Myrobalanus glabrescens* (Mart.) Kuntze
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Eichler, A. W., 1872.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16702* (C, F, MBM, NY, US)]; PRY[*Hassler, E. 11364* (A, BAF, BM, C, G, GH, K, MO, NY, P, RB, S, US, W)].

Terminalia hassleriana Chodat = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia hassleriana Chodat var. *bernardiensis* Chodat = **Terminalia triflora** (Griseb.) Lillo
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia modesta Eichler, hom. illeg. = **Terminalia argentea** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia reitzii Exell
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Exell, A. W. & Reitz, P. R., 1967; Klein, R. M., 1989.
Árbol. Endémica. 500–600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dias, 12581* (H, K), *Reitz, P. R. 12194* (BM, HBR, L, NY)].

Terminalia sericea Cambess. = **Terminalia argentea** Mart.
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo
Sin.: *Chuncoa triflora* Griseb., *Myrobalanus balansae* Kuntze, *Myrobalanus triflora* (Griseb.) Kuntze, *Terminalia balansae* (Kuntze) Hassl., comb. superfl., *Terminalia balansae* (Kuntze) K. Schum., *Terminalia hassleriana* Chodat, *Terminalia hassleriana* Chodat var. *bernardiensis* Chodat
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Exell, A. W., 1939; Guaglianone, E. R. & Novara, L. J., 1999; Guaglianone, E. R., 1998; Klein, R. M., 1989.
Arbusto o árbol. Nativa. 300–1700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4149* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 8349* (BM)]; PRY[*Basualdo, I. 1595* (BM, FCQ, G, MA), *Pedersen, T. M. 5211* (K, P, S, SI), *Soria, N. 4038* (H, MO), *Woolston, A. L. 288* (C, H, K, NY, S)].

Terminalia uleana Engl. ex Alwan & Stace
Referencias: Alwan Al-Mayah, A. R. A. & Stace, C. A., 1989; Alwan Al-Mayah, A. R. A., 1983.
Árbol. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1004* (HBG, P, US)].

CONNARACEAE

2 géneros, 2 especies.

Canicidia rostrata Vell. = **Connarus rostratus** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Klein, R. M., 1985.

Connarus L.

Número de especies: 1

Connarus cymosus Planch. = **Connarus rostratus** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Klein, R. M., 1985.

Connarus cymosus Planch. var. *angustifolius* Baker, p.p. = **Connarus rostratus** (Vell.) L.B. Sm.
Referencias: Klein, R. M., 1985.

Connarus rostratus (Vell.) L.B. Sm.
Sin.: *Canicidia rostrata* Vell., *Connarus cymosus* Planch., *Connarus cymosus* Planch. var. *angustifolius* Baker, p.p.
Referencias: Forero, E. & Costa, C. B., 2002; Klein, R. M., 1985.
Arbusto o arbolito. Nativa. 100–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20292* (SI), *Reitz, P. R. 5641* (BR, G, GH, HBR, K, NY, US, WIS)].

Rourea Aubl., nom. cons.

Número de especies: 1

Rourea gracilis G. Schellenb.
Referencias: Forero, E. & Costa, C. B., 2002; Klein, R. M., 1985.
Liana. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20829* (HB, HBR, K, MBM, NY, R, SP, UEC)].

CONVOLVULACEAE

Autores: Austin, D. F. & Costea, M. (*Cuscuta*)

13 géneros, 180 especies, 72 especies endémicas, 8 especies introducidas.

Aniseia Choisy

Número de especies: 2, 1 endémica

Aniseia argentina (N.E. Br.) O´Donell
Sin.: *Aniseia cernua* Moric. f. *parviflora* Chodat & Hassl., *Aniseia cernua* Moric. var. *ambigua* Meisn., *Ipomoea argentina* N.E. Br., *Ipomoea argentinensis* Speg., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *chacoensis* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *obtusiflora* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *palmirense* Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *platensis* Hassl., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. f. *yapeyuana* Arechav., *Ipomoea cernua* (Moric.) Arechav. var. *ambigua* (Meisn.) Arechav.
Referencias: Austin, D. F., 1999; O'Donell, C. A., 1950a, 1959c, 1960a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CON, PHA); URY(ART, CLA, COL, DUR, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14481* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 41336* (LIL)]; PRY[*Degen, R. 3341* (FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 4671* (LIL)].

Aniseia arifolia Meisn. = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Aniseia cernua Moric. f. *parviflora* Chodat & Hassl. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F., 1999.

Aniseia cernua Moric. var. *ambigua* Meisn. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959c.

Aniseia costata (Meyen) Walp. = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Aniseia diversifolia Walp. = **Convolvulus bonariensis** Cav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Aniseia hastata Meisn. = **Ipomoea fimbriosepala** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy var. **ambigua** Hallier f.
Referencias: Austin, D. F., 1999; O'Donell, C. A., 1960a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Galeano, C. s.n.* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3000* (LIL)].

Argyreia hieronymi (Kuntze) K. Schum. = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1948, 1959b.

Argyreia juramenti (Kuntze) K. Schum. = **Ipomoea argentinica** Peter
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Argyreia megapotamica Griseb. = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Argyreia megapotamica Griseb. var. *puberula* Griseb. = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Batatas cavanillesii (Roem. & Schult.) G. Don = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Batatas cissoides (Lam.) Choisy = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Batatas crassicaulis Benth. = **Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F., 1977.

Batatas glabra (Aubl.) Benth. = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Batatas papiru (Ruiz & Pav.) G. Don = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Batatas setosa (Ker Gawl.) Lindl. = **Ipomoea setosa** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Batatas subtriloba (Ruiz & Pav.) G. Don = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Bonamia Thouars, nom. cons.

Número de especies: 4, 3 endémicas

Bonamia balansae Hallier f.
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(APA, AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4531* (BM, G, GH, L, W)].

Bonamia sericea (Griseb.) Hallier f. var. **latifolia** O'Donell
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 2074* (A, GH, NY, SI, US)].

Bonamia sericea (Griseb.) Hallier f. var. **sericea**
Sin.: *Breweria sericea* Griseb., *Convolvulus breweraceus* Kuntze
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lanfranchi, A. E. 1193* (SI)].

Bonamia subsessilis Hassl.
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4764* (BM, G, GH, L)].

Bonamia tomentosa Hassl.
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.
Arbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9038* (BM, F, G, MO, NY, W)].

Breweria hassleriana Chodat = **Convolvulus hassleriana** (Chodat) O'Donell
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.

Breweria montevidensis Peter = **Convolvulus ottonis** Meisn.
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.

Breweria sericea Griseb. = **Bonamia sericea** (Griseb.) Hallier f. var. **sericea**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calonyction aculeatum (L.) House = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calonyction bona-nox (L.) Bojer = **Ipomoea alba** L.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Calonyction muricatum (L.) G. Don = **Ipomoea turbinata** Lag.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Calonyction pavoni Hallier f. = **Ipomoea setosa** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calonyction pulcherrimum D. Parodi = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calonyction setosum (Ker Gawl.) Hallier f. = **Ipomoea setosa** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calonyction speciosum Choisy = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calystegia R. Br., nom. cons.

Número de especies: 3, 1 introducida

Calystegia hantelmanni Phil. = **Calystegia tuguriorum** (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

[Calystegia krauseana Phil.]
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.
Notas: Nombre dudoso.

Calystegia rosea Phil. = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.
Sin.: *Aniseia arifolia* Meisn., *Calystegia rosea* Phil., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. subsp. *americana* (Sims) Brummitt, *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *rosea* Choisy, nom. illeg., *Convolvulus sepium* L. var. *americanus* Sims
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Buck, H. T., 1979; Fabris, H. A., 1965b; Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c.
Enredadera. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MEN, RNE); CHL(V, VIII, IX, X, IDE, RME); URY(CLA, COL, FLA, MAL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 130* (SI)]; CHL[*Skottsberg, C. J. F. 689* (S)]; URY[*Rosengurtt, B. 805b* (SI)].

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. *hantelmanni* (Phil.) Reiche = **Calystegia tuguriorum** (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.
Referencias: Brummitt, R. K., 1981; O'Donell, C. A., 1957.

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. *rosea* Choisy, nom. illeg. = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calystegia sepium (L.) R. Br. var. **sepium**
Sin.: *Convolvulus sepium* L., *Volvulus sepium* (L.) Junger
Referencias: O'Donell, C. A., 1957, 1959b.
Enredadera. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(BAI, NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI, IDE, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; CHL[*Looser, G. 4743* (G)].

Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. *americana* (Sims) Brummitt = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.

Calystegia setifera (Poir.) Meisn. = **Ipomoea setifera** Poir.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Calystegia soldanella (L.) Roem. & Schult.
Sin.: *Convolvulus soldanella* L.
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Fabris, H. A., 1965b; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(CAS, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Grondona, E. M. s.n.* (BAA, CTES)]; CHL[*Ricardi, M. 343* (CONC, LIL)]; URY[*Seijo, G. J. 2637* (CTES)].

Calystegia tuguriorum (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.
Sin.: *Calystegia hantelmanni* Phil., *Calystegia sepium* (L.) R. Br. var. *hantelmanni* (Phil.) Reiche, *Convolvulus tuguriorum* G. Forst.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: CHL(XI, IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Krause 1858* (SGO)].

[Calystegia valdiviana Miq. ex Lechl., nom. nud.]
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.
Notas: Nombre dudoso.

Convolvulus L.

Número de especies: 12, 5 endémicas, 1 introducida

Convolvulus aculeatus L. = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus aculeatus L. var. *bona-nox* (L.) Kuntze = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus acuminatus Vahl = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus agrestis Choisy = **Jacquemontia agrestis** (Choisy) Meisn.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Convolvulus alsinoides L. = **Evolvulus alsinoides** (L.) L.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Convolvulus andinus Phil. = **Convolvulus demissus** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus aristolochiifolius Kunth, nom. illeg. = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus arvensis L.
Sin.: *Convolvulus arvensis* L. var. *hastulatus* Meisn., *Convolvulus arvensis* L. var. *villosus* Choisy
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Enredadera. Perenne. Introducida. 0–3200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(CAS, COL, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 397* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 677* (CONC, LIL)]; URY[*Felippone, F. 3334* (SI)].

Convolvulus arvensis L. var. *hastulatus* Meisn. = **Convolvulus arvensis** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus arvensis L. var. *villosus* Choisy = **Convolvulus arvensis** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus asarifolius Desr. = **Ipomoea asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus bogotensis Kunth = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Convolvulus bona-nox (L.) Spreng. = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus bonariensis Cav.
Sin.: *Aniseia diversifolia* Walp., *Convolvulus bonariensis* Cav. var. *multiflorus* Phil., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche, *Convolvulus triflorus* Phil.
Referencias: Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(V, RME); PRY(COA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 932* (SI)]; BRA[*Reineck, E. M. s.n.* (GH)]; CHL[*Cuming, H. 338* (BM), *Philippi, R. A. s.n.* (LP)]; PRY[*Zardini, E. M. 7400* (FCQ, MO)]; URY[*Osten, C. 4597* (MVM)].

Convolvulus bonariensis Cav. var. *multiflorus* Phil. = **Convolvulus bonariensis** Cav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus breweraceus Kuntze = **Bonamia sericea** (Griseb.) Hallier f. var. **sericea**
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.

Convolvulus cairicus L. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus canescens Phil., nom. illeg. = **Convolvulus chilensis** Pers.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus cavanillesii (Roem. & Schult.) Spreng. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus chilensis Pers.
Sin.: *Convolvulus canescens* Phil., nom. illeg., *Convolvulus dissectus* Cav. var. *canescens* (Phil.) Reiche, *Convolvulus dissectus* Cav., nom. illeg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei. O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; O'Donell, C. A., 1957.
Hierba o enredadera. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 1819* (NY, S)].

Convolvulus cissoides Lam. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Convolvulus congestus (R. Br.) Spreng. = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Convolvulus contortus Vell. = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Convolvulus costatus Meyen = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav.
Sin.: *Convolvulus crenatifolius* Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Hallier f., *Convolvulus montevidensis* Spreng., *Convolvulus montevidensis* Spreng. var. *megapotamicum* Meisn., *Ipomoea montevidensis* (Spreng.) G. Don
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Enredadera. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CEN, COA, GUA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, PAY, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 1107* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 36367* (S)]; PRY[*Rojas, T. 12423* (LIL)]; URY[*Seijo, G. J. 2608* (CTES)].

Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. var. *montevidensis* (Spreng.) Hallier f. = **Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus crenatus Jacq. = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus crinicalix (S. Moore) Kuntze = **Ipomoea crinicalyx** S. Moore
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus demissus Choisy
Sin.: *Convolvulus andinus* Phil., *Convolvulus demissus* Choisy var. *andinus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus demissus* Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche, *Convolvulus ovatus* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. 263* (BA)]; CHL[*Kausel, E. M. L. 3153* (LIL)].

Convolvulus demissus Choisy var. *andinus* (Phil.) Reiche = **Convolvulus demissus** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus demissus Choisy var. *ovatus* (Phil.) Reiche = **Convolvulus demissus** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus dissectus Cav., nom. illeg. = **Convolvulus chilensis** Pers.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus dissectus Jacq. = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **dissecta**
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Convolvulus dissectus Cav. var. *canescens* (Phil.) Reiche = **Convolvulus chilensis** Pers.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus dissectus Cav. var. *diversifolius* (Walp.) Reiche = **Convolvulus bonariensis** Cav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus dumetorum Kunth = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus erosus Desr. = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.

Convolvulus geranioides Phil. = **Convolvulus laciniatus** Desr. var. **laciniatus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus glaber Aubl., nom. illeg. = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Convolvulus glaucescens Kunth = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus hassleriana (Chodat) O'Donell
Sin.: *Breweria hassleriana* Chodat, *Convolvulus mollis* Meisn. f. *amplexicaulis* Hassl., *Convolvulus mollis* Meisn. var. *hasslerianus* (Chodat) Hassl.
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968; O'Donell, C. A., 1950c.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAU, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15683* (GH)]; PRY[*Hassler, E. 9123* (GH)].

Convolvulus heptaphyllus Roxb. = **Ipomoea wrightii** A. Gray
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Convolvulus hermanniae L'Hér.
Sin.: *Aniseia costata* (Meyen) Walp., *Convolvulus costatus* Meyen, *Convolvulus crenatus* Jacq., *Convolvulus erosus* Desr., *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *elongatus* Choisy, *Convolvulus hermanniae* L'Hér. var. *viridis* Meisn., *Convolvulus incanus* Vahl, *Ipomoea hermanniae* (L'Hér.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); CHL(IV, V, VII, VIII, IX); URY(MON, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 635* (BAB)]; CHL[*Ricardi, M. 701* (LIL)]; URY[*Seijo, G. J. 2537* (CTES)].

[Convolvulus hermanniae L'Hér. var. albido-villosus (Chodat & Hassl.) Hassl.]
Sin.: *Convolvulus mollis* Meisn. var. *albido-villosus* Chodat & Hassl.
Notas: Nombre dudoso.

Convolvulus hermanniae L'Hér. var. *elongatus* Choisy = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus hermanniae L'Hér. var. *viridis* Meisn. = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus hookerianus D. Dietr., nom. superfl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus incanus Vahl = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus indicus Burm. f. = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Convolvulus indivisus Vell. = **Ipomoea indivisa** (Vell.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959a.

Convolvulus laciniatus Desr. f. *pinnatisecta* Arechav. = **Convolvulus laciniatus** Desr. var. **hirsutus** Desr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957, 1959b.

Convolvulus laciniatus Desr. f. *subglabra* Arechav. = **Convolvulus laciniatus** Desr. var. **laciniatus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959c.

Convolvulus laciniatus Desr. var. **hirsutus** Desr.
Sin.: *Convolvulus laciniatus* Desr. f. *pinnatisecta* Arechav., *Convolvulus lasianthus* Cav.
Referencias: Buck, H. T., 1979; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); CHL(III, IV); URY(MON, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18004* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 5040* (CONC)]; URY[*Seijo, G. J. 2381* (CTES)].

Convolvulus laciniatus Desr. var. **laciniatus**
Sin.: *Convolvulus geranioides* Phil., *Convolvulus laciniatus* Desr. f. *subglabra* Arechav., *Convolvulus laciniatus* Desr. var. *peduncularis* Meisn., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. var. *glabra* Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, RNE, SAL, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(III, IV, V); URY(ART, CAS, FLO, FLA, MAL, MON, RIV, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5504* (SI)]; BRA[*Palacios, M. A. 1879* (LIL)]; CHL[*Montero, G. 7649* (CONC)]; URY[*Seijo, G. J. 2602* (CTES)].

Convolvulus laciniatus Desr. var. *peduncularis* Meisn. = **Convolvulus laciniatus** Desr. var. **laciniatus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959c.

Convolvulus lasianthus Cav. = **Convolvulus laciniatus** Desr. var. **hirsutus** Desr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus lilloi O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Holmberg, E. L. s.n.* (SI)].

Convolvulus limphaticus Vell. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus lorentzii Kuntze = **Jacquemontia lorentzii** (Kuntze) Peter ex O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Convolvulus macrocalyx Ruiz & Pav. = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Convolvulus mollis Kunth = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Convolvulus mollis Meisn. f. *amplexicaulis* Hassl. = **Convolvulus hassleriana** (Chodat) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950c.

Convolvulus mollis Meisn. var. *albido-villosus* Chodat & Hassl. = **Convolvulus hermanniae** L'Hér. var. **albido-villosus** (Chodat & Hassl.) Hassl.

Convolvulus mollis Meisn. var. *hasslerianus* (Chodat) Hassl. = **Convolvulus hassleriana** (Chodat) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950c.

Convolvulus montanus Ooststr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 1782* (LIL)].

Convolvulus montevidensis Spreng. = **Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus montevidensis Spreng. var. *megapotamicum* Meisn. = **Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus muricatus L. = **Ipomoea turbinata** Lag.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Convolvulus nil L. = **Ipomoea nil** (L.) Roth
Referencias: Austin, D. F., 1982; O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus nummularius L. = **Evolvulus nummularius** (L.) L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b; Ooststroom, S. J., 1934.

Convolvulus ottonis Meisn.
Sin.: *Breweria montevidensis* Peter
Referencias: Myint, T. & Ward, D. B., 1968.
Enredadera. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 38080* (SI)].

Convolvulus ovatus Phil. = **Convolvulus demissus** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus papiru (Ruiz & Pav.) Spreng. = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus pauciflorus Roem. & Schult. = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus pauciflorus Roem. & Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché) Kuntze = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus penthaphyllus L. = **Merremia aegyptia** (L.) Urb.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Convolvulus pes-caprae L. = **Ipomoea pes-caprae** (L.) R. Br.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Convolvulus platensis (Ker Gawl.) Spreng. = **Ipomoea platensis** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus portoricensis Spreng. = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Acevedo-Rodríguez, P., 2003b.

Convolvulus praelongus S. Moore = **Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Convolvulus pubescens (Lam.) Willd. = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus pulchellus Kunth = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus pulcherrimus Vell. = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus purpureus L. = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus ramosissimus Poir. = **Ipomoea ramosissima** (Poir.) Choisy
Referencias: Austin, D. F., 1978.

Convolvulus ruber Vahl = **Ipomoea setifera** Poir.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus schulzei O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1953a, 1959b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 3556* (LIL)].

Convolvulus sepium L. = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **sepium**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus sepium L. var. *americanus* Sims = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **americana** (Sims) Kitag.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus setifer (Poir.) Spreng. = **Ipomoea setifera** Poir.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus setosus (Ker Gawl.) Spreng. = **Ipomoea setosa** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus soldanella L. = **Calystegia soldanella** (L.) Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus tomentosus Vell. = **Ipomoea nil** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus triflorus Phil. = **Convolvulus bonariensis** Cav.

Convolvulus tuberculatus Desr. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Convolvulus tuguriorum G. Forst. = **Calystegia tuguriorum** (G. Forst.) R. Br. ex Hook. f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Convolvulus umbellatus L. = **Merremia umbellata** (L.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Convolvulus venustus auct. non Spreng. = **Ipomoea marginisepala** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Cressa L.

Número de especies: 2, 1 endémica

Cressa australis R. Br. var. *petiolata* Meisn. = **Cressa truxillensis** Kunth
Referencias: Austin, D. F., 2000.

Cressa cretica L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy = **Cressa truxillensis** Kunth
Referencias: Austin, D. F., 2000.

Cressa nudicaulis Griseb.
Referencias: Austin, D. F., 2000; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 491* (LIL)].

Cressa truxillensis Kunth
Sin.: *Cressa australis* R. Br. var. *petiolata* Meisn., *Cressa cretica* L. var. *truxillensis* (Kunth) Choisy
Referencias: Austin, D. F., 2000; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, COS, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, RME); PRY(APY); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30561* (F, MO, SI, UC)]; CHL[*Werdermann, E. 466* (F, MO, NY, UC)]; PRY[*Mereles, F. 6125* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Chebataroff, J. s.n.* (LIL)].

Cuscuta L.

Número de especies: 37, 20 endémicas, 3 introducidas

Cuscuta alataloba Yunck.
Sin.: *Cuscuta alataloba* Yunck. var. *monosperma* Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1063* (SI)].

Cuscuta alataloba Yunck. var. *monosperma* Yunck. = **Cuscuta alataloba** Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta americana L.
Sin.: *Cuscuta americana* L. var. *spectabilis* Progel, p.p.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Pontiroli, A., 1983b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 229* (CORD, S)].

Cuscuta americana L. var. *spectabilis* Progel, p.p. = **Cuscuta americana** L.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949; Yuncker, T. G., 1965.

Cuscuta andina Phil.
Sin.: *Cuscuta decora* Choisy var. *integriuscula* Engelm., *Cuscuta indecora* Choisy var. *integriuscula* (Engelm.) Yunck., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche
Referencias: Hunziker, A. T., 1949; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica.
Países: ARG(MEN); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gillies, J. s.n.* (MO)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (CORD)].

Cuscuta argentinana Yunck. var. **argentinana**
Sin.: *Cuscuta argentinana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1160* (SI)].

Cuscuta argentinana Yunck. var. **parviflora** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a; Hunziker, A. T., 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 13125* (LIL)].

Cuscuta argentinana Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta argentinana** Yunck. var. **argentinana**

Cuscuta aurea Phil. = **Cuscuta chilensis** Ker Gawl.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b; Yuncker, T. G., 1932.

Cuscuta bicolor Hunz. = **Cuscuta microstyla** Engelm. var. **bicolor** (Hunz.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta boliviana Yunck. var. **boliviana**
Sin.: *Cuscuta boliviana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 12500* (SI)].

Cuscuta boliviana Yunck. var. **paranensis** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a; Hunziker, A. T., 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 1626* (BAA)]; BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (SP)].

Cuscuta boliviana Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta boliviana** Yunck. var. **boliviana**

Cuscuta brevisquamata Yunck. = **Cuscuta flossdorfii** Hicken var. **flossdorfii**
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta campestris Yunck.
Sin.: *Cuscuta pentagona* Engelm. var. *calycina* Engelm.
Referencias: Costea, M., Nesom, G. L. & Stefanovic, S., 2006.; Fabris, H. A., 1965b; Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Múlgura, M. E., 1979; Pontiroli, A., 1983b; Rossow, R. A., 1999d; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, DFE, ERI, JUJ, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR); CHL(I, VI, VII, VIII, IX, RME); URY(CAS, FLO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15880* (SI)]; CHL[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; URY[*Arechavaleta, J. 5532* (MVFA)].

Cuscuta chilensis Ker Gawl.
Sin.: *Cuscuta aurea* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Hunziker, A. T., 1950b; Rossow, R. A., 1999d; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 1000–2300 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 13816* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Burkart, A. 9393* (SI)].

Cuscuta corniculata Engelm. var. *racemulosa* Engelm. = **Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta cristata Engelm. var. **chacoensis** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 4505* (SF)].

Cuscuta cristata Engelm. var. **cristata**
Sin.: *Cuscuta cristata* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Múlgura, M. E., 1979; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, LRI, SDE); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1297* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4789* (SI)].

Cuscuta cristata Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.
= **Cuscuta cristata** Engelm. var. **cristata**

Cuscuta decora Choisy var. *integriuscula* Engelm.
= **Cuscuta andina** Phil.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta epilinum Weihe
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barcos, A. s.n.* (BAB)].

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. f. *angustissima* Engelm. = **Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **angustissima** (Engelm.) Yunck.

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **angustissima** (Engelm.) Yunck.
Sin.: *Cuscuta epithymum* (L.) Murray ex L. f. *angustissima* Engelm.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); CHL(IX, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (CORD)].

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **epithymum**
Sin.: *Cuscuta epithymum* (L.) Murray ex L. var. *typica* Hunz., nom. inval., *Cuscuta europaea* L. var. *epithymum* L.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. 2952* (BAA)].

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. **macranthera** (Heldr. & Sartori ex Boiss.) Engelm.
Sin.: *Cuscuta macranthera* Heldr. & Sartori ex Boiss.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BAA)].

Cuscuta epithymum (L.) Murray ex L. var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **epithymum**

Cuscuta europaea L. var. *epithymum* L. = **Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **epithymum**

Cuscuta floribunda Phil. = **Cuscuta suaveolens** Ser.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta flossdorfii Hicken var. **flossdorfii**
Sin.: *Cuscuta brevisquamata* Yunck., *Cuscuta flossdorfii* Hicken var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 2500–4000 m.
Países: ARG(COR, LRI, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Flossdorf, A. 41* (SI)].

Cuscuta flossdorfii Hicken var. **microstyla** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Cuscuta flossdorfii Hicken var. **pampagrandensis** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 1888* (CORD, SI)].

Cuscuta flossdorfii Hicken var. **tucumanensis** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3057* (LIL)].

Cuscuta flossdorfii Hicken var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta flossdorfii** Hicken var. **flossdorfii**

Cuscuta friesii Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Pontiroli, A., 1983b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 3500–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 906* (CORD)].

Cuscuta globiflora Engelm.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Pontiroli, A., 1983b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11261* (SI)].

Cuscuta grandiflora Kunth
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Pontiroli, A., 1983b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jones, K. s.n.* (SI)].

Cuscuta incurvata Progel
Sin.: *Cuscuta incurvata* Progel var. *apaensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8178* (G)].

Cuscuta incurvata Progel var. *apaensis* Chodat & Hassl. = **Cuscuta incurvata** Progel
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.

Cuscuta indecora Choisy var. **indecora**
Sin.: *Cuscuta indecora* Choisy var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Fabris, H. A., 1965b; Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Múlgura, M. E., 1979; Rossow, R. A., 1999d.
Enredadera parásita. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, NEU, RNE, SDE); BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15680* (CORD, SI)]; BRA[*Frenzel, H. s.n.* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 17891* (CTES)].

Cuscuta indecora Choisy var. *integriuscula* (Engelm.) Yunck. = **Cuscuta andina** Phil.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta indecora Choisy var. **longisepala** Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Múlgura, M. E., 1979; Pontiroli, A., 1983b; Rossow, R. A., 1999d; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15879* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3478pp* (BA, LIL, SI)].

Cuscuta indecora Choisy var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta indecora** Choisy var. **indecora**

Cuscuta insquamata Yunck. var. **argentina** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Meyer, T. 5017* (LIL)].

Cuscuta longiloba Yunck.
Referencias: Yuncker, T. G., 1961.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas 13877* (S)].

Cuscuta macranthera Heldr. & Sartori ex Boiss. = **Cuscuta epithymum** (L.) Murray ex L. var. **macranthera** (Heldr. & Sartori ex Boiss.) Engelm.

Cuscuta membranacea Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 983* (LIL)].

Cuscuta micrantha Choisy var. **holwayi** Yunck.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Holway, E. W. D. s.n.* (NY)].

Cuscuta micrantha Choisy var. **latiflora** Engelm.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 464* (SI)].

Cuscuta micrantha Choisy var. **micrantha**
Sin.: *Cuscuta micrantha* Choisy var. *typica* Yunck., nom. inval.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 3000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Worth, C. R. 16235* (SI)].

Cuscuta micrantha Choisy var. *typica* Yunck., nom. inval. = **Cuscuta micrantha** Choisy var. **micrantha**

Cuscuta microstyla Engelm. var. **bicolor** (Hunz.) Hunz.
Sin.: *Cuscuta bicolor* Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Marticorena, C. & Quezada, M., 1988[1987].
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10243* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 815* (CONC)].

Cuscuta microstyla Engelm. var. **microstyla**
Sin.: *Cuscuta microstyla* Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 1600–3100 m.
Países: CHL(VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Reynolds s.n.* (CORD, K)].

Cuscuta microstyla Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta microstyla** Engelm. var. **microstyla**

Cuscuta obtusiflora Kunth
Sin.: *Cuscuta racemosa* Mart. var. *nuda* auct. non Engelm., *Cuscuta stuckertii* Yunck.
Referencias: Fabris, H. A., 1965b; Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Múlgura, M. E., 1979; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MEN, MIS, SFE, TUC); BRA(SCA); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 1304* (BA)]; BRA[*Reitz, P. R. 1723* (HBR)]; PRY[*Schinini, A. 4059* (SI)].

Cuscuta odorata Ruiz & Pav.
Referencias: Yuncker, T. G., 1922.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 600–1500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 38* (SGO)].

Cuscuta odorata Ruiz & Pav. var. *botrychoides* Hauman = **Cuscuta parodiana** Yunck. var. **tucumana** (Yunck.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta odorata Ruiz & Pav. var. *holwayana* Yunck. = **Cuscuta parodiana** Yunck. var. **parodiana**
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta parodiana Yunck. var. **parodiana**
Sin.: *Cuscuta odorata* Ruiz & Pav. var. *holwayana* Yunck., *Cuscuta parodiana* Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4000* (SI)].

Cuscuta parodiana Yunck. var. **tucumana** (Yunck.) Hunz.
Sin.: *Cuscuta odorata* Ruiz & Pav. var. *botrychoides* Hauman, *Cuscuta tucumana* Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.

Enredadera parásita. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BAA)].

Cuscuta parodiana Yunck. var. *typica* Hunz., nom. inval.
= **Cuscuta parodiana** Yunck. var. **parodiana**

Cuscuta partita Choisy
Referencias: Yuncker, T. G., 1922, 1965.
Enredadera parásita. Anual. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gardner, G. 2684* (*)].

Cuscuta pauciflora Phil.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Rossow, R. A., 1999d.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(RNE, SCR); CHL(VII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; CHL[*Gunckel, L. H. 2125* (SI)].

Cuscuta pentagona Engelm. var. *calycina* Engelm.
= **Cuscuta campestris** Yunck.
Referencias: Costea, M., Nesom, G. L. & Stefanovic, S., 2006.; Yuncker, T. G., 1932.

Cuscuta platyloba Progel var. **pampeana** Hunz.
Referencias: Fabris, H. A., 1965b; Hunziker, A. T., 1947a, 1949.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 4470* (CORD, LIL, SI)].

Cuscuta platyloba Progel var. **platyloba**
Sin.: *Cuscuta platyloba* Progel var. *triangulata* Yunck., *Cuscuta platyloba* Progel var. *typica* Hunz., nom. inval., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *calycina* Engelm.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Múlgura, M. E., 1979; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, RIV, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3025* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1411* (HBR)]; URY[*Osten, C. 17007* (BAF)].

Cuscuta platyloba Progel var. *triangulata* Yunck.
= **Cuscuta platyloba** Progel var. **platyloba**

Cuscuta platyloba Progel var. *typica* Hunz., nom. inval.
= **Cuscuta platyloba** Progel var. **platyloba**
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta purpurata Phil.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Beetle, A. A. 26113* (SI)].

Cuscuta pusilla Phil.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B)].

[Cuscuta racemosa Mart.]
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cuscuta racemosa Mart. var. *andina* (Phil.) Reiche
= **Cuscuta andina** Phil.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta racemosa Mart. var. *calycina* Engelm.
= **Cuscuta platyloba** Progel var. **platyloba**
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.

Cuscuta racemosa Mart. var. *chiliana* Engelm. = **Cuscuta suaveolens** Ser.
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta racemosa Mart. var. **nuda** Engelm.
Referencias: Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11349* (*)].

Cuscuta racemosa Mart. var. *nuda* auct. non Engelm.
= **Cuscuta obtusiflora** Kunth
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta rojasii Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947b.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 7292* (CORD)].

Cuscuta rotundiflora Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2680* (CORD, SI)].

Cuscuta rustica Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 4000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)].

Cuscuta stuckertii Yunck. = **Cuscuta obtusiflora** Kunth

Cuscuta suaveolens Ser.
Sin.: *Cuscuta floribunda* Phil., *Cuscuta racemosa* Mart. var. *chiliana* Engelm.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Fabris, H. A., 1965b; Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, SJU); CHL(I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); URY(ART, CAS, DUR, PAY, SAO, SJO, TAC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Cuezzo, A. R. 1877* (LIL)]; CHL[*Eyerdam, W. J. 24649* (SI)]; URY[*Felippone, F. 4785* (SI)].
Notas: Citada para Brasil sin mencionar material de referencia (Hunziker, 1950b).

Cuscuta trichostyla Engelm. = **Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**
Referencias: Hunziker, A. T., 1949.

Cuscuta trichostyla Engelm. var. *carinata* Yunck. = **Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **carinata** (Yunck.) Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta tucumana Yunck. = **Cuscuta parodiana** Yunck. var. **tucumana** (Yunck.) Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b.

Cuscuta werdermannii Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 300 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 880* (LIL, SI)].

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **carinata** (Yunck.) Yunck.
Sin.: *Cuscuta trichostyla* Engelm. var. *carinata* Yunck.
Referencias: Hunziker, A. T., 1950b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CEN, COA); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 5997* (NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 487* (BAF, LIL)]; URY[*Arechavaleta, J. 5538a, pp* (MVFA)].

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **lanceolata** Yunck.
Referencias: Fabris, H. A., 1965b; Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MIS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 15311* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6705* (FCQ)].

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **longibracteata** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval. = **Cuscuta xanthochortos** Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**

Cuscuta xanthochortos Mart. ex Engelm. var. **xanthochortos**
Sin.: *Cuscuta corniculata* Engelm. var. *racemulosa* Engelm., *Cuscuta trichostyla* Engelm., *Cuscuta xanthochortos* Mart. ex Engelm. var. *typica* Hunz., nom. inval.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1950b; Múlgura, M. E., 1979; Yuncker, T. G., 1932.
Enredadera parásita. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21870* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 30722* (LIL)]; PRY[*Jörgensen, P. 3478p.p.* (LIL)].

Cuscuta yunckeriana Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1947a, 1949; Rossow, R. A., 1999d.
Enredadera parásita. Anual. Endémica.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 1909* (LIL)].

Dichondra J.R. Forst. & G. Forst.

Número de especies: 4

Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Dichondra evolvulacea* Britton var. *argentea* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
Referencias: Austin, D. F., 1982; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 437* (CORD, CTES, SI)].

Dichondra argentea Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *macrophylla* Arechav. = **Dichondra sericea** Sw. var. **holosericea** (O´Donell) Fabris
Referencias: Austin, D. F., 1998.

Dichondra evolvulacea Britton var. *argentea* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze = **Dichondra argentea** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Dichondra evolvulacea Britton var. *villosa* (D. Parodi) Kuntze = **Dichondra macrocalyx** Meisn.

Dichondra macrocalyx Meisn.
Sin.: *Dichondra evolvulacea* Britton var. *villosa* (D. Parodi) Kuntze, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *macrocalyx* (Meisn.) Hoehne, *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *villosa* (D. Parodi) O´Donell, *Dichondra villosa* D. Parodi
Referencias: Buck, H. T., 1979.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, TUC); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6442* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12540* (NY)].

Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris
Sin.: *Dichondra repens* auct. non J.R. Forst. & G. Forst., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *microcalyx* Hallier f., *Dichondra sericea* Sw. var. *microcalyx* (Hallier f.) H.T. Buck
Referencias: Austin, D. F., 1982; Fabris, H. A., 1965b; Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SDE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IV, IX); PRY(COA, GUA); URY(CLA, DUR, FLA, MON, ROC).

Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 6358* (CTES)]; BRA[*Palacios 2341* (LIL)]; CHL[*Jiles, C. 649* (LIL)]; PRY[*Jörgensen, P. 4299* (LIL, LP)]; URY[*Osten, C. 4188* (MVM)].

Dichondra parviflora Meisn. = **Dichondra sericea** Sw. var. **sericea**

Dichondra repens auct. non J.R. Forst. & G. Forst. = **Dichondra microcalyx** (Hallier f.) Fabris
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. *holosericea* O'Donell = **Dichondra sericea** Sw. var. **holosericea** (O´Donell) Fabris

Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. *macrocalyx* (Meisn.) Hoehne = **Dichondra macrocalyx** Meisn.

Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. *microcalyx* Hallier f. = **Dichondra microcalyx** (Hallier f.) Fabris
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. *sericea* (Sw.) Choisy = **Dichondra sericea** Sw. var. **sericea**
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. *villosa* (D. Parodi) O´Donell = **Dichondra macrocalyx** Meisn.

Dichondra sericea Sw. var. **holosericea** (O´Donell) Fabris
Sin.: *Dichondra argentea* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *macrophylla* Arechav., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *holosericea* O'Donell
Referencias: Buck, H. T., 1979; Fabris, H. A., 1965b; Fortunato, R. H., 1999a; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; O'Donell, C. A., 1959c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, LPA, LRI, MEN, RNE, SDE, SLU); CHL(IV, V, VII, VIII, IX); URY(ART, FLO, FLA, MAL, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ariza Espinar, L. 327* (CORD)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (US)]; URY[*Rosengurtt, B. 797* (LIL)].

Dichondra sericea Sw. var. *microcalyx* (Hallier f.) H.T. Buck = **Dichondra microcalyx** (Hallier f.) Fabris

Dichondra sericea Sw. var. **sericea**
Sin.: *Dichondra parviflora* Meisn., *Dichondra repens* J.R. Forst. & G. Forst. var. *sericea* (Sw.) Choisy
Referencias: Alonso Paz, E. & Bassagoda, M. J., 2003; Austin, D. F., 1982; Buck, H. T., 1979; Fabris, H. A., 1965b; O'Donell, C. A., 1959c; Rundel, P. W., Dillon, M. O. & Palma, B., 1996.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(RGS); CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); PRY(CEN, COA, PAI); URY(CLA, LAV, MAL, MON, ROC, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2231* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994904* (CONC)]; PRY[*Zardini, E. M. 22594* (AS, MO)]; URY[*Alonso Paz, E. 3644* (MVFQ)].

Dichondra sericea Sw. var. **tomentosa** H.T. Buck ex Tronc. & Bacigalupo
Referencias: Buck, H. T., 1977, 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI); URY(RIV, SJO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30072* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 9606* (MVFA)].

Dichondra villosa D. Parodi = **Dichondra macrocalyx** Meisn.

Evolvulus L.

Número de especies: 20, 1 endémica

Evolvulus alsinoides (L.) L.
Sin.: *Convolvulus alsinoides* L.
Referencias: Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 3468* (FCQ, MO)].

Evolvulus anomalus Meisn. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **sericeus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus araucanus Phil. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **sericeus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1957, 1959b.

Evolvulus arizonicus A. Gray
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1959b; Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20881* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2635* (FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 1078-b* (SI)].

Evolvulus aurigenius Mart.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Santos s.n.* (NY)].

Evolvulus aurigenius Mart. var. *viscidulus* Hassl. = **Evolvulus barbatus** Meisn.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.

Evolvulus barbatus Meisn.
Sin.: *Evolvulus aurigenius* Mart. var. *viscidulus* Hassl.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13207* (S)]; PRY[*Hassler, E. 9815* (B, BM, K, P)].

Evolvulus cardiophyllus Schltdl.
Referencias: Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 26248* (FCQ, MO)].

Evolvulus chamaepitys Mart. var. **paraguayensis** Ooststr.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11103* (B, BM, K, P)].

Evolvulus chrysotrichos Meisn.
Sin.: *Evolvulus guaraniticus* Chodat & Hassl.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7936* (B, K, P)].

Evolvulus convolvuloides (Willd.) Stearn
Sin.: *Evolvulus glaber* Spreng., *Nama convolvuloides* Willd.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b; Stearn, W. T., 1972.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 517* (CORD, CTES, SI)]; PRY[*Soria, N. 1259* (SI)].

Evolvulus corumbaensis Hoehne
Sin.: *Evolvulus pseudofilipes* Hassl., nom. nud.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4086* (B, K, L, M)].

Evolvulus echioides Moric. = **Evolvulus glomeratus** Nees & Mart. f. **echioides** (Moric.) Ooststr.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.

Evolvulus elegans Moric. var. **capillaceus** Meisn.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA);
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10750* (B, K, P)].

Evolvulus falcatus Griseb. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus filipes Mart.
Sin.: *Evolvulus filipes* Mart. var. *exilis* (Meisn.) Chodat & Hassl.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4833* (B, G, K, L, M, SI, US)].

Evolvulus filipes Mart. var. *exilis* (Meisn.) Chodat & Hassl. = **Evolvulus filipes** Mart.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.

Evolvulus glaber Spreng. = **Evolvulus convolvuloides** (Willd.) Stearn
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Evolvulus glomeratus Nees & Mart. f. **echioides** (Moric.) Ooststr.
Sin.: *Evolvulus echioides* Moric.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17391* (S)].

Evolvulus glomeratus Nees & Mart. subsp. **grandiflorus** (D. Parodi) Ooststr.
Sin.: *Evolvulus grandiflorus* D. Parodi, *Evolvulus martii* Meisn. f. *saltense* Arechav., *Evolvulus paraguariensis* Chodat & Hassl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b, c; Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); PRY(GUA); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ibarrola, T. 2671* (SI)]; PRY [*Jörgensen, P. 3477* (SI)]; URY[*Osorio, H. s.n.* (MVM)].

Evolvulus grandiflorus D. Parodi = **Evolvulus glomeratus** Nees & Mart. subsp. **grandiflorus** (D. Parodi) Ooststr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus guaraniticus Chodat & Hassl. = **Evolvulus chrysotrichos** Meisn.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.

Evolvulus hasslerianus Chodat
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 6362* (FCQ)].

Evolvulus holosericeus Kunth = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **sericeus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus incanus Pers. var. *elongatus* Choisy = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus latifolius Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b; Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 29028* (CTES)]; PRY[*Rojas, T. 8513* (AS)].

Evolvulus linarioides Meisn.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 2402* (B, P)].

Evolvulus martii Meisn. f. *saltense* Arechav. = **Evolvulus glomeratus** Nees & Mart. subsp. **grandiflorus** (D. Parodi) Ooststr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus nummularius (L.) L.
Sin.: *Convolvulus nummularius* L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1959b; Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL, SDE); PRY(APY, AMA, CON, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30288* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5566* (FCQ), *Vanni, R. O. 2338* (CTES)].

Evolvulus paraguariensis Chodat & Hassl. = **Evolvulus glomeratus** Nees & Mart. subsp. **grandiflorus** (D. Parodi) Ooststr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus pseudofilipes Hassl., nom. nud. = **Evolvulus corumbaensis** Hoehne
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.

Evolvulus pusillus Choisy
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbustifome. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Burkart, A. 25181* (SI)].

Evolvulus sericeus Sw. f. **pedunculatus** Ooststr.
Referencias: Buck, H. T., 1979.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Okada, K. A. 15* (SI)].

Evolvulus sericeus Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell
Sin.: *Evolvulus falcatus* Griseb., *Evolvulus incanus* Pers. var. *elongatus* Choisy, *Evolvulus sericeus* Sw. var. *falcatus* (Griseb.) Ooststr., *Leucomalla lanuginosa* Phil.
Referencias: Fortunato, R. H., 1999a; O'Donell, C. A., 1957, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, JUJ, MEN, RNE, SAL, SCR, TUC); CHL(RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 354* (SI)]; CHL[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LP)].

Evolvulus sericeus Sw. var. *falcatus* (Griseb.) Ooststr. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus sericeus Sw. var. *holosericeus* (Kunth) Ooststr. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **sericeus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus sericeus Sw. var. *latior* Meisn. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **sericeus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Evolvulus sericeus Sw. var. **sericeus**
Sin.: *Evolvulus anomalus* Meisn., *Evolvulus araucanus* Phil., *Evolvulus holosericeus* Kunth, *Evolvulus sericeus* Sw. var. *holosericeus* (Kunth) Ooststr., *Evolvulus sericeus* Sw. var. *latior* Meisn.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–3500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SLU); BRA(RGS, SCA); CHL(VIII); PRY(APY, CEN, CON, COA, GUA, PAI); URY(COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8081* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 27530* (SI)]; CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO)]; PRY[*Mereles, F. 5055* (CTES, FCQ)]; URY[*Rosengurtt, B. 516* (SI)].

Evolvulus serpylloides Meisn.
Referencias: Ooststroom, S. J., 1934.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9182* (S)].

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var. **cinereus** Chodat & Hassl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b; Ooststroom, S. J., 1934.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BA)]; PRY[*Rojas, T. 3391* (AS, MO, SI)].

Evolvulus tenuis Mart. ex Choisy var. **tenuis**
Referencias: Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 2389* (SI)].

Gomphipus setosus Raf. = **Ipomoea setosa** Ker Gawl.

Ipomoea L.

Número de especies: 70, 30 endémicas, 3 introducidas

Ipomoea aculeata (L.) Kuntze var. *bona-nox* (L.) Kuntze = **Ipomoea alba** L.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea acuminata (Vahl) Roem. & Schult. = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea acutisepala O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950a, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 1812* (LIL)]; BRA[*Krapovickas, A. 43574* (CTES)].

Ipomoea aegyptia L. = **Merremia aegyptia** (L.) Urb.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Ipomoea alba L.
Sin.: *Calonyction aculeatum* (L.) House, *Calonyction bona-nox* (L.) Bojer, *Calonyction pulcherrimum* D. Parodi, *Calonyction speciosum* Choisy, *Convolvulus aculeatus* L., *Convolvulus aculeatus* L. var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Convolvulus bona-nox* (L.) Spreng., *Convolvulus pulcherrimus* Vell., *Ipomoea aculeata* (L.) Kuntze var. *bona-nox* (L.) Kuntze, *Ipomoea bona-nox* L.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b, c; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1131* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1881* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 22050* (AS, MO, SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 3040* (MVM)].

Ipomoea altoparanaensis O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1952.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5812* (LIL, SI)].

Ipomoea amnicola Morong
Sin.: *Ipomoea nuda* N.E. Br., nom. illeg.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rotman, A. D. 586* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5680* (CTES, FCQ, MO)].

Ipomoea argentea Meisn.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1960b.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. s.n.* (S)]; PRY[*Rojas, T. 10055* (BM)].

Ipomoea argentina N.E. Br. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F., 1999; O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea argentinensis Speg. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F., 1999; O'Donell, C. A., 1950a.

Ipomoea argentinica Peter
Sin.: *Argyreia juramenti* (Kuntze) K. Schum., *Ipomoea juramenti* (Kuntze) O´Donell, *Murucoa juramenti* Kuntze
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Austin, D. F., 1999; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34479* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9048* (MO)].

Ipomoea argyreia (Choisy) Meisn. f. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Ipomoea paraguariensis** Peter
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea argyreia (Choisy) Meisn. f. *oblongifolia* Hassl. = **Ipomoea oblongifolia** (Hassl.) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.

Ipomoea argyreia (Choisy) Meisn. f. *salicifolia* Hassl., nom. illeg. = **Ipomoea paraguariensis** Peter
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea argyreia (Choisy) Meisn. var. *discolor* Hassl. = **Ipomoea paraguariensis** Peter
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea argyreia (Choisy) Meisn. var. *paraguariensis* (Peter) Chodat & Hassl. = **Ipomoea paraguariensis** Peter
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea aristolochaefolia G. Don
Sin.: *Convolvulus aristolochiifolius* Kunth, nom. illeg., *Ipomoea austinsmithii* Standl., *Ipomoea concinna* House, *Ipomoea cordata* L.B. Sm. & B.G. Schub., *Ipomoea peckoltii* Meisn., *Ipomoea peninsularis* Brandegee, *Ipomoea tuerckheimii* Vatke ex Donn. Sm., *Ipomoea tweediei* Hook.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34344* (SI)].

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult.
Sin.: *Convolvulus asarifolius* Desr., *Ipomoea nymphaeifolia* Griseb., *Ipomoea pes-caprae* (L.) Sweet var. *heterosepala* Chodat & Hassl., *Ipomoea urbica* (Salzm. ex Choisy) Choisy, *Ipomoea urbica* (Salzm. ex Choisy) Choisy var. *muricata* Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(APY, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ibarrola, T. 377* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 13599* (LIL)].

Ipomoea assumptionis Britton = **Ipomoea setifera** Poir.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea austinsmithii Standl. = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea biglandulosa Arechav. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bogotensis (Kunth) G. Don = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea bona-nox L. = **Ipomoea alba** L.
Referencias: Austin, D. F., 1982; O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook.
Sin.: *Convolvulus hookerianus* D. Dietr., nom. superfl., *Ipomoea biglandulosa* Arechav., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *cordata* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *glabrata* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. f. *intermedia* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. subsp. *mollis* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *calvescens* Hallier f., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *chacoensis* O'Donell, *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *cordifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *grandiflora* Chodat & Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *pubisepala* Hassl., *Ipomoea bonariensis* Hook. var. *rupestris* Chodat & Hassl., *Ipomoea digitata* L. var. *septemfida* auct. non Meisn., *Ipomoea heterotricha* Didr. var. *homotricha* Chodat & Hassl., *Ipomoea heterotricha* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea obtusiloba* Meisn., *Ipomoea obtusiloba* Meisn. var. *tridens* Meisn.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1959b, c; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, COA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, COL, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Porta, R. E. 190* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10461* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 10022* (MO)]; URY[*Berro, M. B. 2568* (LIL)].

Ipomoea bonariensis Hook. f. *cordata* Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. f. *glabrata* Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea bonariensis Hook. f. *intermedia* Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *calvescens* Hallier f. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *chacoensis* O'Donell = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *cordifolia* Chodat & Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *grandiflora* Chodat & Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *pubisepala* Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. var. *rupestris* Chodat & Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea bonariensis Hook. subsp. *mollis* Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea cairica (L.) Sweet
Sin.: *Batatas cavanillesii* (Roem. & Schult.) G. Don, *Convolvulus cairicus* L., *Convolvulus cavanillesii* (Roem. & Schult.) Spreng., *Convolvulus limphaticus* Vell., *Convolvulus tuberculatus* Desr., *Ipomoea cairica* (L.) Sweet var. *uniflora* (Meisn.) Hoehne, *Ipomoea cavanillesii* Roem. & Schult., *Ipomoea funaria* Larrañaga, *Ipomoea heptaphylla* Voigt, nom. illeg., *Ipomoea palmata* Forssk., *Ipomoea pentaphylla* Cav., nom. illeg., *Ipomoea rosea* Choisy var. *pluripartita* Hassl., *Ipomoea stipulacea* Jacq., *Ipomoea tuberculata* (Desr.) Roem. & Schult.
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998; Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, PAI, PHA); URY(ART, COL, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 4436* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 5087* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 18326* (AS, MO, SI)]; URY[*Cabrera, A. L. 4026* (LP, SI)].

Ipomoea cairica (L.) Sweet var. *uniflora* (Meisn.) Hoehne = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea carnea Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Sin.: *Batatas crassicaulis* Benth., *Ipomoea crassicaulis* (Benth.) Robinson, *Ipomoea fistulosa* Mart. ex Choisy, *Ipomoea gossypioides* D. Parodi, *Ipomoea texana* Coult.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Austin, D. F., 1977; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CAA, CEN, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 654* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 6150* (CTES, FCQ, MO), *Zardini, E. M. 27688* (MO, SI)].

Ipomoea cathartica Poir. = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea cavanillesii Roem. & Schult. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f. *chacoensis* Hassl. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Austin, D. F., 1999.

Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f. *obtusiflora* Hassl. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F., 1999.

Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f. *palmirense* Arechav. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f. *platensis* Hassl. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. f. *yapeyuana* Arechav. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea cernua (Moric.) Arechav. var. *ambigua* (Meisn.) Arechav. = **Aniseia argentina** (N.E. Br.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F., 1999; O'Donell, C. A., 1959c.

Ipomoea cheirophylla O'Donell
Sin.: *Ipomoea digitata* auct. non L., *Ipomoea digitata* L. var. *platensis* auct. non (Ker Gawl.) Lindl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Solís Neffa, V. 588* (CTES)]; PRY[*Rojas, T. 3031* (SI)].

Ipomoea chilensis A. Braun & Bouché = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea chiliantha Hallier f.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(APY, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2651* (LIL)]; PRY[*Degen, R. 2707* (FCQ)].

Ipomoea chodatiana O'Donell
Sin.: *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. f. *argentea* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. f. *canescens* Hassl., *Ipomoea polymorpha* Riedel ex Meisn. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. f. *retusa* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *elliptica* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Ipomoea uruguayensis* Meisn. var. *sericea* Chodat & Hassl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950a.
Hierba o enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN, CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4681* (G)].

Ipomoea chondrosepala Hallier f.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1237* (BM, CTES, MO, PY)].

Ipomoea cissoides (Lam.) Griseb. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea coccinea auct. non L. = **Ipomoea rubriflora** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959a.

Ipomoea concinna House = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea congesta R. Br. = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea contorquens Choisy = **Merremia contorquens** (Choisy) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea cordata L.B. Sm. & B.G. Schub. = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea cordatotriloba Dennst. var. **australis** (O'Donell) D.F. Austin
Sin.: *Ipomoea trichocarpa* Elliot, nom. illeg., *Ipomoea trichocarpa* Elliott var. *australis* O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998; Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4642* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 9984* (FCQ, MO)].

[Ipomoea cornucopia Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea crassicaulis (Benth.) Robinson = **Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F., 1977.

Ipomoea crinicalyx S. Moore
Sin.: *Convolvulus crinicalix* (S. Moore) Kuntze, *Ipomoea seleri* Millsp.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4045* (SI)].

Ipomoea cuneifolia A. Gray = **Ipomoea plummerae** A. Gray var. **cuneifolia** (A. Gray) J.F. Macbr.
Referencias: McDonald, J., 1995.

Ipomoea cuspidata Ruiz & Pav. = **Ipomoea nil** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea dactylophylla Griseb. = **Ipomoea subrevoluta** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea descolei O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950c, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 340* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3583* (SI)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10896* (LIL)].

Ipomoea dichotoma auct. non Choisy = **Ipomoea marginisepala** O'Donell

Ipomoea digitata auct. non L. = **Ipomoea cheirophylla** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea digitata L. var. *platensis* auct. non (Ker Gawl.) Lindl. = **Ipomoea cheirophylla** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea digitata L. var. *septemfida* auct. non Meisn. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea digitata L. var. *septempartita* Meisn. = **Ipomoea platensis** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea dissecta (Jacq.) Pursh var. *edentata* Meisn. = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea dissecta (Jacq.) Pursh var. *maximiliani* (Meisn.) O´Donell = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F. & Cavalcante, P. B., 1982; O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea diversifolia Lindl. = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult.
Sin.: *Convolvulus dumetorum* Kunth, *Convolvulus glaucescens* Kunth, *Convolvulus pauciflorus* Roem. & Schult., *Convolvulus pauciflorus* Roem. & Schult. var. *chilensis* (A. Braun & Bouché) Kuntze, *Convolvulus pulchellus* Kunth, *Ipomoea chilensis* A. Braun & Bouché, *Ipomoea dumetorum* Willd. ex Roem. & Schult. var. *glaucescens* (Kunth) Choisy, *Ipomoea oligantha* Choisy, *Ipomoea paposana* Phil., *Ipomoea pulchella* (Kunth) G. Don, comb. superfl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1957, 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 900–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(II); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30488* (SI)]; CHL[*Johnston, I. M. 5311* (GH, S, US)]; PRY[*Degen, R. 3288* (FCQ)].

Ipomoea dumetorum Willd. ex Roem. & Schult. var. *glaucescens* (Kunth) Choisy = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea estrellensis O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1952.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10052* (G), *Rojas, T. 6260* (LIL)].

Ipomoea evolvuloides Moric. = **Jacquemontia evolvuloides** (Moric.) Meisn.
Referencias: Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1982.

Ipomoea fiebrigii Hassl. ex O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1948.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5675* (G, LIL, SI)].

Ipomoea filipedunculata Rusby = **Jacquemontia blanchetii** Moric.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea fimbriosepala Choisy
Sin.: *Aniseia hastata* Meisn., *Ipomoea phylloneura* Baker
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, MIS); PRY(PHA); URY(COL, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 5602* (LIL)]; PRY[*Krapovickas, A. 45113* (CTES)]; URY[*Del Puerto, O. 1294* (MVFA)].

Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy = **Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F., 1977.

Ipomoea fulva Bertol. = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea funaria Larrañaga = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea glabra (Aubl.) Choisy = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea glandulifera Ruiz & Pav. = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea gossypioides D. Parodi = **Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea gracilipes Hassl. = **Ipomoea wrightii** A. Gray
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Ipomoea grandifolia (Dammer) O´Donell
Sin.: *Ipomoea triloba* auct. non L., *Jacquemontia grandifolia* Dammer
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; O'Donell, C. A., 1952, 1959b.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAN, CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART, CLA, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29422* (SI)]; BRA[*Dlouhy, C. 7287* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 22056* (MO, SI)]; URY[*Felippone, F. 3583* (SI)].

[Ipomoea granulosa Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea grisebachiana Meisn. = **Iseia luxurians** (Moric.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F., 1982; O'Donell, C. A., 1953b.

[Ipomoea guaranitica Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea hassleriana Chodat & Hassl. = **Merremia hassleriana** (Chodat & Hassl.) Hassl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea hederifolia L.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1594* (SI)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 6196* (NY)].

Ipomoea hederifolia auct. non L. = **Ipomoea rubriflora** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959a.

Ipomoea heptaphylla Voigt, nom. illeg. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Ipomoea hermanniae (L'Hér.) G. Don = **Convolvulus hermanniae** L'Hér.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Ipomoea heterotricha Meisn., nom. illeg. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea heterotricha Didr. var. *homotricha* Chodat & Hassl. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea hieronymi (Kuntze) O´Donell
Sin.: *Argyreia hieronymi* (Kuntze) K. Schum., *Argyreia megapotamica* Griseb., *Argyreia megapotamica* Griseb. var. *puberula* Griseb., *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O´Donell var. *calchaquina* O'Donell, *Ipomoea hieronymi* (Kuntze) O´Donell var. *kurtziana* (O´Donell) O´Donell, *Ipomoea kurtziana* O'Donell, *Ipomoea megapotamica* auct. non Choisy, *Murucoa hieronymi* Kuntze, *Murucoa megapotamica* (Griseb.) Kuntze
Referencias: O'Donell, C. A., 1948, 1959b; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–2400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10650* (SI)].

Ipomoea hieronymi (Kuntze) O´Donell var. *calchaquina* O'Donell = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea hieronymi (Kuntze) O´Donell var. *kurtziana* (O´Donell) O´Donell = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea hirsutula Jacq. = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea homotrichoidea O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1948.
Hierba. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 4051* (LIL)].

Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.
Sin.: *Convolvulus acuminatus* Vahl, *Convolvulus bogotensis* Kunth, *Convolvulus congestus* (R. Br.) Spreng., *Convolvulus indicus* Burm. f., *Convolvulus mollis* Kunth, *Convolvulus portoricensis* Spreng., *Ipomoea acuminata* (Vahl) Roem. & Schult., *Ipomoea bogotensis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea cathartica* Poir., *Ipomoea congesta* R. Br., *Ipomoea mollis* (Kunth) G. Don, *Ipomoea portoricensis* (Spreng.) G. Don, *Ipomoea*

vahliana House, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy, *Pharbitis acuminata* (Vahl) Choisy var. *congesta* Choisy, *Pharbitis bogotensis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis cathartica* (Poir.) Choisy, *Pharbitis mollis* (Kunth) Choisy, *Pharbitis rosea* Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1957, 1959c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(V); PRY(GUA, PAI); URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29507* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44670* (CTES)]; CHL[*Pahlman s.n.* (S)]; PRY[*Zardini, E. M. 5916* (MO, PY)]; URY[*Felippone, F. 3917* (SI)].

Ipomoea indivisa (Vell.) Hallier f.
Sin.: *Convolvulus indivisus* Vell.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959a, b, c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, MON, PAY, ROC, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29370* (SI)]; BRA[*Palacios 4171* (LIL, SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 5475* (LIL)].

Ipomoea jamesonii Choisy = **Iseia luxurians** (Moric.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F., 1982; O'Donell, C. A., 1953b.

Ipomoea jujuyensis O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1948, 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–2600 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8741* (SI)].

Ipomoea juramenti (Kuntze) O´Donell = **Ipomoea argentinica** Peter
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea kunthiana Meisn.
Sin.: *Ipomoea tacuaremboensis* Arechav., *Ipomoea tacuaremboensis* Arechav. f. *foliosa* Arechav.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(APA); URY(CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 798* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 1005* (S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 3715* (LIL)]; URY[*Arechavaleta, J. 458* (MVM)].

Ipomoea kurtziana O'Donell = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell

Ipomoea lanuginosa O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950c, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 5611* (LIL)]; PRY[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)].

Ipomoea lilloana O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1948, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Barboza, G. E. 751* (CORD)].

Ipomoea lineariloba Peter = **Ipomoea platensis** Ker Gawl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea lobata (Cerv. ex La Llave & Lex.) Thell.
Sin.: *Mina lobata* Cerv.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34809* (SI)].

Ipomoea longicuspis Meisn., nom. illeg. = **Ipomoea nil** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea luxurians Moric. = **Iseia luxurians** (Moric.) O´Donell
Referencias: Austin, D. F., 1982; O'Donell, C. A., 1953b.

Ipomoea macrocalyx (Ruiz & Pav.) Choisy = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea malpighipila O'Donell
Sin.: *Ipomoea malpighipila* O'Donell var. *aemilii* O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; O'Donell, C. A., 1950c, 1959b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, AMA, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1666* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5684* (LIL, SI)].

Ipomoea malpighipila O'Donell var. *aemilii* O'Donell = **Ipomoea malpighipila** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea malvaeoides Meisn. f. *apiculata* Chodat & Hassl. = **Ipomoea paludosa** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea malvaeoides Meisn. var. **argentea** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 8811* (LIL)].

Ipomoea malvaeoides Meisn. var. *integrifolia* Chodat & Hassl. = **Ipomoea paludosa** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea malvaeoides Meisn. var. **lineariloba** Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tell Bertoni, G. 730* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1073* (G)].

Ipomoea malvaeoides Meisn. var. **malvaeoides**
Sin.: *Ipomoea pinifolioides* Arechav.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; O'Donell, C. A., 1959c.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(CAN, CEN, CON); URY(ART, RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 270* (SI)]; PRY[*Jiménez, B. 1962* (BM, G, MO, PY)]; URY[*Legrand, C. M. D. H. 3482* (MVM)].

Ipomoea malvaeoides Meisn. var. *nitida* (Griseb.) Hallier f. = **Ipomoea nitida** Griseb.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea malvaeoides Meisn. var. *uliginosa* Chodat & Hassl. = **Ipomoea paludosa** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea marginisepala O'Donell
Sin.: *Convolvulus venustus* auct. non Spreng., *Ipomoea dichotoma* auct. non Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950a, 1959b.
Enredadera. Anual. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Taylor, C. M. 11447* (SI)].

Ipomoea maurandioides Meisn.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni 2568* (LIL)]; BRA[*Sellow, F. 3619* (B)]; PRY[*Zardini, E. M. 3761* (FCQ, MO)].

Ipomoea maximiliani Meisn. = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea megapotamica auct. non Choisy = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea minuta R.E. Fr. = **Ipomoea plummerae** A. Gray var. **plummerae**
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; McDonald, J., 1995.

Ipomoea minuta R.E. Fr. f. *adiantifolia* (Ooststr.) O´Donell = **Ipomoea plummerae** A. Gray var. **plummerae**
Referencias: McDonald, J., 1995.

Ipomoea mollis (Kunth) G. Don = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea montevidensis (Spreng.) G. Don = **Convolvulus crenatifolius** Ruiz & Pav.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea morongii Britton
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950c.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Morong, T. 303* (NY)].

Ipomoea muricata (L.) Jacq., nom. illeg. = **Ipomoea turbinata** Lag.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Ipomoea nil (L.) Roth
Sin.: *Convolvulus nil* L., *Convolvulus tomentosus* Vell., *Ipomoea cuspidata* Ruiz & Pav., *Ipomoea longicuspis* Meisn., nom. illeg., *Ipomoea scabra* Forssk., *Pharbitis cuspidata* (Ruiz & Pav.) G. Don
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Muñoz, J. D., 1996; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(CEN, COA, PAI); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Huidobro, A. M. 5062* (LIL)]; PRY[*Pérez de Molas 8974* (CTES), *Zardini, E. M. 20048* (AS, MO)]; URY[*Arechavaleta, J. 5965* (MVFA)].

[Ipomoea nitens Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea nitida Griseb.
Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *nitida* (Griseb.) Hallier f.
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998; Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 6881* (LIL)]; BRA[*Bueno, O. L. 409* (CTES)]; URY[*Marchesi, E. 14276* (MVFA)].

Ipomoea nuda N.E. Br., nom. illeg. = **Ipomoea amnicola** Morong
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea nymphaeifolia Griseb. = **Ipomoea asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea oblongifolia (Hassl.) O'Donell
Sin.: *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. f. *oblongifolia* Hassl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950a.

Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 9821* (LIL)].

Ipomoea obtusiloba Meisn. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea obtusiloba Meisn. var. *tridens* Meisn. = **Ipomoea bonariensis** Hook.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea oligantha Choisy = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea oranensis O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1948, 1959b.
Enredadera. Endémica. 1800 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pierotti, A. 280* (LIL)].

Ipomoea padillae O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 1671* (SI)].

Ipomoea palmata Forssk. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea paludosa O'Donell
Sin.: *Ipomoea malvaeoides* Meisn. f. *apiculata* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *integrifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea malvaeoides* Meisn. var. *uliginosa* Chodat & Hassl., *Ipomoea paludosa* O'Donell var. *uliginosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1950a, 1959b.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1955* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 45851* (CTES)].

Ipomoea paludosa O'Donell var. *uliginosa* (Chodat & Hassl.) O'Donell = **Ipomoea paludosa** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea papiru Ruiz & Pav. = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea papiru Ruiz & Pav. var. *subtriloba* (Ruiz & Pav.) Pers. = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea paposana Phil. = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea paraguariensis Peter
Sin.: *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. f. *salicifolia* Hassl., nom. illeg., *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. var. *discolor* Hassl., *Ipomoea argyreia* (Choisy) Meisn. var. *paraguariensis* (Peter) Chodat & Hassl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1953a.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: PRY(CAU, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 4846* (NY, S, SI)].

[Ipomoea paranaensis Hoehne]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea paulistana O'Donell, nom. illeg. = **Ipomoea saopaulista** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea peckoltii Meisn. = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea peninsularis Brandegee = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea pentaphylla Cav., nom. illeg. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea pentaphylla Jacq., nom. illeg. = **Merremia aegyptia** (L.) Urb.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br.
Sin.: *Convolvulus pes-caprae* L.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 6060* (NY)].

Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet var. *heterosepala* Chodat & Hassl. = **Ipomoea asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea phylloneura Baker = **Ipomoea fimbriosepala** Choisy

Ipomoea pinifolioides Arechav. = **Ipomoea malvaeoides** Meisn. var. **malvaeoides**
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea platensis Ker Gawl.
Sin.: *Convolvulus platensis* (Ker Gawl.) Spreng., *Ipomoea digitata* L. var. *septempartita* Meisn., *Ipomoea lineariloba* Peter

Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b, c.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, SDE, SFE, TUC); PRY(CEN, SPE); URY(MON, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Di Giácomo, A. 377* (CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 44910* (CTES, G)]; URY[*Rosengurtt, B. 5094* (LIL)].

Ipomoea plummerae A. Gray var. **cuneifolia** (A. Gray) J.F. Macbr.
Sin.: *Ipomoea cuneifolia* A. Gray
Referencias: McDonald, J., 1995.
Enredadera. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8557* (US)].

Ipomoea plummerae A. Gray var. **plummerae**
Sin.: *Ipomoea minuta* R.E. Fr., *Ipomoea minuta* R.E. Fr. f. *adiantifolia* (Ooststr.) O'Donell, *Ipomoea polymorpha* auct. non Riedel ex Meisn.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; McDonald, J., 1995.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1500–4500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9141* (SI)].

Ipomoea polyanthes Roem. & Schult., nom. illeg. = **Merremia umbellata** (L.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea polymorpha auct. non Riedel ex Meisn. = **Ipomoea plummerae** A. Gray var. **plummerae**

Ipomoea polymorpha Riedel ex Meisn. f. *argentea* Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.

Ipomoea polymorpha Riedel ex Meisn. f. *canescens* Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.

Ipomoea polymorpha Riedel ex Meisn. var. *discolor* Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.

Ipomoea polymorpha Riedel ex Meisn. var. *glabra* Griseb. = **Convolvulus laciniatus** Desr. var. **laciniatus**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea portoricensis (Spreng.) G. Don = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

[Ipomoea pseudocalystegia Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Ipomoea pseudomalvaeoides Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

[Ipomoea pseudomalvaeoides Chodat & Hassl. f. palmata Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

[Ipomoea pseudomalvaeoides Chodat & Hassl. f. sericea Chodat & Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

[Ipomoea pseudomalvaeoides Chodat & Hassl. f. trispathulata Chodat]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea pubescens Lam.
Sin.: *Batatas papiru* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Batatas subtriloba* (Ruiz & Pav.) G. Don, *Convolvulus papiru* (Ruiz & Pav.) Spreng., *Convolvulus pubescens* (Lam.) Willd., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav., *Ipomoea papiru* Ruiz & Pav. var. *subtriloba* (Ruiz & Pav.) Pers., *Ipomoea subtriloba* Ruiz & Pav., *Pharbitis pubescens* (Lam.) Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5072* (SI)].

Ipomoea pulchella (Kunth) G. Don, comb. superfl. = **Ipomoea dumetorum** Willd. ex Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea pulchella Roth = **Ipomoea wrightii** A. Gray
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Ipomoea pulchella Roth var. *lineariloba* Hassl. = **Ipomoea wrightii** A. Gray
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Ipomoea purpurea (L.) Roth
Sin.: *Convolvulus purpureus* L., *Ipomoea diversifolia* Lindl., *Ipomoea glandulifera* Ruiz & Pav., *Ipomoea hirsutula* Jacq., *Ipomoea purpurea* (L.) Roth var. *diversifolia* (Lindl.) O'Donell, *Pharbitis hispida* Choisy, *Pharbitis purpurea* (L.) Voigt
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1957, 1959b, c; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, JUJ, LRI, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(V, RME); URY(MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34341* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11030* (NY)]; CHL[*Matthei, O. R. 516* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 3136* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Austin & Huáman, 1996).

Ipomoea purpurea (L.) Roth var. *diversifolia* (Lindl.) O'Donell = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea quamoclit L.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5722* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9904* (S)]; PRY[*Schwarz, G. J. 12023* (LIL)].

Ipomoea radicans Bertero ex Choisy = **Ipomoea wrightii** A. Gray
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Ipomoea ramboi O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.
Hierba. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 28183* (LIL)].

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy
Sin.: *Convolvulus ramosissimus* Poir., *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy f. *rosea* (Hallier f.) O´Donell, *Ipomoea ramosissima* (Poir.) Choisy var. *rosea* Hallier f.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1952, 1959b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Negritto, M. A. 495* (CORD, CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14507* (NY)]; PRY[*Mereles, F. 5948* (FCQ)].

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy f. *rosea* (Hallier f.) O´Donell = **Ipomoea ramosissima** (Poir.) Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy var. *rosea* Hallier f. = **Ipomoea ramosissima** (Poir.) Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea riparia G. Don = **Ipomoea rubens** Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea rojasii Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Soria, N. 6400* (FCQ)].

Ipomoea rosea Choisy var. *pluripartita* Hassl. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea rubens Choisy
Sin.: *Ipomoea riparia* G. Don, *Ipomoea villicalyx* N.E. Br.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Buck, H. T., 1979.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 5601* (LIL)]; BRA[*Pott, V. J. 2032* (CTES)]; PRY[*Zardini, E. M. 27555* (AS, MO)].

Ipomoea ruber (Vahl) Millsp. = **Ipomoea setifera** Poir.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea rubriflora O'Donell
Sin.: *Ipomoea coccinea* auct. non L., *Ipomoea hederifolia* auct. non L.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959a, b.
Enredadera. Anual. Nativa. 500–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34523* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Austin & Huamán, 1996).

Ipomoea saopaulista O'Donell
Sin.: *Ipomoea paulistana* O'Donell, nom. illeg.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Enredadera. Nativa. 100–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 3075* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 26373* (NY)].

Ipomoea scabra Forssk. = **Ipomoea nil** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea schulziana O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1948, 1959b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 5483* (CTES, LIL)].

Ipomoea seleri Millsp. = **Ipomoea crinicalyx** S. Moore
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea selloi Meisn. = **Jacquemontia selloi** (Meisn.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

[Ipomoea selloi Meisn. f. procumbens Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Ipomoea selloi Meisn. var. brevipedunculata Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Ipomoea selloi Meisn. var. tomentosa Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea sericantha Griseb., nom. illeg. = **Iseia luxurians** (Moric.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1953b.

Ipomoea sericea Spreng. ex Choisy = **Iseia luxurians** (Moric.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1953b.

Ipomoea serpens Meisn. f. *crassifolia* Chodat & Hassl. = **Ipomoea subtomentosa** (Chodat & Hassl.) O'Donell f. **subtomentosa**
Referencias: O'Donell, C. A., 1952.

Ipomoea serpens Meisn. var. *albiflora* Hallier f. = **Ipomoea subtomentosa** (Chodat & Hassl.) O'Donell f. **albiflora** (Hallier f.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1952.

Ipomoea serpens Meisn. var. *subtomentosa* Chodat & Hassl. = **Ipomoea subtomentosa** (Chodat & Hassl.) O'Donell f. **subtomentosa**
Referencias: O'Donell, C. A., 1952.

Ipomoea setifera Poir.
Sin.: *Calystegia setifera* (Poir.) Meisn., *Convolvulus ruber* Vahl, *Convolvulus setifer* (Poir.) Spreng., *Ipomoea assumptionis* Britton, *Ipomoea ruber* (Vahl) Millsp.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APY, APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5655* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13324* (NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6303* (SI)].

Ipomoea setosa Ker Gawl.
Sin.: *Batatas setosa* (Ker Gawl.) Lindl., *Calonyction pavoni* Hallier f., *Calonyction setosum* (Ker Gawl.) Hallier f., *Convolvulus setosus* (Ker Gawl.) Spreng., *Gomphpius setosus* Raf.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4875* (SI)].

Ipomoea sinuata Ortega = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **dissecta**
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea spiralis House = **Ipomoea wrightii** A. Gray
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Ipomoea stipulacea Jacq. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea stuckertii O'Donell
Sin.: *Maripa decemlobata* Stuck. ex Seckt, nom. nud.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1948, 1959b.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 4736* (SI)].

Ipomoea subrevoluta Choisy
Sin.: *Ipomoea dactylophylla* Griseb., *Ipomoea subrevoluta* Choisy f. *acutiloba* Hassl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni 5831* (LIL)]; BRA[*Lindeman, J. C. 4391* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 18468* (AS, MO, SI)].

Ipomoea subrevoluta Choisy f. *acutiloba* Hassl. = **Ipomoea subrevoluta** Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea subtomentosa (Chodat & Hassl.) O'Donell f. **albiflora** (Hallier f.) O´Donell
Sin.: *Ipomoea serpens* Meisn. var. *albiflora* Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1952.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3806* (G)].

Ipomoea subtomentosa (Chodat & Hassl.) O'Donell f. **subtomentosa**
Sin.: *Ipomoea serpens* Meisn. f. *crassifolia* Chodat & Hassl., *Ipomoea serpens* Meisn. var. *subtomentosa* Chodat & Hassl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1952.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4028* (C, LIL, LP, NY, SI)].

Ipomoea subtriloba Ruiz & Pav. = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

[Ipomoea subulata Hassl.]
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Notas: Nombre dudoso.

Ipomoea syringifolia Meisn.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CAN, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5125* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11146* (GH, NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 12922* (MO, PY)].

Ipomoea tacuaremboensis Arechav. = **Ipomoea kunthiana** Meisn.

Ipomoea tacuaremboensis Arechav. f. *foliosa* Arechav. = **Ipomoea kunthiana** Meisn.

Ipomoea tamnifolia L. = **Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Ipomoea texana Coult. = **Ipomoea carnea** Jacq. subsp. **fistulosa** (Mart. ex Choisy) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F., 1977.

Ipomoea theodori O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1948.
Hierba. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 5036* (LIL)].

Ipomoea trichocarpa Elliot, nom. illeg. = **Ipomoea cordatotriloba** Dennst. var. **australis** (O´Donell) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea trichocarpa Elliott var. *australis* O'Donell = **Ipomoea cordatotriloba** Dennst. var. **australis** (O´Donell) D.F. Austin
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998.

Ipomoea tricolor Cav.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1959b.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. s.n.* (SI)].

Ipomoea triloba auct. non L. = **Ipomoea grandifolia** (Dammer) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea tuberculata (Desr.) Roem. & Schult. = **Ipomoea cairica** (L.) Sweet
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea tuerckheimii Vatke ex Donn. Sm. = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea turbinata Lag.
Sin.: *Calonyction muricatum* (L.) G. Don, *Convolvulus muricatus* L., *Ipomoea muricata* (L.) Jacq., nom. illeg.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; Austin, D. F., 1982.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabezas, V. 51* (SI)].

Ipomoea turneroides Chodat & Hassl. = **Jacquemontia turneroides** (Chodat & Hassl.) Hassl.

Ipomoea tweediei Hook. = **Ipomoea aristolochaefolia** G. Don
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea umbellata G. Mey., nom. illeg. = **Merremia umbellata** (L.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Ipomoea urbica (Salzm. ex Choisy) Choisy = **Ipomoea asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea urbica (Salzm. ex Choisy) Choisy var. *muricata* Choisy = **Ipomoea asarifolia** (Desr.) Roem. & Schult.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Ipomoea uruguayensis Meisn. f. *retusa* Chodat & Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea uruguayensis Meisn. var. *elliptica* Chodat & Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea uruguayensis Meisn. var. *glabrata* Chodat & Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea uruguayensis Meisn. var. *sericea* Chodat & Hassl. = **Ipomoea chodatiana** O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea vahliana House = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea valenzuelensis Chodat & Hassl.
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Mereles, F. 7561* (FCQ)].

Ipomoea villicalyx N.E. Br. = **Ipomoea rubens** Choisy
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.

Ipomoea volcanensis O'Donell
Referencias: Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996; O'Donell, C. A., 1953a, 1959b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000–2200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4951* (SI)].

Ipomoea wrightii A. Gray
Sin.: *Convolvulus heptaphyllus* Roxb., *Ipomoea gracilipes* Hassl., *Ipomoea pulchella* Roth, *Ipomoea pulchella* Roth var. *lineariloba* Hassl., *Ipomoea radicans* Bertero ex Choisy, *Ipomoea spiralis* House
Referencias: Austin, D. F. & Bianchini, R. S., 1998; Austin, D. F. & Huáman, Z., 1996.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruíz Huidobro, A. M. 2265* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 3026* (SI)].

Iseia O'Donell

Número de especies: 1

Iseia luxurians (Moric.) O´Donell
Sin.: *Ipomoea grisebachiana* Meisn., *Ipomoea jamesonii* Choisy, *Ipomoea luxurians* Moric., *Ipomoea sericantha* Griseb., nom. illeg., *Ipomoea sericea* Spreng. ex Choisy, *Jacquemontia luxurians* (Moric.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1953b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR); PRY(ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2045* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 11496* (NY)]; PRY[*Meyer, T. 15965* (LIL)].

Jacquemontia Choisy

Número de especies: 17, 10 endémicas

Jacquemontia agrestis (Choisy) Meisn.
Sin.: *Convolvulus agrestis* Choisy, *Jacquemontia diantha* Urb., *Jacquemontia palmeri* S. Watson
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SLU); PRY(AMA, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Báez, J. R. 171* (SI)]; PRY[*Fortunato, R. H. 1121* (BAB, SI)].

Jacquemontia anomala O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6278* (BM, SI)].

Jacquemontia blanchetii Moric.
Sin.: *Ipomoea filipedunculata* Rusby
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1960a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1380* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14260* (NY)]; PRY[*Mereles, F. 542* (SI)].

Jacquemontia decumbens O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950b, c, 1960a.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APY, ITA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6581* (SI)]; PRY[*Bertoni 4523* (LIL)].

Jacquemontia densiflora Rusby, nom. illeg. = **Jacquemontia rusbyana** Standl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f.
Sin.: *Jacquemontia violacea* (Vahl) Choisy var. *densiflora* Meisn.
Referencias: Austin, D. F., 1982.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 12597* (NY)].

Jacquemontia diantha Urb. = **Jacquemontia agrestis** (Choisy) Meisn.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.
Sin.: *Ipomoea evolvuloides* Moric.
Referencias: Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1982.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); PRY(CON, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3066* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2546* (FCQ)].

[Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn. var. grandiflora Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn. var. *tweedie* Meisn. = **Jacquemontia heterotricha** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Jacquemontia fruticulosa Hallier f.
Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 3895* (FCQ, MO)].

Jacquemontia fusca (Meisn.) Hallier f. f. *glabrior* Chodat & Hassl. = **Jacquemontia paraguayensis** Britton
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.

Jacquemontia fusca (Meisn.) Hallier f. var. *altosiana* Chodat & Hassl. = **Jacquemontia paraguayensis** Britton
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.

Jacquemontia grandifolia Dammer = **Ipomoea grandifolia** (Dammer) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Jacquemontia guaranitica Hassl.
Referencias: Hassler, E., 1911.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9749* (B, BM)].

Jacquemontia heterotricha O'Donell
Sin.: *Jacquemontia evolvuloides* (Moric.) Meisn. var. *tweedie* Meisn.
Referencias: O'Donell, C. A., 1950b, c, 1960; Zardini, E. M. & Basualdo, I. Z., 2004.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(CON, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 839* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 29165* (LIL)]; PRY[*Degen, R. 2120* (FCQ)].

[Jacquemontia hirsuta Choisy var. adenotricha Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Jacquemontia laxiflora O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.
Enredadera. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 2211* (LIL)].

Jacquemontia lorentzii (Kuntze) Peter ex O´Donell
Sin.: *Convolvulus lorentzii* Kuntze, *Jacquemontia velutina* auct. non Choisy
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; O'Donell, C. A., 1960a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); PRY(APY, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2609* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 9911* (MO)].

Jacquemontia luxurians (Moric.) Hallier f. = **Iseia luxurians** (Moric.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1953b.

Jacquemontia mattogrossensis Hoehne = **Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.

Jacquemontia palmeri S. Watson = **Jacquemontia agrestis** (Choisy) Meisn.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Jacquemontia paraguayensis Britton
Sin.: *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f. f. *glabrior* Chodat & Hassl., *Jacquemontia fusca* (Meisn.) Hallier f. var. *altosiana* Chodat & Hassl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1950a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 7561* (LIL)].

Jacquemontia rojasiana O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1950c.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 4163* (LIL)].

Jacquemontia rondonii Hoehne = **Jacquemontia tamnifolia** (L.) Griseb.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Jacquemontia rusbyana Standl.
Sin.: *Jacquemontia densiflora* Rusby, nom. illeg.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, JUJ, SAL); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 994* (CTES, LIL)]; PRY[*Degen, R. 3331* (FCQ)].

Jacquemontia selloi (Meisn.) Hallier f.
Sin.: *Ipomoea selloi* Meisn.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 14451* (LIL, SI)]; BRA[*Rambo, B. 9440* (LIL)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 27133* (FCQ)].

Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb.
Sin.: *Convolvulus praelongus* S. Moore, *Ipomoea tamnifolia* L., *Jacquemontia mattogrossensis* Hoehne, *Jacquemontia rondonii* Hoehne
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR); BRA(PAR); PRY(CEN, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 3320* (CTES, LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 26677* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 2674* (G)].

Jacquemontia turneroides (Chodat & Hassl.) Hassl.
Sin.: *Ipomoea turneroides* Chodat & Hassl.
Referencias: Hassler, E., 1911.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5849* (MO)].

Jacquemontia velutina auct. non Choisy = **Jacquemontia lorentzii** (Kuntze) Peter ex O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Jacquemontia violacea (Vahl) Choisy var. *densiflora* Meisn. = **Jacquemontia densiflora** (Meisn.) Hallier f.
Referencias: Austin, D. F., 1982.

Leucomalla lanuginosa Phil. = **Evolvulus sericeus** Sw. var. **elongatus** (Choisy) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Maripa decemlobata Stuck. ex Seckt, nom. nud. = **Ipomoea stuckertii** O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Merremia Dennst., nom. cons.

Número de especies: 7, 1 endémica

Merremia aegyptia (L.) Urb.
Sin.: *Convolvulus penthaphyllus* L., *Ipomoea aegyptia* L., *Ipomoea pentaphylla* Jacq., nom. illeg., *Merremia pentaphylla* (L.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1939, 1941; Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); PRY(APY, AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 7084* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 10798* (LIL)].

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.
Sin.: *Batatas cissoides* (Lam.) Choisy, *Convolvulus cissoides* Lam., *Ipomoea cissoides* (Lam.) Griseb., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *diminuta* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *guaranitica* Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *major* (Meisn.) Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *tomentosa* Hassl., *Merremia cissoides* (Lam.) Hallier f. f. *vulgaris* (Meisn.) Hassl., *Pharbitis cissoides* (Lam.) Peter
Referencias: O'Donell, C. A., 1939, 1941.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS, SAL); PRY(APY, APA, CAN, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 47767* (CTES, NY)]; PRY[*Rojas, T. 3023* (AS, LIL, SI)].

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. f. *diminuta* (Meisn.) Hassl. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. f. *guaranitica* Hassl. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. f. *major* (Meisn.) Hassl. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. f. *tomentosa* Hassl. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f. f. *vulgaris* (Meisn.) Hassl. = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia contorquens (Choisy) Hallier f.
Sin.: *Ipomoea contorquens* Choisy
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.
Hierba. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11012* (G, MO)].

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. var. *chacoensis* O'Donell = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **dissecta**
Referencias: Austin, D. F. & Cavalcante, P. B., 1982.

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. var. **dissecta**
Sin.: *Convolvulus dissectus* Jacq., *Ipomoea sinuata* Ortega, *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *chacoensis* O'Donell
Referencias: Pontiroli, A., 1983b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); PRY(COA, ITA, PAI, SPE); URY(ART, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 655* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 5156* (FCQ, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 5910* (MVFA)].

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Sin.: *Ipomoea dissecta* (Jacq.) Pursh var. *edentata* Meisn., *Ipomoea dissecta* (Jacq.) Pursh var. *maximiliani* (Meisn.) O´Donell, *Ipomoea fulva* Bertol., *Ipomoea maximiliani* Meisn., *Merremia dissecta* (Jacq.) Hallier f. var. *maximiliani* (Meisn.) Hallier f., *Merremia sinuata* (Ortega) Hoehne var. *edentata* (Meisn.) Hoehne
Referencias: Buck, H. T., 1979; O'Donell, C. A., 1941, 1960a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34469* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 2992* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 13030* (FCQ, MO)].

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. var. *maximiliani* (Meisn.) Hallier f. = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Merremia glabra (Aubl.) Choisy = **Merremia macrocalyx** (Ruiz & Pav.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia hassleriana (Chodat & Hassl.) Hassl.
Sin.: *Ipomoea hassleriana* Chodat & Hassl.
Referencias: O'Donell, C. A., 1939, 1941, 1960a.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, AMA, CAU, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28681* (CTES, SI)]; PRY[*Schinini, A. 29974* (CTES)].

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O´Donell
Sin.: *Batatas glabra* (Aubl.) Benth., *Convolvulus contortus* Vell., *Convolvulus glaber* Aubl., nom. illeg., *Convolvulus macrocalyx* Ruiz & Pav., *Ipomoea glabra* (Aubl.) Choisy, *Ipomoea macrocalyx* (Ruiz & Pav.) Choisy, *Merremia glabra* (Aubl.) Choisy
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; O'Donell, C. A., 1941.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CAN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1878* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 15199* (US)]; PRY[*Jiménez, B. 1238* (PY)].

Merremia pentaphylla (L.) Hallier f. = **Merremia aegyptia** (L.) Urb.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Merremia sinuata (Ortega) Hoehne var. *edentata* (Meisn.) Hoehne = **Merremia dissecta** (Jacq.) Hallier f. var. **edentata** (Meisn.) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960a.

Merremia umbellata (L.) Hallier f.
Sin.: *Convolvulus umbellatus* L., *Ipomoea polyanthes* Roem. & Schult., nom. illeg., *Ipomoea umbellata* G. Mey., nom. illeg., *Merremia umbellata* (L.) Hallier f. var. *occidentalis* Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1939, 1941.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS, SAL); PRY(APY, CEN, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4031* (CTES)]; PRY[*Kiesling, R. 9608* (G, PY, SI)].

Merremia umbellata (L.) Hallier f. var. *occidentalis* Hallier f. = **Merremia umbellata** (L.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Mina lobata Cerv. = **Ipomoea lobata** (Cerv. ex La Llave & Lex.) Thell.
Referencias: O'Donell, C. A., 1957.

Murucoa hieronymi Kuntze = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Murucoa juramenti Kuntze = **Ipomoea argentinica** Peter
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Murucoa megapotamica (Griseb.) Kuntze = **Ipomoea hieronymi** (Kuntze) O´Donell

Nama convolvuloides Willd. = **Evolvulus convolvuloides** (Willd.) Stearn

Operculina Silva Manso
Número de especies: 1

Operculina alata (Ham.) Urb. var. **pubescens** (Pilg.) O'Donell
Sin.: *Operculina pterodes* (Choisy) Meisn. f. *pubescens* Pilg.
Referencias: O'Donell, C. A., 1960b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8268* (BM)].

Operculina pterodes (Choisy) Meisn. f. *pubescens* Pilg. = **Operculina alata** (Ham.) Urb. var. **pubescens** (Pilg.) O'Donell
Referencias: O'Donell, C. A., 1960ab.

Pharbitis acuminata (Vahl) Choisy = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Pharbitis acuminata (Vahl) Choisy var. *congesta* Choisy = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Pharbitis bogotensis (Kunth) Choisy = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Pharbitis cathartica (Poir.) Choisy = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Pharbitis cissoides (Lam.) Peter = **Merremia cissoides** (Lam.) Hallier f.
Referencias: O'Donell, C. A., 1941.

Pharbitis cuspidata (Ruiz & Pav.) G. Don = **Ipomoea nil** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Pharbitis hispida Choisy = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Pharbitis mollis (Kunth) Choisy = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Pharbitis pubescens (Lam.) Choisy = **Ipomoea pubescens** Lam.
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Pharbitis purpurea (L.) Voigt = **Ipomoea purpurea** (L.) Roth
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

Pharbitis rosea Choisy = **Ipomoea indica** (Burm. f.) Merr.

Volvulus sepium (L.) Junger = **Calystegia sepium** (L.) R. Br. var. **sepium**
Referencias: O'Donell, C. A., 1959b.

CORIARIACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Coriaria L.
Número de especies: 1 endémica

Coriaria ruscifolia L.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Rossow, R. A., 1988b; Ruiz, E., 2003b; Skog, L. E., 1972.
Arbusto o arbolito. Endémica. 500–1600 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6300* (SI), *Diem, J. 1744* (SI)]; CHL[*Cuming, H. 146* (E, GH), *Morrison, J. L. 17537* (SI)].

CRASSULACEAE

Autor: Freire, A.

4 géneros, 17 especies, 5 especies endémicas, 3 especies introducidas.

Bulliarda bonariensis DC., nom. nud. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Bulliarda magellanica DC., nom. nud. = **Crassula moschata** G. Forst.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Bulliarda moschata (G. Forst.) d'Urv. = **Crassula moschata** G. Forst.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

[Cotyledon paraguayensis N.E. Br.]
Notas: Nombre dudoso.

Cotyledon pinnata Lam. = **Kalanchoe pinnata** (Lam.) Pers.

Crassula L.
Número de especies: 12, 4 endémicas, 1 introducida

Crassula andicola (Phil.) Meigen = **Crassula solieri** (Gay) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Crassula androsace Sparre ex Rossow = **Crassula phascoides** (Griseb.) M. Bywater
Referencias: Bywater, M., 1985.

Crassula bonariensis (DC.) Cambess., nom. illeg. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Crassula caudiculata Bacigalupo & Rossow
Referencias: Bacigalupo, N. M. & Rossow, R. A., 1983; Bacigalupo, N. M., 1987a; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); URY(FLA, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2212* (SI)]; URY[*Osten, C. 19291* (BAF)].

Crassula closiana (Gay) Reiche
Sin.: *Tillaea closiana* Gay
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Sin.: *Crassula erecta* (Hook. & Arn.) Berger, *Crassula minima* (Miers) Reiche, nom. illeg., *Tillaea connata* Ruiz & Pav., *Tillaea erecta* Hook. & Arn., *Tillaea minima* Gay, *Tillaea minima* Miers ex Hook. & Arn., nom. illeg., *Tillaea minima* Miers, nom. nud.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Hunziker, A. T., 1966a; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, JUJ, LRI, NEU, SAL, SCR, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VIII, X, RME); URY(CAS, LAV, MAL, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5341* (SI)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (P), *Grandjot, G. F. 4317* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2181* (MVFA)].

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **erectoides** M. Bywater & Wickens
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: CHL(V, VII, RME).
Notas: Citada para Chile sin indicar material de referencia (Bywater & Wickens, 1984).

Crassula connata (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **muscoides** M. Bywater & Wickens
Sin.: *Tillaea muscosa* Gay, hom. illeg.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar localidad o material de referencia (Bywater & Wickens, 1984).

Crassula decumbens Thunb.
Sin.: *Crassula ovallei* (Phil.) Reiche, *Crassula radicans* (Phil.) Reiche, *Tillaea ovallei* Phil., *Tillaea radicans* Phil., *Tillaea rencana* Phil.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: CHL(V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (K, SGO)].

Crassula drummondii (Torr. & A. Gray) Fedde
Sin.: *Tillaea drummondii* Torr. & A. Gray
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Kiesling, R., 1994b.
Hierba. Anual. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS, SJU); CHL(VII, RME); PRY(PAI); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28564* (SI)]; CHL[*Bliss 2343* (CONC)]; PRY[*Balansa, B. 2351* (BM)]; URY[*Herter, W. G. F. 450pp* (SI)].

Crassula erecta (Hook. & Arn.) Berger = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Referencias: Rossow, R. A., 1983a.

Crassula longipes (Rose) M. Bywater & Wickens
Sin.: *Tillaeastrum longipes* Rose
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1987a; Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, SFE); URY(FLA, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2195* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 2350pp* (*)]; URY[*Rosengurtt, B. 2202* (MVFA)].

Crassula magellanica (Willd. ex Schult.) Macloskie = **Crassula moschata** G. Forst.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Crassula minima (Miers) Reiche, nom. illeg. = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**

Crassula minutissima (Skottsb.) M. Bywater & Wickens
Sin.: *Tillaea minutissima* Skottsb.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Skottsberg, C. J. F. 710* (BA, S, SGO, UPS)].

Crassula moschata G. Forst.
Sin.: *Bulliarda magellanica* DC., nom. nud., *Bulliarda moschata* (G. Forst.) d'Urv., *Crassula magellanica* (Willd. ex Schult.) Macloskie, *Tillaea chiloensis* Gay, *Tillaea magellanica* Willd. ex Schult., *Tillaea moschata* (G. Forst.) DC.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Moore, D. M., 1983; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(RNE, SCR, TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 669* (SI), *Nicora, E. G. 7262* (BAA, SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Crassula ovallei (Phil.) Reiche = **Crassula decumbens** Thunb.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Crassula paludosa Schltdl. ex Dusén, nom. illeg. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Crassula paludosa Schltdl. ex Reiche = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Crassula peduncularis (Sm.) F. Meigen
Sin.: *Bulliarda bonariensis* DC., nom. nud., *Crassula bonariensis* (DC.) Cambess., nom. illeg., *Crassula paludosa* Schltdl. ex Dusén, nom. illeg., *Crassula paludosa* Schltdl. ex Reiche, *Tillaea bonariensis* DC. ex Britton, nom. illeg., *Tillaea paludosa* Schltdl. ex Lechl., nom. nud., *Tillaea peduncularis* Sm., *Tillaea simplex* Phil., hom. illeg.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1987a; Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Hunziker, A. T., 1966a; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MEN, MIS, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, RME); URY(CAS, COL, FLA, LAV, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3050* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 531* (NY)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI), *Lechler, W. 472* (K, P, SGO)]; URY[*Commerson, P. s.n.* (LINN), *Felippone, F. 2581* (SI)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Bywater & Wickens, 1984).

Crassula phascoides (Griseb.) M. Bywater
Sin.: *Crassula androsace* Sparre ex Rossow, *Tristicha phascoides* Griseb.
Referencias: Bywater, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3373* (LIL)].

Crassula radicans (Phil.) Reiche = **Crassula decumbens** Thunb.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Crassula solieri (Gay) F. Meigen
Sin.: *Crassula andicola* (Phil.) Meigen, *Tillaea andicola* Phil., *Tillaea solierii* Gay
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.
Hierba. Anual. Endémica. 100–500 m.
Países: CHL(VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 178* (P)].

Crassula tillaea Lest.-Garl.
Referencias: Lombardo, A., 1982a; Rossow, R. A., 1983a.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: CHL(IV, V, VII, VIII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: CHL[*Barros, E. 9106* (CONC)]; URY[*Lombardo, A. 6459* (MVJB)].

[Crassula venezuelensis (Steyerm.) M. Bywater & Wickens]
Sin.: *Tillaea venezuelensis* Steyerm.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Echeveria DC.

Número de especies: 1

Echeveria peruviana Meyen
Referencias: Cabrera, A. L., 1957b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 329* (SI), *Kiesling, R. 5276* (SI)].

Kalanchoe Adans.

Número de especies: 1 introducida

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.
Sin.: *Cotyledon pinnata* Lam.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1981.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 14270* (CTES)].

Sedum L., nom. cons.

Número de especies: 3, 1 endémica, 1 introducida

Sedum acre L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1988[1987]; Moore, D. M., 1983; Zardini, E. M., 1971b.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 20499* (LP), *Goodall, N. 3219* (SI)]; CHL[*Villagrán, C. 6794* (CONC)].

Sedum cymatopetalum Fröd.
Referencias: Hunziker, A. T., 1966a; Zardini, E. M., 1971b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1800–4200 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1855* (LIL), *Kiesling, R. 6090* (SI)].

Sedum jujuyense Zardini
Referencias: Zardini, E. M., 1971b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34539* (SI), *Cabrera, A. L. 20222* (LP)].

[Sedum rupestre L.]
Referencias: Zardini, E. M., 1971b.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Tillaea andicola Phil. = **Crassula solieri** (Gay) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea bonariensis DC. ex Britton, nom. illeg. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea chiloensis Gay = **Crassula moschata** G. Forst.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea closiana Gay = **Crassula closiana** (Gay) Reiche
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea connata Ruiz & Pav. = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Referencias: Rossow, R. A., 1983a.

Tillaea drummondii Torr. & A. Gray = **Crassula drummondii** (Torr. & A. Gray) Fedde
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Kiesling, R., 1994b.

Tillaea erecta Hook. & Arn. = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Referencias: Rossow, R. A., 1983a.

Tillaea magellanica Willd. ex Schult. = **Crassula moschata** G. Forst.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea minima Gay = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea minima Miers ex Hook. & Arn., nom. illeg. = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea minima Miers, nom. nud. = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **connata**
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea minutissima Skottsb. = **Crassula minutissima** (Skottsb.) M. Bywater & Wickens
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea moschata (G. Forst.) DC. = **Crassula moschata** G. Forst.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea muscosa Gay, hom. illeg. = **Crassula connata** (Ruiz & Pav.) A. Berger var. **muscoides** M. Bywater & Wickens
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea ovallei Phil. = **Crassula decumbens** Thunb.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea paludosa Schltdl. ex Lechl., nom. nud. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Tillaea peduncularis Sm. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

[Tillaea portulacoides Larrañaga]
Notas: Nombre dudoso.

Tillaea radicans Phil. = **Crassula decumbens** Thunb.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea rencana Phil. = **Crassula decumbens** Thunb.
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea simplex Phil., hom. illeg. = **Crassula peduncularis** (Sm.) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984; Rossow, R. A., 1983a.

Tillaea solierii Gay = **Crassula solieri** (Gay) F. Meigen
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaea venezuelensis Steyerm. = **Crassula venezuelensis** (Steyerm.) M. Bywater & Wickens
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tillaeastrum longipes Rose = **Crassula longipes** (Rose) M. Bywater & Wickens
Referencias: Bywater, M. & Wickens, G. E., 1984.

Tristicha phascoides Griseb. = **Crassula phascoides** (Griseb.) M. Bywater
Referencias: Bywater, M., 1985.

CUCURBITACEAE

Autores: Pozner, R. & Belgrano, M. J. (*Apodanthera*)

24 géneros, 78 especies, 15 especies endémicas, 8 especies introducidas.

Abobra Naudin

Número de especies: 1

Abobra tenuifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn.
Sin.: *Abobra viridiflora* Naudin, *Adobra tenuifolia* (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn., *Adobra viridiflora* Naudin, *Bryonia tenuifolia* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1974; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SDE, SFE, SLU); URY(CAS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21432* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 3211* (SI)].

Abobra viridiflora Naudin = **Abobra tenuifolia** (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn.

Referencias: Martínez Crovetto, R., 1965.

Adobra tenuifolia (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn. = **Abobra tenuifolia** (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Adobra viridiflora Naudin = **Abobra tenuifolia** (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Alsomitra brasiliensis Cogn. = **Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1893.

Alsomitra brasiliensis Cogn. var. *pubescens* Griseb. = **Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.
Referencias: Robinson, G. L. & Wunderlin, R. P., 2005a.

Anguria grandiflora Cogn. = **Psiguria ternata** (M. Roem.) C. Jeffrey
Referencias: Jeffrey, C., 1978.

Anguria laciniosa Schltdl. = **Apodanthera laciniosa** (Schltdl.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1916.

Anguria pedatisecta Ser. = **Cyclanthera pedata** (L.) Schrad.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Anguria ternata M. Roem. = **Psiguria ternata** (M. Roem.) C. Jeffrey
Referencias: Jeffrey, C., 1978.

Antagonia citrullifolia Griseb. = **Cayaponia citrullifolia** (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1879; Martínez Crovetto, R., 1954b.

Apodanthera Arn.

Número de especies: 6, 3 endémicas

Apodanthera anatuyana (Mart. Crov.) Pozner
Sin.: *Melothria añatuyana* Mart. Crov.
Referencias: Pozner, R., 1996.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(FOR, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 7140* (BAB)].

Apodanthera catharinensis Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1953.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Stienstra, B. H. s.n.* (SI)].

Apodanthera hirtella Cogn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Cogniaux, C. A., 1916; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 2100–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 6311* (LP, SI)].

Apodanthera laciniosa (Schltdl.) Cogn.
Sin.: *Anguria laciniosa* Schltdl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cogniaux, C. A., 1916; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 200–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 1309* (B)]; BRA[*Rambo, B. 36407* (PACA)].

[Apodanthera linearis (Cogn.) Mart. Crov.]
Sin.: *Wilbrandia linearis* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Apodanthera sagittifolia (Griseb.) Mart. Crov. var. **dissecta** (Cogn.) Mart. Crov.
Sin.: *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn. var. *dissecta* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1946, 1954a, b, 1965; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 2959* (SI)]; URY[*Gallinal, J. P. 5513* (F, MVM)].

Apodanthera sagittifolia (Griseb.) Mart. Crov. var. **sagittifolia**
Sin.: *Wilbrandia sagittifolia* Griseb., *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *typica* Mart. Crov., nom. inval.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1946, 1954a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(COR, LRI, MEN, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 173* (CORD, GOET)].

Apodanthera sagittifolia (Griseb.) Mart. Crov. var. **villosa** (Cogn.) Mart. Crov.
Sin.: *Wilbrandia sagittifolia* Griseb. var. *villosa* (Cogn.) Mart. Crov., *Wilbrandia villosa* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1946, 1954a, b, 1965, 1974; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1999.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, LPA, MIS, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); URY(CAS, FLA, LAV, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 558* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 57188* (PACA)]; URY[*Rosengurtt, B. 5869* (LIL, MVM)].

Apodanthera smilacifolia Cogn. = **Melothrianthus smilacifolius** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1956b.

Apodanthera ulei (Cogn.) Mart. Crov.
Sin.: *Melothria ulei* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1956a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–100 m.

Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1141* (BR)].

Bryonia bonariensis Mill. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954b.

Bryonia cabocla Vell. = **Cayaponia cabocla** (Vell.) Mart.
Referencias: Jeffrey, C., 1971.

Bryonia ficifolia Lam. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954b.

Bryonia fluminensis Vell. = **Cayaponia fluminensis** (Vell.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1878.

Bryonia pilosa Vell. = **Cayaponia pilosa** (Vell.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1878; Martínez Crovetto, R., 1968.

Bryonia tayuya Mart., hom. illeg. = **Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881; Martínez Crovetto, R., 1968.

Bryonia tayuya Vell. = **Cayaponia tayuya** (Vell.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881.

Bryonia tenuifolia Gillies ex Hook. & Arn. = **Abobra tenuifolia** (Gillies ex Hook. & Arn.) Cogn.

Cayaponia Silva Manso

Número de especies: 22, 4 endémicas

Cayaponia alarici M.L. Porto
Referencias: Porto, M. L., 1974b.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Porto, M. L. s.n.* (ICN)].

Cayaponia biflora Cogn. ex Harms
Referencias: Harms, H. A. T., 1926; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 4484* (PACA)].

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov.
Sin.: *Bryonia bonariensis* Mill., *Bryonia ficifolia* Lam., *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. f. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov., *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. var. *dissecta* (Cogn.) M.L. Porto, *Cayaponia bonariensis* (Mill.) Mart. Crov. var. *rigida* (Cogn.) M.L. Porto, *Cayaponia ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *dissecta* Cogn., *Cayaponia ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *genuina* Cogn., *Cayaponia ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *rigida* Cogn., *Cayaponia sandia* Griseb., *Trianosperma ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *dissecta* Cogn., *Trianosperma ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval., *Trianosperma ficifolia* (Lam.) Cogn. var. *rigida* Cogn., *Trianosperma hilarianum* Naudin
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1974; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, COA); URY(CAS, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1643* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 545* (MBM, US)]; PRY[*Caballero Mármori, G. 1189* (CTES)]; URY[*Arechavaleta, J. 4279* (SI)].

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov. f. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov. var. *dissecta* (Cogn.) M.L. Porto = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Porto, M. L., 1974b; Pozner, R., 1998a.

Cayaponia bonariensis (Mill.) Mart. Crov. var. *rigida* (Cogn.) M.L. Porto = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Porto, M. L., 1974b; Pozner, R., 1998a.

Cayaponia breviloba (Griseb. ex Cogn.) Lillo, nom. nud. = **Cayaponia citrullifolia** (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Pozner, R., 1998a.

Cayaponia cabocla (Vell.) Mart.
Sin.: *Bryonia cabocla* Vell., *Cayaponia glaziovii* Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Jeffrey, C., 1971; Klein, V. L. G., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8109* (CTES, HBR)].

Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Sin.: *Antagonia citrullifolia* Griseb., *Cayaponia breviloba* (Griseb. ex Cogn.) Lillo, nom. nud., *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb. var. *breviloba* Griseb. ex Cogn., *Cayaponia citrullifolia* (Griseb.) Cogn. ex Griseb. var. *genuina* Cogn., *Cayaponia latifolia* Cogn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1974; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, APA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI); URY(CAS, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3655* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2350* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 4597b* (LIL, MVM)].

Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb. var. *breviloba* Griseb. ex Cogn. = **Cayaponia citrullifolia** (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. ex Griseb. var. *genuina* Cogn. = **Cayaponia citrullifolia** (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Cayaponia cordifolia Cogn.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 11370* (CTES)].

Cayaponia diffusa Silva Manso = **Cayaponia pilosa** (Vell.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1968; Pozner, R., 1998a.

Cayaponia diversifolia (Cogn.) Cogn.
Sin.: *Trianosperma diversifolia* Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cabrera, A. L., 1993a; Cogniaux, C. A., 1881; Jeffrey, C., 1971; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 100–1400 m.
Países: ARG(JUJ); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10264* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 207* (CTES)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5612* (SI)].

Cayaponia espelina (Silva Manso) Cogn.
Sin.: *Perianthopodus espelina* Silva Manso
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881; Jeffrey, C., 1971.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7277* (G)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3603* (CTES, FCQ, SI)].

Cayaponia ficifolia (Lam.) Cogn. var. *dissecta* Cogn. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Jeffrey, C., 1971.

Cayaponia ficifolia (Lam.) Cogn. var. *genuina* Cogn. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1954b.

Cayaponia ficifolia (Lam.) Cogn. var. *rigida* Cogn. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1954b.

Cayaponia fluminensis (Vell.) Cogn.
Sin.: *Bryonia fluminensis* Vell.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1878.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2945* (CTES)].

Cayaponia glaziovii Cogn. = **Cayaponia cabocla** (Vell.) Mart.
Referencias: Jeffrey, C., 1971.

[Cayaponia gracillima (Cogn.) Cogn.]
Sin.: *Trianosperma gracillima* Cogn.
Referencias: Jeffrey, C., 1971.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

[Cayaponia hirsuta Cogn.]
Referencias: Porto, M. L., 1974a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Cayaponia latifolia Cogn. = **Cayaponia citrullifolia** (Griseb.) Cogn. ex Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a.

Cayaponia laxa Cogn. ex Harms
Referencias: Harms, H. A. T., 1926.
Enredadera. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1467* (B)].

Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn.
Sin.: *Bryonia tayuya* Mart., hom. illeg., *Cayaponia martiana* (Cogn.) Cogn. var. *acutiloba* (Cogn.) Cogn., *Trianosperma martiana* Cogn., *Trianosperma martiana* Cogn. var. *acutiloba* Cogn., *Trianosperma martiana* Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Jeffrey, C., 1971; Klein, V. L. G., 2001; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1968, 1974; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); URY(MON, ROC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1037* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44710* (CTES)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 3281* (MVM)].
Notas: Probablemente habite en Paraguay.

Cayaponia martiana (Cogn.) Cogn. var. *acutiloba* (Cogn.) Cogn. = **Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1968.

Cayaponia membranacea Gomes-Klein
Referencias: Gomes-Klein, V. L., 2003.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 939* (CTES, HB, HBR, SP)].

Cayaponia palmata Cogn.
Sin.: *Cayaponia palustris* Cogn., nom. nud., *Cayaponia saldanhaei* Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881; Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1968; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ferrucci, M. S. 471* (CTES)]; BRA[*Oliveira, P. I. 1008* (CTES)].

Cayaponia palustris Cogn., nom. nud. = **Cayaponia palmata** Cogn.
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Pozner, R., 1998a.

Cayaponia pilosa (Vell.) Cogn.
Sin.: *Bryonia pilosa* Vell., *Cayaponia diffusa* Silva Manso, *Dermophylla eliptica* Silva Manso
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Klein, V. L. G., 2001; Martínez Crovetto, R., 1968; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5754* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28599* (CTES)].

Cayaponia podantha Cogn.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Cabrera, A. L., 1993a; Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1974; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7345* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 41257* (PACA)]; PRY[*Balansa, B. 1108* (G, K, P)]; URY[*Schroeder, J. s.n.* (MVM)].

Cayaponia saldanhaei Cogn. = **Cayaponia palmata** Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881; Jeffrey, C., 1971; Pozner, R., 1998a.

Cayaponia sandia Griseb. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954b.

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.
Sin.: *Bryonia tayuya* Vell.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881.
Enredadera. Perenne. Nativa. 600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 51223* (CTES)].

Cayaponia ternata Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1878.
Enredadera. Perenne. Nativa. 300–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6553* (CTES)].

Cayaponia tibiricae (Naudin) Cogn.
Sin.: *Trianosperma tibiricae* Naudin
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 30852* (CTES)].

Cayaponia trifoliolata (Cogn.) Cogn.
Sin.: *Trianosperma trifoliolata* Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cogniaux, C. A., 1881; Jeffrey, C., 1971; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 1220* (HBR)].

Cayaponia trilobata (Cogn.) Cogn.
Sin.: *Trianosperma trilobata* Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 42594* (CTES)].

Cayaponia ulei Cogn. ex Harms
Sin.: *Cayaponia ulei* Cogn. ex Harms var. *dentata* Cogn. ex Harms, *Cayaponia ulei* Cogn. ex Harms var. *subtrilobata* Cogn. ex Harms, *Cayaponia ulei* Cogn. ex Harms var. *villosa* Cogn. ex Harms
Referencias: Harms, H. A. T., 1926; Jeffrey, C., 1971; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 500–2100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7743* (CTES)].

Cayaponia ulei Cogn. ex Harms var. *dentata* Cogn. ex Harms = **Cayaponia ulei** Cogn. ex Harms

Cayaponia ulei Cogn. ex Harms var. *subtrilobata* Cogn. ex Harms = **Cayaponia ulei** Cogn. ex Harms

Cayaponia ulei Cogn. ex Harms var. *villosa* Cogn. ex Harms = **Cayaponia ulei** Cogn. ex Harms

Cayaponia villosissima Cogn.
Referencias: Klein, V. L. G., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Kummrow, R. 1657* (MBM)].

Ceratosanthes Burm. ex Adans.

Número de especies: 2

Ceratosanthes diazii Lillo ex Descole, O´Donell & Lourteig = **Ceratosanthes multiloba** Cogn.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Ceratosanthes fiebrigii Cogn. = **Ceratosanthes multiloba** Cogn.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Ceratosanthes hassleri Cogn. = **Ceratosanthes multiloba** Cogn.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Ceratosanthes hilariana Cogn.
Referencias: Porto, M. L., 1975; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 528* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 32912* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 7185* (BM, CTES, LIL)].

Ceratosanthes multiloba Cogn.
Sin.: *Ceratosanthes diazii* Lillo ex Descole, O´Donell & Lourteig, *Ceratosanthes fiebrigii* Cogn., *Ceratosanthes hassleri* Cogn.
Referencias: Descole, H. R., O´Donell, C. A. & Lourteig, A., 1939a; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1968; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, PHA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8093* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 27136* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 27283* (CTES)]; URY[*Arechavaleta, J. 27* (MVM)].

Citrullus Schrad. ex Eckl. & Zeyh.

Número de especies: 2 introducidas

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Sin.: *Cucumis colocynthis* L.
Referencias: Filov, A. I., 1962; Martínez Crovetto, R., 1965; Millán, R., 1968.
Hierba o enredadera. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, SDE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 1979* (CTES)].

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **lanatus**
Sin.: *Momordica lanata* Thunb.
Referencias: Fursa, T. B., 1972; Villamil, C. B., 2001.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Villamil, C. B. 9631* (BBB)].

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa
Sin.: *Citrullus vulgaris* Schrad. ex Eckl. & Zeyh.
Referencias: Burkart, A., 1974; Fursa, T. B., 1972; Hara, A., 1969; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2008* (SI)].

Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyh. = **Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **vulgaris** (Schrad. ex Eckl. & Zeyh.) Fursa
Referencias: Burkart, A., 1974; Fursa, T. B., 1972; Pozner, R., 1998a.

Cucumis L.

Número de especies: 2 introducidas

Cucumis anguria L.
Sin.: *Cucumis anguria* L. var. *longipes* (Hook. f.) A. Meeuse, *Cucumis anguroides* M. Roem., *Cucumis arada* L. ex Naudin & F. Muell., *Cucumis echinatus* Moench, *Cucumis longipes* Hook. f., *Cucumis parviflorus* Salisb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Covas, G., 1972; Jeffrey, C., 1967; Mansfeld, R., 1959; Martínez Crovetto, R., 1968; Meeuse, A. D. J., 1958, 1962; Millán, R., 1968; Muñoz, J. D., 1996; Pozner, R., 1998a, 1999.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, SAL, SJU, SLU); BRA(SCA); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2876* (LIL)]; BRA[*Lowe, R. T. s.n.* (BM)]; PRY[*Vanni, R. O. 2500* (CTES)].

Cucumis anguria L. var. *longipes* (Hook. f.) A. Meeuse = **Cucumis anguria** L.
Referencias: Jeffrey, C., 1967; Mansfeld, R., 1959.

Cucumis anguroides M. Roem. = **Cucumis anguria** L.
Referencias: Jeffrey, C., 1967; Mansfeld, R., 1959.

Cucumis arada L. ex Naudin & F. Muell. = **Cucumis anguria** L.
Referencias: Mansfeld, R., 1959; Meeuse, A. D. J., 1962.

Cucumis colocynthis L. = **Citrullus colocynthis** (L.) Schrad.
Referencias: Fursa, T. B., 1972.

Cucumis dudaim L. = **Cucumis melo** L. var. **dudaim** (L.) Naudin
Referencias: Bailey, L. H., 1943; Martínez Crovetto, R., 1974.

Cucumis echinatus Moench = **Cucumis anguria** L.
Referencias: Mansfeld, R., 1959; Meeuse, A. D. J., 1962.

Cucumis longipes Hook. f. = **Cucumis anguria** L.
Referencias: Jeffrey, C., 1967; Mansfeld, R., 1959; Meeuse, A. D. J., 1962.

Cucumis melo L. var. **dudaim** (L.) Naudin
Sin.: *Cucumis dudaim* L., *Cucumis odoratissimus* Moench
Referencias: Bailey, L. H., 1943; Martínez Crovetto, R., 1974.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: ARG(ERI, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26395* (SI)].

Cucumis odoratissimus Moench = **Cucumis melo** L. var. **dudaim** (L.) Naudin
Referencias: Bailey, L. H., 1943.

Cucumis parviflorus Salisb. = **Cucumis anguria** L.
Referencias: Mansfeld, R., 1959; Meeuse, A. D. J., 1962.

Cucurbita L.

Número de especies: 3, 2 introducidas

Cucurbita andreana Naudin = **Cucurbita maxima** Duchesne subsp. **andreana** (Naudin) Filov
Referencias: Lira Saade, R., 1995; Pozner, R., 1998a.

Cucurbita asperata Gillies ex Hook. & Arn. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1916; Pozner, R., 1998b.

Cucurbita lagenaria L. = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.
Referencias: Jeffrey, C., 1967; Pozner, R., 1998a.

Cucurbita maxima Duchesne subsp. **andreana** (Naudin) Filov
Sin.: *Cucurbita andreana* Naudin
Referencias: Lira Saade, R., 1995; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1974; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LRI, MEN, SDE, SLU); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27387* (SI)]; URY[*Gallinal, J. P. 5106pe* (LIL, MVM)].

Cucurbita maxima Duchesne subsp. **maxima**
Referencias: Lira Saade, R., 1995; Martínez Crovetto, R., 1974; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26759* (SI)].

Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.
Sin.: *Cucurbita pepo* L. var. *moschata* Duchesne ex Lam.
Referencias: Lira Saade, R., 1995; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, FOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 30371* (CTES)].

Cucurbita pepo L.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lira Saade, R., 1995; Martínez Crovetto, R., 1974; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, ERI, SFE); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 60* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 35583* (MBM)].

Cucurbita pepo L. var. *moschata* Duchesne ex Lam. = **Cucurbita moschata** (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Cucurbita siceraria Molina = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Pozner, R., 1998a.

Cucurbita urkupinana Cárdenas = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998b.

Cucurbitella Walp.

Número de especies: 1

Cucurbitella asperata (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Sin.: *Cucurbita asperata* Gillies ex Hook. & Arn., *Cucurbita urkupinana* Cárdenas, *Cucurbitella cucumifolia* (Griseb.) Cogn., *Cucurbitella duriaei* (Naudin) Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn., *Cucurbitella integrifolia* Cogn. var. *glabrior* Cogn., *Cucurbitella urkupinana* (Cárdenas) C. Jeffrey, *Prasopepon cucumifolius* Griseb., *Prasopepon durieui* Naudin, *Schizostigma asperatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn., nom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Cogniaux, C. A., 1878, 1916; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Martínez Crovetto, R., 1965, 1974; Pozner, R., 1998a, b.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(sin localidad); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA); URY(MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 13116* (SI)]; BRA[*Sello 896* (*)]; PRY[*Arenas, P. 300* (SI)]; URY[*Courbon, A. 449* (G)].

Cucurbitella cucumifolia (Griseb.) Cogn. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Cucurbitella duriaei (Naudin) Cogn. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Cucurbitella integrifolia Cogn. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Cucurbitella integrifolia Cogn. var. *glabrior* Cogn. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1916; Pozner, R., 1998b.

Cucurbitella urkupinana (Cárdenas) C. Jeffrey = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Cyclanthera Schrad.

Número de especies: 6

Cyclanthera australis Cogn. = **Pseudocyclanthera australis** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1956b.

Cyclanthera boliviensis Mart. Crov. = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera brasiliensis Cogn. = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera digitata Arn. = **Cyclanthera pedata** (L.) Schrad.
Referencias: Lira Saade, R., 1995.

Cyclanthera edulis Naudin ex Huber = **Cyclanthera pedata** (L.) Schrad.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera elegans Cogn. = **Cyclanthera tenuisepala** Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera elegans Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval. = **Cyclanthera tenuisepala** Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera elegans Cogn. var. *grandifolia* Cogn. = **Cyclanthera tenuisepala** Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera elegans Cogn. var. *obtusiloba* Cogn. = **Cyclanthera tenuisepala** Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera elegans Cogn. var. *warmingii* Cogn. = **Cyclanthera tenuisepala** Cogn.
Referencias: Lira Saade, R., 1995; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera hystrix (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn.
Sin.: *Momordica hystrix* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cabrera, A. L., 1993a; Lira Saade, R., 1995; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1974; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA, PAI); URY(CAS, COL, RNO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3934* (CTES, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11704* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 8291* (MO, PY)]; URY[*Osten, C. 6633* (MVM)].

Cyclanthera killipii Standl. = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Lira Saade, R., 1995; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera kuhlmanniana J.M. Toledo & Barboza = **Cyclanthera tenuifolia** Cogn.
Referencias: Lira Saade, R., 1995.

Cyclanthera microcarpa Cogn. = **Cyclanthera tamnifolia** Griseb.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera pedata (L.) Schrad.
Sin.: *Anguria pedatisecta* Ser., *Cyclanthera digitata* Arn., *Cyclanthera edulis* Naudin ex Huber, *Cyclanthera pedata* (L.) Schrad. var. *edulis* (Naudin ex Huber) Cogn., *Momordica pedata* L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Jones, C. E., 1969; Lira Saade, R., 1995; Martínez Crovetto, R., 1968; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 500–2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 1641* (SI)].

Cyclanthera pedata (L.) Schrad. var. *edulis* (Naudin ex Huber) Cogn. = **Cyclanthera pedata** (L.) Schrad.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera quinquelobata (Vell.) Cogn.
Sin.: *Cyclanthera boliviensis* Mart. Crov., *Cyclanthera brasiliensis* Cogn., *Cyclanthera killipii* Standl., *Cyclanthera trianaei* Cogn., *Cyclanthera trigonoloba* J.M. Toledo & Barboza, *Cyclanthera trigonoloba* J.M. Toledo & Barboza var. *caudata* J.M. Toledo & Barboza, *Momordica quinquelobata* Vell.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Jones, C. E., 1969; Lira Saade, R., 1995; Martínez Crovetto, R., 1948; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 300–2900 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 637* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 23152* (CTES)].

Cyclanthera tamnifolia Griseb.
Sin.: *Cyclanthera microcarpa* Cogn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 700–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kiesling, R. 5552* (SI)].

Cyclanthera tenuifolia Cogn.
Sin.: *Cyclanthera kuhlmanniana* J.M. Toledo & Barboza
Referencias: Lira Saade, R., 1995.
Enredadera. Anual. Nativa. 300–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 41175* (CTES, NY)].

Cyclanthera tenuisepala Cogn.
Sin.: *Cyclanthera elegans* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *grandifolia* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *obtusiloba* Cogn., *Cyclanthera elegans* Cogn. var. *warmingii* Cogn., *Cyclanthera tonduzii* Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cogniaux, C. A., 1878; Jones, C. E., 1969; Martínez Crovetto, R., 1968; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5483* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 36409* (PACA)].

Cyclanthera tonduzii Cogn. = **Cyclanthera tenuisepala** Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera trianaei Cogn. = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera trigonoloba J.M. Toledo & Barboza = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Cyclanthera trigonoloba J.M. Toledo & Barboza var. *caudata* J.M. Toledo & Barboza = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Dermophylla eliptica Silva Manso = **Cayaponia pilosa** (Vell.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1968.

Echinocystis araneosa Griseb. = **Echinopepon racemosus** (Steud.) C. Jeffrey
Referencias: Monro, A. K. & Stafford, P. J., 1998; Pozner, R., 1998a.

Echinocystis racemosa (Steud.) Mart. Crov. = **Echinopepon racemosus** (Steud.) C. Jeffrey
Referencias: Monro, A. K. & Stafford, P. J., 1998; Pozner, R., 1998a.

Echinopepon Naudin

Número de especies: 2, 1 endémica

Echinopepon disjunctus Pozner
Referencias: Pozner, R., 2004.
Enredadera. Anual. Endémica. 400–600 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 226* (K, MO, SI)].

Echinopepon racemosus (Steud.) C. Jeffrey
Sin.: *Echinocystis araneosa* Griseb., *Echinocystis racemosa* (Steud.) Mart. Crov., *Momordica muricata* Vell., hom. illeg., *Momordica racemosa* Steud.
Referencias: Jeffrey, C., 1978; Monro, A. K. & Stafford, P. J., 1998; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 300–3500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 26306* (LP, SI)].

Fevillea L.

Número de especies: 2

Fevillea cordifolia Vell., hom. illeg. = **Fevillea trilobata** L.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1916; Martínez Crovetto, R., 1968; Pozner, R., 1998a.

Fevillea passiflora Vell.
Referencias: Robinson, G. L. & Wunderlin, R. P., 2005b.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9106* (US)].

Fevillea trilobata L.
Sin.: *Fevillea cordifolia* Vell., hom. illeg., *Hypanthera guapeva* Silva Manso, *Nhandiroba trilobata* (L.) Kuntze, nom. illeg.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cogniaux, C. A., 1916; Martínez Crovetto, R., 1968; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a; Robinson, G. L. & Wunderlin, R. P., 2005b.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Daviña, J. 196* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19297* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 27267* (CTES, LIL)].

Fevillea triphylla Griseb. ex Lorentz, nom. nud. = **Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.

Fevillea triphylla Griseb., nom. nud. = **Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.

Halosicyos Mart. Crov.

Número de especies: 1 endémica

Halosicyos ragonesei Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1947; Pozner, R., 1998a; Ruíz Leal, R. A., 1958.
Enredadera. Perenne. Endémica. 700–900 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. s.n.* (BAB)].

Hypanthera guapeva Silva Manso = **Fevillea trilobata** L.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1916; Pozner, R., 1998a.

Lagenaria Ser.

Número de especies: 1 introducida

Lagenaria leucantha Rusby, nom. illeg. = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.
Referencias: Jeffrey, C., 1967; Pozner, R., 1998a.

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
Sin.: *Cucurbita lagenaria* L., *Cucurbita siceraria* Molina, *Lagenaria leucantha* Rusby, nom. illeg., *Lagenaria siceraria* (Molina) Standl. var. *laevisperma* Millán, *Lagenaria vulgaris* Ser., *Lagenaria vulgaris* Ser. subsp. *africana* Kobyakova
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Jeffrey, C., 1967; Martínez Crovetto, R., 1954b; Millán, R., 1946; Parodi, L. R., 1980; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Hierba o enredadera. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, JUJ); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, CAA, PAI); URY(SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31431* (SI)]; BRA[*Paciornik, E. F. 255* (MBM)]; PRY[*Soria, N. 3893* (CTES)]; URY[*Millán, A. R. s.n.* (SI)].

Lagenaria siceraria (Molina) Standl. var. *laevisperma* Millán = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.
Referencias: Wunderlin, R. P., 1978.

Lagenaria vulgaris Ser. = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.
Referencias: Jeffrey, C., 1967.

Lagenaria vulgaris Ser. subsp. *africana* Kobyakova = **Lagenaria siceraria** (Molina) Standl.
Referencias: Jeffrey, C., 1967.

Luffa Mill.

Número de especies: 1 introducida

Luffa aegyptiaca Mill.
Sin.: *Momordica cylindrica* L., *Momordica luffa* L.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Exell, A. W., 1933; Martínez Crovetto, R., 1968; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 3061* (SI)]; BRA[*Lindeman, J. C. 1653* (NY)]; PRY[*Mereles, F. 903* (CTES)].

Melancium Naudin

Número de especies: 1

Melancium campestre Naudin
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997a; Martínez Crovetto, R., 1968; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 8836* (*)]; BRA[*Rambo, B. 28126* (PACA)]; PRY[*Krapovickas, A. 46140* (CTES), *Zardini, E. M. 25838* (AS, MO)].

Melothria L.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Melothria añatuyana Mart. Crov. = **Apodanthera anatuyana** (Mart. Crov.) Pozner
Referencias: Pozner, R., 1996.

Melothria candolleana Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1949, 1974; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE); BRA(RGS); PRY(CEN, CON, COA, GUA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2782* (LIL, SI)]; BRA[*Rambo, B. 1480* (PACA)]; PRY[*Vanni, R. O. 1261* (CTES)].

Melothria cucumis Vell.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Martínez Crovetto, R., 1949, 1954b, 1974; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN); URY(CAS, MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2151* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 44711* (CTES)]; PRY[*Jiménez, B. 1849* (BM, CTES, MO, PY)]; URY[*Arechavaleta, J. s.n.* (MVM)].

Melothria fluminensis Gardner = **Melothria pendula** L.
Referencias: Dieterle, J. V. A., 1976; Wunderlin, R. P., 1978.

Melothria pendula L.
Sin.: *Melothria fluminensis* Gardner
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Dieterle, J. V. A., 1976; Martínez Crovetto, R., 1949; Porto, M. L., 1974a; Wunderlin, R. P., 1978.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CEN, COA, ITA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1150* (SI)]; BRA[*Isernhagen, I. 182* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 119* (SI)].

Melothria schulziana Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1949; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1890* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 12297* (CTES)].

Melothria ulei Cogn. = **Apodanthera ulei** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1956a.

Melothria uliginosa Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Martínez Crovetto, R., 1949.
Enredadera. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1465* (BAB, SI)]; PRY[*Hassler, E. 4074* (G)].

Melothria warmingii Cogn.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1949; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS); PRY(APA, AMA, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 5616* (LIL)]; PRY[*Hassler, E. 1691* (SI)].

[Melothrianthus smilacifolius (Cogn.) Mart. Crov.]
Sin.: *Apodanthera smilacifolia* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1956b; Porto, M. L., 1974a.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Momordica L.

Número de especies: 1

Momordica charantia L.
Sin.: *Momordica charantia* L. var. *abbreviata* Ser.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Martínez Crovetto, R., 1965, 1974; Porto, M. L., 1974a.
Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, JUJ, LRI, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 27832* (SI)]; BRA[*Cordeiro, J. 1928* (MBM, SI)]; PRY[*Mereles, F. 6339* (CTES, FCQ)].

Momordica charantia L. var. *abbreviata* Ser. = **Momordica charantia** L.
Referencias: Jeffrey, C., 1967.

Momordica cylindrica L. = **Luffa aegyptiaca** Mill.
Referencias: Exell, A. W., 1933; Pozner, R., 1998a.

Momordica hystrix Gillies ex Hook. & Arn. = **Cyclanthera hystrix** (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954b, 1965, 1974.

Momordica lanata Thunb. = **Citrullus lanatus** (Thunb.) Matsum. & Nakai subsp. **lanatus**

Momordica luffa L. = **Luffa aegyptiaca** Mill.
Referencias: Exell, A. W., 1933; Pozner, R., 1998a.

Momordica muricata Vell., hom. illeg. = **Echinopepon racemosus** (Steud.) C. Jeffrey
Referencias: Monro, A. K. & Stafford, P. J., 1998; Pozner, R., 1998a.

Momordica pedata L. = **Cyclanthera pedata** (L.) Schrad.
Referencias: Jones, C. E., 1969; Pozner, R., 1998a.

Momordica quinquelobata Vell. = **Cyclanthera quinquelobata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Pozner, R., 1998a.

Momordica racemosa Steud. = **Echinopepon racemosus** (Steud.) C. Jeffrey
Referencias: Monro, A. K. & Stafford, P. J., 1998; Pozner, R., 1998a.

Momordica verticillata Vell. = **Wilbrandia verticillata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960.

Nhandiroba trilobata (L.) Kuntze, nom. illeg. = **Fevillea trilobata** L.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1916; Pozner, R., 1998a.

Perianthopodus espelina Silva Manso = **Cayaponia espelina** (Silva Manso) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881.

Prasopepon cucumifolius Griseb. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Prasopepon durieui Naudin = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Pseudocyclanthera Mart. Crov.

Número de especies: 1

Pseudocyclanthera australis (Cogn.) Mart. Crov.
Sin.: *Cyclanthera australis* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1956b.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Neiff, J. J. 1855* (CTES)].

Psiguria Neck. ex Arn.

Número de especies: 1

Psiguria ternata (M. Roem.) C. Jeffrey
Sin.: *Anguria grandiflora* Cogn., *Anguria ternata* M. Roem.
Referencias: Jeffrey, C., 1978.
Liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40595* (CTES, NY)]; PRY[*Schinini, A. 27415* (CTES)].

Pteropepon (Cogn.) Cogn.

Número de especies: 2, 1 endémica

Pteropepon argentinense Mart. Crov.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1952; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 6238* (BAB)].

Pteropepon parodii Mart. Crov.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1950, 1952; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1400 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. s.n.* (LIL, SI)].

Schizostigma asperatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Arn., nom. illeg. = **Cucurbitella asperata** (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.
Referencias: Pozner, R., 1998a, b.

Sicydium Schltdl.

Número de especies: 1

Sicydium gracile Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Klein, V. L. G., 2001; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 1729* (PACA)].

Sicyos L.

Número de especies: 7, 1 endémica

Sicyos aculeatus auct. non R.E. Fr. = **Sicyos warmingii** Cogn. var. **warmingii**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1964a.

Sicyos baderoa Hook. & Arn. var. **ambrosianus** (Skottsb.) Martic. & Quezada
Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris var. *ambrosianus* Skottsb.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.
Enredadera. Anual. Endémica. 400–500 m.
Países: CHL(IDE).
Ejemplares de referencia: CHL[*Skottsberg, C. J. F. 22* (K, SGO)].

Sicyos baderoa Hook. & Arn. var. **baderoa**
Sin.: *Sicyos bryoniaefolius* Moris
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991; Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–900 m.
Países: CHL(I, II, III, IV, V, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Taylor, C. M. 10644* (MO)].

Sicyos bryoniaefolius Moris = **Sicyos baderoa** Hook. & Arn. var. **baderoa**
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.

Sicyos bryoniaefolius Moris var. *ambrosianus* Skottsb. = **Sicyos baderoa** Hook. & Arn. var. **ambrosianus** (Skottsb.) Martic. & Quezada
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.

Sicyos hieronymii Cogn., nom. nud. = **Sicyos warmingii** Cogn. var. **warmingii**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1964a.

Sicyos ignarus Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1964a.
Enredadera. Anual. Endémica.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 253½* (BA)].

Sicyos kunthii Cogn.
Sin.: *Sicyos parviflorus* Kunth, hom. illeg.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1964a.
Enredadera. Anual. Nativa. 1000–3100 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4963* (BA, BAB, LIL, LP, SI)].

Sicyos malvifolius Griseb.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1954b, 1964a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, SJU, TUC); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 8074* (BAB, LIL)]; URY[*Ewernberg 306* (P)].

Sicyos montanus auct. non Poepp. = **Sicyos warmingii** Cogn. var. **warmingii**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1964a.

Sicyos odonelli Mart. Crov.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1955, 1964a.
Enredadera. Anual. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 3361* (LIL)].

Sicyos parviflorus Kunth, hom. illeg. = **Sicyos kunthii** Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1964a.

Sicyos polyacanthus Cogn.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Cabrera, A. L., 1993a; Klein, V. L. G., 2001; Martínez Crovetto, R., 1964a, 1974; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1138* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 48855* (CTES)]; PRY[*Jörgensen, P. 4250* (BA, LIL, LP, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7742* (MVFA)].

Sicyos warmingii Cogn. var. **longispinus** Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1964a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Anual. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 5149* (LIL)].

Sicyos warmingii Cogn. var. **warmingii**
Sin.: *Sicyos aculeatus* auct. non R.E. Fr., *Sicyos hieronymii* Cogn., nom. nud., *Sicyos montanus* auct. non Poepp.
Referencias: Cabrera, A. L., 1993a; Martínez Crovetto, R., 1964a.
Enredadera. Anual. Nativa. 100–3100 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4975* (SI)].

Siolmatra Baill.

Número de especies: 1

Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill.
Sin.: *Alsomitra brasiliensis* Cogn., *Alsomitra brasiliensis* Cogn. var. *pubescens* Griseb., *Fevillea triphylla* Griseb. ex Lorentz, nom. nud., *Fevillea triphylla* Griseb., nom. nud., *Siolmatra brasiliensis* (Cogn.) Baill. var. *pubescens* (Griseb.) Cogn., *Siolmatra paraguayensis* Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1893, 1916; Kearns, D. M., 1993; Robinson, G. L. & Wunderlin, R. P., 2005a.
Liana. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32232* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 3184* (G)].

Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill. var. *pubescens* (Griseb.) Cogn. = **Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.
Referencias: Robinson, G. L. & Wunderlin, R. P., 2005a.

Siolmatra paraguayensis Cogn. = **Siolmatra brasiliensis** (Cogn.) Baill.
Referencias: Kearns, D. M., 1993.

Trianosperma diversifolia Cogn. = **Cayaponia diversifolia** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881; Pozner, R., 1998a.

Trianosperma ficifolia (Lam.) Cogn. var. *dissecta* Cogn. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Jeffrey, C., 1971.

Trianosperma ficifolia (Lam.) Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1954b.

Trianosperma ficifolia (Lam.) Cogn. var. *rigida* Cogn. = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954b.

Trianosperma gracillima Cogn. = **Cayaponia gracillima** (Cogn.) Cogn.

Trianosperma hilarianum Naudin = **Cayaponia bonariensis** (Mill.) Mart. Crov.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1878; Pozner, R., 1998a.

Trianosperma martiana Cogn. = **Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Jeffrey, C., 1971; Martínez Crovetto, R., 1968.

Trianosperma martiana Cogn. var. *acutiloba* Cogn. = **Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1968.

Trianosperma martiana Cogn. var. *genuina* Cogn., nom. inval. = **Cayaponia martiana** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1965, 1968, 1974.

Trianosperma tibiricae Naudin = **Cayaponia tibiricae** (Naudin) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881.

Trianosperma trifoliolata Cogn. = **Cayaponia trifoliolata** (Cogn.) Cogn.
Referencias: Cogniaux, C. A., 1881.

Trianosperma trilobata Cogn. = **Cayaponia trilobata** (Cogn.) Cogn.

Wilbrandia Silva Manso

Número de especies: 5, 2 endémicas

Wilbrandia dusenii Harms
Referencias: Harms, H. A. T., 1926.
Enredadera. Perenne. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 6531* (B)].

Wilbrandia ebracteata Cogn. var. **bracteata** Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960.
Enredadera. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Belgrano, M. J. 400* (SI)].

Wilbrandia ebracteata Cogn. var. **ebracteata**
Sin.: *Wilbrandia longisepala* Cogn. var. *angustiloba* Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960; Porto, M. L., 1974a; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CAU, CAN, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6449* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 8403* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 31437* (CTES)].

Wilbrandia ebracteata Cogn. var. **pedunculata** Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960; Pozner, R., 1998a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 6218* (BAB)]; PRY[*Woolston, A. 980* (SI)].

Wilbrandia hibiscoides Silva Manso
Enredadera. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 39263* (CTES)].

Wilbrandia linearis Cogn. = **Apodanthera linearis** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

Wilbrandia longisepala Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960; Porto, M. L., 1974a.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 39639* (CTES)].

Wilbrandia longisepala Cogn. var. *angustiloba* Cogn. = **Wilbrandia ebracteata** Cogn. var. **ebracteata**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960.

Wilbrandia riedeli Silva Manso = **Wilbrandia verticillata** (Vell.) Cogn.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1960.

Wilbrandia sagittifolia Griseb. = **Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov. var. **sagittifolia**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

Wilbrandia sagittifolia Griseb. var. *dissecta* (Cogn.) Mart. Crov. = **Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov. var. **dissecta** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

Wilbrandia sagittifolia Griseb. var. *typica* Mart. Crov., nom. inval. = **Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov. var. **sagittifolia**
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

Wilbrandia sagittifolia Griseb. var. *villosa* (Cogn.) Mart. Crov. = **Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov. var. **villosa** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

Wilbrandia verticillata (Vell.) Cogn.
Sin.: *Momordica verticillata* Vell., *Wilbrandia riedeli* Silva Manso
Referencias: Angely, J. A., 1965; Martínez Crovetto, R., 1960.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ferrari-Tomé, M. V. 289* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 7124* (G)].

Wilbrandia villosa Cogn. = **Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov. var. **villosa** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

Wilbrandia villosa Cogn. var. *dissecta* Cogn. = **Apodanthera sagittifolia** (Griseb.) Mart. Crov. var. **dissecta** (Cogn.) Mart. Crov.
Referencias: Martínez Crovetto, R., 1954a.

CUNONIACEAE

Autor: Fortune Hopkins, H.

3 géneros, 9 especies, 2 especies endémicas.

Belangera cuneata Cambess. = **Lamanonia cuneata** (Cambess.) Kuntze
Referencias: Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971.

Belangera glabra Cambess. = **Lamanonia ternata** Vell.
Referencias: Biloni, J. S., 1965.

Belangera paraguaiensis Pamp. = **Lamanonia cuneata** (Cambess.) Kuntze
Referencias: Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.

Belangera speciosa Cambess. = **Lamanonia ternata** Vell.
Referencias: Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.

Belangera tomentosa Cambess. = **Lamanonia ternata** Vell.
Referencias: Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.

Caldcluvia D. Don

Número de especies: 1 endémica

Caldcluvia paniculata (Cav.) D. Don
Sin.: *Dieterica paniculata* (Cav.) Ser. ex A. DC., *Weinmannia dentata* Ruiz & Pav. ex López, *Weinmannia paniculata* Cav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Biloni, J. S., 1965; Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1984a; Dimitri, M. J., 1974a.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 1359* (BAB, SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17552* (SI)].

Dieterica paniculata (Cav.) Ser. ex A. DC. = **Caldcluvia paniculata** (Cav.) D. Don
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1984a.

Lamanonia Vell.

Número de especies: 2

Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze
Sin.: *Belangera cuneata* Cambess., *Belangera paraguaiensis* Pamp.
Referencias: Biloni, J. S., 1965; Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971; Hatschbach, G. & Nakamura, H., 1976; Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17938* (HBR, US)]; PRY[*Brunner, D. R. 1038* (MO, PY)].
Notas: Citada erróneamente para Argentina (cfr. Biloni, 1965: 296).

Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B. Sm. = **Lamanonia ternata** Vell.
Referencias: Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.

Lamanonia ternata Vell.
Sin.: *Belangera glabra* Cambess., *Belangera speciosa* Cambess., *Belangera tomentosa* Cambess., *Lamanonia speciosa* (Cambess.) L.B. Sm., *Lamanonia tomentosa* (Cambess.) Kuntze, *Polystemon pentaphyllus* D. Don
Referencias: Biloni, J. S., 1965; Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13630* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 4228* (CTES)].
Notas: Citada para Argentina sin mencionar ejemplar de herbario (Biloni, 1965).

Lamanonia tomentosa (Cambess.) Kuntze = **Lamanonia ternata** Vell.
Referencias: Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.

Polystemon pentaphyllus D. Don = **Lamanonia ternata** Vell.
Referencias: Zickel, C. S. & Leitão, H. F., 1993.

Weinmannia L., nom. cons.

Número de especies: 6, 1 endémica

Weinmannia boliviensis R.E. Fr.
Sin.: *Weinmannia hieronymi* Engl., *Weinmannia sorbifolia* Kunth var. *crenata* auct. non (C. Presl) Cuatrec.
Referencias: Bernardi, L., 1963; Fabris, H. A., 1972.
Árbol. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Brown, A. 972* (SI)].

Weinmannia corymbosa Ruiz & Pav. ex López = **Weinmannia trichosperma** Cav.

Weinmannia dentata Ruiz & Pav. ex López = **Caldcluvia paniculata** (Cav.) D. Don

Weinmannia discolor Gardner
Sin.: *Weinmannia paulliniifolia* Pohl ex Ser. f. *janeirensis* Pamp., *Windmannia discolor* (Gardner) Kuntze
Referencias: Bernardi, L., 1961; Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971; Hatschbach, G. & Nakamura, H., 1976.
Arbusto. Nativa. 900–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).

Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35534* (SI)].

Weinmannia hieronymi Engl. = **Weinmannia boliviensis** R.E. Fr.
Referencias: Fabris, H. A., 1972.

Weinmannia humilis Engl.
Sin.: *Weinmannia microphylla* Ruiz & Pav. f. *humilis* (Engl.) Pamp., *Windmannia humilis* (Engl.) Kuntze
Referencias: Bernardi, L., 1961; Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971; Hatschbach, G. & Nakamura, H., 1976.
Arbusto o arbolito. Nativa. 100–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8380* (HBR, US)].

Weinmannia microphylla Ruiz & Pav. f. *humilis* (Engl.) Pamp. = **Weinmannia humilis** Engl.
Referencias: Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971.

Weinmannia organensis Gardner
Sin.: *Weinmannia pinnata* auct. non L.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5694* (G)].

Weinmannia paniculata Cav. = **Caldcluvia paniculata** (Cav.) D. Don
Referencias: Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1984a.

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser.
Sin.: *Windmannia paulliniifolia* (Pohl ex Ser.) Kuntze
Referencias: Bernardi, L., 1961; Biloni, J. S., 1965; Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971; Hatschbach, G. & Nakamura, H., 1976.
Árbol. Nativa. 0–1900 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9403* (HBR, US)].
Notas: Citada para Argentina sin indicar localidad o material de referencia.

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. f. *janeirensis* Pamp. = **Weinmannia discolor** Gardner
Referencias: Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971.

Weinmannia pinnata auct. non L. = **Weinmannia organensis** Gardner

Weinmannia producta auct. non Moric. = **Weinmannia trichosperma** Cav.

Weinmannia sorbifolia Kunth var. *crenata* auct. non (C. Presl) Cuatrec. = **Weinmannia boliviensis** R.E. Fr.
Referencias: Biloni, J. S., 1965; Fabris, H. A., 1972.

Weinmannia trichosperma Cav.
Sin.: *Weinmannia corymbosa* Ruiz & Pav. ex López, *Weinmannia producta* auct. non Moric., *Windmannia trichosperma* (Cav.) Kuntze
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Bernardi, L., 1961; Biloni, J. S., 1965; Crespo, S. & Pérez-Moreau, R. L., 1984a.
Árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Koslowsky, J. s.n.* (BA)]; CHL[*Lechler, W. 577* (FI, G, M)].

Windmannia discolor (Gardner) Kuntze = **Weinmannia discolor** Gardner
Referencias: Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971.

Windmannia humilis (Engl.) Kuntze = **Weinmannia humilis** Engl.
Referencias: Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971.

Windmannia paulliniifolia (Pohl ex Ser.) Kuntze = **Weinmannia paulliniifolia** Pohl ex Ser.
Referencias: Cuatrecasas, J. & Smith, L. B., 1971.

Windmannia trichosperma (Cav.) Kuntze = **Weinmannia trichosperma** Cav.

DESFONTAINIACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Desfontainia Ruiz & Pav.

Número de especies: 1 endémica

Desfontainia chilensis Gay = **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

Desfontainia fulgens D. Don
Sin.: *Desfontainia chilensis* Gay, *Desfontainia hookeri* Dunal, *Desfontainia ilicifolia* Phil., *Desfontainia novemdentata* Gand., *Desfontainia spinosa* auct. non Ruiz & Pav., *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche, *Desfontainia spinosa* Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Hoc, P. S. & Bravo, L. D., 1984; Leeuwenberg, A. J. M., 1969; Maldonado, S., 1986; Rossow, R. A., 1999j; Weigend, M., 2001.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6024* (NY), *Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1090* (SI)]; CHL[*Gardner, G. 4056* (K), *Morrison, J. L. 17626* (SI)].

Desfontainia hookeri Dunal = **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

Desfontainia ilicifolia Phil. = **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

Desfontainia novemdentata Gand. = **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

Desfontainia spinosa auct. non Ruiz & Pav.
= **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

[Desfontainia spinosa Ruiz & Pav.]
Sin.: *Linkia peruviana* Pers., *Linkia spinosa* (Ruiz & Pav.) Poir.
Referencias: Weigend, M., 2001.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. var. *chilensis* (Gay) Reiche = **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. var. *hookeri* (Dunal) Reiche = **Desfontainia fulgens** D. Don
Referencias: Weigend, M., 2001.

Linkia peruviana Pers. = **Desfontainia spinosa** Ruiz & Pav.
Referencias: Weigend, M., 2001.

Linkia spinosa (Ruiz & Pav.) Poir. = **Desfontainia spinosa** Ruiz & Pav.
Referencias: Weigend, M., 2001.

DILLENIACEAE

Autor: Aymard C., G.

4 géneros, 11 especies.

Curatella Loefl.

Número de especies: 1

Curatella americana L.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Todzia, C. A. & Barrie, F. R., 1991.
Árbol. Nativa. 100–200 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Stevens, W. D. 26207* (MO)].

Davilla Vand.

Número de especies: 3

Davilla brasiliana DC. = **Davilla rugosa** Poir.
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1971.

Davilla castaneaefolia A. St.-Hil. = **Davilla elliptica** A. St.-Hil.
Referencias: Kubitzki, K., 1971; Saint-Hilaire, A. F. C. P., 1825.

Davilla castaneaefolia A. St.-Hil. var. *floribunda* A. St.-Hil. = **Davilla elliptica** A. St.-Hil.
Referencias: Kubitzki, K., 1971.

Davilla elliptica A. St.-Hil.
Sin.: *Davilla castaneaefolia* A. St.-Hil., *Davilla castaneaefolia* A. St.-Hil. var. *floribunda* A. St.-Hil., *Davilla elliptica* A. St.-Hil. var. *castaneaefolia* (A. St.-Hil.) Eichler
Referencias: Aymard C., G., 2002; Kubitzki, K., 1971.
Arbusto o liana. Nativa. 100–300 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1797* (BM, CTES, G, MO, PY)].

Davilla elliptica A. St.-Hil. var. *castaneaefolia* (A. St.-Hil.) Eichler = **Davilla elliptica** A. St.-Hil.
Referencias: Kubitzki, K., 1971.

Davilla grandiflora A. St.-Hil.
Referencias: Kubitzki, K., 1971.
Arbusto. Nativa. 100–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10515* (MO, NY, P, S, W)].

Davilla lechleri Rusby = **Tetracera parviflora** (Rusby) Sleumer
Referencias: Kubitzki, K., 1970.

Davilla parviflora Rusby = **Tetracera parviflora** (Rusby) Sleumer
Referencias: Kubitzki, K., 1970.

Davilla pilosa Miq. = **Davilla rugosa** Poir.
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1971.

Davilla radula Mart. = **Tetracera oblongata** DC.
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1970.

Davilla rugosa Poir.
Sin.: *Davilla brasiliana* DC., *Davilla pilosa* Miq.
Referencias: Aymard C., G. & Miller, J., 1994; Aymard C., G., 1998; Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1971.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2176* (HBR, US)]; PRY[*Soria, N. 7515* (FCQ)].

Doliocarpus Rol.

Número de especies: 3

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.
Sin.: *Tigarea dentata* Aubl.
Referencias: Kubitzki, K., 1971; Stutz, L. C., 1983.
Liana. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(APA, AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11300* (G, NY, P)].

Doliocarpus glomeratus Eichler
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1971.
Liana. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).

Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11952* (G, NY, S)].

Doliocarpus lasiogyne Benoist = **Doliocarpus schottianus** Eichler
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1971.

Doliocarpus schottianus Eichler
Sin.: *Doliocarpus lasiogyne* Benoist
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1971.
Liana. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9517* (G, HBR, US)].

Tetracera L.

Número de especies: 4

Tetracera acuminata DC. = **Tetracera volubilis** L.
Referencias: Kubitzki, K., 1970.

Tetracera carpinifolia Eichler = **Tetracera oblongata** DC.
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1970.

Tetracera gardneri Eichler = **Tetracera oblongata** DC.
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1970.

Tetracera japurensis Mart. & Zucc. = **Tetracera volubilis** L.
Referencias: Kubitzki, K., 1970.

Tetracera oblongata DC.
Sin.: *Davilla radula* Mart., *Tetracera carpinifolia* Eichler, *Tetracera gardneri* Eichler, *Tetracera radula* (Mart.) Eichler
Referencias: Hauman, L. L., 1919b; Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1970.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1180* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 7306* (FLOR, HBR)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6105* (SI)].

Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer
Sin.: *Davilla lechleri* Rusby, *Davilla parviflora* Rusby
Referencias: Kubitzki, K., 1970.
Liana. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(CAU, CAN, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 10513* (FCQ, MO)].

Tetracera radula (Mart.) Eichler = **Tetracera oblongata** DC.
Referencias: Kubitzki, K., 1970.

Tetracera sellowiana Schltdl.
Referencias: Kubitzki, K. & Reitz, P. R., 1971; Kubitzki, K., 1970.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35754* (SI), *Reitz, P. R. 1489* (HBR, NY, US)].

Tetracera volubilis L.
Sin.: *Tetracera acuminata* DC., *Tetracera japurensis* Mart. & Zucc.
Liana. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 3905* (NY)].

Tigarea dentata Aubl. = **Doliocarpus dentatus** (Aubl.) Standl.
Referencias: Kubitzki, K., 1971.

DIPSACACEAE

3 géneros, 5 especies introducidas.

Dipsacus L.

Número de especies: 2 introducidas

Dipsacus fullonum L.
Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var. *sylvestris* (Huds.) Huds., *Dipsacus sylvestris* Huds., *Dipsacus sylvestris* Mill.
Referencias: Burkart, A., 1957a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1965d; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1982.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, RNE, SFE); URY(CAS, MON, ROC, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lavallol, E. s.n.* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2308* (MVFA)].

Dipsacus fullonum L. var. *sativus* L. = **Dipsacus sativus** (L.) Honck.
Referencias: Burkart, A., 1957a; Xifreda, C. C., 1986.

Dipsacus fullonum L. var. *sylvestris* (Huds.) Huds. = **Dipsacus fullonum** L.
Referencias: Burkart, A., 1957a.

Dipsacus sativus (L.) Garsault, nom. nud. = **Dipsacus sativus** (L.) Honck.
Referencias: Xifreda, C. C., 1986.

Dipsacus sativus (L.) Honck.
Sin.: *Dipsacus fullonum* L. var. *sativus* L., *Dipsacus sativus* (L.) Garsault, nom. nud.
Referencias: Burkart, A., 1957a; Correa, M. N., 1999h; Pontiroli, A., 1965d; Xifreda, C. C., 1986.
Hierba. Bianual. Introducida. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(V, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4944* (BA, LP, SI)]; CHL[*Rodríguez Ríos, R. 2918* (CONC)].

Dipsacus sylvestris Huds. = **Dipsacus fullonum** L.
Referencias: Burkart, A., 1957a.

Dipsacus sylvestris Mill. = **Dipsacus fullonum** L.
Referencias: Burkart, A., 1957a.

Knautia L.
Número de especies: 2 introducidas

Knautia arvensis (L.) Coult.
Sin.: *Scabiosa arvensis* L.
Referencias: Burkart, A., 1949d, 1957a; Correa, M. N., 1999h.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 460* (SI)].

Knautia integrifolia (L.) Bertol.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–300 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 1375* (CONC)].

Scabiosa L.
Número de especies: 1 introducida

Scabiosa arvensis L. = **Knautia arvensis** (L.) Coult.
Referencias: Burkart, A., 1949d, 1957a.

Scabiosa atropurpurea L.
Sin.: *Scabiosa maritima* L.
Referencias: Burkart, A., 1957a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pontiroli, A., 1965d.
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MEN, SFE, SJU, TUC); CHL(II, IV, V, VII, VIII, IX, IJF, RME); URY(CAS, CLA, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2190* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 1256* (CONC)]; URY[*Felippone, F. 3137* (SI), *Seijo, G. J. 2601* (SI)].

Scabiosa maritima L. = **Scabiosa atropurpurea** L.
Referencias: Burkart, A., 1957a.

DONATIACEAE

1 género, 1 especie endémica.

Donatia J.R. Forst. & G. Forst.
Número de especies: 1 endémica

Donatia fascicularis J.R. Forst. & G. Forst.
Sin.: *Donatia magellanica* Lam., *Polycarpon magellanicum* L. f.
Referencias: Correa, M. N., 1984a; Moore, D. M., 1974, 1983.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2243* (BAB, SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17657* (SI), *Ricardi, M. 1153* (CONC)].

Donatia magellanica Lam. = **Donatia fascicularis** J.R. Forst. & G. Forst.
Referencias: Correa, M. N., 1984a.

Polycarpon magellanicum L. f. = **Donatia fascicularis** J.R. Forst. & G. Forst.
Referencias: Moore, D. M., 1983.

DROSERACEAE

1 género, 6 especies, 1 especie endémica.

Drosera L.
Número de especies: 6, 1 endémica

Drosera ascendens A. St.-Hil. = **Drosera villosa** A. St.-Hil.
Referencias: Santos, E., 1980.

Drosera brevifolia Pursh
Sin.: *Drosera maritima* A. St.-Hil.
Referencias: Correa A., M. D. & Silva, T. R. S., 2005; Dawson, G., 1938; Duno de Stefano, R., Mereles, F. & Martínez, L., 2001; Parodi, L. R., 1943a; Rotman, A. D., 1987a; Santos, E., 1980; Silva, T. R. S. & Giulietti, A. M., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2100 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA); URY(CAS, LAV, MAL, MON, RNO, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 22566* (SI)]; BRA[*Cordeiro, J. 882* (MBM)]; URY[*Burkart, A. 12677* (SI)].

Drosera brevifolia Pursh var. *major* Hook. = **Drosera capillaris** Poir.
Referencias: Santos, E., 1980.

Drosera capillaris Poir.
Sin.: *Drosera brevifolia* Pursh var. *major* Hook.
Referencias: Correa A., M. D. & Silva, T. R. S., 2005; Santos, E., 1980; Silva, T. R. S. & Giulietti, A. M., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6286* (FLOR)]; PRY[*Hassler, E. 6807* (G, MO, NY, UC)].

Drosera communis A. St.-Hil.
Sin.: *Drosera montana* A. St.-Hil. f. *parviflora* Chodat
Referencias: Correa A., M. D. & Silva, T. R. S., 2005; Dawson, G., 1938; Duno de Stefano, R., Mereles, F. & Martínez, L., 2001; Hauman, L. L., 1925b; Santos, E., 1980; Silva, T. R. S. & Giulietti, A. M., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hauman, L. L. s.n.* (BA)]; BRA[*Pirani, J. R. 388* (SP)]; PRY[*Schinini, A. 23068* (CTES)].

Drosera communis A. St.-Hil. var. *pauciflora* Eichler = **Drosera montana** A. St.-Hil.
Referencias: Correa A., M. D. & Silva, T. R. S., 2005.

Drosera macloviana Gand. = **Drosera uniflora** Willd.
Referencias: Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1984.

Drosera maritima A. St.-Hil. = **Drosera brevifolia** Pursh
Referencias: Dawson, G., 1938; Rotman, A. D., 1987a; Santos, E., 1980.

Drosera montana A. St.-Hil.
Sin.: *Drosera communis* A. St.-Hil. var. *pauciflora* Eichler, *Drosera parvifolia* A. St.-Hil.
Referencias: Correa A., M. D. & Silva, T. R. S., 2005; Santos, E., 1980; Silva, T. R. S. & Giulietti, A. M., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20152* (MBM)].

Drosera montana A. St.-Hil. f. *parviflora* Chodat = **Drosera communis** A. St.-Hil.
Referencias: Duno de Stefano, R., Mereles, F. & Martínez, L., 2001.

Drosera parvifolia A. St.-Hil. = **Drosera montana** A. St.-Hil.
Referencias: Santos, E., 1980.

Drosera uniflora Willd.
Sin.: *Drosera macloviana* Gand.
Referencias: Dawson, G., 1938; Moore, D. M., 1983; Pérez-Moreau, R. L. & Crespo, S., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Goodall, N. 2220* (SI)]; CHL [*Gentry, A. H. 53511* (MO), *Morrison, J. L. 17655* (SI)].

Drosera villosa A. St.-Hil.
Sin.: *Drosera ascendens* A. St.-Hil.
Referencias: Correa A., M. D. & Silva, T. R. S., 2005; Santos, E., 1980; Silva, T. R. S. & Giulietti, A. M., 1997.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20016* (MBM)].

EBENACEAE

Autor: Wallnöfer, B.

1 género, 3 especies, 1 especie endémica.

Diospyros L.

Número de especies: 3, 1 endémica

Diospyros hassleri Hieron.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4964* (BM), *Zardini, E. M. 47957* (AS, MO)].
Notas: Cita dudosa para la flora de Argentina.

Diospyros hispida A. DC.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 27146* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5087* (G)].

Diospyros inconstans Jacq.
Sin.: *Maba inconstans* (Jacq.) Griseb., *Macreightia inconstans* (Jacq.) A. DC.
Referencias: Burkart, A., 1979a; Molfino, J. F., 1923b; Reitz, R., 1988d; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; White, F., 1978.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CEN, GUA, MIE, ÑEE, PAI, SPE); URY(RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21856* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 8316* (FLOR, HBR), *Rambo, B. 37327* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5947* (SI), *Zardini, E. M. 48505* (AS, MO)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Maba inconstans (Jacq.) Griseb. = **Diospyros inconstans** Jacq.
Referencias: Burkart, A., 1979a; Reitz, R., 1988d.

Macreightia inconstans (Jacq.) A. DC. = **Diospyros inconstans** Jacq.
Referencias: Burkart, A., 1979a; Reitz, R., 1988d.

ELAEAGNACEAE

1 género, 1 especie introducida.

Elaeagnus L.

Número de especies: 1 introducida

Elaeagnus angustifolia L.
Sin.: *Elaeagnus argenteus* Moench, *Elaeagnus hortensis* M. Bieb., *Elaeagnus hortensis* M. Bieb. var. *agustifolia* (L.) Schltdl., *Elaeagnus hortensis* M. Bieb. var. *orientalis* (L.) Schltdl., *Elaeagnus incana* Lam., *Elaeagnus orientalis* L., *Elaeagnus spinosa* L., *Elaeagnus tomentosus* Moench
Referencias: Steibel, P., Troiani, H. O. & Williamson, T., 2001[2000]; Sánchez, M. I., 1988a.
Arbolito o árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(LPA, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15396* (BAB)].

Elaeagnus argenteus Moench = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus hortensis M. Bieb. = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus hortensis M. Bieb. var. *agustifolia* (L.) Schltdl. = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus hortensis M. Bieb. var. *orientalis* (L.) Schltdl. = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus incana Lam. = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus orientalis L. = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus spinosa L. = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

Elaeagnus tomentosus Moench = **Elaeagnus angustifolia** L.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988a.

ELAEOCARPACEAE

4 géneros, 10 especies, 4 especies endémicas.

Ablania guianensis Aubl. = **Sloanea guianensis** (Aubl.) Benth.
Referencias: Reitz, R. & Smith, L. B., 1970; Smith Jr., C. E., 1954.

Aristotelia L'Hér., nom. cons.

Número de especies: 1 endémica

Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz
Sin.: *Aristotelia glandulosa* Ruiz & Pav., nom. illeg., *Aristotelia macqui* L'Hér., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *alpestris* Reiche, *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *andina* Phil., *Aristotelia macqui* L'Hér. var. *leucocarpa* Dimitri, *Cornus chilensis* Molina
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Coode, M. J. E., 1985; Moore, H. E., 1953; Rodríguez Ríos, R., 2005; Rossow, R. A., 1988d.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Mazzuconi, V. 1123* (BAB), *Seijo, G. J. 1533* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20018* (CONC), *Morrison, J. L. 17150* (SI)].
Notas: Introducida en el Archipélago de Juan Fernández, Chile.

Aristotelia glandulosa Ruiz & Pav., nom. illeg. = **Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz
Referencias: Coode, M. J. E., 1985.

Aristotelia macqui L'Hér. = **Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz
Referencias: Coode, M. J. E., 1985.

Aristotelia macqui L'Hér. var. *alpestris* Reiche = **Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz
Referencias: Coode, M. J. E., 1985.

Aristotelia macqui L'Hér. var. *andina* Phil. = **Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz
Referencias: Coode, M. J. E., 1985.

Aristotelia macqui L'Hér. var. *leucocarpa* Dimitri = **Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz
Referencias: Rossow, R. A., 1988d.

Cornus chilensis Molina = **Aristotelia chilensis** (Molina) Stuntz
Referencias: Coode, M. J. E., 1985.

Crinodendron Molina

Número de especies: 4, 3 endémicas

Crinodendron boliviense Villa = **Crinodendron tucumanum** Lillo
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Valera, C. A., 1993.

Crinodendron brasiliense Reitz & L.B. Sm.
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987; Reitz, R. & Smith, L. B., 1958, 1970.
Arbusto o arbolito. Endémica. 1400–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 7758* (HBR, US)].

Crinodendron dependens (Ruiz & Pav.) Kuntze = **Crinodendron patagua** Molina
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987.

Crinodendron eriocladum Gand. = **Crinodendron hookerianum** Gay
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987.

Crinodendron hookerianum Gay
Sin.: *Crinodendron eriocladum* Gand., *Tricuspidaria hookeriana* (Gay) A. Cunn., *Tricuspidaria lanceolata* Miq.
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987; Rodríguez Ríos, R., 2005.
Árbol. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Landrum, L. R. 896* (MICH)].

Crinodendron patagua Molina
Sin.: *Crinodendron dependens* (Ruiz & Pav.) Kuntze, *Tricuspidaria dependens* Ruiz & Pav., *Tricuspidaria hexapetala* Turcz., *Tricuspidaria patagua* (Molina) Miers
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987; Rodríguez Ríos, R., 2005.
Árbol. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 428* (SI), *Kausel, E. M. L. 1809* (LIL)].
Notas: Introducida en el Archipélago de Juan Fernández, Chile.

Crinodendron tucumanum Lillo
Sin.: *Crinodendron boliviense* Villa
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987; Descole, H. R. & O´Donell, C. A., 1938; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Valera, C. A., 1993.
Árbol. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4649* (F, GH, LIL, SI), *Venturi, S. 7718* (SI)].

Sloanea L.

Número de especies: 4

Sloanea garckeana K. Schum.
Referencias: Reitz, R. & Smith, L. B., 1970; Smith Jr., C. E., 1954.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 48578* (SI), *Reitz, P. R. 6281* (HBR, US), *Silva, J. M. 188* (SI)].

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Sin.: *Ablania guianensis* Aubl.
Referencias: Reitz, R. & Smith, L. B., 1970; Smith Jr., C. E., 1954.
Árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8952* (HBR, US)].

Sloanea lasiocoma K. Schum.
Referencias: Reitz, R. & Smith, L. B., 1970; Smith Jr., C. E., 1954.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1025* (SI), *Reitz, P. R. 4067* (HBR, US)].

Sloanea monosperma Vell.
Referencias: Reitz, R. & Smith, L. B., 1970; Smith Jr., C. E., 1954.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 52948* (SI), *Reitz, P. R. 16250* (HBR, US)].

Tricuspidaria dependens Ruiz & Pav. = **Crinodendron patagua** Molina
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987.

Tricuspidaria hexapetala Turcz. = **Crinodendron patagua** Molina
Referencias: Bricker, J. S., 1991.

Tricuspidaria hookeriana (Gay) A. Cunn. = **Crinodendron hookerianum** Gay
Referencias: Bricker, J. S., 1991.

Tricuspidaria lanceolata Miq. = **Crinodendron hookerianum** Gay
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987.

Tricuspidaria patagua (Molina) Miers = **Crinodendron patagua** Molina
Referencias: Bricker, J. S., 1991; Coode, M. J. E., 1987.

Vallea Mutis ex L. f.

Número de especies: 1

Vallea stipularis L. f.
Referencias: Coode, M. J. E., 1985; Legname, P. R., 1978; Valera, C. A., 1993.
Árbol. Nativa. 1500–4000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Giusti, L. 12077* (LIL)].

ELATINACEAE

1 género, 2 especies, 1 especie endémica.

Elatine L.

Número de especies: 2, 1 endémica

Elatine brachysperma A. Gray = **Elatine triandra** Schkuhr var. **brachysperma** (A. Gray) Fassett
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970.

Elatine chilensis Naudin = **Elatine triandra** Schkuhr var. **triandra**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970.

Elatine hydropiper L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori = **Elatine triandra** Schkuhr var. **triandra**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970.

Elatine lorentziana Hunz.
Sin.: *Elatine opposita* Bacig.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970; Hunziker, A. T., 1970, 1984e.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS, SFE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26429* (SI), *Deginani, N. B. 1404* (SI)].

[Elatine minima (Nutt.) Fisch. & C.A. Mey.]
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970.
Notas: Especie citada erróneamente para la Argentina sobre la base de material mal identificado.

Elatine nivalis Speg. = **Elatine triandra** Schkuhr var. **triandra**
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970.

Elatine opposita Bacig. = **Elatine lorentziana** Hunz.
Referencias: Hunziker, A. T., 1984e.

Elatine triandra Schkuhr var. **brachysperma** (A. Gray) Fassett
Sin.: *Elatine brachysperma* A. Gray
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970.

Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, FOR); URY(MAL, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8374* (C, CTES)]; URY[*Del Puerto, O. 6404* (MVFA, SI)].

Elatine triandra Schkuhr var. **triandra**
Sin.: *Elatine chilensis* Naudin, *Elatine hydropiper* L. var. *triandra* (Schkuhr) Fiori, *Elatine nivalis* Speg.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1970, 1988a; Baeza, C. M., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MEN, RNE, SFE); CHL(VI, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tur, N. M. 1346 bis* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 692* (LIL)].

EMPETRACEAE

1 género, 1 especie.

Empetrum L.
Número de especies: 1

Empetrum rubrum Vahl ex Willd.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Good, R. D. O., 1927; Moore, D. M., 1970, 1983; Moore, D. M., Harborne, J. B. & Williams, C. A., 1970; Rossow, R. A., 1999a.
Subarbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 14314* (BAA, BAB, SI), *Salomon, B. 4750* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92097* (CONC), *Dudley, T. R. 33* (SI)].

EPACRIDACEAE

Autor: Arroyo-Leuenberger, S.

1 género, 1 especie endémica.

Andromeda myrsinites Lam. = **Lebetanthus myrsinites** (Lam.) Dusén
Referencias: Arroyo, S. C., 1975.

Lebetanthus Endl., nom. cons.
Número de especies: 1 endémica

Lebetanthus americanus (Hook.) Endl. = **Lebetanthus myrsinites** (Lam.) Dusén
Referencias: Arroyo, S. C., 1975, 1999c; Moore, D. M., 1983.

Lebetanthus myrsinites (Lam.) Dusén
Sin.: *Andromeda myrsinites* Lam., *Lebetanthus americanus* (Hook.) Endl., *Pernettya myrsinites* (Lam.) G. Don, *Prionotes americana* Hook., *Prionotes myrsinites* (Lam.) Skottsb.
Referencias: Arroyo, S. C., 1975, 1999c; Crayn, D. M., Kron, K. A., Gadek, P. A. & Quinn, C. J., 1998; Kron, K. A., Judd, W. S., Stevens, P. F., Crayn, D. M., Anderberg, A. A., Gadek, P. A., Quinn, C. J. & Luteyn, J. L., 2002.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Albov, N. M. 644* (LP, SI)]; CHL[*Benove, A. 247* (SI)].

Pernettya myrsinites (Lam.) G. Don = **Lebetanthus myrsinites** (Lam.) Dusén
Referencias: Arroyo, S. C., 1975.

Prionotes americana Hook. = **Lebetanthus myrsinites** (Lam.) Dusén
Referencias: Arroyo, S. C., 1975.

Prionotes myrsinites (Lam.) Skottsb. = **Lebetanthus myrsinites** (Lam.) Dusén
Referencias: Arroyo, S. C., 1975.

EREMOLEPIDACEAE

Revisor: Kuijt, J.

3 géneros, 3 especies, 2 especies endémicas.

Antidaphne Poepp. & Endl.
Número de especies: 1 endémica

Antidaphne punctulata (Clos) Kuijt
Sin.: *Eremolepis punctulata* (Clos) Griseb., *Eremolepis verrucosa* Griseb., *Lepidoceras punctulatum* Clos
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kuijt, J., 1988a.
Arbusto parásito. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 287* (MO, NY, US)].

Eremolepis punctulata (Clos) Griseb. = **Antidaphne punctulata** (Clos) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Eremolepis verrucosa Griseb. = **Antidaphne punctulata** (Clos) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Eubrachion Hook. f.
Número de especies: 1

Eubrachion ambiguum (Hook. & Arn.) Engl.
Sin.: *Eubrachion ambiguum* (Hook. & Arn.) Engl. var. *jamaicense* Krug & Urb., *Eubrachion andalgalense* Abbiatti, *Eubrachion arnottii* Hook. f., *Eubrachion brasiliense* Eichler, *Viscum ambiguum* Hook. & Arn.
Referencias: Abbiatti, D., 1943, 1946c; Kuijt, J., 1988a; Rizzini, C. T., 1956, 1968; Ulibarri, E. A., 1987a.
Arbusto parásito. Nativa. 0–1000 m.

Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, FLA, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23308* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 8953* (MO, NY, US)]; URY[*Del Puerto, O. 4022* (US)].

Eubrachion ambiguum (Hook. & Arn.) Engl. var. *jamaicense* Krug & Urb. = **Eubrachion ambiguum** (Hook. & Arn.) Engl.

Eubrachion andalgalense Abbiatti = **Eubrachion ambiguum** (Hook. & Arn.) Engl.
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Eubrachion arnottii Hook. f. = **Eubrachion ambiguum** (Hook. & Arn.) Engl.
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Eubrachion brasiliense Eichler = **Eubrachion ambiguum** (Hook. & Arn.) Engl.
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Lepidoceras Hook. f.

Número de especies: 1 endémica

Lepidoceras chilense (Molina) Kuijt
Sin.: *Lepidoceras dombei* Hook. f., *Lepidoceras kingii* Hook. f., *Lepidoceras squamifer* Clos, *Myrtobium microphyllum* Miq., *Viscum chilense* Molina
Referencias: Kuijt, J., 1985, 1988a.
Arbusto parásito. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Pfister, A. 635* (CONC)].

Lepidoceras dombei Hook. f. = **Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Lepidoceras kingii Hook. f. = **Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1985, 1988a.

Lepidoceras punctulatum Clos = **Antidaphne punctulata** (Clos) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Lepidoceras squamifer Clos = **Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Myrtobium microphyllum Miq. = **Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1988a.

Viscum ambiguum Hook. & Arn. = **Eubrachion ambiguum** (Hook. & Arn.) Engl.
Referencias: Abbiatti, D., 1946c; Kuijt, J., 1988a.

Viscum chilense Molina = **Lepidoceras chilense** (Molina) Kuijt
Referencias: Kuijt, J., 1985, 1988a.

ERICACEAE

Autores: Luteyn, J. L. & Grela, I.

5 géneros, 33 especies, 18 especies endémicas.

Agarista D. Don ex G. Don

Número de especies: 8, 3 endémicas

Agarista boliviensis (Sleumer) Judd
Sin.: *Leucothoë boliviensis* Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1983b; Judd, W. S., 1984, 1995; Legname, P. R., 1978.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30549* (FLAS, SI)].

Agarista chlorantha (Cham.) G. Don
Sin.: *Agarista serrulata* (Cham.) G. Don, *Andromeda chlorantha* Cham., *Andromeda serrulata* Cham., *Leucothoë chlorantha* (Cham.) DC., *Leucothoë serrulata* (Cham.) DC.
Referencias: Grela, I. & Brussa, C., 2005; Judd, W. S., 1995; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200–1700 m.
Países: BRA(PAR, SCA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13032* (US)]; URY[*Brussa, C. 29476* (MVFA)].

Agarista eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) G. Don
Sin.: *Agarista multiflora* (Pohl) G. Don, *Andromeda eucalyptoides* Cham. & Schltdl., *Andromeda multiflora* Pohl, *Leucothoë eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoë multiflora* (Pohl) DC. var. *eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) Meisn.
Referencias: Grela, I. & Brussa, C., 2005; Judd, W. S., 1995; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbolito o árbol. Nativa. 200–2300 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: BRA[*Malme, G. O. A. 608* (S), *Rambo, B. 37325* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4973* (MVFA)].

Agarista itatiaiae (Wawra) Wawra = **Gaultheria itatiaiae** Wawra
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a.

Agarista minensis (Glaz. ex Sleumer) Judd
Sin.: *Leucothoë minensis* Glaz. ex Sleumer, *Leucothoë minensis* Glaz., nom. nud.
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.
Arbusto. Nativa. 900–1300 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 34939* (MO, S)].

Agarista multiflora (Pohl) G. Don = **Agarista eucalyptoides** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Agarista niederleinii (Sleumer) Judd var. **acutifolia** Judd
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.
Arbusto o arbolito. Endémica. 300–1000 m.

Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25598* (C, MO, NY, S, SP, UC, US)].

Agarista niederleinii (Sleumer) Judd var. **niederleinii**
Sin.: *Leucothoë niederleinii* Sleumer
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.
Arbusto o arbolito. Endémica. 800–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5889* (B, L, NY, UC, US)].

Agarista nummularia (Cham. & Schltdl.) G. Don
Sin.: *Andromeda nummularia* Cham. & Schltdl., *Leucothoë nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC., *Leucothoë nummularia* (Cham. & Schltdl.) DC. var. *floccigera* Sleumer
Referencias: Judd, W. S., 1995; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–1700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7456* (L)].

Agarista paraguayensis (Sleumer) Judd
Sin.: *Leucothoë paraguayensis* Sleumer, *Leucothoë paraguayensis* Sleumer var. *calva* Sleumer
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6468* (SI)]; PRY[*Sparre, B. B. 501* (C, K, LIL, TEX)].

Agarista pulchella Cham. ex G. Don
Sin.: *Leucothoë pulchella* (Cham. ex G. Don) DC.
Referencias: Judd, W. S., 1995; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbusto. Nativa. 100–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7272* (S)].

Agarista serrulata (Cham.) G. Don = **Agarista chlorantha** (Cham.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Andromeda chlorantha Cham. = **Agarista chlorantha** (Cham.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Andromeda eucalyptoides Cham. & Schltdl. = **Agarista eucalyptoides** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Andromeda multiflora Pohl = **Agarista eucalyptoides** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Andromeda nummularia Cham. & Schltdl. = **Agarista nummularia** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Andromeda prostrata Cav. = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b; Sleumer, H. O., 1985.

Andromeda serrulata Cham. = **Agarista chlorantha** (Cham.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Arbutus empetrifolia Lam. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Arbutus furiens Hook. & Arn. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Arbutus mucronata L. f. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Arbutus phillyreifolia Pers. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951.

Arbutus pumila L. f. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Arbutus punctata Hook. & Arn. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Arbutus rigida Banks & Sol. ex Hook. f. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Arbutus serpyllifolia Lam. = **Gaultheria antarctica** Hook. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1951.

Arbutus vernalis Poepp. & Endl. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Brossea organensis (Meisn.) Kuntze = **Gaultheria serrata** (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **organensis** (Meisn.) Luteyn
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a.

[Calluna vulgaris (L.) Salisb.]
Sin.: *Erica vulgaris* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Erica vulgaris L. = **Calluna vulgaris** (L.) Salisb.

Gaultheria L.

Número de especies: 15, 11 endémicas

Gaultheria antarctica Hook. f.
Sin.: *Arbutus serpyllifolia* Lam., *Gaultheria microphylla* Hook. f., *Gaultheria serpyllifolia* (Lam.) Skottsb., *Pernettya hookeri* Nied., *Pernettya serpyllifolia* (Lam.) DC.
Referencias: Moore, D. M., 1983; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR, TDF); CHL(IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 475* (SI), *Diem, J. 360* (BAB)]; CHL[*Ricardi, M. 1196* (CONC)].

Gaultheria bradeana Sleumer
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a; Mendes Marques, M. C., 1975.
Subarbusto. Nativa. 1600–2500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 60223* (B, L)].

Gaultheria caespitosa Poepp. & Endl.
Sin.: *Gaultheria minima* (Phil.) Sandwith, *Pernettya minima* Phil., *Pernettya quadrifida* Phil.
Referencias: Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1500–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 11366* (BAA, BAB, SI)]; CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC), *Werdermann, E. 1292* (SI)].

Gaultheria elegans (Phil.) Reiche = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria erecta Vent.
Sin.: *Gaultheria saltensis* Sleumer
Referencias: Cabrera, A. L., 1983b; Luteyn, J. L., 1995a.
Arbusto. Nativa. 1000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 3865* (SI), *Schiavone, M. M. 11793* (NY), *Sleumer, H. O. 3833* (LIL, US)]; BRA[*Reitz, P. R. 2348* (B, L, NY, RB, US)].

Gaultheria florida Phil. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Kausel, E. M. L., 1949; Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria furiens (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Gaultheria glaziovii Warm. ex Glaz., nom. nud. = **Gaultheria itatiaiae** Wawra
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a.

Gaultheria insana (Molina) D.J. Middleton
Sin.: *Arbutus furiens* Hook. & Arn., *Arbutus punctata* Hook. & Arn., *Arbutus vernalis* Poepp. & Endl., *Gaultheria furiens* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria punctata* (Hook. & Arn.) Hook. & Arn., *Gaultheria rengifoana* Phil., *Gaultheria vernalis* (Poepp. & Endl.) Kunze, *Hippomanica insana* Molina, *Pernettya furiens* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya insana* (Molina) Gunckel, *Pernettya melanocarpa* Phil., *Pernettya punctata* (Hook. & Arn.) Klotzsch, *Pernettya vernalis* (Poepp. & Endl.) Phil.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3241* (BAB)]; CHL[*Ricardi, S. M. 1950* (CONC), *Werdermann, E. 53* (SI)].

Gaultheria itatiaiae Wawra
Sin.: *Agarista itatiaiae* (Wawra) Wawra, *Gaultheria glaziovii* Warm. ex Glaz., nom. nud., *Leucothoë itatiaiae* (Wawra) Drude
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbusto. Nativa. 1000–2300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 35227* (SI), *Smith, L. B. 14421* (C, GH, HBR, L, NY, P, US)].

Gaultheria microphylla Hook. f. = **Gaultheria antarctica** Hook. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria minima (Phil.) Sandwith = **Gaultheria caespitosa** Poepp. & Endl.
Referencias: Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Lindl.) D.J. Middleton
Sin.: *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Pernettya angustifolia* Lindl., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, p.p., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IV, VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5993* (LP), *Diem, J. 1782* (SI)]; CHL[*Bridges, T. C. 565* (K), *Hollermayer, A. 1211* (SI)].

Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn. var. **microphylla** (Decne.) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Decne., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skottsb.
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(XII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Hicken, C. M. 95* (SI)].

Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Sin.: *Arbutus mucronata* L. f., *Arbutus rigida* Banks & Sol. ex Hook. f., *Pernettya litoralis* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *rupicola* (Phil.) Reiche, *Pernettya oblongifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya ovalifolia* Hombr. & Jacq., *Pernettya rupicola* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Moore, D. M., 1983; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 502* (SI), *Vervoorst, F. B. 5814* (BAB)]; CHL[*Forster, J. R. s.n.* (GOET, S), *Werdermann, E. 76* (SI)].

Gaultheria myrsinoides Kunth = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b.

Gaultheria myrtilloides Hook. & Arn. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria myrtilloides Poepp. & Endl., nom. illeg. = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Gaultheria myrtilloides Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Lindl.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Gaultheria nubigena (Phil.) B.L. Burtt & Sleumer
Sin.: *Pernettya nubigena* Phil.
Referencias: Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1957.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6011* (SI), *Diem, J. 338* (BAB, LIL)]; CHL[*Pearce, R. s.n.* (SGO)].

Gaultheria organensis Meisn. = **Gaultheria serrata** (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **organensis** (Meisn.) Luteyn
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a.

Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer
Sin.: *Arbutus phillyreifolia* Pers., *Gaultheria florida* Phil., *Gaultheria myrtilloides* Hook. & Arn., *Gaultheria phillyreifolia* (Pers.) Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel, *Pernettya ilicifolia* Miq., nom. nud., *Pernettya palenae* Phil., *Pernettya philippii* Gand., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE); CHL(VII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6103* (SI), *Krapovickas, A. 3945* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996019* (CONC), *Werdermann, E. 1171* (SI)].

Gaultheria phillyreifolia (Pers.) Sleumer var. *florida* (Phil.) Kausel = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer

Gaultheria poeppigii DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya leucocarpa* DC. var. *linearis* Reiche, p.p., *Pernettya linifolia* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1900 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; CHL[*Pearce, R. s.n.* (SGO)].

Gaultheria poeppigii DC. var. **nana** (Sleumer) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *nana* (Sleumer) Sleumer, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch var. *nana* Sleumer
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 1500–1900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1597* (LIL)]; CHL[*Grosse s.n.* (LIL)].

Gaultheria poeppigii DC. var. **poeppigii**
Sin.: *Gaultheria myrtilloides* Poepp. & Endl., nom. illeg., *Pernettya buxifolia* Phil., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche, *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *cordobensis* Sleumer, *Pernettya myrtilloides* Zucc. ex Steud. var. *myrtilloides*, *Pernettya patagonica* Speg., *Pernettya philippiana* Speg., *Pernettya phillyreifolia* (Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze, *Pernettya poeppigii* (DC.) Klotzsch
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, COR, NEU, RNE, SLU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 6026* (SI), *O'Donell, C. A. 2398* (LIL)]; CHL[*Burkart, A. 27522* (SI), *Poeppig, E. F. 679* (G, HAL, L, W)].

[Gaultheria procumbens L.]
Referencias: Moore, D. M., 1983.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton var. **crassifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya andina* Meigen, nom. nud., *Pernettya crassifolia* Phil., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 600–3200 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VI, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6175* (LP), *Neumeyer 586* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya breviflora* Phil., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd., *Pernettya gayana* (DC.) Decne., *Pernettya leucocarpa* DC., *Pernettya leucocarpa* DC. var. *gayana* DC., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 600–3200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 9716* (SI), *Diem, J. 1787* (BAB)]; CHL[*Poeppig, E. F. 121* (G, W), *Rentzell, I. 6257* (SI)].

Gaultheria pumila (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Sin.: *Arbutus empetrifolia* Lam., *Arbutus pumila* L. f., *Pernettya empetrifolia* (Lam.) Gaudich., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook., *Pernettya pumila* (L. f.) Hook. var. *empetrifolia* (Lam.) Hook. f., *Pernettya trinervia* Gand.
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Moore, D. M., 1983; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 749* (SI), *Krapovickas, A. 4150* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92119* (CONC, SGO), *Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Gaultheria punctata (Hook. & Arn.) Hook. & Arn. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Gaultheria racemulosa (DC.) D.J. Middleton
Sin.: *Pernettya bridgesii* Phil., *Pernettya mucronata* (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *mutica* Hook. & Arn., *Pernettya racemulosa* DC., *Pernettya rigida* (Bertero ex Colla) DC.
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.
Arbusto. Endémica. 100–1400 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. s.n.* (P)].

Gaultheria rengifoana Phil. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Gaultheria salicifolia Phil. = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria saltensis Sleumer = **Gaultheria erecta** Vent.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a.

Gaultheria serpyllifolia (Lam.) Skottsb. = **Gaultheria antarctica** Hook. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1951.

Gaultheria serrata (Vell.) Sleumer ex Kin.-Gouv. var. **organensis** (Meisn.) Luteyn
Sin.: *Brossea organensis* (Meisn.) Kuntze, *Gaultheria organensis* Meisn.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbusto. Nativa. 1000–2700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6687* (L)].

Gaultheria tenuifolia (Phil.) Sleumer
Sin.: *Gaultheria elegans* (Phil.) Reiche, *Gaultheria salicifolia* Phil., *Gaultheria tenuifolia* (Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel, *Pernettya elegans* Phil., *Pernettya promaucana* Phil., *Pernettya reticulata* Phil., *Pernettya tenuifolia* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1951.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 7034* (BAB)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 20029* (CONC, SGO)].

Gaultheria tenuifolia (Phil.) Sleumer var. *elegans* (Phil.) Kausel = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951, 1985.

Gaultheria ulei Sleumer
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a; Mendes Marques, M. C., 1975.
Arbusto. Endémica. 1200–1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2156* (A, C, HBG, K, L, P, S, SI, U, US)].

Gaultheria vernalis (Poepp. & Endl.) Kunze = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Gaylussacia Kunth

Número de especies: 8, 4 endémicas

Gaylussacia angustifolia Cham.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975; Sleumer, H. O., 1967c.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pedersen, T. M. 12643* (NY), *Reitz, P. R. 7444* (HBR)].

Gaylussacia arassatubensis R.R. Silva & Cervi
Referencias: Silva, R. R. & Cervi, A. C., 1999.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Fernandes, H. M. 278* (MBM, UPCB)].

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.
Sin.: *Gaylussacia brasiliensis* (Spreng.) Meisn. var. *pubescens* (Cham. & Schltdl.) Meisn., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltdl., *Gaylussacia pseudovaccinium* Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Cham. & Schltdl., *Vaccinium brasiliensis* Spreng.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975; Sleumer, H. O., 1967c.
Arbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4110* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 5067* (MO)].

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn. var. *pubescens* (Cham. & Schltdl.) Meisn. = **Gaylussacia brasiliensis** (Spreng.) Meisn.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975.

Gaylussacia caratuvensis R.R. Silva & Cervi
Referencias: Silva, R. R. & Cervi, A. C., 1999.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16827* (MBM)].

Gaylussacia cardenasii A.C. Sm.
Referencias: Cabrera, A. L., 1983b; Sleumer, H. O., 1967c.
Arbusto. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3857* (LIL, SI)].

Gaylussacia corvensis R.R. Silva & Cervi
Referencias: Silva, R. R. & Cervi, A. C., 2003.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 71783* (HBR, MBM, UPCB)].

Gaylussacia pseudogaultheria Cham. & Schltdl.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975; Sleumer, H. O., 1967c.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lourteig, A. 2157* (HBR, P)].

Gaylussacia pseudovaccinium Cham. & Schltdl. = **Gaylussacia brasiliensis** (Spreng.) Meisn.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975.

Gaylussacia pseudovaccinium Cham. & Schltdl. var. *pubescens* Cham. & Schltdl. = **Gaylussacia brasiliensis** (Spreng.) Meisn.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975.

Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl.
Referencias: Sleumer, H. O., 1967c.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14742* (US)].

Hippomanica insana Molina = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990.

Leucothoë boliviensis Sleumer = **Agarista boliviensis** (Sleumer) Judd
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.

Leucothoë chlorantha (Cham.) DC. = **Agarista chlorantha** (Cham.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Leucothoë eucalyptoides (Cham. & Schltdl.) DC. = **Agarista eucalyptoides** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Leucothoë itatiaiae (Wawra) Drude = **Gaultheria itatiaiae** Wawra
Referencias: Luteyn, J. L., 1995a.

Leucothoë minensis Glaz. ex Sleumer = **Agarista minensis** (Glaz. ex Sleumer) Judd
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.

Leucothoë minensis Glaz., nom. nud. = **Agarista minensis** (Glaz. ex Sleumer) Judd
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.

Leucothoë multiflora (Pohl) DC. var. *eucalyptoides* (Cham. & Schltdl.) Meisn. = **Agarista eucalyptoides** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Leucothoë niederleinii Sleumer = **Agarista niederleinii** (Sleumer) Judd var. **niederleinii**
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.

Leucothoë nummularia (Cham. & Schltdl.) DC. = **Agarista nummularia** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Leucothoë nummularia (Cham. & Schltdl.) DC. var. *floccigera* Sleumer = **Agarista nummularia** (Cham. & Schltdl.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Leucothoë paraguayensis Sleumer = **Agarista paraguayensis** (Sleumer) Judd
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.

Leucothoë paraguayensis Sleumer var. *calva* Sleumer = **Agarista paraguayensis** (Sleumer) Judd
Referencias: Judd, W. S., 1984, 1995.

Leucothoë pulchella (Cham. ex G. Don) DC. = **Agarista pulchella** Cham. ex G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Leucothoë serrulata (Cham.) DC. = **Agarista chlorantha** (Cham.) G. Don
Referencias: Judd, W. S., 1995.

Pernettya Gaudich.

Número de especies: 1

Pernettya andina Meigen, nom. nud. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **crassifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya angustifolia Lindl. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Lindl.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya breviflora Phil. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya bridgesii Phil. = **Gaultheria racemulosa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya buxifolia Phil. = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya cavanillesiana G. Don, nom. illeg. = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya crassifolia Phil. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **crassifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya densa Rusby = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b; Sleumer, H. O., 1951, 1985.

Pernettya elegans Phil. = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951, 1985.

Pernettya empetrifolia (Lam.) Gaudich. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya empetrifolia (Lam.) Gaudich. var. *leucocarpa* (DC.) Wedd. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya furiens (Hook. & Arn.) Klotzsch = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya gayana (DC.) Decne. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya hookeri Nied. = **Gaultheria antarctica** Hook. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya ilicifolia Miq., nom. nud. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya insana (Molina) Gunckel = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya leucocarpa DC. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya leucocarpa DC. var. *buxifolia* (Phil.) Reiche = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya leucocarpa DC. var. *gayana* DC. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya leucocarpa DC. var. *linearis* Reiche, p.p. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Lindl.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya leucocarpa DC. var. *linearis* Reiche, p.p. = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya linifolia Phil. = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya litoralis Phil. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya melanocarpa Phil. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya minima Phil. = **Gaultheria caespitosa** Poepp. & Endl.
Referencias: Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *angustifolia* (Lindl.) Reiche = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **angustifolia** (Lindl.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *cordobensis* Sleumer = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *linifolia* (Phil.) Reiche = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *microphylla* Decne. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **microphylla** (Decne.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *mutica* Hook. & Arn. = **Gaultheria racemulosa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *parvifolia* (Phil.) Skottsb. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **microphylla** (Decne.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya mucronata (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. *rupicola* (Phil.) Reiche = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya myrtilloides Zucc. ex Steud. var. *linifolia* (Phil.) Kausel = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya myrtilloides Zucc. ex Steud. var. *myrtilloides* = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya myrtilloides Zucc. ex Steud. var. *nana* (Sleumer) Sleumer = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **nana** (Sleumer) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya nubigena Phil. = **Gaultheria nubigena** (Phil.) B.L. Burtt & Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951, 1957.

Pernettya oblongifolia Hombr. & Jacq. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya ovalifolia Hombr. & Jacq. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya palenae Phil. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya patagonica Speg. = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya pentandlii DC. = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b.

Pernettya philippiana Speg. = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya philippii Gand. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya phillyreifolia (Pers.) DC. = **Gaultheria phillyreifolia** (Pers.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya phillyreifolia (Pers.) DC. var. *araucana* Kuntze = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya poeppigii (DC.) Klotzsch = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **poeppigii**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya poeppigii (DC.) Klotzsch var. *linifolia* (Phil.) Sleumer = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya poeppigii (DC.) Klotzsch var. *nana* Sleumer = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **nana** (Sleumer) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya promaucana Phil. = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya prostrata (Cav.) Sleumer, comb. superfl. = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b.

Pernettya prostrata (Cav.) DC.
Sin.: *Andromeda prostrata* Cav., *Gaultheria myrsinoides* Kunth, *Pernettya cavanillesiana* G. Don, nom. illeg., *Pernettya densa* Rusby, *Pernettya pentandlii* DC., *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *pentlandlii* (DC.) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) DC. var. *purpurea* (D. Don ex G. Don) Sleumer, *Pernettya prostrata* (Cav.) Sleumer, comb. superfl., *Pernettya purpurea* D. Don ex G. Don
Referencias: Cabrera, A. L., 1983b; Luteyn, J. L., 1995b; Sleumer, H. O., 1951, 1985.
Arbusto. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castillón, L. 28575* (LIL)].

Pernettya prostrata (Cav.) DC. var. *linifolia* (Phil.) Sleumer = **Gaultheria poeppigii** DC. var. **linifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya prostrata (Cav.) DC. var. *pentlandlii* (DC.) Sleumer = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b.

Pernettya prostrata (Cav.) DC. var. *purpurea* (D. Don ex G. Don) Sleumer = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b.

Pernettya pumila (L. f.) Hook. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya pumila (L. f.) Hook. var. *crassifolia* (Phil.) Sleumer = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **crassifolia** (Phil.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya pumila (L. f.) Hook. var. *empetrifolia* (Lam.) Hook. f. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya pumila (L. f.) Hook. var. *leucocarpa* (DC.) Kausel = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **leucocarpa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya punctata (Hook. & Arn.) Klotzsch = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya purpurea D. Don ex G. Don = **Pernettya prostrata** (Cav.) DC.
Referencias: Luteyn, J. L., 1995b.

Pernettya quadrifida Phil. = **Gaultheria caespitosa** Poepp. & Endl.
Referencias: Sleumer, H. O. & Hermann, P., 1999; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya racemulosa DC. = **Gaultheria racemulosa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya reticulata Phil. = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya rigida (Bertero ex Colla) DC. = **Gaultheria racemulosa** (DC.) D.J. Middleton
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya rupicola Phil. = **Gaultheria mucronata** (L. f.) Hook. & Arn. var. **mucronata**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya serpyllifolia (Lam.) DC. = **Gaultheria antarctica** Hook. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1951, 1985.

Pernettya tenuifolia Phil. = **Gaultheria tenuifolia** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1951, 1985.

Pernettya trinervia Gand. = **Gaultheria pumila** (L. f.) D.J. Middleton var. **pumila**
Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Pernettya vernalis (Poepp. & Endl.) Phil. = **Gaultheria insana** (Molina) D.J. Middleton

Referencias: Middleton, D. J. & Wilcox, C. C., 1990; Sleumer, H. O., 1985.

Vaccinium L.

Número de especies: 1

Vaccinium brasiliensis Spreng. = **Gaylussacia brasiliensis** (Spreng.) Meisn.
Referencias: Mendes Marques, M. C., 1975.

Vaccinium floribundum Kunth
Sin.: *Vaccinium floribundum* Kunth var. *ramosissimum* (Dunal) Sleumer, *Vaccinium ramosissimum* Dunal
Referencias: Cabrera, A. L., 1983b; Sleumer, H. O., 1957.
Arbusto. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3831* (LIL, SI)].

Vaccinium floribundum Kunth var. *ramosissimum* (Dunal) Sleumer = **Vaccinium floribundum** Kunth

Vaccinium ramosissimum Dunal = **Vaccinium floribundum** Kunth
Referencias: Cabrera, A. L., 1983b.

ERYTHROXYLACEAE

1 género, 19 especies, 4 especies endémicas.

Erythraea deciduum A. St.-Hil. var. *brevifolium* (Mart.) O.E. Schulz = **Erythroxylum deciduum** A. St.-Hil. var. **deciduum**
Referencias: Amaral, A., 1980.

Erythroxylum P. Browne

Número de especies: 19, 4 endémicas

Erythroxylum actinocalyx Mart. = **Erythroxylum cuspidifolium** Mart.
Referencias: Amaral, A., 1980.

Erythroxylum ambiguum Peyr.
Sin.: *Erythroxylum ambiguum* Peyr. var. *hymenophyllum* O.E. Schulz
Referencias: Amaral, A., 1980; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 5169* (HBR, LIL, MBM)].

Erythroxylum ambiguum Peyr. var. *hymenophyllum* O.E. Schulz = **Erythroxylum ambiguum** Peyr.
Referencias: Amaral, A., 1980; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum amplifolium (Mart.) O.E. Schulz, nom. illeg. = **Erythroxylum vaccinifolium** Mart.
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum anguifugum Mart.
Referencias: Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40606* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 7398* (*)].

Erythroxylum argentinum O.E. Schulz
Sin.: *Erythroxylum argentinum* O.E. Schulz var. *calophyllum* O.E. Schulz, *Erythroxylum ovatum* Griseb., hom. illeg., *Erythroxylum pelleterianum* auct. non A. St.-Hil.
Referencias: Amaral, A., 1980; Digilio, A. P. L. & Legname, P. R., 1966; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 145* (CORD, G, NY)]; BRA[*Rambo, B. 44927* (SI), *Smith, L. B. 7295* (HBR, US)].

Erythroxylum argentinum O.E. Schulz var. *calophyllum* O.E. Schulz = **Erythroxylum argentinum** O.E. Schulz
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum buxus Peyr.
Referencias: Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hoehne, F. C. 576* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 20634* (CTES)].

Erythroxylum campestre A. St.-Hil.
Referencias: Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Souza, V. C. 8761* (CTES)]; PRY[*Hahn, W. J. 1768* (MO, PY)].

Erythroxylum catharinense Amaral
Referencias: Amaral, A., 1980; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3253* (BR, HBR, M)].

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz
Sin.: *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E. Schulz var. *silvaticum* O.E. Schulz, *Erythroxylum cuneifolium* (Mart.) O.E. Schulz var. *squarrosum* O.E. Schulz, *Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil. var. *cuneifolium* Mart.
Referencias: Amaral, A., 1980; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Ragonese, A. E., 1941; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.

Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA,).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1948* (SI)]; BRA[*Bresolin, A. 682* (FLOR, HBR)]; PRY[*Múlgura de Romero, M. E. 3575* (CTES, FCQ, SI), *Rojas, T. 2798* (SI)].

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz var. *silvaticum* O.E. Schulz = **Erythroxylum cuneifolium** (Mart.) O.E. Schulz
Referencias: Amaral, A., 1980; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E. Schulz var. *squarrosum* O.E. Schulz = **Erythroxylum cuneifolium** (Mart.) O.E. Schulz
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum cuspidifolium Mart.
Sin.: *Erythroxylum actinocalyx* Mart.
Referencias: Amaral, A., 1980; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 360* (HBR, US)].

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. var. **deciduum**
Sin.: *Erythraea deciduum* A. St.-Hil. var. *brevifolium* (Mart.) O.E. Schulz, *Erythroxylum hasslerianum* Chodat, *Erythroxylum hasslerianum* Chodat f. *angustifolium* Chodat & Hassl., *Erythroxylum nanum* A. St.-Hil.
Referencias: Amaral, A., 1980; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 7077* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2764* (SI), *Smith, L. B. 12833* (HBR, US)]; PRY[*Hahn, W. J. 904* (MO, NY, PY), *Jörgensen, P. 3460* (SI)].

[Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. var. opacum O.E. Schulz]
Referencias: Amaral, A., 1980; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.
Notas: Nombre dudoso.

Erythroxylum distortum Mart. var. *paraguariense* Chodat & Hassl. = **Erythroxylum paraguariense** (Chodat & Hassl.) O.E. Schulz
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.

Erythroxylum gonoclados (Mart.) O.E. Schulz
Sin.: *Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil. var. *gonocladum* Mart.
Referencias: Amaral, A., 1980; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4123* (HBR)].

Erythroxylum hasslerianum Chodat = **Erythroxylum deciduum** A. St.-Hil. var. **deciduum**
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum hasslerianum Chodat f. *angustifolium* Chodat & Hassl. = **Erythroxylum deciduum** A. St.-Hil. var. **deciduum**
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum hasslerianum Chodat f. *ellipticum* Chodat & Hassl. = **Erythroxylum pachyneurum** O.E. Schulz
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil.
Sin.: *Erythroxylum perpusillum* Fern. Casas
Referencias: Amaral, A., 1980; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Schulz, O. E., 1907.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, COA, SPE); URY(ART, CLA, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2701* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34629* (SI), *Reitz, P. R. 6059* (HBR)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 3897* (G, MA, NY), *Rojas, T. 6325* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1175* (SI)].

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil. var. *amplifolium* Mart. = **Erythroxylum vaccinifolium** Mart.
Referencias: Amaral, A., 1980; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil. var. *cuneifolium* Mart. = **Erythroxylum cuneifolium** (Mart.) O.E. Schulz
Referencias: Amaral, A., 1980; Schulz, O. E., 1907.

Erythroxylum microphyllum A. St.-Hil. var. *gonocladum* Mart. = **Erythroxylum gonoclados** (Mart.) O.E. Schulz
Referencias: Amaral, A., 1980; Schulz, O. E., 1907.

Erythroxylum myrsinites Mart.
Referencias: Amaral, A., 1980; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, GUA, MIE); URY(ART, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 4977* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 413* (SI), *Hatschbach, G. 51482* (SI), *Smith, L. B. 12884* (HBR, US)]; PRY[*Jiménez, B. 1910* (BM, CTES, G, MO, PY), *Pedersen, T. M. 4289* (NY)]; URY[*Arechavaleta, J. 138* (*)].

Erythroxylum nanum A. St.-Hil. = **Erythroxylum deciduum** A. St.-Hil. var. **deciduum**

Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

[Erythroxylum nitidum Spreng.]
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Erythroxylum ovatum Griseb., hom. illeg.
= **Erythroxylum argentinum** O.E. Schulz
Referencias: Amaral, A., 1980.

Erythroxylum pachyneurum O.E. Schulz
Sin.: *Erythroxylum hasslerianum* Chodat f. *ellipticum* Chodat & Hassl.
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1909.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5773* (NY), *Hassler, E. 9623* (A, BM, G)].

Erythroxylum paraguariense (Chodat & Hassl.) O.E. Schulz
Sin.: *Erythroxylum distortum* Mart. var. *paraguariense* Chodat & Hassl.
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7458* (A, BM, F, G, K, MO, NY, P, W), *Rojas, T. 2802* (SI)].

Erythroxylum patentissimum O.E. Schulz
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 12005* (SI), *Hassler, E. 7602* (B, F, NY)].

Erythroxylum pelleterianum auct. non A. St.-Hil.
= **Erythroxylum argentinum** O.E. Schulz
Referencias: Amaral, A., 1980.

Erythroxylum pelleterianum A. St.-Hil.
Sin.: *Erythroxylum verruculosum* O.E. Schulz
Referencias: Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Amaral, A. 86* (NY), *Teodoro 15* (SI)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 4096* (NY), *Hassler, E. 5158* (*)].

Erythroxylum perpusillum Fern. Casas = **Erythroxylum microphyllum** A. St.-Hil.
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

Erythroxylum suberosum A. St.-Hil.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Oliveira Mendonça, J. & Amaral, A., 2002; Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9664* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 4401* (G), *Marín, G. 637* (BM, CTES, MO, PY), *Múlgura de Romero, M. E. 3703* (CTES, FCQ, SI)].

Erythroxylum substriatum O.E. Schulz
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Tweedie, J. 51* (K)].

Erythroxylum vaccinifolium Mart.
Sin.: *Erythroxylum amplifolium* (Mart.) O.E. Schulz, nom. illeg., *Erythroxylum microphyllum* A. St.-Hil. var. *amplifolium* Mart.
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004; Schulz, O. E., 1907.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 925* (HBR, US)]; URY[*Anderson 64* (*)].

Erythroxylum verruculosum O.E. Schulz
= **Erythroxylum pelleterianum** A. St.-Hil.
Referencias: Plowman, T. C. & Hensold, N., 2004.

ESCALLONIACEAE

Autor: Sede, S.

2 géneros, 29 especies, 17 especies endémicas.

Celastrus venustus Banks & Sol. ex Hook. f. = **Escallonia serrata** Sm.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia Mutis ex L. f.

Número de especies: 28, 16 endémicas

Escallonia affinis Rupr. ex A. Gray, nom. nud.
= **Escallonia revoluta** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. **alpina**
Sin.: *Escallonia alpina* Poepp. ex DC. var. *glaberrima* Phil., *Escallonia araucana* Phil., *Escallonia britteniana* Rendle, *Escallonia fonckii* Phil., *Escallonia fonckii* Phil. var. *araucana* (Phil.) Reiche, *Escallonia misella* Gand., *Escallonia sparsiflora* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto. Endémica. 200–2300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Dawson, G. 2088* (LP)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92401* (CONC)].

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. **carmelitana** (Meyen) Acevedo & Kausel
Sin.: *Escallonia carmelitana* Meyen, *Escallonia flavescens* C. Presl
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 2203* (LIL, W)]; CHL[*Morrison, J. L. 17057* (K, UC)].

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. *glaberrima* Phil. = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia alpina Poepp. ex DC. var. **glabrata** (Phil.) Sleumer
Sin.: *Escallonia glabrata* Phil.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 600–2000 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 2780* (SGO)].

Escallonia andina Phil., p.p. = **Escallonia illinita** C. Presl var. **illinita**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia andina Phil., p.p. = **Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia angustifolia Phil. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia angustifolia C. Presl
Sin.: *Escallonia angustifolia* C. Presl var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel, *Escallonia coquimbensis* J. Remy, *Escallonia coquimbensis* J. Remy var. *salicifolia* Reiche, *Escallonia graefiana* Hosseus, nom. nud.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Kiesling, R., 1994f; Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–3300 m.
Países: ARG(SJU); CHL(I, III, IV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fabris, H. A. 2287* (LP)]; CHL[*Krapovickas, A. 5743* (BAB)].

Escallonia angustifolia C. Presl var. *coquimbensis* (J. Remy) Acevedo & Kausel = **Escallonia angustifolia** C. Presl
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia araucana Phil. = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia arguta C. Presl = **Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia bellidifolia Phil. = **Escallonia leucantha** J. Remy
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia berberifolia auct. non (Humb. & Bonpl.) Kunth = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **dumetorum** (Phil.) Acevedo & Kausel
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia berteriana DC. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia bifida Link & Otto
Sin.: *Escallonia floribunda* Humb., Bonpl. & Kunth var. *montevidensis* Cham. & Schltdl., *Escallonia montevidensis* (Cham. & Schltdl.) DC., *Escallonia pugae* Phil.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, GUA); URY(MAL, MON, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bridarolli, A. J. 2521* (LP)]; BRA[*Smith, L. B. 10629* (HBR, US)]; PRY[*Montes, J. E. 9803* (LIL)]; URY[*Rosengurtt, B. 4852* (SI)].

[Escallonia bracteata Phil.]
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.
Notas: Nombre dudoso.

Escallonia britteniana Rendle = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia callcottiae Hook. & Arn.
Sin.: *Escallonia callcottiae* Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl., *Escallonia fernandeziana* Phil., *Escallonia rubricaulis* Colla
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–800 m.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Morrison, J. L. 17343* (G, K, UC)].

Escallonia callcottiae Hook. & Arn. var. *fernandeziana* (Phil.) Engl. = **Escallonia callcottiae** Hook. & Arn.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia candida Lem. = **Escallonia chlorophylla** Cham. & Schltdl.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia canescens A. St.-Hil. = **Escallonia chlorophylla** Cham. & Schltdl.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia carmelitana Meyen = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **carmelitana** (Meyen) Acevedo & Kausel

Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia chlorophylla Cham. & Schltdl.
Sin.: *Escallonia candida* Lem., *Escallonia canescens* A. St.-Hil., *Escallonia tomentosa* Cambess. ex Niederl., nom. nud.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Marchioretto, M. S., 1992; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 49390* (HBR, PACA)].

Escallonia chonotica Phil. = **Escallonia rosea** Griseb.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia claudii Killip = **Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia concinna Phil. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia coquimbensis J. Remy = **Escallonia angustifolia** C. Presl
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia coquimbensis J. Remy var. *salicifolia* Reiche = **Escallonia angustifolia** C. Presl
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia cordobensis (Kuntze) Hosseus
Sin.: *Escallonia montana* auct. non Phil., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *cordobensis* Kuntze
Referencias: Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 9659* (CORD)].

Escallonia dumetorum Phil. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **dumetorum** (Phil.) Acevedo & Kausel
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia duplicato-serrata J. Remy = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia farinacea A. St.-Hil. var. **farinacea**
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Nativa. 800–1800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10347* (HBR, US)].

Escallonia farinacea A. St.-Hil. var. **jordanensis** (Sleumer) Sleumer
Sin.: *Escallonia jordanensis* Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Nativa. 500–1600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10798* (S)].

Escallonia fernandeziana Phil. = **Escallonia callcottiae** Hook. & Arn.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia flavescens C. Presl = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **carmelitana** (Meyen) Acevedo & Kausel
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia floribunda Humb., Bonpl. & Kunth var. *montevidensis* Cham. & Schltdl. = **Escallonia bifida** Link & Otto
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia florida Poepp. ex DC.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zöllner, O. 2302* (L)].

Escallonia fonckii Phil. = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia fonckii Phil. var. *araucana* (Phil.) Reiche = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia gayana Acevedo & Kausel
Sin.: *Escallonia paniculata* Phil., hom. illeg.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gay, C. 1445* (SGO)].

Escallonia glabrata Phil. = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **glabrata** (Phil.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia glutinosa Phil. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glutinosa** (Phil.) Reiche
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia graefiana Hosseus, nom. nud. = **Escallonia angustifolia** C. Presl
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia grahamiana Gillies ex Hook. & Arn. = **Escallonia illinita** C. Presl var. **illinita**
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia hirsuta C. Presl = **Escallonia revoluta** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia humilis A. St.-Hil. = **Escallonia laevis** (Vell.) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia hypoglauca Herzog
Referencias: Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o árbol. Nativa. 1500–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7391* (US)].

Escallonia illinita C. Presl var. *alfa* Hook. & Arn. = **Escallonia illinita** C. Presl var. **illinita**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia illinita C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche = **Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia illinita C. Presl var. *cupularis* Hook. & Arn. ex Reiche = **Escallonia illinita** C. Presl var. **illinita**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia illinita C. Presl var. **illinita**
Sin.: *Escallonia andina* Phil., p.p. , *Escallonia grahamiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *alfa* Hook. & Arn., *Escallonia illinita* C. Presl var. *cupularis* Hook. & Arn. ex Reiche, *Escallonia mertensiana* Rupr. ex A. Gray, nom. nud.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20042* (CONC, SGO)].

Escallonia illinita C. Presl var. **pubicalycina** Briq.
Sin.: *Escallonia illinita* C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel, *Escallonia stenopetala* Kunze
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 100–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Aravena 33371* (G, UC)].

Escallonia illinita C. Presl var. *stenopetala* (Kunze) Acevedo & Kausel = **Escallonia illinita** C. Presl var. **pubicalycina** Briq.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia jordanensis Sleumer = **Escallonia farinacea** A. St.-Hil. var. **jordanensis** (Sleumer) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia laevis (Vell.) Sleumer
Sin.: *Escallonia humilis* A. St.-Hil., *Vigieria laevis* Vell.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Nativa. 800–2300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 18135* (HBR)].

Escallonia ledifolia Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 4485* (HBR)].

[Escallonia lepidota Killip]
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.
Notas: Nombre dudoso.

Escallonia leucantha J. Remy
Sin.: *Escallonia bellidifolia* Phil., *Escallonia modesta* Briq., *Escallonia pycnantha* Briq.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU); CHL(VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pérez-Moreau, R. A. s.n.* (BA)]; CHL[*Anderson 63* (BM, K)].

Escallonia littoralis Phil. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia littoralis Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia longidens Phil. = **Escallonia rosea** Griseb.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia macrantha Hook. & Arn. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **macrantha** (Hook. & Arn.) Reiche

Escallonia macrantha Hook. & Arn. var. *duplicato-serrata* (J. Remy) Engl. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia megapotamica auct. non Spreng. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia megapotamica Spreng. var. **megapotamica**
Sin.: *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dodoneifolia* Cham. & Schltdl., *Escallonia sellowiana* DC., *Escallonia sellowiana* DC. var. *salicifolia* A. St.-Hil.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14320* (HBR)].

Escallonia megapotamica Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Sin.: *Escallonia megapotamica* auct. non Spreng., *Escallonia resinosa* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *spiraeifolia* Cham. & Schltdl., *Escallonia sellowiana* auct. non DC., *Escallonia sellowiana* DC. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltdl.) DC., *Escallonia spiraeoides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil., *Escallonia vaccinioides* A. St.-Hil. var. *guaranitica* A. St.-Hil.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 1987e; Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Nativa. 0–1300 m.

Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8039* (BAB, SI)]; BRA[*Smith, L. B. 8408* (HBR, US)]; URY[*Castellanos, A. 18251* (LIL)].

Escallonia mertensiana Rupr. ex A. Gray, nom. nud. = **Escallonia illinita** C. Presl var. **illinita**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia microcarpa Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud. = **Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia millegrana Griseb.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o árbol. Nativa. 1000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Legname, P. R. 5162* (LIL)].

Escallonia misella Gand. = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia modesta Briq. = **Escallonia leucantha** J. Remy
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

[Escallonia mollis Phil.]
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.
Notas: Nombre dudoso, probablemente se trate de un híbrido natural.

Escallonia montana auct. non Phil. = **Escallonia cordobensis** (Kuntze) Hosseus
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia montana Phil. = **Escallonia rosea** Griseb.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia montevidensis (Cham. & Schltdl.) DC. = **Escallonia bifida** Link & Otto
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia myrtilloides L. f.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto o árbol. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 3834* (L, LIL, S)].

Escallonia myrtoidea Bertero ex DC.
Sin.: *Escallonia andina* Phil., p.p. , *Escallonia arguta* C. Presl, *Escallonia claudii* Killip, *Escallonia illinita* C. Presl var. *andina* (Phil.) Reiche, *Escallonia microcarpa* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Escallonia reflexa* Gillies
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o árbol. Endémica. 100–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Araque, J. 1287* (LIL)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994954* (CONC)].

Escallonia obtusissima A. St.-Hil.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Nativa. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10628* (HBR, US)].

Escallonia paniculata Phil., hom. illeg. = **Escallonia gayana** Acevedo & Kausel
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia paniculata (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. var. *acuminatissima* Kuntze = **Escallonia schreiteri** Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia patagonica Gand. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia petrophila Rambo & Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985; Marchioretto, M. S., 1992; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 49389* (LIL)].

Escallonia philippiana (Engl.) Mast. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia poeppigiana DC. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia poeppigiana DC. var. *longifolia* DC. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

[Escallonia promaucana Phil.]
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.
Notas: Nombre dudoso, probablemente se trate de un híbrido natural.

Escallonia pterocladon Hook. = **Escallonia rosea** Griseb.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia pugae Phil. = **Escallonia bifida** Link & Otto
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Sin.: *Escallonia berteriana* DC., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *berteriana* (DC.) Pamp., *Escallonia pulverulenta* (Ruiz & Pav.) Pers. var.

resiniflua (Walp.) Pamp., *Escallonia resiniflua* Walp., *Escallonia resinosa* auct. non Ruiz & Pav.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 1042* (CONC)].

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. **pulverulenta**
Sin.: *Escallonia spinulosa* Kunth ex Engl., nom. nud., *Stereoxylon pulverulentum* Ruiz & Pav.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Dillon, M. O. 4951* (SI)].

Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers. var. *resiniflua* (Walp.) Pamp. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia punctata DC. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia pycnantha Briq. = **Escallonia leucantha** J. Remy
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia rahmeri Phil. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia rahmeri Phil. var. *obovata* Speg. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

[Escallonia rebecae Kausel]
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.
Notas: Nombre dudoso.

Escallonia reflexa Gillies = **Escallonia myrtoidea** Bertero ex DC.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia resiniflua Walp. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia resinosa auct. non Ruiz & Pav. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glabra** Engl.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. var. *dodoneifolia* Cham. & Schltdl. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia resinosa (Ruiz & Pav.) Pers. var. *spiraeifolia* Cham. & Schltdl. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Escallonia affinis* Rupr. ex A. Gray, nom. nud., *Escallonia hirsuta* C. Presl, *Escallonia thyrsoidea* Bertero, nom. nud., *Stereoxylon revolutum* Ruiz & Pav.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(IV, V, VII, VIII, IX, X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Junge, C. 3160* (US)].

[Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers. var. berteroana Kausel]
Notas: Nombre dudoso.

[Escallonia revoluta (Ruiz & Pav.) Pers. var. laxa Kausel]
Notas: Nombre dudoso.

[Escallonia rigida Phil.]
Notas: Nombre dudoso.

Escallonia rosea Griseb.
Sin.: *Escallonia chonotica* Phil., *Escallonia longidens* Phil., *Escallonia montana* Phil., *Escallonia pterocladon* Hook., *Escallonia rosea* Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche, *Escallonia rupestris* Phil.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Soriano, A. 3469* (BAB)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (LIL, SI)].

[Escallonia rosea Griseb. var. hollermayeriana Kausel]
Notas: Nombre dudoso.

Escallonia rosea Griseb. var. *rupestris* (Phil.) Reiche = **Escallonia rosea** Griseb.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

[Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. albiflora Hook. & Arn.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente se trate de un híbrido natural.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *albiflora* auct. non Hook. & Arn. = **Escallonia tucumanensis** Hosseus
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *concinna* (Phil.) Reiche = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *cordobensis* Kuntze = **Escallonia cordobensis** (Kuntze) Hosseus
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **dumetorum** (Phil.) Acevedo & Kausel
Sin.: *Escallonia berberifolia* auct. non (Humb. & Bonpl.) Kunth, *Escallonia dumetorum* Phil.

Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 5384* (SI)]; CHL[*Kubitzki, K. 354* (L)].

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **glutinosa** (Phil.) Reiche
Sin.: *Escallonia glutinosa* Phil.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 100–2100 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Castellanos, A. s.n.* (BA)].

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **macrantha** (Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Escallonia macrantha* Hook. & Arn.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 3984* (SGO)];

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *poeppigiana* (DC.) Reiche = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

[Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. pubescens Hook. & Arn.]
Notas: Nombre dudoso, probablemente se trate de un híbrido natural.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook. f. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Sin.: *Escallonia concinna* Phil., *Escallonia duplicato-serrata* J. Remy, *Escallonia littoralis* Phil., *Escallonia littoralis* Phil. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia macrantha* Hook. & Arn. var. *duplicato-serrata* (J. Remy) Engl., *Escallonia poeppigiana* DC., *Escallonia poeppigiana* DC. var. *longifolia* DC., *Escallonia punctata* DC., *Escallonia rahmeri* Phil., *Escallonia rahmeri* Phil. var. *obovata* Speg., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *concinna* (Phil.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *glabriuscula* Hook. & Arn., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *multiflora* Poepp. & Endl., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *poeppigiana* (DC.) Reiche, *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *punctata* (DC.) Hook. f., *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl., *Stereoxylon rubrum* Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bernardello, G. 597* (CORD)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994953* (CONC, SGO)].

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. **thalassica** Kausel
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: CHL(IV, V, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3837* (SI)].

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. var. *uniflora* Poepp. & Endl. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Escallonia rubricaulis Colla = **Escallonia callcottiae** Hook. & Arn.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia rupestris Phil. = **Escallonia rosea** Griseb.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia schreiteri Sleumer
Sin.: *Escallonia paniculata* (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. var. *acuminatissima* Kuntze
Referencias: Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5071* (MA, S, SI)].

Escallonia sellowiana auct. non DC. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer

Escallonia sellowiana DC. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia sellowiana DC. var. *salicifolia* A. St.-Hil. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **megapotamica**
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia sellowiana DC. var. *spiraeifolia* (Cham. & Schltdl.) DC. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia serrata Sm.
Sin.: *Celastrus venustus* Banks & Sol. ex Hook. f., *Stereoxylon serratum* (Sm.) Poir.

Referencias: Dudley, T. R., 1981; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(TDF); CHL(X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 487* (SI)]; CHL[*Biese, W. 1444* (LIL, UC)];

[Escallonia skottsbergii Acevedo & Kausel]
Notas: Nombre dudoso.

Escallonia sparsiflora Phil. = **Escallonia alpina** Poepp. ex DC. var. **alpina**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia spinulosa Kunth ex Engl., nom. nud. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **pulverulenta**
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia spiraeoides A. St.-Hil. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia stenopetala Kunze = **Escallonia illinita** C. Presl var. **pubicalycina** Briq.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia stenophylla Phil. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia stricta J. Remy = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia thyrsoidea Bertero, nom. nud. = **Escallonia revoluta** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia tomentosa Cambess. ex Niederl., nom. nud. = **Escallonia chlorophylla** Cham. & Schltdl.
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia tucumanensis Hosseus
Sin.: *Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *albiflora* auct. non Hook. & Arn.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lillo, M. 5454* (LIL)].

Escallonia vaccinioides A. St.-Hil. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia vaccinioides A. St.-Hil. var. *guaranitica* A. St.-Hil. = **Escallonia megapotamica** Spreng. var. **spiraeifolia** (Cham. & Schltdl.) Sleumer
Referencias: Klein, R. M. & Reitz, P. R., 1985.

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.
Sin.: *Escallonia angustifolia* Phil., *Escallonia patagonica* Gand., *Escallonia philippiana* (Engl.) Mast., *Escallonia stenophylla* Phil., *Escallonia stricta* J. Remy, *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp., *Escallonia virgata* (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl., *Stereoxylon virgatum* Ruiz & Pav.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968, 1984a; Stearn, W. T., 1974.
Arbusto. Endémica. 0–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Donat, A. 306* (SI)]; CHL[*Taylor, C. M. 10975* (SI)].

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. *pavoniana* Pamp. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Escallonia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. var. *philippiana* Engl. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Stereoxylon pulverulentum Ruiz & Pav. = **Escallonia pulverulenta** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **pulverulenta**
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Stereoxylon revolutum Ruiz & Pav. = **Escallonia revoluta** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Stereoxylon rubrum Ruiz & Pav. = **Escallonia rubra** (Ruiz & Pav.) Pers. var. **rubra**
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953; Sleumer, H. O., 1968.

Stereoxylon serratum (Sm.) Poir. = **Escallonia serrata** Sm.
Referencias: Kausel, E. M. L., 1953.

Stereoxylon virgatum Ruiz & Pav. = **Escallonia virgata** (Ruiz & Pav.) Pers.
Referencias: Sleumer, H. O., 1968.

Valdivia Gay ex J. Remy

Número de especies: 1 endémica

Valdivia gayana J. Remy
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(X).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 239* (CONC)].

Vigieria laevis Vell. = **Escallonia laevis** (Vell.) Sleumer

EUCRYPHIACEAE

1 género, 2 especies endémicas.

Eucryphia Cav.

Número de especies: 2 endémicas

Eucryphia cordifolia Cav.
Sin.: *Eucryphia patagonica* Speg., *Pellinia chilensis* Molina, *Pellinia cordifolia* (Cav.) Molina
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Dress, W. J., 1956; Sánchez, M. I., 1988b.
Árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(IX, X).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3398* (BAB)]; CHL[*Garaventa, A. 4465* (SI), *Gentry, A. H. 53484* (MO)].

Eucryphia glutinosa (Poepp. & Endl.) Baill.
Sin.: *Eucryphia pinnatifolia* Gay, *Fagus glutinosa* Poepp. & Endl.
Referencias: Dress, W. J., 1956.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Zoellner, O. 3711* (CONC)].

Eucryphia patagonica Speg. = **Eucryphia cordifolia** Cav.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988b.

Eucryphia pinnatifolia Gay = **Eucryphia glutinosa** (Poepp. & Endl.) Baill.
Referencias: Dress, W. J., 1956.

Fagus glutinosa Poepp. & Endl. = **Eucryphia glutinosa** (Poepp. & Endl.) Baill.
Referencias: Dress, W. J., 1956.

Pellinia chilensis Molina = **Eucryphia cordifolia** Cav.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988b.

Pellinia cordifolia (Cav.) Molina = **Eucryphia cordifolia** Cav.
Referencias: Sánchez, M. I., 1988b.

EUPHORBIACEAE

Coordinador: Berry, P. E.
Autores: Berry, P. E., Caruzo, M. B. R., Cordeiro, I., Esser, H. J., Fernández-Casas, F. J., Levin, G. A., Lima, L. R., Riina, R. & Wurdack, K. J.

38 géneros, 437 especies, 202 especies endémicas, 21 especies introducidas.

Acalypha L.

Número de especies: 19, 6 endémicas

Acalypha agrestis Morong ex Britton = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha amblyodonta (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Sin.: *Acalypha amblyodonta* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *villosa* Müll. Arg., *Acalypha cuspidata* Jacq. var. *amblyodonta* Müll. Arg., *Ricinocarpus amblyodontus* (Müll. Arg.) Kuntze
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942; Lourteig, A., 1955[1954]a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6989* (SI)]; PRY[*Pérez, B. 1152* (AS, MO)].

Acalypha amblyodonta (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *villosa* Müll. Arg. = **Acalypha amblyodonta** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha apetiolata Allem & Waetcher
Referencias: Allem, A. C. & Waechter, J. L., 1977; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Acalypha apicalis N.E. Br. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Acalypha boliviensis Müll. Arg.
Sin.: *Ricinocarpus boliviensis* (Müll. Arg.) Kuntze
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. s.n.* (SI), *Lillo, M. 5757* (LIL)].

Acalypha brasiliensis Müll. Arg.
Sin.: *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. f. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *cordata* Müll. Arg., *Acalypha brasiliensis* Müll. Arg. var. *longipes* Müll. Arg., *Ricinocarpus brasiliensis* (Müll. Arg.) Kuntze
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(JUJ, MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4398* (SI), *Zuloaga, F. O. 5468* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13198* (GH, HBR, NY, R, US)].

Acalypha brasiliensis Müll. Arg. f. *cordata* Müll. Arg. = **Acalypha brasiliensis** Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Acalypha brasiliensis Müll. Arg. var. *cordata* Müll. Arg. = **Acalypha brasiliensis** Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Acalypha brasiliensis Müll. Arg. var. *longipes* Müll. Arg. = **Acalypha brasiliensis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg.
Sin.: *Acalypha agrestis* Morong ex Britton, *Acalypha apicalis* N.E. Br., *Acalypha communis* Müll. Arg. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *agrestis* (Morong ex Britton) Chodat, *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *hirta* (Spreng.) Müll. Arg., nom. illeg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Pax & K. Hoffm., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *saltensis* Pax & K. Hoffm., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentella* Müll. Arg., *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg., *Acalypha cordobensis* Müll. Arg. var. *rotundata* Griseb., *Acalypha gracilis* Griseb., hom. illeg., *Acalypha hirta* Spreng., hom. illeg., *Acalypha montevidensis* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Acalypha paraguariensis* Chodat & Hassl., *Acalypha variabilis* Klotzsch ex Baill. var. *angustifolia* Baill., *Ricinocarpus cordobensis* (Müll. Arg.) Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Croizat, L. C. M., 1941a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAA, CON, COA, PAI, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 12757* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 51350* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. 3231* (SI)]; URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].

Acalypha communis Müll. Arg. f. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *agrestis* (Morong ex Britton) Chodat = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *brevipetiolata* Chodat & Hassl. = **Acalypha vellamea** Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *hirta* (Spreng.) Müll. Arg., nom. illeg. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *salicifolia* Pax & K. Hoffm. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *saltensis* Pax & K. Hoffm. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *tomentella* Müll. Arg. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha communis Müll. Arg. var. *tomentosa* Müll. Arg. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha cordifolia Griseb. = **Acalypha plicata** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha cordifolia Griseb. var. *polyadenia* Griseb. = **Acalypha plicata** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha cordobensis Müll. Arg. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha cordobensis Müll. Arg. var. *rotundata* Griseb. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Acalypha cuspidata Jacq.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acalypha cuspidata Jacq. var. *amblyodonta* Müll. Arg. = **Acalypha amblyodonta** (Müll. Arg.) Müll. Arg.

[Acalypha dimorpha Müll. Arg.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acalypha dimorpha Chodat & Hassl., nom. illeg. = **Acalypha nitschkeana** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Acalypha divaricata Müll. Arg.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acalypha divaricata auct. non Müll. Arg. = **Acalypha lycioides** Pax & K. Hoffm.

Acalypha divaricata Baill., nom. illeg. = **Acalypha gracilis** Spreng.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Acalypha divaricata Griseb., nom. illeg. = **Acalypha lycioides** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha flabellifera Rusby = **Acalypha plicata** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha friesii Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1924a.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fries, R. E. 178* (S)].

Acalypha glandulosa (Kuntze) Chodat & Hassl., nom. inval. = **Acalypha hassleriana** Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha gracilis Griseb., hom. illeg. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha gracilis Spreng.
Sin.: *Acalypha divaricata* Baill., nom. illeg., *Acalypha gracilis* Spreng. var. *divaricata* (Baill.) Pax & K. Hoffm., nom. illeg., *Acalypha striolata* Lingelsh., *Acalypha tracheliifolia* Pax & K. Hoffm., *Ricinocarpus gracilis* (Spreng.) Kuntze
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Lourteig, A., 1955[1954]a; Macbride, J. F., 1951; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1763* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13569* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5888* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1483* (MVFA)].

Acalypha gracilis Spreng. var. *divaricata* (Baill.) Pax & K. Hoffm., nom. illeg. = **Acalypha gracilis** Spreng.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.

Acalypha hassleriana Chodat
Sin.: *Acalypha glandulosa* (Kuntze) Chodat & Hassl., nom. inval., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Acalypha hassleriana* Chodat var. *glandulosa* (Kuntze) Pax & K. Hoffm., *Ricinocarpus glandulosus* Kuntze
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6531* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5678* (G)].

Acalypha hassleriana Chodat var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval. = **Acalypha hassleriana** Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha hassleriana Chodat var. *glandulosa* (Kuntze) Pax & K. Hoffm. = **Acalypha hassleriana** Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha hirta Spreng., hom. illeg. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha lagoensis Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Acalypha plicata** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha lycioides Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Acalypha divaricata* auct. non Müll. Arg., *Acalypha divaricata* Griseb., nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Grisebach, A. H. R., 1879; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1924a.
Arbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2866* (SI)].

Acalypha macrostachya Poir., hom. illeg. = **Acalypha poiretii** Spreng.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.

Acalypha montevidensis Klotzsch ex Pax & K. Hoffm., nom. nud. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha multicaulis Chodat & Hassl., nom. illeg. = **Acalypha nitschkeana** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha multicaulis Müll. Arg.
Sin.: *Acalypha multicaulis* Müll. Arg. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Acalypha pruriens* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Ricinocarpus multicaulis* (Müll. Arg.) Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Lourteig, A., 1955[1954]a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CEN, COA, GUA, PAI, PHA); URY(COL, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1409* (SI)]; BRA[*Hunziker, A. T. 2601* (SI)]; PRY[*Nicora, E. G. 9820* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 937* (MVM)].

Acalypha multicaulis Müll. Arg. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm. = **Acalypha multicaulis** Müll. Arg.

Acalypha nitschkeana Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Acalypha dimorpha* Chodat & Hassl., nom. illeg., *Acalypha multicaulis* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BAF)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 141* (BAF), *Pedersen, T. M. 7536* (SI)].

Acalypha paraguariensis Chodat & Hassl. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha pinnata Poir. = **Tragia pinnata** (Poir.) A. Juss.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Acalypha plicata Griseb., nom. illeg. = **Acalypha plicata** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha plicata Müll. Arg.
Sin.: *Acalypha cordifolia* Griseb., *Acalypha cordifolia* Griseb. var. *polyadenia* Griseb., *Acalypha flabellifera* Rusby, *Acalypha lagoensis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Acalypha plicata* Griseb., nom. illeg., *Ricinocarpus cordifolius* (Griseb.) Kuntze, nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Grisebach, A. H. R., 1879; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Macbride, J. F., 1951; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1924a.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34346* (SI)].

Acalypha poiretii Spreng.
Sin.: *Acalypha macrostachya* Poir., hom. illeg., *Ricinocarpus poiretii* (Spreng.) Kuntze
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941a; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Lourteig, A., 1955[1954]a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13829* (SI), *Cabrera, A. L. 4056* (LIL)]; BRA[*Klein, R. M. 5352* (HBR)].

Acalypha pruriens Chodat & Hassl., nom. illeg. = **Acalypha multicaulis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Acalypha ruderalis Mart. ex Britton]
Notas: Nombre dudoso.

Acalypha schreiteri Lillo ex Lourteig & O´Donell
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.
Arbusto o árbol. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 11557* (SI), *Schreiter, R. 1388* (LIL)].

Acalypha sehnemii Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1976b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Acalypha senilis Baill.
Sin.: *Ricinocarpus senilis* (Baill.) Kuntze
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(DUR, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].

Acalypha striolata Lingelsh. = **Acalypha gracilis** Spreng.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha tracheliifolia Pax & K. Hoffm. = **Acalypha gracilis** Spreng.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.

Acalypha uleana L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., 1971.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. s.n.* (HBG, US)].

Acalypha variabilis Klotzsch ex Baill. var. *angustifolia* Baill. = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Acalypha vellamea Baill.
Sin.: *Acalypha communis* Müll. Arg. var. *brevipetiolata* Chodat & Hassl., *Ricinocarpus vellameus* (Baill.) Kuntze
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8313* (BM)].
Notas: Citada para Brasil sin mencionar ejemplar de referencia (Govaerts et al., 2000).

Acalypha villosa Jacq.
Sin.: *Ricinocarpus villosus* (Jacq.) Kuntze

Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Macbride, J. F., 1951; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 3687* (LIL), *Zuloaga, F. O. 2549* (SI)]; PRY[*Stutz, L. C. 1753* (G)].

Actinostemon Mart. ex Klotzsch

Número de especies: 2

Actinostemon anisandrus (Griseb.) Pax = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Actinostemon concepcionis (Chodat & Hassl.) Hochr.
Sin.: *Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var. *concepcionis* Chodat & Hassl., *Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var. *heterophyllus* Chodat & Hassl., *Dactylostemon klotzschii* D. Dietr. var. *obtusatus* Chodat & Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jablonszky, E., 1969; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Noceti s.n.* (BAF)]; PRY[*Schinini, A. 3109* (SI), *Zardini, E. M. 7181* (FCQ, MO)].

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg.
Sin.: *Actinostemon multiflorus* Müll. Arg., *Actinostemon oligandrus* (Müll. Arg.) Baill., *Actinostemon polymorphus* Müll. Arg., *Dactylostemon oligandrus* Müll. Arg., *Gussonia concolor* Spreng., *Gymnanthes concolor* (Spreng.) Müll. Arg., *Stillingia concolor* (Spreng.) Baill.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Chodat, R. H., 1901; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jablonszky, E., 1969; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 245* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 2100* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5717* (HBR, US), *Sehnem, A. 3870* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1637* (G), *Hassler, E. 1523* (G), *Hassler, E. 699* (G), *Rojas, T. 3885* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1806* (F, GH, MO, NY, SI)].

Actinostemon luquense Morong = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Actinostemon multiflorus Müll. Arg. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jablonszky, E., 1969.

Actinostemon oligandrus (Müll. Arg.) Baill. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Jablonszky, E., 1969.

Actinostemon polymorphus Müll. Arg. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jablonszky, E., 1969.

Adelia L.

Número de especies: 1

Adelia caperoniifolia Baill. = **Bernardia caperoniifolia** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Adelia membranifolia (Müll. Arg.) Chodat & Hassl. var. *spinosa* Chodat & Hassl. = **Adelia spinosa** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Adelia pulchella Baill. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Adelia spinosa (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Adelia membranifolia* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl. var. *spinosa* Chodat & Hassl., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. var. *hassleri* Pax & K. Hoffm., *Adelia spinosa* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. var. *hirsuta* Pax & K. Hoffm., *Ricinella membranifolia* Müll. Arg. var. *spinosa* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); PRY(CEN, CON, COA, ÑEE, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1582* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 359* (SI), *Mereles, F. 4868* (FCQ)].

Adelia spinosa (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. var. *hassleri* Pax & K. Hoffm. = **Adelia spinosa** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Adelia spinosa (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. var. *hirsuta* Pax & K. Hoffm. = **Adelia spinosa** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Adenogyne pachystachya Klotzsch = **Sebastiania pachystachys** (Klotzsch) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Adenopeltis Bertero ex A. Juss.

Número de especies: 1 endémica

Adenopeltis colliguaya Bertero ex A. Juss. = **Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Adenopeltis serrata (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Sin.: *Adenopeltis colliguaya* Bertero ex A. Juss., *Excoecaria colliguaya* (Bertero ex A. Juss.) Baill., *Excoecaria marginata* (Baill.) Griseb., *Excoecaria serrata* W.T. Aiton, *Stillingia glandulosa* Dombey ex Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(IV, V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 4308* (CONC)].

Adenoropium ellipticum Pohl = **Jatropha elliptica** (Pohl) Oken

Alchornea Sw.

Número de especies: 4

Alchornea castaneifolia (Willd.) A. Juss.
Sin.: *Alchornea castaneifolia* (Willd.) A. Juss. var. *salicifolia* (Baill.) Baill., *Hermesia castaneifolia* Willd., *Hermesia salicifolia* Baill.
Referencias: Allem, A. C., 1977a; Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Secco, R. S., 2004.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, CON, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2166* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7160* (BM, F, G, GH, S, UC, W)].

Alchornea castaneifolia (Willd.) A. Juss. var. *salicifolia* (Baill.) Baill. = **Alchornea castaneifolia** (Willd.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Alchornea glandulosa auct. non Poepp. = **Heliocarpus popayanensis** Kunth
Referencias: Dimitri, M. J., 1974a.

Alchornea glandulosa Poepp. subsp. **iricurana** (Casar.) Secco
Sin.: *Alchornea iricurana* Casar.
Referencias: Secco, R. S., 2004.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2873* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 53520* (SI), *Reitz, P. R. 9614* (HBR)]; PRY[*Jörgensen, P. 3982* (SI), *Zardini, E. M. 5442* (MO)].

Alchornea iricurana Casar. = **Alchornea glandulosa** Poepp. subsp. **iricurana** (Casar.) Secco
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea janeirensis Casar. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea nemoralis Mart. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea pycnogyne Müll. Arg. = **Alchornea sidifolia** Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea sidifolia Müll. Arg.
Sin.: *Alchornea pycnogyne* Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.
Árbol. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bertoni, M. S. 3133* (W)]; BRA[*Hatschbach, G. 40350* (AAU, NY, UEC)].

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Sin.: *Alchornea janeirensis* Casar., *Alchornea nemoralis* Mart., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *iricuranoides* Chodat & Hassl., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *janeirensis* (Casar.) Müll. Arg., *Alchornea triplinervia* (Spreng.) Müll. Arg. var. *nemoralis* (Mart.) Pax & K. Hoffm., *Antidesma triplinervia* Spreng.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942; Secco, R. S., 2004; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Tressens, S. G., 1981.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1787* (SI), *Rodríguez, F. M. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14617* (HBR, R, US), *Rambo, B. 38479* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 407* (G), *Schinini, A. 3641* (SI), *Soria, N. 2288* (FCQ)].

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. var. *iricuranoides* Chodat & Hassl. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. var. *janeirensis* (Casar.) Müll. Arg. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. var. *nemoralis* (Mart.) Pax & K. Hoffm. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Secco, R. S., 2004.

Anabaena tamnoides A. Juss. = **Romanoa tamnoides** (A. Juss.) Radcl.-Sm.

Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Anabaenella tamnoides (A. Juss.) Pax & K. Hoffm. = **Romanoa tamnoides** (A. Juss.) Radcl.-Sm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Anabaenella tamnoides (A. Juss.) Pax & K. Hoffm. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval. = **Romanoa tamnoides** (A. Juss.) Radcl.-Sm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Anisophyllum besseri Klotzsch & Garcke = **Euphorbia besseri** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Anisophyllum caecorum Klotzsch & Garcke, nom. nud. = **Euphorbia potentilloides** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Anisophyllum caecorum Mart. ex Boiss. = **Euphorbia potentilloides** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Anisophyllum emarginatum Klotzsch & Garcke = **Euphorbia emarginata** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Anisophyllum nanum Klotzsch & Garcke = **Euphorbia chamaerrhodos** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Anisophyllum ovalifolium Klotzsch & Garcke = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**
Referencias: Subils, R., 1977.

Anisophyllum rhytispermum Klotzsch & Garcke = **Euphorbia rhytisperma** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Anisophyllum selloi Klotzsch & Garcke = **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Antidesma triplinervia Spreng. = **Alchornea triplinervia** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Tressens, S. G., 1981.

Aonikena patagonica Speg. = **Chiropetalum patagonicum** (Speg.) O´Donell & Lourteig
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Aparisthmium Endl.

Número de especies: 1

Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill.
Sin.: *Conceveibum cordatum* A. Juss.
Referencias: Secco, R. S., 2004; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2551* (SI)].

Aphora catamarcensis Griseb. = **Ditaxis catamarcensis** (Griseb.) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia acalyphifolia (Griseb.) Kuntze = **Caperonia acalyphifolia** Griseb.

Argythamnia acaulis (Herter ex Arechav.) J.W. Ingram = **Ditaxis acaulis** Herter ex Arechav.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1957.

Argythamnia anisotricha Müll. Arg. = **Chiropetalum anisotrichum** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia argentinense (Skottsb.) Allem & Irgang = **Chiropetalum argentinense** Skottsb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia berteriana (Schltdl.) Müll. Arg. = **Chiropetalum berterianum** Schltdl. var. **berterianum**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia berteriana (Schltdl.) Müll. Arg. var. *psiladenia* (Skottsb.) J.W. Ingram = **Chiropetalum berterianum** Schltdl. var. **psiladenium** Skottsb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia boliviensis Müll. Arg. = **Chiropetalum boliviense** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia brasiliensis (Klotzsch) Müll. Arg. = **Philyra brasiliensis** Klotzsch

Argythamnia breviramea Müll. Arg. = **Ditaxis breviramea** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia canescens (Phil.) F. Phil. = **Chiropetalum canescens** Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia catamarcensis Griseb. = **Ditaxis catamarcensis** (Griseb.) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia cremnophila (I.M. Johnst.) J.W. Ingram = **Chiropetalum cremnophilum** I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia grisea (Griseb.) Allem & Irgang = **Chiropetalum griseum** Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia intermedia (Pax & K. Hoffm.) Allem & Irgang = **Chiropetalum intermedium** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia jablonszkyana (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram = **Ditaxis jablonszkyana** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia lineata (Klotzsch) Baill., nom. illeg. = **Chiropetalum tricoccum** (Vell.) Chodat & Hassl.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.

Argythamnia malpighipila (Hicken) J.W. Ingram = **Ditaxis malpighipila** (Hicken) L.C. Wheeler
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia mollis Baill. = **Chiropetalum molle** (Baill.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia mollis Kuntze, nom. nud. = **Chiropetalum griseum** Griseb.

Argythamnia montevidensis (Didr.) Müll. Arg. = **Ditaxis montevidensis** (Didr.) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia phalacradenia J.W. Ingram = **Chiropetalum phalacradenium** (J.W. Ingram) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia pilosistyla Allem & Irgang = **Chiropetalum pilosistylum** (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia ramboi Allem & Irgang = **Chiropetalum ramboi** (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia rhizantha (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram = **Ditaxis rhizantha** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia rosularis (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram = **Ditaxis rosularis** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia salina (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram = **Ditaxis salina** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia sponiella Müll. Arg. = **Chiropetalum canescens** Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia triandra (Griseb.) Allem & Irgang = **Chiropetalum boliviense** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia tricocca (Vell.) Müll. Arg. = **Chiropetalum tricoccum** (Vell.) Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.

Argythamnia tricuspidata (Lam.) Müll. Arg. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia tricuspidata (Lam.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Argythamnia tricuspidata (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.) Müll. Arg. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Ingram, J. W., 1980.

Astraea Klotzsch

Número de especies: 3, 2 endémicas

Astraea aureomarginata (Chodat & Hassl.) P.E. Berry
Sin.: *Croton aureomarginatus* Chodat & Hassl.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5010* (G)].

Astraea hauthalii (Kuntze) P.E. Berry
Sin.: *Croton hauthalii* (Kuntze) K. Schum., *Croton rumicifolius* Chodat & Hassl., *Oxydectes hauthalii* Kuntze
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.

Países: PRY(CAU, CAN, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4386* (BM)].

Astraea lobata (L.) Klotzsch
Sin.: *Croton lobatus* L.
Referencias: Berry, P. E., Hipp, A. L., Wurdack, K. J., Van Ee, B. & Riina, R., 2005; Croizat, L. C. M., 1941a, b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COR, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, GUA, PAI, PHA); URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32760* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 1440* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16731* (HBR, US)]; PRY[*Mereles, F. 5213* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1489* (MVFA)].

Avellanita Phil.

Número de especies: 1 endémica

Avellanita bustillosii Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bustillos, V. s.n.* (SGO)].

Bernardia Mill., nom. cons.

Número de especies: 19, 14 endémicas

Bernardia alarici Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1976b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Allem, A. C. s.n.* (ICN)].

Bernardia ambigua Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18040* (MBM)].

Bernardia apaensis Chodat & Hassl. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Bernardia apaensis Chodat & Hassl. var. *subintegra* Chodat & Hassl. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Bernardia argentinensis Lourteig & O'Donell
Sin.: *Bernardia paraguariensis* auct. non Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20463* (SI), *de la Sota, E. R. 1979* (LIL)].

Bernardia asplundii Lourteig
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19687* (SI), *Ibarrola, T. 2900* (LIL, S)].

Bernardia caperoniifolia (Baill.) Müll. Arg.
Sin.: *Adelia caperoniifolia* Baill., *Bernardia guaranitica* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5504* (G)].

Bernardia confertifolia Müll. Arg. var. **glabrata** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Lourteig, A., 1955[1954]a; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1924a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ekman, E. L. 486* (S)].

Bernardia flexuosa Pax & K. Hoffm.
Referencias: Allem, A. C., 1980; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Allem, A. C. s.n.* (ICN)].

Bernardia geniculata Allem & J.L. Waechter
Referencias: Allem, A. C. & Waechter, J. L., 1977; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Bernardia guaranitica Chodat & Hassl. = **Bernardia caperoniifolia** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia hagelundii Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1976b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Allem, A. C. s.n.* (ICN, U)].

Bernardia hassleriana Chodat
Sin.: *Bernardia hassleriana* Chodat var. *tobatyensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA);
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1582* (G)].

Bernardia hassleriana Chodat var. *ovata* Chodat & Hassl. = **Bernardia ovata** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.

Bernardia hassleriana Chodat var. *tobatyensis* Chodat & Hassl. = **Bernardia hassleriana** Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia leptostachys Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5081* (G)].

Bernardia longipedunculata (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Bernardia pedunculatis* Müll. Arg. f. *spiciflora* Chodat & Hassl., *Bernardia pedunculatis* Müll. Arg. f. *subcapituliflora* Chodat & Hassl., *Bernardia pedunculatis* Müll. Arg. var. *longipedunculata* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43327* (MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 41492* (AS, MO)].

Bernardia lorentzii Müll. Arg. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C., 1980.

Bernardia lorentzii Müll. Arg. var. *apaensis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Bernardia lorentzii Müll. Arg. var. *fistulosa* Pax & K. Hoffm. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Bernardia lorentzii Müll. Arg. var. *obovata* Pax & K. Hoffm. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Bernardia lorentzii Müll. Arg. var. *subintegra* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Bernardia multicaulis Müll. Arg.
Sin.: *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl., *Bernardia apaensis* Chodat & Hassl. var. *subintegra* Chodat & Hassl., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *apaensis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *fistulosa* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *obovata* Pax & K. Hoffm., *Bernardia lorentzii* Müll. Arg. var. *subintegra* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Polyboea lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb.
Referencias: Allem, A. C., 1980; Lourteig, A., 1955[1954]a; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1914; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 826* (SI), *Troncoso, N. S. s.n.* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 10963* (US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3993* (SI), *Zardini, E. M. 52945* (AS, MO)].

Bernardia odonellii Villa
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Villa Carenzo, M., 1960.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 5015* (LIL)].

[Bernardia ovata (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.]
Sin.: *Bernardia hassleriana* Chodat var. *ovata* Chodat & Hassl.
Notas: Nombre dudoso.

Bernardia paraguariensis auct. non Chodat & Hassl. = **Bernardia argentinensis** Lourteig & O'Donell

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl.
Sin.: *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *orbiculata* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. f. *rhombilofia* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Bernardia paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *parvifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Degen, R. 2958* (FCQ, MO)].

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl. f. *orbiculata* Chodat & Hassl. = **Bernardia paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl. f. *rhombilofia* Chodat & Hassl. = **Bernardia paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl. var. *fruticosa* Chodat & Hassl. = **Bernardia paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia paraguariensis Chodat & Hassl. var. *parvifolia* Chodat & Hassl. = **Bernardia paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia pedunculatis Müll. Arg. f. *spiciflora* Chodat & Hassl. = **Bernardia longipedunculata** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia pedunculatis Müll. Arg. f. *subcapituliflora* Chodat & Hassl. = **Bernardia longipedunculata** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia peduncularis Müll. Arg. var. *longipedunculata* Chodat & Hassl. = **Bernardia longipedunculata** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Pax & K. Hoffm. = **Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **setosa** Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. f. *elliptica* Pax & K. Hoffm. = **Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **setosa** Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl. = **Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **curuguatensis**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. f. *salicina* Chodat & Hassl. = **Bernardia polymorpha** Chodat & Hassl. var. **curuguatensis**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **curuguatensis**
Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *salicina* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7639* (BM)].

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **polymorpha**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 0–700 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 40935* (AS, MO)].

Bernardia polymorpha Chodat & Hassl. var. **setosa** Chodat & Hassl.
Sin.: *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Bernardia polymorpha* Chodat & Hassl. f. *elliptica* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Krapovickas, A. 46071* (CTES)].

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg.
Sin.: *Adelia pulchella* Baill., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidens* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidenta* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *breviserrata* Chodat & Hassl., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. f. *lanceolata* Müll. Arg., *Bernardia pulchella* (Baill.) Müll. Arg. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval.
Referencias: Allem, A. C., 1980; Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1914; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1606* (SI), *Morrone, O. 820* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12525* (SI), *Smith, L. B. 12893* (GH, HBR, NY, R, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6396* (SI), *Stutz, L. C. 1677* (G)].

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. f. *acuminata* Chodat & Hassl. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidens* Chodat & Hassl. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. f. *acutidenta* Chodat & Hassl. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. f. *breviserrata* Chodat & Hassl. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. f. *lanceolata* Müll. Arg. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.

Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval. = **Bernardia pulchella** (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Bernardia sellowii Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(COS, ERI, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(CAN); URY(PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 23386* (SI), *Zuloaga, F. O. 7776* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11447* (US)]; PRY[*Zardini, E. M. 51408* (AS, MO)]; URY[*Bonifacino, M. 895* (MVFA)].

Bernardia simplex Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4569* (BM, NY)].

Bia alienata Didr. = **Tragia alienata** (Didr.) Múlgura & M.M. Gut.

Bia sellowiana Baill. ex Müll. Arg. = **Tragia alienata** (Didr.) Múlgura & M.M. Gut.
Referencias: Múlgura, M. E., 1991.

Breynia J.R. Forst. & G. Forst., nom. cons.

Número de especies: 1 introducida

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 8783* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 12237* (HBR)].

Caperonia A. St.-Hil.

Número de especies: 9, 4 endémicas

[Caperonia acalyphifolia Griseb.]
Sin.: *Argythamnia acalyphifolia* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Caperonia altissima Eskuche
Referencias: Eskuche, U. G., 2002c.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Eskuche, U. G. 6137* (SI), *Eskuche, U. G. 6143* (SI)].

Caperonia bahiensis Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl. = **Caperonia castaneifolia** (L.) A. St.-Hil.
Referencias: Eskuche, U. G., 2002a.

Caperonia buettneriacea Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Nativa. 400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6394* (MBM, US)].

Caperonia capiibarensis Eskuche
Referencias: Eskuche, U. G., 2002c.
Hierba palustre. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Eskuche, U. G. 6405* (SI), *Eskuche, U. G. 6412* (SI)].

Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil.
Sin.: *Caperonia bahiensis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Caperonia latior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Croton castaneifolius* L.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 2005b; Eskuche, U. G., 2002a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(AMA, CEN, CON, COA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21249* (MU, SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 22517* (AS, MO)]; URY[*Marchesi, E. 16873* (MVFA)].

Caperonia cordata A. St.-Hil.
Sin.: *Caperonia cordata* A. St.-Hil. var. *mollis* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Dawson, G., 1965a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1912a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAA, ITA, PHA); URY(CLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 409* (SI), *Zuloaga, F. O. 6530* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 2923* (ICN)]; PRY[*Jörgensen, P. 4333* (LP, SI), *Schinini, A. 26749* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1625* (SI), *Rosengurtt, B. 56086* (LIL)].

Caperonia cordata A. St.-Hil. var. *mollis* Pax & K. Hoffm. = **Caperonia cordata** A. St.-Hil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Caperonia glabrata Pax & K. Hoffm.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Eskuche, U. G., 1989; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba palustre. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(MIE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 12623* (P, SI)]; PRY[*Schinini, A. 5892* (SI)].

Caperonia hystrix Pax & K. Hoffm. = **Caperonia linearifolia** A. St.-Hil.

Caperonia latior (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Caperonia castaneifolia** (L.) A. St.-Hil.
Referencias: Eskuche, U. G., 2002a.

Caperonia linearifolia A. St.-Hil.
Sin.: *Caperonia hystrix* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Eskuche, U. G., 1989; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1912a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, MON, ROC, SJO, TYT).

Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 29961* (SI), *Burkart, A. 8926* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 4452* (PACA)]; URY[*Berro, M. B. 1983* (MVFA)].

Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil.
Sin.: *Croton palustris* L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Eskuche, U. G., 2002a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Hierba acuática. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CAU, CEN, ÑEE, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2851* (BA, LIL)]; PRY[*Mereles, F. 4807* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 2188* (SI)].

Caperonia paraguayensis Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 46619* (AS, MO)].

Chamaesaracha engelmannii (Boiss.) Soják = **Euphorbia engelmannii** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chamaesyce adenoptera (Bertol.) Small = **Euphorbia adenoptera** Bertol.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce barberiana Croizat = **Euphorbia berteroana** Spreng.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce berter0ana (Spreng.) Millsp. = **Euphorbia berteroana** Spreng.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce brasiliensis (Lam.) Small = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Chamaesyce caecorum (Mart. ex Boiss.) Croizat = **Euphorbia potentilloides** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Chamaesyce catamarcensis Croizat = **Euphorbia catamarcensis** (Croizat) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce chamaerrhodos (Boiss.) Croizat = **Euphorbia chamaerrhodos** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chamaesyce eichleri (Müll. Arg.) Croizat = **Euphorbia eichleri** Müll. Arg.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce emarginata (Klotzsch & Garcke) Croizat = **Euphorbia emarginata** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. = **Euphorbia hirta** L. var. **hirta**
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. var. *procumbens* (DC.) Moldenke = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang

[Chamaesyce hirta (L.) Millsp. subsp. laeticincta Croizat]
Notas: Nombre dudoso.

Chamaesyce hirta (L.) Millsp. subsp. *procumbens* (DC.) Croizat = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Chamaesyce hirtella (Boiss.) Croizat = **Euphorbia hirtella** Boiss.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Chamaesyce hunzikeri (Subils) Holub = **Euphorbia hunzikeri** Subils

Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. = **Euphorbia hypericifolia** L.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small = **Euphorbia hyssopifolia** L.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce koerneriana (Allem & Irgang) V.S. Raju & P.N. Rao = **Euphorbia koernerana** Allem & Irgang

Chamaesyce lasiocarpa (Klotzsch) Arthur = **Euphorbia lasiocarpa** Klotzsch
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce lorentzii (Müll. Arg.) Croizat = **Euphorbia lorentzii** Müll. Arg.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce lutulenta Croizat = **Euphorbia lutulenta** (Croizat) Oudejans
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chamaesyce maculata (L.) Small = **Euphorbia maculata** L.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce marayensis (Subils) Holub = **Euphorbia marayensis** Subils

Chamaesyce meyeniana (Klotzsch) Croizat = **Euphorbia meyeniana** Klotzsch

Chamaesyce nana (Klotzsch & Garcke) M.P. Simmons & W.J. Hayden = **Euphorbia chamaerrhodos** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chamaesyce nutans (Lag.) Small = **Euphorbia nutans** Lag.

Chamaesyce ophthalmica (Pers.) D.G. Burch = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Chamaesyce oranensis Croizat = **Euphorbia oranensis** (Croizat) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Croizat = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce portucasadiana Croizat = **Euphorbia portucasadiana** (Croizat) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce potentilloides (Boiss.) Croizat = **Euphorbia potentilloides** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Chamaesyce prostrata (Aiton) Small = **Euphorbia prostrata** Aiton
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.

Chamaesyce rhytisperma (Klotzsch & Garcke) Soják = **Euphorbia rhytisperma** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Chamaesyce rochaensis Croizat = **Euphorbia rochaensis** (Croizat) Alonso Paz & Marchesi
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chamaesyce ruiz-lealii (Subils) Holub = **Euphorbia ruiz-lealii** Subils

Chamaesyce selloi (Klotzsch & Garcke) Croizat = **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Chamaesyce selloi (Klotzsch & Garcke) Croizat var. *brevisemina* Croizat = **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Chamaesyce serpens (Kunth) Small = **Euphorbia serpens** Kunth var. **serpens**
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce serpens (Kunth) Small var. *montevidensis* (Boiss.) Croizat = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**

Chamaesyce serpyllifolia (Pers.) Small = **Euphorbia serpyllifolia** Pers.
Referencias: Subils, R., 1977.

Chamaesyce supina (Raf.) Moldenke = **Euphorbia maculata** L.

Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. = **Euphorbia thymifolia** L.

Chiropetalum A. Juss.

Número de especies: 15, 10 endémicas

Chiropetalum anisotrichum (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia anisotricha* Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Chiropetalum argentinense Skottsb.
Sin.: *Argythamnia argentinense* (Skottsb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum tricuspidatum* auct. non (Lam.) A. Juss., p.p.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; Lourteig, A., 1942; Lourteig, A., 1955[1954]a; Steibel, P., 1995.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, LPA, LRI, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 1794* (SI), *Stuckert, T. J. V. 14985* (GH, LIL)].

Chiropetalum berterianum Schltdl. f. *macrantha* Skottsb. = **Chiropetalum berterianum** Schltdl. var. **berterianum**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum berterianum Schltdl. var. **berterianum**
Sin.: *Argythamnia berteriana* (Schltdl.) Müll. Arg., *Chiropetalum berterianum* Schltdl. f. *macrantha* Skottsb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Subarbusto. Endémica. 200–1800 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, IX, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 226* (A, BM, G, GH, HAL, MO, NY, P)].

Chiropetalum berterianum Schltdl. var. **psiladenium** Skottsb.
Sin.: *Argythamnia berteriana* (Schltdl.) Müll. Arg. var. *psiladenia* (Skottsb.) J.W. Ingram
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Subarbusto. Endémica. 600 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 34* (BM, F, G, GH, NY, S, UC, US)].

Chiropetalum boliviense (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia boliviensis* Müll. Arg., *Argythamnia triandra* (Griseb.) Allem & Irgang, *Chiropetalum triandrum* Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 647* (SI)].

Chiropetalum canescens Phil.
Sin.: *Argythamnia canescens* (Phil.) F. Phil., *Argythamnia sponiella* Müll. Arg., *Chiropetalum gigouxii* Espinosa, *Chiropetalum sponiella* (Müll. Arg.) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Johnston, I. M. 4780* (F, GH, S, US), *Werdermann, E. 773* (SI)].

Chiropetalum cremnophilum I.M. Johnst.
Sin.: *Argythamnia cremnophila* (I.M. Johnst.) J.W. Ingram
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Subarbusto. Endémica. 200 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Garaventa, A. 4141* (SI), *Johnston, I. M. 5707* (GB, GH, P, US)].

Chiropetalum cupreum Pax & K. Hoffm. = **Chiropetalum griseum** Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum gigouxii Espinosa = **Chiropetalum canescens** Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum griseum Griseb.
Sin.: *Argythamnia grisea* (Griseb.) Allem & Irgang, *Argythamnia mollis* Kuntze, nom. nud., *Chiropetalum cupreum* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Dawson, G., 1965a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, SLU); PRY(APY, ÑEE, PHA); URY(SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 13918* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4880* (FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 698* (SI)].

Chiropetalum intermedium Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia intermedia* (Pax & K. Hoffm.) Allem & Irgang
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CAS, FLO, FLA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 4613* (GH, LIL, SI)]; URY[*Berro, M. B. 3066* (G, K)].

Chiropetalum lanceolatum (Cav.) A. Juss. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum lineatum Klotzsch, nom. nud. = **Chiropetalum tricoccum** (Vell.) Chodat & Hassl.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.

Chiropetalum molle (Baill.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia mollis* Baill.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. s.n.* (PACA)].

Chiropetalum ovatum Phil. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum patagonicum (Speg.) O´Donell & Lourteig
Sin.: *Aonikena patagonica* Speg.
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, COR, LPA, MEN, RNE, SCR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 16156* (BAA, BAB)].

Chiropetalum phalacradenium (J.W. Ingram) L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Argythamnia phalacradenia* J.W. Ingram
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Endémica. 700–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12343* (NY, UC, US)].

Chiropetalum pilosistylum (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Argythamnia pilosistyla* Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1976a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)].

Chiropetalum ramboi (Allem & Irgang) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Argythamnia ramboi* Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1976a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Allem s.n.* (ICN)].

Chiropetalum sponiella (Müll. Arg.) Pax = **Chiropetalum canescens** Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum triandrum Griseb. = **Chiropetalum boliviense** (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl.
Sin.: *Argythamnia lineata* (Klotzsch) Baill., nom. illeg., *Argythamnia tricocca* (Vell.) Müll. Arg., *Chiropetalum lineatum* Klotzsch, nom. nud., *Chiropetalum tricoccum* (Vell.) Chodat & Hassl. f. *latifolius* Chodat & Hassl., *Desfontaena tricocca* Vell.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI); URY(DUR, FLO, FLA, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 9027* (SI), *Morrone, O. 1479* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13251* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 201* (SI), *Zardini, E. M. 2492* (FCQ, MO)]; URY[*Gallinal 3132* (F, GH)].

Chiropetalum tricoccum (Vell.) Chodat & Hassl. f. *latifolius* Chodat & Hassl. = **Chiropetalum tricoccum** (Vell.) Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980.

Chiropetalum tricuspidatum auct. non (Lam.) A. Juss., p.p. = **Chiropetalum argentinense** Skottsb.

Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) A. Juss.
Sin.: *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg., *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Argythamnia tricuspidata* (Lam.) Müll. Arg. var. *lanceolata* (Cav.) Müll. Arg., *Chiropetalum lanceolatum* (Cav.) A. Juss., *Chiropetalum ovatum* Phil., *Chiropetalum tricuspidatum* (Lam.) A. Juss. var. *genuinum* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Chiropetalum tricuspidatum* (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm., *Croton lanceolatum* Cav., *Croton tricuspidatus* Lam.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SLU, TUC); CHL(V, VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 10657* (LIL), *Schulz, A. G. 8920* (SI)]; CHL[*Looser, G. 2070* (GH)].

Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) A. Juss. var. *genuinum* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., nom. inval. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Chiropetalum tricuspidatum (Lam.) A. Juss. var. *lanceolatum* (Cav.) Pax & K. Hoffm. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Cicca argentea (L.) Kuntze = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Cicca montevidensis (Klotzsch ex Baill.) Kuntze = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Cnemidostachys hispida Mart. = **Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Cnemidostachys serrulata Mart. = **Sebastiania serrulata** (Mart.) Müll. Arg.

Cnidoscolus Pohl

Número de especies: 14, 9 endémicas

Cnidoscolus albomaculatus (Pax) I.M. Johnst.
Sin.: *Jatropha albomaculata* Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *nana* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *stimulosissima* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha albomaculata* Pax var. *subcuneata* Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. f. *nana* Chodat & Hassl., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *stimulosissima* Chodat & Hassl.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(CHA, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 623* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 2028* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2179* (SI), *Woolston, A. L. 432* (SI)].

Cnidoscolus appendiculatus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha appendiculata* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–600 m.
Países: ARG(MIS, TUC); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CON, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29315* (MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 47585* (AS, MO)].

Cnidoscolus campanulatus (Pax) Pax
Sin.: *Jatropha campanulata* Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 100–400 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAA, CON, COA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5632* (SI), *Zardini, E. M. 43507* (MO, PY)].
Notas: Citada para Tucumán, Argentina, sin indicar localidad o material de referencia (Govaerts et al., 2000).

Cnidoscolus cnicodendrum Griseb. = **Cnidoscolus vitifolius** (Mill.) Pohl var. **cnicodendrum** (Griseb.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Cnidoscolus hasslerianus (Pax) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha hassleriana* Pax
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1589* (SI), *Rojas, T. 2180* (SI)].

Cnidoscolus loasoides (Pax) I.M. Johnst.
Sin.: *Jatropha loasoides* Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2201* (SI)].

Cnidoscolus löfgrenii (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm. = **Cnidoscolus urens** (L.) Arthur
Referencias: Lourteig, A., 1955[1954]a.

Cnidoscolus maracayensis (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha maracayensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 54916* (MO)].

Cnidoscolus neglectus Pohl = **Cnidoscolus urens** (L.) Arthur
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Cnidoscolus pteroneurus Fern. Casas
Referencias: Fernández Casas, F. J., 2004a.
Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Caballero Mármori, G. 4114* (MBM)].

Cnidoscolus serrulatus (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha serrulata* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 100–700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1327* (BM, PY), *Jörgensen, P. 4675* (SI)].

Cnidoscolus subinteger (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha subintegra* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Jatropha vitifolia* Mill. f. *subintegra* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: PRY(ITA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 46217* (AS, MO)].

Cnidoscolus tenuifolius (Pax & K. Hoffm.) I.M. Johnst.
Sin.: *Jatropha tenuifolia* Pax & K. Hoffm., nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(sin localidad); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 15377* (MO)]; PRY[*Zardini, E. M. 50366* (AS, MO)].

Cnidoscolus tetracyclus Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Malme, G. O. A. 1084a* (*)].

Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. **trilobus** (Müll. Arg.) Lourteig & O´Donell
Sin.: *Cnidoscolus vitifolius* (Mill.) Pohl var. *repandus* Griseb., *Jatropha tubulosa* Müll. Arg. var. *triloba* Müll. Arg., *Jatropha vitifolia* Mill. var. *repanda* (Griseb.) Pax
Referencias: Basualdo, I. & Soria Rey, N., 1999; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Arbusto. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, O. 4485* (SI), *Jörgensen, P. 2854* (BA, LIL)]; PRY[*Brunner, D. R. 1570* (MO, PY)].

Cnidoscolus urens (L.) Arthur
Sin.: *Cnidoscolus löfgrenii* (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm., *Cnidoscolus neglectus* Pohl, *Cnidoscolus urens* (L.) Arthur var. *neglectus* (Pohl) Lourteig, *Jatropha löfgrenii* Pax & K. Hoffm., *Jatropha urens* L., *Jatropha urens* L. var. *neglecta* (Pohl) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943; Lourteig, A., 1955[1954]a.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez {2° serie}, F. M. 36* (BA, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 43198* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 1674* (SI), *Jörgensen, P. 4334* (SI)].

Cnidoscolus urens (L.) Arthur var. *neglectus* (Pohl) Lourteig = **Cnidoscolus urens** (L.) Arthur

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl var. **cnicodendrum** (Griseb.) Lourteig & O´Donell
Sin.: *Cnidoscolus cnicodendrum* Griseb., *Jatropha vitifolia* Griseb. var. *grisebachii* Pax, *Jatropha vitifolia* Mill. var. *cnicodendrum* (Griseb.) Pax
Referencias: Basualdo, I., Zardini, E. M., Soria, N. & Ortíz, M., 1994; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL); PRY(APY, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 4131* (SI), *Zuloaga, F. O. 7665* (SI)]; PRY[*Soria, N. 361* (FCQ, MO)].

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl var. *repandus* Griseb. = **Cnidoscolus tubulosus** (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. **trilobus** (Müll. Arg.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

[Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl var. vitifolius]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Colliguaja Molina

Número de especies: 5 endémicas

Colliguaja brasiliensis Klotzsch ex Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Endémica. 500–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12906* (GH, HBR, NY, R, US)].
Notas: Citada para Paraguay y Uruguay sin indicar distribución o material de referencia (Govaerts et al., 2000).

Colliguaja dombeyana A. Juss.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–2700 m.
Países: CHL(IV, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 994822* (CONC, SGO), *Werdermann, E. 549* (SI)].

Colliguaja dombeyana Gay, nom. illeg. = **Colliguaja salicifolia** Gillies & Hook.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Colliguaja integerrima Gillies & Hook.
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, XI, XII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15568* (SI), *Hunziker, J. H. 13105* (SI), *Rossow, R. A. 3060* (BAB)]; CHL[*Worth, C. R. 16598* (SI)].

Colliguaja obtusa Regel = **Colliguaja odorifera** Molina
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Colliguaja odorifera Molina
Sin.: *Colliguaja obtusa* Regel, *Colliguaja triquetra* Gillies & Hook., *Croton colliguay* Molina
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Boelcke, O. 3886* (SI)].

Colliguaja patagonica Speg. = **Stillingia patagonica** (Speg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Wurdack, K. J., Hoffmann, P. & Chase, M. W., 2005.

Colliguaja salicifolia Gillies & Hook.
Sin.: *Colliguaja dombeyana* Gay, nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 200–1800 m.
Países: CHL(IV, V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Ricardi, M. 2801* (CONC)].

Colliguaja triquetra Gillies & Hook. = **Colliguaja odorifera** Molina
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Conceveibum cordatum A. Juss. = **Aparisthmium cordatum** (A. Juss.) Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton L.

Número de especies: 123, 66 endémicas, 1 introducida

Croton aberrans Müll. Arg.
Sin.: *Croton guaraniticus* Chodat & Hassl.
Referencias: Eskuche, U. G., 1992; Mueller Argoviensis, J., 1873; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CAN, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1654* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16524* (HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4329* (SI)].

Croton ackermannianus (Müll. Arg.) G.L. Webster
Sin.: *Julocroton ackermannianus* Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CAA, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 11192* (HBR, US)]; PRY[*Soria, N. 2162* (FCQ)].

Croton allemii G.L. Webster
Sin.: *Julocroton ramboi* L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. s.n.* (US)]; PRY[*Balansa, B. 1660* (P)].

Croton andinus Müll. Arg.
Sin.: *Croton psammophilus* Lillo
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual o perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20176* (SI), *Venturi, S. 4385* (NY)]; PRY[*Rojas, T. 2176* (SI), *Zardini, E. M. 42237* (AS, MO)].

Croton antisyphiliticus Mart.
Sin.: *Croton antisyphiliticus* Mart. var. *cordiaefolius* Müll. Arg., *Croton antisyphiliticus* Mart. var. *latifolius* (Baill.) Müll. Arg., *Croton perdicipes* Baill. var. *latifolius* Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 40752* (CTES, MBM)].

Croton antisyphiliticus Mart. var. *cordiaefolius* Müll. Arg. = **Croton antisyphiliticus** Mart.

Croton antisyphiliticus Mart. var. *latifolius* (Baill.) Müll. Arg. = **Croton antisyphiliticus** Mart.

Croton apostolon Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton vulpinus* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 236* (GH, SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9230* (GH)].

Croton arechavaletae Herter ex Arechav. = **Croton chamaepitys** Baill.

[Croton argentealbidus Radcl.-Sm. & Govaerts]
Sin.: *Julocroton gardneri* Müll. Arg.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton argenteus L.
Sin.: *Cicca argentea* (L.) Kuntze, *Cicca montevidensis* (Klotzsch ex Baill.) Kuntze, *Croton integer* (Chodat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton argenteus* (L.) Didr., *Julocroton camporum* Chodat & Hassl., *Julocroton elaeagnoides* S. Moore, *Julocroton integer* Chodat, *Julocroton integer* Chodat f. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Julocroton linearifolius* (Chodat & Hassl.) Croizat, *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg., *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *linearifolius* Chodat & Hassl.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L., 1992.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CEN, ITA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 975* (SI), *Taylor, C. M. 11419* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 300* (G), *Rojas, T. 2162* (SI)].

Croton argentinus Müll. Arg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 200–2100 m.
Países: ARG(BAI, COR, SLU); BRA(RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Gez, J. W. 68* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 16304* (MO)]; URY[*Fruchard, M. 767* (P)].

Croton astrogynus Baill. = **Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry

Croton aureomarginatus Chodat & Hassl. = **Astraea aureomarginata** (Chodat & Hassl.) P.E. Berry

Croton beetlei Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1940, 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Árbol. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 22829* (GH), *Maruñak, V. 530* (SI)].

Croton berberifolius Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11211* (GH)].
Notas: Especie afin a *Croton perviscosus*, posiblemente conespecífica con ella.

Croton bonplandianus Baill.
Sin.: *Croton pauperulus* Müll. Arg., *Croton rivinoides* Chodat, *Croton sparsiflorus* Morong
Referencias: Bacigalupo, N. M., 2005b; Croizat, L. C. M., 1941b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, COA, PHA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 11685* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5215* (CTES, FCQ), *Schinini, A. 3973bis* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1161* (SI)].

Croton bresolinii L.B. Sm. & Downs
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100 m.

Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 6749* (FLOR, HBR, US)].

Croton buxifolius Müll. Arg. = **Croton erythroxyloides** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton calonervosus G.L. Webster
Sin.: *Julocroton nervosus* Baill.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1140* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 5948* (R, US)].

Croton calyciglandulosus Allem
Referencias: Allem, A. C., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. s.n.* (ICN)].

Croton calycireduplicatus Allem
Referencias: Allem, A. C., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 11296* (HBR, US)].

Croton campestris A. St.-Hil.
Referencias: Lima, L. R. & Pirani, J. R., 2003.
Hierba, subarbusto o arbusto. Perenne. Nativa. 100–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14862* (R)].
Notas: Citada para Misiones, Argentina, sin mencionar ejemplar de referencia (Govaerts et al. 2000).

[Croton carandaitensis Croizat]
Notas: Especie excluida del área del proyecto. La localidad típo pertenece actualmente a Bolivia.

Croton castaneifolius L. = **Caperonia castaneifolia** (L.) A. St.-Hil.

Croton catamarcensis Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Menéndez Sevillano 9376c* (LIL)].

Croton catharinensis L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 1400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7847* (HBR, US)].

[Croton ceanothifolius Baill.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton celtidifolius Baill.
Sin.: *Croton cynanchicus* Baill., *Croton oreophilus* Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 10612* (FLOR, HBR, US), *Kummrow, R. 1028* (SI), *Kummrow, R. 863* (SI)].

Croton chaetophorus Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 500–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9221* (GH, HBR, NY, R, US)].
Notas: Especie muy afin a *Croton serratifolius*.

Croton chamaepitys Baill.
Sin.: *Croton arechavaletae* Herter ex Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *chamaepitys* (Baill.) Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *brevifolius* Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *intermedius* Müll. Arg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. 1193a* (SI), *Osten, C. 5167* (G, MVM)].

Croton chilensis Müll. Arg.
Sin.: *Croton collinus* Phil., hom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B)].

Croton chloroleucos Müll. Arg.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 38371* (CTES, G, MBM)].

Croton chodatii (Croizat) P.E. Berry
Sin.: *Julocroton chodatii* Croizat, *Julocroton pycnophyllus* Schltdl. f. *latifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto. Endémica.
Países: PRY(CAN). 0–500 m.
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4598* (G)].

Croton cinerellus Müll. Arg.
Sin.: *Croton cinerellus* Müll. Arg. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.
Arbusto. Nativa.
Países: PRY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5126* (G)].

Croton cinerellus Müll. Arg. f. *parvifolia* Chodat & Hassl. = **Croton cinerellus** Müll. Arg.

Croton coelebogyne Baill. = **Croton uruguayensis** Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton colliguay Molina = **Colliguaja odorifera** Molina

Croton collinus Phil., hom. illeg. = **Croton chilensis** Müll. Arg.

Croton confinis L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 1000–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 12175* (US)].
Notas: Posiblemente una forma de *Croton splendidus*.

Croton cooperianus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton cooperianus* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Subarbusto. Nativa.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4630* (GH, SI)].

Croton cordobensis Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999.
Arbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 4995* (CTES, SI)].
Notas: Forma parte de un complejo de especies afín a *Croton conduplicatus* y probablemente sea conespecífica con *Croton orbignyanus*.

Croton corrientesianus Baill., nom. nud. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton crassirameus Müll. Arg. = **Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry

Croton cuchillae-nigrae Croizat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(MON, RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 8619* (CTES)]; URY[*Chebataroff, J. 9124* (A)].

Croton curiosus Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 1500–2600 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 8664* (US)].

Croton curuguatyensis Ahumada
Sin.: *Croton pohlianus* Müll. Arg. var. *macrophyllus* Chodat & Hassl.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4633* (G)].

Croton cynanchicus Baill. = **Croton celtidifolius** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton debilis Müll. Arg. = **Croton heterodoxus** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton densiflorus Pax & K. Hoffm. = **Croton piluliferus** Rusby

Croton dentosus Griseb. = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

[Croton dichorus Müll. Arg.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton didrichsenii G.L. Webster
Sin.: *Croton lithrifolius* (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts, *Julocroton humilis* Didr., *Julocroton lithrifolius* Croizat
Referencias: Cordeiro, I., 1990; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L., 1992.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 800–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 449b* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9323* (HBR, R, US)]; PRY[*Mereles, F. 5186* (FCQ), *Rojas, T. 13251* (SI)].

Croton divaricatus Sw. = **Croton glandulosus** L.

Croton doctoris S. Moore
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 2727* (P)].

Croton doratophylloides (Croizat) G.L. Webster
Sin.: *Julocroton doratophylloides* Croizat
Referencias: Cordeiro, I., 1990; Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 438* (A)].

Croton dracona Larrañaga = **Croton urucurana** Baill.

Croton dusenii Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1940; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Subarbusto. Endémica. 900–1100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9265* (S)].

Croton echinulatus (Griseb.) Croizat
Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var. *echinulatus* Griseb.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991; Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 621* (CORD, GOET)]; BRA[*Rambo, B. 9907* (PACA)]; URY[*Berro, M. B. 1598* (MVM)].

Croton emporiorum Croizat
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999; Croizat, L. C. M., 1941b.
Arbusto. Nativa. 1500–2000 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Fiebrig, K. A. G. 2243* (SI), *Zuloaga, F. O. 1195* (SI)].

Croton ericoideus Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 48773* (NY)].

Croton erythroxyloides Baill.
Sin.: *Croton buxifolius* Müll. Arg., *Croton riedelianus* Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 1400–1500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8406* (HBR, US)].

Croton eskuchei Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CEN, ÑEE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 6515* (CTES, SI)]; PRY[*Eskuche, U. G. 2527-57* (CTESN)].

Croton flavispicatus Rusby
Sin.: *Julocroton paniculatus* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Quarín, C. L. 268* (P)]; PRY[*Zardini, E. M. 47812* (AS, MO)].

Croton floribundus Spreng.
Sin.: *Croton maracayuensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lima, L. R. & Pirani, J. R., 2003.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Francisco, E. M. s.n.* (SP, UEC)]; PRY[*Bernardi, L. 18254* (G)].

Croton fuscus Müll. Arg. var. *microbracteata* Chodat & Hassl. = **Croton senescens** Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a.

Croton garckeanus Baill. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton garckeanus Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton garckeanus Baill. var. *guaraniticus* Chodat & Hassl. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton garckeanus Baill. var. *major* Müll. Arg. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton gaudichaudii Baill. = **Croton uruguayensis** Baill.

[Croton gilgianus Herter ex Arechav.]
Notas: Nombre dudoso, posiblemente conespecífica con *Croton serratifolius*.

Croton glandulosus L.
Sin.: *Croton divaricatus* Sw., *Croton glandulosus* L. var. *scordioides* (Lam.) Müll. Arg., *Croton scordioides* Lam.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 2005b; Croizat, L. C. M., 1941b; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SJU); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(COL, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2207* (SI), *Roig, F. A. 8385* (CTESN, MERL)]; BRA[*Hatschbach, A. 1540* (SI), *Klein, R. M. 4141* (HBR, US)]; PRY[*Jiménez, B. 1846* (BM, CTES, MO, PY), *Jörgensen, P. 3991* (SI)]; URY[*Osten, C. 5414* (SI)].

Croton glandulosus L. var. *cordovensis* Müll. Arg. = **Croton hirtus** L'Hér.

Croton glandulosus L. var. *hirtus* (L'Hér.) Müll. Arg. = **Croton hirtus** L'Hér.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton glandulosus L. var. *lundianus* (Didr.) L.B. Sm. & B.J. Downs = **Croton lundianus** (Didr.) Müll. Arg.

Croton glandulosus L. var. *scordioides* (Lam.) Müll. Arg. = **Croton glandulosus** L.

Croton glandulosus L. subsp. *hirtus* (L'Hér.) Croizat = **Croton hirtus** L'Hér.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton glechomifolius Müll. Arg.
Sin.: *Croton tragifolius* Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999; Mueller Argoviensis, J., 1873; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1300 m.

Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 6782* (CTESN)]; BRA[*Lourteig, A. 2246* (SI), *Smith, L. B. 13608* (GH, HBR, NY, R, US)]; PRY[*Schinini, A. 9112* (CTES)].

Croton gnaphalii Baill.
Sin.: *Croton herteri* Arechav., *Croton troncosoi* Ahumada
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(COL, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8095* (SI)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1671* (GH, P), *Sehnem, A. 4411* (SI)]; URY[*Herter, G. 252* (SI)].

Croton goyazensis Müll. Arg.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jiménez, B. 1556* (BM, CTES, PY)].

Croton gracilipes Baill.
Sin.: *Croton hasslerianus* Chodat
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Medri, C. 906* (FUEL, HRCB, SP)]; PRY[*Zardini, E. M. 9902* (MO)].

Croton grandivelus auct. non Baill. = **Croton pedersenii** Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998.

Croton grandivelus Baill.
Sin.: *Croton grandivelus* Baill. var. *pannosus* Müll. Arg., *Croton intercedens* auct. non Müll. Arg., *Croton pycnocarpus* Müll. Arg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, COA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bianeck, A. E. 114* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 8424* (G, LIL)].

Croton grandivelus Baill. var. *pannosus* Müll. Arg. = **Croton grandivelus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998.

Croton guaraniticus Chodat & Hassl. = **Croton aberrans** Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton harmsianus Herter ex Arechav. = **Croton lanatus** Lam. var. **lanatus**

Croton hasslerianus Chodat = **Croton gracilipes** Baill.

Croton hauthalii (Kuntze) K. Schum. = **Astraea hauthalii** (Kuntze) P.E. Berry

Croton helichrysum Baill.
Referencias: Baillon, H. E., 1864; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Saint-Hilaire, A. F. C. P. 1830–c2* (SI)].

Croton herteri Arechav. = **Croton gnaphalii** Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton heterodoxus Baill.
Sin.: *Croton debilis* Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9235* (HBR, US)].

Croton heteroneurus Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(RGS); URY(MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reineck, E. M. 227* (P)]; URY[*Sellow, F. s.n.* (B)].

Croton hieronymi Griseb.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 7724* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2154* (SI)].

Croton hilarii Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: URY(CLA, LAV, MAL, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. 1519* (SI)].

Croton hirtus L'Hér.
Sin.: *Croton glandulosus* L. subsp. *hirtus* (L'Hér.) Croizat, *Croton glandulosus* L. var. *cordovensis* Müll. Arg., *Croton glandulosus* L. var. *hirtus* (L'Hér.) Müll. Arg., *Croton verbenifolius* Müll. Arg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L., 1967.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1776* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1974* (HBR, US)].

Croton holodiscus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton holodiscus* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Subarbusto. Nativa.
Países: BRA(RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9006* (G)].

Croton ichthygaster L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 10937* (US)].

Croton integer (Chodat) Radcl.-Sm. & Govaerts = **Croton argenteus** L.

Croton integrilobus Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 3708* (GH)].

Croton intercedens auct. non Müll. Arg. = **Croton grandivelus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998.

Croton isabellei Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 400–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 5056* (SI)].
Notas: Especie pobremente conocida, afin a *Croton campestris*.

Croton ituzaingensis Ahumada = **Croton missionum** Croizat

Croton julopsidium Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lima, L. R. & Pirani, J. R., 2003.
Arbusto o subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1675* (P)].

Croton kleinii L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 11256* (HBR, US)].

Croton lachnostachyus Baill.
Sin.: *Croton sarcopetalus* Müll. Arg., *Croton tucumanensis* Griseb., *Croton tucumanensis* Griseb. var. *oblongatus* Griseb.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, COA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 6930* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 149* (SI)].

Croton lachnostephanus Baill.
Sin.: *Croton paxianus* Herter ex Arechav., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *lachnostephanus* (Baill.) Müll. Arg., *Croton trichocephalus* Müll. Arg. var. *rigidus* Müll. Arg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(MAL).
Ejemplares de referencia: URY[*Felippone, F. 4066* (G)].

Croton lanatus Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry
Sin.: *Croton astrogynus* Baill., *Croton crassirameus* Müll. Arg., *Croton laseguei* Müll. Arg., *Croton macrostigma* Chodat, *Croton silvanus* Croizat, *Croton thermarum* Müll. Arg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1730* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1971* (HBR, S, US)]; PRY[*Hassler, E. 3158* (GH)].

Croton lanatus Lam. var. **lanatus**
Sin.: *Croton harmsianus* Herter ex Arechav.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, LAV, MAL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de referencia: URY[*Herter, W. G. F. 75a* (SI)].

Croton lanatus Lam. var. **lorentzii** (Müll. Arg. ex Griseb.) P.E. Berry
Sin.: *Croton lorentzii* Müll. Arg. ex Griseb.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7290* (SI)].

Croton lanatus Lam. var. **ruderalis** (Ahumada) P.E. Berry
Sin.: *Croton ruderalis* Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999; Bacigalupo, N. M., 2005b.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 6251* (CTESN)].

Croton lanatus Lam. var. **tatacuensis** (Ahumada) P.E. Berry
Sin.: *Croton tatacuensis* Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999.
Subarbusto. Endémica. 100–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 7284* (CTESN)].

Croton lanceolatum Cav. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton landoltii Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1986; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 6755* (CTESN)].

Croton laseguei Müll. Arg. = **Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry

Croton laureltyanus Ahumada
Sin.: *Croton multirameus* Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ahumada, L. Z. 7327* (CTESN, SI)].
Notas: Especie que debe ser comparada con *Croton pycnocephalus*.

Croton leptophyllus Müll. Arg.
Subarbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 844* (CTES)].
Notas: Especie pobremente conocida.

Croton linearifolius Müll. Arg.
Arbusto. Nativa. 500–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Silva, J. M. 353* (MBM, SPF, WIS)].

Croton lithrifolius (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts = **Croton didrichsenii** G.L. Webster

Croton lobatus L. = **Astraea lobata** (L.) Klotzsch
Referencias: Berry, P. E., Hipp, A. L., Wurdack, K. J., Van Ee, B. & Riina, R., 2005.

Croton lombardianus Croizat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(CAS, MAL, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M. B. 7643* (MVFA)].

Croton lorentzii Müll. Arg. ex Griseb. = **Croton lanatus** Lam. var. **lorentzii** (Müll. Arg. ex Griseb.) P.E. Berry

Croton lundianus (Didr.) Müll. Arg.
Sin.: *Croton glandulosus* L. var. *lundianus* (Didr.) L.B. Sm. & B.J. Downs, *Podostachys lundianus* Didr.
Referencias: Lima, L. R. & Pirani, J. R., 2003.
Hierba, subarbusto o arbusto. Perenne. Nativa. 400–1200 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ginzbarg, S. 366* (SPF)]; BRA[*Rambo, B. 34479* (SI), *Ribas, O. S. 1265* (SPF)].

Croton macrobothrys Baill.
Sin.: *Croton vauthieri* Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Árbol. Nativa. 200–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 58455* (MBM, SI)].

Croton macrostigma Chodat = **Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry

[Croton malacotrichus Müll. Arg.]
Notas: Nombre dudoso, posiblemente conespecífico con *Croton montevidensis*.

Croton malpighipilus Hicken = **Ditaxis malpighipila** (Hicken) L.C. Wheeler
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton malvoides (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton malvoides* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(PHA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 2647* (G)].

Croton maracayuensis Chodat & Hassl. = **Croton floribundus** Spreng.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Croton microcarpus Müll. Arg.
Subarbusto. Nativa. 100–300 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 11510* (NY)].

Croton migrans Casar. = **Croton splendidus** Mart. ex Colla

Croton minutiflorus Müll. Arg. = **Croton uruguayensis** Baill.

Croton missionum Croizat
Sin.: *Croton ituzaingensis* Ahumada
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Montes, J. E. 7049* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3552* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 9248* (SI)].

Croton montevidensis Spreng.
Sin.: *Croton penaeaceus* Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(FLA, LAV, MAL).
Ejemplares de referencia: BRA[*Wasum, R. 4699* (NY)]; URY[*Herter, W. G. F. 920b* (SI)].

Croton multirameus Ahumada = **Croton laureltyanus** Ahumada

Croton myriadenus Müll. Arg. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton myriadenus Müll. Arg. f. *abortivus* Müll. Arg. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton myriadenus Müll. Arg. var. *normalis* Müll. Arg., nom. inval. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton myrianthus Müll. Arg.
Sin.: *Croton pallidulus* Baill. var. *myrianthus* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & S.F. Sm.
Arbusto. Endémica. 700–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 12326* (HBR, US)].

Croton myriodontus Müll. Arg. = **Croton serratifolius** Baill.

Croton nitrariifolius Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(LAV, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sobral, M. 5182* (NY)]; URY[*Bonifacino, M. 829* (MVFA)].

Croton occidentalis Müll. Arg.
Sin.: *Croton occidentalis* Müll. Arg. f. *rupestris* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *intermedius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *oblongifolius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *ovalifolius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *parvifolius* Chodat & Hassl., *Croton occidentalis* Müll. Arg. var. *setosus* Chodat & Hassl.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1076* (G)].
Notas: La asignación de las variedades de Chodat & Hassler a esta especie es provisoria.

Croton occidentalis Müll. Arg. f. *rupestris* Chodat & Hassl. = **Croton occidentalis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton occidentalis Müll. Arg. var. *intermedius* Chodat & Hassl. = **Croton occidentalis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton occidentalis Müll. Arg. var. *oblongifolius* Chodat & Hassl. = **Croton occidentalis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton occidentalis Müll. Arg. var. *ovalifolius* Chodat & Hassl. = **Croton occidentalis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton occidentalis Müll. Arg. var. *parvifolius* Chodat & Hassl. = **Croton occidentalis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton occidentalis Müll. Arg. var. *setosus* Chodat & Hassl. = **Croton occidentalis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton odontadenius Müll. Arg.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(APA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 12029* (P)].

Croton oranensis Hieron., nom. nud. = **Croton piluliferus** Rusby

Croton orbignyanus Müll. Arg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(CAT, COR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lossen, W. 79* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2758* (FCQ, MO)].

Croton oreophilus Müll. Arg. = **Croton celtidifolius** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton pallidulus Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 13606* (HBR, R, US)].

Croton pallidulus Baill. var. *myrianthus* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & S.F. Sm. = **Croton myrianthus** Müll. Arg.

Croton palustris L. = **Caperonia palustris** (L.) A. St.-Hil.

Croton paraguayensis Chodat
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 1866* (G)].

Croton parvifolius Müll. Arg.
Sin.: *Croton ventanicolus* Speg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Dawson, G., 1965a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, ERI, SDE, SFE, SLU); BRA(RGS); URY(ART, ROC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Seijo, G. J. 1380* (SI)]; BRA[*Gibert, J. E. 26* (G, K)]; URY[*Lourteig, A. 2497* (SI)].

[Croton parvulus Müll. Arg.]
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Croton patrum L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 1000–1800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2665* (US)].

Croton pauperulus Müll. Arg. = **Croton bonplandianus** Baill.

Croton paxianus Herter ex Arechav. = **Croton lachnostephanus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pedersenii Ahumada
Sin.: *Croton grandivelus* auct. non Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Nativa. 100–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4470a* (G)].

Croton penaeaceus Baill. = **Croton montevidensis** Spreng.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Croton peraffinis Müll. Arg.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton perdicipes Baill. var. *latifolius* Baill. = **Croton antisyphiliticus** Mart.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton perviscosus Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 12042* (GH)].

Croton phyllanthus (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Sin.: *Julocroton phyllanthus* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4576* (BM, G)].

Croton piluliferus Rusby
Sin.: *Croton densiflorus* Pax & K. Hoffm., *Croton oranensis* Hieron., nom. nud.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999; Rusby, H. H., 1895.
Árbol. Nativa. 300–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32278* (SI)].

Croton pimelaeus Baill.
Arbusto. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14845* (P)].

Croton pohlianus Müll. Arg. var. *macrophyllus* Chodat & Hassl. = **Croton curuguatyensis** Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998.

Croton polygonoides L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 9681* (HBR, R, US)].

Croton psammophilus Lillo = **Croton andinus** Müll. Arg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton pycnocarpus Müll. Arg. = **Croton grandivelus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1998.

Croton pycnocephalus Baill.
Sin.: *Croton pycnocephalus* Baill. var. *argyrocomus* Baill., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval., *Croton pycnocephalus* Baill. var. *leptophylloides* Müll. Arg.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(MAL, MON).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sellow, F. 3109* (G, LIL)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1556* (LIL)].

Croton pycnocephalus Baill. var. *argyrocomus* Baill. = **Croton pycnocephalus** Baill.

Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pycnocephalus Baill. var. *chamaepitys* (Baill.) Müll. Arg. = **Croton chamaepitys** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pycnocephalus Baill. var. *echinulatus* Griseb. = **Croton echinulatus** (Griseb.) Croizat
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pycnocephalus Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval. = **Croton pycnocephalus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pycnocephalus Baill. var. *lachnostephanus* (Baill.) Müll. Arg. = **Croton lachnostephanus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pycnocephalus Baill. var. *leptophylloides* Müll. Arg. = **Croton pycnocephalus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton pyrosoma (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton pyrosoma* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6305* (G)].

Croton quintasii Allem
Referencias: Allem, A. C., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Lindeman, J. C. s.n.* (ICN)].

Croton ramboi Allem
Referencias: Allem, A. C., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 39052* (PACA)].

Croton ramellae Ahumada
Referencias: Ahumada, L. Z., 1992; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA, AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10275* (G, LIL, P)].
Notas: Especie que debe compararse con *Croton pycnocephalus*.

Croton reitzii L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbolito. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 8011* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3464* (SI)].

[Croton rhamnifolius Kunth]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton riedelianus Müll. Arg. = **Croton erythroxyloides** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton rivinoides Chodat = **Croton bonplandianus** Baill.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton robustior Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton humilis* Didr. var. *robustior* L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 100–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA); PRY(CEN); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14388* (HBR, US)].

Croton ruderalis Ahumada = **Croton lanatus** Lam. var. **ruderalis** (Ahumada) P.E. Berry

Croton rumicifolius Chodat & Hassl. = **Astraea hauthalii** (Kuntze) P.E. Berry

Croton rupestris (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Sin.: *Julocroton montevidensis* Klotzsch ex Müll. Arg. f. *longepetiolata* Chodat & Hassl., *Julocroton rupestris* Chodat & Hassl., *Julocroton rupestris* Chodat & Hassl. var. *velutinus* Chodat & Hassl., *Julocroton velutinus* (Chodat & Hassl.) Croizat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAA, CAN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 3090* (G)].

Croton rutilus (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Sin.: *Julocroton pulcher* Croizat, *Julocroton rutilus* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS); PRY(CAA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5226* (G, UC)].

Croton saltensis Griseb.
Sin.: *Croton saltensis* Griseb. var. *discolor* Griseb.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 400–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Renvoize, S. A. 3461* (SI)].

Croton saltensis Griseb. var. *discolor* Griseb. = **Croton saltensis** Griseb.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b.

[Croton salzmannii (Baill.) G.L. Webster]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton santolinus Baill.
Referencias: Baillon, H. E., 1864.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bonpland, A. J. A. 661* (P)].

Croton sarcopetalus Müll. Arg. = **Croton lachnostachyus** Baill.

Croton scordioides Lam. = **Croton glandulosus** L.

Croton senescens Croizat
Sin.: *Croton fuscus* Müll. Arg. var. *microbracteata* Chodat & Hassl.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAU, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 5098* (NY)].

[Croton serpyllifolius Baill.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton serratifolius Baill.
Sin.: *Croton corrientesianus* Baill., nom. nud., *Croton garckeanus* Baill., *Croton garckeanus* Baill. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval., *Croton garckeanus* Baill. var. *guaraniticus* Chodat & Hassl., *Croton garckeanus* Baill. var. *major* Müll. Arg., *Croton myriadenus* Müll. Arg., *Croton myriadenus* Müll. Arg. f. *abortivus* Müll. Arg., *Croton myriadenus* Müll. Arg. var. *normalis* Müll. Arg., nom. inval., *Croton myriodontus* Müll. Arg., *Croton staechadis* Baill. var. *silvaticus* (Chodat & Hassl.) Croizat
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(COR, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, PAI); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 2243* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13099* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 595* (G)]; URY[*Berro, M. B 4812* (MVFA)].
Notas: Nuevos estudios serán necesarios para corroborar la nueva sinonimia.

Croton serratus (Klotzsch) Müll. Arg.
Sin.: *Croton serratus* (Klotzsch) Müll. Arg. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval., *Croton timandra* Baill., *Timandra serrata* Klotzsch
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 880* (HBR, PACA, US)].

Croton serratus (Klotzsch) Müll. Arg. var. *genuinus* Müll. Arg., nom. inval. = **Croton serratus** (Klotzsch) Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton setiger Hook.
Sin.: *Eremocarpus setiger* (Hook.) Benth.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: CHL(VII, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Matthei, O. R. 1257* (CONC)].

Croton siderophyllus Baill. var. *hirsutus* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Croton venturii** Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b.

Croton silvanus Croizat = **Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry

Croton solanaceus (Müll. Arg.) G.L. Webster
Sin.: *Julocroton humilis* Didr. var. *solanaceus* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Julocroton solanaceus* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Julocroton solanaceus* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *niveus* Chodat & Hassl., *Julocroton typhaecephalus* Croizat
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 7080* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13196* (SI)]; PRY[*Riemel, R. 78* (SI)].

Croton sparsiflorus Morong = **Croton bonplandianus** Baill.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton spissirameus Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton crassirameus* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 559* (GH)]; BRA[*Rambo, B. 53015* (SI)].

Croton splendidus Baill., nom. illeg. = **Croton splendidus** Mart. ex Colla

Croton splendidus Mart. ex Colla
Sin.: *Croton migrans* Casar., *Croton splendidus* Baill., nom. illeg.
Subarbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8184* (MBM)].

Croton staechadis Baill. var. *silvaticus* (Chodat & Hassl.) Croizat = **Croton serratifolius** Baill.

Croton stenandrus Müll. Arg. = **Croton vulnerarius** Baill.

Croton stenotrichus Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Endémica. 900–1100 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reiche, C. F. 13733* (HBR, US)].

Croton subcinerellus Croizat
Sin.: *Croton subcinerellus* Croizat var. *aquidabanensis* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CEN, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6543* (GH)].

Croton subcinerellus Croizat var. *aquidabanensis* Croizat = **Croton subcinerellus** Croizat

[Croton subdioecus (Kuntze) K. Schum.]
Sin.: *Oxydectes subdioeca* Kuntze
Notas: Nombre dudoso, posiblemente conespecífico con *Croton echinulatus* o *C. parvifolius*.

Croton subpannosus Müll. Arg. ex Griseb.
Sin.: *Croton dentosus* Griseb., *Julocroton brittonianum* Morong, *Julocroton serratus* Müll. Arg., *Julocroton subpannosus* Müll. Arg., *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *chacoensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *formosensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *posadensis* Croizat, *Julocroton subpannosus* Müll. Arg. var. *uruguayensis* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L., 1992.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(COA); URY(ART, DUR, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 291* (G)]; PRY[*Schinini, A. 4091* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 966* (GH)].

Croton succiruber D. Parodi = **Croton urucurana** Baill.

[Croton tarapotensis Müll. Arg.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Croton tatacuensis Ahumada = **Croton lanatus** Lam. var. **tatacuensis** (Ahumada) P.E. Berry

Croton tenuissimus Baill., nom. nud. = **Croton uruguayensis** Baill.

Croton thellungianus (Herter ex Arechav.) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton thellungianus* Herter ex Arechav.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Arbusto. Endémica.
Países: URY(TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Berro, M.B. 5870* (MVFA)].

Croton thermarum Müll. Arg. = **Croton lanatus** Lam. var. **astrogynus** (Baill.) P.E. Berry

Croton thymelinus Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1658* (P)].

Croton timandra Baill. = **Croton serratus** (Klotzsch) Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton tragifolius Baill. = **Croton glechomifolius** Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton trichocephalus Müll. Arg. var. *brevifolius* Müll. Arg. = **Croton chamaepitys** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton trichocephalus Müll. Arg. var. *intermedius* Müll. Arg. = **Croton chamaepitys** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton trichocephalus Müll. Arg. var. *rigidus* Müll. Arg. = **Croton lachnostephanus** Baill.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1991.

Croton tricolor Klotzsch ex Baill.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ziller, S. R. 1142* (MBM)].

Croton tricuspidatus Lam. = **Chiropetalum tricuspidatum** (Lam.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Croton triqueter Lam.
Sin.: *Julocroton phagedaenicus* Mart., *Julocroton triqueter* (Lam.) Didr.
Referencias: Cordeiro, I., 1990; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 28976* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 29695* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 4147* (SI)].

Croton troncosoi Ahumada = **Croton gnaphalii** Baill.

Croton tucumanensis Griseb. = **Croton lachnostachyus** Baill.

Croton tucumanensis Griseb. var. *oblongatus* Griseb. = **Croton lachnostachyus** Baill.

Croton urucurana Baill.
Sin.: *Croton dracona* Larrañaga, *Croton succiruber* D. Parodi
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Croizat, L. C. M., 1941b, Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbolito o árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1098* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 51691* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5781* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. s.n.* (MVFA)].

Croton uruguayensis Baill.
Sin.: *Croton coelebogyne* Baill., *Croton gaudichaudii* Baill., *Croton minutiflorus* Müll. Arg., *Croton tenuissimus* Baill., nom. nud.
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999; Bacigalupo, N. M., 2005b; Croizat, L. C. M., 1941b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA); URY(FLO, PAY, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7887* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 11667* (HBR, US)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5385* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1604* (SI)].

Croton vauthieri Müll. Arg. = **Croton macrobothrys** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Croton ventanicolus Speg. = **Croton parvifolius** Müll. Arg.
Referencias: Dawson, G., 1965a.

Croton venturii Croizat
Sin.: *Croton siderophyllus* Baill. var. *hirsutus* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Croton venturii* Croizat var. *cheirotenos* Croizat
Referencias: Ahumada, L. Z., 1999; Croizat, L. C. M., 1941b, 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 392* (GOET)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4556* (GH)].

Croton venturii Croizat var. *cheirotenos* Croizat = **Croton venturii** Croizat

Croton verbascoides G.L. Webster
Sin.: *Julocroton verbascifolius* (Klotzsch) Müll. Arg. var. *angustifolius* Chodat & Hassl.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Webster, G. L., 1992.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 1674* (P)]; PRY[*Hassler, E. 5622* (BM)].

Croton verbenifolius Müll. Arg. = **Croton hirtus** L'Hér.

Croton villosissimus (Chodat & Hassl.) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton villosissimus* Chodat & Hassl.
Referencias: Cordeiro, I., 1990; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Arbusto. Nativa.
Países: ARG(TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CAN); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5714* (BM)].

Croton viridulus (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Julocroton viridulus* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 11318* (GH)].

Croton vulnerarius Baill.
Sin.: *Croton stenandrus* Müll. Arg.
Arbusto o árbol. Nativa. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Souza, J. P. 29* (ESA, MBM)].

Croton yacaensis Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1944a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6804* (GH)].

Croton yerbalium Chodat & Hassl.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Endémica.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5841* (BM)].

Dactylostemon anisandrus Griseb. = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Dactylostemon klotzschii D. Dietr. var. *concepcionis* Chodat & Hassl. = **Actinostemon concepcionis** (Chodat & Hassl.) Hochr.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Dactylostemon klotzschii D. Dietr. var. *heterophyllus* Chodat & Hassl. = **Actinostemon concepcionis** (Chodat & Hassl.) Hochr.

Dactylostemon klotzschii D. Dietr. var. *obtusatus* Chodat & Hassl. = **Actinostemon concepcionis** (Chodat & Hassl.) Hochr.
Referencias: Jablonszky, E., 1969.

Dactylostemon oligandrus Müll. Arg. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Jablonszky, E., 1969.

Dalechampia L.

Número de especies: 22, 7 endémicas, 1 introducida

Dalechampia amambayensis Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia weddelliana** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia angustifolia Mart. ex Pax & K. Hoffm., nom. nud. = **Dalechampia linearis** Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Dalechampia anomala Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4673* (G, K)].
Notas: Citada para Paraná, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Webster & Ambruster, 1991; Govaerts et al., 2000).

Dalechampia bangii Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Dalechampia boliviana* Gand., hom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Zardini, E. M. 53421* (AS, MO)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia (Webster & Ambruster, 1991; Govaerts et al., 2000).

Dalechampia boliviana Gand., hom. illeg. = **Dalechampia bangii** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia caperonioides Baill. var. *lanceolata* Chodat & Hassl., nom. illeg. = **Dalechampia serrula** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Dalechampia clausseniana Baill.
Sin.: *Dalechampia triphylla* Lam. var. *clausseniana* Müll. Arg., *Dalechampia triphylla* Lam. var. *villosa* Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14830* (BR, R, US)].

Dalechampia crenulata Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia micromeria** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia ficifolia Lam.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9260* (HBR, US)].

Dalechampia fimbriata Kunth = **Dalechampia scandens** L.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia glechomifolia Baill.
Sin.: *Dalechampia microphylla* Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C., 1977b; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 28453* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9234* (HBR, R, US)].

Dalechampia grüningiana Pax = **Dalechampia ulmifolia** Chodat & Hassl.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia guaranitica Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Subarbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4334* (G)].

Dalechampia hassleriana Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5852* (G)].

Dalechampia leandrii Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 197* (HBG)].

Dalechampia linearis Baill.
Sin.: *Dalechampia angustifolia* Mart. ex Pax & K. Hoffm., nom. nud., *Dalechampia linearis* Baill. var. *goyazensis* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia linearis* Baill. var. *hilariana* Baill., *Dalechampia linearis* Baill. var. *subintegra* Müll. Arg.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5296a* (BM)].

Dalechampia linearis Baill. var. *goyazensis* Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia linearis** Baill.

Dalechampia linearis Baill. var. *hilariana* Baill. = **Dalechampia linearis** Baill.

Dalechampia linearis Baill. var. *subintegra* Müll. Arg. = **Dalechampia linearis** Baill.

Dalechampia meridionalis Müll. Arg.
Sin.: *Dalechampia pallida* Klotzsch ex Pax & K. Hoffm.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa.
Países: URY(sin localidad).

Dalechampia micromeria Baill.
Sin.: *Dalechampia crenulata* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *angustifolia* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia micromeria* Baill. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg., *Dalechampia sellowiana* Müll. Arg. var. *subintegra* Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Klein, R. M. 9099* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 13265* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 6067* (G)].

Dalechampia micromeria Baill. var. *angustifolia* Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia micromeria** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia micromeria Baill. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval. = **Dalechampia micromeria** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Dalechampia microphylla Müll. Arg. = **Dalechampia glechomifolia** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia morifolia Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia weddelliana** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia pallida Klotzsch ex Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia meridionalis** Müll. Arg.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

[Dalechampia parvula Pax & K. Hoffm.]
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Notas: Nombre dudoso, posiblemente un sinónimo de *Croton glechomiifolia*.

Dalechampia patagonica Pax = **Dalechampia stenosepala** Müll. Arg.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia pentaphylla Lam.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 58469* (CTES)].

Dalechampia reitzkleinii L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5626* (HBR, US)].

Dalechampia riparia L.B. Sm. & Downs
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3834* (HBR, US)].

[Dalechampia rubrivenia Pax & K. Hoffm.]
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Notas: Nombre dudoso.

Dalechampia scandens L.
Sin.: *Dalechampia fimbriata* Kunth, *Dalechampia scandens* L. var. *fimbriata* (Kunth) Müll. Arg.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(CEN, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6698* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 1469* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7231* (G, S)].

Dalechampia scandens L. var. *fimbriata* (Kunth) Müll. Arg. = **Dalechampia scandens** L.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia sellowiana Müll. Arg. = **Dalechampia micromeria** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Dalechampia sellowiana Müll. Arg. var. *subintegra* Müll. Arg. = **Dalechampia micromeria** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia serrula Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Dalechampia caperonioides* Baill. var. *lanceolata* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Subarbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5296* (B, G)].

Dalechampia stenosepala Müll. Arg.
Sin.: *Dalechampia patagonica* Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1364* (SI)]; BRA[*Ritter, M. R. 35359* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5982* (SI)].

Dalechampia stipulacea Müll. Arg.
Sin.: *Dalechampia stipulacea* Müll. Arg. var. *minor* (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C., 1977b; Chodat, R. H., 1901; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Stutz, L. C., 1983; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5043* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 16673* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 1448* (G), *Rojas 1767* (SI), *Stutz, L. C. 990* (G)].

Dalechampia stipulacea Müll. Arg. var. *minor* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Dalechampia stipulacea** Müll. Arg.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia sylvestris S. Moore
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Introducida. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1252* (MO, PY)].

[Dalechampia ternata D. Parodi, hom. illeg.]
Notas: Nombre dudoso.

Dalechampia trichophila Pax & K. Hoffm. = **Dalechampia weddelliana** Baill.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia triphylla Lam.
Referencias: Allem, A. C., 1977b; Fernández Casas, F. J. & Molero Briones, J., 1982.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hagelund, K. 1951* (ICN)]; PRY[*Fernández Casas, F. J. 3578* (G)].

Dalechampia triphylla Lam. var. *clausseniana* Müll. Arg. = **Dalechampia clausseniana** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Dalechampia triphylla Lam. var. *villosa* Müll. Arg. = **Dalechampia clausseniana** Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Dalechampia ulmifolia Chodat & Hassl.
Sin.: *Dalechampia grüningiana* Pax, *Dalechampia ulmifolia* Chodat & Hassl. var. *grüningiana* (Pax) Pax
Referencias: Lourteig, A., 1955[1954]a; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(CAN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3137* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 53018* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 6949* (G, S)].

Dalechampia ulmifolia Chodat & Hassl. var. *grüningiana* (Pax) Pax = **Dalechampia ulmifolia** Chodat & Hassl.
Referencias: Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.

Dalechampia weddelliana Baill.
Sin.: *Dalechampia amambayensis* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia morifolia* Pax & K. Hoffm., *Dalechampia trichophila* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L. & Armbruster, W. S., 1991.
Subarbusto. Nativa. 200–800 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4476* (G)].

Desfontaena tricocca Vell. = **Chiropetalum tricoccum** (Vell.) Chodat & Hassl.
Referencias: Ingram, J. W., 1980.

Ditaxis Vahl ex A. Juss.

Número de especies: 9, 7 endémicas

Ditaxis acaulis Herter ex Arechav.
Sin.: *Argythamnia acaulis* (Herter ex Arechav.) J.W. Ingram
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1957; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(GUA); URY(RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 3807* (SI)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)]; PRY[*Jörgensen, P. 4352* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 15a* (MVM)].

Ditaxis brasiliensis (Klotzsch) Baill. = **Philyra brasiliensis** Klotzsch

Ditaxis breviramea (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia breviramea* Müll. Arg.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 359* (LIL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 8479* (GH)].

Ditaxis catamarcensis (Griseb.) Pax
Sin.: *Aphora catamarcensis* Griseb., *Argythamnia catamarcensis* Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Hieronymus, G. H. E. W., 1882; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b; Steibel, P., 1995.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, LRI, SAL, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 16332* (SI), *Lorentz, P. G. 477* (CORD)].

Ditaxis jablonszkyana Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia jablonszkyana* (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram

Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1957; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 20245* (SI)].

Ditaxis malpighipila (Hicken) L.C. Wheeler
Sin.: *Argythamnia malpighipila* (Hicken) J.W. Ingram, *Croton malpighipilus* Hicken
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1957; Steibel, P., 1995.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, RNE, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Correa, M. N. 8794* (BAB)].

Ditaxis montevidensis (Didr.) Pax
Sin.: *Argythamnia montevidensis* (Didr.) Müll. Arg., *Stenonia montevidensis* Didr.
Referencias: Dawson, G., 1965a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, ERI, FOR, SFE); PRY(APY, APA, PHA); URY(PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 1249* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1737* (SI)]; URY[*Marchesi, E. s.n.* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin mencionar material de referencia (Goevarts et al., 2000).

Ditaxis rhizantha Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia rhizantha* (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Del Puerto, O. s.n.* (MVFA)].

Ditaxis rosularis Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia rosularis* (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); URY(TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Niederlein, G. 87* (*)]; URY[*Arechavaleta, J. 15* (B)].

Ditaxis salina Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Argythamnia salina* (Pax & K. Hoffm.) J.W. Ingram
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1957; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2264* (BA, LIL, SI)]; PRY[*Balansa, B. 3152* (P)].

Dysopsis Baill.

Número de especies: 2 endémicas

Dysopsis gayana Baill. = **Dysopsis glechomoides** (A. Rich.) Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Dysopsis glechomoides (A. Rich.) Müll. Arg.
Sin.: *Dysopsis gayana* Baill., *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., *Hydrocotyle glechomoides* A. Rich., *Molina chilensis* Gay
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(IV, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diem, J. 3010* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (BAA, SI)].

Dysopsis glechomoides (A. Rich.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg. = **Dysopsis glechomoides** (A. Rich.) Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Dysopsis glechomoides (A. Rich.) Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg. = **Dysopsis hirsuta** (Müll. Arg.) Skottsb.
Referencias: Lozano, G. & Murillo A., J., 2001.

Dysopsis hirsuta (Müll. Arg.) Skottsb.
Sin.: *Dysopsis glechomoides* (A. Rich.) Müll. Arg. var. *hirsuta* Müll. Arg.
Referencias: Lozano, G. & Murillo A., J., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IJF).
Ejemplares de referencia: CHL[*Looser, G. 506* (CONC)].

Eremocarpus setiger (Hook.) Benth. = **Croton setiger** Hook.

Euphorbia L.

Número de especies: 83, 35 endémicas, 13 introducidas

Euphorbia acerensis Boiss.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 34705* (SI)].

Euphorbia adenoptera Bertol.
Sin.: *Chamaesyce adenoptera* (Bertol.) Small
Referencias: Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS, SFE); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 972* (LIL)]; PRY[*Comisión argentino-paraguaya de límites 17* (BM)].

[Euphorbia adianthoides Lam.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Euphorbia amandi Oudejans
Sin.: *Euphorbia minuta* Phil., hom. illeg., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr.

Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Oudejans, R. C. H. M., 1989; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 1500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU); CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 31835* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 62* (CONC)].

Euphorbia andina Phil. = **Euphorbia collina** Phil. var. **andina** (Phil.) Subils
Referencias: Correa, M. N., 1988a.

Euphorbia angustifolia D. Parodi, hom. illeg. = **Euphorbia parodii** Oudejans

Euphorbia anomala Salzm. ex Boiss. = **Euphorbia insulana** Vell.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

[Euphorbia antonii Oudejans]
Sin.: *Euphorbia lanceolata* Larrañaga, hom. illeg.
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia araucana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Euphorbia argillosa Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7310* (G)].

Euphorbia aureocincta Croizat = **Euphorbia dentata** Michx.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia berteroana Spreng.
Sin.: *Chamaesyce barberoana* Croizat, *Chamaesyce berteriana* (Spreng.) Millsp.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26271* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7213* (GH, SI)].

Euphorbia besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Anisophyllum besseri* Klotzsch & Garcke
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Endémica.
Países: CHL(sin localidad).
Ejemplares de referencia: CHL[*Besser, W. S. J. G. 144* (B)].

Euphorbia boliviana Rusby = **Euphorbia hypericifolia** L.

Euphorbia brasiliensis Lam. = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia brasiliensis Lam. f. *pruinosa* Chodat = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia brasiliensis Lam. var. *hyssopifolia* (L.) Boiss., nom. illeg. = **Euphorbia hyssopifolia** L.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia brasiliensis Lam. var. *lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb. = **Euphorbia lorentzii** Müll. Arg.

Euphorbia brasiliensis Lam. var. *paraguayensis* Chodat = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia brasiliensis Lam. var. *uniflora* Chodat & Hassl. = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia burkartii Bacigalupo
Referencias: Bacigalupo, N. M., 2005b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2334* (SI)].

Euphorbia caecorum Mart. ex Boiss. = **Euphorbia potentilloides** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Euphorbia caespitosa Lam. var. **caespitosa**
Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *typica* Croizat, nom. inval., *Euphorbia portulacoides* auct. non L.
Referencias: Baillon, H. E., 1864; Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 3836* (CORD)]; URY[*Herter, W. G. F. 171* (SI)].

Euphorbia caespitosa Lam. var. **ventanicola** (Croizat) Subils
Sin.: *Euphorbia caespitosa* Lam. subsp. *ventanicola* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Rentzell, I. 1082* (GH, SI)].

Euphorbia caespitosa Lam. subsp. *typica* Croizat, nom. inval. = **Euphorbia caespitosa** Lam. var. **caespitosa**
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia caespitosa Lam. subsp. *ventanicola* Croizat = **Euphorbia caespitosa** Lam. var. **ventanicola** (Croizat) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia catamarcensis (Croizat) Subils
Sin.: *Chamaesyce catamarcensis* Croizat
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1621* (GH, SI)].

Euphorbia chamaerrhodos Boiss.
Sin.: *Anisophyllum nanum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce chamaerrhodos* (Boiss.) Croizat, *Chamaesyce nana* (Klotzsch & Garcke) M.P. Simmons & W.J. Hayden, *Euphorbia chamaerrhodos* Boiss. var. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Euphorbia macrorrhiza* Glaz., nom. nud., *Euphorbia nana* Klotzsch ex Boiss., nom. nud.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CON, MIE, PAI).
Ejemplares de referencia: BRA[*Allem, A. C. s.n.* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 8498* (BM, G, NY), *Jörgensen, P. 4672* (SI)].

Euphorbia chamaerrhodos Boiss. var. *hirsuta* Chodat & Hassl. = **Euphorbia chamaerrhodos** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Euphorbia characias L.
Referencias: Dawson, G., 1965a.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 10397* (LP)].

Euphorbia chilensis Gay = **Euphorbia portulacoides** L. var. **portulacoides**
Referencias: Dawson, G., 1965a.

Euphorbia chrysophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss. = **Euphorbia collina** Phil. var. **chrysophylla** (Klotzsch & Garcke) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia collina Phil. var. **andina** (Phil.) Subils
Sin.: *Euphorbia andina* Phil., *Euphorbia dasyclada* Dusén, *Euphorbia portulacoides* L. var. *andensis* Croizat
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Correa, M. N., 1988a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR); CHL(VII, IX, XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6184* (LP)]; CHL[*Behn, K. s.n.* (CONC)].

Euphorbia collina Phil. var. **chrysophylla** (Klotzsch & Garcke) Subils
Sin.: *Euphorbia chrysophylla* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 21331* (LP)].

Euphorbia collina Phil. var. **collina**
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Correa, M. N., 1988a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3100 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, SLU); CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33480* (SI)]; CHL[*Looser, G. 3950* (CONC)].

Euphorbia collina Phil. var. **glaucescens** (Chodat & Wilczek) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *glaucescens* Chodat & Wilczek
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–3500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 10209* (SI)].

Euphorbia collina Phil. var. **minor** (Hicken) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *minor* Hicken
Referencias: Marticorena, C., com. pers.; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 125* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 352* (CONC)].

Euphorbia collina Phil. var. **nahuelhuapina** (Croizat) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *nahuelhuapina* Croizat
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 1033* (MERL)].

Euphorbia collina Phil. var. **patagonica** (Hieron.) Subils
Sin.: *Euphorbia patagonica* Hieron.
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TDF).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33006* (SI)].

Euphorbia collina Phil. var. **spathulata** (Chodat & Wilczek) Subils
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *spathulata* Chodat & Wilczek
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE); CHL(XI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33234* (SI)]; CHL[*Hogberg, C. 100* (SI)].

Euphorbia copiapina Phil.
Referencias: Teillier A., S., Zepeda F., H. & García V., P., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (B)].

Euphorbia cordata Larrañaga, hom. illeg. = **Euphorbia cordatella** Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1989.

[Euphorbia cordatella Oudejans]
Sin.: *Euphorbia cordata* Larrañaga, hom. illeg.
Notas: Nombre dudoso.

[Euphorbia correntina D. Parodi]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia cyathophora Murray
Sin.: *Euphorbia heterophylla* L. var. *cyathophora* (Murray) Boiss., *Poinsettia cyathophora* (Murray) Klotzsch & Garcke
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Bacigalupo, N. M., 2005b; Dressler, R. L., 1962; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE); BRA(RGS); CHL(II); PRY(GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 448* (SI)]; BRA[*Schultz 450* (ICN)]; CHL[*Quezada, M. 405* (CONC)]; PRY[*Schinini, A. 5* (SI)].

[Euphorbia damasoi Oudejans]
Sin.: *Euphorbia ovata* Larrañaga, hom. illeg.
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia dasyclada Dusén = **Euphorbia collina** Phil. var. **andina** (Phil.) Subils

Euphorbia davidii Subils
Referencias: Subils, R., 1984.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Subils, R. 3163* (CORD)].
Notas: Mayfield (1997), en una tesis doctoral inédita, asevera que esta especie está introducida en Argentina y es proveniente de Norteamérica y que corresponde a una maleza muy generalizada, conocida anteriormente bajo el nombre de *Euphorbia dentata*. Véanse también comentarios bajo *E. dentata*.

[Euphorbia dendroides L.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Euphorbia dentata Michx.
Sin.: *Euphorbia aureocincta* Croizat, *Poinsettia dentata* (Michx.) Klotzsch & Garcke
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Dressler, R. L., 1962; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SFE, SLU, TUC); PRY(PAI); URY(FLO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schreiter, R. 10990* (GH)]; PRY[*Rojas, T. 3379* (G, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 7304* (MVFA)].
Notas: Según Mayfield (1997) esta especie está restringida a Norteamérica y no es la especie ampliamente distribuida desde allí hasta la Argentina; de acuerdo a este autor la especie sería *Euphorbia davidii*. Mayfield (1997) propuso en su tesis doctoral un nuevo nombre para la especie que Subils (1984) consideró *E. dentata* en la Argentina, pero este nombre no ha sido válidamente publicado hasta la fecha. Desde un punto de vista menos estricto, se podría considerar a un complejo diversificado dentro de *E. dentata*, y para el cual *E. davidii* sería simplemente un sinónimo. Lo que no se sabe con seguridad es si este complejo representa una introducción reciente en el Cono Sur desde Norteamérica por acción del hombre, o si fue el resultado de una ocupación más antigua.

[Euphorbia digestiva Rojas Acosta]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia dioica Hieron., nom. illeg. = **Euphorbia hieronymi** Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia dioica Hieron. f. *parvifolia* Hieron. = **Euphorbia hieronymi** Subils f. **parvifolia** (Hieron.) Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1992.

[Euphorbia diuretica Larrañaga]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia dyctiosperma Fisch. & C.A. Mey. = **Euphorbia spathulata** Lam.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Euphorbia eichleri Müll. Arg.
Sin.: *Chamaesyce eichleri* (Müll. Arg.) Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Roig, F. A. 8402* (MERL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 2170* (GH, SI)].

Euphorbia elodes Boiss.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 3912* (HBR, US)].

Euphorbia elquiensis Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Philippi, F. s.n.* (SGO)].

Euphorbia emarginata (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Anisophyllum emarginatum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce emarginata* (Klotzsch & Garcke) Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a.
Nativa. 0–500 m.
Países: URY(RNO).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 1472* (GH)].

Euphorbia engelmannii Boiss.
Sin.: *Chamaesaracha engelmannii* (Boiss.) Soják, *Euphorbia engelmannii* Boiss. var. *depressa* Boiss., *Euphorbia hortensis* Engelm. ex Boiss., nom. nud., *Euphorbia inclinata* Boiss., nom. nud., *Euphorbia rotundifolia* Hook. & Arn., nom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 900–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VIII, RME).

Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 83317* (CONC)].

Euphorbia engelmannii Boiss. var. *depressa* Boiss.
= **Euphorbia engelmannii** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbia erythrorrhiza (Klotzsch & Garcke) Boiss.
= **Euphorbia papillosa** A. St.-Hil. var. **cabrerae** Subils

Euphorbia evonymocarpa Chodat & Wilczek
= **Euphorbia schickendantzii** Hieron.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia falcata L.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 26712* (CONC)].

Euphorbia germainii Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 1600–3200 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*Jiles, C. 3601* (CONC)].

Euphorbia graminea Jacq.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34854* (SI)].

Euphorbia hassleriana Chodat = **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Euphorbia hebegyne Pax & K. Hoffm. ex Emrich
= **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Euphorbia helioscopia L.
Referencias: Dawson, G., 1965a; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, DFE, LPA, MIS); CHL(I, III, IV, V, IX, X, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2722* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 462* (CONC)].

[Euphorbia herteri Arechav.]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia heterophylla L.
Sin.: *Poinsettia heterophylla* (L.) Klotzsch & Garcke
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Dressler, R. L., 1962; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(CAS, COL, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1299* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 17747* (HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4004* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 17210* (MVFA)].

Euphorbia heterophylla L. var. *cyathophora* (Murray) Boiss. = **Euphorbia cyathophora** Murray
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia hieronymi Subils
Sin.: *Euphorbia dioica* Hieron., nom. illeg., *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p.
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, COR, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Anderson, D. L. 1752* (SI)].

[Euphorbia hieronymi Subils f. parvifolia (Hieron.) Oudejans]
Sin.: *Euphorbia dioica* Hieron. f. *parvifolia* Hieron.
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia hinkleyorum I.M. Johnst.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 4916* (GH)].

Euphorbia hirta L. var. **hirta**
Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp., *Euphorbia pilulifera* auct. non L., *Euphorbia pilulifera* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, IDE); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5082* (SI)]; BRA[*Stienstra, B. H. 185* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3287* (CONC)]; PRY[*Jörgensen, P. 4006* (SI)].

Euphorbia hirta L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Sin.: *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. subsp. *procumbens* (DC.) Croizat, *Chamaesyce hirta* (L.) Millsp. var. *procumbens* (DC.) Moldenke, *Chamaesyce ophthalmica* (Pers.) D.G. Burch, *Euphorbia hirta* L. var. *procumbens* (DC.) N.E. Br., *Euphorbia ophthalmica* Pers., *Euphorbia pilulifera* L. var. *procumbens* (DC.) Boiss., *Euphorbia procumbens* DC.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LPA, SAL, SFE, TUC); BRA(SCA); CHL(I, V); PRY(APY); URY(ART, MON, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 33924* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 7294* (PACA)]; PRY[*Vanni, R. O. 2069* (CTES)]; URY[*Del Puerto, O. 8261* (MVFA)].

Euphorbia hirta L. var. *procumbens* (DC.) N.E. Br. = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Euphorbia hirtella Boiss.
Sin.: *Chamaesyce hirtella* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia hirtella* Boiss. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 62* (SI)]; BRA[*Allem, A. C. s.n.* (ICN)]; URY[*Lombardo, A. 1958* (GH)].

Euphorbia hirtella Boiss. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval. = **Euphorbia hirtella** Boiss.

Euphorbia hortensis Engelm. ex Boiss., nom. nud. = **Euphorbia engelmannii** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbia huanchalana (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Euphorbia huanchalana* (Klotzsch & Garcke) Boiss. subsp. *penazuelensis* Croizat, *Tithymalus huanchalana* Klotzsch & Garcke
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–4300 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 5306* (GH, SI)].

Euphorbia huanchalana (Klotzsch & Garcke) Boiss. subsp. *penazuelensis* Croizat = **Euphorbia huanchalana** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia hunzikeri Subils
Sin.: *Chamaesyce hunzikeri* (Subils) Holub
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1977.
Hierba. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Diers, L. 228* (SI)].

Euphorbia hypericifolia L.
Sin.: *Chamaesyce hypericifolia* (L.) Millsp., *Euphorbia boliviana* Rusby
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, RNE, SAL, SFE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2171* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5684* (FCQ, MO)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o ejemplar de referencia (Govaerts et al., 2000).

Euphorbia hypericifolia L. var. *lasiocarpa* (Klotzsch) Griseb. = **Euphorbia lasiocarpa** Klotzsch

Euphorbia hyssopifolia L.
Sin.: *Chamaesyce brasiliensis* (Lam.) Small, *Chamaesyce hyssopifolia* (L.) Small, *Euphorbia brasiliensis* Lam., *Euphorbia brasiliensis* Lam. f. *pruinosa* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *hyssopifolia* (L.) Boiss., nom. illeg., *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *paraguayensis* Chodat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *uniflora* Chodat & Hassl., *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *paraguayensis* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *pruinosa* (Chodat) Oudejans, *Euphorbia hyssopifolia* L. var. *uniflora* (Chodat & Hassl.) Oudejans
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, COA, PAI); URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cuezzo, A. R. 1250* (LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 14465* (HBR, US)]; PRY[*Woolston, A. L. 378* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1050* (MVFA)].

Euphorbia hyssopifolia L. var. *paraguayensis* (Chodat) Oudejans = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia hyssopifolia L. var. *pruinosa* (Chodat) Oudejans = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia hyssopifolia L. var. *uniflora* (Chodat & Hassl.) Oudejans = **Euphorbia hyssopifolia** L.

Euphorbia inclinata Boiss., nom. nud. = **Euphorbia engelmannii** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbia insulana Vell.
Sin.: *Euphorbia anomala* Salzm. ex Boiss., *Euphorbia insulana* Vell. subsp. *pilcomayense* Croizat, *Euphorbia insulana* Vell. var. *pilcomayensis* (Croizat) Oudejans, *Poinsettia insulana* (Vell.) Klotzsch & Garcke
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 12155* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 8806* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Morong, T. 867* (GH)].

Euphorbia insulana Vell. var. *pilcomayensis* (Croizat) Oudejans = **Euphorbia insulana** Vell.

Euphorbia insulana Vell. subsp. *pilcomayense* Croizat
= **Euphorbia insulana** Vell.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia invaginata Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 7268* (GH)].

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **argentina** (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans
Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb.
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1992; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(VII).
Ejemplares de referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 8211* (SI)]; CHL[*Taylor, C. M. 10951* (SI)].

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **klotzschii**
Sin.: *Anisophyllum ovalifolium* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small var. *montevidensis* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *montevidensis* Boiss., *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss., hom. illeg., *Euphorbia serpens* Kunth var. *montevidensis* (Boiss.) Cabrera
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Croizat, L. C. M., 1943a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Oudejans, R. C. H. M., 1989; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME); PRY(APY, PAI); URY(CAS, MON, PAY, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 609* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 996114* (CONC, SGO)]; PRY[*Mereles, F. 5505* (FCQ)]; URY[*Herter, W. G. F. 74* (SI)].

Euphorbia klotzschii Oudejans var. **schizosepala** (Engelm. ex Boiss.) Oudejans
Sin.: *Euphorbia ovalifolia* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss.
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1992; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU); CHL(VII); URY(COL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2799* (SI)]; CHL[*Taylor, C. M. 11065* (SI)]; URY[*de la Rúa 58* (SI)].

Euphorbia koernerana Allem & Irgang
Sin.: *Chamaesyce koerneriana* (Allem & Irgang) V.S. Raju & P.N. Rao
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Irgang, B. E. s.n.* (ICN)].
Notas: Govaerts et al. (2000) la consideran sinónimo de *Euphorbia rochaensis*.

Euphorbia kurtzii Subils
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1971.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(COR, MIS, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5395* (SI)].

Euphorbia lactiflua Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 376* (SI)].

Euphorbia lanceolata Larrañaga, hom. illeg.
= **Euphorbia antonii** Oudejans

Euphorbia lanceolata Phil., hom. illeg. = **Euphorbia raphilippii** Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1989.

[Euphorbia larranagae Oudejans]
Sin.: *Euphorbia rupestris* Larrañaga, hom. illeg.
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia lasiocarpa Klotzsch
Sin.: *Chamaesyce lasiocarpa* (Klotzsch) Arthur, *Euphorbia hypericifolia* L. var. *lasiocarpa* (Klotzsch) Griseb.
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arenas, P. 2316* (SI)].

Euphorbia lathyrus L.
Sin.: *Tithymalus lathyrus* (L.) Hill
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Dawson, G., 1965a; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, SFE, TUC); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, X, IJF, RME).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ambrosetti, A. s.n.* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)].

Euphorbia lorentzii Müll. Arg.
Sin.: *Chamaesyce lorentzii* (Müll. Arg.) Croizat, *Euphorbia brasiliensis* Lam. var. *lorentzii* (Müll. Arg.) Griseb.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.

Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(sin localidad).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 8357* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 5192a* (GH)].
Notas: Citada para Uruguay sin mencionar localidad (Croizat, 1943a).

Euphorbia lutulenta (Croizat) Oudejans
Sin.: *Chamaesyce lutulenta* Croizat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(FLA).
Ejemplares de referencia: URY[*Rosengurtt, B. 1654* (A)].

Euphorbia macraulonia Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Euphorbia macrorrhiza Glaz., nom. nud. = **Euphorbia chamaerrhodos** Boiss.
Referencias: Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Euphorbia maculata L.
Sin.: *Chamaesyce maculata* (L.) Small, *Chamaesyce supina* (Raf.) Moldenke, *Euphorbia supina* Raf.
Referencias: Bacigalupo, N. M., 2005b; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(III, IV, V, VII, VIII, RME); URY(PAY, RNO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 30520* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 169* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 1831* (SI)].

Euphorbia marayensis Subils
Sin.: *Chamaesyce marayensis* (Subils) Holub
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Endémica. 700–1500 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 3608* (LIL)].

Euphorbia marginata Pursh
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Bacigalupo, N. M., 2005b; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, MEN); BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 2454* (CORD)]; BRA[*Emrich, K. s.n.* (PACA)].

Euphorbia meyeniana Klotzsch
Sin.: *Chamaesyce meyeniana* (Klotzsch) Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: CHL(I); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 2171* (GH)].

Euphorbia minuta Phil., hom. illeg. = **Euphorbia amandi** Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1989.

Euphorbia nana Klotzsch ex Boiss., nom. nud. = **Euphorbia chamaerrhodos** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbia nutans Lag.
Sin.: *Chamaesyce nutans* (Lag.) Small
Referencias: Burch, D. G., 1966.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: ARG(COR, JUJ).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 25* (SI)].

Euphorbia ophthalmica Pers. = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Euphorbia oranensis (Croizat) Subils
Sin.: *Chamaesyce oranensis* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 5555* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4577* (FCQ)].

Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss., hom. illeg. = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1989.

Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *argentina* Müll. Arg. ex Griseb. = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **argentina** (Müll. Arg. ex Griseb.) Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1992.

Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *dentata* R.E. Fr. = **Euphorbia amandi** Oudejans
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *montevidensis* Boiss. = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia ovalifolia (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *schizosepala* Engelm. ex Boiss. = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **schizosepala** (Engelm. ex Boiss.) Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1992.

Euphorbia ovalleana Phil.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (CONC)].

Euphorbia ovata Larrañaga, hom. illeg. = **Euphorbia damasoi** Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1989.

Euphorbia pampeana Speg.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, RNO, PAY, SJO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 4773* (LP)]; BRA[*Pott s.n.* (ICN)]; URY[*Lombardo, A. 1959* (GH)].

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **cabrerae** Subils
Sin.: *Euphorbia erythrorrhiza* (Klotzsch & Garcke) Boiss., *Euphorbia papillosa* A. St.-Hil. var. *erythrorrhiza* (Klotzsch & Garcke) Subils, *Tithymalus erythrorrhizus* Klotzsch & Garcke
Referencias: Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 81* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 491* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 28094* (CTES)].

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. *erythrorrhiza* (Klotzsch & Garcke) Subils = **Euphorbia papillosa** A. St.-Hil. var. **cabrerae** Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia papillosa A. St.-Hil. var. **papillosa**
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(ART, CAS, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 834* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 1657* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4676* (SI)]; URY[*Osten, C. 5412* (SI)].

[Euphorbia paraguayiensis D. Parodi]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia paranensis Dusén
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7390* (MBM, US)].

[Euphorbia parodii Oudejans]
Sin.: *Euphorbia angustifolia* D. Parodi, hom. illeg.
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia patagonica Hieron. = **Euphorbia collina** Phil. var. **patagonica** (Hieron.) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia pedersenii Subils
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1971.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de referencia: ARG[*Ibarrola, T. 2608* (LIL)].

Euphorbia pentadactyla Griseb.
Sin.: *Poinsettia pentadactyla* (Griseb.) Dusén
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Dressler, R. L., 1962; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 10664* (SI)]; PRY[*Rojas 7287* (GH)].

Euphorbia peperomioides Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 900–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 53860* (SI), *Smith, L. B. 11575* (HBR, R, US)].

Euphorbia peplus L.
Sin.: *Tithymalus peplus* (L.) Hill
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Correa, M. N., 1988a; Dawson, G., 1965a; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); URY(MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3156* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5416* (FLOR, HBR, US)]; CHL[*Matthei, O. R. 159* (CONC)]; URY[*Herter, W. G. F. 1182b* (SI)].

Euphorbia philippiana (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Euphorbia pygmaea* Phil., hom. illeg., *Tithymalus philippianus* Klotzsch & Garcke
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO)].

Euphorbia pilulifera auct. non L. = **Euphorbia hirta** L. var. **hirta**

Euphorbia pilulifera L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Euphorbia hirta** L. var. **hirta**
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Euphorbia pilulifera L. var. *procumbens* (DC.) Boiss. = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Euphorbia platyphyllos L.
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, RNE); CHL(V, VI, VII, VIII, RME); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26500* (SI)]; CHL[*Matthei, O. R. 423* (CONC)]; PRY[*Arenas, P. 1511* (SI)].

Euphorbia porphyrantha Phil.
Endémica.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de referencia: CHL[*Werdermann, E. 118* (CONC)].

Euphorbia portucasadiana (Croizat) Subils
Sin.: *Chamaesyce portucasadiana* Croizat
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Denham, S. S. 109* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2152* (GH, SI)].

Euphorbia portulacoides auct. non L. = **Euphorbia caespitosa** Lam. var. **caespitosa**

Euphorbia portulacoides L. var. **acutifolia** Boiss.
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. var. *porphyrantha* Kuntze
Referencias: Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2356* (SI)].

Euphorbia portulacoides L. var. *andensis* Croizat = **Euphorbia collina** Phil. var. **andina** (Phil.) Subils

[Euphorbia portulacoides L. var. bridgesii Boiss.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Euphorbia portulacoides L. var. *glaucescens* Chodat & Wilczek = **Euphorbia collina** Phil. var. **glaucescens** (Chodat & Wilczek) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. var. **major** Müll. Arg.
Sin.: *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR, ERI, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20671* (SI)].

Euphorbia portulacoides L. var. *minor* Hicken = **Euphorbia collina** Phil. var. **minor** (Hicken) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. var. *normalis* Kuntze = **Euphorbia portulacoides** L. var. **portulacoides**

Euphorbia portulacoides L. var. *obtusifolia* Müll. Arg. = **Euphorbia portulacoides** L. var. **portulacoides**
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. var. *porphyrantha* Kuntze = **Euphorbia portulacoides** L. var. **acutifolia** Boiss.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. var. **portulacoides**
Sin.: *Euphorbia chilensis* Gay, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat var. *obtusifolia* (Müll. Arg.) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat, *Euphorbia portulacoides* L. var. *normalis* Kuntze, *Euphorbia portulacoides* L. var. *obtusifolia* Müll. Arg.
Referencias: Dawson, G., 1965a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SFE, TUC); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2100* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 291* (SI)]; URY[*Osten, C. 5597* (SI)].

Euphorbia portulacoides L. var. *spathulata* Chodat & Wilczek = **Euphorbia collina** Phil. var. **spathulata** (Chodat & Wilczek) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

[Euphorbia portulacoides L. var. xanthantha Kuntze]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia portulacoides L. subsp. *collina* (Phil.) Croizat = **Euphorbia collina** Phil. var. **collina**
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. subsp. *major* (Müll. Arg.) Croizat, p.p. = **Euphorbia portulacoides** L. var. **major** Müll. Arg.
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. subsp. *nahuelhuapina* Croizat = **Euphorbia collina** Phil. var. **nahuelhuapina** (Croizat) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Euphorbia portulacoides L. subsp. *normalis* (Kuntze) Croizat = **Euphorbia portulacoides** L. var. **portulacoides**

Euphorbia potentilloides Boiss.
Sin.: *Anisophyllum caecorum* Klotzsch & Garcke, nom. nud., *Anisophyllum caecorum* Mart. ex Boiss., *Chamaesyce caecorum* (Mart. ex Boiss.) Croizat, *Chamaesyce potentilloides* (Boiss.) Croizat, *Euphorbia caecorum* Mart. ex Boiss.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.

Hierba. Perenne. Nativa. 300–1400 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, PAI); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 616* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16450* (MO, NY, S)]; PRY[*Rojas, T. 6339* (A, BAF)]; URY[*Berro, M. B. 1796* (MVFA)].

Euphorbia procumbens DC. = **Euphorbia hirta** L. var. **ophthalmica** (Pers.) Allem & Irgang
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Euphorbia prostrata Aiton
Sin.: *Chamaesyce prostrata* (Aiton) Small
Referencias: Dawson, G., 1965a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 21789* (SI)]; BRA[*Afonso, I. L. 34* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4001* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10396* (MVFA)].

Euphorbia pseudopeplus Speg. = **Euphorbia spathulata** Lam.
Referencias: Correa, M. N., 1988a.

Euphorbia pygmaea Phil., hom. illeg. = **Euphorbia philippiana** (Klotzsch & Garcke) Boiss.

Euphorbia raphilippii Oudejans
Sin.: *Euphorbia lanceolata* Phil., hom. illeg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Oudejans, R. C. H. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (SGO)].

Euphorbia rhabdodes Boiss.
Sin.: *Tithymalus chrysophyllus* Klotzsch & Garcke var. *angustifolius* Klotzsch & Garcke
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Allem, A. C. s.n.* (ICN)].

[Euphorbia rhytisperma (Klotzsch & Garcke) Boiss.]
Sin.: *Anisophyllum rhytispermum* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce rhytisperma* (Klotzsch & Garcke) Soják
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia rochaensis (Croizat) Alonso Paz & Marchesi
Sin.: *Chamaesyce rochaensis* Croizat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(ROC).
Ejemplares de referencia: URY[*Lombardo, A. 2488* (A)].

Euphorbia rotundifolia Hook. & Arn., nom. illeg. = **Euphorbia engelmannii** Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Euphorbia ruiz-lealii Subils
Sin.: *Chamaesyce ruiz-lealii* (Subils) Holub
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cuezzo, A. R. 2906* (LIL)].

Euphorbia rupestris Larrañaga, hom. illeg. = **Euphorbia larranagae** Oudejans
Referencias: Oudejans, R. C. H. M., 1989.

Euphorbia schickendantzii Hieron.
Sin.: *Euphorbia evonymocarpa* Chodat & Wilczek
Referencias: Chiapella, J. & Ezcurra, C., 1999; Correa, M. N., 1988a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Tombesi, T. S. 39* (SI)].

Euphorbia sciadophila Boiss.
Referencias: Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, PAI); URY(ART).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1512* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5090* (HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 3334* (AS, MO)]; URY[*Del Puerto, O. 15233* (MVFA)].

Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Anisophyllum selloi* Klotzsch & Garcke, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat, *Chamaesyce selloi* (Klotzsch & Garcke) Croizat var. *brevisemina* Croizat, *Euphorbia hassleriana* Chodat, *Euphorbia hebegyne* Pax & K. Hoffm. ex Emrich, *Euphorbia selloi* (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *setosa* auct. non Boiss., *Euphorbia setosa* (Boiss.) Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Chodat, R. H., 1901; Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(GUA); URY(ART, CLA, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 822* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 487* (S)]; PRY[*Hassler, E. 1228* (G)]; URY[*Osten, C. 5411* (SI)].

Euphorbia selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss. var. *setosa* auct. non Boiss. = **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Simmons, M. P. & Hayden, W. J., 1997.

Euphorbia serpens Kunth var. **microphylla** Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Bacigalupo, N. M., 2005b; Correa, M. N., 1988a; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, MEN, MIS, NEU, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY); URY(COL, MON, PAY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26991* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 29308* (PACA)]; PRY[*Vanni, R. O. 2206* (CTES)].

Euphorbia serpens Kunth var. *montevidensis* (Boiss.) Cabrera = **Euphorbia klotzschii** Oudejans var. **klotzschii**

Euphorbia serpens Kunth var. **serpens**
Sin.: *Chamaesyce serpens* (Kunth) Small
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Croizat, L. C. M., 1943a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, IV, V, VII, VIII, IX, RME); PRY(APY, PHA); URY(ART, CAS, CLA, FLA, MON, PAY, RIV, RNO, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1252* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 5114* (HBR, US)]; CHL[*Ricardi, M. 3289* (CONC)]; PRY[*Schinini, A. 4008* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 5573* (MVFA)].

Euphorbia serpyllifolia Pers.
Sin.: *Chamaesyce serpyllifolia* (Pers.) Small
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 16973* (CORD)].

Euphorbia setosa (Boiss.) Müll. Arg. = **Euphorbia selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975.

Euphorbia spathulata Lam.
Sin.: *Euphorbia dyctiosperma* Fisch. & C.A. Mey., *Euphorbia pseudopeplus* Speg.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Correa, M. N., 1988a; Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Steibel, P., 1995; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–1700 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, MIS, RNE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CLA, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 3747* (GH)]; BRA[*Smith, L. B. 10410* (HBR, R, US)]; URY[*Lombardo, A. 3903* (GH)].

Euphorbia stenophylla (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Sin.: *Tithymalus stenophyllus* Klotzsch & Garcke
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Subils, R., 1977.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Charpin, A. 20103* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14265* (HBR, US)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1210* (MVFA)].
Notas: Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (Govaerts et al., 2000).

Euphorbia supina Raf. = **Euphorbia maculata** L.

Euphorbia tarapacana Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 100–1300 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. s.n.* (CONC)].

Euphorbia thinophila Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de referencia: CHL[*Marticorena, C. 1671* (CONC)].

Euphorbia thymifolia L.
Sin.: *Chamaesyce thymifolia* (L.) Millsp.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Subils, R., 1977.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Subils, R. 882* (CORD)]; PRY[*Hassler, E. 1426* (G), *Schinini, A. 5da* (SI)].

[Euphorbia urceolophora D. Parodi]
Notas: Nombre dudoso.

Euphorbia verna Phil.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de referencia: CHL[*sin colector s.n.* (*)].

Euphorbia vervoorstii Subils
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Subils, R., 1971.
Hierba. Anual. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 8454* (LIL)].

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. f. *oblongata* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. f. *obovata* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. var. *glandulata* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. var. *klotzschiana* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. var. *montevidensis* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. var. *petiolaris* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. var. *serrata* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria biglandulosa (L.) Müll. Arg. var. *stenophylla* Müll. Arg. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.

Excoecaria bodenbenderi (Kuntze) K. Schum. = **Stillingia bodenbenderi** (Kuntze) D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Excoecaria colliguaya (Bertero ex A. Juss.) Baill. = **Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Excoecaria glauca D. Parodi]
Notas: Nombre dudoso.

Excoecaria haematosperma (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria hippophaifolia Griseb. = **Sebastiania schottiana** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Excoecaria marginata (Baill.) Griseb. = **Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Excoecaria marginata (Baill.) Griseb. var. puberula Griseb.]
Notas: Nombre dudoso.

Excoecaria obovata (Klotzsch ex Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Sapium obovatum** Klotzsch ex Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Excoecaria serrata W.T. Aiton = **Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Excoecaria subsessilis Müll. Arg. = **Sebastiania subsessilis** (Müll. Arg.) Pax

Excoecaria subulata Müll. Arg. = **Sebastiania subulata** (Müll. Arg.) Pax

Gussonia concolor Spreng. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Gussonia discolor Spreng. = **Gymnanthes discolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Gymnanthes Sw.

Número de especies: 2

Gymnanthes angustifolia Müll. Arg. = **Sebastiania schottiana** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Gymnanthes concolor (Spreng.) Müll. Arg. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Jablonszky, E., 1969.

Gymnanthes discolor (Spreng.) Müll. Arg.
Sin.: *Gussonia discolor* Spreng., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg., *Sebastiania discolor* (Spreng.) Müll. Arg. var. *fiebrigii* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1300 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS); PRY(APA, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Johnson, A. E. 896* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1670* (G), *Hassler, E. 1626* (SI)].

Gymnanthes klotzschiana Müll. Arg., nom. superfl. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Gymnanthes marginata Baill. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Gymnanthes nervosa Müll. Arg.
Sin.: *Sebastiania nervosa* (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 7660* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 3094* (FCQ, MO)].
Notas: Citada para Brasil sin mencionar ejemplar de referencia (Goevarts et al., 2000).

Gymnanthes schottiana Müll. Arg. = **Sebastiania schottiana** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Gymnanthes serrata Baill. ex Müll. Arg. = **Sebastiania serrata** (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Gymnanthes ypanemensis Müll. Arg. = **Sebastiania ypanemensis** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Hermesia castaneifolia Willd. = **Alchornea castaneifolia** (Willd.) A. Juss.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Hermesia salicifolia Baill. = **Alchornea castaneifolia** (Willd.) A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Hevea Aubl.

Número de especies: 1

Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.
Sin.: *Siphonia brasiliensis* Willd. ex A. Juss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 37153* (CTES)].

Hippomane biglandulosa L., nom. illeg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Hippomane glandulosa L. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Hydrocotyle glechomoides A. Rich. = **Dysopsis glechomoides** (A. Rich.) Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1942.

Ilex longifolia Nees = **Pachystroma longifolium** (Nees) I.M. Johnst.
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Janipha anisophylla (Griseb.) Müll. Arg. = **Manihot anisophylla** Müll. Arg.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Janipha violacea Griseb. = **Manihot guaranitica** Chodat & Hassl.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Jatropha L.

Número de especies: 27, 16 endémicas, 2 introducidas

Jatropha albomaculata Pax = **Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha albomaculata Pax var. *nana* (Chodat & Hassl.) Pax = **Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha albomaculata Pax var. *stimulosissima* (Chodat & Hassl.) Pax = **Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha albomaculata Pax var. *subcuneata* Pax = **Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha antisyphilitica Speg. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha appendiculata Pax & K. Hoffm. = **Cnidoscolus appendiculatus** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha bornmuelleri Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bornmüller, A. 766* (M)].

Jatropha breviloba (Morong) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Jatropha gossypiifolia* L. var. *breviloba* Morong, *Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill. var. *breviloba* (Morong) Pax
Referencias: Bernardi, L., 1984; Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); PRY(APY, AMA, CEN).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hicken, C. M. 317* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1367* (G), *Kiesling, R. 9740* (G, PY, SI)].

Jatropha campanulata Pax = **Cnidoscolus campanulatus** (Pax) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha chacoana Fern. Casas
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fortunato, R. H., 1988b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schulz, A. G. 17421* (CTES)]; PRY[*Degen, R. 2941* (FCQ, MO)].

Jatropha curcas L.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o arbolito. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); PRY(COA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 10772* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 3650* (G)].

Jatropha dissecta (Chodat & Hassl.) Pax
Sin.: *Jatropha gossypiifolia* L. var. *dissecta* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–400 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4518* (BM)].

Jatropha eglandulosa Pax
Sin.: *Jatropha elliptica* (Pohl) Oken var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8233* (B, MO)].

Jatropha elliptica (Pohl) Oken
Sin.: *Adenoropium ellipticum* Pohl
Hierba. Perenne. Nativa. 200–400 m.
Países: PRY(CAU, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Burkart, A. 18740* (SI)].

Jatropha elliptica (Pohl) Oken var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Jatropha eglandulosa** Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha excisa Griseb.
Sin.: *Jatropha excisa* Griseb. var. *pubescens* Lourteig & O'Donell, *Jatropha excisa* Griseb. var. *viridiflora* Lourteig & O'Donell
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–1700 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1260* (SI)]; PRY[*Kiesling, R. 9607* (PY, SI)].

Jatropha excisa Griseb. var. *pubescens* Lourteig & O'Donell = **Jatropha excisa** Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha excisa Griseb. var. *viridiflora* Lourteig & O'Donell = **Jatropha excisa** Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha flavovirens Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(COR, LRI, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 12472* (MO)]; PRY[*Arenas, P. 1668* (SI)].

Jatropha gossypiifolia L. f. *glabrata* Chodat & Hassl. = **Jatropha intermedia** (Chodat & Hassl.) Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Jatropha gossypiifolia L. f. *latifolia* Chodat & Hassl. = **Jatropha intermedia** (Chodat & Hassl.) Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Jatropha gossypiifolia L. var. *breviloba* Morong = **Jatropha breviloba** (Morong) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha gossypiifolia L. var. *dissecta* Chodat & Hassl. = **Jatropha dissecta** (Chodat & Hassl.) Pax

Jatropha gossypiifolia L. var. **elegans** (Pohl) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 8013* (BM)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar localidad o material de referencia (Govaerts et al., 2000).

Jatropha gossypiifolia L. var. **gossypiifolia**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APY, CAU, CEN, MIE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Bresolin, A. 1214* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Rojas, T. 2177* (SI)].

Jatropha gossypiifolia L. var. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha gossypiifolia L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha gossypiifolia L. var. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Jatropha intermedia** (Chodat & Hassl.) Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Jatropha gossypiifolia L. var. *palmata* Chodat & Hassl. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha gossypiifolia L. var. *rhombifolia* Chodat & Hassl. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha gossypiifolia L. var. *typica* Chodat & Hassl. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.

Jatropha grossidentata Pax & K. Hoffm.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 20207* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1672* (SI)].

Jatropha guaranitica Speg.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4893* (SI)].

Jatropha hassleriana Pax = **Cnidoscolus hasslerianus** (Pax) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha hieronymi Kuntze
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 32265* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1725* (SI)].

Jatropha hippocastanifolia Croizat
Referencias: Fernández Casas, F. J. & Pizarro Domínguez, J. M., 2002; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Duarte 49561* (AS, MO)].

[Jatropha induta Pax]
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979.
Notas: Nombre dudoso.

Jatropha intermedia (Chodat & Hassl.) Pax
Sin.: *Jatropha gossypiifolia* L. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypiifolia* L. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypiifolia* L. var. *intermedia* Chodat & Hassl.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAU, CAA, CAN, COA, ITA, SPE).
Ejemplares de referencia: BRA[*Reitz, P. R. 16540* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 3414* (G), *Schinini, A. 4174* (SI)].

Jatropha isabelliae Müll. Arg.
Sin.: *Jatropha antisyphilitica* Speg., *Jatropha gossypiifolia* L. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypiifolia* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypiifolia* L. var. *palmata* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypiifolia* L. var. *rhombifolia* Chodat & Hassl., *Jatropha gossypiifolia* L. var. *typica* Chodat & Hassl., *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *antisyphilitica* (Speg.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *cuneifolia* Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *palmata* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha isabelliae* Müll. Arg. var. *rhombifolia* (Chodat & Hassl.) Pax, *Jatropha rigidifolia* Pax & K. Hoffm., *Jatropha rigidifolia* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(CAU, CAN, CEN, COA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Belgrano, M. J. 263* (SI, WIS)]; BRA[*Rambo, B. 52996* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 45707* (CTES)].

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var. *antisyphilitica* (Speg.) Pax = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var. *cuneifolia* Pax = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var. *guaranitica* (Chodat & Hassl.) Pax = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var. *palmata* (Chodat & Hassl.) Pax = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha isabelliae Müll. Arg. var. *rhombifolia* (Chodat & Hassl.) Pax = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha katharinae Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9078* (MO)].

Jatropha loasoides Pax = **Cnidoscolus loasoides** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha löfgrenii Pax & K. Hoffm. = **Cnidoscolus urens** (L.) Arthur

Jatropha macrocarpa Griseb.
Sin.: *Jatropha multiflora* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1943.
Arbusto. Endémica. 500–1200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SDE, SLU, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 26560* (SI)].

Jatropha maracayensis Chodat & Hassl. = **Cnidoscolus maracayensis** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha matacensis A. Cast.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR, FOR); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Castellanos, A. 19366* (LIL)]; PRY[*Vavrek, M. 356* (CTES)].

Jatropha multifida L.
Referencias: Bernardi, L., 1984.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7137* (G)].

Jatropha multiflora Pax & K. Hoffm. = **Jatropha macrocarpa** Griseb.
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha palmata Vell. = **Manihot leptopoda** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan

Jatropha paraguayensis Radcl.-Sm. & Govaerts
Sin.: *Jatropha ricinifolia* Pax, hom. illeg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.
Árbol. Endémica. 100–200 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bernardi, L. 20462* (G)].

Jatropha pedersenii Lourteig
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(ITA, MIE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 19413* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 55442* (MO)].

Jatropha peiranoi Lourteig & O'Donell
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.
Arbusto. Endémica. 1700–1900 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Peirano, A. s.n.* (LIL)].

Jatropha puncticulata Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Anisits, J. D. 95* (*)].

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. var. **ambigua** Pax
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Vanni, R. O. 2447* (CTES)].

Jatropha ribifolia (Pohl) Baill. var. *breviloba* (Morong) Pax = **Jatropha breviloba** (Morong) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha ricinifolia Pax, hom. illeg. = **Jatropha paraguayensis** Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Jatropha rigidifolia Pax & K. Hoffm. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha rigidifolia Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm. = **Jatropha isabelliae** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha serrulata Pax & K. Hoffm. = **Cnidoscolus serrulatus** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha subintegra (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm. = **Cnidoscolus subinteger** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha tacumbensis Pax & K. Hoffm.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Insfrán, P. 1117* (CTES)].

Jatropha tenuifolia Pax & K. Hoffm., nom. illeg. = **Cnidoscolus tenuifolius** (Pax & K. Hoffm.) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Jatropha transiens Pax]
Notas: Nombre dudoso.

Jatropha tubulosa Müll. Arg. var. *triloba* Müll. Arg. = **Cnidoscolus tubulosus** (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. **trilobus** (Müll. Arg.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha urens L. = **Cnidoscolus urens** (L.) Arthur
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha urens L. var. *neglecta* (Pohl) Müll. Arg. = **Cnidoscolus urens** (L.) Arthur

Jatropha vitifolia Mill. f. *nana* Chodat & Hassl. = **Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha vitifolia Mill. f. *stimulosissima* Chodat & Hassl. = **Cnidoscolus albomaculatus** (Pax) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha vitifolia Mill. f. *subintegra* Chodat & Hassl. = **Cnidoscolus subinteger** (Pax & K. Hoffm.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Jatropha vitifolia Mill. var. *cnicodendrum* (Griseb.) Pax = **Cnidoscolus vitifolius** (Mill.) Pohl var. **cnicodendrum** (Griseb.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha vitifolia Griseb. var. *grisebachii* Pax = **Cnidoscolus vitifolius** (Mill.) Pohl var. **cnicodendrum** (Griseb.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha vitifolia Mill. var. *repanda* (Griseb.) Pax = **Cnidoscolus tubulosus** (Müll. Arg.) I.M. Johnst. var. **trilobus** (Müll. Arg.) Lourteig & O´Donell
Referencias: Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943.

Jatropha weddelliana Baill.
Referencias: Dehgan, B. & Webster, G. L., 1979; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A., 1955[1954]a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CAU, CON).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 5518* (AS, MO)].

Julocroton ackermannianus Müll. Arg. = **Croton ackermannianus** (Müll. Arg.) G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton argenteus (L.) Didr. = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton brittonianum Morong = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton camporum Chodat & Hassl. = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L., 1992.

Julocroton chodatii Croizat = **Croton chodatii** (Croizat) P.E. Berry

Julocroton cooperianus Croizat = **Croton cooperianus** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton crassirameus Croizat = **Croton spissirameus** Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton doratophylloides Croizat = **Croton doratophylloides** (Croizat) G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton elaeagnoides S. Moore = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton gardneri Müll. Arg. = **Croton argentealbidus** Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton holodiscus Croizat = **Croton holodiscus** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton humilis Didr. = **Croton didrichsenii** G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton humilis Didr. var. *robustior* L.B. Sm. & Downs = **Croton robustior** Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton humilis Didr. var. *solanaceus* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Croton solanaceus** (Müll. Arg.) G.L. Webster

Julocroton integer Chodat = **Croton argenteus** L.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton integer Chodat f. *parvifolia* Chodat & Hassl. = **Croton argenteus** L.

Julocroton linearifolius (Chodat & Hassl.) Croizat = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton lithrifolius Croizat = **Croton didrichsenii** G.L. Webster

Julocroton malvoides Croizat = **Croton malvoides** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton montevidensis Klotzsch ex Müll. Arg. = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton montevidensis Klotzsch ex Müll. Arg. f. *longepetiolata* Chodat & Hassl. = **Croton rupestris** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster

Julocroton montevidensis Klotzsch ex Müll. Arg. var. *linearifolius* Chodat & Hassl. = **Croton argenteus** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton nervosus Baill. = **Croton calonervosus** G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton paniculatus Pax & K. Hoffm. = **Croton flavispicatus** Rusby
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton phagedaenicus Mart. = **Croton triqueter** Lam.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton phyllanthus Chodat & Hassl. = **Croton phyllanthus** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton pulcher Croizat = **Croton rutilus** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton pycnophyllus Schltdl. f. *latifolia* Chodat & Hassl. = **Croton chodatii** (Croizat) P.E. Berry

Julocroton pyrosoma Croizat = **Croton pyrosoma** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton ramboi L.B. Sm. & Downs = **Croton allemii** G.L. Webster
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Webster, G. L., 1992.

Julocroton rupestris Chodat & Hassl. = **Croton rupestris** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton rupestris Chodat & Hassl. var. *velutinus* Chodat & Hassl. = **Croton rupestris** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton rutilus Chodat & Hassl. = **Croton rutilus** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster

Julocroton serratus Müll. Arg. = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton solanaceus (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Croton solanaceus** (Müll. Arg.) G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

[Julocroton solanaceus (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. incisus Croizat]
Notas: Nombre dudoso.

Julocroton solanaceus (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *niveus* Chodat & Hassl. = **Croton solanaceus** (Müll. Arg.) G.L. Webster

Julocroton subpannosus Müll. Arg. = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton subpannosus Müll. Arg. var. *chacoensis* Croizat = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.

Julocroton subpannosus Müll. Arg. var. *formosensis* Croizat = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.

Julocroton subpannosus Müll. Arg. var. *posadensis* Croizat = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.

Julocroton subpannosus Müll. Arg. var. *uruguayensis* Croizat = **Croton subpannosus** Müll. Arg. ex Griseb.

Julocroton thellungianus Herter ex Arechav. = **Croton thellungianus** (Herter ex Arechav.) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton triqueter (Lam.) Didr. = **Croton triqueter** Lam.
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton typhaecephalus Croizat = **Croton solanaceus** (Müll. Arg.) G.L. Webster
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Julocroton valenzuellae (Chodat & Hassl.) Croizat]
Sin.: *Julocroton villosissimus* Chodat & Hassl. var. *valenzuellae* Chodat & Hassl.
Referencias: Webster, G. L., 1992.
Notas: Nombre dudoso. Probable sinónimo de *Croton geraesensis*.

Julocroton velutinus (Chodat & Hassl.) Croizat = **Croton rupestris** (Chodat & Hassl.) G.L. Webster
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Julocroton verbascifolius (Klotzsch) Müll. Arg. var. *angustifolius* Chodat & Hassl. = **Croton verbascoides** G.L. Webster
Referencias: Webster, G. L., 1992.

Julocroton villosissimus Chodat & Hassl. = **Croton villosissimus** (Chodat & Hassl.) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton villosissimus Chodat & Hassl. var. *valenzuellae* Chodat & Hassl. = **Julocroton valenzuellae** (Chodat & Hassl.) Croizat

Julocroton viridulus Croizat = **Croton viridulus** (Croizat) Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Julocroton vulpinus Croizat = **Croton apostolon** Radcl.-Sm. & Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Radcliffe-Smith, A. & Govaerts, R., 1997.

Leptorhachis hastata Klotzsch = **Tragia polyandra** Vell.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Mabea Aubl.

Número de especies: 1

[Mabea fistulifera Mart. subsp. fistulifera]
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Mabea fistulifera Mart. subsp. **robusta**
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Schinini, A. 20595* (CTES)].

[Mabea paniculata Spruce ex Benth.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Manihot Mill.

Número de especies: 18, 5 endémicas, 1 introducida

Manihot anisitsii Pax & K. Hoffm. = **Manihot guaranitica** Chodat & Hassl.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot anisophylla Müll. Arg.
Sin.: *Janipha anisophylla* (Griseb.) Müll. Arg., *Manihot carthagenensis* (Jacq.) Müll. Arg. var. *anisophylla* (Müll. Arg.) Kuntze
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1943; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1225* (GH, LIL, MO, UC, US)]; PRY[*Degen, R. 3019* (FCQ, MO)].

Manihot anomala Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot glabrata* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Manihot langsdorfii* Müll. Arg. var. *glabrata* Chodat & Hassl., *Manihot multiflora* auct. non Pax & Hoffm., *Manihot multiflora* Pax & K. Hoffm., *Manihot pseudoheterophylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot pubescens* Pohl f. *glabrata* Chodat & Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(APY, AMA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Balansa, B. 1715* (G), *Pedersen, T. M. 7542* (SI)].

Manihot anomala Pohl subsp. **pavoniana** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot pavoniana* Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 1690* (BAB, LIL, SI, US)].

Manihot caerulescens Pohl emend. D.J. Rogers & Appan subsp. **macrantha** (Pax & K. Hoffm.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot macrantha* Pax & K. Hoffm., *Manihot speciosa* Chodat & Hassl., nom. illeg.
Referencias: Allem, A. C., 2001; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto o árbol. Endémica. 100–700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5132* (BM, F, N, P, S, UC, W)].

Manihot carthagenensis (Jacq.) Müll. Arg. var. *anisophylla* (Müll. Arg.) Kuntze = **Manihot anisophylla** Müll. Arg.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot cordifolia Pax = **Manihot populifolia** Pax
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot depauperata Pax = **Manihot gracilis** Pohl emend. D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot enneaphylla Pax & K. Hoffm. = **Manihot grahamii** Hook.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Manihot esculenta Crantz
Subarbusto. Introducida. 0–200 m.
Países: PRY(PHA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Arenas, P. 727* (SI)].
Notas: Escapada de cultivo.

Manihot fiebrigii Pax & K. Hoffm. = **Manihot guaranitica** Chodat & Hassl.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot flabellifolia Pohl
Referencias: Allem, A. C., 1977b.
Arbolito. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pivetta, J. 815* (PACA)].

Manihot flabellifolia auct. non Pohl = **Manihot grahamii** Hook.

Manihot glabrata (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Manihot gracilis Pohl emend. D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot depauperata* Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Subarbusto. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 6326b* (A)].

Manihot grahamii Hook.
Sin.: *Manihot enneaphylla* Pax & K. Hoffm., *Manihot flabellifolia* auct. non Pohl, *Manihot lobata* (Chodat & Hassl.) Pax, *Manihot tweedieana* Müll. Arg., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. f. *nana* Chodat & Hassl., *Manihot tweedieana* Müll. Arg. var. *lobata* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, MIE, PAI); URY(ART, CAS, CLA, MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Biganzoli, F. 873* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 45076* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4002* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1192* (MVFA)].

Manihot graminifolia Chodat & Hassl. = **Manihot pentaphylla** Pohl subsp. **graminifolia** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot grandistipula Pax & K. Hoffm. = **Manihot guaranitica** Chodat & Hassl.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot guaranitica Chodat & Hassl.
Sin.: *Janipha violacea* Griseb., *Manihot anisitsii* Pax & K. Hoffm., *Manihot fiebrigii* Pax & K. Hoffm., *Manihot grandistipula* Pax & K. Hoffm., *Manihot recognita* Pax
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lourteig, A. & O´Donell, C. A., 1943; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, COA, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Venturi, S. 669* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4170* (SI)].

Manihot hassleriana Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4576a* (G)].

Manihot hunzikeriana Mart. Crov.
Referencias: Allem, A. C., 1977b; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Martínez Crovetto, R., 1964b; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973; Schinini, A. & López, M. G., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(APA, CAU, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1813* (SI), *Múlgura de Romero, M. E. 2321* (SI)]; BRA[*Hagelund, K. 7822* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 27164* (CTES)].

Manihot inflata Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Subarbusto. Nativa. 0–700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6404* (US)].

Manihot katharinae Pax = **Manihot variifolia** Pax
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot langsdorfii Müll. Arg. var. *glabrata* Chodat & Hassl. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

[Manihot leptopoda (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan]
Sin.: *Jatropha palmata* Vell., *Manihot palmata* (Vell.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Manihot palmata* (Vell.) Müll. Arg. var. *leptoda* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Manihot palmata* (Vell.) Pax
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Manihot lobata (Chodat & Hassl.) Pax = **Manihot grahamii** Hook.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot macrantha Pax & K. Hoffm. = **Manihot caerulescens** Pohl emend. D.J. Rogers & Appan subsp. **macrantha** (Pax & K. Hoffm.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot meeboldii Pax = **Manihot procumbens** Müll. Arg.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot mirabilis Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbolito. Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10711* (BM, F, NY, P, S, UC, W)].

Manihot multiflora auct. non Pax & Hoffm. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Manihot multiflora Pax & K. Hoffm. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

[Manihot neusana Nassar]
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Manihot palmata (Vell.) Pax = **Manihot leptopoda** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan

Manihot palmata (Vell.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval. = **Manihot leptopoda** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan

Manihot palmata (Vell.) Müll. Arg. var. *leptoda* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Manihot leptopoda** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan

Manihot pavoniana Müll. Arg. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **pavoniana** (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot pentaphylla Pohl subsp. **graminifolia** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot graminifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100–700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5172* (BM, G, K, P, W)].

Manihot populifolia Pax
Sin.: *Manihot cordifolia* Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10896* (G)].

Manihot procumbens Müll. Arg.
Sin.: *Manihot meeboldii* Pax, *Manihot procumbens* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1100 m.
Países: PRY(CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 9525* (BM, GH, NY, S, UC, W)].

Manihot procumbens Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Manihot procumbens** Müll. Arg.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot pseudoheterophylla Pax & K. Hoffm. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot pubescens Pohl f. *glabrata* Chodat & Hassl. = **Manihot anomala** Pohl subsp. **glabrata** (Chodat & Hassl.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot pubescens Pohl var. *villosa* (Cham. & Schltdl.) K. Schum. = **Manettia pubescens** Cham. & Schltdl.
Referencias: Chung, I. C., 1968; Delprete, P. G., Smith, L. B. & Klein, R. M., 2005; Macias, L., 1998.

Manihot recognita Pax = **Manihot guaranitica** Chodat & Hassl.

Manihot speciosa Chodat & Hassl., nom. illeg.
= **Manihot caerulescens** Pohl emend. D.J. Rogers & Appan subsp. **macrantha** (Pax & K. Hoffm.) D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot tenella Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Arbusto. Nativa. 600–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Pedersen, T. M. 14675* (MO)].

Manihot tripartita (Spreng.) Müll. Arg. emend. D.J. Rogers & Appan
Sin.: *Manihot tripartita* (Spreng.) Müll. Arg. var. *apaensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Subarbusto. Nativa. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 7955* (BM, F, NY, P, S, UC)].

Manihot tripartita (Spreng.) Müll. Arg. var. *apaensis* Chodat & Hassl. = **Manihot tripartita** (Spreng.) Müll. Arg. emend. D.J. Rogers & Appan
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot tweedieana Müll. Arg. = **Manihot grahamii** Hook.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot tweedieana Müll. Arg. f. *nana* Chodat & Hassl. = **Manihot grahamii** Hook.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot tweedieana Müll. Arg. var. *lobata* Chodat & Hassl. = **Manihot grahamii** Hook.
Referencias: Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.

Manihot variifolia Pax
Sin.: *Manihot katharinae* Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J. & Appan, S., 1973.
Arbusto. Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10897* (G)].

Maprounea Aubl.

Número de especies: 1

Maprounea brasiliensis A. St.-Hil.
Sin.: *Stillingia brasiliensis* (A. St.-Hil.) Baill., *Stillingia hilariana* Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18612* (SI)].

Mercurialis L.

Número de especies: 1 introducida

Mercurialis annua L.
Referencias: Dawson, G., 1965a; Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942; Moore, D. M., 1968.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, TDF); CHL(V).
Ejemplares de referencia: ARG[*Parodi, L. R. s.n.* (BAA)]; CHL[*Jaffuel, F. 1759* (CONC)].

Microstachys A. Juss.

Número de especies: 2

Microstachys corniculata (Vahl) Griseb.
Sin.: *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg., *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg. var. *hassleriana* Chodat, *Tragia corniculata* Vahl
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 5835* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Jörgensen, P. 4673* (SI)].

Microstachys hispida (Mart.) Govaerts
Sin.: *Cnemidostachys hispida* Mart., *Sebastiania corniculata* (Vahl) Müll. Arg. var. *paraguayensis* Chodat, *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax, *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *aspera* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *graciliramea* Pax & K. Hoffm., *Sebastiania hispida* (Mart.) Pax var. *paraguayensis* (Chodat) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COR, COS, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAA, CAN, CON, COA, ITA, PHA, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2066* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 2846* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3292* (SI)].

Microstachys ramosissima A. St.-Hil. = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

[Microstachys serrulata (Mart.) Müll. Arg.]
Notas: Nombre dudoso.

Molina chilensis Gay = **Dysopsis glechomoides** (A. Rich.) Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Omphalea glandulata Vell. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

[Ophthalmoblapton crassipes Müll. Arg.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto. Citada para Santa Catarina, Brasil, sin indicar localidad o material de referencia (Govaerts et al., 2000).

Oxydectes hauthalii Kuntze = **Astraea hauthalii** (Kuntze) P.E. Berry

Oxydectes subdioeca Kuntze = **Croton subdioecus** (Kuntze) K. Schum.

Pachystroma Müll. Arg.

Número de especies: 1

Pachystroma ilicifolium Müll. Arg. = **Pachystroma longifolium** (Nees) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Pachystroma ilicifolium Müll. Arg. var. *ellipticum* Müll. Arg. = **Pachystroma longifolium** (Nees) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Pachystroma longifolium (Nees) I.M. Johnst.
Sin.: *Ilex longifolia* Nees, *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg., *Pachystroma ilicifolium* Müll. Arg. var. *ellipticum* Müll. Arg., *Pachystroma longifolium* (Nees) I.M. Johnst. var. *ellipticum* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Allem, A. C., 1977c; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Árbol. Nativa. 0-400 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Sehnem, A. 2433* (SI)].

Pachystroma longifolium (Nees) I.M. Johnst. var. *ellipticum* (Müll. Arg.) L.B. Sm. & Downs = **Pachystroma longifolium** (Nees) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Pausandra Radlk.

Número de especies: 1

Pausandra morisiana (Casar.) Radlk.
Sin.: *Thouinia morisiana* Casar.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 35233* (SI)].

Pera Mutis

Número de especies: 3

Pera ferruginea (Schott) Müll. Arg.
Sin.: *Peridium ferrugineum* Schott, *Peridium oblongifolium* Benth.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Pabst, G. F. J. 164* (*)].

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.
Sin.: *Peridium glabratum* Schott
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Krapovickas, A. 43538* (CTES)].

Pera obovata (Klotzsch) Baill.
Sin.: *Peridium obovatum* Klotzsch
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Árbol. Nativa. 300–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Smith, L. B. 14619* (HBR, R, US)].

Peridium ferrugineum Schott = **Pera ferruginea** (Schott) Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Peridium glabratum Schott = **Pera glabrata** (Schott) Poepp. ex Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Peridium oblongifolium Benth. = **Pera ferruginea** (Schott) Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Peridium obovatum Klotzsch = **Pera obovata** (Klotzsch) Baill.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Philyra Klotzsch

Número de especies: 1

Philyra brasiliensis Klotzsch
Sin.: *Argythamnia brasiliensis* (Klotzsch) Müll. Arg., *Ditaxis brasiliensis* (Klotzsch) Baill.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Ingram, J. W., 1980; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a; Tressens, S. G., 1981.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5471* (SI)]; PRY[*Gentry, A. H. 51884* (SI)].

Podostachys lundianus Didr. = **Croton lundianus** (Didr.) Müll. Arg.

Poinsettia cyathophora (Murray) Klotzsch & Garcke = **Euphorbia cyathophora** Murray
Referencias: Subils, R., 1977.

Poinsettia dentata (Michx.) Klotzsch & Garcke = **Euphorbia dentata** Michx.
Referencias: Subils, R., 1977.

Poinsettia heterophylla (L.) Klotzsch & Garcke = **Euphorbia heterophylla** L.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Subils, R., 1977.

Poinsettia insulana (Vell.) Klotzsch & Garcke = **Euphorbia insulana** Vell.
Referencias: Dressler, R. L., 1962; Subils, R., 1977.

Poinsettia pentadactyla (Griseb.) Dusén = **Euphorbia pentadactyla** Griseb.

Polyboea lorentzii (Müll. Arg.) Griseb. = **Bernardia multicaulis** Müll. Arg.

Ricinella membranifolia Müll. Arg. var. *spinosa* Chodat & Hassl. = **Adelia spinosa** (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Ricinocarpus amblyodontus (Müll. Arg.) Kuntze = **Acalypha amblyodonta** (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Ricinocarpus boliviensis (Müll. Arg.) Kuntze = **Acalypha boliviensis** Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Ricinocarpus brasiliensis (Müll. Arg.) Kuntze = **Acalypha brasiliensis** Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Ricinocarpus cordifolius (Griseb.) Kuntze, nom. illeg. = **Acalypha plicata** Müll. Arg.

Ricinocarpus cordobensis (Müll. Arg.) Kuntze = **Acalypha communis** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Ricinocarpus glandulosus Kuntze = **Acalypha hassleriana** Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Ricinocarpus gracilis (Spreng.) Kuntze = **Acalypha gracilis** Spreng.

Ricinocarpus multicaulis (Müll. Arg.) Kuntze = **Acalypha multicaulis** Müll. Arg.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Ricinocarpus poiretii (Spreng.) Kuntze = **Acalypha poiretii** Spreng.
Referencias: Lourteig, A. & O'Donell, C. A., 1942.

Ricinocarpus senilis (Baill.) Kuntze = **Acalypha senilis** Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Ricinocarpus vellameus (Baill.) Kuntze = **Acalypha vellamea** Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Ricinocarpus villosus (Jacq.) Kuntze = **Acalypha villosa** Jacq.

Ricinus L.

Número de especies: 1 introducida

Ricinus communis L.
Sin.: *Ricinus communis* L. var. *americana* Müll. Arg.
Referencias: Chodat, R. H., 1901; Dawson, G., 1965a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, COS, DFE, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VIII, IJF, RME); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI); URY(MON).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 1168* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 10502* (HBR, US)]; CHL[*Ricardi, M. 3632* (CONC)]; PRY[*Arenas, P. 524* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 5921* (MVFA)].

Ricinus communis L. var. *americana* Müll. Arg. = **Ricinus communis** L.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Romanoa Trevis.

Número de especies: 1

Romanoa tamnoides (A. Juss.) Radcl.-Sm.
Sin.: *Anabaena tamnoides* A. Juss., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax & K. Hoffm., *Anabaenella tamnoides* (A. Juss.) Pax & K. Hoffm. var. *genuina* Pax & K. Hoffm., nom. inval.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 200–700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Bacigalupo, N. M. 1159* (SI)].

Sapium P. Browne

Número de especies: 3

Sapium aucuparium Jacq. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium aucuparium Jacq. var. *petiolare* (Müll. Arg.) Griseb. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

Sapium aucuparium Jacq. var. *salicifolium* (Kunth) Griseb. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

Sapium aucuparium Jacq. var. *stenophyllum* (Müll. Arg.) Griseb. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.

[Sapium balansae D. Parodi]
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Kruijt, R. C., 1996.
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Sebastiania*.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg., p.p. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. f. *longifolium* (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. f. *oblongatum* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. f. *obovatum* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. var. *aucuparium* (Jacq.) Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. var. *klotzschinaum* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. var. *longifolium* Müll. Arg. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. var. *serratum* Müll. Arg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg. var. *stenophyllum* Müll. Arg. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.

Sapium bodenbenderi Kuntze = **Stillingia bodenbenderi** (Kuntze) D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Sapium cremostachyum (Baill.) I.M. Johnst. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium cupuliferum Hemsl. = **Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Sapium fragile Pax & K. Hoffm. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium gibertii Hemsl. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium glandulatum (Müll. Arg.) Pax = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium glandulosum (L.) Morong
Sin.: *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. f. *oblongata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. f. *obovata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *glandulata* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *klotzschiana* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *montevidensis* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *petiolaris* Müll. Arg., *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *serrata* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Hippomane biglandulosa* L., nom. illeg., *Hippomane glandulosa* L., *Omphalea glandulata* Vell., *Sapium aucuparium* Jacq., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *petiolare* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *salicifolium* (Kunth) Griseb., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *oblongatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *obovatum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *aucuparium* (Jacq.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *klotzschinaum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *serratum* Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg., p.p., *Sapium cremostachyum* (Baill.) I.M. Johnst., *Sapium fragile* Pax & K. Hoffm., *Sapium glandulatum* (Müll. Arg.) Pax, *Sapium haematospermum* Müll. Arg. var. *saltensis* O'Donell & Lourteig, *Sapium klotzschianum* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium montevidense* Klotzsch ex Baill., *Sapium muelleri* Hemsl., *Sapium paranaense* Pax & K. Hoffm., *Sapium salicifolium* Kunth, *Sapium saltense* (O´Donell ex Lourteig) Jabl., nom. illeg., *Stillingia cremostachya* Baill.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Chodat, R. H., 1901; Croizat, L. C. M., 1943a; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Kruijt, R. C., 1996; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(CAT, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, COA, ITA); URY(MON, ROC, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7593* (SI)]; BRA[*Klein, R. M. 7626* (FLOR, HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 1365* (G), *Stutz, L. C. 1706* (G)]; URY[*Sellow, F. s.n.* (G, NY)].

Sapium haematospermum Müll. Arg.
Sin.: *Excoecaria biglandulosa* (L.) Müll. Arg. var. *stenophylla* Müll. Arg., *Excoecaria haematosperma* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium aucuparium* Jacq. var. *stenophyllum* (Müll. Arg.) Griseb., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. f. *longifolium* (Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium biglandulosum* (L.) Müll. Arg. var. *longifolium* Müll. Arg., *Sapium*

biglandulosum (L.) Müll. Arg. var. *stenophyllum* Müll. Arg., *Sapium gibertii* Hemsl., *Sapium haematospermum* Müll. Arg. f. *arborea* Chodat & Hassl., *Sapium linearifolium* Hemsl., *Sapium longifolium* (Müll. Arg.) Huber, *Sapium rojasi* H. Lév., *Sapium stenophyllum* (Müll. Arg.) Huber, *Stillingia sylvatica* L. var. *paraguayensis* Morong
Referencias: Bernardi, L., 1984; Chodat, R. H., 1901; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Kruijt, R. C., 1996; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942b.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(MON, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1743* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3980* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 700* (SI)].

Sapium haematospermum Müll. Arg. f. *arborea* Chodat & Hassl. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium haematospermum Müll. Arg. var. *saltensis* O'Donell & Lourteig = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

Sapium hasslerianum Huber, nom. illeg. = **Sapium obovatum** Klotzsch ex Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium klotzschianum (Müll. Arg.) Huber = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium linearifolium Hemsl. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium longifolium (Müll. Arg.) Huber = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.

Sapium marginatum Müll. Arg. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl. = **Sapium obovatum** Klotzsch ex Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium montevidense Klotzsch ex Baill. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium muelleri Hemsl. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium obovatum Klotzsch ex Müll. Arg.
Sin.: *Excoecaria obovata* (Klotzsch ex Müll. Arg.) Müll. Arg., *Sapium hasslerianum* Huber, nom. illeg., *Sapium marginatum* Müll. Arg. var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Sapium obovatum* Klotzsch ex Müll. Arg. var. *ellipticum* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Kruijt, R. C., 1996.
Arbusto. Nativa. 100–700 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4926* (BM, G, K, NY, P)].

Sapium obovatum Klotzsch ex Müll. Arg. var. *ellipticum* Chodat & Hassl. = **Sapium obovatum** Klotzsch ex Müll. Arg.
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium paranaense Pax & K. Hoffm. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium patagonicum (Speg.) D.J. Rogers = **Stillingia patagonica** (Speg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Esser, H. J., 2001.

Sapium rojasi H. Lév. = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sapium salicifolium Kunth = **Sapium glandulosum** (L.) Morong

Sapium salpingadenium Müll. Arg. = **Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Sapium salpingadenium Müll. Arg. var. *salicina* Chodat & Hassl. = **Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Sapium saltense (O´Donell ex Lourteig) Jabl., nom. illeg. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Sapium stenophyllum (Müll. Arg.) Huber = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.

Sapium subsessile Hemsl. = **Stillingia bodenbenderi** (Kuntze) D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Sapium subulatum (Müll. Arg.) Chodat & Hassl. = **Sebastiania subulata** (Müll. Arg.) Pax
Referencias: Bernardi, L., 1984.

[Sapium subulatum (Müll. Arg.) Chodat & Hassl. var. virgata Chodat & Hassl.]
Referencias: Bernardi, L., 1984; Kruijt, R. C., 1996.
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Stillingia*.

[Sapium tenellum Pax & K. Hoffm.]
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Stillingia*.

Sebastiania Spreng.

Número de especies: 13, 3 endémicas

Sebastiania anisandra (Griseb.) Lillo = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania argutidens Pax & K. Hoffm.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de referencia: BRA[*Klein, R. M. 774* (HBR, US)].

Sebastiania brasiliensis Spreng.
Sin.: *Actinostemon anisandrus* (Griseb.) Pax, *Actinostemon luquense* Morong, *Dactylostemon anisandrus* Griseb., *Microstachys ramosissima* A. St.-Hil., *Sebastiania anisandra* (Griseb.) Lillo, *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *genuina* Pax, nom. inval., *Sebastiania brasiliensis* Spreng. var. *ramosissima* (A. St.-Hil.) Müll. Arg.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Croizat, L. C. M., 1941a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1912a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(MAL, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7098* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 35732* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5391* (SI)]; URY[*Osten, C. 5263* (SI)].

Sebastiania brasiliensis Spreng. var. *genuina* Pax, nom. inval. = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Sebastiania brasiliensis Spreng. var. *ramosissima* (A. St.-Hil.) Müll. Arg. = **Sebastiania brasiliensis** Spreng.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Sin.: *Gymnanthes klotzschiana* Müll. Arg., nom. superfl., *Gymnanthes marginata* Baill., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *brachyclada* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *trichoneura* Müll. Arg., *Sebastiania klotzschiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg., nom. superfl., *Stillingia commersoniana* Baill.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, COA, PAI); URY(DUR, MAL, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2901* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 27195* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 12359* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1014* (SI)].

Sebastiania corniculata (Vahl) Müll. Arg. = **Microstachys corniculata** (Vahl) Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania corniculata (Vahl) Müll. Arg. var. *hassleriana* Chodat = **Microstachys corniculata** (Vahl) Griseb.

Sebastiania corniculata (Vahl) Müll. Arg. var. *paraguayensis* Chodat = **Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania discolor (Spreng.) Müll. Arg. = **Gymnanthes discolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania discolor (Spreng.) Müll. Arg. var. *fiebrigii* Pax & K. Hoffm. = **Gymnanthes discolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania edwalliana Pax & K. Hoffm.
Referencias: Bernardi, L., 1984.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Rojas, T. 1915* (G)].

Sebastiania grandifolia (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Sebastiania serrata** (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Sebastiania hippophaifolia (Griseb.) Pax & K. Hoffm. = **Sebastiania schottiana** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Sebastiania hispida (Mart.) Pax = **Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania hispida (Mart.) Pax var. *aspera* Pax & K. Hoffm. = **Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania hispida (Mart.) Pax var. *graciliramea* Pax & K. Hoffm. = **Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania hispida (Mart.) Pax var. *paraguayensis* (Chodat) Pax = **Microstachys hispida** (Mart.) Govaerts
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

[Sebastiania jacobensis Müll. Arg.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg., nom. superfl. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Bernardi, L., 1984; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *brachyclada* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *genuina* Müll. Arg., nom. inval. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Sebastiania klotzschiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *trichoneura* Müll. Arg. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Sebastiania longispicata Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 200–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 10612* (SI)].

Sebastiania nervosa (Müll. Arg.) Müll. Arg. = **Gymnanthes nervosa** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Sebastiania pachyphylla Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 4350* (BM)].

[Sebastiania pachystachys (Klotzsch) Müll. Arg.]
Sin.: *Adenogyne pachystachya* Klotzsch
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Sebastiania pusilla Croizat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de referencia: URY[*Del Puerto, O. 14465* (MVFA)].

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Sin.: *Excoecaria hippophaifolia* Griseb., *Gymnanthes angustifolia* Müll. Arg., *Gymnanthes schottiana* Müll. Arg., *Sebastiania hippophaifolia* (Griseb.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania schottiana* (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *angustifolia* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAN, PAI); URY(PAY, RIV, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1185* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 40130* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 13229* (FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 1004* (SI)].

Sebastiania schottiana (Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *angustifolia* (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. = **Sebastiania schottiana** (Müll. Arg.) Müll. Arg.

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.
Sin.: *Gymnanthes serrata* Baill. ex Müll. Arg., *Sebastiania grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Sebastiania serrata* (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAA, CEN, COA, PAI); URY(COL, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 1076* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 28468* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 3920* (MO)]; URY[*Grela, I. 1080* (MVJB)].

Sebastiania serrata (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Sebastiania serrata** (Baill. ex Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Sebastiania serrulata (Mart.) Müll. Arg.
Sin.: *Cnemidostachys serrulata* Mart.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(AMA, ITA, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 951* (BAB)]; URY[*Berro, M. B. 1670* (MVFA)].

Sebastiania subsessilis (Müll. Arg.) Pax
Sin.: *Excoecaria subsessilis* Müll. Arg.
Referencias: O'Donell, C. A. & Lourteig, A., 1942a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2041* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19718* (MBM)]; PRY[*Jörgensen, P. 4671* (SI)].

Sebastiania subulata (Müll. Arg.) Pax
Sin.: *Excoecaria subulata* Müll. Arg., *Sapium subulatum* (Müll. Arg.) Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Basualdo, I. 1614* (FCQ)].

Sebastiania ypanemensis (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Sin.: *Gymnanthes ypanemensis* Müll. Arg., *Stillingia ypanemensis* (Müll. Arg.) Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 33* (BM)].

Siphonia brasiliensis Willd. ex A. Juss. = **Hevea brasiliensis** (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Spegazziniophytum patagonicum (Speg.) Esser = **Stillingia patagonica** (Speg.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Wurdack, K. J., Hoffmann, P. & Chase, M. W., 2005.

Stenonia montevidensis Didr. = **Ditaxis montevidensis** (Didr.) Pax
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Stillingia Garden ex L.

Número de especies: 7, 3 endémicas

Stillingia bodenbenderi (Kuntze) D.J. Rogers
Sin.: *Excoecaria bodenbenderi* (Kuntze) K. Schum., *Sapium bodenbenderi* Kuntze, *Sapium subsessile* Hemsl.
Referencias: Belgrano, M. J. & Pozner, R., 2005; Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J., 1951.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(COR); BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. 29652* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13179* (SI)].

Stillingia brasiliensis (A. St.-Hil.) Baill. = **Maprounea brasiliensis** A. St.-Hil.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Stillingia commersoniana Baill. = **Sebastiania commersoniana** (Baill.) L.B. Sm. & Downs
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Stillingia concolor (Spreng.) Baill. = **Actinostemon concolor** (Spreng.) Müll. Arg.
Referencias: Jablonszky, E., 1969.

Stillingia cremostachya Baill. = **Sapium glandulosum** (L.) Morong
Referencias: Kruijt, R. C., 1996.

Stillingia dusenii Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J., 1951.
Subarbusto. Endémica. 700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10440* (MO, S)].

Stillingia glandulosa Dombey ex Baill. = **Adenopeltis serrata** (W.T. Aiton) I.M. Johnst.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Stillingia hilariana Baill. = **Maprounea brasiliensis** A. St.-Hil.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Stillingia oppositifolia Baill. ex Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Rogers, D. J., 1951.
Arbusto o árbol. Nativa. 600–1000 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de referencia: BRA[*Rambo, B. 46236* (SI)].

Stillingia patagonica (Speg.) Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Colliguaja patagonica* Speg., *Sapium patagonicum* (Speg.) D.J. Rogers, *Spegazziniophytum patagonicum* (Speg.) Esser
Referencias: Correa, M. N., 1988a; Esser, H. J., 2001; Rogers, D. J., 1951.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Boelcke, O. 15802* (SI)].

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber
Sin.: *Sapium cupuliferum* Hemsl., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg., *Sapium salpingadenium* Müll. Arg. var. *salicina* Chodat & Hassl., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *cupulifera* (Hemsl.) Pax, *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *salicina* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Pax, F. A. & Hoffmann, K., 1912b; Rogers, D. J., 1951.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); PRY(AMA, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Arbo, M. M. 2179* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3985* (SI)].

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber var. *angustior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber var. *cupulifera* (Hemsl.) Pax = **Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber var. *elliptica* Pax & K. Hoffm. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber var. *salicina* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Stillingia salpingadenia** (Müll. Arg.) Huber
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia salpingadenia (Müll. Arg.) Huber subsp. *saxatilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia saxatilis Müll. Arg. f. *angustior* Chodat & Hassl. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia saxatilis Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Stillingia saxatilis Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia saxatilis Müll. Arg. var. *salicifolia* Chodat & Hassl. = **Stillingia scutellifera** D.J. Rogers
Referencias: Rogers, D. J., 1951.

Stillingia scutellifera D.J. Rogers
Sin.: *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber subsp. *saxatilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *angustior* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *elliptica* Pax & K. Hoffm., *Stillingia salpingadenia* (Müll. Arg.) Huber var. *grandifolia* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *angustior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. f. *latior* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Stillingia saxatilis* Müll. Arg. var. *salicifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Rogers, D. J., 1951.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, CAA, CAN, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 27570* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 4360* (F, GH, S)].

Stillingia sylvatica L. var. *paraguayensis* Morong = **Sapium haematospermum** Müll. Arg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Stillingia ypanemensis (Müll. Arg.) Baill. = **Sebastiania ypanemensis** (Müll. Arg.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Stillingia yungasensis Belgrano & Pozner
Referencias: Belgrano, M. J. & Pozner, R., 2005.
Arbusto o arbolito. Nativa. 1200–2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Morrone, O. 2336* (CTES, MO, MU, SI)].

Tetrorchidium Poepp.

Número de especies: 2

Tetrorchidium dusenii Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(APY).
Ejemplares de referencia: BRA[*Hatschbach, G. 45303* (MO)]; PRY[*Brunner, D. R. 1911* (MO, PY)].

Tetrorchidium rubrivenium Poepp.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Eskuche, U. G., 1989; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schinini, A. 5969* (CTES)]; BRA[*Smith, L. B. 14910* (HBR, R, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 48999* (AS, MO)].

Thouinia morisiana Casar. = **Pausandra morisiana** (Casar.) Radlk.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Timandra serrata Klotzsch = **Croton serratus** (Klotzsch) Müll. Arg.
Referencias: Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Tithymalus chrysophyllus Klotzsch & Garcke = **Euphorbia collina** Phil. var. **chrysophylla** (Klotzsch & Garcke) Subils
Referencias: Subils, R., 1977.

Tithymalus chrysophyllus Klotzsch & Garcke var. *angustifolius* Klotzsch & Garcke = **Euphorbia rhabdodes** Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Tithymalus erythrorrhizus Klotzsch & Garcke = **Euphorbia papillosa** A. St.-Hil. var. **cabrerae** Subils

Tithymalus huanchalana Klotzsch & Garcke = **Euphorbia huanchalana** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Subils, R., 1977.

Tithymalus lathyrus (L.) Hill = **Euphorbia lathyrus** L.

Tithymalus peplus (L.) Hill = **Euphorbia peplus** L.
Referencias: Correa, M. N., 1988a.

Tithymalus philippianus Klotzsch & Garcke = **Euphorbia philippiana** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000.

Tithymalus stenophyllus Klotzsch & Garcke = **Euphorbia stenophylla** (Klotzsch & Garcke) Boiss.
Referencias: Allem, A. C. & Irgang, B. E., 1975; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Tragia L.

Número de especies: 17, 6 endémicas

Tragia adenophylla Pax & K. Hoffm. var. *ferrugienea* Pax & K. Hoffm. = **Tragia chlorocaulon** Baill.
Referencias: Múlgura, M. E., 1990.

Tragia adenophylla Pax & K. Hoffm. var. *mollis* Pax & K. Hoffm. = **Tragia chlorocaulon** Baill.
Referencias: Múlgura, M. E., 1990.

Tragia alienata (Didr.) Múlgura & M.M. Gut.
Sin.: *Bia alienata* Didr., *Bia sellowiana* Baill. ex Müll. Arg., *Tragia cissoides* Müll. Arg., *Tragia sellowiana* (Baill.) Müll. Arg.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAA, CAN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Romanczuk, M. C. 591* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1812* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 854* (G)].

Tragia arechavaletae Herter ex Arechav. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**
Referencias: Allem, A. C., 1980; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

[Tragia arechavaletae Herter ex Arechav. var. cordifolia Herter ex Arechav.]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso.

[Tragia arechavaletae Herter ex Arechav. var. rotundifolia Herter ex Arechav.]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso, probablemente deba ubicarse en el género *Argythamnia*.

Tragia bahiensis Müll. Arg.
Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *flexuosa* Pax & K. Hoffm., *Tragia depauperata* Pax & K. Hoffm., *Tragia emrichii* Herter, *Tragia lagoensis* Müll. Arg.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, ERI, SDE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CON); URY(RIV).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 480* (SI)]; BRA[*Henz, E. 35678* (SI), *Rambo, B. 28153* (LIL, PACA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4754* (G)]; URY[*Borsani 2494* (MVFA)].

Tragia bahiensis Müll. Arg. var. *flexuosa* Pax & K. Hoffm. = **Tragia bahiensis** Müll. Arg.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia bahiensis Müll. Arg. var. *subsessilis* Chodat & Hassl. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **discolor** Chodat & Hassl.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia bangii Rusby = **Tragia melochioides** Griseb.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia caperonioides Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1907* (G, K)].

[Tragia catamarcensis Pax & K. Hoffm.]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Tragia dodecandra*.

Tragia chlorocaulon Baill.
Sin.: *Tragia adenophylla* Pax & K. Hoffm. var. *ferrugienea* Pax & K. Hoffm., *Tragia adenophylla* Pax & K. Hoffm. var. *mollis* Pax & K. Hoffm., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *subvolubilis* Chodat & Hassl., *Tragia tristis* Müll. Arg. f. *volubilis* Chodat & Hassl.
Referencias: Múlgura, M. E., 1990, 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CEN, COA).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 6311* (G), *Nicora, E. G. 9824* (SI)].

Tragia cissoides Müll. Arg. = **Tragia alienata** (Didr.) Múlgura & M.M. Gut.
Referencias: Múlgura, M. E., 1991.

Tragia corniculata Vahl = **Microstachys corniculata** (Vahl) Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.

Tragia depauperata Pax & K. Hoffm. = **Tragia bahiensis** Müll. Arg.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia dodencandra Griseb.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, LRI, SDE, SLU).
Ejemplares de referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 13* (CORD, GOET), *Múlgura de Romero, M. E. 1022* (SI)].

Tragia emilii Pax & K. Hoffm. = **Tragia polyandra** Vell.
Referencias: Allem, A. C., 1980; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia emrichii Herter = **Tragia bahiensis** Müll. Arg.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

[Tragia fallacina Pax & K. Hoffm.]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Tragia uberana*.

Tragia friesii Pax & K. Hoffm.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 3819* (SI)].

[Tragia gayana Baill.]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso.

Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill.
Sin.: *Tragia geraniifolia* Klotzsch ex Baill. var. *multifida* Griseb.
Referencias: Dawson, G., 1965a; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SFE, SJU, SLU); BRA(RGS); PRY(APY); URY(ART, COL, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 5171* (LP), *Troncoso, N. S. 3522* (SI)]; BRA[*knob s.n.* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 2185* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1006a* (SI), *Rosengurtt, B. 4543* (MVFA, SI)].

Tragia geraniifolia Klotzsch ex Baill. var. *multifida* Griseb. = **Tragia geraniifolia** Klotzsch ex Baill.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia giardelli M.M. Gut. & Múlgura
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Gutiérrez de Sanguinetti, M. M. & Múlgura, M. E., 1986; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(SCA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6685* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 12742* (HBR, R, US)].
Notas: Su presencia es probable en Paraguay.

Tragia hassleriana Chodat
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E., 1991.
Subarbusto. Endémica. 100–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de referencia: PRY[*Hassler, E. 5107* (G)].

Tragia hastata (Klotzsch) Müll. Arg. = **Tragia polyandra** Vell.
Referencias: Allem, A. C., 1980; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia hieronymii Pax & K. Hoffm.
Sin.: *Tragia oligantha* Pax & K. Hoffm., *Tragia tenella* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Kurtz, F. 8453* (CORD, LP), *Saravia Toledo, C. 1278* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2688* (G), *Schinini, A. 16380* (SI)].

Tragia incana Klotzsch ex Baill.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(CAS, CLA, FLA, LAV, MON, RIV, ROC, TAC).
Ejemplares de referencia: URY[*Del Puerto, O. 6043* (MVFA, SI)].

[Tragia incana Klotzsch ex Baill. var. glauca Herter]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso. Posible sinónimo de *Tragia incana*.

Tragia lagoensis Müll. Arg. = **Tragia bahiensis** Müll. Arg.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia melochioides Griseb.
Sin.: *Tragia bangii* Rusby, *Tragia micrococca* Pax & K. Hoffm., *Tragia pseudomelochioides* Pax & K. Hoffm.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–2600 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(CEN, CON, GUA, PAI, SPE); URY(RNO, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5340* (SI)]; BRA[*Palacios, M. A. 1887* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 2159* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 5688* (MVFA)].

Tragia micrococca Pax & K. Hoffm. = **Tragia melochioides** Griseb.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia oligantha Pax & K. Hoffm. = **Tragia hieronymii** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

[Tragia ovata D. Parodi]
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Notas: Nombre dudoso.

Tragia paraguariensis Pax & K. Hoffm. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**

Tragia paraguariensis Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., p.p. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia paraguariensis Pax & K. Hoffm. var. *discolor* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **discolor** Chodat & Hassl.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia paraguariensis Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia paraguariensis Pax & K. Hoffm. var. *macrophylla* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia paraguariensis Pax & K. Hoffm. var. *subsessilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **discolor** Chodat & Hassl.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia paxii Lourteig & O'Donell
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1990, 1991.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(GUA, PAI).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 1880* (LIL)]; PRY[*Rojas, T. 3273* (LIL)].

Tragia pinnata (Poir.) A. Juss.
Sin.: *Acalypha pinnata* Poir.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI); BRA(RGS); URY(CAS, FLA, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 753* (SI)]; BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. s.n.* (P)]; URY[*Gallinal, J. P. 1467* (LIL, MO, PACA)].

Tragia polyandra Vell.
Sin.: *Leptorhachis hastata* Klotzsch, *Tragia emilii* Pax & K. Hoffm., *Tragia hastata* (Klotzsch) Müll. Arg.
Referencias: Allem, A. C., 1980; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, COA, GUA).
Ejemplares de referencia: ARG[*Schwindt, E. 1875* (LIL)]; BRA[*Ule, E. H. G. 1895* (B)]; PRY[*Hassler, E. 11164* (G)].

Tragia pseudomelochioides Pax & K. Hoffm. = **Tragia melochioides** Griseb.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia sellowiana (Baill.) Müll. Arg. = **Tragia alienata** (Didr.) Múlgura & M.M. Gut.
Referencias: Múlgura, M. E., 1991.

Tragia tenella Pax & K. Hoffm. = **Tragia hieronymii** Pax & K. Hoffm.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia tristis Müll. Arg. f. *subvolubilis* Chodat & Hassl. = **Tragia chlorocaulon** Baill.
Referencias: Múlgura, M. E., 1990.

Tragia tristis Müll. Arg. f. *volubilis* Chodat & Hassl. = **Tragia chlorocaulon** Baill.
Referencias: Múlgura, M. E., 1990.

Tragia uberabana Müll. Arg. var. **discolor** Chodat & Hassl.
Sin.: *Tragia bahiensis* Müll. Arg. var. *subsessilis* Chodat & Hassl., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *discolor* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *subsessilis* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia websterii* Allem & Waetcher
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–700 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, CON, PAI, SPE).
Ejemplares de referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28860* (CTES)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11504* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 4413* (G)].

Tragia uberabana Müll. Arg. var. *macrophylla* Chodat & Hassl. = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia uberabana Müll. Arg. var. **uberabana**
Sin.: *Tragia arechavaletae* Herter ex Arechav., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *canescens* Pax & K. Hoffm., p.p., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *glabrescens* Pax & K. Hoffm., *Tragia paraguariensis* Pax & K. Hoffm. var. *macrophylla* (Chodat & Hassl.) Pax & K. Hoffm., *Tragia uberabana* Müll. Arg. var. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Tragia wingei* Allem & Waetcher
Referencias: Allem, A. C., 1980; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CON, MIE, PAI); URY(CLA, LAV, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de referencia: ARG[*Burkart, A. 18650* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 9357* (HBR, US)]; PRY[*Hassler, E. 7726* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4879b* (SI)].

Tragia volubilis L.
Sin.: *Tragia volubilis* L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl.
Referencias: Govaerts, R., Frodin, D. G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989; Múlgura, M. E., 1991; Smith, L. B., Downs, R. J. & Klein, R. M., 1988.
Hierba voluble. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CON, PAI, SPE); URY(ART, RIV, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1009* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2743* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 666* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15317* (MVFA)].

Tragia volubilis L. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Tragia volubilis** L.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia websterii Allem & Waetcher = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **discolor** Chodat & Hassl.
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

Tragia wingei Allem & Waetcher = **Tragia uberabana** Müll. Arg. var. **uberabana**
Referencias: Múlgura, M. E. & Gutiérrez de Sanguinetti, M. M., 1989.

FABACEAE

Coordinador: Fortunato, R. H.
Autores: Beyhaut, R. (Uruguay), Costa Bortoluzzi, R. L. (Caesalpinioideae del Sur de Brasil), Fortunato, R. H. (*Andira* del Sur de Brasil), Gómez-Sosa, E. V. (*Astragalus*), Izaguirre, P., Lima, H. C. (*Acosmium, Amburana, Andira, Centrolobium, Dalbergia, Holocalyx, Machaerium, Myrocarpus, Myroxylon, Ormosia, Platypodium, Pterocarpus, Riedeliella, Sweetia* y *Zollernia* del Sur de Brasil), Miotto, S. T. S. (Papilionoideae del Sur de Brasil), Moura Baptista, L. R. (Mimosoideae del Sur de Brasil) & Ulibarri, E. A. (*Adesmia, Caesalpinia, Hoffmannseggia, Pomaria* y *Cercidium*).
Revisores: Lewis, G. P. (*Anadenanthera* y *Diptychandra*), Pennington, T. D. (*Inga*), Rico, L. (*Acacia*, Ingeae excepto *Inga*), Schrire, B. D. (*Indigofera*) & Tozzi, A. M. G. A. (*Lonchocarpus* y *Machaerium*).

154 géneros, 1323 especies, 617 especies endémicas, 107 especies introducidas.

Abarema Pittier

Número de especies: 2

Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Inga brachystachya* DC.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.
Arbusto. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1045* (MBM)].

Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Pithecellobium langsdorffii* Benth.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Burkart, A., 1979b.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Gaudichaud-Beaupré, C. 208* (G), *Klein, R. M. 760* (HBR, SI)].

Abrus arboreus Vell. = **Ormosia arborea** (Vell.) Harms

Acacia Mill.

Número de especies: 36, 7 endémicas, 6 introducidas

Acacia acicularis Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Acacia farnesiana** (L.) Willd.
Referencias: Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia adenopa Hook. & Arn. = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984.

[Acacia adhaerens Benth.]
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Acacia adhaerens Benth. var. *parviceps* Speg. = **Acacia parviceps** (Speg.) Burkart
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia adstringens Mart. = **Stryphnodendron adstringens** (Mart.) Coville

Acacia alba Colla = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia albicorticata Burkart
Referencias: Burkart, A., 1947; Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schreiter, R. 3355* (LIL, SI)].

Acacia amambayensis Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10602* (G)].

Acacia angico Mart. = **Parapiptadenia rigida** (Benth.) Brenan
Referencias: Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 2000.

Acacia angustiloba DC. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Acacia angustisiliqua (Lam.) Desf. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

[Acacia angustissima (Mill.) Kuntze]
Sin.: *Mimosa angustissima* Mill.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acacia armata R. Br. = **Acacia paradoxa** DC.
Referencias: Pedley, L., 2003.

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *cochlearis* Griseb., *Acacia aroma* Gillies ex Hook. & Arn. var. *moniliformis* (Griseb.) Hieron., *Acacia lutea* (Mill.) Britton var. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Acacia lutea* (Mill.) Britton var. *moniliformis* (Griseb.) Kuntze, *Acacia michelii* Rusby, *Acacia moniliformis* Griseb., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *leptocarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *moniliformis* (Griseb.) Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *oocephala* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *pachycarpa* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. f. *thlipsacantha* Speg., *Vachellia lutea* (Mill.) Speg. var. *moniliformis* (Griseb.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1938* (SI), *Jörgensen, P. 1427* (BA, G, MO, UC)]; PRY[*Arenas, P. 488* (BAB)].

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. var. *cochlearis* Griseb. = **Acacia aroma** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. var. *moniliformis* (Griseb.) Hieron. = **Acacia aroma** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia astringens (Gillies) Speg. = **Acacia atramentaria** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Acacia atramentaria Benth.
Sin.: *Acacia astringens* (Gillies) Speg., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *atramentaria* (Benth.) Kuntze, *Acacia prosopoma* A. Schnyd., *Prosopis astringens* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Vachellia astringens* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MEN, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); URY(PAY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 13102* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 9378* (MVFA)].

Acacia bimucronata DC. = **Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia boliviana Rusby
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schreiter, R. 11047* (SI)].

Acacia bonariensis Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1967a, 1987a; Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SFE, SJU, TUC); BRA(RGS); PRY(CAA, CEN, COA, MIE, PHA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 659* (SI), *Pedersen, T. M. 6000* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 1406* (PACA)]; PRY[*Hassler, E. 2622* (G)]; URY[*Del Puerto, O. 15268* (MVFA)].

Acacia bonplandii Gillies ex Hook. & Arn. = **Mimosa bonplandii** (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964b.

Acacia catharinensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica. 400–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 2172* (HBR, SI), *Reitz, P. R. 10563* (SI)].

Acacia caven (Molina) Molina var. **caven**
Sin.: *Acacia adenopa* Hook. & Arn., *Acacia cavenia* (Molina) Hook. & Arn., *Acacia cavenia* Colla, hom. illeg., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. f. *cavenia* (Molina) E.C. Clos, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *brachicarpa* Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Arechav., comb. superfl., *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Kuntze, *Acacia farnesiana* (L.) Willd. var. *heterocarpa* Kuntze, *Mimosa caven* Molina, *Mimosa cavenia* Molina, *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *brachypoda* Speg., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *cavenia* (Molina) Speg.
Referencias: Aronson, J., 1992; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Spegazzini, C. L., 1923a; Steibel, P., 2001[2000].
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME); PRY(APY, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CAS, COL, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 525* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3603* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 410* (G, MO, NY)]; PRY[*Mereles, F. 6046* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Herter, W. G. F. 669* (F, G, MO)].

Acacia caven (Molina) Molina var. **dehiscens** Burkart ex Ciald.
Referencias: Aronson, J., 1992; Cialdella, A. M., 1984; Steibel, P., 2001[2000].
Arbusto o árbol. Endémica.
Países: ARG(CAT, COR, LPA, SAL, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Giardelli, M. L. 405* (SI), *Nicora, E. G. 962* (SI)].

Acacia caven (Molina) Molina var. **macrocarpa** Aronson
Referencias: Aronson, J., 1992.
Arbusto o árbol. Nativa. 2000–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 17577* (SI)].

Acacia caven (Molina) Molina var. **microcarpa** (Speg.) Burkart ex Ciald.
Sin.: *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *microcarpa* Speg.
Referencias: Aronson, J., 1992; Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 943* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 1625* (SI)].

Acacia caven (Molina) Molina var. **sphaerocarpa** Burkart ex Aronson
Referencias: Aronson, J., 1992.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, SFE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3539* (CTES, K)].

Acacia caven (Molina) Molina var. **stenocarpa** (Speg.) Burkart ex Ciald.
Sin.: *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn. f. *stenocarpa* Speg.
Referencias: Aronson, J., 1992; Cialdella, A. M., 1984; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, MIS, SFE); PRY(APY, CAU, CEN, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14734* (SI), *Hunziker, A. T. 5749* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8419* (SI)].

Acacia cavenia (Molina) Hook. & Arn. = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia cavenia Colla, hom. illeg. = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia cebil Griseb. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964; Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia concinna Phil., hom. illeg. = **Acacia visco** Lorentz ex Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia curvifructa Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Cialdella, A. M., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.
Arbusto o arbolito. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Carmelich, J. N. s.n.* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4079* (SI)].

Acacia dealbata Link
Referencias: Isely, D., 1973; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto o árbol. Introducida. 0–800 m.
Países: BRA(RGS); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, IDE, IJF, RME); URY(LAV, MAL, MON, SOR).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 42805* (CONC)]; URY[*Gibert, J. E. 9147* (MVFA)].
Notas: Según Steibel (2001[2000]: 10) esta especie está escapada de cultivo en La Pampa, Argentina.

Acacia edulis Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Acacia farnesiana** (L.) Willd.
Referencias: Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia emilioana Fortunato & Ciald.
Referencias: Fortunato, R. H. & Cialdella, A. M., 1996.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Toledo, A. J. M. 10046* (SI)].

Acacia etilis Speg.
Sin.: *Acacia plumosa* auct. non Lowe
Referencias: Cialdella, A. M., 1984, 1996; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 24229* (SI), *Morrone, O. 4588* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3189* (FCQ)].

Acacia farnesiana (L.) Willd.
Sin.: *Acacia acicularis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia edulis* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Acacia ferox* M. Martens & Galeotti, *Mimosa farnesiana* L., *Vachellia farnesiana* (L.) Wight & Arn.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CAN, PAI, PHA); URY(CAS, MON, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 5512* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 64* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 7227* (G), *Rojas, T. 9478* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 631* (MVM)].
Notas: Cultivada en Santa Catarina, Brasil, podría aparecer como subespontánea en ese estado (Burkart, 1979b).

Acacia farnesiana (L.) Willd. f. *cavenia* (Molina) E.C. Clos = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia farnesiana (L.) Willd. var. *atramentaria* (Benth.) Kuntze = **Acacia atramentaria** Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia farnesiana (L.) Willd. var. *brachicarpa* Kuntze = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia farnesiana (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Arechav., comb. superfl. = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia farnesiana (L.) Willd. var. *cavenia* (Molina) Kuntze = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984.

Acacia farnesiana (L.) Willd. var. *heterocarpa* Kuntze = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

Acacia ferox M. Martens & Galeotti = **Acacia farnesiana** (L.) Willd.
Referencias: Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.

[Acacia filicina Willd.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acacia flexuosa Lag., nom. illeg. = **Prosopis flexuosa** DC. f. **flexuosa**
Referencias: Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.

Acacia formosa Kunth = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Hernández, H. M., 1989.

Acacia furcata Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Acacia furcatispina** Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1947; Cialdella, A. M., 1984.

Acacia furcatispina Burkart
Sin.: *Acacia furcata* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg., *Manganaroa furcata* (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1947, 1967a; Cialdella, A. M., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, FOR, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, CAA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 291* (SI), *Kiesling, R. 5843* (SI)]; PRY[*Degen, R. 3164* (FCQ), *Rojas, T. 7235* (SI)].

[Acacia glomerosa Benth.]
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acacia gonoacantha Mart. = **Piptadenia gonoacantha** (Mart.) J.F. Macbr. var. **gonoacantha**
Referencias: Burkart, A., 1979b.

Acacia gracilis M. Martens & Galeotti = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia grandistipula Benth.
Arbusto. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, A. 1652* (SI)].

Acacia grata Willd. = **Piptadenia grata** (Willd.) J.F. Macbr.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia guacamayo (Britton & Killip) Standl. = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Acacia hamiltonii Desv. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia hassleri Chodat = **Acacia praecox** Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 1984.

Acacia horrida (L.) Willd.
Sin.: *Mimosa horrida* L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Árbol. Introducida. 0–900 m.
Países: CHL(III, RME); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Mahu, M. 146* (CONC)]; URY[*Gibert, J. E. 9134* (MVM)].
Notas: Cultivada en Chile y Uruguay.

Acacia incana Spreng. = **Mimosa incana** (Spreng.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia inundata Mart. = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia karroo Hayne
Referencias: Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.
Arbusto o arbolito. Introducida.
Países: CHL(I, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Plowman, T. C. 2663* (US)].

[Acacia langsdorfii Benth.]
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acacia lepidota Hook. & Arn. = **Mimosa bonplandii** (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Acacia linearis Desv. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Sin.: *Mimosa longifolia* Andrews
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto o árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, COL, MAL, MON, ROC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 8730* (MVFA)]; BRA[*Wasum, R. 8626* (NY)]; URY[*Boelcke, O. 2177* (BAA, MVFA)].
Notas: Introducida para fijar las dunas costeras, naturalizada con los años.

Acacia lophantha Willd. = **Albizia lophantha** (Willd.) Benth.

[Acacia lutea (Mill.) Britton]
Sin.: *Mimosa lutea* Mill.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Nombre dudoso.

Acacia lutea (Mill.) Britton var. *aroma* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Acacia aroma** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia lutea (Mill.) Britton var. *moniliformis* (Griseb.) Kuntze = **Acacia aroma** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia lycopodioides (Desf.) Desv. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Ebinger, J. E., Seigler, D. S. & Clarke, H. D., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–100 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Aronson, J. 7745* (MO), *Werdermann, E. 748* (SI)].

Acacia magnibracteosa Burkart
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 30749* (PACA, SI)].
Notas: Probablemente habite en Santa Catarina, Brasil.

Acacia martii Benth.
Sin.: *Acacia paniculata* Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl., *Manganaroa martii* (Benth.) Speg., *Manganaroa paniculata* (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904; Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Muello s.n.* (LP)]; PRY[*Hassler, E. 7443* (G)].

Acacia martusiana (Steud.) Burkart
Sin.: *Mimosa martusiana* Steud.
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Arbusto o liana. Nativa.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 3991* (HBR, SI)].

Acacia melalobiata Rojas Acosta = **Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Acacia melanoxylon R. Br.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Árbol. Introducida. 0–800 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); CHL(V, VII, VIII, IX, X, IDP, IJF, RME); URY(MAL, MON, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 79* (MVFA)]; BRA[*Coura Neto, A. B. 61* (MBM)]; CHL[*Gunckel, L. H. 33425* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 1980* (MVFA)].

Acacia michelii Rusby = **Acacia aroma** Gillies ex Hook. & Arn.

Acacia microphylla Willd. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Acacia monacantha Willd. f. **monacantha**
Sin.: *Acacia rojasii* Hassl., *Acacia velutina* Benth., hom. illeg., *Manganaroa monacantha* (Willd.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); BRA(PAR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Covas, G. 4420* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15793* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 2903* (G)].

Acacia monacantha Willd. f. **schulziana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1952a; Cialdella, A. M., 1984.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 2012* (SI)].

Acacia moniliformis Griseb. = **Acacia aroma** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia nigra Clos = **Calliandra chilensis** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Acacia niopo (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Acacia nitidifolia Speg.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 1984; Rambo, B., 1966; Spegazzini, C. L., 1923a; Stutz, L. C., 1983.
Arbusto. Endémica. 200–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, MIE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1022* (SI), *Morrone, O. 1048* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 3221* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4831* (SI), *Stutz, L. C. 978* (G)].

Acacia pachyloma Mart., nom. nud. = **Calliandra parviflora** Benth.

Acacia paniculata Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10645* (G), *Rojas, T. 6548* (SI)].

Acacia paniculata Willd. var. *martii* (Benth.) Hassl. = **Acacia martii** Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia paradoxa DC.
Sin.: *Acacia armata* R. Br.
Referencias: Pedley, L., 2003.
Arbusto. Introducida.
Países: CHL(V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 53005* (CONC)].

Acacia paraguariensis D. Parodi = **Caesalpinia paraguariensis** (D. Parodi) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ulibarri, E. A., 1996b.

Acacia parviceps (Speg.) Burkart
Sin.: *Acacia adhaerens* Benth. var. *parviceps* Speg.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(AMA, CEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7875* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13247* (MBM)]; PRY[*Woolston, A. L. 419* (SI)].

Acacia peregrina (L.) Willd. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Acacia platensis Manganaro = **Acacia visco** Lorentz ex Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia plumosa Lowe
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 11501* (HBR, SI, US)].

Acacia plumosa auct. non Lowe = **Acacia etilis** Speg.

Acacia polyantha Spreng. = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1949c; Hoc, P. S., 1992b.

Acacia polyphylla Clos, hom. illeg. = **Acacia visco** Lorentz ex Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia polyphylla DC.
Sin.: *Acacia riparia* Bertero ex Spreng., nom. illeg., *Senegalia polyphylla* (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b; Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904; Cialdella, A. M., 1984.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5160* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12100* (HBR, SI)]; PRY[*Balansa, B. 1430* (G), *Rojas, T. 6928* (SI)].

Acacia portoricensis (Jacq.) Willd. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia praecox Griseb.
Sin.: *Acacia hassleri* Chodat, *Acacia praecox* Griseb. f. *hassleri* (Chodat) Burkart

Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Spegazzini, C. L., 1923a.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CON, PAI, PHA); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 248* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 6073* (CTES, FCQ, MO)]; URY[*Lombardo, A. 2476* (MVJB)].

Acacia praecox Griseb. f. *hassleri* (Chodat) Burkart = **Acacia praecox** Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 1984.

Acacia prosopoma A. Schnyd. = **Acacia atramentaria** Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia pseudoadhaerens Hassl. = **Acacia riparia** Kunth var. **pseudoadhaerens** (Hassl.) Hassl.

Acacia punctata (L.) Desv. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Acacia recurva Benth.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 1984; Rambo, B., 1966; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto. Nativa. 200–1200 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1270* (SI), *Zuloaga, F. O. 5179* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3536* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 41476* (AS, MO)].

Acacia riparia Kunth
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 3457* (G)].

Acacia riparia Bertero ex Spreng., nom. illeg. = **Acacia polyphylla** DC.

[Acacia riparia Kunth f. intermedia Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Acacia riparia Kunth var. angustifolia Kuntze]
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Nombre dudoso.

Acacia riparia Kunth var. *argentinensis* Speg. = **Acacia tucumanensis** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

[Acacia riparia Kunth var. pseudoadhaerens (Hassl.) Hassl.]
Sin.: *Acacia pseudoadhaerens* Hassl.
Notas: Nombre dudoso.

Acacia riparia Kunth var. *subscandens* (Griseb.) Griseb. = **Acacia tucumanensis** Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia riparia Kunth var. *tucumanensis* (Griseb.) Griseb. = **Acacia tucumanensis** Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Acacia rojasii Hassl. = **Acacia monacantha** Willd. f. **monacantha**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 1984.

Acacia selloi Spreng. = **Calliandra brevipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Acacia siliquastrum Cav. ex Lag. = **Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **chilensis**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Acacia sprengelii Hook. & Arn. = **Mimosa incana** (Spreng.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

[Acacia striata Humb. & Bonpl. ex Willd.]
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Acacia stricta Willd.]
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acacia strombulifera (Lam.) Willd. = **Prosopis strombulifera** (Lam.) Benth. var. **strombulifera**
Referencias: Burkart, A., 1976; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.

Acacia subtilifolia Kunth = **Piptadenia viridiflora** (Kunth) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1949c; Cialdella, A. M., 2000.

[Acacia tenuifolia (L.) Willd.]
Sin.: *Mimosa tenuifolia* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Acacia torquata Cav. ex Lag. = **Prosopis torquata** (Cav. ex Lag.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1976.

Acacia tucumanensis Griseb.
Sin.: *Acacia riparia* Kunth var. *argentinensis* Speg., *Acacia riparia* Kunth var. *subscandens* (Griseb.) Griseb., *Acacia riparia* Kunth var. *tucumanensis* (Griseb.) Griseb., *Acacia tucumanensis* Griseb. var. *subscandens* Griseb.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.

Países: ARG(CAT, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, GUA, PAI); URY(ART).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 656* (SI), *Xifreda, C. C. 493* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 14083* (HBR, SI, US)]; PRY[*Rojas, T. 9276* (SI), *Zardini, E. M. 8145* (FCQ, MO)]; URY[*Berro, M. B. 2795* (MVFA)].

Acacia tucumanensis Griseb. var. *subscandens* Griseb. = **Acacia tucumanensis** Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia ungulata Desv. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia velutina Benth., hom. illeg. = **Acacia monacantha** Willd. f. **monacantha**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia velutina Bertol., nom. illeg. = **Acacia velutina** DC. var. **velutina**

[Acacia velutina DC. f. ferox Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Acacia velutina DC. f. subinermis Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Acacia velutina DC. var. *glabrescens* (Speg.) Burkart = **Acacia velutina** DC. var. **monadena** Hassl.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Acacia velutina DC. var. **monadena** Hassl.
Sin.: *Acacia velutina* DC. var. *glabrescens* (Speg.) Burkart, *Manganaroa velutina* (DC.) Speg. var. *glabrescens* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 1984; Rambo, B., 1966; Spegazzini, C. L., 1923a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1753* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1733* (LIL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 6461* (SI)].

Acacia velutina DC. var. **velutina**
Sin.: *Acacia velutina* Bertol., nom. illeg., *Manganaroa velutina* (DC.) Speg.
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Nativa. 100–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CAN, ITA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 9510* (HBR, SI)]; PRY[*Hassler, E. 5573* (G)].

Acacia venusta Willd. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia vespertina Macfad. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Acacia virgata (L.) Gaertn. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Acacia viridiflora Kunth = **Piptadenia viridiflora** (Kunth) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1949c; Cialdella, A. M., 2000.

Acacia visco Lorentz ex Griseb.
Sin.: *Acacia concinna* Phil., hom. illeg., *Acacia platensis* Manganaro, *Acacia polyphylla* Clos, hom. illeg., *Lysiloma polyphylla* (Clos) Benth., *Manganaroa platensis* (Manganaro) Speg., *Manganaroa subsericea* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984; Spegazzini, C. L., 1923a.
Árbol. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 349* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3606* (CONC)].

Acosmium Schott

Número de especies: 2

Acosmium cardenasii H.S. Irwin & Arroyo
Referencias: Mereles, F., Pérez, L. & Delmás de Rojas, G., 2004.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Mereles, F. 8999* (FCQ)].

Acosmium subelegans (Mohlenbr.) Yakovlev
Sin.: *Sweetia elegans* (Vogel) Benth., *Sweetia elegans* (Vogel) Benth. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Sweetia elegans* (Vogel) Benth. f. *ovatifolia* Chodat & Hassl., *Sweetia subelegans* Mohlenbr.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Ulibarri, E. A., 1997c; Yakovlev, G. P., 1969.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2847* (SI), *Rojas, T. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, A. 20388* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 8588* (SI), *Rojas, T. 2028* (G)].

Acuan acuminatum (Benth.) Kuntze = **Desmanthus acuminatus** Benth.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Acuan bahamense Britton & Rose = **Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.

Acuan depressum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Acuan texanum Britton & Rose = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Acuan tracyi Britton & Rose = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Acuan virgatum (L.) Medik. f. *paspalacea* Lindm. = **Desmanthus paspalaceus** (Lindm.) Burkart
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Adenocarpus DC.

Número de especies: 1 introducida

Adenocarpus complicatus (L.) A. Gray
Sin.: *Spartium complicatum* L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: URY(RIV).
Ejemplares de Referencia: URY[*Izaguirre, P. 20192* (MVFA)].

Adesmia DC.

Número de especies: 198, 185 endémicas

Adesmia aconcaguensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 3200–4800 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 9749* (SI), *Kiesling, R. 6739* (SI)].

Adesmia acuta Burkart
Sin.: *Adesmia acuta* Burkart f. *choiquesica* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1962; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Subarbusto. Endémica. 1700–2800 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33329* (SI)].

Adesmia acuta Burkart f. *choiquesica* Burkart = **Adesmia acuta** Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia adenophora Phil. = **Adesmia frigida** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A., 1980.

Adesmia adrianii M.N. Correa
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ezcurra, C. 34* (SI), *Ruíz Leal, R. A. 25817* (MERL, SI)].

Adesmia aegiceras Phil.
Sin.: *Adesmia glanduligera* I.M. Johnst., *Adesmia remyana* Phil., *Adesmia subumbellata* Phil., *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana* (Phil.) Burkart, *Adesmia trijuga* Gillies ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook. & Arn., *Patagonium aegiceras* (Phil.) Kuntze, *Patagonium aegiceras* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Subarbusto. Endémica. 1500–4000 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(I, III, IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 2147* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 950* (LIL, SI)].

Adesmia affinis Hook. f. = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **affinis** (Hook. f.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia alcicornutum Rusby = **Adesmia spinosissima** Meyen

Adesmia amblysepala Solms = **Adesmia schickendanzii** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia ameghinoi Speg.
Sin.: *Patagonium ameghinoi* (Speg.) Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Spegazzini, C. L., 1897; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33244* (SI), *Cocucci, A. A. 2522* (CORD, CTES, SI)].

Adesmia angulata Hook. f. = **Adesmia incana** Vogel var. **incana**
Referencias: Burkart, A., 1939a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia angustifolia Hook. & Arn. = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia aphanantha Speg.
Sin.: *Patagonium aphananthum* (Speg.) Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Spegazzini, C. L., 1902b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1500 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33185* (SI)].

Adesmia aphylla Clos
Sin.: *Patagonium aphyllum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1800–3000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 1133* (SI)].

Adesmia aprica Phil. = **Adesmia viscida** Bertero ex Colla
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia arachnipes Clos
Sin.: *Adesmia oresigena* Phil., *Patagonium arachnipes* (Clos) Kuntze, *Patagonium oresigenum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

Hierba. Perenne. Endémica. 1600–3500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 3448* (SI)].

Adesmia araucana Phil.
Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–1500 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 10508* (SI)].

Adesmia araujoi Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1967b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Miotto, S. T. S., 1991; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 4053* (SI)].

[Adesmia arborea Bertero ex Colla]
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.
Notas: Nombre dudoso.

Adesmia arborea Bertero ex Clos, hom. illeg. = **Adesmia confusa** Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia arenicola (R.E. Fr.) Burkart
Sin.: *Patagonium arenicola* R.E. Fr.
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fries, R. E. 881* (S, SI), *Kiesling, R. 5274* (SI)].

Adesmia argentea Meyen
Sin.: *Adesmia cinerea* Clos, *Patagonium argenteum* (Meyen) Kuntze, *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Cabrera, A. 12608* (SI), *Dillon, M. O. 5013* (SI)].

Adesmia argyrophylla Phil.
Sin.: *Adesmia furcata* Phil., *Patagonium argyrophyllum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 200–2800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 5298* (SI)].

Adesmia arillata Miotto
Referencias: Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Miotto, S. T. S., 1993.

Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 11346* (CEN, ICN, K, MBM, MO, MVM, NY, P, SI, U, UEC, US)].

Adesmia arnottiana Gillies ex Hook. = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia aromatica Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1100–1300 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 3304* (SI)].

Adesmia arvensis Phil. = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia aspera Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–3000 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(IV, V, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 24549* (SI)]; CHL[*Barros, E. 7590* (SI)].

Adesmia atacamensis Phil.
Sin.: *Adesmia glandulosa* Phil., *Patagonium atacamense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glandulosum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 2000–4000 m.
Países: CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 633* (SI)].

Adesmia atuelensis Burkart = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia aucaensis Burkart = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia aueri Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–1500 m.
Países: ARG(RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 6302* (BAB, SI), *Donat, A. 158* (S, SI), *Ruiz Leal, R. A. 25596* (SI)].

Adesmia aurantiaca (Dusén) Burkart
Sin.: *Adesmia pumila* Hook. f. var. *aurantiaca* Dusén
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1960a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 24231* (SI)]; CHL[*Elvebakk, A. 714* (CONC)].

Adesmia axillaris Phil. = **Adesmia parvifolia** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia balsamica Bertero ex Colla
Sin.: *Patagonium balsamicum* (Bertero ex Colla) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Bertero, C. L. G. 761* (SI)].

Adesmia bedwellii Skottsb.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Skottsberg, C. J. F., 1946.
Arbusto. Endémica. 200–700 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 1275* (SI)].

Adesmia berteroi Phil. ex Kuntze, nom. nud. = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1964b; Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia berteroniana Steud., nom. nud. = **Adesmia confusa** Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia bicolor (Poir.) DC.
Sin.: *Adesmia glabriuscula* Vogel, *Adesmia pendula* Poir., *Adesmia radicans* Clos, *Hedysarum bicolorum* Poir., *Hedysarum pendulum* Poir., *Patagonium bicolor* (Poir.) Kuntze, *Patagonium glabriusculum* (Vogel) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1967b; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Rambo, B., 1966; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, DFE, ERI, MIS, RNE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(V, VIII, IX, RME); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 22383* (SI)]; BRA[*Araújo, A. C. 89* (SI)]; CHL[*Bertero, C. L. G. 767* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11586* (MVFA)].

Adesmia bijuga Phil.
Sin.: *Patagonium bijugum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Azocart, R. s.n.* (SGO)].

Adesmia boelckeana Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 1200–1500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 10730* (BAA, BAB, SI)].

Adesmia bonariensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1967b; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(LAV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pastore, A. L. 1137* (SI)]; URY[*Kachele s.n.* (MVFA)].

Adesmia boronioides Hook. f.
Sin.: *Patagonium boronioides* (Hook. f.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 11280* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 16* (SI)].

Adesmia brachycarpa Phil. = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia brachysemeon Phil.
Sin.: *Patagonium bracteatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A., 1960a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2200 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Marticorena, A. 25288* (SI)].

Adesmia bracteata Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1200–2600 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 2900* (SI), *Krapovickas, A. 5765* (SI)].

Adesmia brevivexillata Burkart
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A., 1960a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2500 m.
Países: CHL(V, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*King, D. O. 449* (BAB, SI)].

Adesmia burkartii M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1981; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 26418* (MERL, SI)].
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Adesmia cabrerae Burkart = **Adesmia candida** Hook. f. var. **cabrerae** (Burkart) Ulibarri & Burkart
Referencias: Burkart, A., 1964d; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia caespitosa Gillies ex Hook., nom. nud. = **Adesmia minor** (Hook. & Arn.) Burkart var. **minor**
Referencias: Burkart, A., 1960a.

Adesmia caespitosa Phil. = **Adesmia minor** (Hook. & Arn.) Burkart var. **caespitosa** (Phil.) Ulibarri & Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia calocarpa Phil. = **Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia calopogon Phil. = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia calycicomosa Burkart
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1100–1400 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Wagenknecht, R. s.n.* (G, GH, SI, UC)].

Adesmia calycina Vogel = **Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**
Referencias: Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia calycosa Phil. = **Adesmia monosperma** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia campestris (Rendle) Rowlee = **Adesmia volckmannii** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia candida Hook. f. var. **cabrerae** (Burkart) Ulibarri & Burkart
Sin.: *Adesmia cabrerae* Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 33150* (SI), *Cabrera, A. L. 11017* (LP, SI)].

Adesmia candida Hook. f. var. **candida**
Sin.: *Adesmia canescens* (A. Gray) Speg., *Patagonium candidum* (Hook. f.) Macloskie, *Streptodesmia canescens* A. Gray
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 3387* (BAB, SI)].

Adesmia canescens (A. Gray) Speg. = **Adesmia candida** Hook. f. var. **candida**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

[Adesmia canescens Phil., hom. illeg.]
Sin.: *Adesmia rudolfi* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Notas: Nombre dudoso.

Adesmia capitellata (Clos) Hauman
Sin.: *Adesmia oligophylla* Phil., *Hosackia capitellata* (Clos) Brand, *Lotus capitellatus* Clos, *Patagonium oligophyllum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1966a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 2300–4200 m.
Países: ARG(LRI, MEN, NEU, SJU); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 11683* (BAB, SI), *Krapovickas, A. 5693* (BAB, SI)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (GH, K, P), *Grandjot, G. F. 3715* (SI)].

Adesmia capricornica Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud. = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia capricornu Phil. = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia caragana Griseb. = **Adesmia cytisoides** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia carnosa Dusén = **Adesmia salicornioides** Speg.
Referencias: Burkart, A., 1939a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia cervicornis Burkart = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia chillanensis Phil. = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia ciliata Vogel
Sin.: *Adesmia ciliata* Vogel var. *graminetorum* Burkart, *Patagonium ciliatum* (Vogel) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3354* (SI), *Rosengurtt, B. 8762* (MVFA)].

Adesmia ciliata Vogel var. *graminetorum* Burkart = **Adesmia ciliata** Vogel
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Adesmia cinerea Clos = **Adesmia argentea** Meyen
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia clarenii (R.E. Fr.) Burkart = **Adesmia miraflorensis** J. Remy
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia closii Phil. = **Adesmia mucronata** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia codonocalyx G.F. Grandjot & K. Grandjot = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia colinensis (Phil. ex Reiche) Martic.
Sin.: *Patagonium colinense* Phil. ex Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Marticorena, C., 2001[2000].
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 4305* (CONC)].

Adesmia coluteoides Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1949c; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 1500–1900 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Covas, G. 1362* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 4799* (SI)].

Adesmia coluteoides Phil. = **Adesmia prostrata** Clos var. **eglandulosa** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Adesmia comechingona C.A. Bianco & Weberling = **Adesmia cordobensis** Burkart var. **cordobensis**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia compacta Phil. = **Adesmia glomerula** Clos var. **glomerula**
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia concinna Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Arbusto. Endémica. 200–1400 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 6575* (SI)].

Adesmia conferta Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia brachycarpa* Phil., *Adesmia izquierdi* Phil. ex Reiche, *Adesmia stipulacea* Clos, *Adesmia venosa* Phil., *Patagonium brachycarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium stipulaceum* (Clos) Kuntze, *Patagonium venosum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1800 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Looser, G. 231* (SI)].

Adesmia confusa Ulibarri
Sin.: *Adesmia arborea* Bertero ex Clos, hom. illeg., *Adesmia berteroniana* Steud., nom. nud., *Patagonium arboreum* (Bertero ex Clos) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Muñoz-Schick, M. 995* (SI)].

Adesmia coquimbensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1900 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Worth, C. R. 16395* (GH, SI, UC, US)].

Adesmia cordobensis Burkart var. **appendiculata** Ulibarri & Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 900–1100 m.
Países: ARG(SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Anderson, D. L. 1921* (SI)].

Adesmia cordobensis Burkart var. **cordobensis**
Sin.: *Adesmia comechingona* C.A. Bianco & Weberling
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 900–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 7362* (SI), *Lanfranchi, A. E. 1251* (SI)];

Adesmia coronilloides Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia atuelensis* Burkart, *Adesmia codonocalyx* G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia germainii* Phil., *Adesmia glauca* Phil., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *glaucum* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium coronilloides* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium germainii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium germainii* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium glaucum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Böcher, T. W. 1266* (SI)]; CHL[*Barros, E. 5217* (SI)].

Adesmia corymbosa Clos var. **corymbosa**
Sin.: *Adesmia aucaensis* Burkart, *Adesmia dubia* M.N. Correa, *Adesmia fernandezii* Phil., *Adesmia glandulifera* (Rendle) Rowlee, *Adesmia palenae* Phil., *Adesmia subsericea* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Adesmia subsericea* (Chodat & Wilczek) Hauman var. *nigro-punctata* Hauman, *Adesmia tenuis* Phil., *Adesmia vallis-pulchrae* Phil., nom. nud., *Patagonium corymbosum* (Clos) Kuntze, *Patagonium glanduliferum* Rendle, *Patagonium palenae* (Phil.) Reiche, *Patagonium subsericeum* Chodat & Wilczek, *Patagonium vallis-pulchrae* Reiche

Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–3500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(V, VI, VII, IX, XI, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6437* (SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

Adesmia corymbosa Clos var. **sinepenna** Ulibarri & Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–3500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hicken, C. M. 572* (SI)].

Adesmia crassicaulis Phil.
Sin.: *Patagonium crassicaule* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967a; Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987; Philippi, R. A., 1891; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Subarbusto. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 1928* (SI)].
Notas: Probablemente habite en el norte de Chile.

Adesmia cuneata Meyen ex Vogel
Sin.: *Patagonium cuneatum* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2100–2800 m.
Países: CHL(VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Teillier A., S. 2335* (CONC)].

Adesmia curvifolia Clos
Sin.: *Patagonium curvifolium* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. s.n.* (CONC)].

Adesmia cytisoides Griseb.
Sin.: *Adesmia caragana* Griseb., *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *oleae* Burkart, *Adesmia cytisoides* Griseb. var. *pugionata* (Griseb.) Burkart, *Adesmia pugionata* Griseb., *Patagonium cytisoides* (Griseb.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 106* (CORD, GOET, SI)].

Adesmia cytisoides Griseb. var. *oleae* Burkart = **Adesmia cytisoides** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia cytisoides Griseb. var. *pugionata* (Griseb.) Burkart = **Adesmia cytisoides** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia darapskyana (Phil. ex Reiche) Martic.
Sin.: *Patagonium darapskyanum* Phil. ex Reiche
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 2300–2800 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Boelcke, O. 2403* (SI)].

Adesmia davilae Phil.
Sin.: *Patagonium davilae* (Phil.) Kuntze
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jaffuel, F. s.n.* (CONC)].

Adesmia decumbens Phil. = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia decumbens Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia dendroides Phil. = **Adesmia propinqua** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia dentata (Lag.) DC. = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia denticulata Clos
Sin.: *Patagonium denticulatum* (Clos) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–1600 m.
Países: CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 3968* (SI)].

Adesmia denudata Phil.
Sin.: *Patagonium denudatum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 4258* (SI)].

Adesmia deserticola Phil. = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia dessaueri (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sin.: *Patagonium dessaueri* Phil. ex Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Dessauer, H. s.n.* (SGO, SI)].

Adesmia diaziana I.M. Johnst. = **Adesmia melanocaulos** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia dichotoma Clos
Sin.: *Patagonium cinereum* (Clos) Kuntze var. *dichotomum* (Clos) Reiche, *Patagonium dichotomum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 900–2800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Wagenknecht, R. 14w* (SI)].

Adesmia digitata Burkart
Referencias: Burkart, A., 1964b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Subarbusto. Endémica. 2800–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 6916* (SI)].

Adesmia disperma Phil.
Sin.: *Patagonium dispermum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Behn, K. s.n.* (CONC)].

Adesmia divaricata (Phil. ex Reiche) Dyer = **Adesmia kingii** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia dubia M.N. Correa = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia dumosa Phil.
Sin.: *Patagonium dumosum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Adesmia echinus C. Presl
Sin.: *Adesmia gayana* Phil., *Patagonium echinus* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium gayanum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1999.
Subarbusto. Endémica. 2800–4400 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1453* (SI)]; CHL[*Jiles P., C. 2963* (SI)].

Adesmia elata Clos
Sin.: *Patagonium elatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–1300 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Behn, F. 24215* (SI)].

Adesmia elegans Clos
Sin.: *Patagonium elegans* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gay, C. 579* (P, SI)].

Adesmia elongata Phil. = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia emarginata Clos
Sin.: *Patagonium emarginatum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–2700 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VII, VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19144* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9560* (SI)].

Adesmia eremophila Phil.
Sin.: *Adesmia latistipula* Phil. ex Reiche, *Patagonium eremophilum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Kausel, E. M. L. 5113* (SI)].

Adesmia erinacea Phil.
Sin.: *Adesmia senticula* Phil., *Patagonium erinaceum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium erinaceum* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Patagonium senticulum* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 2500–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL); CHL(II, III).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 31788* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 834* (SI)].

Adesmia exilis Clos
Sin.: *Adesmia berteroi* Phil. ex Kuntze, nom. nud., *Adesmia decumbens* Phil., *Adesmia decumbens* Phil. var. *berteroi* Phil. ex G.F. Grandjot & K. Grandjot, *Adesmia humifusa* Phil., *Adesmia inconspicua* Phil., *Adesmia tristis* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Adesmia valdesia* Clos, *Patagonium berteroi* (Kuntze) Speg., comb. superfl., *Patagonium confertum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *berteroi* Kuntze, *Patagonium decumbens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium exile* (Clos) Kuntze, *Patagonium humifusum* Kuntze, *Patagonium inconspicum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triste* Chodat & Wilczek, *Patagonium valdesium* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1964b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1982.

Hierba. Perenne. Endémica. 1400–3300 m.
Países: ARG(MEN); CHL(IV, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Wilczek, E. 113* (SI, US)]; CHL[*Zöllner, O. 7283* (SI)].

Adesmia fabrisii Burkart = **Adesmia stenocaulon** Hauman
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia fernandezii Phil. = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia filicaulis Phil.
Sin.: *Patagonium filicaule* (Phil.) Kuntze, *Patagonium radicans* (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Sparre, B. B. 17699* (SI)].

Adesmia filifolia Clos
Sin.: *Patagonium filifolium* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Wagenknecht, R. 7* (SI)].

Adesmia filipes A. Gray
Sin.: *Adesmia filipes* A. Gray var. *obcordata* Hicken, *Adesmia filipes* A. Gray var. *obtusifolia* Speg., *Patagonium filipes* (A. Gray) Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 3716* (BAB, SI)].

Adesmia filipes A. Gray var. *obcordata* Hicken = **Adesmia filipes** A. Gray
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia filipes A. Gray var. *obtusifolia* Speg. = **Adesmia filipes** A. Gray
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

[Adesmia firma Poepp.]
Referencias: Burkart, A., 1939a.
Notas: Nombre dudoso.

Adesmia friesii Burkart ex Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 30746* (SI)].

Adesmia frigida Phil.
Sin.: *Adesmia adenophora* Phil., *Patagonium adenophorum* (Phil.) Reiche, *Patagonium frigidum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1980.
Subarbusto. Endémica. 1900–4500 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 1637* (SI)].

Adesmia fuentesii G.F. Grandjot
Referencias: Burkart, A., 1966a; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Morrison, J. L. 17056* (SI)].

Adesmia furcata Phil. = **Adesmia argyrophylla** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia gayana Phil. = **Adesmia echinus** C. Presl
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia genistoides C. Presl = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia germainii Phil. = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia gilliesii Hook. & Arn. = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **gilliesii** (Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glabriuscula Vogel = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glandulifera (Rendle) Rowlee = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glandulifolia Steibel & Ulibarri
Referencias: Steibel, P. & Ulibarri, E. A., 1999; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 1200–1700 m.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 15584* (BAB, SI)].

Adesmia glanduligera I.M. Johnst. = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glandulosa Phil. = **Adesmia atacamensis** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia glareosa (Chodat & Wilczek) Hauman = **Adesmia longipes** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glauca Phil. = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glaucescens Phil.
Sin.: *Patagonium araucanum* (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche, *Patagonium glaucescens* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Burkart, A. 9601* (SI)].

Adesmia globosa Davyt & Izag.
Referencias: Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: ARG(ERI, MIS); URY(ART, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 25964* (SI)]; URY[*Burkart, A. 15778* (SI)].

Adesmia glomerula Clos var. **australior** Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1964b, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1700–2700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VII, VIII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 9657* (SI)]; CHL[*Cabrera, A. 3652* (SI)].

Adesmia glomerula Clos var. **glomerula**
Sin.: *Adesmia compacta* Phil., *Adesmia humilis* Phil., *Patagonium compactum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium glomerulum* (Clos) Kuntze, *Patagonium humile* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1964b, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 4176* (SI)]; CHL[*Gay, C. 865* (K, NY, P, SI)].

Adesmia glutinosa Arechav., hom. illeg. = **Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia glutinosa Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium glutinosum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Skottsberg, C. J. F., 1946.
Arbusto. Endémica. 700–3000 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 1810* (SI)].

Adesmia godoyae (Phil. ex Reiche) Martic.
Sin.: *Patagonium godoyae* Phil. ex Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C., 1995; Marticorena, C., 2001[2000].
Arbusto. Endémica. 700–1000 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Teillier A., S. 4730* (CONC)].

Adesmia gracilis Meyen ex Vogel
Sin.: *Patagonium gracile* (Meyen ex Vogel) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a; Marticorena, C., 1995; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 200–3000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR); CHL(IV, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 10743* (BAB, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 882* (SI)].

Adesmia gracillima I.M. Johnst.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5428* (GH, SI)].

Adesmia graminidea Speg.
Sin.: *Patagonium graminideum* (Speg.) Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 3971* (BAA, BAB, SI)].

Adesmia grandiflora Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia calocarpa* Phil., *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *calocarpa* (Phil.) Kurtz, *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *gracilis* Kurtz, *Patagonium calocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium grandiflorum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1954; Steibel, P., 2001[2000]; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–1900 m.
Países: ARG(LPA, MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14960* (SI)].

Adesmia grandiflora Gillies ex Hook. & Arn. var. *calocarpa* (Phil.) Kurtz = **Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia grandiflora Gillies ex Hook. & Arn. var. *gracilis* Kurtz = **Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia graveolens Phil. = **Adesmia obscura** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia grisea Hook. f. = **Adesmia incana** Vogel var. **grisea** (Hook. f.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1967b; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia grisebachii Phil. = **Adesmia retusa** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia guttulifera Sandwith
Referencias: Burkart, A., 1962; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Steibel, P., 2001[2000]; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Sin.: Sin.: *Adesmia calocarpa* Phil., *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *calocarpa* (Phil.) Kurtz, *Adesmia grandiflora* Gillies ex Hook. & Arn. var. *gracilis* Kurtz, *Patagonium calocarpum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium grandiflorum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Arbusto. Endémica. 100–1600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ancibor, E. s.n.* (SI)].

Adesmia hedysaroides (Schrank) Hauman = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **muricata**
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b.

Adesmia hemisphaerica Hauman
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 3200–3600 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 4126* (BAB, CTES, SI)].

Adesmia herteri Looser = **Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**
Referencias: Burkart, A., 1967b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia hirsuta Phil.
Sin.: *Patagonium hirsutum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Germain, P. s.n.* (SGO, SI)].

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia capricornica* Gillies ex Hook. & Arn., nom. nud., *Adesmia horridiuscula* Burkart, *Adesmia horridiuscula* Burkart f. *sericea* Burkart, *Adesmia leucopogon* Phil., *Adesmia pyramidata* Burkart, *Patagonium horridum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium leucopogon* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Nativa. 2800–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 3049* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 403* (CONC, SI)].

Adesmia horrida Gillies ex Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn. = **Adesmia minor** (Hook. & Arn.) Burkart var. **minor**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia horridiuscula Burkart = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia horridiuscula Burkart f. *sericea* Burkart = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia humifusa Phil. = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1964b; Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia humilis Phil. = **Adesmia glomerula** Clos var. **glomerula**
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia hunzikeri Burkart
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Hierba. Anual. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 4726* (SI)].

Adesmia hystrix Phil.
Sin.: *Adesmia sentis* Phil., *Adesmia villanuevae* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium hystrix* (Phil.) Kuntze, *Patagonium sentis* (Phil.) Reiche, *Patagonium villanuevae* Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Luebert B., F. & Gajardo M., R., 1999; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 2000–4100 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 836* (SI)].

Adesmia incana Vogel var. **grisea** (Hook. f.) Burkart
Sin.: *Adesmia grisea* Hook. f., *Patagonium griseum* (Hook. f.) Speg.
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967a, b, 1987a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SFE); URY(COL, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 23680* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 9001* (MVFA)].

Adesmia incana Vogel var. *heterotricha* Burkart = **Adesmia incana** Vogel var. **incana**
Referencias: Burkart, A., 1967a, b; Burkart, A., 1987a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia incana Vogel var. **incana**
Sin.: *Adesmia angulata* Hook. f., *Adesmia incana* Vogel var. *heterotricha* Burkart, *Patagonium incanum* (Vogel) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967a, b, 1987a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, LPA, MIS, SAL, SLU); BRA(RGS); URY(CLA, COL, DUR, FLA, PAY, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 10314* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 1250* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 1166* (SI)].

Adesmia incana Vogel var. **oblata** Davyt & Izag.
Referencias: Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: URY(LAV, MAL, RIV, SOR, TYT).
Ejemplares de Referencia: URY[*Izaguirre, P. 21040b* (MVFA)].

Adesmia inconspicua Phil. = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A., 1980.

Adesmia inflexa Griseb.
Sin.: *Adesmia tucumanensis* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1985a.
Arbusto. Endémica. 1800–3700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 410* (CORD, GOET, SI)].

Adesmia inflexa Griseb. var. *brevisetosa* Burkart = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia inflexa Griseb. var. *sericeophylla* Burkart = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia inflexa Griseb. var. *tenuispina* Burkart = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia inflexa Griseb. var. *viscidisepala* Burkart = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia intricata Phil. ex Reiche, nom. nud. = **Adesmia pungens** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia izquierdi Phil. ex Reiche = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia jilesiana Burkart
Referencias: Burkart, A., 1962, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1991, 1994a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4200 m.
Países: ARG(SJU); CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 7612* (SI)]; CHL[*Jiles P., C. 2498* (CONC, SI)].

Adesmia karraikensis Speg.
Sin.: *Adesmia negeri* Dusén, *Patagonium karraikense* (Speg.) Speg., *Patagonium negeri* (Dusén) Macloskie
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1964b, 1967a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 1186* (LIL, S, SI, UC, US)].

Adesmia karraikensis Speg. f. *relaxata* Hicken = **Adesmia obcordata** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia kingii Phil.
Sin.: *Adesmia divaricata* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Patagonium kingii* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 200–1200 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 718* (SI)].

Adesmia lanata Hook. f.
Sin.: *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–900 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(IX, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, A. 2597* (SI)]; CHL[*Burkart, A. 9600* (SI)].

Adesmia landbecki Phil.
Sin.: *Patagonium landbecki* (Phil.) Kuntze, *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Pfister, A. 7094* (SI)].

Adesmia latifolia (Spreng.) Vogel
Sin.: *Aeschynomene latifolia* Spreng., *Patagonium latifolium* (Spreng.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1987a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15087* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 30927* (PACA)]; URY[*Rosengurtt, B. 1675* (MVFA, SI)].

Adesmia latistipula Phil. ex Reiche = **Adesmia eremophila** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia laxa Clos
Sin.: *Patagonium laxum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Marticorena, A. 1477* (SI)].

Adesmia leiocarpa Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia psilocarpa* Phil., *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium psilocarpum* (Phil.) Kuntze

Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Behn, F. 8517* (SI)].

Adesmia leptacantha Phil. = **Adesmia obovata** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia leptobotrys Burkart
Referencias: Burkart, A., 1954; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Steibel, P., 2001
Hierba. Anual. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 18617* (SI)].

Adesmia leptopoda Speg. = **Adesmia pumila** Hook. f.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1954.

Adesmia leucopogon Phil. = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia lihuelensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. s.n.* (SI)].

Adesmia littoralis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 25083* (SI)].

Adesmia longipes Phil.
Sin.: *Adesmia glareosa* (Chodat & Wilczek) Hauman, *Patagonium glareosum* Chodat & Wilczek, *Patagonium longipes* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1949c, 1962, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1300–3200 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 11559* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 886* (SI)].

Adesmia longiseta DC.
Sin.: *Patagonium longisetum* (DC.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Burkart, A., 1964b, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3200 m.
Países: CHL(VI, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Grandjot, G. F. 1012* (SI)].

Adesmia lotoides Hook. f.
Sin.: *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *brachypoda* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *elata* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *normalis* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *petiolulata* Speg., *Adesmia lotoides* Hook. f. f. *tipica* Speg., nom. inval., *Adesmia lotoides* Hook. f. var. *vaginata* Hook. f., *Adesmia unifoliolata* Skottsb., *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Kuntze, *Patagonium lotoides* (Hook. f.) Reiche, comb. superfl.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 16127* (BAB, SI)]; CHL[*Dominguez, E. 26* (SI)].

Adesmia lotoides Hook. f. f. *brachypoda* Speg. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia lotoides Hook. f. f. *elata* Speg. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia lotoides Hook. f. f. *normalis* Speg. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia lotoides Hook. f. f. *petiolulata* Speg. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia lotoides Hook. f. f. *tipica* Speg., nom. inval. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia lotoides Hook. f. var. *vaginata* Hook. f. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia loudonia Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium loudonii* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl.
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Garaventa, A. 1652* (SI)].

Adesmia macrostachya Benth.
Sin.: *Patagonium macrostachyum* (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1954, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, ERI, MIS, SFE, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5884* (SI)].

[Adesmia maulina (Reiche) K. Schum.]
Sin.: *Patagonium maulinum* Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Notas: Nombre dudoso.

Adesmia medinae (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sin.: *Patagonium medinae* (Phil. ex Reiche) Reiche
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: CHL(VII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Acevedo, C. s.n.* (SI)].

Adesmia melanocarpa (Phil. ex Reiche) Dyer = **Adesmia multicuspis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1960a; Burkart, A., 1967b.

Adesmia melanocaulos Phil.
Sin.: *Adesmia diaziana* I.M. Johnst., *Patagonium melanocaulon* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 18357* (SI)].

Adesmia melanthes Phil.
Sin.: *Patagonium melanthes* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Nativa. 3700–4200 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 662* (SI)].

Adesmia mendozana Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 1700–2400 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33340* (SI)].

Adesmia meyeniana Phil. = **Adesmia prostrata** Clos var. **prostrata**
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Adesmia micrantha Phil.
Sin.: *Patagonium micranthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Adesmia microcalyx Phil. var. **calvescens** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 5215* (SI)].

Adesmia microcalyx Phil. var. **microcalyx**
Sin.: *Patagonium microcalyx* (Phil.) Reiche
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Smith, L. B. 89* (CONC)].

Adesmia microphylla Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia spinosa* A. Lesson, *Patagonium microphyllum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Skottsberg, C. J. F., 1946; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Burckhardt 10* (SI)].

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. **caespitosa** (Phil.) Ulibarri & Burkart
Sin.: *Adesmia caespitosa* Phil., *Patagonium caespitosum* (Phil.) Reiche
Referencias: Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 3800–4400 m.
Países: ARG(CAT, SAL, SJU); CHL(II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31858* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1025* (S, SI)].

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. **minor**
Sin.: *Adesmia caespitosa* Gillies ex Hook., nom. nud., *Adesmia horrida* Gillies ex Hook. & Arn. var. *minor* Hook. & Arn., *Adesmia subterranea* Clos var. *glabriuscula* Phil., nom. nud.
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 3082* (SI)].

Adesmia minor (Hook. & Arn.) Burkart var. **riojana** (Burkart) Ulibarri
Sin.: *Adesmia riojana* Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 3500–3800 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 5409* (SI)].

Adesmia miraflorensis J. Remy
Sin.: *Adesmia clarenii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia nordenskioldii* (R.E. Fr.) Burkart, *Adesmia polyacantha* Wedd., *Adesmia vicina* J.F. Macbr., *Patagonium clarenii* R.E. Fr., *Patagonium miraflorensis* (J. Remy) Rusby, *Patagonium nordenskioldii* R.E. Fr.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1984a, 1986.
Arbusto. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 7790* (SI)].

Adesmia monosperma Clos
Sin.: *Adesmia calycosa* Phil., *Patagonium calycosum* (Phil.) Reiche, *Patagonium monospermum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 200–2600 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 3786* (SI)].

Adesmia montana Phil.
Sin.: *Patagonium montanum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2100–2800 m.
Países: CHL(IV, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (SI)].

Adesmia morenonis Harms = **Adesmia villosa** Hook. f.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia mucronata Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia closii* Phil., *Patagonium closii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Luebert B., F. & Muñoz-Schick, M., 2005; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 1053* (SI)].

Adesmia multicuspis Clos
Sin.: *Adesmia melanocarpa* (Phil. ex Reiche) Dyer, *Adesmia oxalidophylla* Phil., *Patagonium multicuspe* (Clos) Kuntze, *Patagonium oxalidophyllum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b.
Hierba. Anual. Endémica. 1100–2300 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 548* (CONC)].

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. **affinis** (Hook. f.) Burkart
Sin.: *Adesmia affinis* Hook. f., *Patagonium affine* (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Burkart, A., 1954; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(COL, FLA, MAL, MON, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Dawson, G. 20* (SI)]; BRA[*Malme, G. O. A. 130b* (S)]; URY[*Berro, M. B. 1898* (SI)].

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Sin.: *Adesmia dentata* (Lag.) DC., *Adesmia muricata* (Jacq.) DC. var. *pimpinellifolia* (Poir.) Burkart, *Aeschynomene dentata* Lag., *Hedysarum pimpinellifolium* Poir., *Patagonium dentatum* (Lag.) Kuntze, *Patagonium grandidentatum* Rusby
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Nativa. 300–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, ERI, JUJ, LPA, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC);
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 25951* (SI)].

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. **gilliesii** (Hook. & Arn.) Burkart
Sin.: *Adesmia gilliesii* Hook. & Arn., *Patagonium gilliesii* (Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SFE, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 6668* (SI)].

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. **muricata**
Sin.: *Adesmia hedysaroides* (Schrank) Hauman, *Hedysarum muricatum* Jacq., *Patagonium hedysaroides* Schrank, *Patagonium muricatum* (Jacq.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1954, 1967b; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1966; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, ERI, LPA, RNE, SFE, TUC); BRA(RGS); URY(CAS, MON, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Soriano, A. 2739* (BAB, SI)]; BRA[*Capparelli, P. N. s.n.* (PACA)]; URY[*Rosengurtt, B. 5213b* (MVFA)].

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. *pimpinellifolia* (Poir.) Burkart = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia muricata (Jacq.) DC. var. **rionegrensis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fischer, W. 87* (SI)].

[Adesmia nana (Chodat & Wilczek) Hauman]
Sin.: *Patagonium nanun* Chodat & Wilczek
Referencias: Burkart, A., 1939a; Chodat, R. H. & Wilczek, E., 1902; Hauman, L. L., 1919b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Notas: Nombre dudoso. Probablemente sinónimo de *Adesmia echinus*.

Adesmia nanolignea Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949c; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Subarbusto. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 2177* (SI)].

Adesmia negeri Dusén = **Adesmia karraikensis** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia neglecta M.N. Correa
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Correa, M. N., 1981; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 1200–1300 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Arroyo-Leuenberger, S. 36* (BAB, SI)].

Adesmia neuquenensis Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 1100–1700 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 32989* (SI)].

Adesmia neuquenensis Speg. ex Autran, nom. nud. = **Adesmia retusa** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia nordenskioldii (R.E. Fr.) Burkart = **Adesmia miraflorensis** J. Remy
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia obcordata Clos
Sin.: *Adesmia karraikensis* Speg. f. *relaxata* Hicken, *Patagonium obcordatum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 200–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VI, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 24322* (SI)]; CHL[*Gay, C. s.n.* (P)].

Adesmia obovata Clos
Sin.: *Adesmia leptacantha* Phil., *Patagonium leptacanthum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obovatum* (Clos) Kuntze
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 200–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14101* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 1045* (SI)].

Adesmia obscura Clos
Sin.: *Adesmia graveolens* Phil., *Adesmia serrazziana* Speg., *Adesmia villosa* Phil., *Patagonium graveolens* (Phil.) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze, *Patagonium obscurum* (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche, *Patagonium serrazzianum* (Speg.) Speg., *Patagonium villosum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Arbusto. Endémica. 2000–3400 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 10287* (SI)].

Adesmia occulta (R.E. Fr.) Burkart
Sin.: *Adesmia patancana* Ulbr., *Patagonium occultum* R.E. Fr., *Patagonium patancanum* (Ulbr.) Rusby
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1984a.
Subarbusto. Nativa. 3000–4400 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10441* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1129* (SI)].

Adesmia odontophylla Phil.
Sin.: *Patagonium odontophyllum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Geisse, G. s.n.* (SGO)].

Adesmia oligophyla Phil. var. *quadripinnata* Hicken = **Adesmia quadripinnata** (Hicken) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia oligophylla Phil. = **Adesmia capitellata** (Clos) Hauman
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia oresigena Phil. = **Adesmia arachnipes** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia oxalidophylla Phil. = **Adesmia multicuspis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia palenae Phil. = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia pampeana Speg.
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 25632* (SI)].

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. **papposa**
Sin.: *Adesmia arvensis* Phil., *Adesmia chillanensis* Phil., *Adesmia elongata* Phil., *Aeschynomene papposa* Lag., *Patagonium arvense* (Phil.) Kuntze, *Patagonium chillanense* (Phil.) Reiche, *Patagonium elongatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium leiocarpum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche, *Patagonium papposum* (Lag.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1960a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 10812* (SI)]; CHL[*Gay, C. 357* (SGO)].

Adesmia papposa (Lag.) DC. var. **radicifolia** (Clos) M.N. Correa
Sin.: *Adesmia radicifolia* Clos, *Patagonium radicifolium* (Clos) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hierba. Perenne. Endémica. 0–3100 m.
Países: ARG(NEU); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 10881* (SI)]; CHL[*Bertero, C. L. G. 766* (SI)].

Adesmia paranensis Burkart
Sin.: *Adesmia psoraleoides* Vogel var. *glabrata* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6417* (K, MBM, SI, UEC)].

Adesmia parviflora Clos
Sin.: *Patagonium parviflorum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2600 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Worth, C. R. 16363* (SI)].

Adesmia parvifolia Phil.
Sin.: *Adesmia axillaris* Phil., *Adesmia parvifolia* Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche, *Patagonium axillare* (Phil.) Kuntze, *Patagonium lanatum* (Hook. f.) Kuntze var. *axillaris* (Phil.) Speg., *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche, *Patagonium parvifolium* (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vervoorst, F. B. 5799* (BAB, SI)]; CHL[*Behn, F. s.n.* (SI)].

Adesmia parvifolia Phil. var. *axillaris* (Phil.) Reiche = **Adesmia parvifolia** Phil.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b.

Adesmia parvula Phil. = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia patagonica Speg.
Sin.: *Adesmia patagonica* Speg. var. *nana* Speg., *Patagonium patagonicum* (Speg.) Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Steibel, P., 2001[2000]; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 1100–1500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 10740* (BAB, SI)].

Adesmia patagonica Speg. var. *nana* Speg. = **Adesmia patagonica** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia patancana Ulbr. = **Adesmia occulta** (R.E. Fr.) Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1984a.

Adesmia pauciflora Vogel
Sin.: *Patagonium pauciflorum* (Vogel) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Meyen, F. J. F. s.n.* (B)].

Adesmia pearcei Phil.
Sin.: *Patagonium pearcei* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Volkmann, H. s.n.* (SGO)].

Adesmia pedicellata Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia calopogon* Phil., *Adesmia deserticola* Phil., *Adesmia genistoides* C. Presl, *Adesmia ulicina* C. Presl, *Patagonium deserticolum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Kuntze, *Patagonium genistoides* (C. Presl) Reiche, comb. superfl., *Patagonium pedicellatum* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Patagonium ulicinum* (C. Presl) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 0–2800 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Marticorena, C. 185* (SI)].

Adesmia pendula Poir. = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia pentaphylla Phil.
Sin.: *Patagonium pentaphyllum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 2200–3000 m.
Países: ARG(MEN); CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14900* (SI)].

Adesmia peraltae (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sin.: *Patagonium peraltae* Phil. ex Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 4937* (SI)].

Adesmia philippiana (Hosseus) Burkart = **Adesmia trifoliata** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia phylloidea Clos
Sin.: *Adesmia virgata* Bertero ex Steud., nom. nud., *Patagonium phylloideum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1964b.

Arbusto. Endémica. 100–1400 m.
Países: CHL(IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 101* (SI)].

Adesmia pinifolia Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium pinifolium* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 1500–3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1465* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. 3907* (SI)].

Adesmia pirionii I.M. Johnst.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 100–900 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jaffuel, F. 228* (CONC)].

Adesmia polyacantha Wedd. = **Adesmia miraflorensis** J. Remy
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia polygaloides (Chodat & Wilczek) Burkart = **Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia polyphylla Phil.
Sin.: *Patagonium polyphyllum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 3200–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zoellner, O. 840* (SI)].

Adesmia propinqua Clos
Sin.: *Adesmia dendroides* Phil., *Patagonium dendrodes* (Phil.) Kuntze, *Patagonium propinquum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 100–1500 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Morrison, J. L. 17462* (SI)].

Adesmia prostrata Clos var. **eglandulosa** Burkart
Sin.: *Adesmia coluteoides* Phil., *Patagonium coluteoides* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1966a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1500 m.
Países: CHL(IV, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Marticorena, C. 809* (SI)].

Adesmia prostrata Clos var. **prostrata**
Sin.: *Adesmia meyeniana* Phil., *Patagonium meyenianum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium prostratum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1966a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1500 m.
Países: CHL(VI, VII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gay, C. 555* (SGO, SI)].

Adesmia pseudogrisea Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 5425* (SI)].

Adesmia pseudoincana Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1200–1700 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 3932* (SI, UC)].

Adesmia psilocarpa Phil. = **Adesmia leiocarpa** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia psoraleoides Vogel
Sin.: *Patagonium psoralodes* (Vogel) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 700–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3356* (SI)].

Adesmia psoraleoides Vogel var. *glabrata* Benth. = **Adesmia paranensis** Burkart
Referencias: Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993.

Adesmia pugionata Griseb. = **Adesmia cytisoides** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia pulchra Phil. = **Adesmia viscosa** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia pumahuasiana Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Nativa. 3400–4000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 9460* (BAB, SI)].

Adesmia pumila Hook. f.
Sin.: *Adesmia leptopoda* Speg., *Patagonium leptopodum* (Speg.) Speg., *Patagonium pumilum* (Hook. f.) Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–900 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 950* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 25* (SI)].

Adesmia pumila Hook. f. var. *aurantiaca* Dusén = **Adesmia aurantiaca** (Dusén) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia punctata (Poir.) DC. var. **hilariana** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b, 1987a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 1495* (SI)]; BRA[*Pabst, G. F. J. 6176* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 11451* (MVFA)].

Adesmia punctata (Poir.) DC. var. **punctata**
Sin.: *Adesmia calycina* Vogel, *Adesmia glutinosa* Arechav., hom. illeg., *Adesmia herteri* Looser, *Adesmia uruguaya* Arechav., *Adesmia viciifolia* Herter, *Hedysarum punctatum* Poir.
Referencias: Burkart, A., 1939a,1967b, 1987a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Seijo, G. J. 650* (MNES, SI)]; BRA[*Rambo, B. 65333* (PACA)]; URY[*Del Puerto, O. 9434* (MVFA)].

Adesmia punctata (Poir.) DC. var. **sessiliflora** Davyt & Izag.
Referencias: Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(PAY, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Marchesi, E. 20600* (MVFA)].

Adesmia pungens Clos
Sin.: *Adesmia intricata* Phil. ex Reiche, nom. nud., *Patagonium intricatum* Phil., *Patagonium pungens* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 0–2100 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 4060* (SI)].

Adesmia pusilla Phil.
Sin.: *Patagonium pusillum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Endémica. 100–600 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 830* (SI)].

Adesmia pyramidata Burkart = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia quadrijuga Phil. = **Adesmia volckmannii** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia quadripinnata (Hicken) Burkart
Sin.: *Adesmia oligophyla* Phil. var. *quadripinnata* Hicken, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart f. *punctata* Burkart, *Adesmia quadripinnata* (Hicken) Burkart var. *pygmaea* Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1960a, 1966a, 1967b; Forcone, A., 2002; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 800–2600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU); CHL(VII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 24683* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 584* (SI)].

Adesmia quadripinnata (Hicken) Burkart f. *punctata* Burkart = **Adesmia quadripinnata** (Hicken) Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia quadripinnata (Hicken) Burkart var. *pygmaea* Burkart = **Adesmia quadripinnata** (Hicken) Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia radicans Clos = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia radicifolia Clos = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **radicifolia** (Clos) M.N. Correa
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia rafaelensis (Chodat & Wilczek) Hicken = **Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia ragonesei Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1962; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 1700–1800 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 120* (BA, SI)].

Adesmia rahmeri Phil.
Sin.: *Patagonium rahmeri* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1954; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 2600–4400 m.
Países: ARG(CAT, SAL); CHL(II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 8799* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 18215* (SI)].

Adesmia ramosissima Phil.
Sin.: *Patagonium ramosissimum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: CHL(IV, VI).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Pfister, A. s.n.* (CONC)].

Adesmia reclinata Muñoz
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Muñoz-Pizarro, C., 1948.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Marticorena, C. 104* (SI)].

Adesmia reitziana Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1967b; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993.
Subarbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2943* (SI)].

Adesmia remyana Phil. = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia renjifoana Phil., nom. nud. = **Adesmia renjifoana** (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia renjifoana (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Sin.: *Adesmia renjifoana* Phil., nom. nud., *Patagonium renjifoanum* Phil. ex Reiche
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 1500–2600 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 10084* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 10008* (SI)].

Adesmia resinosa (Phil. ex Reiche) Martic.
Sin.: *Patagonium resinosum* Phil. ex Reiche
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].
Arbolito. Endémica. 1700–2000 m.
Países: CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16792* (SI)].

Adesmia retrofracta Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia polygaloides* (Chodat & Wilczek) Burkart, *Adesmia rafaelensis* (Chodat & Wilczek) Hicken, *Adesmia retrofracta* Hook. & Arn. var. *rectirostris* (Chodat & Wilczek) Burkart, *Patagonium polygaloides* Chodat & Wilczek, *Patagonium rafaelense* Chodat & Wilczek, *Patagonium retrofractum* Chodat & Wilczek var. *rectirostris* Chodat & Wilczek
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1800 m.
Países: ARG(COR, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 12068* (SI)].

Adesmia retrofracta Hook. & Arn. var. *rectirostris* (Chodat & Wilczek) Burkart = **Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia retusa Griseb.
Sin.: *Adesmia grisebachii* Phil., *Adesmia neuquenensis* Speg. ex Autran, nom. nud., *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze, *Patagonium retusum* (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1800 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE); CHL(X).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6244* (SI)]; CHL[*Dawson, G. 2790* (SI)].

Adesmia rigida Skottsb. = **Adesmia schneideri** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia riograndensis Miotto
Referencias: Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Miotto, S. T. S., 1993.
Hierba. Anual. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Valls, J. F. M. 11931* (CEN, ICN, K, NY, SI, UEC)].

Adesmia riojana Burkart = **Adesmia minor** (Hook. & Arn.) Burkart var. **riojana** (Burkart) Ulibarri
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia rocinhensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1962, 1967b; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 45367* (SI)].

Adesmia rubroviridis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1964d, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 2200–2600 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 3807* (SI)].

Adesmia rudolfi Speg. = **Adesmia canescens** Phil., hom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia ruiz-lealii Burkart ex M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1981; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–2000 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 26456* (MERL, SI)].

Adesmia rupicola Wedd. = **Adesmia spinosissima** Meyen
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia salamancensis Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1962, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23806* (SI)].

Adesmia salicornioides Speg.
Sin.: *Adesmia carnosa* Dusén, *Patagonium carnosum* (Dusén) Speg., *Patagonium salicornioides* (Speg.) Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1964b, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(SCR, TDF); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 27046* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 50* (SI)].

Adesmia sandwithii Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Comber, T. 114* (K, SI)].

Adesmia sanjuanensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1960a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986, 1994a.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 2300–3000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Spegazzini, R. A. 184* (BAB, SI)].

Adesmia schickendanzii Griseb.
Sin.: *Adesmia amblysepala* Solms
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1996a.
Subarbusto. Nativa. 2900–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5577* (SI)].

Adesmia schneideri Phil.
Sin.: *Adesmia rigida* Skottsb., *Patagonium schneideri* (Phil.) Kuntze, *Patagonium schneideri* (Phil.) Reiche, comb. superfl.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 200–3300 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, SCR); CHL(III, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Botta, S. M. 536* (SI)]; CHL[*Barros, E. 5288* (SI)].

Adesmia securigerifolia Herter
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1967b, 1987a; Davyt, M. & Izaguirre, P., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Miotto, S. T. S., 1993; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–100 m.
Países: ARG(ERI); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, PAY, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2085* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 9615* (CEN)]; URY[*Rosengurtt, B. 5313pe* (MVFA, SI)].

Adesmia senticula Phil. = **Adesmia erinacea** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia sentis Phil. = **Adesmia hystrix** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia serrana M.N. Correa
Referencias: Correa, M. N., 1981; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 400–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Piccinini, B. 1601* (BAB, SI)].

Adesmia serrazziana Speg. = **Adesmia obscura** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia sessiliflora Phil.
Sin.: *Patagonium sessiliflorum* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1000–2300 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 3660* (SI)].

Adesmia silvestrii (Speg.) Burkart
Sin.: *Patagonium silvestrii* Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Silvestri, F. s.n.* (LPS)].

Adesmia simonsi Phil. = **Adesmia viscida** Bertero ex Colla
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia smithiae DC.
Sin.: *Patagonium smithiae* (DC.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1949c, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 21901* (SI)].

Adesmia smithiae DC. var. *misera* Phil. = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **misera** (Phil.) Skottsb.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia spinosa A. Lesson = **Adesmia microphylla** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia spinosissima Meyen
Sin.: *Adesmia alcicornutum* Rusby, *Adesmia rupicola* Wedd., *Patagonium alcicornutum* Rusby, *Patagonium spinosissimum* (Meyen) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Nativa. 2700–4300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II, III).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10469* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 25529* (SI)].

Adesmia spuma Werderm. ex Burkart
Referencias: Burkart, A., 1964b, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SJU); CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Nicora, E. G. 8505* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 210* (SI)].

Adesmia stenocaulon Hauman
Sin.: *Adesmia fabrisii* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1964b, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1991, 1994a.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hauman, L. L. 169* (BA, SI)].

Adesmia stipulacea Clos = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia subsericea (Chodat & Wilczek) Hauman = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia subsericea (Chodat & Wilczek) Hauman var. *nigro-punctata* Hauman = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia subterranea Clos
Sin.: *Patagonium subterraneum* (Clos) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1954, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1994a.
Subarbusto. Endémica. 1200–4300 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU); CHL(III, IV, V).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 3188* (SI)]; CHL[*Gay, C. 496* (G, P, SI)].

Adesmia subterranea Clos var. *glabriuscula* Phil., nom. nud. = **Adesmia minor** (Hook. & Arn.) Burkart var. **minor**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia subumbellata Phil. = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia suffocata Hook. f.
Sin.: *Patagonium suffocatum* (Hook. f.) Macloskie
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1962; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Subarbusto. Endémica. 300–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Donat, A. 71* (SI)].

Adesmia sulina Miotto
Referencias: Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Miotto, S. T. S., 1993.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 1000–1400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 13615* (SI)].

Adesmia tehuelcha Speg.
Sin.: *Patagonium tehuelches* (Speg.) Speg.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1939a, 1967b; Spegazzini, C. L., 1899; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ameghino, C. s.n.* (LPS)].

Adesmia tenella Hook. & Arn. var. **macrocarpa** Ulibarri
Sin.: *Patagonium angustifolium* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1982.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 5237* (SI)].

Adesmia tenella Hook. & Arn. var. **misera** (Phil.) Skottsb.
Sin.: *Adesmia smithiae* DC. var. *misera* Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1982.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Worth, C. R. 16550* (SI)].

Adesmia tenella Hook. & Arn. var. **tenella**
Sin.: *Adesmia angustifolia* Hook. & Arn., *Adesmia parvula* Phil., *Adesmia vesicaria* Bertero ex Colla, *Patagonium parvulum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium tenuicaule* (Phil.) Reiche, *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. superfl., *Patagonium vesicarium* (Bertero ex Colla) Reiche
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1982.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1300 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Jiles, C. 1786* (SI)].

Adesmia tenuis Phil. = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia tomentosa Meyen
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 1011* (SI)].

Adesmia torcaea Phil.
Sin.: *Patagonium torcaeum* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–3200 m.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. 133b* (SI)].

Adesmia trifoliata Phil.
Sin.: *Adesmia philippiana* (Hosseus) Burkart, *Patagonium philippianum* Hosseus, *Patagonium trifoliatum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium triphyllum* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 2000 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Hutchison, P. C. 97* (SI)].

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn. var. **epunctata** Burkart
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1962, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 200–400 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zardini, E. M. 92* (SI)].

Adesmia trifoliolata Gillies ex Hook. & Arn. var. **trifoliolata**
Sin.: *Patagonium trifoliolatum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1962, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 200–2300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(V, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 21920* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17065* (SI)].

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia arnottiana* Gillies ex Hook., *Adesmia capricornu* Phil., *Adesmia cervicornis* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *brevisetosa* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *sericeophylla* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *tenuispina* Burkart, *Adesmia inflexa* Griseb. var. *viscidisepala* Burkart, *Patagonium trijugum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986, 1994a, 1996a.
Arbusto. Endémica. 900–3700 m.
Países: ARG(CAT, CHU, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, SAL, SCR, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 7073* (SI)].

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn. var. *remyana* (Phil.) Burkart = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia trijuga Gillies ex Hook. & Arn. var. *robustior* Hook. & Arn. = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia tristis Vogel
Referencias: Burkart, A., 1967b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Endémica. 500–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 35041* (SI)].

Adesmia tristis (Chodat & Wilczek) Hauman = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1964b; Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia tucumanensis Burkart = **Adesmia inflexa** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia tunuianica Burkart
Referencias: Burkart, A., 1962, 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Arbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 1122* (SI)].

Adesmia ulicina C. Presl = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia unifoliolata Skottsb. = **Adesmia lotoides** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia uruguaya Arechav. = **Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**
Referencias: Burkart, A., 1967b, 1987a.

Adesmia uspallatensis Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Patagonium uspallatense* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986, 1994a.
Arbusto. Endémica. 1900–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU); CHL(V, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5530* (BAB, SI)]; CHL[*Ricardi, M. 2409* (CONC)].

Adesmia valdesia Clos = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1964b; Burkart, A., 1967b.

Adesmia vallis-pulchrae Phil., nom. nud. = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia vallsii Miotto
Referencias: Miotto, S. T. S. & Leitão, H. F., 1993; Miotto, S. T. S., 1993.
Hierba subleñosa. Perenne. Endémica. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 13022* (SI, US)].

Adesmia venosa Phil. = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia verrucosa Meyen
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Arbusto. Nativa. 1700–3600 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zoellner, O. 5002* (CONC)].

Adesmia vesicaria Bertero ex Colla = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.

Adesmia viciifolia Herter = **Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**
Referencias: Burkart, A., 1967b; Burkart, A., 1987a.

Adesmia vicina J.F. Macbr. = **Adesmia miraflorensis** J. Remy
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia villanuevae Phil. ex Reiche, nom. nud. = **Adesmia hystrix** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Adesmia villosa Phil. = **Adesmia obscura** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Adesmia villosa Hook. f.
Sin.: *Adesmia morenonis* Harms, *Adesmia villosa* Hook. f. var. *acutifolia* Speg., *Adesmia villosa* Hook. f. var. *glabrata* (Speg.) Burkart, *Patagonium morenonis* (Harms) Kuntze, *Patagonium villosum* (Hook. f.) Speg. var. *glabratum* Speg.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Burkart, A., 1939a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2400 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33172* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 3* (SI)].

Adesmia villosa Hook. f. var. *acutifolia* Speg. = **Adesmia villosa** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Adesmia villosa Hook. f. var. *glabrata* (Speg.) Burkart = **Adesmia villosa** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

[Adesmia virens Phil.]
Sin.: *Patagonium virens* (Phil.) Reiche
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.
Notas: Nombre dudoso.

Adesmia virgata Bertero ex Steud., nom. nud. = **Adesmia phylloidea** Clos
Referencias: Burkart, A., 1964d, 1967b.

Adesmia viscida Bertero ex Colla
Sin.: *Adesmia aprica* Phil., *Adesmia simonsi* Phil., *Patagonium apricum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium mucronatum* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche, *Patagonium simonsii* (Phil.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16852* (SI)].

Adesmia viscidissima I.M. Johnst.
Referencias: Burkart, A., 1967b.
Hierba. Perenne. Endémica. 700–800 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Eggli, U. 2651* (CONC)].

Adesmia viscosa Gillies ex Hook. & Arn.
Sin.: *Adesmia pulchra* Phil., *Patagonium pulchrum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium viscosum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939a, 1967b; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 5123* (SI)].

Adesmia volckmannii Phil.
Sin.: *Adesmia campestris* (Rendle) Rowlee, *Adesmia quadrijuga* Phil., *Patagonium campestre* Rendle, *Patagonium quadrijugum* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Kuntze, *Patagonium volckmannii* (Phil.) Reiche, comb. superfl.
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1967b; Eskuche, U. G., 1996; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000; Ulibarri, E. A., 1986.
Arbusto. Endémica. 200–2200 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, VIII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14488* (SI)]; CHL[*Volckmann, G. s.n.* (SGO, SI)].

Adesmia zoellneri Ulibarri
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1985b.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zoellner, O. 9129* (SI)].

Adipera corymbosa (Lam.) Britton & Rose = **Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Aeschynomene L.

Número de especies: 21, 4 endémicas, 1 introducida

Aeschynomene americana L.
Sin.: *Aeschynomene americana* L. var. *depila* Millsp., *Aeschynomene americana* L. var. *glandulosa* (Poir.) Rudd, *Aeschynomene glandulosa* Poir.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rudd, V. E., 1955.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, SFE); PRY(CON, COA, GUA, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1142* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4619* (SI)].

Aeschynomene americana L. var. *depila* Millsp. = **Aeschynomene americana** L.

Aeschynomene americana L. var. *glandulosa* (Poir.) Rudd = **Aeschynomene americana** L.
Referencias: Howard, R. A., 1988.

Aeschynomene apoloana Rusby = **Aeschynomene falcata** (Poir.) DC. var. **falcata**
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene arenicola Brandegee = **Aeschynomene elegans** Schltdl. & Cham.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene bispinosa Jacq. = **Sesbania bispinosa** (Jacq.) W. Wight
Referencias: Rudd, V. E., 1955.

Aeschynomene bonariensis Speg. = **Aeschynomene rudis** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a.

[Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC.]
Sin.: *Hedysarum brasilianum* Poir.
Referencias: Vanni, R. O., 1997.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. f. *multijuga* Chodat & Hassl. = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **multijuga** (Chodat & Hassl.) Rudd
Referencias: Vanni, R. O., 1997.

Aeschynomene cachemiriana Cambess. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene conferta Benth. = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **histrix**
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene densiflora Benth. = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **densiflora** (Benth.) Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene dentata Lag. = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rudd, V. E., 1955; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Aeschynomene denticulata Rudd
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1955.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, COA, GUA); URY(ART, RNO, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 21210* (SI)]; BRA[*Capparelli, P. N. 241* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7726* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15379* (MVFA)].

Aeschynomene diffusa Klein ex Willd. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene echinus Vogel = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **multijuga** (Chodat & Hassl.) Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham.
Sin.: *Aeschynomene arenicola* Brandegee, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. f. *glabrior* Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *elegans* (Schltdl. & Cham.) Kuntze, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *plurijuga* Benth., *Aeschynomene gracilis* Vogel, *Aeschynomene tecta* Vogel
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1955, 1959.
Hierba. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4314* (US)].

Aeschynomene eriocarpa Standl. & Steyerm. = **Aeschynomene viscidula** Michx.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene evenia C. Wright
Referencias: Rudd, V. E., 1955.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 7* (GH), *Zuloaga, F. O. 3804* (SI)].

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. f. *glabrior* Kuntze = **Aeschynomene elegans** Schltdl. & Cham.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. *elegans* (Schltdl. & Cham.) Kuntze = **Aeschynomene elegans** Schltdl. & Cham.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. **falcata**
Sin.: *Aeschynomene apoloana* Rusby, *Aeschynomene falcata* (Poir.) DC. var. *paucijuga* Benth., *Hedysarum diffusum* Vell., *Hedysarum falcatum* Poir.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1955, 1959.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14188* (SI, US)]; BRA[*Rambo, B. 46876* (US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3595* (MO, NY)].

[Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. glabra Micheli]
Notas: Nombre dudoso.

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. **hassleri** Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1959.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 7461* (K, NY)].

[Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. microphylla Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. *paucijuga* Benth. = **Aeschynomene falcata** (Poir.) DC. var. **falcata**
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene falcata (Poir.) DC. var. *plurijuga* Benth. = **Aeschynomene elegans** Schltdl. & Cham.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene fluminensis Vell.
Sin.: *Aeschynomene scoparia* Splitg.
Referencias: Rudd, V. E., 1955.
Subarbusto. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1457* (K)].

Aeschynomene fructipendula Abruzzi de Oliveira
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 1995, 2002.
Subarbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Abruzzi Aragão de Oliveira, M. L. 2449* (CTES, HAS)].

Aeschynomene glaberrima Poir. = **Aeschynomene indica** L.
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 1991.

Aeschynomene glandulosa Poir. = **Aeschynomene americana** L.
Referencias: Howard, R. A., 1988.

Aeschynomene gracilis Miq., hom. illeg. = **Aeschynomene paniculata** Willd. ex Vogel

Aeschynomene gracilis Vogel = **Aeschynomene elegans** Schltdl. & Cham.

Aeschynomene hedysaroides M. Martens & Galeotti = **Aeschynomene paniculata** Willd. ex Vogel

[Aeschynomene hispidula Kunth]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aeschynomene histrix Poir. var. **apana** Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1959.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4387* (GH, SI, US)].

Aeschynomene histrix Poir. var. **densiflora** (Benth.) Rudd
Sin.: *Aeschynomene densiflora* Benth.
Referencias: Rudd, V. E., 1955, 1959.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10955* (GH)].

Aeschynomene histrix Poir. var. **histrix**
Sin.: *Aeschynomene conferta* Benth., *Aeschynomene histrix* Poir. var. *mucronulata* (Benth.) Benth., *Aeschynomene mucronulata* Benth., *Secula hystrix* (Poir.) Small
Referencias: Burkart, A., 1987a; Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rudd, V. E., 1955, 1959.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: BRA(RGS); PRY(CON, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Miotto, S. T. S. 1172* (ICN)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5220* (GH, US)].

Aeschynomene histrix Poir. var. **incana** (Vogel) Benth.
Sin.: *Aeschynomene incana* Vogel, *Aeschynomene puberula* DC.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rudd, V. E., 1955, 1959.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(APY, CON, COA); URY(ART, COL, MON, RNO, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vattuone, I. C. 178* (BAF)]; BRA[*Sobral, M. 919* (ICN)]; PRY[*Mereles, F. 6195* (FCQ), *Vanni, R. O. 2254* (CTES)]; URY[*Seijo, G. J. 2416* (CTES)].

Aeschynomene histrix Poir. var. *mucronulata* (Benth.) Benth. = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **histrix**
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene histrix Poir. var. **multijuga** (Chodat & Hassl.) Rudd
Sin.: *Aeschynomene brasiliana* (Poir.) DC. f. *multijuga* Chodat & Hassl., *Aeschynomene echinus* Vogel
Referencias: Rudd, V. E., 1959.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAA, CAN, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15344* (SI, US)]; PRY[*Jiménez, B. 1584* (BM, CTES, PY)].

Aeschynomene incana Vogel = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **incana** (Vogel) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rudd, V. E., 1955.

Aeschynomene indica L.
Sin.: *Aeschynomene cachemiriana* Cambess., *Aeschynomene diffusa* Klein ex Willd., *Aeschynomene glaberrima* Poir., *Aeschynomene indica* L. var. *punctata* Pers., *Aeschynomene indica* L. var. *viscosa* Miq., *Aeschynomene macropoda* DC., *Aeschynomene montana* Span., *Aeschynomene oligantha* Welw. ex Baker, *Aeschynomene pumila* L., *Aeschynomene punctata* Steud., *Aeschynomene quadrata* Schumach. & Thonn., *Aeschynomene roxburgii* Spreng., *Aeschynomene subviscosa* DC., *Hedysarum alpinum* Lour., *Hedysarum neli-tali* Roxb., *Hedysarum virginicum* Lour.
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 1991, 2002.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Silveira, N. J. E. 6314* (HAS)].

Aeschynomene indica L. var. *punctata* Pers. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene indica L. var. *viscosa* Miq. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene laevis M. Martens & Galeotti = **Aeschynomene paniculata** Willd. ex Vogel

Aeschynomene latifolia Spreng. = **Adesmia latifolia** (Spreng.) Vogel
Referencias: Burkart, A., 1966a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Aeschynomene lorentziana Bacigalupo & Vanni
Referencias: Bacigalupo, N. M. & Vanni, R. O., 1984; Burkart, A., 1987a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); URY(ART, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1363* (CTES, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 14849* (MVFA)].

Aeschynomene macropoda DC. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene magna Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1955.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4340* (US)].

Aeschynomene mollicula Kunth
Sin.: *Aeschynomene pauciflora* Vogel
Referencias: Rudd, V. E., 1955.
Subarbusto. Nativa. 300–600 m.
Países: PRY(CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 2816* (K)].

Aeschynomene montana Span. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene montevidensis Vogel
Sin.: *Aeschynomene montevidensis* Vogel var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Macromiscus brasiliensis* Turcz.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rudd, V. E., 1955; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PHA, SPE); URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 3962* (SI), *Hurrell, J. A. 5459* (MU, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12129* (HBR)]; PRY[*Degen, R. 3336* (CTES, FCQ), *Fortunato, R. H. 1160* (BAB, SI)]; URY[*Berro, M. B. 2291* (MVFA), *Cabrera, A. 2816* (SI)].

Aeschynomene montevidensis Vogel var. *microphylla* Chodat & Hassl. = **Aeschynomene montevidensis** Vogel
Referencias: Rudd, V. E., 1955.

Aeschynomene mucronulata Benth. = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **histrix**
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene natans Hassl. = **Aeschynomene rudis** Benth.

Aeschynomene oligantha Welw. ex Baker = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel
Sin.: *Aeschynomene gracilis* Miq., hom. illeg., *Aeschynomene hedysaroides* M. Martens & Galeotti, *Aeschynomene laevis* M. Martens & Galeotti
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Rudd, V. E., 1955; Vanni, R. O., 1983.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 1083* (BAB, SI), *Hassler, E. 12017* (GH)].

Aeschynomene papposa Lag. = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Aeschynomene paraguayensis Rudd
Sin.: *Aeschynomene selloi* Vogel f. *scabra* Chodat & Hassl.
Referencias: Rudd, V. E., 1955.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6694* (GH, MO)].

Aeschynomene parviflora Micheli
Referencias: Burkart, A., 1939c; Rudd, V. E., 1955.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, AMA, CEN, CON, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3220a* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5010* (SI, US)].

Aeschynomene pauciflora Vogel = **Aeschynomene mollicula** Kunth

Aeschynomene pratensis Small var. **caribaea** Rudd
Referencias: Vanni, R. O., 2003.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*López, M. G. 341* (CTES, G, SI)].

Aeschynomene prostrata Poir. = **Aeschynomene viscidula** Michx.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene puberula DC. = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **incana** (Vogel) Benth.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene pumila L. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene punctata Steud. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene quadrata Schumach. & Thonn. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene roxburgii Spreng. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene rudis Benth.
Sin.: *Aeschynomene bonariensis* Speg., *Aeschynomene natans* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1955.

Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, PHA, SPE); URY(SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 12788* (CTES)]; BRA[*Schultz 225* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2893* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1903* (MVFA)].

Aeschynomene scoparia Splitg. = **Aeschynomene fluminensis** Vell.

Aeschynomene selloi Vogel
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rambo, B., 1966.
Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7777* (NY)]; PRY[*Pin, A. B. 342* (PY)].

Aeschynomene selloi Vogel f. *scabra* Chodat & Hassl. = **Aeschynomene paraguayensis** Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1955.

Aeschynomene sensitiva P. Beauv., nom. superfl. = **Aeschynomene sensitiva** Sw.

Aeschynomene sensitiva Sw.
Sin.: *Aeschynomene sensitiva* P. Beauv., nom. superfl., *Aeschynomene sensitiva* Sw. var. *paucifoliolata* Chodat & Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Oliveira, M. L. A. A., 2002; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1955; Vanni, R. O., 1983.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vanni, R. O. 1533* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 2498* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 217* (SI), *Mereles, F. 6060* (CTES, FCQ, MO)].

Aeschynomene sensitiva Sw. var. *paucifoliolata* Chodat & Hassl. = **Aeschynomene sensitiva** Sw.

Aeschynomene sesban L. = **Sesbania sesban** (L.) Merr.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Aeschynomene subviscosa DC. = **Aeschynomene indica** L.

Aeschynomene tecta Vogel = **Aeschynomene elegans** Schltdl. & Cham.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Aeschynomene virgata Cav. = **Sesbania virgata** (Cav.) Pers.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

[Aeschynomene virginica (L.) Britton, Stern & Poggenb.]
Sin.: *Hedysarum virginicum* L.
Referencias: Rudd, V. E., 1955.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Aeschynomene viscidula Michx.
Sin.: *Aeschynomene eriocarpa* Standl. & Steyerm., *Aeschynomene prostrata* Poir., *Secula viscidula* (Michx.) Small
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Rudd, V. E., 1959; Vanni, R. O., 1997.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Insfrán, P. 995* (CTES)]; PRY[*Mereles, F. 4109* (FCQ)].

Affonsea comosa Benth. = **Inga globularis** T.D. Penn.

Affonsea dusenii Harms = **Inga edwallii** (Harms) T.D. Penn.

Affonsea edwallii Harms = **Inga edwallii** (Harms) T.D. Penn.

Affonsea hirsuta Harms = **Inga edwallii** (Harms) T.D. Penn.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Affonsea juglandifolia A. St.-Hil. = **Inga globularis** T.D. Penn.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Affonsea schwebeliana Harms = **Inga edwallii** (Harms) T.D. Penn.

Albizia Durazz.

Número de especies: 5, 1 endémica

Albizia austrobrasilica Burkart = **Albizia edwallii** (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Albizia burkartiana Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.
Árbol. Endémica. 600–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 14359* (HBR, NY, SI)].

Albizia caribaea (Urb.) Britton & Rose = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart

Albizia distachya (Vent.) J.F. Macbr. = **Albizia lophantha** (Willd.) Benth.

Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Albizia austrobrasilica* Burkart, *Pithecellobium edwallii* Hoehne
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.
Árbol. Nativa. 200–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vanni, R. O. 3309* (BAB, CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 3511* (SI)].

Albizia guacamayo (Britton & Killip) L. Cardenas = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart

Albizia hassleri (Chodat) Burkart = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984.

Albizia inundata (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Acacia inundata* Mart., *Acacia polyantha* Spreng., *Albizia polyantha* (A. Spreng.) G.P. Lewis, *Arthrosamanea polyantha* (A. Spreng.) Burkart, *Arthrosamanea polycephala* (Griseb.) Burkart, *Cathormion polyanthum* (A. Spreng.) Burkart, *Cathormion polycephalum* (Griseb.) Burkart, hom. illeg., *Enterolobium polycephalum* Griseb., *Feuilleea polycephala* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium multiflorum* (Kunth) Benth. var. *brevipedunculata* Chodat & Hassl., *Pithecellobium pendulum* Lindm.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1949c, 1964b, 1979b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hoc, P. S., 1992b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CAA, CEN, CON, COA, PHA); URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1364* (SI)]; BRA[*Sellow, F. s.n.* (VT)]; PRY[*Mereles, F. 4551* (CTES, FCQ, MO, NY)]; URY[*Berro, M. B. 1641* (MVFA), *Osten, C. 18005* (SI)].

Albizia lophantha (Willd.) Benth.
Sin.: *Acacia lophantha* Willd., *Albizia distachya* (Vent.) J.F. Macbr., *Feuilleea distachya* (Vent.) Kuntze, *Mimosa distachya* Vent., *Mimosa lophantha* (Willd.) Pers., *Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: CHL(V, IJF).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Boelcke, O. 3919* (SI)].
Notas: Especie cultivada desde antiguo en el continente americano, siendo dudoso que sea nativa en Chile.

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart
Sin.: *Acacia guacamayo* (Britton & Killip) Standl., *Albizia caribaea* (Urb.) Britton & Rose, *Albizia guacamayo* (Britton & Killip) L. Cardenas, *Albizia hassleri* (Chodat) Burkart, *Albizia richardiana* King & Prain, *Feuilleea niopiodes* (Spruce ex Benth.) Kuntze, *Pithecellobium caribaeum* Urb., *Pithecellobium hassleri* Chodat, *Pithecellobium niopoides* Spruce ex Benth., *Senegalia guacamayo* Britton & Killip, *Senegalia liebmannii* Britton & Rose
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Tressens, S. G., 1981.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14236* (SI), *Schwarz, G. J. 5180* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 52401* (MBM)]; PRY[*Lillo, M. 10611* (SI), *Stutz, L. C. 1246* (G)].

Albizia polyantha (A. Spreng.) G.P. Lewis = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

[Albizia polycephala (Benth.) Killip]
Sin.: *Pithecellobium polycephalum* Benth.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Albizia richardiana King & Prain = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Amarenus flavus C. Presl = **Trifolium dubium** Sibth.
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Amarenus spadiceus (L.) C. Presl = **Trifolium spadiceum** L.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c; Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Amburana Schwacke & Taub.

Número de especies: 1

Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm.
Sin.: *Torresea cearensis* Allemão
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Ulibarri, E. A., 1997c.
Árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zabala, S. 111* (SI)]; PRY[*Bernardi, L. 19177* (G), *Hassler, E. 8392* (G)].

Amerimnon brasiliense (Vogel) Kuntze = **Dalbergia brasiliensis** Vogel

Amerimnon ecastaphyllum (L.) Standl. = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Amerimnon lateriflorum (Benth.) Kuntze = **Dalbergia lateriflora** Benth.

Amicia Kunth

Número de especies: 3

Amicia andicola (Griseb.) Harms
Sin.: *Zornia andicola* Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1952a; Mohlenbrock, R. H., 1961.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–3400 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 355* (SI)].

Amicia fimbriata Harms
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1952a.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 30708* (SI)].

Amicia medicaginea Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1952a.
Hierba. Anual. Nativa. 2000–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 171* (SI), *Morrone, O. 4387* (SI)].

Amoria bonannii (C. Presl) Roskov = **Trifolium fragiferum** L. subsp. **bonanni** (C. Presl) Soják

Amoria fragifera (L.) Roskov = **Trifolium fragiferum** L. subsp. **fragiferum**

Amoria hybrida (L.) C. Presl = **Trifolium hybridum** L. var. **hybridum**

Amoria obcordata (Desv.) C. Presl = **Trifolium polymorphum** Poir. var. **polymorphum**
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Amoria polymorpha (Poir.) C. Presl = **Trifolium polymorphum** Poir. var. **polymorphum**
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Amoria repens (L.) C. Presl = **Trifolium repens** L.

Amoria resupinata (L.) Roskov = **Trifolium resupinatum** L.

Amoria suffocata (L.) R.M. Burton = **Trifolium suffocatum** L.

Amoria suffocata (L.) Soják, nom. illeg. = **Trifolium suffocatum** L.

Amorpha L.

Número de especies: 1 introducida

Amorpha fruticosa L.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Wilbur, R. L., 1975.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, SFE, TUC); URY(CLA, FLA, MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 5421* (MU, SI), *Troncoso, N. S. 2169* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8283* (MVFA)].

Amphicarpaea ovalifolia (Kunth) Seckt = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Amphicarpaea pulchella (Kunth) Taub. = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Anadenanthera Speg.

Número de especies: 2

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Sin.: *Acacia cebil* Griseb., *Anadenanthera macrocarpa* (Benth.) Brenan, *Piptadenia cebil* (Griseb.) Griseb., *Piptadenia hassleriana* Chodat, *Piptadenia hassleriana* Chodat var. *fruticosa* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *microcarpa* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *puberula* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. f. *rupestris* Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *cebil* (Griseb.) Chodat & Hassl., *Piptadenia macrocarpa* Benth. var. *vestita* Chodat & Hassl., *Piptochaetium macrocarpa* Benth. var. *plurifoliata* Hoehne
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964; Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 2000; Dimitri, M. J., 1974a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 4538* (SI), *Zuloaga, F. O. 7515* (SI)]; BRA[*Schwarz, G. J. 7273* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2141* (SI), *Zardini, E. M. 13224* (FCQ, MO)].
Notas: Cultivada en Uruguay según Izaguirre & Beyhaut (2003) y en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. **colubrina**
Sin.: *Mimosa colubrina* Vell., *Piptadenia colubrina* (Vell.) Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lewis, G. P., 1987.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8744* (SI)].

Anadenanthera falcata (Benth.) Speg. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964; Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.
Sin.: *Acacia angustiloba* DC., *Acacia microphylla* Willd., *Acacia niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth, *Acacia peregrina* (L.) Willd., *Anadenanthera falcata* (Benth.) Speg., *Anadenanthera peregrina* (L.) Speg. var. *falcata* (Benth.) Altschul, *Mimosa acacioides* Benth., *Mimosa niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa parvifolia* Poir., *Mimosa peregrina* L., *Niopa peregrina* (L.) Britton & Rose, *Piptadenia falcata* Benth., *Piptadenia niopo* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spruce, *Piptadenia peregrina* (L.) Benth., *Piptadenia peregrina* (L.) Benth. var. *falcata* (Benth.) Chodat & Hassl.
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAN, ÑEE, PAI).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10952* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 5585* (SI), *Zardini, E. M. 5459* (FCQ, MO)].

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. var. *falcata* (Benth.) Altschul = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Anarthrophyllum Benth.

Número de especies: 15 endémicas

Anarthrophyllum andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Sin.: *Anarthrophyllum andicolum* (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz., *Anarthrophyllum juniperinum* (Meyen) F. Phil., *Genista andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Genista juniperina* Meyen
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.
Arbusto. Endémica. 0–1800 m.
Países: CHL(V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Morrison, J. L. 16736* (SI)].

Anarthrophyllum andicolum (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil. var. *bridgesii* Chodat & Wilcz. = **Anarthrophyllum andicolum** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum beaufilsii Kuntze = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.

Anarthrophyllum bergii Hieron. = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.

Anarthrophyllum brevistipula Phil. = **Anarthrophyllum rigidum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum burkartii Sorarú
Referencias: Sorarú, S. B., 1971, 1974b, 1984a.
Subarbusto. Endémica. 1400–2100 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pastore, F. 49* (SI)].

Anarthrophyllum capitatum Sorarú
Referencias: Sorarú, S. B., 1973, 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Castellanos 20184* (LIL)].

Anarthrophyllum catamarcense Sorarú
Referencia: Sorarú, S. B., 1971.
Arbusto. Endémica. 2700–3000 m.
Países: ARG (CAT).
Ejemplar de referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 4160* (LIL)].

Anarthrophyllum cumingii (Hook. & Arn.) F. Phil.
Sin.: *Anarthrophyllum cumingii* (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz., *Genista cumingii* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Sorarú, S. B., 1974b.
Arbusto. Endémica. 1800–3000 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Nicora, E. G. 4377* (SI)].

Anarthrophyllum cumingii (Hook. & Arn.) F. Phil. var. *angustifolia* Chodat & Wilcz. = **Anarthrophyllum cumingii** (Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum desideratum Neger, nom. illeg. = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. *bergii* (Hieron.) Speg. = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **desideratum**
Sin.: *Anarthrophyllum beaufilsii* Kuntze, *Anarthrophyllum bergii* Hieron., *Anarthrophyllum desideratum* (DC.) Benth. var. *bergii* (Hieron.) Speg., *Anarthrophyllum desideratum* Neger, nom. illeg., *Anarthrophyllum prichardii* Rendle, *Genista desiderata* DC.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Illin, N. 108b* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 92255* (CONC, SGO), *Ibar s.n.* (SI)].

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **morenonis** (Kuntze) Speg.
Sin.: *Anarthrophyllum morenonis* Kuntze
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Donat, A. 57* (SI)]; CHL[*Magens, O. s.n.* (CONC)].

Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. **mustersii** Speg.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (LP)].

Anarthrophyllum elegans (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Sin.: *Anarthrophyllum pungens* Chodat, *Genista elegans* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(MEN, NEU); CHL(V).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 9749* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. s.n.* (MO)].

Anarthrophyllum gayanum (A. Gray) B.D. Jacks.
Sin.: *Anarthrophyllum umbellatum* (Clos) F. Phil., *Genista gayana* A. Gray, *Genista umbellata* Clos
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A., 1949c; Gómez Sosa, E. V., 1994; Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.

Subarbusto. Endémica. 2000–3700 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 8566* (SI)]; CHL[*Worth, C. R. 16592* (SI)].

Anarthrophyllum juniperinum (Meyen) F. Phil. = **Anarthrophyllum andicolum** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum macrophyllum Sorarú
Referencias: Sorarú, S. B., 1973, 1984a.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 21487* (SI)].

Anarthrophyllum morenonis Kuntze = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **morenonis** (Kuntze) Speg.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum negeri Chodat & Wilczek = **Anarthrophyllum rigidum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum ornithopodum Sandwith
Referencias: Sandwith, N. Y., 1927; Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hicken, C. M. 21* (SI)].

Anarthrophyllum patagonicum Speg.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 33023* (SI)].

Anarthrophyllum pedicellatum Sorarú
Referencias: Sorarú, S. B., 1973, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Daciuk, J. 46xv* (SI)].

Anarthrophyllum prichardii Rendle = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.

Anarthrophyllum pungens Chodat = **Anarthrophyllum elegans** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.
Sin.: *Anarthrophyllum brevistipula* Phil., *Anarthrophyllum negeri* Chodat & Wilczek, *Anarthrophyllum rigidum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. var. *toninii* (Kuntze) Speg., *Anarthrophyllum toninii* Kuntze, *Genista rigida* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 200–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(VII, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 33039* (SI)]; CHL[*Neger, F. W. 18591* (SI)].

Anarthrophyllum rigidum (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron. var. *toninii* (Kuntze) Speg. = **Anarthrophyllum rigidum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Anarthrophyllum strigulipetalum Sorarú
Referencias: Sorarú, S. B., 1973, 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Neumeyer 527* (SI)].

Anarthrophyllum subandinum Speg.
Sin.: *Anarthrophyllum subandinum* Speg. var. *nahuelhuapensis* Speg.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6273* (SI)].

Anarthrophyllum subandinum Speg. var. *nahuelhuapensis* Speg. = **Anarthrophyllum subandinum** Speg.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum toninii Kuntze = **Anarthrophyllum rigidum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Anarthrophyllum umbellatum (Clos) F. Phil. = **Anarthrophyllum gayanum** (A. Gray) B.D. Jacks.
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1974b.

Andira Lam., nom. cons.

Número de especies: 3, 1 introducida

[Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr. var. anthelmia]
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Andira anthelmia (Vell.) J.F. Macbr. var. *gracilis* N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira bahiensis N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira excelsa Kunth = **Andira inermis** (W. Wright) DC.

Andira fraxinifolia Benth.
Sin.: *Andira anthelmia* (Vell.) J.F. Macbr. var. *gracilis* N.F. Mattos, *Andira bahiensis* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *lanceolata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *latifoliolata* N.F. Mattos, *Andira fraxinifolia* Benth. var. *rosea* (Mart. ex Benth.) Benth., *Andira handroana* N.F. Mattos, *Andira micans* Taub. ex Glaz., *Andira parvifolia* Mart. ex Benth., *Andira pernambucensis* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth., *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *emarginata* N.F. Mattos, *Andira pisonis* Mart. ex Benth. var. *puberula* N.F. Mattos, *Andira rosea* Mart. ex Benth., *Vouacapoua fraxinifolia* (Benth.) Kuntze, *Vouacapoua*

parvifolia (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua pisonis* (Mart. ex Benth.) Kuntze
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Pennington, R. T., 2003.
Arbusto, arbolito o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15117* (NY, US), *Hatschbach, G. 2710* (SI)].

Andira fraxinifolia Benth. var. *lanceolata* N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira fraxinifolia Benth. var. *latifoliolata* N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira fraxinifolia Benth. var. *rosea* (Mart. ex Benth.) Benth. = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira handroana N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira humilis Mart. ex Benth.
Sin.: *Andira humilis* Mart. ex Benth. var. *cordata* N.F. Mattos, *Andira laurifolia* Benth., *Andira pauciflora* Benth., *Vouacapoua humilis* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Vouacapoua laurifolia* (Benth.) Kuntze
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Pennington, R. T., 2003.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19955* (F, NY)]; PRY[*Jiménez, B. 1539* (BM, CTES, G, MO, PY), *Múlgura de Romero, M. E. 3631* (CTES, FCQ, SI)].

Andira humilis Mart. ex Benth. var. *cordata* N.F. Mattos = **Andira humilis** Mart. ex Benth.

Andira inermis (W. Wright) DC.
Sin.: *Andira excelsa* Kunth, *Andira inermis* (W. Wright) DC. var. *riedelii* Benth., *Andira riparia* Kunth, *Geoffraea inermis* W. Wright, *Glycyrrhiza undulata* Ruiz & Pav., *Vouacapoua inermis* (W. Wright) Lyon
Referencias: Pennington, R. T., 2003.
Árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(MIE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15795* (SPF)]; PRY[*Schinini, A. 25958* (GH, SI, SPF)].
Notas: Cultivada en Corrientes, Argentina.

Andira inermis (W. Wright) DC. var. *riedelii* Benth. = **Andira inermis** (W. Wright) DC.

Andira laurifolia Benth. = **Andira humilis** Mart. ex Benth.

Andira micans Taub. ex Glaz. = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira parvifolia Mart. ex Benth. = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira pauciflora Benth. = **Andira humilis** Mart. ex Benth.

Andira pernambucensis N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira pisonis Mart. ex Benth. = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira pisonis Mart. ex Benth. var. *emarginata* N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira pisonis Mart. ex Benth. var. *puberula* N.F. Mattos = **Andira fraxinifolia** Benth.

Andira riparia Kunth = **Andira inermis** (W. Wright) DC.

Andira rosea Mart. ex Benth. = **Andira fraxinifolia** Benth.

Anila asperifolia (Bong. ex Benth.) Kuntze = **Indigofera asperifolia** Bong. ex Benth.

Anila bongardiana Kuntze = **Indigofera bongardiana** (Kuntze) Burkart var. **bongardiana**
Referencias: Burkart, A., 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.

Anila kurtzii (Harms) Kuntze = **Indigofera kurtzii** Harms
Referencias: Burkart, A., 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.

Anila lespedezoides (Kunth) Kuntze = **Indigofera lespedezioides** Kunth

Anila pascuorum (Benth.) Kuntze = **Indigofera lespedezioides** Kunth

Anila sabulicola (Benth.) Kuntze = **Indigofera sabulicola** Benth.

Anila tinctoria (L.) Kuntze var. *brachycarpa* (DC.) Kuntze = **Indigofera suffruticosa** Mill.

Anila tinctoria (L.) Kuntze var. *vera* Kuntze = **Indigofera suffruticosa** Mill.
Referencias: Burkart, A., 1942b, 1987a; Gómez Sosa, E. V., 2000a.

Anneslia brevipes (Benth.) Lindm. = **Calliandra brevipes** Benth.

Anneslia chapaderoana Britton & Rose = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Anneslia cookii Britton & Rose = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Anneslia formosa (Kunth) Britton & Millsp. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Anneslia marginata (Griseb. ex R.O. Williams) Moldenke = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.

Anneslia parvifolia (Hook. & Arn.) Britton = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Hoc, P. S., 1992a.

Anneslia penduliflora (Rose) Britton & Rose = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.

Anneslia portoricensis (Jacq.) Donn. Sm. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Anneslia tweediei (Benth.) Lindm. = **Calliandra tweedii** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Apuleia Mart., nom. cons.

Número de especies: 1

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr.
Sin.: *Apuleia molaris* Spruce ex Benth., *Apuleia praecox* Mart., *Leptolobium leiocarpum* Vogel, *Platymiscium ellipticum* Rusby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Macbride, J. F., 1919; Rambo, B., 1966; Stutz, L. C., 1983; Ulibarri, E. A., 1997d.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(APA, CAN, COA, ITA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 423* (SI)]; BRA[*Camargo, O. 117* (PACA)]; PRY[*Stutz, L. C. 1879* (G)].

Apuleia molaris Spruce ex Benth. = **Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.

Apuleia praecox Mart. = **Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Macbride, J. F., 1919.

Apurimacia Harms

Número de especies: 1 endémica

Apurimacia dolichocarpa (Griseb.) Burkart
Sin.: *Tephrosia dolichocarpa* Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Gómez Sosa, E. V., 2000a, c.
Arbusto. Endémica. 1800–3000 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 29655* (SI), *Sayago, M. 967* (SI)].

Arachis L.

Número de especies: 20, 7 endémicas

Arachis angustifoilia (Chodat & Hassl.) Killip ex Hoehne = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis argentinensis Speg. ex Hoehne, nom. nud. = **Arachis duranensis** Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis batizocae Krapov. & W.C. Greg., nom. nud. = **Arachis batizocoi** Krapov. & W.C. Greg.

Arachis batizocoi Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis batizocae* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–700 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 25658* (CTES)].

Arachis burkartii Handro
Sin.: *Arachis marginata* auct. non Gardner, *Arachis marginata* Gardner f. *submarginata* Hoehne, p.p.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Handro, O., 1958; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 29116* (CTES, SI), *Troncoso, N. S. 1187* (SI)]; BRA[*Hammons, R. O. 362* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 1949* (MVFA), *Rosengurtt, B. 3715* (MVFA, SI)].

Arachis cardenasii Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 15219b* (CTES, G, MO, SI, US)].

Arachis chacoense Krapov. & W.C. Greg., nom. nud. = **Arachis diogoi** Hoehne
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis correntina (Burkart) Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis villosa* Benth. var. *correntina* Burkart
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CEN, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Clos, E. C. 5930* (BAB), *Zardini, E. M. 644* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 12593* (CTES, G, MO, NY, P, SI, US)].

Arachis diogoi Hoehne
Sin.: *Arachis chacoense* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis villosa* Benth. subsp. *diogoi* (Hoehne) A. Chev.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Krapovickas, A. 12404* (CTES, G, NY, SI, SP, US)].

Arachis diogoi Hoehne f. *submarginata* Hoehne, p.p.
= **Arachis paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis diogoi Hoehne subsp. *major* Hoehne, nom. nud.
= **Arachis major** Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis duranensis Krapov. & W.C. Greg., nom. nud.
= **Arachis duranensis** Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis duranensis Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Anual. Nativa. 200–1300 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 8010* (BAB, CTES, G, K, LIL, MO, SI), *Schinini, A. 21764* (CEN, CTES, GH, K, MEXU, MO, NY, SI, US)]; PRY[*Rojas, T. 7387* (SI)].

Arachis glabrata Benth. f. *major* Hoehne, nom. nud.
= **Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis glabrata Benth. f. *minor* Hoehne, nom. nud.
= **Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis glabrata Benth. var. **glabrata**
Sin.: *Arachis argentinensis* Speg. ex Hoehne, nom. nud., *Arachis duranensis* Krapov. & W.C. Greg., nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *major* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. f. *minor* Hoehne, nom. nud., *Arachis glabrata* Benth. var. *membranifolia* Benth. ex A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudomarginata* Chodat & Hassl., *Arachis spegazzinii* M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994; Mereles, F., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 7934* (CEN, CTES, LIL, SI, US)]; PRY[*Schinini, A. 21506* (SI)]; URY[*Seijo, G. J. 2418* (CTES)].

Arachis glabrata Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Sin.: *Arachis angustifoilia* (Chodat & Hassl.) Killip ex Hoehne, *Arachis hagenbeckii* Harms ex Kuntze, *Arachis marginata* Gardner subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Arachis prostrata* Benth. f. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne, *Arachis prostrata* Benth. var. *angustifolia* Chodat & Hassl. ex Hoehne
Referencias: Hermann, F. J., 1954; Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(APY, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4109* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7566a* (SI)].

Arachis glabrata Benth. var. *membranifolia* Benth. ex A. Chev. = **Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis guaranitica Chodat & Hassl.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 4975* (G, NY, UC), *Pedersen, T. M. 14681* (CTES)].

[Arachis guaranitica Bertoni]
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Notas: Nombre dudoso.

Arachis hagenbeckii Harms ex Kuntze = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Hermann, F. J., 1954; Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis hassleri Krapov., Valls & C.E. Simpson
Referencias: Valls, J. F. M. & Simpson, C. E., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Silva, G. P. 3818* (CEN, CTES, FCQ, G, MO, NY, P, SI, US)].

Arachis hoehnei Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 20563* (CTES)].

Arachis lignosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis marginata* Gardner var. *lignosa* (Chodat & Hassl.) A. Chev., *Arachis prostrata* Benth. f. *lignosa* Chodat & Hassl.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 14074* (SI)].

Arachis major Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne subsp. *major* Hoehne, nom. nud.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–300 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Krapovickas, A. 14444* (CEN, CTES, G, K, NY, SI, SP, US)].

Arachis marginata auct. non Gardner = **Arachis burkartii** Handro
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis marginata Gardner f. *submarginata* Hoehne, p.p. = **Arachis burkartii** Handro
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis marginata Gardner var. *lignosa* (Chodat & Hassl.) A. Chev. = **Arachis lignosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis marginata Gardner subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) A. Chev. = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis monticola Krapov. & Rigoni
Sin.: *Arachis pusilla* auct. non Benth.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994; Krapovickas, A. & Rigoni, V. A., 1957.
Hierba. Anual. Endémica. 1200–1600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ahumada, O. 9020* (SI), *Schinini, A. 21768* (CEN, CTES, G, LIL, MO, NY, SI, US)].

Arachis nitida Valls, Krapov. & C.E. Simpson
Referencias: Valls, J. F. M. & Simpson, C. E., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Silva, G. P. 3782* (CEN)].

Arachis paraguariensis Chodat & Hassl.
Sin.: *Arachis diogoi* Hoehne f. *submarginata* Hoehne, p.p., *Arachis prostrata* Benth. var. *intermedia* Chodat & Hassl.
Referencias: Basualdo, I. Z., Soria Rey, N., Keel, S. & Rivarola, N., 1997a; Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6358* (BM, G), *Krapovickas, A. 30015* (CEN, CTES, G, GH, MO, NY, P, RB, SI, SP, US)].

Arachis pflugeae C.E. Simpson, Krapov. & Valls
Referencias: Valls, J. F. M. & Simpson, C. E., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4277* (G, K, SI, US)].

Arachis prostrata Benth. f. *angustifolia* Chodat & Hassl. = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. f. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. f. *lignosa* Chodat & Hassl. = **Arachis lignosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. var. *angustifolia* Chodat & Hassl. ex Hoehne = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval. = **Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. var. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Arachis paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. var. *pseudomarginata* Chodat & Hassl. = **Arachis glabrata** Benth. var. **glabrata**
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. var. *pseudovillosa* Chodat & Hassl. = **Arachis pseudovillosa** (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. var. *villosa* (Benth.) A. Chev. = **Arachis villosa** Benth.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis prostrata Benth. subsp. *hagenbeckii* (Harms ex Kuntze) Hoehne = **Arachis glabrata** Benth. var. **hagenbeckii** (Harms ex Kuntze) F.J. Herm.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis pseudovillosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C. Greg.
Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *pseudovillosa* Chodat & Hassl.
Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5069* (BM, G, K, NY, P, UC), *Rojas, T. 6481* (SI)].

Arachis pusilla auct. non Benth. = **Arachis monticola** Krapov. & Rigoni
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis schininii Krapov., Valls & C.E. Simpson
Referencias: Valls, J. F. M. & Simpson, C. E., 2005.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Valls, J. F. M. 9923* (CEN, CTES, G, K, MO, NY, SI, SP, US)].

Arachis spegazzinii M.P. Greg. & W.C. Greg., nom. nud. = **Arachis duranensis** Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis stenosperma Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hammons, R. O. 410* (CTES, G, LIL, MO, NY, SI, US)].

Arachis villosa Benth.
Sin.: *Arachis prostrata* Benth. var. *villosa* (Benth.) A. Chev., *Stylosanthes leiocarpa* auct. non Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1111* (SI)]; BRA[*Valls, J. F. M. 14316* (ICN)]; URY[*Burkart, A. 18159* (SI), *Osten, C. 22545* (MVM)].

Arachis villosa Benth. var. *correntina* Burkart = **Arachis correntina** (Burkart) Krapov. & W.C. Greg.
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arachis villosa Benth. subsp. *diogoi* (Hoehne) A. Chev. = **Arachis diogoi** Hoehne
Referencias: Krapovickas, A. & Gregory, W. C., 1994.

Arcyphyllum leucophyllum Benth. = **Rhynchosia leucophylla** (Benth.) Benth.

Arthrolobium micranthum Benth. = **Ornithopus micranthus** (Benth.) Arechav.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Arthrosamanea polyantha (A. Spreng.) Burkart = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Arthrosamanea polycephala (Griseb.) Burkart = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Astragalus L.

Número de especies: 94, 74 endémicas

Astragalus aconcaguensis Speg. = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus affinis Steud. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus alberjilla Steud. = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus alfalfalis Phil. = **Astragalus germainii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus amatus Clos
Sin.: *Astragalus brachypterus* (Phil.) Reiche, *Astragalus chilensis* E. Sheld., *Astragalus ferrugineus* Clos, *Astragalus leucomallus* Phil., *Astragalus litoreus* Phil., *Astragalus procumbens* Hook. & Arn., *Astragalus subandinus* Speg., *Astragalus tricolor* (Clos) Reiche, *Phaca brachyptera* Phil., *Phaca tricolor* Clos, *Tragacantha brevialata* Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Garaventa, A. 3204* (SI), *Zöllner, O. 7894* (SI)].

Astragalus ameghinoi Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947; Spegazzini, C. L., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33047* (SI)].

Astragalus amoenus (Phil.) Reiche = **Astragalus philippianus** (Kuntze) Hauman
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus amunategui Phil. = **Astragalus cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.

Astragalus anni-novi Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969c; Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 25826* (MERL, SI)].

Astragalus araucanus (F. Phil.) Reiche = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus arequipensis Vogel
Sin.: *Astragalus bolivianus* Phil., *Astragalus drepanophrorus* Griseb., *Astragalus orbignyanus* Wedd., *Astragalus sinocarpus* Rusby
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947; Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 6740* (SI), *Morrone, O. 2585* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 3646* (SI)].

Astragalus argentinus Manganaro
Referencias: Burkart, A., 1967a; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Dusén, P. K. H. 6279* (LP)].

Astragalus arnottianus (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Astragalus nanus* (Phil.) Reiche, *Astragalus philippi* Speg., *Astragalus reedi* (Phil.) Hauman, *Phaca arnottiana* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca nana* Phil., *Phaca reedi* Phil., *Phaca uspallatensis* Phil.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4500 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Prina, A. O. 1539* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 9143* (SI)].

Astragalus asplundii I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1981; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 18977* (SI)].

Astragalus atacamensis (Kuntze) R.E. Fr. = **Astragalus bustillosii** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus atuelii Chodat & Wilczek = **Astragalus darumbium** (Bertero ex Colla) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus austroargentinus Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1976, 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 12822* (BAA, BAB, SI)].

Astragalus azureus Phil. ex Reiche = **Astragalus germainii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus barceloi Phil. = **Astragalus monticola** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus bellus (Kuntze) R.E. Fr.
Sin.: *Astragalus pulchellus* (Clos) Reiche, *Phaca pulchella* Clos, *Tragacantha bella* Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1981; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(MEN, SJU); CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27029* (SI)]; CHL[*Gay, C. 514* (SI)].

Astragalus benthamianus Gillies ex Hook. & Arn. = **Astragalus garbancillo** Cav.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus bergii Hieron.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1967a; Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cano, E. 519* (SI)].

Astragalus berteri Colla
Sin.: *Astragalus alberjilla* Steud., *Astragalus cauquenensis* Phil., *Astragalus concinnus* (Phil.) Reiche, *Astragalus elongatus* (Phil.) Reiche, *Astragalus filifolius* Clos, *Astragalus gratus* (Clos) Reiche, *Astragalus pencanus* Phil., *Astragalus prostratus* Hook. & Arn., *Astragalus rhudolphi* Speg., *Phaca concinna* Phil., *Phaca grata* Clos, *Tragacantha longior* Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 4357* (SI)].

Astragalus berterianus (Moris) Reiche
Sin.: *Astragalus aconcaguensis* Speg., *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus dolichostachys* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche, *Astragalus laxiflorus* (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche, *Astragalus oblongifolius* Clos, *Astragalus placens* Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche, *Astragalus sphaerocarpus* Clos, *Phaca berteriana* Moris, *Phaca canescens* Hook. & Arn., *Phaca dissitiflora* Phil., *Phaca dolichostachya* Phil., *Phaca laxiflora* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1200 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Looser, G. s.n.* (SI)].

Astragalus boelckei Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1992, 1994.
Hierba. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(LRI, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 4628* (SI)].

Astragalus bolivianus Phil. = **Astragalus arequipensis** Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus bonariensis Gómez-Sosa
Sin.: *Astragalus distans* Gray var. *beta* Gray
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, MEN, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart 25634* (SI)].

Astragalus brachycalyx Phil. = **Astragalus bustillosii** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus brachypterus (Phil.) Reiche = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus brachytropis (Phil.) Reiche, comb. superfl. = **Astragalus maulensis** Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1997e.

Astragalus brevicaulis Dusén, nom. illeg. = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.

Astragalus burkartii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2924* (SI)].

Astragalus bustillosii Clos
Sin.: *Astragalus atacamensis* (Kuntze) R.E. Fr., *Astragalus brachycalyx* Phil., *Astragalus depauperatus* (Phil.) Reiche, *Astragalus tarapacanus* Speg., *Phaca depauperata* Phil., *Phaca saxifraga* Phil., *Tragacantha atacamensis* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, MEN, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 6725* (SI)]; CHL[*Morrison, J. L. 17252* (SI)].

Astragalus cachinalensis Phil.
Sin.: *Tragacantha cachinalensis* (Phil.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II, III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5825* (G, K, US)].

Astragalus canescens (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg. = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus canescens (Hook. & Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche = **Astragalus pissisii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus capitellus Britton = **Astragalus micranthellus** Wedd.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus carinatus (Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Phaca andicola* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca carinata* Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 30415* (MEN, SI)].

Astragalus cauquenensis Phil. = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus chamissonis (Vogel) Reiche
Sin.: *Astragalus araucanus* (F. Phil.) Reiche, *Astragalus chilensis* (Nees) Reiche, hom. illeg., *Astragalus laetevirens* Phil., *Astragalus monospermus* Phil., *Astragalus ochroleucus* (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg., *Astragalus ovallensis* Clos, *Astragalus placens* Clos, *Astragalus volckmannii* Phil., *Phaca araucana* F. Phil., *Phaca chamissonis* Vogel, *Phaca chilensis* Nees, *Phaca ochroleuca* Hook. & Arn.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE); CHL(III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gerling, G. F. 259* (SI)]; CHL[*Jiles, C. 1668* (SI)].

Astragalus chilensis (Nees) Reiche, hom. illeg. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus chilensis E. Sheld. = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus chrysanthus (Moris) Reiche, nom. illeg. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus chubutensis Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947; Spegazzini, C. L., 1902b.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–3300 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Nicora, E. G. 9198* (SI)].

Astragalus clandestinus (Phil.) Hieron. = **Astragalus cryptobotrys** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus clandestinus (Phil.) Hieron. var. *flossdorfii* Hicken = **Astragalus cryptobotrys** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus closianus Phil. = **Astragalus germainii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus colhuensis Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1982, 1984.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 4127* (BAA, BAB, SI)].

Astragalus compactus (Phil.) Reiche = **Astragalus reichei** Speg.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus complicatus Gillies
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–2900 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gillies, J. s.n.* (K)].

Astragalus concinnus (Phil.) Reiche = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus confinis I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–2500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Troll, C. 3305* (B)].

Astragalus coquimbensis (Hook. & Arn.) Reiche
Sin.: *Astragalus vasticola* I.M. Johnst., *Phaca atacamensis* Phil., *Phaca carrizalensis* Phil., *Phaca coquimbensis* Hook. & Arn.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 16182* (SI)].

Astragalus cruckshanksii (Hook. & Arn.) Griseb.
Sin.: *Astragalus amunategui* Phil., *Astragalus landbecki* (Phil.) Reiche, *Phaca cruckshanksii* Hook. & Arn., *Phaca landbecki* Phil., *Tragacantha cruckshanksii* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 800–3600 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU); CHL(III, IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 6425* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 4049* (SI)].

Astragalus crymophilus I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4200 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1263* (SI)].

Astragalus cryptanthus Wedd.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 1159* (G, K)].

Astragalus crypticus I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5407* (SI)].

Astragalus cryptobotrys I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus clandestinus* (Phil.) Hieron., *Astragalus clandestinus* (Phil.) Hieron. var. *flossdorfii* Hicken, *Phaca clandestina* (Phil.) Hieron., *Phaca cryptantha* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 3700–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 4563* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1034* (CONC)].

Astragalus curvicaulis (Clos) Reiche
Sin.: *Astragalus elatus* (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl., *Phaca curvicaulis* Clos, *Phaca elata* Hook. & Arn., *Tragacantha curvicaulis* (Clos) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 2969* (SI)].

Astragalus cuyanus Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1982, 1984.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Roig, F. 4739* (MERL, SI)].

Astragalus darumbium (Bertero ex Colla) Clos
Sin.: *Astragalus atuelii* Chodat & Wilczek, *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche, *Astragalus macrophysus* (Phil.) Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche, *Phaca macrophysa* Phil., *Phaca robusta* Phil., *Sutherlandia darumbium* Bertero ex Colla, *Tragacantha firma* Kuntze
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2700 m.
Países: ARG(MEN); CHL(VI, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14881* (SI)]; CHL[*Bertero, C. L. G. 679* (BM, P)].

Astragalus deminutivus I.M. Johnst. = **Astragalus diminutivus** (Phil.) Gómez-Sosa var. **diminutivus**
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2005.

Astragalus depauperatus (Phil.) Reiche = **Astragalus bustillosii** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus dessaueri Phil. = **Astragalus germainii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus dielsii J.F. Macbr. = **Astragalus diminutivus** (Phil.) Gómez-Sosa var. **dielsii** (J.F. Macbr.) Gómez-Sosa

Astragalus dilectus Phil. = **Astragalus germainii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus diminutivus (Phil.) Gómez-Sosa var. **dielsii** (J.F. Macbr.) Gómez-Sosa
Sin.: *Astragalus dielsii* J.F. Macbr.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4400 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 2589* (SI)].

Astragalus diminutivus (Phil.) Gómez-Sosa var. **diminutivus**
Sin.: *Astragalus deminutivus* I.M. Johnst., *Phaca diminutiva* Phil.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2005.
Hierba. Perenne. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 31462* (LIL, SI)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)].

Astragalus distans Gray = **Astragalus distinens** Macloskie
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus distans Gray var. *beta* Gray = **Astragalus bonariensis** Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.

Astragalus distinens Macloskie
Sin.: *Astragalus distans* Gray
Referencias: Burkart, A., 1987a; Gómez Sosa, E. V., 1979, 1994, 2003; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–4200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); URY(COL, MON, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 277* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 1488* (MVFA)].

Astragalus dodtii Phil.
Sin.: *Astragalus melanogonatus* I.M. Johnst., *Astragalus rengifoi* Phil., *Tragacantha dodtii* (Phil.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 16183* (SI)].

Astragalus dolichostachys (Phil.) Reiche = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus domeykoanus (Phil.) Reiche
Sin.: *Astragalus orites* (Phil.) Reiche, *Phaca domeykoana* Phil., *Phaca orites* Phil., *Tragacantha procumbens* (Hook. & Arn.) Kuntze var. *glabrescens* Kunze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, SCR); CHL(VII, VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 236* (SI)]; CHL[*Philippi, F. s.n.* (LP)].

Astragalus drepanophrorus Griseb. = **Astragalus arequipensis** Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus duseni Macloskie = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.

Astragalus echegarayi Hieron. = **Astragalus vagus** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus edmonstonei (Hook.) B.L. Rob.
Sin.: *Astragalus affinis* Steud., *Astragalus chrysanthus* (Moris) Reiche, nom. illeg., *Astragalus flavus* (Hook. & Arn.) E. Sheld., *Astragalus hohenacheri* Speg., *Phaca acutidens* Phil., *Phaca chrysantha* Moris, *Phaca edmonstonei* Hook., *Phaca flava* Hook. & Arn., *Phaca podocarpa* Phil., *Tragacantha chrysantha* (Moris) Kuntze, *Tragacantha flava* (Hook. & Arn.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(III, IV, V, VI, VII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 3043* (SI)].

Astragalus elatus (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl. = **Astragalus curvicaulis** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus elongatus (Phil.) Reiche = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus fabrisii Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1981.
Hierba. Perenne. Endémica. 4300–4700 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwabe, H. 964* (LP)].

Astragalus famatinae I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–3200 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 13189* (SI), *Kiesling, R. 6365* (SI)].

Astragalus ferrugineus Clos = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus filifolius Clos = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus flavocreatus I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3600–4600 m.
Países: ARG(CAT, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5385* (SI)].

Astragalus flavus (Hook. & Arn.) E. Sheld. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus garbancillo Cav.
Sin.: *Astragalus benthamianus* Gillies ex Hook. & Arn., *Astragalus minus* Clos, *Astragalus unifultus* L'Hér., *Tragacantha benthamiana* (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze, *Tragacantha garbancillo* (Cav.) Kuntze, *Tragacantha minor* (Clos) Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994, 1999, 2004; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, MEN, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31660* (SI)].

Astragalus germaini Phil. var. *azureus* Phil. ex R.E. Fr. = **Astragalus germaini** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus germaini Phil.
Sin.: *Astragalus alfalfalis* Phil., *Astragalus azureus* Phil. ex Reiche, *Astragalus closianus* Phil., *Astragalus dessaueri* Phil., *Astragalus dilectus* Phil., *Astragalus germaini*

Phil. var. *azureus* Phil. ex R.E. Fr., *Astragalus segethi* Phil., *Tragacantha closiana* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha dilecta* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha germaini* (Phil.) Kuntze, *Tragacantha segethii* (Phil.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Subarbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: CHL(V, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 7246* (SI)].

[Astragalus gilliesi Phil.]
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Notas: Nombre dudoso.

Astragalus grandis (Kuntze) Speg. = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus gratus (Clos) Reiche = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus herzogii Ulbr. = **Astragalus uniflorus** DC.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus hickenii Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1983, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*León, R. 3227* (BAA)].

Astragalus hieronymi Ulbr. = **Astragalus tarijensis** Wedd.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus hohenacheri Speg. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus hypsogenus I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6070* (SI)].

Astragalus illinii I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus moyanoi* Speg. var. *villosula* Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Arroyo, S. C. 503* (SI)].

[Astragalus infirmus Steud.]
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Notas: Nombre dudoso.

Astragalus inflatus (Gillies ex Hook. & Arn.) Steud. = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus joergensenii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5404* (SI)].

Astragalus johnstonii Gómez-Sosa
Referencias: Gómez-Sosa, E. V., 1997e.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–1400 m.
Países: CHL(V, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gómez-Sosa, E. V. 571* (CONC, SI)].

Astragalus laetevirens Phil. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus landbecki (Phil.) Reiche = **Astragalus cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus laxiflorus (Phil.) Reiche = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus laxiflorus (Phil.) Reiche var. *dissitiflora* (Phil.) Reiche = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus leucomallus Phil. = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus limariensis Muñoz
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: CHL(II, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zöllner, O. 3042* (SI)].

Astragalus litoreus Phil. = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus looseri I.M. Johnst.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Gómez Sosa, E. V., 1988, 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 1600–3500 m.
Países: ARG(SJU); CHL(IV, V, VI, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 7534* (SI)]; CHL[*Ricardi, M. 3182* (SI)].

Astragalus macrocarpus (Phil.) Reiche, nom. illeg. = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus macrocarpus (Phil.) Reiche var. *petiolatus* Hauman = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus macrophysus (Phil.) Reiche = **Astragalus darumbium** (Bertero ex Colla) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus macrophysus (Phil.) Reiche var. *robustus* (Phil.) Reiche = **Astragalus darumbium** (Bertero ex Colla) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus magellanicus Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1977, 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Boelcke, O. 264* (BAB)]; CHL[*Donat, A. 412* (BA, SI)].

Astragalus maulensis Speg.
Sin.: *Astragalus brachytropis* (Phil.) Reiche, comb. superfl., *Phaca brachytropis* Phil., hom. illeg.
Referencias: Gómez-Sosa, E. V., 1997e.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(VII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SI)].

Astragalus megalocarpus Speg. = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus melanogonatus I.M. Johnst. = **Astragalus dodtii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus mendocinus Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1988.
Hierba. Endémica. 1500–2000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Prina, A. O. 1482* (SI)].

Astragalus meyenianus Speg. = **Astragalus vesiculosus** Clos
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus meyenianus Speg. var. *paucifoliolata* Hicken = **Astragalus vesiculosus** Clos
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus micranthellus Wedd.
Sin.: *Astragalus capitellus* Britton, *Astragalus patancanus* Ulbr., *Tragacantha arequibensis* Kuntze var. *minima* Kuntze, *Tragacantha arequibensis* Kuntze var. *tenuifolia* Kuntze, *Tragacantha micranthella* (Wedd.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6030* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 2581* (CONC)].

Astragalus minimus Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 5291* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1136* (B, G)].

Astragalus minus Clos = **Astragalus garbancillo** Cav.

Astragalus minutissimus Wedd.
Sin.: *Tragacantha minutissima* (Wedd.) Kuntze
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Villagrán, C. 4133* (CONC)].

Astragalus modestus Wedd., nom. illeg. = **Astragalus weddellianus** (Kuntze) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus monospermus Phil. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus monteroi I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Montero, G. 1161* (GH)].

Astragalus monticola Phil.
Sin.: *Astragalus barceloi* Phil., *Tragacantha monticola* (Phil.) Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3500 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2433* (SI)]; CHL[*Behn, F. s.n.* (G)].

Astragalus moyanoi Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 7841* (SI)].

Astragalus moyanoi Speg. var. *villosula* Speg. = **Astragalus illinii** I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus nanus (Phil.) Reiche = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus nelidae Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1988, 1994.
Hierba. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 6231* (LP, MERL, NY, SI)].

Astragalus neoburkartianus Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1976, 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*De Marco de Kreibohm, E. s.n.* (SI)].

Astragalus neocarpus Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1997a.
Hierba. Anual. Endémica. 800–1000 m.
Países: ARG(CHU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 401* (CTES, MO, NY, P, SI)].

Astragalus neuquenensis Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1976, 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 26733* (MERL, SI)].

Astragalus nicorae Gómez-Sosa
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1982.
Endémica. 3200–3600 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 8836* (SI), *Nicora, E. G. 8147* (SI)].

Astragalus nivicola Gómez-Sosa
Referencias: Arroyo, M. T. K., Bohlen, C., Cavieres, C. & Marticorena, C., 1992; Gómez Sosa, E. V., 1977, 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*James, P. 415* (SI), *León, R. 950* (SI)]; CHL[*Pisano, E. 3648* (SI)].

Astragalus nubigenus (Meyen ex Vogel) Taub. = **Astragalus vesiculosus** Clos
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus nudus Clos
Sin.: *Tragacantha nuda* (Clos) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Goodspeed, T. H. 16224* (SI)].

Astragalus oblongifolius Clos = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus ochroleucus (Hook. & Arn.) Gray, nom. illeg. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984.

Astragalus oliganthus (Phil.) Reiche, nom. illeg. = **Astragalus orthocarpus** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus orbignyanus Wedd. = **Astragalus arequipensis** Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus orites (Phil.) Reiche = **Astragalus domeykoanus** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus orthocarpus I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus oliganthus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Phaca oligantha* Phil., *Tragacantha oligantha* (Phil.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: CHL(VI).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Bertero 65* (BM, P)].

Astragalus ovallensis Clos = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984.

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. *dusenii* (Macloskie) I.M. Johnst. = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. **grandiflora** Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 393* (SI)].

Astragalus palenae (Phil.) Reiche var. **palenae**
Sin.: *Astragalus brevicaulis* Dusén, nom. illeg., *Astragalus duseni* Macloskie, *Astragalus palenae* (Phil.) Reiche var. *dusenii* (Macloskie) I.M. Johnst., *Astragalus pallens* Reiche, *Astragalus rahmeri* (Phil.) Reiche, *Phaca oreophila* Phil., *Phaca palenae* Phil., *Phaca rahmeri* Phil., *Tragacantha oreophila* (Phil.) Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VII, IX, X, XI, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Arroyo, S. C. 329* (SI)]; CHL[*Domínguez, E. 4* (SI), *Donat, A. 413* (SI)].

Astragalus pallens Reiche = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus paposanus I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Endémica. 200–2600 m.
Países: CHL(II, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Montero, G. 2982* (G)].

Astragalus parodii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 10307* (SI)].

Astragalus patagonicus (Phil.) Speg.
Sin.: *Phaca patagonica* Phil.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2100 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE, SCR); CHL(XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 2648* (SI)]; CHL[*Ibar s.n.* (K, LPS)].

Astragalus patancanus Ulbr. = **Astragalus micranthellus** Wedd.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus pauranthus I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–3000 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fischer, W. 99* (GH, SI)].

Astragalus pehuenches Niederl.
Sin.: *Astragalus grandis* (Kuntze) Speg., *Astragalus inflatus* (Gillies ex Hook. & Arn.) Steud., *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche var. *petiolatus* Hauman, *Astragalus macrocarpus* (Phil.) Reiche, nom. illeg., *Astragalus megalocarpus* Speg., *Astragalus striatus* (Clos) Reiche, *Phaca inflata* Gillies ex Hook. & Arn., *Phaca macrocarpa* Phil., *Phaca striata* Clos, *Tragacantha bisinflata* Kuntze, *Tragacantha grandis* Kuntze, *Tragacantha striata* (Clos) Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2300 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Steibel, P. 3063* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 5701* (SI)].

Astragalus pencanus Phil. = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus peruvianus Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Nativa. 3000–4800 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 2477* (SI)].

Astragalus philippi Speg. = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

[Astragalus philippianus (Kuntze) Hauman]
Sin.: *Astragalus amoenus* (Phil.) Reiche, *Astragalus santiagensis* Speg., *Phaca amoena* Phil., *Tragacantha philippiana* Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Notas: Nombre dudoso.

[Astragalus pictus Steud.]
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Notas: Nombre dudoso.

Astragalus pilgeri J.F. Macbr. = **Astragalus weddellianus** (Kuntze) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus pissisii (Phil.) I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus canescens* (Hook. & Arn.) Reiche var. *pissisii* (Phil.) Reiche, *Phaca pissisii* Phil., *Tragacantha pissisii* (Phil.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1500 m.
Países: CHL(III, IV, V, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Reed, E. C. s.n.* (K)].

Astragalus placens Clos = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus placens Clos var. *oblongifolius* (Clos) Reiche = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus procumbens Hook. & Arn. = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus prostratus Hook. & Arn. = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus pulchellus (Clos) Reiche = **Astragalus bellus** (Kuntze) R.E. Fr.

Astragalus pulviniformis I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Johnston, I. M. 6128* (G, K, P, S)].

Astragalus punae I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Endémica. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1272* (SI)].

Astragalus punensis J.F. Macbr. = **Astragalus weddellianus** (Kuntze) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus pusillus Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, LRI, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 2487* (SI)]; CHL[*Sparre, B. B. 10630* (SI)].

[Astragalus quindecimjugus (Phil.) Reiche]
Sin.: *Phaca quindecimjugus* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Notas: Nombre dudoso.

Astragalus rahmeri (Phil.) Reiche = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus reedii (Phil.) Hauman = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus reichei Speg.
Sin.: *Astragalus compactus* (Phil.) Reiche, *Phaca compacta* Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Villagrán, C. 2581* (SI)].

Astragalus rengifoi Phil. = **Astragalus dodtii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus rengifoi Phil. var. *lejocarpa* Speg. = **Astragalus spegazzinii** I.M. Johnst.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus rhudolphi Speg. = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus ruiz-lealii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Anual. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lagiglia, H.A. 7801* (SI)].

Astragalus rupestris Reiche = **Astragalus vesiculosus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus san-romani (Phil.) Reiche = **Astragalus vagus** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus sanctae-crucis Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947; Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 7103* (SI)].

Astragalus santiagensis Speg. = **Astragalus philippianus** (Kuntze) Hauman
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus schinetorum Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1974.
Hierba. Perenne. Endémica. 2800 m.
Países: CHL(IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zoellner, O. 5592* (CONC, NY, SGO, SI)].

Astragalus segethi Phil. = **Astragalus germainii** Phil.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus sinocarpus Rusby = **Astragalus arequipensis** Vogel
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus spegazzinii I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus rengifoi* Phil. var. *lejocarpa* Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 22467* (SI)].

Astragalus sphaerocarpus Clos = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus striatus (Clos) Reiche = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Astragalus striatus (Clos) Reiche var. *echegarayi* (Hieron.) Hosseus = **Astragalus vagus** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus subandinus Speg. = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus tarapacanus Speg. = **Astragalus bustillosii** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus tarijensis Wedd.
Sin.: *Astragalus hieronymi* Ulbr., *Tragacantha tarijensis* (Wedd.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 3644* (SI)].

Astragalus tehuelches Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947; Spegazzini, C. L., 1902b.
Hierba. Anual. Endémica. 0–1400 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ambrosetti, A. 31026* (SI)].

Astragalus tricolor (Clos) Reiche = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus triflorus (DC.) A. Gray
Sin.: *Astragalus viciiformis* Ulbr., *Phaca triflora* DC., *Tragacantha triflora* (DC.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 3549* (SI)].

Astragalus trifoliatus Phil. = **Astragalus valparadisiensis** Speg.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus uniflorus DC.
Sin.: *Astragalus herzogii* Ulbr., *Tragacantha uniflora* (DC.) Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1981; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 781* (SI)].

Astragalus unifultus L'Hér. = **Astragalus garbancillo** Cav.

Astragalus vagus (Clos) Reiche
Sin.: *Astragalus echegarayi* Hieron., *Astragalus san-romani* (Phil.) Reiche, *Astragalus striatus* (Clos) Reiche var. *echegarayi* (Hieron.) Hosseus, *Phaca san-romani* Phil., *Phaca vaga* Clos, *Tragacantha vaga* (Clos) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–4000 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gay, C. 364* (G, K, P)].

Astragalus valerianensis I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Johnston, I. M. 6033* (G)].

Astragalus valparadisiensis Speg.
Sin.: *Astragalus trifoliatus* Phil., *Tragacantha trifoliata* (Phil.) Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Kohler 441g* (SI)].

Astragalus vasticola I.M. Johnst. = **Astragalus coquimbensis** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus venturii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4700 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 7417* (SI, US)].

Astragalus verticillatus (Phil.) Reiche
Sin.: *Phaca verticillata* Phil.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1997e; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–1800 m.
Países: CHL(V, VI, VII, VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Astragalus vesiculosus Clos
Sin.: *Astragalus meyenianus* Speg., *Astragalus meyenianus* Speg. var. *paucifoliolata* Hicken, *Astragalus nubigenus* (Meyen ex Vogel) Taub., *Astragalus rupestris* Reiche, *Phaca bustillosi* Phil., *Phaca nubigena* Meyen ex Vogel, *Tragacantha andina* Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 2300–4000 m.
Países: ARG(MEN, NEU, SJU); CHL(IV, V, VI, VII, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 7472* (SI)]; CHL[*Zöllner, O. 5408* (SI)].

Astragalus viciiformis Ulbr. = **Astragalus triflorus** (DC.) A. Gray
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus violaceus R.P. St.John = **Sphaerophysa salsula** (Pall.) DC.
Referencias: Barneby, R. C., 1964.

Astragalus volckmannii Phil. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Astragalus weddellianus (Kuntze) I.M. Johnst.
Sin.: *Astragalus modestus* Wedd., nom. illeg., *Astragalus pilgeri* J.F. Macbr., *Astragalus punensis* J.F. Macbr., *Tragacantha weddelliana* Kuntze
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Nativa. 3500–4500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5408* (SI)].

Astragalus werdermannii I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.
Hierba. Perenne. Endémica. 4000–4700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 1439* (B)].

Astyposanthes gracilis (Kunth) Herter = **Stylosanthes guianensis** (Aubl.) Sw. var. **gracilis** (Kunth) Vogel

Astyposanthes intermedia (Vogel) Herter = **Stylosanthes montevidensis** Vogel var. **intermedia** Vogel

Astyposanthes leiocarpa (Vogel) Herter = **Stylosanthes leiocarpa** Vogel
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1999; Speroni, G. & Izaguirre, P., 1994.

Astyposanthes montevidensis (Vogel) Herter = **Stylosanthes montevidensis** Vogel var. **montevidensis**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Speroni, G. & Izaguirre, P., 1994.

Astyposanthes viscosa (L.) Herter = **Stylosanthes viscosa** (L.) Sw.

Ateleia (DC.) Benth.

Número de especies: 1 endémica

Ateleia glazioveana Baill.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1968; Ulibarri, E. A., 1997c.
Árbol. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 21841* (LIL, SI), *Niederlein, G. 2189* (BA, SI)]; BRA[*Rambo, B. 3088* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5755* (G)].

Balsamocarpon Clos

Número de especies: 1 endémica

Balsamocarpon brevifolium Clos
Sin.: *Caesalpinia brevifolia* (Clos) Benth.
Referencias: Simpson, B. B., Larkin, L. L. & Weeks, A., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b.

Arbusto. Endémica. 0–1900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Cabrera, A. L. 12619* (SI)].

Bauhinia L.

Número de especies: 16, 5 endémicas

Bauhinia acuruana Moric.
Referencias: Bernardi, L., 1984.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 932* (BAB), *Hassler, E. 5910* (G)].

Bauhinia affinis Vogel
Sin.: *Pauletia affinis* (Vogel) A. Schmitz
Referencias: Fortunato, R. H., 1996, 1997b.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8041* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10374* (SI)].

Bauhinia amambayensis Fortunato
Sin.: *Bauhinia uniflora* Hassl., hom. illeg.
Referencias: Fortunato, R. H., 1985.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 10667* (G, GH, K, W)].

Bauhinia angulicaulis Harms = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia appendiculata Hassl. = **Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c.

Bauhinia argentinensis Burkart var. **argentinensis**
Referencias: Fortunato, R. H., 1986; Scarpa, G. F., 2004.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SAL); PRY(APY, GUA, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 376* (BAB)]; PRY[*Arenas, P. 1817* (BACP, CTES, SI)].

Bauhinia argentinensis Burkart var. **megasiphon** (Burkart) Fortunato
Sin.: *Bauhinia megasiphon* Burkart
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Devoto, F. E. s.n.* (BAB, BAI, SI)].

Bauhinia aromatica Ducke = **Bauhinia cheilantha** (Bong.) Steud.

Bauhinia bahiensis Bong. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia bauhinioides (Mart.) J.F. Macbr.
Sin.: *Bauhinia microphylla* Vogel, *Pauletia bauhinioides* (Mart.) A. Schmitz, *Perlebia bauhinioides* Mart.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fortunato, R. H., 1986.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2509* (BAB, G, MO, SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 14205* (BAA, CTES, MBM, SI)].

Bauhinia benthamiana Taub. = **Bauhinia ungulata** L. var. **ungulata**

Bauhinia candicans Benth. = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1986; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Bauhinia cataholo Hoehne = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia aromatica* Ducke, *Pauletia cheilantha* Bong.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 2686* (SI)].

Bauhinia cordata Vogel = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Bauhinia corumbensis S. Moore = **Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c.

Bauhinia cuiabensis (Bong.) D. Dietr., hom. illeg. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia cuiabensis (Bong.) Steud. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.

Bauhinia cuiabensis (Bong.) Walp., hom. illeg. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia cuiabensis (Bong.) Steud. f. *ferruginea* Chodat & Hassl. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia cuiabensis (Bong.) Steud. f. *vestita* Chodat & Hassl. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia cuiabensis (Bong.) Steud. var. *ferruginea* Chodat & Hassl. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia dodecandra (Bong.) Steud. = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Bauhinia estrellensis Hassl.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 4013* (SI)].

Bauhinia forficata auct. non Link = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia forficata Link var. *candicans* (Benth.) Hassl. ex Latzina = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia forficata Link var. *pruinosa* (Vogel) Hassl. = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1986; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Bauhinia forficata Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Sin.: *Bauhinia candicans* Benth., *Bauhinia forficata* auct. non Link, *Bauhinia forficata* Link var. *candicans* (Benth.) Hassl. ex Latzina, *Bauhinia forficata* Link var. *pruinosa* (Vogel) Hassl., *Bauhinia pruinosa* Vogel, *Pauletia candicans* (Benth.) A. Schmitz, *Pauletia pruinosa* (Vogel) A. Schmitz
Referencias: Bernardi, L., 1984; Fortunato, R. H., 1986; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Steibel, P., 2001[2000].
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, MEN, MIS, SAL, SFE, SJU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, COA, ITA); URY(MON, PAY, ROC, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 824* (BAB, SI)]; BRA[*Castellanos, A. 24905* (GUA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6310* (LIL, SI, US)]; URY[*Rosengurtt, B. 3832b* (MVFA)].

[Bauhinia fusconervis D. Dietr.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bauhinia geminata Vogel = **Bauhinia longifolia** (Bong.) Steud.

Bauhinia guaranitica Lindm. = **Bauhinia uruguayensis** Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia hagenbeckii Harms
Sin.: *Bauhinia hassleriana* Chodat, *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *acuminata* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Bauhinia hassleriana* Chodat var. *marginata* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fortunato, R. H., 1986; Wunderlin, R. P., 1968.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 3311* (SI)].

Bauhinia hassleriana Chodat = **Bauhinia hagenbeckii** Harms

Bauhinia hassleriana Chodat f. *acuminata* Chodat & Hassl. = **Bauhinia hagenbeckii** Harms

Bauhinia hassleriana Chodat f. *angustifolia* Chodat & Hassl. = **Bauhinia hagenbeckii** Harms

Bauhinia hassleriana Chodat f. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Bauhinia hagenbeckii** Harms

Bauhinia hassleriana Chodat f. *latifolia* Chodat & Hassl. = **Bauhinia hagenbeckii** Harms

Bauhinia hassleriana Chodat var. *marginata* Chodat & Hassl. = **Bauhinia hagenbeckii** Harms

Bauhinia hermesiana N.F. Mattos = **Bauhinia uruguayensis** Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia heterandra Benth. = **Bauhinia pentandra** (Bong.) Vogel ex Steud.

Bauhinia hiemalis Malme = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Bauhinia holophylla (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia cordata* Vogel, *Bauhinia dodecandra* (Bong.) Steud., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *cordata* (Vogel) Benth., *Bauhinia rufa* (Bong.) Steud. var. *dodecandra* (Bong.) Benth., *Pauletia dodecandra* Bong., *Pauletia holophylla* Bong., *Pauletia rufa* Bong. var. *cordata* (Vogel) A. Schmitz, *Pauletia rufa* Bong. var. *dodecandra* (Bong.) A. Schmitz
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Kuniyoshi, Y. S. 5179* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 10988* (W)].

Bauhinia kleiniana Burkart
Sin.: *Binaria kleiniana* (Burkart) A. Schmitz
Referencias: Burkart, A., 1961.
Liana. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 2332* (HBR, SI)].

Bauhinia lagesiana Harms = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia langsdorffiana Bong. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia langsdorffiana Bong. var. *bahiensis* (Bong.) Benth. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia longifolia (Bong.) Steud.
Sin.: *Bauhinia geminata* Vogel, *Bauhinia obtusata* Vogel, *Bauhinia recurva* R.S. Cowan, *Pauletia longifolia* Bong.
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.
Arbusto o arbolito. Nativa.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 64021* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 10210* (G, W)].

Bauhinia macrostachya Benth. = **Bauhinia ungulata** L. var. **ungulata**

Bauhinia macrostachya Benth. var. *tenuifolia* Ducke = **Bauhinia ungulata** L. var. **ungulata**

Bauhinia megasiphon Burkart = **Bauhinia argentinensis** Burkart var. **megasiphon** (Burkart) Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

[Bauhinia membranacea Benth.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bauhinia microphylla Vogel = **Bauhinia bauhinioides** (Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr.
Sin.: *Bauhinia bahiensis* Bong., *Bauhinia lagesiana* Harms, *Bauhinia langsdorffiana* Bong., *Bauhinia langsdorffiana* Bong. var. *bahiensis* (Bong.) Benth., *Bauhinia microstachya* (Raddi) J.F. Macbr. var. *bahiensis* (Bong.) J.F. Macbr., *Bauhinia scandens* Vell., *Bauhinia spicata* Vogel, *Bauhinia tomentosa* Vell., *Bauhinia vogeliana* Steud., *Schnella microstachya* Raddi, *Schnella microstachya* Raddi var. *bahiensis* (Bong.) A. Schmitz, *Schnella spicata* (Vogel) A. Schmitz
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 6749* (GH, LE, LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 38082* (MBM)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6201* (LIL, SI)].

Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr. var. *bahiensis* (Bong.) J.F. Macbr. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia mollis (Bong.) Walp. f. *glabrescens* Chodat & Hassl. = **Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c.

Bauhinia mollis (Bong.) Walp. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c.

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Sin.: *Bauhinia appendiculata* Hassl., *Bauhinia corumbensis* S. Moore, *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Bauhinia mollis* (Bong.) Walp. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Pauletia mollis* Bong.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Woolston, A. L. 376* (SI)].

Bauhinia mollis (Bong.) D. Dietr. var. **notophila** (Griseb.) Fortunato
Sin.: *Bauhinia notophila* Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c, 1986.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7346* (BAB)].

Bauhinia notophila Griseb. = **Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **notophila** (Griseb.) Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c, 1986.

Bauhinia obtusata Vogel = **Bauhinia longifolia** (Bong.) Steud.

[Bauhinia pentandra (Bong.) Vogel ex Steud.]
Sin.: *Bauhinia heterandra* Benth., *Pauletia pentandra* Bong.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bauhinia pruinosa Vogel = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia recurva R.S. Cowan = **Bauhinia longifolia** (Bong.) Steud.

[Bauhinia rufa (Bong.) Steud.]
Sin.: *Pauletia rufa* Bong.
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. var. *cordata* (Vogel) Benth. = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Bauhinia rufa (Bong.) Steud. var. *dodecandra* (Bong.) Benth. = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Bauhinia scandens Vell. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia spicata Vogel = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia tomentosa Vell. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia ungulata L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz
Sin.: *Bauhinia angulicaulis* Harms, *Bauhinia cataholo* Hoehne, *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) D. Dietr., hom. illeg., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. f. *vestita* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Steud. var. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Bauhinia cuiabensis* (Bong.) Walp., hom. illeg., *Bauhinia hiemalis* Malme, *Pauletia cuiabensis* Bong.
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN, CON, GUA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5380* (BM, G, GH, NY)].

Bauhinia ungulata L. var. **ungulata**
Sin.: *Bauhinia benthamiana* Taub., *Bauhinia macrostachya* Benth., *Bauhinia macrostachya* Benth. var. *tenuifolia* Ducke, *Cansenia ungulata* (L.) Raf., *Pauletia ungulata* (L.) A. Schmitz
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.
Arbusto. Nativa.
Países: PRY(APY, AMA, CAN, CON, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 14343* (SI)].

Bauhinia uniflora Hassl., hom. illeg. = **Bauhinia amambayensis** Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1985.

Bauhinia uruguayensis Benth.
Sin.: *Bauhinia guaranitica* Lindm., *Bauhinia hermesiana* N.F. Mattos, *Bauhinia venturii* Lillo, *Binaria uruguayensis* (Benth.) A. Schmitz
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1969c; Fortunato, R. H. & Wunderlin, R. P., 1985; Fortunato, R. H., 1986.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 745* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 4436* (MBM, SI, US)]; PRY[*Hassler, E. 1905* (G)].

Bauhinia venturii Lillo = **Bauhinia uruguayensis** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1969c; Fortunato, R. H., 1986.

Bauhinia vogeliana Steud. = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Benthamantha caribaea (Jacq.) Kuntze var. *dubia* Kuntze = **Coursetia hassleri** Chodat
Referencias: Lavin, M., 1988.

Benthamantha glabrescens (Benth.) Burkart, comb. superfl. = **Coursetia hassleri** Chodat

Bergeronia Micheli

Número de especies: 1 endémica

Bergeronia sericea Micheli
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Gómez-Sosa, E. V., 2000a.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL); PRY(CEN, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2508* (BAB, SI)]; PRY[*Hassler, E. 7518* (G), *Rojas, T. 2121a* (SI)].

Binaria kleiniana (Burkart) A. Schmitz = **Bauhinia kleiniana** Burkart

Binaria uruguayensis (Benth.) A. Schmitz = **Bauhinia uruguayensis** Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Bowdichia Kunth

Número de especies: 1

Bowdichia densiflora Benth. = **Bowdichia virgilioides** Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev

Bowdichia major (Mart.) Mart. ex Benth. = **Bowdichia virgilioides** Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev

Bowdichia virgilioides Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev
Sin.: *Bowdichia densiflora* Benth., *Bowdichia major* (Mart.) Mart. ex Benth., *Bowdichia virgilioides* Kunth var. *glabrata* Benth., *Sebipira major* Mart.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lewis, G. P., 1987.
Arbusto o arbolito. Nativa. 100–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10534* (G)].

Bowdichia virgilioides Kunth var. *glabrata* Benth. = **Bowdichia virgilioides** Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev

Bradburya angustifolia (Kunth) Kuntze = **Centrosema angustifolium** (Kunth) Benth.

Bradburya arenaria (Benth.) Kuntze = **Centrosema arenarium** Benth.

Bradburya biflora (Mart. ex Benth.) Kuntze = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya bracteosa (Benth.) Kuntze = **Centrosema bracteosum** Benth.

Bradburya brasiliana (L.) Kuntze = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya conjugata (Lehm.) Kuntze = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya decumbens (Mart.) Kuntze = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya dubia (Kunth) Kuntze = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya insulana (Vell.) Kuntze = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya pascuorum (Mart. ex Benth.) Kuntze = **Centrosema pascuorum** Mart. ex Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya plumieri (Turpin ex Pers.) Kuntze = **Centrosema plumieri** (Turpin ex Pers.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya sagittata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya virginiana (L.) Kuntze = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Bradburya virginiana (L.) Kuntze f. *pascuorum* (Mart. ex Benth.) Lindm. = **Centrosema pascuorum** Mart. ex Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Brasilettia dubia (Spreng.) Kuntze = **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Caesalpinia L.

Número de especies: 17, 5 endémicas, 2 introducidas

Caesalpinia angulata (Hook. & Arn.) Baill.
Sin.: *Caesalpinia angulicaulis* Clos, *Zuccagnia angulata* Hook. & Arn.
Referencias: Lewis, G. P., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Endémica. 0–1900 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ezcurra, C. 473* (SI)].

Caesalpinia angulicaulis Clos = **Caesalpinia angulata** (Hook. & Arn.) Baill.
Referencias: Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia aphylla Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Endémica. 0–3200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 753* (SI)].

Caesalpinia argentina Burkart
Referencias: Burkart, A., 1936; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2571* (SI)].

Caesalpinia balansae Ulibarri = **Pomaria parviflora** (Micheli) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia bangii Rusby = **Caesalpinia fimbriata** Tul.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.

Caesalpinia brevifolia (Clos) Benth. = **Balsamocarpon brevifolium** Clos
Referencias: Simpson, B. B., Larkin, L. L. & Weeks, A., 2003.

Caesalpinia chicamana Killip & J.F. Macbr. = **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert

Caesalpinia chilensis DC. = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia coluteifolia Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1936; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Grisebach, A. H. R., 1879; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Nativa. 200–1700 m.
Países: ARG(SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7474* (BAB)]; PRY[*Schinini, A. 16417* (CTES, G, NY)].

Caesalpinia coriaria Micheli, hom. illeg. = **Caesalpinia paraguariensis** (D. Parodi) Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia coulterioides Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1936, 1952a; Grisebach, A. H. R., 1879; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Nativa. 1400–2800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 4973* (BA, BAB, SI)].

Caesalpinia crista auct. non L. = **Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia cromantha Burkart = **Caesalpinia fimbriata** Tul.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston
Sin.: *Caesalpinia crista* auct. non L., *Caesalpinia sepiaria* Roxb., *Reichardia decapetala* Roth
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Introducida. 100–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Bresolin, A. 270* (SI)].

Caesalpinia dictamnoides Chodat & Hassl. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1936; Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.

Caesalpinia dictamnoides Chodat & Hassl. f. *punctata* Chodat & Hassl. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia dubia Spreng. = **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Ulibarri, E. A., 1997a.

Caesalpinia epunctata (Vogel) Benth. = **Pomaria pilosa** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia exilifolia Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1936, 1952a; Grisebach, A. H. R., 1874; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.
Arbusto. Endémica. 1600–2000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 4253* (SI)].

Caesalpinia falcaria (Cav.) L. Fisher = **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert
Referencias: Eifert, I. J., 1972; Simpson, B. B., 1999; Ulibarri, E. A., 1979, 1996b.

Caesalpinia fimbriata Tul.
Sin.: *Caesalpinia bangii* Rusby, *Caesalpinia cromantha* Burkart
Referencias: Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.
Arbusto. Nativa. 1300–3200 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Castillón, L. 1868* (SI)].

Caesalpinia fisheriana Rusby = **Caesalpinia trichocarpa** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1936; Ulibarri, E. A., 1987d, 1996b, 1997a.

[Caesalpinia flexipetala Ravenna]
Notas: Nombre dudoso, material tipo no localizado, probablemente sinónimo de *Caesalpinia marginata*.

Caesalpinia floribunda Tul. = **Caesalpinia pluviosa** DC. var. **pluviosa**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg. = **Caesalpinia gilliesii** (Wall. ex Hook.) D. Dietr.

Caesalpinia gilliesii (Wall. ex Hook.) D. Dietr.
Sin.: *Caesalpinia gilliesii* (Wall. ex Hook.) Benth., nom. illeg., *Erythrostemon gilliesii* (Wall. ex Hook.) Klotzsch, *Poinciana gilliesii* Wall. ex Hook.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Isely, D., 1975; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Lewis, G. P., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1994a, 1996b.
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, III, IV, RME); URY(COL, MON, PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 27962* (SI)]; CHL[*Jiles P., C. 498* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 1118* (SI)].

Caesalpinia glauca (Ortega) Kunth = **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert
Referencias: Eifert, I. J., 1972; Simpson, B. B., 1999; Ulibarri, E. A., 1979, 1996b.

Caesalpinia hauthalii Harms = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia herzogii Harms = **Caesalpinia stuckertii** Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1936; Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia marginata Tul.
Sin.: *Cenostigma sclerophyllum* Malme
Referencias: Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Zardini, E. M. 41159* (BAB)].

Caesalpinia melanocarpa Griseb. = **Caesalpinia paraguariensis** (D. Parodi) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952b, 1987a.

Caesalpinia mimosifolia Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1936; Grisebach, A. H. R., 1874; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.
Arbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, SAL, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27108* (SI)].

Caesalpinia modesta Arechav. = **Pomaria pilosa** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart
Sin.: *Acacia paraguariensis* D. Parodi, *Caesalpinia coriaria* Micheli, hom. illeg., *Caesalpinia melanocarpa* Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Ulibarri, E. A., 1996b.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1707* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7666* (SI)].

Caesalpinia pectinata Cav. = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia peltophoroides Benth. = **Caesalpinia pluviosa** DC. var. **peltophoroides** (Benth.) G.P. Lewis
Referencias: Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.

Caesalpinia pilosa (Vogel) Benth. = **Pomaria pilosa** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia pluviosa DC. var. **peltophoroides** (Benth.) G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia peltophoroides* Benth.
Referencias: Bortoluzzi, R. L. C., 2004; Lewis, G. P., 1998.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 40736* (MBM)]; PRY[*Schinini, A. 27118* (CTES)].

Caesalpinia pluviosa DC. var. **pluviosa**
Sin.: *Caesalpinia floribunda* Tul., *Caesalpinia taubertiana* S. Moore
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.
Árbol. Nativa. 400–1300 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY, AMA, CAN, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schreiter, R. 11897* (SI)]; PRY[*Bernardi, L. 20398* (G, NY)].

Caesalpinia praecox Ruiz & Pav. ex Hook. = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **praecox**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A. & Carter, A., 1976.

Caesalpinia prostrata (Lag. ex DC.) J.F. Macbr. = **Hoffmannseggia prostrata** Lag. ex DC.
Referencias: Macbride, J. F., 1943; Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw.
Sin.: *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw. var. *flava* L.H. Bailey & Rehder, *Poinciana bijuga* Lour., *Poinciana elata* Lour., *Poinciana pulcherrima* L.
Referencias: Isely, D., 1975; Lewis, G. P., 1987; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto o árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(SCA); PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Bortoluzzi, R. L. C. 1349* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 6227* (G, K)].

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. var. *flava* L.H. Bailey & Rehder = **Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.

Caesalpinia pumilio Griseb. = **Hoffmannseggia pumilio** (Griseb.) B.B. Simpson
Referencias: Simpson, B. B., Tate, J. A. & Weeks, A., 2004.

Caesalpinia pumilio Griseb. var. *riojana* (Kurtz ex Hosseus) Burkart = **Hoffmannseggia pumilio** (Griseb.) B.B. Simpson
Referencias: Simpson, B. B., Tate, J. A. & Weeks, A., 2004.

Caesalpinia riojana Kurtz ex Hosseus = **Hoffmannseggia pumilio** (Griseb.) B.B. Simpson
Referencias: Simpson, B. B., Tate, J. A. & Weeks, A., 2004.

Caesalpinia rosulata Rusby = **Caesalpinia trichocarpa** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1987d, 1996b, 1997a.

Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth. f. *subobtusata* Chodat & Hassl. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth. var. *hauthalii* (Vogel) Hassl. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1936; Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.

Caesalpinia rubicunda (Vogel) Benth. var. *intermedia* Hassl. = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1936; Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.

Caesalpinia sepiaria Roxb. = **Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze
Sin.: *Caesalpinia chilensis* DC., *Caesalpinia pectinata* Cav., *Caesalpinia tara* Ruiz & Pav., *Caesalpinia tinctoria* (Kunth) Benth. ex Reiche, *Caesalpinia tinctoria* Dombey ex DC., nom. nud., *Coulteria tinctoria* Kunth,

Poinciana spinosa Molina, *Tara spinosa* (Molina) Britton & Rose
Referencias: Macbride, J. F., 1943; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1996b.
Árbol. Nativa. 0–3000 m.
Países: CHL(I, IV, V).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 752* (SI)].
Notas: Cultivada en Uruguay (Izaguirre & Beyhaut, 2003).

Caesalpinia stipularis (Vogel) Benth. = **Pomaria stipularis** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Caesalpinia stuckerti Hassl.
Sin.: *Caesalpinia herzogii* Harms, *Caesalpinia stuckerti* Hassl. var. *robusta* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1936; Harms, H. A. T., 1915; Hassler, E., 1913a; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.
Arbusto. Endémica. 200–700 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 1550* (BAB, SI)]; PRY[*Beck, S. G. 9443* (SI)].

Caesalpinia stuckerti Hassl. var. *robusta* Hassl. = **Caesalpinia stuckerti** Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1936; Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia tara Ruiz & Pav. = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia taubertiana S. Moore = **Caesalpinia pluviosa** DC. var. **pluviosa**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ulibarri, E. A., 1991, 1996b, 1997a.

Caesalpinia ternata (Phil.) J.F. Macbr. = **Hoffmannseggia ternata** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Caesalpinia tinctoria (Kunth) Benth. ex Reiche = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

Caesalpinia tinctoria Dombey ex DC., nom. nud. = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

Caesalpinia trichocarpa Griseb.
Sin.: *Caesalpinia fisheriana* Rusby, *Caesalpinia rosulata* Rusby
Referencias: Burkart, A., 1936; Grisebach, A. H. R., 1879; Lewis, G. P., 1998; Ulibarri, E. A., 1987d, 1996b, 1997a.
Arbusto. Nativa. 1500–3200 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5357* (SI)].

Cajanus L.

Número de especies: 1 introducida

Cajanus bicolor DC. = **Cajanus cajan** (L.) Millsp.

Cajanus cajan (L.) Millsp.
Sin.: *Cajanus bicolor* DC., *Cajanus flavus* DC., *Cajanus indicus* Spreng., *Cytisus cajan* L., *Cytisus pseudocajan* Jacq.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Miotto, S. T. S., 1988.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, A. 19434* (SI)]; PRY[*Zardini, E. M. 13165* (FCQ, MO)].

Cajanus flavus DC. = **Cajanus cajan** (L.) Millsp.

Cajanus indicus Spreng. = **Cajanus cajan** (L.) Millsp.

Calliandra Benth.

Número de especies: 10, 1 endémica

Calliandra aristulata Rizzini = **Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Calliandra bicolor Benth. = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Hoc, P. S., 1992a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Calliandra brachyandra Speg. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992c.

Calliandra brevicaulis auct. non Micheli = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *grandiflora* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *hirsutula* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *intermedia* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *parviflora* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *robusta* (Hassl.) Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *robusta* Chodat & Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli f. *roseiflora* Chodat & Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli var. **brevicaulis**
Sin.: *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *hirsutula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *intermedia* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* (Hassl.) Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *robusta* Chodat & Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *puberula* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *pubescens* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli var. *tomentosa* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.
Subarbusto. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Balansa, B. 1436* (G, K)].

Calliandra brevicaulis Micheli var. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.
Sin.: *Calliandra brevicaulis* auct. non Micheli, *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *grandiflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *parviflora* Hassl., *Calliandra brevicaulis* Micheli f. *roseiflora* Chodat & Hassl., *Calliandra glabra* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.
Subarbusto. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU, COA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hicken, C. M. 201* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2974* (G, K)].
Notas: Su presencia es probable en Uruguay.

Calliandra brevicaulis Micheli var. *puberula* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli var. *pubescens* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevicaulis Micheli var. *tomentosa* Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **brevicaulis**
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra brevipes Benth.
Sin.: *Acacia selloi* Spreng., *Anneslia brevipes* (Benth.) Lindm., *Calliandra selloi* (Spreng.) J.F. Macbr., *Calliandra yucunensis* Mattos, *Feuilleea brevipes* (Benth.) Kuntze
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1992a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CLA, MON, RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Daviña, J. 272* (MNES, SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1763* (SI)]; URY[*Schroeder, J. 15459* (MVM)].

Calliandra capillata Benth. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra chilensis Benth.
Sin.: *Acacia nigra* Clos, *Feuilleea chilensis* (Benth.) Kuntze
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica. 1100 m.
Países: CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Looser, G. 4328* (SI)].

Calliandra cylindrocarpa Benth. = **Calliandra harrisii** (Lindl.) Benth.

*Calliandra diadema*ta Lem. = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.
Referencias: Hoc, P. S., 1992a.

Calliandra dysantha Benth. var. **macrocephala** (Benth.) Barneby
Sin.: *Calliandra macrocephala* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.
Arbusto. Nativa. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6260* (MBM)].

Calliandra dysantha Benth. var. **opulenta** Barneby
Sin.: *Calliandra macrocephala* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.
Arbusto. Nativa. 400–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10818* (A, BM, NY)].

Calliandra falcifera Ducke = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Calliandra foliolosa Benth.
Sin.: *Calliandra sancti-pauli* Hassk., *Calliandra tweedii* Benth. var. *sancti-pauli* (Hassk.) Benth., *Feuilleea foliolosa* (Benth.) Kuntze
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1992a; Rambo, B., 1966; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28784* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1509* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4404* (SI)].

Calliandra formosa (Kunth) Benth. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Hernández, H. M., 1989.

Calliandra gentryi Standl. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra glabra Hassl. = **Calliandra brevicaulis** Micheli var. **glabra** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra gracilis Griseb. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra grisebachiana (Harms) Speg. = **Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Calliandra harrisii (Lindl.) Benth.
Sin.: *Calliandra cylindrocarpa* Benth., *Clelia ornata* Casar., *Feuilleea harrisii* (Lindl.) Kuntze, *Inga harrisii* Lindl.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Ramella, L. 3016* (NY)].

Calliandra longipes Benth.
Sin.: *Calliandra longipes* Benth. var. *nana* Chodat & Hassl., *Calliandra longipes* Benth. var. *valenzuelensis* Chodat & Hassl., *Calliandra pyrophila* Fern.Casas & Schinini, *Feuilleea longipes* (Benth.) Kuntze
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Hoc, P. S., 1992a.
Arbusto. Nativa. 200–800 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAU, COA, MIE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8026* (BAB)]; PRY[*Schinini, A. 30179* (CTES)].

Calliandra longipes Benth. var. *nana* Chodat & Hassl. = **Calliandra longipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra longipes Benth. var. *valenzuelensis* Chodat & Hassl. = **Calliandra longipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra macrocephala auct. non Benth. = **Calliandra dysantha** Benth. var. **opulenta** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra macrocephala Benth. = **Calliandra dysantha** Benth. var. **macrocephala** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra malacophylla Benth. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra marginata Griseb. ex R.O. Williams = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra microcalyx Harms = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Calliandra microphylla Benth. = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Calliandra myriophylla Benth. = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Calliandra pacara Griseb. = **Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Calliandra parviflora Benth.
Sin.: *Acacia pachyloma* Mart., nom. nud., *Feuilleea pachyloma* Kuntze
Referencias: Barneby, R. C., 1998.
Arbusto. Nativa. 200–800 m.
Países: PRY(APY, AMA, COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5943* (G), *Woolston, A. L. 452* (SI)].

Calliandra parvifolia (Hook. f. & Arn.) Speg.
Sin.: *Anneslia parvifolia* (Hook. & Arn.) Britton, *Calliandra bicolor* Benth., *Calliandra diademata* Lem., *Calliandra falcifera* Ducke, *Calliandra microcalyx* Harms, *Calliandra microphylla* Benth., *Calliandra myriophylla* Benth., *Calliandra peckoltii* Benth., *Feuilleea bicolor* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea multifoliolata* Kuntze, *Feuilleea myriophylla* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea peckoltii* (Benth.) Kuntze, *Inga parvifolia* Hook. f. & Arn.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Bernardi, L., 1984; Hoc, P. S., 1992a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Spegazzini, C. L., 1926.
Arbusto. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, PAI); URY(ART, COL, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 19339* (LP)]; BRA[*Macedo, A. 2541* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 1048* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 4123* (SI)].

Calliandra peckoltii Benth. = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Calliandra penduliflora Rose = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Calliandra pyrophila Fern.Casas & Schinini = **Calliandra longipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra sancti-pauli Hassk. = **Calliandra foliolosa** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra schwackeana Taub. = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico

Calliandra selloi (Spreng.) J.F. Macbr. = **Calliandra brevipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Calliandra tubulosa Benth. = **Samanea tubulosa** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Calliandra tweedii Benth.
Sin.: *Anneslia tweediei* (Benth.) Lindm., *Feuilleea tweedii* (Benth.) Kuntze, *Inga pulcherrima* Cerv. ex Sweet, nom. nud., *Inga pulcherrima* Sweet ex Paxton, *Mimosa yaguaronensis* Larrañaga
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1992a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(ART, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1737* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37328* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3263* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 2812* (MVFA)].

Calliandra tweedii Benth. var. *sancti-pauli* (Hassk.) Benth. = **Calliandra foliolosa** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calliandra viridiflora Benth. = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Hernández, H. M., 1989.

Calliandra yucunensis Mattos = **Calliandra brevipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Calopogonium Desv.

Número de especies: 2

Calopogonium caeruleum (Benth.) Britton, nom. illeg. = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Calopogonium caeruleum (Benth.) Hemsl., nom. illeg. = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.
Referencias:

Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright ex Sauv.
Sin.: *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Britton, nom. illeg., *Calopogonium caeruleum* (Benth.) C. Wright ex Sauv. var. *glabrescens* (Benth.) Malme, *Calopogonium caeruleum* (Benth.) Hemsl., nom. illeg., *Stenolobium caeruleum* Benth., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *glabrescens* Benth., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *villosior* Benth., *Stenolobium glabrum* Benth., *Stenolobium tomentosum* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Carvalho-Okano, R. M. & Leitão, H. F., 1985; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 205* (SI)]; BRA[*Leite, J. E. 2530* (SP)]; PRY[*Rojas, T. 2934* (SI)].

Calopogonium caeruleum (Benth.) C. Wright ex Sauv. var. *glabrescens* (Benth.) Malme = **Calopogonium caeruleum** (Benth.) C. Wright ex Sauv.

Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl.
Sin.: *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Calopogonium sericeum* (Benth.) Chodat & Hassl. var. *villicalyx* Chodat & Hassl., *Stenolobium caeruleum* Benth. var. *sericeum* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8048* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 8716* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5033* (G, NY)].

Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl. = **Calopogonium sericeum** (Benth.) Chodat & Hassl.

Calopogonium sericeum (Benth.) Chodat & Hassl. var. *villicalyx* Chodat & Hassl. = **Calopogonium sericeum** (Benth.) Chodat & Hassl.

Calycomorphum subterraneum (L.) C. Presl = **Trifolium subterraneum** L.

Camptosema Hook. & Arn.

Número de especies: 4, 1 endémica

Camptosema paraguariense (Chodat & Hassl.) Hassl. var. **paraguariense**
Sin.: *Galactia paraguariensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1942a, 1970.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Spegazzini, R. A. s.n.* (BAB)]; PRY[*Krapovickas, A. 44173* (CTES)].

Camptosema paraguariense (Chodat & Hassl.) Hassl. var. **parviflorum** Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1970; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(APY, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2419* (BAB, G, MO)]; PRY[*Meyer, T. 18755* (SI)].

Camptosema penthaphyllum Taub. = **Dahlstedtia pinnata** (Benth.) Malme
Referencias: Burkart, A., 1957b.

Camptosema pinnatum Benth. = **Dahlstedtia pinnata** (Benth.) Malme

Camptosema praeandinum Burkart
Sin.: *Dioclea lasiophylla* auct. non Mart. ex Benth.
Referencias: Burkart, A., 1970.
Enredadera. Perenne. Nativa. 1000–1700 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vignati, M. A. s.n.* (SI)].

Camptosema rubicundum Hook. & Arn.
Sin.: *Camptosema rubicundum* Hook. & Arn. f. *angustifolia* Chodat & Hassl., *Dioclea glycinoides* auct. non Pasq., *Dioclea jacquiniana* auct. non DC., *Kennedia ovata* Hort, *Kennedia splendens* Meisn.
Referencias: Burkart, A., 1970, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1986; Rambo, B., 1966.
Liana. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(RGS); PRY(APA, CEN); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 17424* (BAB, CTES)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 427* (ICN)]; PRY[*von Güllich, C. s.n.* (LPS)]; URY[*Rosengurtt, B. 4958-b* (MVFA, MVM)].

Camptosema rubicundum Hook. & Arn. f. *angustifolia* Chodat & Hassl. = **Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1970.

Camptosema scarlatinum (Mart. ex Benth.) Burkart
Sin.: *Camptosema scarlatinum* (Mart. ex Benth.) Burkart var. *pohlianum* (Benth.) Burkart, *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *calycina* Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *latifolia* Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *oblongifolia* Benth., *Collaea scarlatina* Mart. ex Benth. var. *pohliana* Benth., *Galactia scarlatina* (Mart. ex Benth.) Taub., *Galactia scarlatina* (Mart. ex Benth.) Taub. var. *brevibracteolata* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1970; Miotto, S. T. S., 1986.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–2300 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8003* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 3497* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6221* (SI)].

Camptosema scarlatinum (Mart. ex Benth.) Burkart var. *pohlianum* (Benth.) Burkart = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1970.

Canavalia DC.

Número de especies: 7, 1 introducida

Canavalia anomala Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia apiculata Piper = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia arenicola Piper = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia baueriana Endl. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia bonariensis Lindl.
Sin.: *Canavalia cryptodon* Meisn., *Canavalia monodon* E. Mey., *Canavalia paranensis* Hook. & Arn., *Canavalia tortilis* Frapp. ex Cordem.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sauer, J. D., 1964.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, ERI, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(ITA); URY(ART, CAS, CLA, COL, MON, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1048* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1168* (SI)]; PRY[*Schrottky, C. 64* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1643* (MVFA)].

Canavalia brasiliensis auct. non Mart. ex Benth. = **Canavalia piperi** Killip & J.F. Macbr.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.
Sin.: *Canavalia anomala* Piper, *Canavalia campylocarpa* Piper, *Canavalia caribaea* Urb., *Canavalia fendleri* Piper, *Canavalia gladiata* auct. non (Jacq.) DC., *Canavalia leptophylla* Piper, *Canavalia mexicana* Piper, *Canavalia panamensis* Piper, *Canavalia paraguayensis* Piper, *Canavalia prolifera* Piper ex Ricker
Referencias: Sauer, J. D., 1964.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CEN, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 14844* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 5902* (L)]; PRY[*Hassler, E. 2951* (BM, F, G, NY, P, W)].

Canavalia campylocarpa Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia caribaea Urb. = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia cryptodon Meisn. = **Canavalia bonariensis** Lindl.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia emarginata (Jacq.) G. Don = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia ensiformis (L.) DC.
Sin.: *Canavalia ensiformis* (Jacq.) DC. var. *truncata* Ricker, *Canavalia ensiformis* (L.) DC. var. *albida* DC., *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. f. *leucocarpa* Taub. ex

Glaz., nom. nud., *Canavalia gladiata* (Jacq.) DC. var. *leucosperma* Voigt, *Dolichos acinaciformis* Jacq., *Dolichos ensiformis* L., *Dolichos pugioniformis* Raeusch., *Malocchia ensiformis* (L.) Savi
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Sauer, J. D., 1964.
Liana. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SAL); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Llamas, A. 13253* (BAB)]; URY[*Rosengurtt, B. 5569pe* (MVFA)].
Notas: Cultivada en Uruguay.

Canavalia ensiformis (L.) DC. var. *albida* DC. = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.

Canavalia ensiformis (Jacq.) DC. var. *truncata* Ricker = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia fendleri Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia gladiata auct. non (Jacq.) DC. = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia gladiata (Jacq.) DC. f. *leucocarpa* Taub. ex Glaz., nom. nud. = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia gladiata (Jacq.) DC. var. *leucosperma* Voigt = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia lasiocalyx Kuntze = **Canavalia mattogrossensis** (Barb. Rodr.) Malme

Canavalia lenta Benth. = **Canavalia picta** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia leptophylla Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia maritima (Aubl.) Urb., nom. illeg. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia maritima Thouars = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia mattogrossensis (Barb. Rodr.) Malme
Sin.: *Canavalia lasiocalyx* Kuntze, *Mucuna mattogrossensis* Barb. Rodr., *Wenderothia mattogrossensis* (Barb. Rodr.) Piper
Referencias: Sauer, J. D., 1964.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5118* (GH, M, P)].

Canavalia mexicana Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia miniata (Kunth) DC. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia monodon E. Mey. = **Canavalia bonariensis** Lindl.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia obtusifolia DC. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia obtusifolia DC. var. *emarginatus* (Jacq.) DC. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia obtusifolia DC. var. *insularis* Ridl. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia panamensis Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia paraguayensis Piper = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia paranensis Hook. & Arn. = **Canavalia bonariensis** Lindl.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Sauer, J. D., 1964.

Canavalia peruviana Piper = **Dioclea virgata** (Rich.) Amshoff

Canavalia picta Mart. ex Benth.
Sin.: *Canavalia lenta* Benth., *Wenderothia lenta* (Benth.) Piper, *Wenderothia picta* (Mart. ex Benth.) Piper
Referencias: Sauer, J. D., 1964.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 9783* (C, NY)].

Canavalia piperi Killip & J.F. Macbr.
Sin.: *Canavalia brasiliensis* auct. non Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.
Liana. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 6082* (BM, F, GH, MO, SI, UC, US)].

Canavalia prolifera Piper ex Ricker = **Canavalia brasiliensis** Mart. ex Benth.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Canavalia rosea (Sw.) DC.
Sin.: *Canavalia apiculata* Piper, *Canavalia arenicola* Piper, *Canavalia baueriana* Endl., *Canavalia emarginata* (Jacq.) G. Don, *Canavalia maritima* (Aubl.) Urb., nom. illeg., *Canavalia maritima* Thouars, *Canavalia miniata* (Kunth) DC., *Canavalia obtusifolia* DC., *Canavalia obtusifolia* DC. var. *emarginatus* (Jacq.) DC., *Canavalia obtusifolia* DC. var. *insularis* Ridl., *Dolichos emarginatus* Jacq., *Dolichos littoralis* Vell., *Dolichos maritimus* Aubl., *Dolichos miniatus* Kunth, *Dolichos roseus* Sw.
Referencias: Lewis, G. P., 1987.
Enredadera o liana. Perenne. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13517* (BM, NY, S, US)].

Canavalia tortilis Frapp. ex Cordem. = **Canavalia bonariensis** Lindl.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Cansenia ungulata (L.) Raf. = **Bauhinia ungulata** L. var. **ungulata**

Caracalla pulcherrima Tod. = **Vigna caracalla** (L.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Cascaronia Griseb.

Número de especies: 1

Cascaronia astragalina Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1952a.
Árbol. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7398* (BAB)].

Cassia L.

Número de especies: 2

Cassia absus L. = **Chamaecrista absus** (L.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia acanthoclada Griseb. = **Senna acanthoclada** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia acinacicarapa Rusby = **Senna morongii** (Britton) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aculeata Pohl ex Benth. = **Senna aculeata** (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia adscendens Mart. ex Colla = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **desvauxii**

Cassia alata L. = **Senna alata** (L.) Roxb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia alata L. var. *perennis* Pamp. = **Senna alata** (L.) Roxb.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia alata L. var. *rumphiana* DC. = **Senna alata** (L.) Roxb.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia alcaparra Phil. = **Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **alcaparra** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia amambaya H.S. Irwin & Barneby = **Chamaecrista amambaya** (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby

Cassia amazonica Ducke = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia andina Phil. = **Senna arnottiana** (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia apaënsis Chodat & Hassl. = **Chamaecrista repens** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aphylla Cav. = **Senna aphylla** (Cav.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aphylla Cav. var. *rigida* Hieron. = **Senna rigida** (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aphylla Cav. var. *robusta* Burkart = **Senna chacoënsis** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby

Cassia aphylla Cav. var. *trichosepala* Chodat & Wilczek = **Senna trichosepala** (Chodat & Wilczek) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aphylla Cav. var. *virgata* Burkart = **Senna aphylla** (Cav.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aphylla Cav. subsp. *divaricata* (Hieron.) L. Bravo = **Senna aphylla** (Cav.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia arenaria Kunth = **Chamaecrista flexuosa** (L.) Greene

Cassia arequipensis Meyen ex Vogel = **Senna birostris** (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **arequipensis** (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia aristellata (Pennell) Cory ex Cory & Parks = **Chamaecrista calycioides** (DC. ex Collad.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia arlindo-andradei Hoehne = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia arlindo-andradei Hoehne var. *major* Hoehne = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis

Cassia arnottiana Gillies ex Hook. = **Senna arnottiana** (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia arnottiana Gillies ex Hook. var. *andina* (Phil.) Reiche = **Senna arnottiana** (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia arnottiana Gillies ex Hook. var. *sericea* Burkart = **Senna arnottiana** (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia barbata Nees & Mart. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl. = **Chamaecrista viscosa** (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia barlettii Standl. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia bauhiniifolia Kunth = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia bicapsularis L. f. *pilosa* Chodat & Hassl. = **Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **paludicola** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia bicapsularis L. var. *chilensis* Benth. = **Senna candolleana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia bicapsularis L. var. *eriocarpa* Griseb. = **Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **eriocarpa** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia bifoliola Pers. ex R. Knuth = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia bifoliolata DC. ex Collad. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia bifoliolata DC. ex Collad. var. *pentandra* (Raddi) Desv. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia bifoliolata DC. ex Collad. var. *rotundifolia* (Pers.) Desv., nom. illeg. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia biglandulosa Bertol. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Cassia borbonioides Vogel = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **langsdorffii** (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia brachypoda Benth. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **brachypoda** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia bracteata L. f. = **Senna alata** (L.) Roxb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

[Cassia bracteosa Lass.]
Notas: Nombre dudoso.

Cassia brevipes DC. ex Collad. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia brongniartii Gaudich. = **Senna brongniartii** (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia broughtonii Fawc. & Rendle = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia browniana (Britton & Rose) Philipson, nom. illeg. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia burkartiana Villa = **Senna burkartiana** (Villa) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia calycioides DC. ex Collad. = **Chamaecrista calycioides** (DC. ex Collad.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia campanae Phil. = **Senna cruckshanksii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia camporum Benth. = **Chamaecrista campestris** H.S. Irwin & Barneby

Cassia candolleana Vogel = **Senna candolleana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia carnaval Speg. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia caroliniana Walter = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia cathartica Mart. subsp. *floribunda* Hassl. = **Chamaecrista amambaya** (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby

Cassia cernua Balb. = **Senna cernua** (Balb.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia chacoënsis L. Bravo = **Senna chacoënsis** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia chamaecrista L. var. *brasiliensis* Vogel = **Chamaecrista glandulosa** (L.) Greene var. **brasiliensis** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia chamaecrista L. var. *hypnotica* (Vell.) N.F. Mattos = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia chartacea H.S. Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **langsdorffii** (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia chloroclada Harms = **Senna chloroclada** (Harms) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia ciliata Raf. = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia closiana Phil. = **Senna candolleana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia cochabambae Herzog = **Senna morongii** (Britton) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia comayaguana (Britton & Rose) Lundell = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia confusa Phil. var. *campanae* (Phil.) Reiche = **Senna cruckshanksii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia conjugata Ruiz & Pav. ex Benth. = **Senna brongniartii** (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia coquimbensis Vogel = **Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **coquimbensis** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia cordistipula Mart. = **Chamaecrista cordistipula** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia corymbosa Lam. = **Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia crassifolia Ortega = **Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia crassiramea Benth. = **Senna crassiramea** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia cruckshanksii Hook. & Arn. = **Senna cruckshanksii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia cumingii Hook. & Arn. = **Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **cumingii**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia desvauxii Collad. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **desvauxii**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia desvauxii Collad. var. *brevipes* Benth. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia desvauxii Collad. var. *mollissima* Benth. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia desvauxii (Collad.) Killip var. *stipulacea* Pilg. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia disadena Steud. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **disadena** (Steud.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia edulis Posada-Ar. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia egregia Sandwith = **Senna kurtzii** (Harms) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia emarginata Clos, nom. illeg. = **Senna candolleana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia erecta Willd. ex Steud. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia eremobia Phil. = **Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **eremobia** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia excelsa Schrad. var. *acutifolia* Hassl. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia fabaginifolia Kunth = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia fabrisii L. Bravo = **Senna fabrisii** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia falcata Dum. Cours., nom. superfl. = **Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia falcata L. = **Senna occidentalis** (L.) Link
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia fenixensis (Britton & Rose) Lundell = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia ferruginea (Schrad.) DC. var. **velloziana** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Glaziou, A. F. M. 10696* (NY, P)].

Cassia filipes Benth. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia flaccida Clos = **Senna cumingii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby var. **coquimbensis** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia flavicoma Humb., Bonpl. & Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia flexuosa L. = **Chamaecrista flexuosa** (L.) Greene
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia flexuosa Mill., hom. illeg. = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **serpens**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia flexuosa L. var. *euyabensis* Pilg. = **Chamaecrista flexuosa** (L.) Greene

Cassia flexuosa L. var. *pubescens* Benth. = **Chamaecrista flexuosa** (L.) Greene

Cassia foetida Pers., nom. illeg. = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia foetida Ruiz & Pav. ex G. Don = **Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia foliosa Phil. = **Senna foliosa** (Phil.) Zoellner & San Martin, nom. illeg.

Cassia gemina Vell. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia glaucescens Benth. = **Senna urmenetae** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia gonoclada Benth. = **Chamaecrista gonoclada** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia guaranitica Chodat & Hassl. = **Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **guaranitica** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia guaranitica Chodat & Hassl. f. *latifolia* Chodat & Hassl. = **Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **guaranitica** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia hassleri H.S. Irwin & Barneby = **Chamaecrista hassleri** (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby

Cassia herpetica Jacq., nom. superfl. = **Senna alata** (L.) Roxb.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia hilariana Benth. = **Senna hilariana** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia hirsuta auct. non L. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia hispidula Vahl var. *oblongifolia* Chodat & Hassl. = **Chamaecrista campestris** H.S. Irwin & Barneby

Cassia hookeriana Hook. = **Senna birostris** (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **hookeriana** (Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia huidobriana Phil. = **Senna huidobriana** (Phil.) Zoellner & San Martin

Cassia humboldtiana DC. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia humilis (Pers.) Collad. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia hypnotica Vell. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia ignorata Hoehne = **Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia incana Vogel = **Chamaecrista incana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia indecora Kunth var. *glabrata* Vogel = **Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **glabrata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia kurtzii Harms = **Senna kurtzii** (Harms) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia lanceolata Pers. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia langsdorffii Kunth ex Vogel = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **langsdorffii** (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia langsdorffii Kunth ex Vogel var. *longipedicellata* H.S. Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **desvauxii**

Cassia langsdorffii Kunth ex Vogel var. *parvifoliola* H.S. Irwin = **Chamaecrista ramosa** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **parvifoliola** (H.S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia latistipulata Benth. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia latistipulata Benth. var. *glauca* Hassl. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia leiophylla Vogel = **Senna leiophylla** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia leptadenia Greenm. var. *jaliscensis* Greenm. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia leptocarpa auct. non Benth. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **streptocarpa** H.S. Irwin & Barneby

Cassia leptocarpa Benth. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **leptocarpa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia leptocarpa Benth. var. *hirsuta* auct. non Benth. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia leptophylla Vogel
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Mattos, N. F., 1983; Rambo, B., 1966; Reitz, R. & Klein, J. T., 1964.

Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 7615* (HBR, NY, PACA, U)].

Cassia lindleyana Gardner = **Senna multijuga** (Rich.) H.S. Irwin & Barneby subsp. **lindleyana** (Gardner) H.S. Irwin & Barneby

Cassia longisiliqua Blanco = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia lorentzii Niederl. ex Lorentz & Niederl. = **Senna arnottiana** (Gillies ex Hook.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia macradena Collad. = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia macranthera DC. ex Collad. = **Senna macranthera** (DC. ex Collad.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia macrocarpa Micheli = **Senna cernua** (Balb.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia madrensis (Rose ex Britton & Rose) Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia mayana Lundell = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia mimosoides L. = **Chamaecrista mimosoides** (L.) Greene

Cassia misera Phil. = **Senna brongniartii** (Gaudich.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia monophylla Vell. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia morongii Britton = **Senna morongii** (Britton) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia mucronifera Mart. ex Benth. = **Senna mucronifera** (Mart. ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia multijuga Rich. var. *lindleyana* (Gardner) Benth. = **Senna multijuga** (Rich.) H.S. Irwin & Barneby subsp. **lindleyana** (Gardner) H.S. Irwin & Barneby

Cassia myrtifolia Phil. ex Reiche = **Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia nana Benth. = **Senna nana** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia neglecta Vogel = **Senna neglecta** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia neglecta Vogel var. *entreriana* Griseb. = **Senna scabriuscula** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia nicoyana (Britton ex Britton & Rose) Standl. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia nudicaulis Burkart = **Senna nudicaulis** (Burkart) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia obliquifolia Schrank = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia oblongifolia Vogel = **Senna oblongifolia** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia obtusa Clos = **Senna candolleana** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia obtusifolia L. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia occidentalis L. = **Senna occidentalis** (L.) Link
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia occidentalis L. f. *ovato-lanceolata* Chodat & Hassl. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia occidentalis L. var. *aristata* Collad. = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia occidentalis L. var. *entreriana* (Griseb.) Burkart = **Senna scabriuscula** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia occidentalis L. var. *scabriuscula* Vogel = **Senna scabriuscula** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia oreades Phil. = **Senna urmenetae** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pachyrrhiza L. Bravo = **Senna pachyrrhiza** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia paposana Phil. = **Senna paposana** (Phil.) Zoellner & San Martin
Referencias: Zöllner, O. & San Martín, C., 1986.

Cassia paradictyon Vogel = **Senna paradictyon** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby

Cassia paraguensis Micheli = **Chamaecrista viscosa** (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia parahyba Vell. = **Schizolobium parahyba** (Vell.) S.F. Blake

Cassia patellaria auct. non DC. ex Collad. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia patellaria DC. ex Collad. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Cassia patellaria DC. ex Collad. var. *longifolia* Benth. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Cassia patellaria DC. ex Collad. var. *ramosa* Vogel = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Cassia pedersenii Burkart = **Chamaecrista calycioides** (DC. ex Collad.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pendula Willd. var. *eriocarpa* (Griseb.) Lass. = **Senna pendula** (Willd.) H.S. Irwin & Barneby var. **eriocarpa** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pennelliana Amshoff = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia pentandra Raddi = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pentandria Larrañaga, hom. illeg. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia persoonii Collad. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia picachensis Brandegee = **Chamaecrista flexuosa** (L.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pilifera Vogel = **Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pilifera Vogel f. *pilosa* Chodat & Hassl. = **Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pilifera Vogel f. *sericea* Chodat & Hassl. = **Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia piribebuiensis Chodat & Hassl. = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **piribebuiensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia planisiliqua L. = **Senna occidentalis** (L.) Link
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia planisiliqua Lam., hom. illeg. = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia plumieri DC. = **Senna occidentalis** (L.) Link

Cassia propinqua Kunth = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia prostrata Kunth = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **serpens**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia psammophila Benth. = **Chamaecrista cordistipula** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia pubescens Jacq. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia pulchra Kunth = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia punctata Vogel = **Chamaecrista punctata** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia racemosa Mill. = **Senna racemosa** (Mill.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia repens Vogel = **Chamaecrista repens** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia rigida (Hieron.) Burkart = **Senna rigida** (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia rigida (Hieron.) Burkart var. *inermis* L. Bravo = **Senna rigida** (Hieron.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rigida (Hieron.) Burkart var. *robusta* Burkart = **Senna chacoënsis** (L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rigidicaulis Burkart ex L. Bravo = **Senna rigidicaulis** (Burkart ex L. Bravo) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia riparia Kunth = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia riparia Kunth var. *pilosa* Benth. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rojasiana Hassl. = **Senna morongii** (Britton) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rotundifolia Pers. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia rotundifolia Pers. var. *bauhiniifolia* (Kunth) Benth. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rotundifolia Pers. var. *grandiflora* Benth. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rotundifolia Pers. var. *grandiflora* Micheli, nom. nud. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rotundifolia Pers. var. *longepedicellata* Chodat & Hassl., nom. nud. = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia rugosa G. Don = **Senna rugosa** (G. Don) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia schlimii Benth. = **Chamaecrista cordistipula** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia serpens L. = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **serpens**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia serpens L. var. *grandiflora* Benth. = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *ferruginea* Chodat & Hassl. = **Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **unifaria** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia silvestris (Vell.) H.S. Irwin & Barneby f. *olivacea* Chodat & Hassl. = **Senna silvestris** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby var. **unifaria** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia simplex (Standl.) Standl., nom. nud. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia speciosa Kunth = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia spectabilis DC. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia spiniflora Burkart = **Senna spiniflora** (Burkart) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia splendida Vogel = **Senna splendida** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia stenocarpa Vogel var. *stenocarpoides* (Britton) Schery = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia stenocarpoides (Britton) Lundell = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia stipulacea Aiton = **Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia stipulacea Willd., nom. illeg. = **Senna stipulacea** (Aiton) H.S. Irwin & Barneby var. **stipulacea**

Cassia stipulacea Aiton var. *tenuistipula* Bertero ex Vogel = **Senna cruckshanksii** (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

[Cassia striata Vogel]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Cassia subulata Griseb. = **Senna subulata** (Griseb.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia sulcata Blanco, hom. illeg. = **Senna hirsuta** (L.) H.S. Irwin & Barneby var. **puberula** H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia sulcata DC. = **Senna cernua** (Balb.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia tarapacana Phil. = **Senna birostris** (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **arequipensis** (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tecta Vogel = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tenella Kunth = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia tenuivenosa A.P.D. Jones = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tetraphylla Martyn var. *brevipes* (Benth.) H.S. Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Cassia tetraphylla Martyn var. *colombiana* H.S. Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tetraphylla Martyn var. *littoralis* H.S. Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **desvauxii**

Cassia tetraphylla Martyn var. *longifolia* Amshoff = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tetraphylla Martyn var. *mollissima* (Benth.) H.S. Irwin = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tomentosa L. f. var. *paucijuga* Kuntze = **Senna morongii** (Britton) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tora L. f. *hirsuta* Chodat & Hassl. = **Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tora L. var. *humilis* Pers. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia toroides Raf. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cassia toroides Roxb., nom. nud. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia totonaca Sessé & Moç. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia trachycarpa Vogel subsp. *macrophylla* Hassl. = **Chamaecrista hassleri** (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby

Cassia trichopoda Benth. = **Chamaecrista trichopoda** (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip

Cassia trichosepala (Chodat & Wilczek) L. Bravo = **Senna trichosepala** (Chodat & Wilczek) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia trinitatis Rchb. ex DC. = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia tropica Vell. = **Senna tropica** (Vell.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia uniflora Mill. var. *glaucescens* Vogel = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **desvauxii**

Cassia urmenetae Phil. = **Senna urmenetae** (Phil.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia velutina Vogel = **Senna velutina** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia vestita Vogel = **Chamaecrista vestita** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia villosissima (Britton & Rose) Lundell = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Cassia viscosa (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby = **Chamaecrista viscosa** (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cassia wilsonii (Britton & Rose) Standl. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby

Cathartocarpus speciosus (DC.) G. Don = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cathartocarpus trinitatis (DC.) G. Don = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Cathormion polyanthum (A. Spreng.) Burkart = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Bernardi, L., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Cathormion polycephalum (Griseb.) Burkart, hom. illeg. = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992b.

Cenostigma aculeatifolium Burkart = **Lophocarpinia aculeatifolia** (Burkart) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944b.

Cenostigma sclerophyllum Malme = **Caesalpinia marginata** Tul.
Referencias: Lewis, G. P., 1998.

Centrolobium Mart. ex Benth.

Número de especies: 2

Centrolobium microchaete (Mart. ex Benth.) H.C. Lima
Sin.: *Centrolobium minus* auct. non C. Presl, *Centrolobium robustum* (Vell.) Mart. ex Benth. var. *microchaete* Mart. ex Benth.
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Lima, H. C., 1985.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Camargo, R. A. 185* (ICN)].

Centrolobium minus auct. non C. Presl = **Centrolobium microchaete** (Mart. ex Benth.) H.C. Lima

Centrolobium robustum (Vell.) Mart. ex Benth. var. *microchaete* Mart. ex Benth. = **Centrolobium microchaete** (Mart. ex Benth.) H.C. Lima
Referencias: Lima, H. C., 1985.

Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.
Referencias: Lima, H. C., 1985.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15719* (MBM, RB)].

Centrosema (DC.) Benth.

Número de especies: 10, 2 endémicas

Centrosema angustifolium (Kunth) Benth.
Sin.: *Bradburya angustifolia* (Kunth) Kuntze, *Centrosema brasilianum* (L.) Benth. var. *angustifolium* (Benth.) Amshoff, nom. illeg., *Clitoria angustifolia* Kunth
Referencias: Fantz, P. R., 2001.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4073* (R)].

Centrosema arenarium Benth.
Sin.: *Bradburya arenaria* (Benth.) Kuntze, *Centrosema brachypodum* Benth., *Centrosema rigidulum* Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977; Lewis, G. P., 1987.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4063* (RB)].

Centrosema biflorum Mart. ex Benth. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Centrosema brachypodum Benth. = **Centrosema arenarium** Benth.

Centrosema bracteosum Benth.
Sin.: *Bradburya bracteosa* (Benth.) Kuntze
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20415* (NY)].

Centrosema brasilianum (L.) Benth.
Sin.: *Bradburya brasiliana* (L.) Kuntze, *Bradburya insulana* (Vell.) Kuntze, *Centrosema insulanum* (Vell.) Steud., *Clitoria brasiliana* L., *Clitoria formosa* Kunth, *Clitoria insulana* Arráb., hom. illeg., *Clitoria insulana* Vell., *Vexillaria brasiliana* (L.) Hoffmanns.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977; Burkart, A., 1937b; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Lewis, G. P., 1987.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*von Güllich, C. s.n.* (LPS)]; BRA[*Krapovickas, A. 43511* (CTES)]; PRY[*Krapovickas, A. 14300* (SI)].

Centrosema brasilianum (L.) Benth. var. *angustifolium* (Benth.) Amshoff, nom. illeg. = **Centrosema angustifolium** (Kunth) Benth.

Centrosema decumbens Mart. ex Benth. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Centrosema dubium (Kunth) Benth. = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Centrosema hastatum Benth. = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Centrosema insulanum (Vell.) Steud. = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Centrosema kermesi Burkart
Referencias: Burkart, A., 1937b.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kermes, E. 539* (BAB)].

Centrosema micranthum Steud. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Centrosema pascuorum auct. non Mart. ex Benth. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.

Centrosema pascuorum Mart. ex Benth.
Sin.: *Bradburya pascuorum* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze f. *pascuorum* (Mart. ex Benth.) Lindm., *Centrosema sinuatum* (Desv.) Benth., *Clitoria sinuata* Desv.
Referencias: Burkart, A., 1937b; Lewis, G. P., 1987; Miotto, S. T. S., 1987; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hicken, C. M. 192* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2131* (SI)].

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.
Sin.: *Bradburya plumieri* (Turpin ex Pers.) Kuntze, *Clitoria plumieri* Turpin ex Pers., *Cruminium giganteum* Desv.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977; Lewis, G. P., 1987.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CEN, GUA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 7869* (RB)]; PRY[*Jörgensen, P. 4198* (BAB)].

Centrosema rigidulum Benth. = **Centrosema arenarium** Benth.

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Malme, nom. illeg. = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Sin.: *Bradburya dubia* (Kunth) Kuntze, *Bradburya sagittata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rose, *Centrosema dubium* (Kunth) Benth., *Centrosema hastatum* Benth., *Centrosema sagittatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Malme, nom. illeg., *Glycine sagittata* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Rudolphia dubia* Kunth
Referencias: Barbosa, V. P., 1977; Burkart, A., 1937b; Miotto, S. T. S., 1987.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Quiroga, H. 273* (BAF)]; BRA[*Hatschbach, G. 19118* (SI)]; PRY[*Fortunato, R. H. 1168* (BAB)].

Centrosema scabriusculum Hassk. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Centrosema sinuatum (Desv.) Benth. = **Centrosema pascuorum** Mart. ex Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Centrosema variifolium Burkart
Referencias: Burkart, A., 1937b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 178* (SI)].

Centrosema virginianum (L.) Benth.
Sin.: *Bradburya biflora* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Bradburya conjugata* (Lehm.) Kuntze, *Bradburya decumbens* (Mart.) Kuntze, *Bradburya virginiana* (L.) Kuntze, *Centrosema biflorum* Mart. ex Benth., *Centrosema decumbens* Mart. ex Benth., *Centrosema micranthum* Steud., *Centrosema pascuorum* auct. non Mart. ex Benth., *Centrosema scabriusculum* Hassk., *Centrosema virginianum* (L.) Benth. var. *angustifolium* Griseb., *Clitoria alabamensis* Bertol., *Clitoria amoena* Roth, *Clitoria gemina* Vell., *Clitoria virginiana* L., *Cruminium virginianum* (L.) Britton, *Glycine pugiunculus* Desv., *Steganotropis conjugata* Lehm.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977; Burkart, A., 1937b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lewis, G. P., 1987; Miotto, S. T. S., 1987; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CEN, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(CLA, MAL, MON, RIV, ROC, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Keller, H. A. 80* (CTES, SI)]; BRA[*Porto, M. L. 2261* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 9198* (BAB)]; URY[*Arechavaleta, J. 5592* (MVM)].

Centrosema virginianum (L.) Benth. var. *angustifolium* Griseb. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1937b.

Ceratonia chilensis Molina = **Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **chilensis**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Cercidium Tul.

Número de especies: 2

Cercidium andicola Griseb.
Sin.: *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms var. *andicola* (Griseb.) Hosseus
Referencias: Burkart, A. & Carter, A., 1976; Burkart, A., 1952a; Grisebach, A. H. R., 1879; Ulibarri, E. A., 1997a.
Arbusto. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7638* (BAB)].

[Cercidium andicola Griseb. var. petiolata Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Cercidium australe I.M. Johnst. = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **glaucum** (Cav.) Burkart & Carter
Referencias: Burkart, A. & Carter, A., 1976; Fortunato, R. H., 1984a.

Cercidium plurifoliolatum Micheli = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **praecox**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A. & Carter, A., 1976; Ulibarri, E. A., 1997a.

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hauman, nom. illeg. = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **praecox**

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms var. *andicola* (Griseb.) Hosseus = **Cercidium andicola** Griseb.

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **glaucum** (Cav.) Burkart & Carter
Sin.: *Cercidium australe* I.M. Johnst., *Pomaria glauca* Cav.
Referencias: Burkart, A. & Carter, A., 1976; Fortunato, R. H., 1984a; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Ulibarri, E. A., 1997a.
Arbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SFE, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 24516* (SI)].

Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **praecox**
Sin.: *Caesalpinia praecox* Ruiz & Pav. ex Hook., *Cercidium plurifoliolatum* Micheli, *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hauman, nom. illeg., *Cercidium praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hauman, nom. illeg., *Cercidium spinosum* Tul., *Parkinsonia praecox* (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A. & Carter, A., 1976; Hawkins, J. A., White Olascoaga, L., Hughes, C. E., Contreras Jiménez, J. L. R. & Mercado Ruaro, P., 1999; Ulibarri, E. A., 1997a.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); PRY(APY, AMA, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 10626* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4185* (G, SI)].
Notas: Hawkins et al. (1999) transfieren la especie al género *Parkinsonia*.

Cercidium spinosum Tul. = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **praecox**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A. & Carter, A., 1976.

Chaetocalyx DC.

Número de especies: 5, 2 endémicas

Chaetocalyx belizensis Standl. = **Chaetocalyx brasiliensis** (Vogel) Benth.

Chaetocalyx brasiliensis (Vogel) Benth.
Sin.: *Chaetocalyx belizensis* Standl., *Chaetocalyx ilheotica* Taub., *Chaetocalyx matudai* Lundell, *Rhadinocarpus brasiliensis* Vogel
Referencias: Burkart, A., 1939c; Rudd, V. E., 1958; Vanni, R. O., 1983.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, SCA); PRY(APA, CEN, COA, GUA, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 7362* (CTES)]; BRA[*Tessmann, G. 6079* (A, K, RB)]; PRY[*Rojas, T. 2895* (SI)].

Chaetocalyx chacoensis Vanni
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Vanni, R. O., 1981.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 16460* (CTES, NY)].

Chaetocalyx glaziovii Taub. = **Chaetocalyx longiflora** Benth. ex A. Gray

Chaetocalyx hebecarpa Benth. = **Chaetocalyx longiflora** Benth. ex A. Gray
Referencias: Rudd, V. E., 1958.

Chaetocalyx hebecarpa Benth. var. *mollis* Benth. = **Chaetocalyx longiflora** Benth. ex A. Gray

Chaetocalyx hebecarpa Benth. var. *oblongifolia* Benth. = **Chaetocalyx longiflora** Benth. ex A. Gray

Chaetocalyx ilheotica Taub. = **Chaetocalyx brasiliensis** (Vogel) Benth.

Chaetocalyx latifolia Benth. var. **latifolia**
Referencias: Burkart, A., 1939c; Vanni, R. O., 1983.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vanni, R. O. 34* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 11538* (BAF)].

Chaetocalyx latifolia Benth. var. **setulifera** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (BAB, LPS)].

Chaetocalyx longiflora Benth. ex A. Gray
Sin.: *Chaetocalyx glaziovii* Taub., *Chaetocalyx hebecarpa* Benth., *Chaetocalyx hebecarpa* Benth. var. *mollis* Benth., *Chaetocalyx hebecarpa* Benth. var. *oblongifolia* Benth.
Referencias: Lewis, G. P., 1987; Rudd, V. E., 1958; Vanni, R. O., 1983.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APA, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vanni, R. O. 4003* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 11157* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 28264* (CTES)].

Chaetocalyx matudai Lundell = **Chaetocalyx brasiliensis** (Vogel) Benth.

Chaetocalyx nigricans Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1958; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1977.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, SCA); URY(ART, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 8197* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 11272* (US)]; URY[*Berro, M. B. 3369* (MVFA)].

Chaetocalyx parviflora Benth. = **Chaetocalyx scandens** (L.) Urb. var. **pubescens** (DC.) Rudd
Referencias: Rudd, V. E., 1958.

[Chaetocalyx scandens (L.) Urb. var. pubescens (DC.) Rudd]
Sin.: *Chaetocalyx parviflora* Benth.
Referencias: Rudd, V. E., 1958.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Chaetocalyx vestitus Rizzini = **Justicia goudotii** V.A.W. Graham
Referencias: Ezcurra, C., 2002.

Chamaecrista Moench

Número de especies: 20, 4 endémicas, 1 introducida

Chamaecrista absus (L.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia absus* L.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Zardini, E. M. 20648* (MO)].

Chamaecrista amambaya (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia amambaya* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia cathartica* Mart. subsp. *floribunda* Hassl.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Subarbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: PRY(AMA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10862* (G, NY)].

Chamaecrista amplistipulata Rose = **Chamaecrista flexuosa** (L.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista arachiphylla Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1996; Fortunato, R. H. & Palese, R., 1999a.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 10773* (G)]; PRY[*Krapovickas, A. 45456* (CTES, NY)].

Chamaecrista aristellata Pennell = **Chamaecrista calycioides** (DC. ex Collad.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista bauhiniifolia (Kunth) Gleason = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista bifolliolata (DC. ex Collad.) Greene = **Chamaecrista rotundifolia** (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista brevipes (DC. ex Collad.) Greene
= **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista browniana Britton & Rose
= **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista calycioides (DC. ex Collad.) Greene
Sin.: *Cassia aristellata* (Pennell) Cory ex Cory & Parks, *Cassia calycioides* DC. ex Collad., *Cassia pedersenii* Burkart, *Chamaecrista aristellata* Pennell
Referencias: Burkart, A., 1969c; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, SDE); PRY(CAU, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 5824* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4217* (BM)];

Chamaecrista campestris H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia camporum* Benth., *Cassia hispidula* Vahl var. *oblongifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1978, 1982.
Arbusto. Nativa. 400–800 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10677* (SI)].

Chamaecrista comayaguana Britton & Rose
= **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista conzattii Britton & Rose = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista cordistipula (Mart.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia cordistipula* Mart., *Cassia psammophila* Benth., *Cassia schlimii* Benth., *Chamaecrista schlimii* (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6609* (G)].

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **brevipes** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia brevipes* DC. ex Collad., *Cassia desvauxii* (Collad.) Killip var. *stipulacea* Pilg., *Cassia desvauxii* Collad. var. *brevipes* Benth., *Cassia tetraphylla* Martyn var. *brevipes* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista brevipes* (DC. ex Collad.) Greene
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Jiménez, B. 1834* (BM, CTES, MO, PY)].

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **desvauxii**
Sin.: *Cassia adscendens* Mart. ex Colla, *Cassia desvauxii* Collad., *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel var. *longipedicellata* H.S. Irwin, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *littoralis* H.S. Irwin, *Cassia uniflora* Mill. var. *glaucescens* Vogel
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Lewis, G. P., 1987.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Lindeman, J. C. 2622* (NY)].

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. *glauca* (Hassl.) H.S. Irwin & Barneby = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **langsdorffii** (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia borbonioides* Vogel, *Cassia chartacea* H.S. Irwin, *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel, *Chamaecrista langsdorffii* (Kunth ex Vogel) Britton ex Pittier
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, PAI).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13486* (MBM)]; PRY[*Zardini, E. M. 10211* (MO)].

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **latistipula** (Benth.) G.P. Lewis
Sin.: *Cassia arlindo-andradei* Hoehne, *Cassia arlindo-andradei* Hoehne var. *major* Hoehne, *Cassia latistipulata* Benth., *Cassia latistipulata* Benth. var. *glauca* Hassl., *Chamaecrista desvauxii* (Collad.) Killip var. *glauca* (Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Lewis, G. P., 1987.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100–1600 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 5732* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 22163* (MBM, NY)]; PRY[*Hassler, E. 10080* (G, K)].

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia barlettii* Standl., *Cassia desvauxii* Collad. var. *mollissima* Benth., *Cassia lanceolata* Pers., *Cassia madrensis* (Rose ex Britton & Rose) Irwin, *Cassia persoonii* Collad., *Cassia pulchra* Kunth, *Cassia tecta* Vogel, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *colombiana* H.S. Irwin, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *longifolia* Amshoff, *Cassia tetraphylla* Martyn var. *mollissima* (Benth.) H.S. Irwin, *Chamaecrista madrensis* Rose ex Britton & Rose, *Chamaecrista persoonii* (Collad.) Greene, *Chamaecrista pulchra* (Kunth) Britton & Killip
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Arbusto o subarbusto. Nativa.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAU, COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8031* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 7928* (MBM)]; PRY[*Rojas, T. 4197a* (SI)].

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip var. **piribebuiensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia piribebuiensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–400 m.
Países: PRY(COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6118* (G, NY, S)].

Chamaecrista flexuosa (L.) Greene
Sin.: *Cassia arenaria* Kunth, *Cassia flexuosa* L., *Cassia flexuosa* L. var. *euyabensis* Pilg., *Cassia flexuosa* L. var. *pubescens* Benth., *Cassia picachensis* Brandegee, *Chamaecrista amplistipulata* Rose
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, COA, PAI); URY(COL, RNO, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1632* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 1814* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 3385b* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1955* (MVFA)].

[Chamaecrista glandulosa (L.) Greene var. brasiliensis (Vogel) H.S. Irwin & Barneby]
Sin.: *Cassia chamaecrista* L. var. *brasiliensis* Vogel
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Chamaecrista gonoclada (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia gonoclada* Benth.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Riedel, L. 468* (LE, NY)]; PRY[*Hassler, E. 10088* (G)].

Chamaecrista hassleri (H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia hassleri* H.S. Irwin & Barneby, *Cassia trachycarpa* Vogel subsp. *macrophylla* Hassl.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1978, 1982.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 9833* (MO)].

Chamaecrista incana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia incana* Vogel
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1978, 1982.
Nativa. 1000–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Landrum, L. R. 4059* (NY)].

Chamaecrista langsdorffii (Kunth ex Vogel) Britton ex Pittier = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **langsdorffii** (Kunth ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista leptadenia (Greenm.) Cockerell var. *jaliscensis* Greenm. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista longicona Britton & Rose = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista madrensis Rose ex Britton & Rose = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

[Chamaecrista mimosoides (L.) Greene]
Sin.: *Cassia mimosoides* L.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chamaecrista nicoyana Britton ex Britton & Rose = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia broughtonii* Fawc. & Rendle, *Cassia leptadenia* Greenm. var. *jaliscensis* Greenm., *Cassia nicoyana* (Britton ex Britton & Rose) Standl., *Cassia patellaria* auct. non DC. ex Collad., *Cassia riparia* Kunth, *Cassia wilsonii* (Britton & Rose) Standl., *Chamaecrista leptadenia* (Greenm.) Cockerell var. *jaliscensis* Greenm., *Chamaecrista longicona* Britton & Rose, *Chamaecrista nicoyana* Britton ex Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton, *Chamaecrista wilsonii* Britton & Rose
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Anual. Nativa.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7663* (BAB)].

[Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. nictitans]
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia browniana* (Britton & Rose) Philipson, nom. illeg., *Cassia chamaecrista* L. var. *hypnotica* (Vell.) N.F. Mattos, *Cassia flavicoma* Humb., Bonpl. & Kunth var. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Cassia gemina* Vell., *Cassia hypnotica* Vell., *Cassia pennelliana* Amshoff, *Cassia simplex* (Standl.) Standl., nom. nud., *Chamaecrista browniana* Britton & Rose, *Chamaecrista simplex* Standl., nom. nud.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CAA, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 9933* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 5420* (G, K, P)].

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Sin.: *Cassia biglandulosa* Bertol., *Cassia patellaria* DC. ex Collad., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *longifolia* Benth., *Cassia patellaria* DC. ex Collad. var. *ramosa*

Vogel, *Cassia villosissima* (Britton & Rose) Lundell, *Chamaecrista nictitans* (L.) Moench var. *ramosa* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby, *Chamaecrista patellaria* (DC. ex Collad.) Greene, *Chamaecrista villosissima* Britton & Rose
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(GUA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 3480* (BAB)]; BRA[*Bortoluzzi, R. L. C. 1163* (ICN), *Reitz, P. R. 2507* (HBR), *Rodrígues, R. S. 649* (ICN)]; PRY[*Schinini, A. 27966* (CTES)].

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia comayaguana* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia erecta* Willd. ex Steud., *Cassia fenixensis* (Britton & Rose) Lundell, *Cassia mayana* Lundell, *Cassia propinqua* Kunth, *Cassia riparia* Kunth var. *pilosa* Benth., *Cassia stenocarpa* Vogel var. *stenocarpoides* (Britton) Schery, *Cassia stenocarpoides* (Britton) Lundell, *Chamaecrista comayaguana* Britton & Rose, *Chamaecrista conzattii* Britton & Rose, *Chamaecrista riparia* (Kunth) Britton var. *pilosa* Benth., *Chamaecrista salvadorensis* Britton, *Chamaecrista stenocarpoides* Britton, *Chamaecrista tonduzii* Britton & Rose
Referencias: Camargo, R. A. & Miotto, S. T. S., 2004; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 736* (HBR)]; PRY[*Hassler, E. 6643* (G)].

Chamaecrista nictitans (L.) Moench var. *ramosa* (Vogel) H.S. Irwin & Barneby = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. **brachypoda** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia brachypoda* Benth.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Anual. Nativa. 200–500 m.
Países: PRY(COA, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Zardini, E. M. 38937* (BAB, MO)].

Chamaecrista nictitans (L.) Moench subsp. **disadena** (Steud.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia disadena* Steud., *Chamaecrista stenocarpa* (Vogel) Standl.
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10999* (G)].

Chamaecrista patellaria (DC. ex Collad.) Greene = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Chamaecrista persoonii (Collad.) Greene = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista pulchra (Kunth) Britton & Killip = **Chamaecrista desvauxii** (Collad.) Killip var. **mollissima** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista punctata (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia punctata* Vogel
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Irwin, H. S., 1964.
Subarbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4511* (HBR, NY, UPCB)].

Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **parvifoliola** (H.S. Irwin) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia langsdorffii* Kunth ex Vogel var. *parvifoliola* H.S. Irwin
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Subarbusto. Nativa. 600–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Krapovickas, A. 23298* (BAB, CTES)].

Chamaecrista repens (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia apaënsis* Chodat & Hassl., *Cassia repens* Vogel
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Mattos, N. F., 1983; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, ITA, MIE); URY(ART, PAY, RIV, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Montes, J. E. s.n.* (BAB)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 1168* (ICN)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3283* (SI)]; URY[*Osten, C. 5365* (SI)].

Chamaecrista riparia (Kunth) Britton = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaecrista riparia (Kunth) Britton var. *pilosa* Benth. = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia bauhiniifolia* Kunth, *Cassia bifoliola* Pers. ex R. Knuth, *Cassia filipes* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *bauhiniifolia* (Kunth) Benth., *Cassia*

rotundifolia Pers. var. *grandiflora* Benth., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *grandiflora* Micheli, nom. nud., *Cassia rotundifolia* Pers. var. *longepedicellata* Chodat & Hassl., nom. nud., *Chamaecrista bauhiniifolia* (Kunth) Gleason
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 66* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 8462* (NY)].

Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var. **rotundifolia**
Sin.: *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *pentandra* (Raddi) Desv., *Cassia bifoliolata* DC. ex Collad. var. *rotundifolia* (Pers.) Desv., nom. illeg., *Cassia fabaginifolia* Kunth, *Cassia monophylla* Vell., *Cassia pentandra* Raddi, *Cassia pentandria* Larrañaga, hom. illeg., *Cassia rotundifolia* Pers., *Cassia tenuivenosa* A.P.D. Jones, *Chamaecrista bifolliolata* (DC. ex Collad.) Greene
Referencias: Burkart, A., 1987a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, CAU, CAA, CEN, COA); URY(COL, PAY, RNO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7922* (BAB)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16410* (GH)]; PRY[*Fortunato, R. H. 1082* (BAB, SI)]; URY[*Felippone, F. 3202* (SI)].

Chamaecrista salvadorensis Britton = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista schlimii (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip = **Chamaecrista cordistipula** (Mart.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista serpens (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia serpens* L. var. *grandiflora* Benth., *Cassia tenella* Kunth, *Chamaecrista tenella* (Kunth) Pittier
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CEN, COA); URY(RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 16686* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 1487* (G)]; URY[*Berro, M. B. 8054* (MVFA)].

Chamaecrista serpens (L.) Greene var. **serpens**
Sin.: *Cassia flexuosa* Mill., hom. illeg., *Cassia prostrata* Kunth, *Cassia serpens* L., *Ophiocaulon serpens* (L.) Raf.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Croizat, L. C. M., 1943a; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3085* (SI)]; PRY[*Rojas 2161* (GH)].

Chamaecrista simplex Standl., nom. nud.
= **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista stenocarpa (Vogel) Standl.
= **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench subsp. **disadena** (Steud.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista stenocarpoides Britton = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista tenella (Kunth) Pittier = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **grandiflora** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chamaecrista tonduzii Britton & Rose = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **pilosa** (Benth.) H.S. Irwin & Barneby

[Chamaecrista trichopoda (Benth.) Britton & Rose ex Britton & Killip]
Sin.: *Cassia trichopoda* Benth.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chamaecrista venturiana H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 500–3000 m.
Países: ARG(COR, SAL, TUC); PRY(CAU, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 1471* (GH, NY, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 55964* (MO)].

Chamaecrista vestita (Vogel) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia vestita* Vogel
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 600–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 10643* (HBR, NY)]; PRY[*Hassler, E. 11011* (G)].

Chamaecrista villosissima Britton & Rose
= **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **patellaria** (DC. ex Collad.) Kartesz & Gandhi
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Kartesz, J. T. & Gandhi, K. M., 1991.

Chamaecrista viscosa (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. **paraguayensis** (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Sin.: *Cassia barbata* Nees & Mart. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Cassia paraguensis* Micheli, *Cassia viscosa* (Kunth) H.S. Irwin & Barneby var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 11106* (CTES)]; PRY[*Hassler, E. 5909* (BM)].

Chamaecrista wilsonii Britton & Rose = **Chamaecrista nictitans** (L.) Moench var. **jaliscensis** (Greenm.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Chamaefistula corymbosa (Lam.) G. Don = **Senna corymbosa** (Lam.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Chamaesenna aculeata (Pohl ex Benth.) Pittier = **Senna aculeata** (Pohl ex Benth.) H.S. Irwin & Barneby

Chiovendaea hypoleuca Speg. = **Poissonia hypoleuca** (Speg.) Lillo
Referencias: Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.

Chloroleucon Britton & Rose

Número de especies: 3

Chloroleucon chacöense (Burkart) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Pithecellobium chacöense* Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Hoc, P. S., 1981.
Arbusto o arbolito. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 18002* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8397* (SI)].

Chloroleucon foliolosum (Benth.) G.P. Lewis
Sin.: *Calliandra aristulata* Rizzini, *Calliandra grisebachiana* (Harms) Speg., *Pithecellobium foliolosum* Benth., *Pithecellobium grisebachianum* Harms, *Pithecellobium myriophyllum* Malme, hom. illeg., *Pithecellobium oligandrum* Rizzini
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Hoc, P. S., 1981.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Legname, P. R. 6193c* (LIL)].

[Chloroleucon manguense (Jacq.) Britton & Rose]
Sin.: *Mimosa manguensis* Jacq.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Calliandra brachyandra* Speg., *Feuilleea scalaris* (Griseb.) Kuntze, *Pithecellobium anajuliae* Rizzini, *Pithecellobium scalare* Griseb., *Pithecellobium scalare* Griseb. f. *parvifolium* Chodat & Hassl., *Pithecellobium scalare* Griseb. var. *hirsutum* Chodat & Hassl., *Pithecellobium tenuiflorum* Benth., *Pithecellobium tortum* Mart. f. *scalare* (Griseb.) Hassl., *Pithecellobium tortum* Mart. var. *pubescens* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1996; Bernardi, L., 1984; Hoc, P. S., 1981, 1992c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); PRY(CAA, CEN, CON, COA, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1014* (GOET)]; PRY[*Hassler, E. 7527* (G)].

Chrysocalyx schimperi Hochst. ex A. Rich. = **Crotalaria incana** L.

Cladotrichium epunctatum Vogel = **Pomaria pilosa** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Cladotrichium pilosum Vogel = **Pomaria pilosa** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Cladotrichium rubicundum Vogel = **Pomaria rubicunda** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Cladotrichium stipulare Vogel = **Pomaria stipularis** (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003.

Clelia ornata Casar. = **Calliandra harrisii** (Lindl.) Benth.

Clitoria L.

Número de especies: 6, 2 endémicas

Clitoria alabamensis Bertol. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria amoena Roth = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria angustifolia Kunth = **Centrosema angustifolium** (Kunth) Benth.

Clitoria brasiliana L. = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977; Burkart, A., 1937b.

Clitoria broussonetii Balb. = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Clitoria cordobensis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1941, 1987a; Fantz, P. R., 1988; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR, ERI, SFE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Nicora, E. G. 1774* (SI)].

Clitoria densiflora (Benth.) Benth.
Sin.: *Clitoria densiflora* (Benth.) Benth. var. *mucronata* Hassl., *Neurocarpum densiflorum* Benth., *Ternatea densiflora* (Benth.) Kuntze

Referencias: Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Subarbusto. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13275* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9831* (BM, G, MO, NY, S, W)].

Clitoria densiflora (Benth.) Benth. var. *mucronata* Hassl. = **Clitoria densiflora** (Benth.) Benth.

Clitoria epetiolata Burkart var. **angustissima** Fantz
Referencias: Fantz, P. R., 1995.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12968a* (MBM, SI)].

Clitoria epetiolata Burkart var. **epetiolata**
Sin.: *Clitoria guianensis* auct. non (Aubl.) Benth.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Burkart, A., 1949c, e, 1987a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(AMA, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 5500* (BAB)]; PRY[*Rojas, T. 4888* (SI)].

Clitoria epetiolata Burkart var. **latiuscula** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949e.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 12968* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3943a* (SI)].

Clitoria falcata Lam.
Sin.: *Clitoria glycinoides* DC., *Clitoria rubiginosa* Juss. ex Pers., *Clitoria tetragona* Poir. ex DC., nom. nud., *Martia physodes* Leandro, *Martiusia physalodes* Schult., *Neurocarpum falcatum* (Lam.) DC., *Ternatea rubiginosa* (Juss. ex Pers.) Kuntze
Referencias: Fantz, P. R., 1990; Lewis, G. P. & Owen, P. E., 1989; Lewis, G. P., 1987; Miotto, S. T. S., 1987; Rambo, B., 1966.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 45108* (PACA), *Rambo, B. 63580* (PACA)]; PRY[*Zardini, E. M. 48103* (BAB, MO)].

Clitoria formosa Kunth = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria gemina Vell. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria glycinoides DC. = **Clitoria falcata** Lam.
Referencias: Miotto, S. T. S., 1987.

[Clitoria glycinoides DC. var. guaranitica Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Clitoria guayanensis Benth. = **Clitoria guianensis** (Aubl.) Benth.

Clitoria guianensis (Aubl.) Standl., nom. illeg. = **Clitoria guianensis** (Aubl.) Benth.

Clitoria guianensis auct. non (Aubl.) Benth. = **Clitoria epetiolata** Burkart var. **epetiolata**
Referencias: Burkart, A., 1949c.

Clitoria guianensis (Aubl.) Benth.
Sin.: *Clitoria guayanensis* Benth., *Clitoria guianensis* (Aubl.) Standl., nom. illeg., *Crotalaria guianensis* Aubl., *Ternatea guianensis* (Aubl.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1949e; Fantz, P. R., 1990.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 6418* (SI)].

Clitoria insulana Arráb., hom. illeg. = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria insulana Vell. = **Centrosema brasilianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria nana Benth.
Sin.: *Ternatea nana* (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1941, 1949c, e; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1987; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15421* (SI)]; BRA[*Sacco, J. C. 262* (SI)]; URY[*Bayce, D. 21635* (MVFA)].

[Clitoria nana Benth. var. caaguazuensis Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Clitoria plumieri Turpin ex Pers. = **Centrosema plumieri** (Turpin ex Pers.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria rubiginosa Juss. ex Pers. = **Clitoria falcata** Lam.
Referencias: Miotto, S. T. S., 1987.

[Clitoria rufescens (Benth.) Benth.]
Sin.: *Neurocarpum rufescens* Benth.
Notas: Cita dudosa para el área del proyecto.

Clitoria sinuata Desv. = **Centrosema pascuorum** Mart. ex Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Clitoria tetragona Poir. ex DC., nom. nud. = **Clitoria falcata** Lam.

Clitoria virginiana L. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1937b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Coladendron crista-galli (L.) Kuntze = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Collaea DC.

Número de especies: 5, 3 endémicas

Collaea argentina Griseb.
Sin.: *Collaea formosa* Griseb., *Galactia argentina* (Griseb.) Kuntze, *Galactia formosa* (Griseb.) Stuck., *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f. *argentina* (Griseb.) Hassl.
Referencias: Grisebach, A. H. R., 1874.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 366* (SI)].

Collaea aschersoniana (Taub.) Burkart
Sin.: *Galactia aschersoniana* Taub.
Arbusto. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Jonsson, G. 1072a* (G)].

Collaea formosa Griseb. = **Collaea argentina** Griseb.

Collaea macrophylla Benth. = **Galactia boavista** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.

Collaea paraguariensis (Hassl.) R. García
Sin.: *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton f. *paraguariensis* Hassl.
Referencias: García, R. C., 1989.
Hierba o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8043* (BAB, SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 13871* (SI)].

Collaea scarlatina Mart. ex Benth. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1970.

Collaea scarlatina Mart. ex Benth. var. *calycina* Benth. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart

Collaea scarlatina Mart. ex Benth. var. *latifolia* Benth. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart

Collaea scarlatina Mart. ex Benth. var. *oblongifolia* Benth. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart
Referencias: Miotto, S. T. S., 1986.

Collaea scarlatina Mart. ex Benth. var. *pohliana* Benth. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart
Referencias: Miotto, S. T. S., 1986.

Collaea speciosa (Loisel.) DC.
Sin.: *Collaea velutina* Benth., *Cytisus speciosus* Loisel., *Galactia speciosa* (Loisel.) Britton
Referencias: Angely, J. A., 1965; Lewis, G. P., 1987; Miotto, S. T. S., 1980.
Subarbusto. Endémica. 1000–3400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 22265* (SI)].

Collaea stenophylla (Hook. & Arn.) Benth.
Sin.: *Collaea virgata* Benth., *Galactia hassleriana* Chodat, *Galactia stenophylla* Hook. & Arn., *Galactia stenophylla* Hook. & Arn. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl., *Galactia stenophylla* Hook. & Arn. var. *virgata* (Benth.) Hassl., *Galactia virgata* (Benth.) Chodat & Hassl.
Referencias: Angely, J. A., 1965; Burkart, A., 1971, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1980; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, CAN, COA, SPE); URY(CLA, COL, MON, PAY, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7546* (BAB)]; BRA[*Pedersen, T. M. 12594* (CTES, SI)]; PRY[*Schinini, A. 3273* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 5739* (MVFA)].

Collaea tomentosa Benth. = **Galactia eriosematoides** Harms
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Collaea velutina Benth. = **Collaea speciosa** (Loisel.) DC.

Collaea virgata Benth. = **Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Cologania Kunth

Número de especies: 1

Cologania affinis M. Martens & Galeotti = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania australis Griseb. = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania broussonetii (Balb.) DC.
Sin.: *Amphicarpaea ovalifolia* (Kunth) Seckt, *Amphicarpaea pulchella* (Kunth) Taub., *Clitoria broussonetii* Balb., *Cologania affinis* M. Martens & Galeotti, *Cologania australis* Griseb., *Cologania congesta* Rose, *Cologania glabrior* Rose, *Cologania jaliscana* S. Watson, *Cologania lozanii* Rose, *Cologania ovalifolia* Kunth, *Cologania pulchella* Kunth, *Cologania rufescens* Rose, *Cologania tenuis* Rose, *Falcata ovalifolia* (Kunth) Kuntze, *Galactia lorentzii* Griseb.
Referencias: Turner, B. L., 1992b.
Subarbusto. Nativa. 1500–3400 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorente 779* (LIL)].

Cologania congesta Rose = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania glabrior Rose = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania heterophylla Gillies ex Hook. & Arn. = **Galactia marginalis** Benth. var. **marginalis**
Referencias: Burkart, A., 1971.

Cologania jaliscana S. Watson = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania lozanii Rose = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania ovalifolia Kunth = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania pulchella Kunth = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania rufescens Rose = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Cologania tenuis Rose = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Colutea L.

Número de especies: 1 introducida

Colutea arborescens L.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1978.
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(LPA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rúgolo de Agrasar, Z. E. 1032* (SI)].

Condylostylis venusta Piper = **Vigna venusta** (Piper) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Copaiba langsdorffii (Desf.) Kuntze = **Copaifera langsdorffii** Desf. var. **langsdorfii**

Copaifera L.

Número de especies: 2, 1 endémica

Copaifera chodatiana Hassl. = **Guibourtia hymenaeifolia** (Moric.) J. Léonard

Copaifera chodatiana Hassl. var. *fruticosa* Hassl. = **Guibourtia hymenaeifolia** (Moric.) J. Léonard

Copaifera glabra Vogel = **Copaifera langsdorffii** Desf. var. **glabra** (Vogel) Benth.

Copaifera laevis Dwyer
Referencias: Dwyer, J. D., 1951.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4901* (G)].

Copaifera langsdorffii Desf. var. **glabra** (Vogel) Benth.
Sin.: *Copaifera glabra* Vogel
Referencias: Bernardi, L., 1984; Dwyer, J. D., 1951.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 8145* (G)].

Copaifera langsdorffii Desf. var. **langsdorfii**
Sin.: *Copaiba langsdorffii* (Desf.) Kuntze, *Copaifera nitida* Mart. ex Hayne, *Copaifera sellowii* Hayne
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Dwyer, J. D., 1951; Lewis, G. P., 1987; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Ulibarri, E. A., 1997b.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodriguez, F. M. 795* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 9614* (A, G, NY, US)]; PRY[*Zardini, E. M. 13190* (FCQ, MO)].

Copaifera langsdorffii Desf. var. *rupestris* Hassl. = **Copaifera langsdorfii** Desf. var. **laxa** (Hayne) Benth.
Referencias: Dwyer, J. D., 1951.

Copaifera langsdorfii Desf. var. **grandifolia** Benth.
Referencias: Dwyer, J. D., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Jörgensen, P. 3901* (NY, US)].

Copaifera langsdorfii Desf. var. **laxa** (Hayne) Benth.
Sin.: *Copaifera langsdorffii* Desf. var. *rupestris* Hassl.
Referencias: Dwyer, J. D., 1951.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 3851* (A, F)].

Copaifera nitida Mart. ex Hayne = **Copaifera langsdorffii** Desf. var. **langsdorfii**

Copaifera sellowii Hayne = **Copaifera langsdorffii** Desf. var. **langsdorfii**

Coquebertia ilicifolia Brongn. = **Zollernia ilicifolia** (Brongn.) Vogel

Corallodendron falcatum (Benth.) Kuntze = **Erythrina falcata** Benth.
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Corallodendron reticulatum (C. Presl) Kuntze = **Erythrina speciosa** Andrews

Coronilla L.

Número de especies: 1 introducida

Coronilla aculeata Willd. = **Sesbania bispinosa** (Jacq.) W. Wight
Referencias: Lewis, G. P., 1989.

Coronilla varia L.
Referencias: Burkart, A., 1967a; Gómez Sosa, E. V., 1997c; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, SFE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 21521* (SI)].

Coronilla virgata (Cav.) Willd. = **Sesbania virgata** (Cav.) Pers.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Coublandia fluvialis Lindm. = **Lonchocarpus fluvialis** (Lindm.) Fortunato & Palese
Referencias: Bernardi, L., 1984; Fortunato, R. H. & Palese, R., 1997.

Coulteria tinctoria Kunth = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

Coumarouna alata (Vogel) Taub. = **Dipteryx alata** Vogel

Coursetia DC.

Número de especies: 2

Coursetia brachyrhachis Harms
Sin.: *Tephrosia craccoides* Lillo
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000a; Lavin, M., 1988.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–2600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 12023* (MO, SI)].

Coursetia guaranitica Chodat = **Coursetia hassleri** Chodat
Referencias: Lavin, M., 1988.

Coursetia hassleri Chodat
Sin.: *Benthamantha caribaea* (Jacq.) Kuntze var. *dubia* Kuntze, *Benthamantha glabrescens* (Benth.) Burkart, comb. superfl., *Coursetia guaranitica* Chodat, *Cracca corumbae* Hoehne
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000a; Lavin, M., 1988.
Arbusto. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 1049* (LIL, MO, SI)]; PRY[*Hassler, E. 12439* (GH, MO, NY, US)].

Coursetia heterantha (Griseb.) Lavin = **Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin
Referencias: Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.

Coursetia hypoleuca (Speg.) Lavin = **Poissonia hypoleuca** (Speg.) Lillo
Referencias: Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.

Coursetia virgata (Cav.) DC. = **Sesbania virgata** (Cav.) Pers.

Cracca adunca (Benth.) Kuntze = **Tephrosia adunca** Benth.

Cracca cinerea (L.) Morong = **Tephrosia cinerea** (L.) Pers.

Cracca corumbae Hoehne = **Coursetia hassleri** Chodat
Referencias: Lavin, M., 1988.

Cracca disperma (DC.) Godr. & Gren. = **Vicia disperma** DC.

Cracca hirsuta (L.) Gennari = **Vicia hirsuta** (L.) Gray

Cracca villosa (Roth) Godr. & Gren. = **Vicia villosa** Roth subsp. **villosa**

Cratylia Mart. ex Benth.

Número de especies: 1

Cratylia floribunda Benth. var. *intermedia* Hassl. = **Cratylia intermedia** (Hassl.) L.P. Queiroz & R. Monteiro
Referencias: Lewis, G. P., 1989.

Cratylia intermedia (Hassl.) L.P. Queiroz & Coradin, nom. illeg. = **Cratylia intermedia** (Hassl.) L.P. Queiroz & R. Monteiro
Referencias: Queiroz, L. P., 1997.

Cratylia intermedia (Hassl.) L.P. Queiroz & R. Monteiro
Sin.: *Cratylia floribunda* Benth. var. *intermedia* Hassl., *Cratylia intermedia* (Hassl.) L.P. Queiroz & Coradin, nom. illeg.
Referencias: Queiroz, L. P., 1997.
Liana. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 500* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 304* (MBM)].

Crotalaria L.

Número de especies: 21, 2 endémicas, 6 introducidas

Crotalaria affinis DC. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria alata auct. non Hopper = **Crotalaria stipularia** Desv.

Crotalaria anagyroides Kunth = **Crotalaria micans** Link
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Crotalaria balansae Micheli
Sin.: *Crotalaria pohliana* Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. var. *balansae* (Micheli) Hassl., *Crotalaria velutina* Benth. var. *sellowii* Taub.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15403* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 854* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 1850* (G)].

Crotalaria belizensis Lundell = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria bellii Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Referencias: Flores, A. S., Martinelli Filliettaz, A. & Tozzi, A. M. G. A., 2006.

Crotalaria brachystachys Benth. = **Crotalaria micans** Link
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Crotalaria bracteosa Benth. = **Crotalaria paulina** Schrank

Crotalaria brasila Schrank = **Crotalaria vitellina** Ker Gawl.

Crotalaria breviflora DC.
Sin.: *Crotalaria breviflora* DC. var. *pohliana* (Benth.) Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria breviflora* DC. var. *riedellii* Taub., *Crotalaria divergens* Benth., *Crotalaria pohliana* Benth., *Crotalaria regnellii* Benth.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 60529* (MBM)].

Crotalaria breviflora DC. var. *pohliana* (Benth.) Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria breviflora** DC.

Crotalaria breviflora DC. var. *riedellii* Taub. = **Crotalaria breviflora** DC.

Crotalaria cajanifolia Kunth = **Crotalaria vitellina** Ker Gawl.

Crotalaria criocaula S. Schauer = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria cubensis DC. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria depauperata Mart. ex Benth. = **Crotalaria maypurensis** Kunth

Crotalaria diffusa Vell., hom. illeg. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria divergens Benth. = **Crotalaria breviflora** DC.

Crotalaria dombeyana DC. = **Crotalaria micans** Link
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Crotalaria eriocaula Schauer = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria espadilla Kunth = **Crotalaria stipularia** Desv.

Crotalaria foliosa Benth., hom. illeg. = **Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Referencias: Flores, A. S., Martinelli Filliettaz, A. & Tozzi, A. M. G. A., 2006.

Crotalaria fruticosa Mill. = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria genistella DC., nom. illeg. = **Crotalaria pilosa** Mill.

Crotalaria genistella Kunth = **Crotalaria pilosa** Mill.

Crotalaria glabrescens Andersson, hom. illeg. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria grantiana Harv. = **Crotalaria virgulata** Klotzsch
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.

Crotalaria guatemalensis Benth. = **Crotalaria vitellina** Ker Gawl.

Crotalaria guianensis Aubl. = **Clitoria guianensis** (Aubl.) Benth.

Crotalaria hatschbachii Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Referencias: Flores, A. S., Martinelli Filliettaz, A. & Tozzi, A. M. G. A., 2006.

Crotalaria hatschbachii Windler & S.G. Skinner var. *sericea* Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Referencias: Flores, A. S., Martinelli Filliettaz, A. & Tozzi, A. M. G. A., 2006.

Crotalaria herbacea Schweigg. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria hexaptera Schrank = **Crotalaria pilosa** Mill.

Crotalaria hilariana Benth.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 59* (ICN)].

Crotalaria hirta Lag., hom. illeg. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria incana L.
Sin.: *Chrysocalyx schimperi* Hochst. ex A. Rich., *Crotalaria affinis* DC., *Crotalaria criocaula* S. Schauer, *Crotalaria cubensis* DC., *Crotalaria diffusa* Vell., hom. illeg., *Crotalaria eriocaula* Schauer, *Crotalaria glabrescens* Andersson, hom. illeg., *Crotalaria herbacea* Schweigg., *Crotalaria hirta* Lag., hom. illeg., *Crotalaria incana* L. f. *microphylla* Chodat & Hassl., *Crotalaria incana* L. var. *australis* Griseb., *Crotalaria megapotamica* Burkart, *Crotalaria montana* A. Rich., *Crotalaria picensis* Phil., *Crotalaria pubescens* Moench, *Crotalaria purpurascens* Lam., *Crotalaria radiata* Merr., *Crotalaria setifera* DC., *Lupinus rotundifolius* Sessé & Moç.
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lewis, G. P., 1987; Windler, D. R. & McLaughlin, L., 1980.
Hierba o arbusto. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(II); PRY(APY, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, PAI); URY(SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 5115* (CTES)]; BRA[*Flores, A. S. 311* (ICN)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO, SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3629* (BAB, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 15457* (MVFA)].

Crotalaria incana L. f. *microphylla* Chodat & Hassl. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria incana L. var. *australis* Griseb. = **Crotalaria incana** L.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000c.

Crotalaria juncea L.
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 320* (ICN)]; PRY[*Degen, R. 2623* (FCQ)].

Crotalaria lanceolata E. Mey.
Sin.: *Crotalaria mossambicensis* Klotzsch
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Lewis, G. P., 1987.
Subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 179* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 42576* (MO, PY)].

Crotalaria leptophylla Benth. = **Crotalaria maypurensis** Kunth

Crotalaria lunulata Raf. = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria lupulina Kunth = **Crotalaria pumila** Ortega

[Crotalaria martiana Benth. subsp. martiana]
Notas: Subespecie excluida del área del proyecto.

Crotalaria martiana Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Sin.: *Crotalaria bellii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria foliosa* Benth., hom. illeg., *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria hatschbachii* Windler & S.G. Skinner var. *sericea* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria mohlenbrockii* Windler & S.G. Skinner, *Crotalaria paraguayensis* Windler & S.G. Skinner
Referencias: Flores, A. S., Martinelli Filliettaz, A. & Tozzi, A. M. G. A., 2006; Planchuelo, A. M., 1998.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAU, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Molfino, J. F. s.n.* (BAF)]; PRY[*Hassler, E. 10138* (BAF, BM, LIL, NY), *Rojas, T. 6144* (SI)].

Crotalaria matthewsana Benth. = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria maypurensis Kunth
Sin.: *Crotalaria depauperata* Mart. ex Benth., *Crotalaria leptophylla* Benth., *Crotalaria maypurensis* Kunth var. *depauperata* (Benth.) Windler & S.G. Skinner
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Lewis, G. P., 1987.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–3400 m.
Países: ARG(COS, JUJ, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 8065* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21229* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2966* (SI)].

Crotalaria maypurensis Kunth var. *depauperata* (Benth.) Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria maypurensis** Kunth

Crotalaria megapotamica Burkart = **Crotalaria incana** L.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.

Crotalaria micans Link
Sin.: *Crotalaria anagyroides* Kunth, *Crotalaria brachystachys* Benth., *Crotalaria dombeyana* DC., *Crotalaria stipulata* Vell., *Crotalaria triphylla* Vell.
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lewis, G. P., 1987; Windler, D. R. & McLaughlin, L., 1980; Windler, D. R. & Skinner, S. G., 1990.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–3000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, SPE); URY(COL, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1081* (SI)]; BRA[*Schwarz, E. A. 7477* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4617* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1911* (MVFA)].

Crotalaria mohlenbrockii Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Referencias: Planchuelo, A. M., 1998.

Crotalaria montana A. Rich. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria mossambicensis Klotzsch = **Crotalaria lanceolata** E. Mey.

Crotalaria mucronata Desv. = **Crotalaria pallida** Aiton

[Crotalaria nitens Kunth]
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000c.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Crotalaria pallida Aiton
Sin.: *Crotalaria mucronata* Desv., *Crotalaria striata* DC.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Arbusto o subarbusto. Introducida. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 167* (ICN)].

Crotalaria paraguayensis Windler & S.G. Skinner = **Crotalaria martiana** Benth. subsp. **mohlenbrockii** (Windler & S.G. Skinner) Planchuelo
Referencias: Flores, A. S., Martinelli Filliettaz, A. & Tozzi, A. M. G. A., 2006.

Crotalaria parviflora Roth = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria paulina Schrank
Sin.: *Crotalaria bracteosa* Benth., *Crotalaria racemosa* Vell., *Crotalaria virgata* Benth.
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Gómez Sosa, E. V., 2000c.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Tressens, S. G. 5155* (CTES)]; BRA[*Ferrucci, M. S. 297* (CTES)]; PRY[*Schinini, A. 28284* (CTES)].

Crotalaria picensis Phil. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria pilosa Raf., hom. illeg. = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria pilosa Mill.
Sin.: *Crotalaria genistella* DC., nom. illeg., *Crotalaria genistella* Kunth, *Crotalaria hexaptera* Schrank, *Crotalaria pilosa* Mill. var. *skutchii* Senn, *Crotalaria pterocaula* Desv., *Crotalaria pterocaula* Desv. var. *genistella* (Kunth) Benth.
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Lewis, G. P., 1987; Windler, D. R. & McLaughlin, L., 1980.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rojas, T. 9002* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4301* (SI)].

Crotalaria pilosa Mill. var. *skutchii* Senn = **Crotalaria pilosa** Mill.

Crotalaria platycarpa Link = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria pohliana Benth. = **Crotalaria breviflora** DC.

Crotalaria pohliana Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl. = **Crotalaria balansae** Micheli

Crotalaria pringlei A. Gray = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria pterocaula Desv. = **Crotalaria pilosa** Mill.

Crotalaria pterocaula Desv. var. *genistella* (Kunth) Benth. = **Crotalaria pilosa** Mill.

Crotalaria pubescens Moench = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria pumila Ortega
Sin.: *Crotalaria lupulina* Kunth
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000c; Senn, G. A., 1943; Windler, D. R. & Skinner, S. G., 1990.
Hierba. Anual. Nativa. 400–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 1430* (SI)].

Crotalaria purpurascens Lam. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria racemosa Vell. = **Crotalaria paulina** Schrank

Crotalaria radiata Merr. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria regnellii Benth. = **Crotalaria breviflora** DC.

Crotalaria retusa L.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Subarbusto. Introducida. 0–700 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 464* (ICN)].

Crotalaria sagittalis Vell., hom. illeg. = **Crotalaria stipularia** Desv.

Crotalaria sagittalis L.
Sin.: *Crotalaria belizensis* Lundell, *Crotalaria fruticosa* Mill., *Crotalaria lunulata* Raf., *Crotalaria matthewsana* Benth., *Crotalaria parviflora* Roth, *Crotalaria pilosa* Raf., hom. illeg., *Crotalaria platycarpa* Link, *Crotalaria pringlei* A. Gray, *Crotalaria sagittalis* L. var. *blumeriana* H.Senn, *Crotalaria sagittalis* L. var. *fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle, *Crotalaria sagittalis* L. var. *oblonga* Michx., *Crotalaria sagittatas* Hill, *Crotalaria tuerckheimii* Senn
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Senn, G. A., 1943; Windler, D. R. & McLaughlin, L., 1980.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Países: ARG(JUJ); PRY(CAU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 11636* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 886* (MO, PY)].

Crotalaria sagittalis L. var. *blumeriana* H.Senn = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria sagittalis L. var. *fruticosa* (Mill.) Fawc. & Rendle = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria sagittalis L. var. *oblonga* Michx. = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria sagittatas Hill = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria serpyllifolia Lamb. ex DC., nom. nud. = **Crotalaria stipularia** Desv.

Crotalaria setifera DC. = **Crotalaria incana** L.

Crotalaria shamvaensis Verd. = **Crotalaria virgulata** Klotzsch

Crotalaria spectabilis Roth
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Gómez Sosa, E. V., 2000c.
Hierba o arbusto. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 19848* (CTES)]; BRA[*Flores, A. S. 211* (ICN)].

Crotalaria stipularia Desv.
Sin.: *Crotalaria alata* auct. non Hopper, *Crotalaria espadilla* Kunth, *Crotalaria sagittalis* Vell., hom. illeg., *Crotalaria serpyllifolia* Lamb. ex DC., nom. nud., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *elliptica* Chodat & Hassl., *Crotalaria stipularia* Desv. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000c; Lewis, G. P., 1987.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(CAN, CEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 12110* (CTES, SI)]; PRY[*Hassler, E. 7838* (G)].

Crotalaria stipularia Desv. f. *elliptica* Chodat & Hassl. = **Crotalaria stipularia** Desv.
Referencias: Gómez-Sosa, E. V., 2000c.

Crotalaria stipularia Desv. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl. = **Crotalaria stipularia** Desv.

Crotalaria stipularia Desv. var. *balansae* (Micheli) Hassl. = **Crotalaria balansae** Micheli

Crotalaria stipulata Vell. = **Crotalaria micans** Link

Crotalaria striata DC. = **Crotalaria pallida** Aiton

Crotalaria triphylla Vell. = **Crotalaria micans** Link

Crotalaria tuerckheimii Senn = **Crotalaria sagittalis** L.

Crotalaria tweediana Benth.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001; Gómez Sosa, E. V., 2000c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba o arbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 28865* (CTES)]; BRA[*Flores, A. S. 328* (ICN)]; URY[*Berro, M. B. 1910* (MVFA)].

[Crotalaria velutina Benth.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Crotalaria velutina Benth. var. *sellowii* Taub. = **Crotalaria balansae** Micheli

Crotalaria vespertilio Benth.
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rodrigues, R. S. 363* (ICN)].

Crotalaria virgata Benth. = **Crotalaria paulina** Schrank

Crotalaria virgulata Klotzsch
Sin.: *Crotalaria grantiana* Harv., *Crotalaria shamvaensis* Verd., *Crotalaria virgulata* Klotzsch subsp. *grantiana* (Harv.) Polhill
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 199* (ICN)].

Crotalaria virgulata Klotzsch subsp. *grantiana* (Harv.) Polhill = **Crotalaria virgulata** Klotzsch
Referencias: Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.

Crotalaria vitellina Ker Gawl.
Sin.: *Crotalaria brasila* Schrank, *Crotalaria cajanifolia* Kunth, *Crotalaria guatemalensis* Benth.
Referencias: Bernal, H. Y., 1986; Flores, A. S. & Miotto, S. T. S., 2001.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Flores, A. S. 294* (ICN)].

Cruminium giganteum Desv. = **Centrosema plumieri** (Turpin ex Pers.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Cruminium virginianum (L.) Britton = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Cumaruna alata (Vogel) Kuntze = **Dipteryx alata** Vogel

Cyclolobium Benth.

Número de especies: 1

Cyclolobium blanchetianum Tul. = **Cyclolobium brasiliense** Benth.
Referencias: Warwick, M. C. & Pennington, R. T., 2002.

Cyclolobium brasiliense Benth.
Sin.: *Cyclolobium blanchetianum* Tul., *Cyclolobium claussenii* Benth.
Referencias: Warwick, M. C. & Pennington, R. T., 2002.
Árbol. Nativa. 100–900 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Cervi, A. C. 2746* (K, MO, US)]; PRY[*Hassler, E. 10609* (A, F, K, MO, NY, US)].

Cyclolobium claussenii Benth. = **Cyclolobium brasiliense** Benth.
Referencias: Warwick, M. C. & Pennington, R. T., 2002.

Cynometra L.

Número de especies: 1

Cynometra bauhiniifolia Benth. var. **bauhiniifolia**
Sin.: *Cynometra bauhiniifolia* Benth. var. *grandiflora* Dwyer, *Cynometra microflora* R.S. Cowan
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Dwyer, J. D., 1958; Freitas da Silva, M., Sprada Tavares, A. & Berry, P. E., 1998; Ulibarri, E. A., 1997b.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); PRY(CEN, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Clos, E. C. 6734* (BAB)]; PRY[*Rojas, T. 2115* (SI)].

Cynometra bauhiniifolia Benth. var. *grandiflora* Dwyer = **Cynometra bauhiniifolia** Benth. var. **bauhiniifolia**

Cynometra bauhiniifolia Benth. var. **meridiana** Dwyer
Referencias: Burkart, A., 1952a; Dwyer, J. D., 1958; Sprada Tavares, A. & Freitas da Silva, M., 1992.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lillo, M. 313* (SI)].

Cynometra martiana (Hayne) Baill. = **Hymenaea martiana** Hayne

Cynometra microflora R.S. Cowan = **Cynometra bauhiniifolia** Benth. var. **bauhiniifolia**

Cytisus Desf.

Número de especies: 2 introducidas

Cytisus boavista Vell. = **Galactia boavista** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.

Cytisus cajan L. = **Cajanus cajan** (L.) Millsp.
Referencias: Millspaugh, C. F., 1900; Miotto, S. T. S., 1988.

Cytisus heptaphyllus Vell. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Cytisus monspessulanus L. = **Genista monspessulana** (L.) L.A.S. Johnson
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Cytisus pseudocajan Jacq. = **Cajanus cajan** (L.) Millsp.

Cytisus scoparius (L.) Link
Sin.: *Sarothamnus scoparius* (L.) Koch, *Spartium scoparium* L.
Referencias: Bisby, F. A., Buckingham, J. & Harborne, J. B., 1994; Burkart, A., 1967a; Fortunato, R. H., 1984a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Introducida. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE); CHL(VII, VIII, IX, X, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5771* (BAB, MO)]; CHL[*Matthei, O. R. 80* (CONC)].

Cytisus speciosus Loisel. = **Collaea speciosa** (Loisel.) DC.

Cytisus striatus (Hill) Rothm.
Sin.: *Genista striata* Hill
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Introducida. 0–1000 m.
Países: CHL(VII, VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Finot, V. L. 61* (CONC)].

Cytisus violaceus Aubl. = **Eriosema violaceum** (Aubl.) G. Don

Dahlstedtia Malme

Número de especies: 1

Dahlstedtia pentaphylla (Taub.) Burkart = **Dahlstedtia pinnata** (Benth.) Malme

Dahlstedtia pinnata (Benth.) Malme
Sin.: *Camptosema penthaphyllum* Taub., *Camptosema pinnatum* Benth., *Dahlstedtia pentaphylla* (Taub.) Burkart, *Piscidia erythrina* Vell.
Referencias: Burkart, A., 1957b; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O. & Rodríguez, M., 1999.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Keller, H. A. 47* (CTES, SI)]; BRA[*Klein, R. M. 375* (SI)].

Dalbergia L. f.

Número de especies: 6, 1 endémica

Dalbergia brasiliensis Vogel
Sin.: *Amerimnon brasiliense* (Vogel) Kuntze
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Carvalho, A. M. V., 1997.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Koczicki, C. 353* (SI)].

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub.
Sin.: *Amerimnon ecastaphyllum* (L.) Standl., *Dalbergia ecastaphyllum* (L.) Taub. f. *obtusifoliota* Hoehne, *Ecastaphyllum brownei* Pers., *Ecastaphyllum ecastaphyllum* (L.) Britton, nom. illeg., *Ecastaphyllum molle* Miq., *Hedysarum ecastaphyllum* L., *Pterocarpus ecastaphyllum* (L.) L.
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Carvalho, A. M. V., 1997.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 821* (SI)].

Dalbergia ecastaphyllum (L.) Taub. f. *obtusifoliota* Hoehne = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Dalbergia ernest-ulei Hoehne
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Carvalho, A. M. V., 1997.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 617* (HBG, SP, US)].

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton
Sin.: *Dalbergia variabilis* Vogel, *Pterocarpus frutescens* Vell., *Triptolemea glabra* Benth., *Triptolemea latifolia* Benth., *Triptolemea montana* Mart. ex Benth., *Triptolemea ovata* Mart. ex Benth., *Triptolemea pauciflora* Mart. ex Benth., *Triptolemea platycarpa* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Camargo, R. A., 2005; Carvalho, A. M. V., 1997; Stutz, L. C., 1983.
Liana. Perenne. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, COA, GUA, PAI, SPE); URY(ART).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2933* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 6116* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6498* (SI)]; URY[*Brussa, C. 20519* (MVJB)].

Dalbergia lateriflora Benth.
Sin.: *Amerimnon lateriflorum* (Benth.) Kuntze, *Dalbergia rosei* Hoehne
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Carvalho, A. M. V., 1997.
Arbusto o liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Camargo, R. A. 155* (ICN)].

Dalbergia miscolobium Benth.
Sin.: *Dalbergia violacea* (Vogel) Malme, nom. illeg., *Miscolobium nigrum* Mart., nom. nud., *Miscolobium violaceum* Vogel
Referencias: Carvalho, A. M. V., 1997.
Arbusto. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18839* (MBM, NY)].

Dalbergia rosei Hoehne = **Dalbergia lateriflora** Benth.

Dalbergia variabilis Vogel = **Dalbergia frutescens** (Vell.) Britton
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Carvalho, A. M. V., 1997.

Dalbergia violacea (Vogel) Malme, nom. illeg. = **Dalbergia miscolobium** Benth.

Dalea L., nom. cons.

Número de especies: 6, 1 endémica

Dalea alba Michx. ex Roem. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea alopecuroides Willd. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Gómez Sosa, E. V., 2000b.

Dalea annua Kuntze var. *ebracteata* Kuntze = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea azurea (Phil.) Reiche
Sin.: *Lotodes azureum* (Phil.) Kuntze, *Parosela azurea* (Phil.) J.F. Macbr., *Psoralea azurea* Phil.
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: CHL(II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5585* (F, GH)].

Dalea bigelovii (Rydb.) B.L. Turner = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea boliviana Britton
Sin.: *Dalea boliviana* Britton var. *herrerae* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Dalea calliantha* Ulbr., *Dalea hofstenii* R.E. Fr., *Dalea retusifolia* Harms ex Kuntze, *Parosela boliviana* (Britton) J.F. Macbr., *Parosela boliviana* (Britton) J.F. Macbr. var. *herrerae* J.F. Macbr., *Parosela calliantha* (Ulbr.) J.F. Macbr., *Parosela hofstenii* (R.E. Fr.) J.F. Macbr.
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Gómez Sosa, E. V., 2000b, c.
Hierba. Perenne. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 21961* (CTES, SI)].

Dalea boliviana Britton var. *herrerae* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. = **Dalea boliviana** Britton

Dalea calliantha Ulbr. = **Dalea boliviana** Britton

Dalea elegans Gillies ex Hook. & Arn. var. **elegans**
Sin.: *Dalea stenophylla* Griseb., *Parosela elegans* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr.
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Gómez Sosa, E. V., 2000b, c.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 10287* (SI)].

Dalea elegans Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby
Sin.: *Dalea eosina* (J.F. Macbr.) J.F. Macbr., *Dalea onobrychioides* Griseb., *Parosela eosina* J.F. Macbr., *Parosela onobrychioides* (Griseb.) J.F. Macbr.
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Gómez Sosa, E. V., 2000b, c.
Hierba. Perenne. Introducida. 1800–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 11259* (SI)].

Dalea eosina (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. = **Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby

Dalea hofstenii R.E. Fr. = **Dalea boliviana** Britton
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000b.

Dalea lagopus (Cav.) Willd. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea leporina (Aiton) Kearney & Peebles, comb. superfl. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000b.

Dalea leporina (Aiton) Bullock
Sin.: *Dalea alba* Michx. ex Roem., *Dalea alopecuroides* Willd., *Dalea annua* Kuntze var. *ebracteata* Kuntze, *Dalea bigelovii* (Rydb.) B.L. Turner, *Dalea lagopus* (Cav.) Willd., *Dalea leporina* (Aiton) Bullock var. *alba* (Michx. ex Roem.) H.D. Harr., *Dalea leporina* (Aiton) Kearney & Peebles, comb. superfl., *Dalea linnaei* Michx., *Dalea oreophila* (Cory) Cory, *Parosela leporina* (Aiton) Rydb., *Psoralea leporina* Aiton
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Gómez Sosa, E. V., 2000b, c.
Hierba. Anual. Nativa. 2200–2900 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 30707* (CTES, SI)].

Dalea leporina (Aiton) Bullock var. *alba* (Michx. ex Roem.) H.D. Harr. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea linnaei Michx. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea moquehuana J.F. Macbr.
Referencias: Barneby, R. C., 1977; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Anual. Nativa. 1900–2700 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 366* (CONC)].

Dalea multifoliolata (Clos) Reiche = **Errazurizia multifoliolata** (Clos) I.M. Johnst.

Dalea onobrychioides Griseb. = **Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Dalea oreophila (Cory) Cory = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Dalea pennellii (J.F. Macbr.) J.F. Macbr. var. **chilensis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1990.
Subarbusto. Endémica. 2500–3300 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 1378* (CONC, NY)].

Dalea retusifolia Harms ex Kuntze = **Dalea boliviana** Britton

Dalea stenophylla Griseb. = **Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **elegans**
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Daubentonia punicea (Cav.) DC. = **Sesbania punicea** (Cav.) Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Derris leucanthus (Burkart) N.F. Mattos = **Lonchocarpus campestris** Mart. ex Benth.

Derris muehlbergianus (Hassl.) N.F. Mattos = **Lonchocarpus muehlbergianus** Hassl.

Derris nitidus (Vogel) N.F. Mattos = **Lonchocarpus nitidus** (Vogel) Benth.

Derris torrensis (N.F. Mattos) N.F. Mattos = **Lonchocarpus torrensis** N.F. Mattos

Desmanthus Willd.

Número de especies: 6, 1 endémica

Desmanthus acuminatus Benth.
Sin.: *Acuan acuminatum* (Benth.) Kuntze, *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Burkart, *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Isely
Referencias: Burkart, A., 1969c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Luckow, N. A., 1993; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, SAL, SDE, SFE); PRY(MIE); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7906* (BAB, SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 6561* (SI, UC, US)]; URY[*Gallinal, J. P. 2935* (GH)].

Desmanthus brevipes B.L. Turner = **Desmanthus tatuhyensis** Hoehne var. **brevipes** (B.L. Turner) Luckow
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus chacoensis Burkart = **Desmanthus tatuhyensis** Hoehne var. **brevipes** (B.L. Turner) Luckow
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus comosus A. Rich. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Desmanthus depressus auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus depressus Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus depressus Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Burkart = **Desmanthus acuminatus** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1969c; Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus diffusus Willd. = **Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.

Desmanthus hexapetalus (Micheli) J.F. Macbr.
Sin.: *Desmanthus micheli* Hassl., *Desmanthus micheli* Hassl. f. *procumbens* Hassl., *Desmanthus micheli* Hassl. var. *hexapetala* (Micheli) Hassl., nom. superfl., *Neptunia hexapetala* Micheli
Referencias: Burkart, A., 1969c; Luckow, N. A., 1993.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CAU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pierotti, A. 6616* (CAS, LL, MO)]; PRY[*Balansa, B. 1442* (G)].

Desmanthus micheli Hassl. = **Desmanthus hexapetalus** (Micheli) J.F. Macbr.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus micheli Hassl. f. *procumbens* Hassl. = **Desmanthus hexapetalus** (Micheli) J.F. Macbr.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus micheli Hassl. var. *hexapetala* (Micheli) Hassl., nom. superfl. = **Desmanthus hexapetalus** (Micheli) J.F. Macbr.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus paspalaceus (Lindm.) Burkart
Sin.: *Acuan virgatum* (L.) Medik. f. *paspalacea* Lindm., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *santaniensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1946, 1969c; Luckow, N. A., 1993; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, CEN, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(COL, FLA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7551* (BAB)]; BRA[*Smith, L. B. 11953* (US)]; PRY[*Jörgensen, P. 3615* (F, GH, MO, NY)]; URY[*Bartlett, H. H. 21222* (MICH)].

Desmanthus pernambucanus (L.) Thell.
Sin.: *Acuan bahamense* Britton & Rose, *Desmanthus diffusus* Willd., *Desmanthus strictus* Bertol., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *strictus* (Bertol.) Griseb., *Mimosa pernambucana* L.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de Referencia: URY[*Sellow, F. s.n.* (MO)].

Desmanthus plenus (L.) Willd. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Desmanthus polyphyllus DC. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Desmanthus pratorum Macfad. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus punctatus (L.) Willd. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Desmanthus strictus Bertol. = **Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.

Desmanthus tatuhyensis auct. non Hoehne = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus tatuhyensis Hoehne var. **brevipes** (B.L. Turner) Luckow
Sin.: *Desmanthus brevipes* B.L. Turner, *Desmanthus chacoensis* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969c; Luckow, N. A., 1993.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, FOR, JUJ, SDE, SFE, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 5444* (GH, NY, US)].

Desmanthus tatuhyensis Hoehne var. **tatuhyensis**
Sin.: *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. f. *roseiflora* Chodat & Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1969c, 1979b, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Luckow, N. A., 1993; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, MIE, PAI); URY(LAV, MAL, MON, RIV, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 19664* (SI, US)]; BRA[*Hatschbach, G. 1028* (SI, US)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5251* (GH, SI)]; URY[*Izaguirre, P. 16* (MVFA)].

Desmanthus tenellus DC. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus virgatus (L.) Willd.
Sin.: *Acacia angustisiliqua* (Lam.) Desf., *Acacia virgata* (L.) Gaertn., *Acuan depressum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze, *Acuan texanum* Britton & Rose, *Acuan tracyi* Britton & Rose, *Desmanthus depressus* auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd., *Desmanthus depressus* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Desmanthus pratorum* Macfad., *Desmanthus tatuhyensis* auct. non Hoehne, *Desmanthus tenellus* DC., *Desmanthus virgatus* (L.) Willd. var. *depressus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B.L. Turner, *Mimosa angustisiliqua* Lam., nom. superfl., *Mimosa depressa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir., *Mimosa virgata* L.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Luckow, N. A., 1993; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Scarpa, G. F., 2004.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1400 m.

Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE); BRA(RGS, SCA); CHL(I); PRY(APY, GUA, SPE); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 3166* (BAB, MO)]; BRA[*Freitas, O. 21* (SI)]; CHL[*Escobar A., H. 19-x* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2911* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 714b* (MVFA, SI)].

Desmanthus virgatus (L.) Willd. f. *roseiflora* Chodat & Hassl. = **Desmanthus tatuhyensis** Hoehne var. **tatuhyensis**
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus virgatus (L.) Willd. var. *acuminatus* (Benth.) Isely = **Desmanthus acuminatus** Benth.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus virgatus (L.) Willd. var. *depressus* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B.L. Turner = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus virgatus (L.) Willd. var. *santaniensis* Chodat & Hassl. = **Desmanthus paspalaceus** (Lindm.) Burkart
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Desmanthus virgatus (L.) Willd. var. *strictus* (Bertol.) Griseb. = **Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.

Desmodium Desv.

Número de especies: 23, 7 endémicas

Desmodium adscendens (Sw.) DC.
Sin.: *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. var. *caeruleum* (Lindl.) DC., *Desmodium arinense* Hoehne, *Desmodium caeruleum* (Lindl.) G. Don, *Desmodium vogelii* Steud., *Hedysarum adscendens* Sw., *Hedysarum adscendens* Sw. var. *caeruleum* Lindl., *Meibomia adscendens* (Sw.) Kuntze
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwindt, E. 2294* (CTES)]; BRA[*Rosengurtt, B. 3416* (SI)].

Desmodium adscendens (Sw.) DC. var. *caeruleum* (Lindl.) DC. = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Desmodium affine Schltdl.
Sin.: *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth., *Desmodium albiflorum* Salzm. ex Benth. f. *grandifolia* Chodat & Hassl., *Meibomia albiflora* (Salzm.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CEN, GUA, PAI); URY(ART, CAS, PAY, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Tressens, S. G. 1760* (CTES, GH, LIL)]; BRA[*Reitz, P. R. 1392* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3399* (SI)]; URY[*Osten, C. 6527* (MVM, SI)].

Desmodium albiflorum Salzm. ex Benth. = **Desmodium affine** Schltdl.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Desmodium albiflorum Salzm. ex Benth. f. *grandifolia* Chodat & Hassl. = **Desmodium affine** Schltdl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Desmodium arechavaletae Burkart
Sin.: *Desmodium ramosissimum* Arechav., nom. inval., *Meibomia ramosissima* (Arechav.) Schindl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, GUA); URY(CLA, PAY, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 9358* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 35047* (PACA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6335* (SI)]; URY[*Arechavaleta, J. 2780* (MVM)].

Desmodium arinense Hoehne = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Desmodium asperatum (Poir.) Desv. = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Desmodium asperum (Poir.) Desv. = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Desmodium barbatum (L.) Benth.
Sin.: *Desmodium coeruleo-violaceum* (G. Mey.) DC., *Desmodium villosum* (Cham. & Schltdl.) Hemsl., nom. illeg., *Desmodium villosum* (Mill.) DC., *Hedysarum barbatum* L., *Hedysarum coeruleo-violaceum* G. Mey., *Hedysarum villosum* Mill., *Meibomia barbata* (L.) Kuntze, *Meibomia villosa* (Mill.) Kuntze, *Nicolsonia barbata* (L.) DC., *Nicolsonia villosa* Cham. & Schltdl.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Lewis, G. P., 1987; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAA, CAN, CEN, GUA, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 12113* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2165* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4207* (SI)].

Desmodium bigelovii A. Gray = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray

Desmodium bridgesii (Schindl.) Burkart
Sin.: *Desmodium longiarticulatum* (Rusby) Burkart, *Meibomia bridgesii* Schindl., *Meibomia longiarticulatum* Rusby
Referencias: Vanni, R. O., 2001.
Arbusto. Nativa. 500–1200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 26674* (CTES, G, LP, SI)].

Desmodium caeruleum (Lindl.) G. Don = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Desmodium campestre Brandegee = **Desmodium glabrum** (Mill.) DC.

Desmodium canum (J.F. Gmel.) Schinz & Thell. = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Nicolson, D. H., 1978.

Desmodium coeruleo-violaceum (G. Mey.) DC. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Desmodium craspediferum A.M.G. Azevedo & Abruzzi de Oliveira
Referencias: Tozzi, A. M. G. A., 1982; Oliveira, M. L. A. A., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 35064* (SI)].

Desmodium cuneatum Hook. & Arn.
Sin.: *Meibomia brevipes* (Vogel) Kuntze, *Meibomia cuneata* (Hook. & Arn.) Hoehne
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CEN, GUA, MIE, PAI, PHA); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 18138* (BAB, CTES, IAC, LIL, LP)]; BRA[*Dutra, J. 730* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3220* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3254b* (MVFA)].

Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr.
Sin.: *Desmodium asperatum* (Poir.) Desv., *Desmodium asperum* (Poir.) Desv., *Desmodium elatum* Kunth, *Desmodium hirsutum* M. Martens & Galeotti, *Desmodium pabulare* (Hoehne) Malme, *Desmodium rubiginosum* Benth., *Hedysarum asperum* Poir., *Hedysarum distortum* Aubl., *Meibomia aspera* (Poir.) Kuntze, *Meibomia distorta* (Aubl.) Schindl., *Meibomia pabularis* Hoehne
Referencias: Lewis, G. P., 1987; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–300 m.
Países: ARG(FOR); PRY(CAN, CEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Arbo, M. M. 2606* (A, C, CTES, K, MBM, MO, UC)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10542* (CTES)].

Desmodium dutrae Malme = **Desmodium polygaloides** Chodat & Hassl.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Desmodium elatum Kunth = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Desmodium frutescens Schindl. = **Desmodium incanum** DC.

Desmodium glabrum (Mill.) DC.
Sin.: *Desmodium campestre* Brandegee, *Desmodium molle* (Vahl) DC., *Hedysarum glabrum* Mill., *Hedysarum molle* Vahl, *Meibomia glabra* (Mill.) Kuntze, *Meibomia mollis* (Vahl) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1957b, d; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 32752* (CTES, SI)]; PRY[*Schinini, A. 17840* (CTES)].

Desmodium hassleri (Schindl.) Burkart
Sin.: *Meibomia hassleri* Schindl.
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 1990; Burkart, A., 1939c; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Montes, J. E. 711* (CTES)]; BRA[*Abruzzi Aragão de Oliveira, M. L. 1476* (HAS)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3219* (SI)].

Desmodium hickenianum Burkart
Sin.: *Desmodium hickenianum* Burkart var. *major* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Vanni, R. O., 1983, 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(AMA, SPE); URY(COL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5881* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16852* (NY)]; PRY[*Spegazzini, C. L. 10318* (LP)]; URY[*Molfino, J. F. s.n.* (*)].
Notas: Su presencia en Uruguay es dudosa.

Desmodium hickenianum Burkart var. *major* Burkart = **Desmodium hickenianum** Burkart
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Desmodium hirsutum M. Martens & Galeotti = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Desmodium humile (Schindl.) Burkart = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray
Referencias: Schubert, B. G., 1940.

Desmodium incanum DC.
Sin.: *Desmodium canum* (J.F. Gmel.) Schinz & Thell., *Desmodium frutescens* Schindl., *Desmodium supinum* (Sw.) DC., *Hedysarum canescens* Mill., *Hedysarum canum* J.F. Gmel., nom. illeg., *Hedysarum frutescens* Jacq., nom. illeg., *Hedysarum incanum* Sw., hom. illeg., *Hedysarum racemosum* Aubl., *Meibomia cana*

(J.F. Gmel.) S.F. Blake, *Meibomia incana* (DC.) Vail, *Meibomia incana* (Sw.) Hoehne, nom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lewis, G. P., 1987; Nicolson, D. H., 1978; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, ITA, MIE, PAI); URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RIV, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Piccinini, B. 3608* (BAB)]; BRA[*Reitz, P. R. 1393c* (SI)]; PRY[*Hicken, C. M. 334* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 954b* (MVFA, SI)].

Desmodium intermedium Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(CHA, FOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2721* (SI)].

Desmodium leiocarpum (Spreng.) G. Don
Sin.: *Hedysarum leiocarpum* Spreng., *Meibomia leiocarpa* (Spreng.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939c; Lewis, G. P., 1987; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Biganzoli, F. 38* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 12294* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8014* (SI)].

Desmodium lilloanum (Schindl.) Burkart = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray
Referencias: Schubert, B. G., 1940.

Desmodium longiarticulatum (Rusby) Burkart = **Desmodium bridgesii** (Schindl.) Burkart
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Desmodium molle (Vahl) DC. = **Desmodium glabrum** (Mill.) DC.

Desmodium neo-mexicanum A. Gray
Sin.: *Desmodium bigelovii* A. Gray, *Desmodium humile* (Schindl.) Burkart, *Desmodium lilloanum* (Schindl.) Burkart, *Desmodium neo-mexicanum* A. Gray var. *bigelovii* (A. Gray) S. Watson, *Desmodium parvum* (Schindl.) Standl., *Meibomia bigelovii* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia humilis* Schindl., *Meibomia lilloana* Schindl., *Meibomia neo-mexicana* (A. Gray) Kuntze, *Meibomia parva* Schindl.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Schubert, B. G., 1940; Ulibarri, E. A., 1994a; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, SDE, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 30374* (CTES, SI)].

Desmodium neo-mexicanum A. Gray var. *bigelovii* (A. Gray) S. Watson = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray

Desmodium pabulare (Hoehne) Malme = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Desmodium pachyrrhizum Vogel
Sin.: *Meibomia pachyrrhiza* (Vogel) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAA, SPE); URY(ART, MON, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 2795* (BA, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1093* (SI)]; PRY[*Woolston, A. L. 1211* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 5915* (MVFA)].

Desmodium parvum (Schindl.) Standl. = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray

Desmodium polygaloides Chodat & Hassl.
Sin.: *Desmodium dutrae* Malme, *Desmodium polygaloides* Chodat & Hassl. var. *dutrae* (Malme) Malme, *Meibomia polygaloides* (Chodat & Hassl.) Schindl.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Vanni, R. O., 1983, 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(COA, MIE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14771* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 18424* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6092* (SI)]; URY[*Osten, C. 6526* (MVFA, SI)].

Desmodium polygaloides Chodat & Hassl. var. *dutrae* (Malme) Malme = **Desmodium polygaloides** Chodat & Hassl.

Desmodium purpureum (Mill.) Fawc. & Rendle = **Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1952a.

Desmodium ramosissimum Arechav., nom. inval. = **Desmodium arechavaletae** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Desmodium riedelii (Schindl.) Burkart
Sin.: *Meibomia riedelii* Schindl.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 100–500 m.
Países: ARG(COS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pedersen, T. M. 3107* (CTES, SI)].

Desmodium rubiginosum Benth. = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Desmodium subsericeum Malme
Sin.: *Meibomia subsericea* (Malme) Schindl.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Vanni, R. O., 2001.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(I).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7775* (SI)]; BRA[*Abruzzi Aragão de Oliveira, M. L. 406* (ICN)].
Notas: Introducida en Chile. Citada para Paraguay sin indicar localidad o material de referencia (Vanni, 2001).

Desmodium supinum (Sw.) DC. = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Nicolson, D. H., 1978.

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.
Sin.: *Desmodium purpureum* (Mill.) Fawc. & Rendle, *Hedysarum purpureum* Mill., *Hedysarum tortuosum* Sw., *Meibomia purpurea* (Mill.) Vail ex Small, *Meibomia tortuosa* (Sw.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1952a; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Vanni, R. O., 2001.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COR, COS, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, CON, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cristóbal, C. L. 1175* (CTES, GB, LIL, UC)]; BRA[*Abruzzi Aragão de Oliveira, M. L. 397* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 38985* (AS, MO)].

Desmodium triarticulatum Malme
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 11054* (HBR)].
Notas: Citada para Uruguay sin indicar localidad o material de referencia (Izaguirre & Beyhaut, 1999).

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.
Sin.: *Desmodium uncinatum* (Jacq.) DC. var. *gracilis* Burkart, *Hedysarum uncinatum* Jacq., *Meibomia uncinata* (Jacq.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Oliveira, M. L. A. A., 1983; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2001.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAA, GUA); URY(CLA, COL, LAV, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 22291* (CTES, ICN, MEXU)]; BRA[*Hatschbach, G. 1209* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6106* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2543* (MVFA, SI)].

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. var. *gracilis* Burkart = **Desmodium uncinatum** (Jacq.) DC.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Desmodium venosum Vogel
Sin.: *Meibomia venosa* (Vogel) Kuntze
Referencias: Oliveira, M. L. A. A., 1990; Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Vanni, R. O., 2001.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwindt, E. 2815* (LIL)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (PACA)]; URY[*Izaguirre, P. 21430* (MVFA)].

Desmodium villosum (Cham. & Schltdl.) Hemsl., nom. illeg. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Desmodium villosum (Mill.) DC. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Desmodium vogelii Steud. = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Diallobus falcatus Raf., nom. illeg. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Diallobus uniflorus Raf. = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Dimorphandra Schott

Número de especies: 1

Dimorphandra mollis Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Silva, M. F., 1986.
Árbol. Nativa. 500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 6597* (SI)].

Dioclea Kunth

Número de especies: 3

Dioclea burkartii R.H. Maxwell
Referencias: Burkart, A., 1970.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, SFE); BRA(PAR); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Covas, G. 4488* (SI), *Fortunato, R. H. 7950* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15852* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2910* (SI)].

Dioclea glycinoides auct. non Pasq. = **Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1970; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1986.

Dioclea jacquiniana auct. non DC. = **Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1970.

Dioclea lasiocarpa Mart. ex Benth. = **Dioclea virgata** (Rich.) Amshoff
Referencias: Burkart, A., 1970.

Dioclea lasiophylla auct. non Mart. ex Benth. = **Camptosema praeandinum** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1970.

Dioclea megacarpa auct. non Rolfe = **Dioclea violacea** Mart. ex Benth.

Dioclea paraguariensis Hassl. = **Dioclea violacea** Mart. ex Benth.

Dioclea violacea Mart. ex Benth.
Sin.: *Dioclea megacarpa* auct. non Rolfe, *Dioclea paraguariensis* Hassl., *Dolichos altissimus* Vell., nom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1970; Lewis, G. P. & Owen, P. E., 1989; Lewis, G. P., 1987.
Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, COA, GUA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. s.n.* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 15746* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4191* (BA, BAB, LP)].

Dioclea virgata (Rich.) Amshoff
Sin.: *Canavalia peruviana* Piper, *Dioclea lasiocarpa* Mart. ex Benth., *Dolichos virgatus* Rich., *Mucuna virgata* (Rich.) Desv.
Referencias: Burkart, A., 1970.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)]; BRA[*Hatschbach, G. 2780* (SI)].

Dipogon Liebm.
Número de especies: 1 introducida

Dipogon lignosus (L.) Verdc.
Sin.: *Dolichos lignosus* L., *Verdcourtia lignosa* (L.) R. Wilczek
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Introducida. 200–500 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Matthei, O. R. 405* (CONC)].

Dipteryx Schreb.
Número de especies: 1

Dipteryx alata Vogel
Sin.: *Coumarouna alata* (Vogel) Taub., *Cumaruna alata* (Vogel) Kuntze
Referencias: Barham, J., 2005; Bernardi, L., 1984; Rizzini, C. T., 1976.
Árbol o arbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 33415* (CTES, SI)].

Diptychandra Tul.
Número de especies: 1

Diptychandra aurantiaca Tul.
Sin.: *Diptychandra epunctata* Tul. subsp. *rojasii* Hassl., *Diptychandra glabra* Benth.
Árbol o arbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10678* (MO)].

Diptychandra epunctata Tul. subsp. *rojasii* Hassl. = **Diptychandra aurantiaca** Tul.

Diptychandra glabra Benth. = **Diptychandra aurantiaca** Tul.

Discolobium Benth.
Número de especies: 4, 2 endémicas

Discolobium elongatum Benth. = **Discolobium pulchellum** Benth. var. **viscosissimum** Hassl.

Discolobium junceum Micheli = **Discolobium leptophyllum** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Discolobium leptophyllum Benth.
Sin.: *Discolobium junceum* Micheli, *Discolobium leptophyllum* Benth. var. *junceum* (Micheli) Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Vanni, R. O., 1983.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); PRY(MIE, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Vanni, R. O. 106* (CTES)]; PRY[*Rojas, T. 2890* (SI)].

[Discolobium leptophyllum Benth. f. glandiflora Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Discolobium leptophyllum Benth. f. parviflora Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Discolobium leptophyllum Benth. var. *junceum* (Micheli) Hassl. = **Discolobium leptophyllum** Benth.

Discolobium pauciyugum Harms ex Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1939c.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(MIE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 3110* (SI)]; PRY[*Kuntze, C. E. O. s.n.* (NY)].

Discolobium psoraleaefolium Benth.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1312* (SI)]; BRA[*Araújo, A. C. 99* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3753* (MVFA, SI)].

Discolobium pulchellum Benth. var. **pulchellum**
Referencias: Burkart, A., 1939c.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, SFE); PRY(APY, CEN, ÑEE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 4019* (BAB, BAF, CTES)]; PRY[*Rojas, T. 7675* (SI)].

Discolobium pulchellum Benth. var. **viscosissimum** Hassl.
Sin.: *Discolobium elongatum* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1939c.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APA, CEN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 1653* (SI)].
Notas: Cita dudosa para la flora de Argentina.

Ditremexa occidentalis (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson = **Senna occidentalis** (L.) Link
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Dolicholus angustifolius (A. Gray) Kuntze = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.

Dolicholus apoloensis Rusby = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Dolicholus balansae (Micheli) Kuntze = **Rhynchosia balansae** Micheli var. **balansae**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.

Dolicholus hauthalii (Harms) Kuntze = **Rhynchosia hauthalii** Harms ex Kuntze
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Dolicholus kuntzei Harms ex Kuntze = **Rhynchosia reticulata** (Sw.) DC. var. **kuntzei** (Harms ex Kuntze) Grear
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Dolicholus melanostictus (Griseb.) Kuntze = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Dolicholus minimus L. = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Dolicholus phaseoloides (Sw.) Kuntze = **Rhynchosia phaseoloides** (Sw.) DC.
Referencias: Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988.

Dolicholus reticulatus (Sw.) Millsp. = **Rhynchosia reticulata** (Sw.) DC. var. **reticulata**
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Dolicholus senna (Gillies ex Hook.) Kuntze = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **senna**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Miotto, S. T. S., 1988.

Dolichopsis Hassl.

Número de especies: 2

Dolichopsis ligulata (Piper) A. Delgado
Sin.: *Phaseolus dolichicarpus* Burkart, *Phaseolus ligulatus* Piper
Referencias: Delgado-Salinas, A. & Torres-Colín, L., 2004.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 9537* (SI), *Woolston, A. L. 1097* (NY)].

Dolichopsis paraguariensis (Benth.) Hassl.
Sin.: *Vigna paraguariensis* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Hassler, E., 1907a; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978; Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001b.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SAL, SFE); PRY(APY, CAA, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3096* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 2689* (G), *Rojas, T. 7729* (SI)].

Dolichos acinaciformis Jacq. = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos ahipa Wedd. = **Pachyrhizus ahipa** (Wedd.) Parodi

Dolichos altissimus Vell., nom. illeg. = **Dioclea violacea** Mart. ex Benth.

Dolichos emarginatus Jacq. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos ensiformis L. = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.

Dolichos funarius Molina = **Boquila trifoliolata** (DC.) Decne.
Referencias: Gunckel, L. H., 1959.

Dolichos gangeticus Roxb. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Dolichos lignosus L. = **Dipogon lignosus** (L.) Verdc.

Dolichos littoralis Vell. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos luteolus Jacq. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Dolichos maritimus Aubl. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos miniatus Kunth = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos niloticus Delile = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Dolichos pugioniformis Raeusch. = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos repens L. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Dolichos roseus Sw. = **Canavalia rosea** (Sw.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Dolichos urens Jacq., hom. illeg. = **Mucuna sloanei** Fawc. & Rendle
Referencias: Burkart, A., 1970.

Dolichos virgatus Rich. = **Dioclea virgata** (Rich.) Amshoff
Referencias: Burkart, A., 1970.

Ecastaphyllum brownei Pers. = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Ecastaphyllum ecastaphyllum (L.) Britton, nom. illeg. = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Ecastaphyllum molle Miq. = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Edwardsia cassioides Phil. = **Sophora cassioides** (Phil.) Sparre

Edwardsia grandiflora Salisb. var. *microphylla* (Aiton) Hook. f. = **Sophora microphylla** Aiton

Edwardsia masafuerana Phil. = **Sophora masafuerana** (Phil.) Skottsb.

Edwardsia microphylla (Aiton) Salisb. = **Sophora microphylla** Aiton

Edwardsia reedeana Phil. = **Sophora fernandeziana** (Phil.) Skottsb. var. **reedeana** (Phil.) Skottsb.

Emelista pilifera (Vogel) Pittier, nom. illeg. = **Senna pilifera** (Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. **pilifera**
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Emelista tora (L.) Britton & Rose = **Senna obtusifolia** (L.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Emerus exasperatus (Kunth) Kuntze = **Sesbania exasperata** Kunth

Emerus puniceus (Cav.) Kuntze = **Sesbania punicea** (Cav.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Enterolobium Mart.

Número de especies: 2, 1 endémica

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong
Sin.: *Acacia melalobiata* Rojas Acosta, *Calliandra pacara* Griseb., *Enterolobium glaucescens* Mart., *Enterolobium timbouva* auct. non Mart., *Feuilleea pacara* (Griseb.) Kuntze, *Mimosa contortisiliqua* Vell.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Mesquita, A. L., 1990; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, CEN, COA, GUA, ÑEE, PAI); URY(CLA, MON, PAY, RNO, ROC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. s.n.* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 38243* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1132* (G)]; URY[*Rosengurtt, B. 3585-b* (MVFA)].

Enterolobium glaucescens Mart. = **Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Enterolobium guaraniticum (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Enterolobium timbouva** Mart.
Referencias: Mesquita, A. L., 1990.

Enterolobium polycephalum Griseb. = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992b.

Enterolobium tamboril Mart. = **Enterolobium timbouva** Mart.

Enterolobium timbouva auct. non Mart. = **Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong
Referencias: Burkart, A., 1979b, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Enterolobium timbouva Mart.
Sin.: *Enterolobium guaraniticum* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Enterolobium tamboril* Mart., *Enterolobium timbouva* Mart. f. *minor* Hoehne, *Enterolobium timbouva* Mart. var. *canescens* Benth., *Pithecellobium guaraniticum* Chodat & Hassl.
Referencias: Mesquita, A. L., 1990.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CEN, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 7272* (G, K, NY)].

Enterolobium timbouva Mart. f. *minor* Hoehne = **Enterolobium timbouva** Mart.
Referencias: Mesquita, A. L., 1990.

Enterolobium timbouva Mart. var. *canescens* Benth. = **Enterolobium timbouva** Mart.

Eriosema (DC.) Rchb.

Número de especies: 14

Eriosema adumbratum Pittier = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**

Eriosema barbata Desv. = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**

Eriosema boelckei Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1992.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 6318a* (SI)].

Eriosema campestre Benth. f. *pilosa* Chodat & Hassl. = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.

Eriosema campestre Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.

Eriosema campestre Benth. var. **campestre**
Sin.: *Eriosema lagoense* Micheli
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b; Grear, J. W., 1970; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 300–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Bertoni 648* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 12453* (SI), *Pereira, E. 7729* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 12629* (CTES), *Schinini, A. 8032* (SI)].

Eriosema campestre Benth. var. **delicatula** Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.
Subarbusto. Nativa. 200–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(CAU, CAN, COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 1778* (BAB)]; BRA[*Araujo, D. 155* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9641a* (G)].

Eriosema campestre Benth. var. **macrophyllum** (Grear) Fortunato
Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *macrophyllum* Grear
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.
Subarbusto. Nativa. 800–1400 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Irwin, J. B. 11593* (F, GH, IAN, K, MO, NY, UB, US)].

Eriosema campestre Benth. var. *pubescens* (Chodat & Hassl.) Grear = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b; Grear, J. W., 1970.

Eriosema conwayi Rusby = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **crinitum**
Sin.: *Eriosema adumbratum* Pittier, *Eriosema barbata* Desv., *Eriosema conwayi* Rusby, *Eriosema pinetorum* Standl., *Glycine crinita* Kunth, *Rhynchosia crinita* (Kunth) DC.
Referencias: Grear, J. W., 1970; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10999* (S)].

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **discolor** Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.
Subarbusto. Nativa. 600–1400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 49617* (BAB, LIL)].

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. *fusiformis* (Rusby) Grear = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **pulchellum** Benth.

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. *macrophyllum* Grear = **Eriosema campestre** Benth. var. **macrophyllum** (Grear) Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b; Grear, J. W., 1970.

Eriosema crinitum (Kunth) G. Don var. **pulchellum** Benth.
Sin.: *Eriosema crinitum* (Kunth) G. Don var. *fusiformis* (Rusby) Grear, *Eriosema fusiformis* Rusby
Referencias: Fortunato, R. H., 1993.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAU, COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 14918* (US)]; PRY[*Nicora, E. G. 9843* (SI)].

Eriosema edule (Griseb.) Burkart = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Eriosema fusiformis Rusby = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **pulchellum** Benth.

Eriosema glabrum Mart. ex Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1970.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–1200 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*de Llamas, A. 413* (G)]; BRA[*Hatschbach, G. 10660* (SI)].

Eriosema hasslerianum Chodat
Referencias: Grear, J. W., 1970; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5280* (BM, F, G, GH, K, NY, S, UC)].

Eriosema heterophyllum Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 600–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10712* (A, BM, G, GH, K, NY, S, US), *Hatschbach, G. 2033* (SI)].

Eriosema lagoense Micheli = **Eriosema campestre** Benth. var. **campestre**
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.

Eriosema lanceolatum Benth. = **Eriosema simplicifolium** (Kunth) G. Don

Eriosema longifolium Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1970; Miotto, S. T. S., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dutra, J. 434* (ICN), *Hatschbach, G. 863* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 45897* (CTES)].

Eriosema longifolium Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl. = **Eriosema tacuaremboense** Arechav.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988.

Eriosema longifolium Benth. var. *pedunculatum* Chodat & Hassl. = **Eriosema tacuaremboense** Arechav.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988.

Eriosema obovatum Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1970.
Hierba. Perenne. Nativa. 300–1700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 4244* (SI)].

Eriosema pinetorum Standl. = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**

Eriosema platycarpon Micheli
Referencias: Grear, J. W., 1970.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS); PRY(AMA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Montes, J. E. 825* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4372* (SI)].

Eriosema rotundifolium Micheli = **Rhynchosia hauthalii** Harms ex Kuntze
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Eriosema rotundifolium Micheli var. *macrophyllum* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia hauthalii** Harms ex Kuntze
Referencias: Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988.

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. *flexuosum* Kuntze = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b; Miotto, S. T. S., 1988.

Eriosema rufum (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Sin.: *Eriosema campestre* Benth. f. *pilosa* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Eriosema campestre* Benth. var. *pubescens* (Chodat & Hassl.) Grear, *Eriosema rufum* (Kunth) G. Don var. *flexuosum* Kuntze, *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *longifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema yerbalium* Chodat & Hassl. f. *puberulum* Chodat & Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b; Grear, J. W., 1970; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Miotto, S. T. S., 1988.
Subarbusto. Nativa. 200–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jeckeln, G. R. s.n.* (SI), *Vanni, R. O. 641* (BAB, MO)]; BRA[*Burkart, A. 25141* (SI), *Rambo, B. 28461/1* (LIL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 4221* (SI)].

Eriosema simplicifolium (Kunth) G. Don
Sin.: *Eriosema lanceolatum* Benth., *Eriosema simplicifolium* (Kunth) G. Don var. *micranthum* Grear, *Glycine simplicifolia* Kunth, *Neurocarpum barbatum* Desv., *Rhynchosia simplicifolia* (Kunth) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1993; Grear, J. W., 1970.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA); BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 32280* (CTES)]; BRA[*Irwin, H. S. 14323* (NY)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4903* (BM, G, GH)].

Eriosema simplicifolium (Kunth) G. Don var. *micranthum* Grear = **Eriosema simplicifolium** (Kunth) G. Don
Referencias: Grear, J. W., 1970.

Eriosema strictum Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1970; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN, GUA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8643* (HB)]; PRY[*Hassler, E. 4820* (BM, G)].

Eriosema tacuaremboense Arechav.
Sin.: *Eriosema longifolium* Benth. f. *latifolia* Chodat & Hassl., *Eriosema longifolium* Benth. var. *pedunculatum* Chodat & Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1942a; Grear, J. W., 1970; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–1100 m.
Países: ARG(CHA, COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28431* (SI), *Hicken, C. M. 198* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1064* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4311* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 21462* (MVFA)].

Eriosema violaceum (Aubl.) G. Don
Sin.: *Cytisus violaceus* Aubl.
Referencias: Grear, J. W., 1970.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1800 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 8077* (BM, G)].

Eriosema volubile Micheli = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Grear, J. W., 1978.

Eriosema volubile Micheli f. *pube-densiore* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988.

Eriosema yerbalium Chodat & Hassl. = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.

Eriosema yerbalium Chodat & Hassl. f. *longifolia* Chodat & Hassl. = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b; Miotto, S. T. S., 1988.

Eriosema yerbalium Chodat & Hassl. f. *puberulum* Chodat & Hassl. = **Eriosema rufum** (Kunth) G. Don var. **macrostachyum** (DC.) G. Don
Referencias: Fortunato, R. H., 1999b.

Errazurizia Phil.

Número de especies: 1 endémica

Errazurizia glandulifera Phil. = **Errazurizia multifoliolata** (Clos) I.M. Johnst.

Errazurizia multifoliolata (Clos) I.M. Johnst.
Sin.: *Dalea multifoliolata* (Clos) Reiche, *Errazurizia glandulifera* Phil., *Parosela multifoliolata* (Clos) J.F. Macbr., *Psoralea multifoliolata* Clos
Referencias: Barneby, R. C., 1977.
Arbusto. Endémica. 0–1400 m.
Países: CHL(II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Worth, C. R. 16266* (SI)].

Ervum gracile (Loisel.) DC. = **Vicia parviflora** Cav.

Ervum hirsutum L. = **Vicia hirsuta** (L.) Gray

Ervum tenuissimum M. Bieb. = **Vicia parviflora** Cav.

Ervum tetraspermum L. = **Vicia tetrasperma** (L.) Schreb.

Erythrina L.

Número de especies: 5

Erythrina chacoensis Speg., nom. nud. = **Erythrina dominguenzii** Hassl.
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina crista-galli L. var. **crista-galli**
Sin.: *Coladendron crista-galli* (L.) Kuntze, *Erythrina fasciculata* Benth., *Erythrina laurifolia* Jacq., *Erythrina pulcherrima* Tod., *Erythrina speciosa* Tod., *Micropteryx crista-galli* (L.) Walp., *Micropteryx fasciculata* (Benth.) Walp., *Micropteryx laurifolia* (Jacq.) Walp.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a; Rambo, B., 1966; Steibel, P., 2001[2000].
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, COA, ITA, ÑEE, PAI); URY(CAS, CLA, COL, DUR, MON, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 28999* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20592* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 2541* (SI), *Zardini, E. M. 5645* (FCQ, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 4676pe* (MVFA)].

Erythrina crista-galli L. var. *inermis* Speg., nom. nud. = **Erythrina falcata** Benth.
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina crista-galli L. var. **leucochloa** Lombardo
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Endémica. 0–300 m.
Países: URY(TYT).
Ejemplares de Referencia: URY[*Lombardo, A. 4683* (MVJB)].

Erythrina dominguenzii Hassl.
Sin.: *Erythrina chacoensis* Speg., nom. nud.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a; Scarpa, G. F., 2004.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, SAL); PRY(APY, ÑEE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1123* (SI)]; PRY[*Bernardi, L. 18518* (G), *Rojas, T. 8668* (SI)].

Erythrina falcata Benth.
Sin.: *Corallodendron falcatum* (Benth.) Kuntze, *Erythrina crista-galli* L. var. *inermis* Speg., nom. nud., *Erythrina martii* Colla
Referencias: Bernardi, L., 1984; Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a; Rambo, B., 1966.
Árbol. Nativa. 500–2000 m.
Países: ARG(JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 2566* (SI), *Cabrera, A. L. 32063* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 20077* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5408* (G, SI)].

Erythrina fasciculata Benth. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina laurifolia Jacq. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina martii Colla = **Erythrina falcata** Benth.
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina poianthes Brot. = **Erythrina speciosa** Andrews

Erythrina poianthes Brot. var. *subinermis* Lindl. = **Erythrina speciosa** Andrews

Erythrina pulcherrima Tod. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina reticulata C. Presl = **Erythrina speciosa** Andrews

Erythrina similis Krukoff
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 11450* (B, MO, US)].

Erythrina speciosa Tod. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Erythrina speciosa Andrews
Sin.: *Corallodendron reticulatum* (C. Presl) Kuntze, *Erythrina poianthes* Brot., *Erythrina poianthes* Brot. var. *subinermis* Lindl., *Erythrina reticulata* C. Presl
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.
Arbolito. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Velloso Filho, R. s.n.* (ICN)].

Erythrostemon gilliesii (Wall. ex Hook.) Klotzsch = **Caesalpinia gilliesii** (Wall. ex Hook.) D. Dietr.

Exostyles Schott

Número de especies: 1 endémica

Exostyles godoyensis Soares-Silva & Mansano
Referencias: Mansano, V. F. & Lewis, G. P., 2004; Soares-Silva, L. H. & Mansano, V. F., 2004.
Árbol. Endémica. 400–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Soares-Silva, L. H. 208* (FUEL, RB, UB)].

Falcata ovalifolia (Kunth) Kuntze = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Ferreirea spectabilis Allemão = **Sweetia fruticosa** Spreng. var. **fruticosa**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Yakovlev, G. P., 1969.

Ferreirea spectabilis Allemão f. *fruticosa* Chodat & Hassl. = **Sweetia fruticosa** Spreng. var. **hassleri** Yakovlev

Ferreirea spectabilis Allemão var. *paraguariensis* Hassl. = **Sweetia fruticosa** Spreng. var. **paraguariensis** (Chodat & Hassl.) Yakovlev

Feuilleea affinis (DC.) Kuntze = **Inga affinis** DC.
Referencias: Hoc, P. S., 2005.

Feuilleea barbata (Benth.) Kuntze = **Inga barbata** Benth.

Feuilleea bicolor (Benth.) Kuntze = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.
Referencias: Hoc, P. S., 1992a.

Feuilleea brevipes (Benth.) Kuntze = **Calliandra brevipes** Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Feuilleea cataractae (Kunth) Kuntze = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Feuilleea catharinae (Benth.) Kuntze = **Inga striata** Benth.

Feuilleea cauliflora (Willd.) Kuntze = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **communis** Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Feuilleea chilensis (Benth.) Kuntze = **Calliandra chilensis** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Feuilleea conferta (Benth.) Kuntze = **Inga edulis** Mart.

Feuilleea distachya (Vent.) Kuntze = **Albizia lophantha** (Willd.) Benth.

Feuilleea divaricata (Benth.) Kuntze = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Feuilleea foliolosa (Benth.) Kuntze = **Calliandra foliolosa** Benth.
Referencias: Hoc, P. S., 1992a.

Feuilleea formosa (Kunth) Kuntze = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Feuilleea guilleminiana (Benth.) Kuntze = **Inga vulpina** Mart. ex Benth.

Feuilleea harrisii (Lindl.) Kuntze = **Calliandra harrisii** (Lindl.) Benth.

Feuilleea heterophylla (Willd.) Kuntze = **Inga heterophylla** Willd.

Feuilleea laurina (Sw.) Kuntze = **Inga laurina** (Sw.) Willd.

Feuilleea lentiscifolia (Benth.) Kuntze = **Inga lentiscifolia** Benth.

Feuilleea longipes (Benth.) Kuntze = **Calliandra longipes** Benth.
Referencias: Hoc, P. S., 1992a.

Feuilleea luschnathiana (Benth.) Kuntze = **Inga subnuda** Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.

Feuilleea malacophylla (Benth.) Kuntze = **Zapoteca formosa** (Kunth) H.M. Hern.

Feuilleea marginata (Willd.) Kuntze = **Inga marginata** Willd.

Feuilleea multifoliolata Kuntze = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Feuilleea myriophylla (Benth.) Kuntze = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Feuilleea niopiodes (Spruce ex Benth.) Kuntze = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1996.

Feuilleea nuda (Salzm. ex Benth.) Kuntze = **Inga striata** Benth.

Feuilleea pacara (Griseb.) Kuntze = **Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong

Feuilleea pachyloma Kuntze = **Calliandra parviflora** Benth.

Feuilleea peckoltii (Benth.) Kuntze = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.

Feuilleea pithecolobioides (Harms ex Kuntze) Kuntze = **Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Feuilleea polycephala (Griseb.) Kuntze = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992b.

Feuilleea portoricensis (Jacq.) Kuntze = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Feuilleea salzmanniana (Benth.) Kuntze = **Inga striata** Benth.

Feuilleea scabriuscula (Benth.) Kuntze = **Inga edulis** Mart.

Feuilleea scalaris (Griseb.) Kuntze = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992c.

Feuilleea selloana (Benth.) Kuntze = **Inga sellowiana** Benth.

Feuilleea sessilis (Vell.) Kuntze = **Inga sessilis** (Vell.) Mart.

Feuilleea tweedii (Benth.) Kuntze = **Calliandra tweedii** Benth.
Referencias: Hoc, P. S., 1992a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Feuilleea uruguensis (Hook. & Arn.) Kuntze = **Inga uraguensis** Hook. & Arn.
Referencias: Hoc, P. S., 2005.

Feuilleea virescens (Benth.) Kuntze = **Inga virescens** Benth.
Referencias: Hoc, P. S., 1994; Pennington, T. D., 1997.

Feuilleea vulpina (Mart. ex Benth.) Kuntze = **Inga vulpina** Mart. ex Benth.

Galactia P. Browne

Número de especies: 19, 3 endémicas

Galactia argentina (Griseb.) Kuntze = **Collaea argentina** Griseb.

Galactia aschersoniana Taub. = **Collaea aschersoniana** (Taub.) Burkart

Galactia benthamiana Micheli
Sin.: *Galactia decumbens* (Benth.) Hassl. var. *benthamiana* (Micheli) Hassl., *Galactia immarginata* Dusén
Referencias: Bossi, F. S. & Daviña, J. R., 2000; Burkart, A., 1971, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, MIS, SDE, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAA, COA, GUA, PAI); URY(RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Biganzoli, F. 622* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 15346* (SI), *Rambo, B. 35067* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. 3296* (SI)]; URY[*Reyes, A. 1* (SI), *Rosengurtt, B. 7165b* (MVFA)].

Galactia boavista (Vell.) Burkart
Sin.: *Collaea macrophylla* Benth., *Cytisus boavista* Vell., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub., *Galactia macrophylla* (Benth.) Taub. var. *ovalifolia* Hassl.
Referencias: Bossi, F. S. & Daviña, J. R., 2000; Burkart, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 1029* (SI), *Zuloaga, F. O. 5334* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 19974* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 6211* (SI)].

Galactia burkartii Fortunato
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Fortunato, R. H., 1994.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA, CAA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 1152* (BAB)].

Galactia colombiana Killip ex L.A. Bermúdez García, nom. nud. = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia decumbens (Benth.) Hassl. var. *benthamiana* (Micheli) Hassl. = **Galactia benthamiana** Micheli
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia dubia DC.
Sin.: *Galactia montana* Britton
Referencias: Burkart, A., 1971; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 5714* (SI), *Zuloaga, F. O. 7643* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5879* (CTES, FCQ, MO)].

Galactia eriosematoides Harms
Sin.: *Collaea tomentosa* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–400 m.
Países: PRY(AMA); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 33790* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 17626* (MVFA)].

Galactia fiebrigiana Burkart var. **corrrentina** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7894* (BAB, SI), *Troncoso, N. S. 3618* (SI)].

Galactia fiebrigiana Burkart var. **fiebrigiana**
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 2000–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 7154* (SI)].

Galactia fiebrigiana Burkart var. **sericophylla** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 1500–2500 m.
Países: ARG(SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schreiter, R. 9226* (LIL, SI)].

Galactia filiformis (Jacq.) Wall. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **striata**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia flaviflora (Griseb.) Micheli = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia formosa (Griseb.) Stuck. = **Collaea argentina** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia glaucescens Kunth
Referencias: Burkart, A., 1971.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA, CON, ITA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4068* (M)].

Galactia glaucophylla Harms
Sin.: *Rhynchosia sericea* Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1971; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 600–1400 m.
Países: ARG(COR, SDE, SFE, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rentzell, I. 18876* (SI)].

Galactia gracillima Benth.
Sin.: *Galactia linearifolia* Hoehne
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba, subarbusto o enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(CLA, FLA, MON, PAY, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 27245* (SI)]; BRA[*Dombrowski, L. T. 2280* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5957* (GH, NY, P, W)]; URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA), *Rosengurtt, B. 77b* (MVFA, SI)].

Galactia grewiaefolia (Benth.) Taub.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999, 2002; Burkart, A., 1971.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10528* (BAF, LIL, SI, W), *Rojas, T. 6725* (SI)].

Galactia hassleriana Chodat = **Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia heterophylla (Gillies ex Hook. & Arn.) Vail, hom. illeg. = **Galactia marginalis** Benth. var. **marginalis**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia immarginata Dusén = **Galactia benthamiana** Micheli
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia jussiaeana Kunth var. *velutina* (Benth.) Griseb. = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia latisiliqua Desv. var. **chacoensis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–1300 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, SAL, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 17504* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2933* (LIL)].

Galactia latisiliqua Desv. var. **latisiliqua**
Sin.: *Galactia colombiana* Killip ex L.A. Bermúdez García, nom. nud., *Galactia flaviflora* (Griseb.) Micheli, *Galactia jussiaeana* Kunth var. *velutina* (Benth.) Griseb., *Galactia neesii* DC. var. *flaviflora* Griseb., *Galactia obovata* Malme, *Galactia tenuiflora* Wight & Arn. var. *flaviflora* (Micheli) Hassl., *Galactia velutina* Benth.

Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1980.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON); URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 7344* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 413* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 12429* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10410* (MVFA), *Rosengurtt, B. 3266b* (MVFA, SI)].

Galactia latisiliqua Desv. var. **orbicularis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR); URY(PAY, RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 13346* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 21503* (MVFA)].

Galactia linearifolia Hoehne = **Galactia gracillima** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia longifolia (Jacq.) Benth.
Sin.: *Galactia tenuiflora* (Willd.) Wight & Arn. var. *eriocarpa* Benth. f. *angustifoliolata* Benth., *Galega longifolia* Jacq., *Sweetia longifolia* (Jacq.) DC., *Tephrosia longifolia* (Jacq.) Pers.
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SDE, SFE); PRY(APY, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 21222* (SI), *Fortunato, R. H. 7907* (BAB, SI)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5494b* (SI)].

Galactia lorentzii Griseb. = **Cologania broussonetii** (Balb.) DC.

Galactia macrophylla (Benth.) Taub. = **Galactia boavista** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia macrophylla (Benth.) Taub. var. *ovalifolia* Hassl. = **Galactia boavista** (Vell.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia macropoda R.S. Cowan = **Galactia neesii** DC. var. **macropoda** (R.S. Cowan) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia marginalis Benth. var. **colombiana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, ROC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 29411* (SI)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 25186* (MVFA)].

Galactia marginalis Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl. = **Galactia pretiosa** Burkart var. **pretiosa**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia marginalis Benth. var. *unifoliolata* Hassl. = **Galactia pretiosa** Burkart var. **pretiosa**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia marginalis Benth. subsp. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Galactia pretiosa** Burkart var. **pretiosa**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia marginalis Benth. var. **marginalis**
Sin.: *Cologania heterophylla* Gillies ex Hook. & Arn., *Galactia heterophylla* (Gillies ex Hook. & Arn.) Vail, hom. illeg.
Referencias: Bossi, F. S. & Daviña, J. R., 2000; Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1999; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, LPA, MEN, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(PAI); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 4712* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 305* (ICN)]; PRY[*Balansa, B. 1858* (P)]; URY[*Izaguirre, P. 170* (MVFA), *Seijo, G. J. 2415* (CTES)].

Galactia martii DC. var. **acuta** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(AMA, CAN, COA, MIE, PAI).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2535* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5181* (SI)].

Galactia martioides Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1980.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. 1371b* (SI), *van de Venne, H. s.n.* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 9248* (PACA)]; URY[*Rosengurtt, B. 8487b* (MVFA)].

Galactia montana Britton = **Galactia dubia** DC.
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia neesii DC. var. **australis** Malme
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1980.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU); URY(CLA, LAV, MAL, PAY, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8060* (BAB, SI), *Krapovickas, A. 17121* (SI)]; BRA[*Araujo, D. 153* (SI), *Rambo, B. 37859* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 30114* (CTES)]; URY[*Rosengurtt, B. 2744b* (MVFA, SI)].

Galactia neesii DC. var. *flaviflora* Griseb. = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia neesii DC. var. **macropoda** (R.S. Cowan) Burkart
Sin.: *Galactia macropoda* R.S. Cowan
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pierotti, A. 6591* (LIL, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 18465* (SI)].

Galactia obovata Malme = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia paraguariensis Chodat & Hassl. = **Camptosema paraguariense** (Chodat & Hassl.) Hassl. var. **paraguariense**

Galactia pretiosa Burkart var. **pretiosa**
Sin.: *Galactia marginalis* Benth. subsp. *longepedunculata* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Galactia marginalis* Benth. var. *unifoliolata* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, GUA); URY(RIV, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15241* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2574* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 4944* (GH, NY, P)]; URY[*Berro, M. B. 2298* (MVFA)].

Galactia pretiosa Burkart var. **trifoliolata** (Hassl.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR); PRY(COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 4044pp* (US)]; PRY[*Schinini, A. 4397* (SI)].

Galactia scarlatina (Mart. ex Benth.) Taub. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1970; Miotto, S. T. S., 1986.

Galactia scarlatina (Mart. ex Benth.) Taub. var. *brevibracteolata* Hassl. = **Camptosema scarlatinum** (Mart. ex Benth.) Burkart

Galactia speciosa (Loisel.) Britton = **Collaea speciosa** (Loisel.) DC.

Galactia speciosa (Loisel.) Britton f. *argentina* (Griseb.) Hassl. = **Collaea argentina** Griseb.
Referencias: García, R. C., 1989.

Galactia speciosa (Loisel.) Britton f. *paraguariensis* Hassl. = **Collaea paraguariensis** (Hassl.) R. García
Referencias: García, R. C., 1989.

Galactia stenophylla Hook. & Arn. = **Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia stenophylla Hook. & Arn. var. *hassleriana* (Chodat) Hassl. = **Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Galactia stenophylla Hook. & Arn. var. *virgata* (Benth.) Hassl. = **Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Galactia striata (Jacq.) Urb. var. **crassirachis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Tressens, S. G. 68* (CTES, SI)].

Galactia striata (Jacq.) Urb. var. **striata**
Sin.: *Galactia filiformis* (Jacq.) Wall., *Galactia striata* (Jacq.) Urb. var. *tomentosa* (Bertol.) Urb., *Galactia tenuiflora* Wight & Arn., p.p., *Glycine striata* Jacq., *Odonia tomentosa* Bertol.
Referencias: Bossi, F. S. & Daviña, J. R., 2000; Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1980.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CEN, GUA, PAI, SPE); URY(ART, PAY, RIV, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2611* (BAB, G, MO), *Schwindt, E. 1416* (LIL)]; BRA[*Pereira, E. 7868* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6376* (GH, LIL, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 2036* (MVFA)].

Galactia striata (Jacq.) Urb. var. **tenuiflora** (Klein ex Willd.) Burkart
Sin.: *Galactia tenuiflora* (Klein ex Willd.) Wight & Arn., *Glycine tenuiflora* Klein ex Willd., *Teramnus tenuiflorus* (Klein ex Willd.) Spreng.
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, ERI, JUJ, SAL, TUC); PRY(AMA, COA, GUA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 15405* (SI)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10727* (SI)].

Galactia striata (Jacq.) Urb. var. *tomentosa* (Bertol.) Urb. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **striata**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **tenuiflora** (Klein ex Willd.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a.

Galactia tenuiflora Wight & Arn., p.p. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **striata**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia tenuiflora (Willd.) Wight & Arn. var. *eriocarpa* Benth. f. *angustifoliolata* Benth. = **Galactia longifolia** (Jacq.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia tenuiflora Wight & Arn. var. *flaviflora* (Micheli) Hassl. = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galactia texana (Scheele) A. Gray var. **degasperii** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 20288* (SI)].

Galactia texana (Scheele) A. Gray var. **texana**
Sin.: *Lablab texanus* Scheele
Referencias: Burkart, A., 1971.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Saravia Toledo, C. 1271* (SI)].

Galactia velutina Benth. = **Galactia latisiliqua** Desv. var. **latisiliqua**
Referencias: Burkart, A., 1971.

Galactia virgata (Benth.) Chodat & Hassl. = **Collaea stenophylla** (Hook. & Arn.) Benth.

Galearia bonannii (C. Presl) C. Presl = **Trifolium fragiferum** L. subsp. **bonanni** (C. Presl) Soják

Galearia fragifera (L.) Bobrov, nom. illeg. = **Trifolium fragiferum** L. subsp. **fragiferum**

Galearia fragifera (L.) C. Presl = **Trifolium fragiferum** L. subsp. **fragiferum**

Galearia resupinata (L.) C. Presl = **Trifolium resupinatum** L.

Galega L.

Número de especies: 1 introducida

Galega cinerea L. = **Tephrosia cinerea** (L.) Pers.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Galega longifolia Jacq. = **Galactia longifolia** (Jacq.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1971, 1987a.

Galega officinalis L.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, MEN, NEU, RNE); CHL(V, RME); URY(CAS, FLA, MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Naranjo, C. 872* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 55* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5930* (MVFA)].

Garugandra amorphoides Griseb. = **Gleditsia amorphoides** (Griseb.) Taub. var. **amorphoides**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Robertson, K. R. & Lee, Y. T., 1976.

Genista L.

Número de especies: 2 introducidas

Genista andicola Gillies ex Hook. & Arn. = **Anarthrophyllum andicolum** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Genista cumingii Hook. & Arn. = **Anarthrophyllum cumingii** (Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Genista desiderata DC. = **Anarthrophyllum desideratum** (DC.) Benth. var. **desideratum**
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b, 1984a.

Genista elegans Gillies ex Hook. & Arn. = **Anarthrophyllum elegans** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Genista gayana A. Gray = **Anarthrophyllum gayanum** (A. Gray) B.D. Jacks.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Sorarú, S. B., 1974b.

Genista juniperina Meyen = **Anarthrophyllum andicolum** (Gillies ex Hook. & Arn.) F. Phil.
Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson
Sin.: *Cytisus monspessulanus* L., *Teline monspessulana* (L.) K. Koch
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Steibel, P., 2001[2000].
Arbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); CHL(V, VII, VIII, IX, X, IJF, RME); URY(MAL, RIV, ROC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 13199* (SI)]; CHL[*Matthei, O. 995* (CONC)]; URY[*Izaguirre, P. 245* (MVFA)].

Genista rigida Gillies ex Hook. & Arn. = **Anarthrophyllum rigidum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Hieron.

Referencias: Sorarú, S. B., 1974b.

Genista striata Hill = **Cytisus striatus** (Hill) Rothm.

Genista tinctorea L.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Arbusto. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3473* (BCRU)].

Genista umbellata Clos = **Anarthrophyllum gayanum** (A. Gray) B.D. Jacks.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Sorarú, S. B., 1974b.

Geoffraea Jacq.

Número de especies: 2

Geoffraea bredemeyeri Kunth = **Geoffraea spinosa** Jacq.
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Sin.: *Geoffraea decorticans* (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart var. *subtropicalis* (Lillo) Burkart, *Geoffroya spinosa* (Molina) M. de Moussy, nom. illeg., *Gourliea chilensis* Clos, *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn., *Gourliea decorticans* Gillies ex Hook. & Arn. var. *subtropicalis* Lillo, *Gourliea decorticata* Walp., nom. illeg., *Gourliea spinosa* (Molina) Skeels, *Lucuma spinosa* Molina
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1949b, 1952a; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fortunato, R. H., 1984a; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 100–2600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV); PRY(APY, PHA); URY(COL, MON, PAY, RNO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fabris, H. A. 4913* (NY), *Troncoso, N. S. 2360* (SI)]; CHL[*Cumming, W. A. 921* (K), *Werdermann, E. 411* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8381* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8547* (MVFA)].

Geoffraea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart var. *subtropicalis* (Lillo) Burkart = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949b; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Geoffraea inermis W. Wright = **Andira inermis** (W. Wright) DC.
Referencias: Pennington, R. T., 2003.

Geoffraea spinosa Jacq.
Sin.: *Geoffraea bredemeyeri* Kunth, *Geoffraea striata* (Willd.) J.F. Macbr., comb. superfl., *Geoffraea striata* (Willd.) Morong, *Geoffroya superba* Humb. & Bonpl., *Robinia striata* Willd.
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1949b; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.
Árbol. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL, SFE); PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 27635* (GH, MO), *Schulz, A. G. 1153* (SI)]; PRY[*Bernardi, L. 20394* (MO), *Pedersen, T. M. 4102* (SI)].

Geoffraea striata (Willd.) J.F. Macbr., comb. superfl. = **Geoffraea spinosa** Jacq.
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Geoffraea striata (Willd.) Morong = **Geoffraea spinosa** Jacq.
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Geoffroya spinosa (Molina) M. de Moussy, nom. illeg. = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Geoffroya superba Humb. & Bonpl. = **Geoffraea spinosa** Jacq.
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Gleditsia L.

Número de especies: 2, 1 introducida

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. var. **amorphoides**
Sin.: *Garugandra amorphoides* Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Grisebach, A. H. R., 1879; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Robertson, K. R. & Lee, Y. T., 1976; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000; Ulibarri, E. A., 1997a.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CEN, COA, PAI); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 608* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 50378* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1515a* (SI), *Zardini, E. M. 4593* (FCQ, MO)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1661* (MVFA)].

Gleditsia amorphoides (Griseb.) Taub. var. **anacantha** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Ulibarri, E. A., 1997a.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); URY(ART, MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Mangieri, H.R. 131* (LP)]; URY[*Del Puerto, O. 18176* (MVFA)].

Gleditsia triacanthos L.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Robertson, K. R. & Lee, Y. T., 1976; Steibel, P., 2001[2000]; Ulibarri, E. A., 1997a.
Árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, SAL, SFE); URY(CAS, MON, PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 24812* (SI)]; URY[*Gibert, J. E. 832* (MVM)].

Glycine bujacia Benth. = **Neonotonia wightii** (Graham ex Wight & Arn.) Lackey
Referencias: Ulibarri, E. A., 1988.

Glycine crinita Kunth = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**
Referencias: Grear, J. W., 1970.

Glycine lamarckii Kunth = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Glycine littoralis Vahl ex DC. = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Glycine phaseoloides Sw. = **Rhynchosia phaseoloides** (Sw.) DC.
Referencias: Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988.

Glycine pugiunculus Desv. = **Centrosema virginianum** (L.) Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Glycine reflexa Nutt. = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Glycine reticulata Sw. = **Rhynchosia reticulata** (Sw.) DC. var. **reticulata**
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Glycine sagittata Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Glycine simplicifolia Kunth = **Eriosema simplicifolium** (Kunth) G. Don

Glycine striata Jacq. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **striata**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Glycine tenuiflora Klein ex Willd. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **tenuiflora** (Klein ex Willd.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1971.

Glycine wightii (Graham ex Wight & Arn.) Verdc. = **Neonotonia wightii** (Graham ex Wight & Arn.) Lackey
Referencias: Ulibarri, E. A., 1988.

Glycinopsis mediterranea (Vell.) Kuntze = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Glycirrhiza mediterranea Vell. = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.
Referencias: Mattos, N. F., 1973.

Glycyrrhiza L.

Número de especies: 1 endémica

Glycyrrhiza astragalina Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Gómez Sosa, E. V., 1994; Rossow, R. A., 1984c.
Subarbusto. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SJU, TUC); CHL(V, VIII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 32825* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 8071* (SI)].

Glycyrrhiza undulata Ruiz & Pav. = **Andira inermis** (W. Wright) DC.

Goldmania paraguensis (Benth.) Brenan = **Microlobius foetidus** (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis** (Benth.) M. Sousa & G. Andrade
Referencias: Bernardi, L., 1984; Sousa Sánchez, M. & Andrade, G., 1992.

Gourliea chilensis Clos = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949b; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Gourliea decorticans Gillies ex Hook. & Arn. = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1949b; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Gourliea decorticans Gillies ex Hook. & Arn. var. *subtropicalis* Lillo = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Gourliea decorticata Walp., nom. illeg. = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949b; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Gourliea spinosa (Molina) Skeels = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1949b; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Guibourtia A.W. Benn.

Número de especies: 1

Guibourtia chodatiana (Hassl.) J. Léonard = **Guibourtia hymenaeifolia** (Moric.) J. Léonard
Referencias: Barneby, R. C., 1996.

Guibourtia chodatiana (Hassl.) J. Léonard var. *fruticosa* (Hassl.) J. Léonard = **Guibourtia hymenaeifolia** (Moric.) J. Léonard
Referencias: Barneby, R. C., 1996.

Guibourtia hymenaeifolia (Moric.) J. Léonard
Sin.: *Copaifera chodatiana* Hassl., *Copaifera chodatiana* Hassl. var. *fruticosa* Hassl., *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard, *Guibourtia chodatiana* (Hassl.) J. Léonard var. *fruticosa* (Hassl.) J. Léonard
Referencias: Barneby, R. C., 1996.
Árbol o arbolito. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAN, CEN, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Bernardi, L. 18946* (G), *Ferrucci, M. S. 1697* (SI)].

Hedysarum adscendens Sw. = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Hedysarum adscendens Sw. var. *caeruleum* Lindl. = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Hedysarum alpinum Lour. = **Aeschynomene indica** L.

Hedysarum asperum Poir. = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Hedysarum barbatum L. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Hedysarum bicolorum Poir. = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hedysarum brasilianum Poir. = **Aeschynomene brasiliana** (Poir.) DC.

Hedysarum canescens Mill. = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Nicolson, D. H., 1978.

Hedysarum canum J.F. Gmel., nom. illeg. = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Nicolson, D. H., 1978.

Hedysarum coeruleo-violaceum G. Mey. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Hedysarum diffusum Vell. = **Aeschynomene falcata** (Poir.) DC. var. **falcata**
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Hedysarum distortum Aubl. = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Hedysarum ecastaphyllum L. = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Hedysarum falcatum Poir. = **Aeschynomene falcata** (Poir.) DC. var. **falcata**
Referencias: Burkart, A., 1939c; Burkart, A., 1987a.

Hedysarum frutescens Jacq., nom. illeg. = **Desmodium incanum** DC.

Hedysarum gemellum Willd. = **Zornia gemella** (Willd.) Vogel
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Mohlenbrock, R. H., 1961.

Hedysarum glabrum Mill. = **Desmodium glabrum** (Mill.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1957b.

Hedysarum hamatum L. = **Stylosanthes viscosa** (L.) Sw.

Hedysarum hamatum L. var. *viscosum* L. = **Stylosanthes viscosa** (L.) Sw.

Hedysarum incanum Sw., hom. illeg. = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Hedysarum leiocarpum Spreng. = **Desmodium leiocarpum** (Spreng.) G. Don
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Hedysarum molle Vahl = **Desmodium glabrum** (Mill.) DC.

Hedysarum muricatum Jacq. = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **muricata**
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hedysarum neli-tali Roxb. = **Aeschynomene indica** L.

Hedysarum pendulum Poir. = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hedysarum pimpinellifolium Poir. = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hedysarum punctatum Poir. = **Adesmia punctata** (Poir.) DC. var. **punctata**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Hedysarum purpureum Mill. = **Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.

Hedysarum racemosum Aubl. = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Hedysarum tortuosum Sw. = **Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Hedysarum uncinatum Jacq. = **Desmodium uncinatum** (Jacq.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Hedysarum villosum Mill. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Hedysarum virginicum L. = **Aeschynomene virginica** (L.) Britton, Stern & Poggenb.

Hedysarum virginicum Lour. = **Aeschynomene indica** L.

Herpetica alata (L.) Raf. = **Senna alata** (L.) Roxb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Hoffmannseggia Cav.

Número de especies: 10, 5 endémicas

Hoffmannseggia andina Miers, nom. nud.
= **Hoffmannseggia eremophila** (Phil.) Burkart ex Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b.

Hoffmannseggia andina Phil. = **Hoffmannseggia eremophila** (Phil.) Burkart ex Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b, 1997a.

Hoffmannseggia andina Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche = **Hoffmannseggia eremophila** (Phil.) Burkart ex Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979.

Hoffmannseggia chicamana (Killip & J.F. Macbr.) Eifert
= **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Hoffmannseggia densiflora Benth. ex A. Gray
= **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Hoffmannseggia doelli Phil. var. *minor* Phil.
= **Hoffmannseggia minor** (Phil.) Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b.

Hoffmannseggia doelli Phil. subsp. **argentina** Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–3000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 4583* (SI), *Ruiz Leal, R. A. 22091* (SI)].
Notas: Simpson (2004) menciona que podría tratarse de un híbrido entre *Hoffmannseggia trifoliolata* y *H. erecta*.

Hoffmannseggia doellii Phil. subsp. **doellii**
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Ulibarri, E. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Endémica. 2200–4200 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 3552* (SI)].

Hoffmannseggia erecta Phil.
Sin.: *Hoffmannseggia falcaria* Cav. var. *andicola* Hook. & Arn., *Hoffmannseggia patagonica* Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1984b, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–3500 m.
Países: ARG(CAT, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU); CHL(II, V).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 27928* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 1014* (SI)].

Hoffmannseggia eremophila (Phil.) Burkart ex Ulibarri
Sin.: *Hoffmannseggia andina* Miers var. *eremophila* (Phil.) Reiche, *Hoffmannseggia andina* Miers, nom. nud., *Hoffmannseggia andina* Phil., *Hoffmannseggia philippiana* Hosseus, *Zuccagnia eremophila* Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Castor, C., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Cavieres, L., Matthei, O. R., Squeo, F. A., Grosjean, M. & Rodríguez Ríos, R., 1998; Muñoz-Schick, M. & Prina, A. O., 1987; Ulibarri, E. A., 1979, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, MEN, SAL); CHL(II, III).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 31804* (SI)]; CHL[*Arancio, G. 10405* (ULS)].

Hoffmannseggia falcaria Cav., nom. illeg.
= **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b.

Hoffmannseggia falcaria Cav. var. *andicola* Hook. & Arn. = **Hoffmannseggia erecta** Phil.

Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert
Sin.: *Caesalpinia chicamana* Killip & J.F. Macbr., *Caesalpinia falcaria* (Cav.) L. Fisher, *Caesalpinia glauca* (Ortega) Kunth, *Hoffmannseggia chicamana* (Killip & J.F. Macbr.) Eifert, *Hoffmannseggia densiflora* Benth. ex A. Gray, *Hoffmannseggia falcaria* Cav., nom. illeg., *Hoffmannseggia stricta* Benth. ex A. Gray, *Larrea densiflora* (Benth. ex A. Gray) Britton, *Larrea glauca* Ortega
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1984b, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–4000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); CHL(III, IV, V, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 13081* (LP, SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 18808* (SI)].

Hoffmannseggia gracilis (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn.
= **Hoffmannseggia prostrata** Lag. ex DC.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.

Hoffmannseggia minor (Phil.) Ulibarri
Sin.: *Hoffmannseggia doelli* Phil. var. *minor* Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 800–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 32473* (SI)]; CHL[*Wickens, G. E. 71* (K)].

[Hoffmannseggia nana Chodat & Wilczek]
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b.
Notas: Nombre dudoso.

Hoffmannseggia parviflora Micheli = **Pomaria parviflora** (Micheli) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b.

Hoffmannseggia patagonica Speg. = **Hoffmannseggia erecta** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1984b, 1996b.

Hoffmannseggia philippiana Hosseus = **Hoffmannseggia eremophila** (Phil.) Burkart ex Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979.

Hoffmannseggia prostrata Lag. ex DC.
Sin.: *Caesalpinia prostrata* (Lag. ex DC.) J.F. Macbr., *Hoffmannseggia gracilis* (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn., *Larrea gracilis* Ruiz & Pav.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2700 m.
Países: CHL(I, II, III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 3542* (SI)].

Hoffmannseggia pumilio (Griseb.) B.B. Simpson
Sin.: *Caesalpinia pumilio* Griseb., *Caesalpinia pumilio* Griseb. var. *riojana* (Kurtz ex Hosseus) Burkart, *Caesalpinia riojana* Kurtz ex Hosseus
Referencias: Burkart, A., 1936, 1952a; Lewis, G. P., 1998; Simpson, B. B., Tate, J. A. & Weeks, A., 2004; Ulibarri, E. A., 1994a, 1996b, 1997a.
Arbusto. Endémica. 1500–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5568* (BAB, SI)].

Hoffmannseggia stricta Benth. ex A. Gray = **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert

Hoffmannseggia ternata Phil.
Sin.: *Caesalpinia ternata* (Phil.) J.F. Macbr.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1996b.
Hierba. Perenne. Nativa. 1500–3000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 1113* (SI)].

Hoffmannseggia trifoliata Cav. var. *glandulosa* Speg. = **Hoffmannseggia trifoliata** Cav. var. **microphylla** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1997a.

Hoffmannseggia trifoliata Cav. var. **microphylla** Speg.
Sin.: *Hoffmannseggia trifoliata* Cav. var. *glandulosa* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1967a; Ulibarri, E. A., 1979, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Bartlett, H. H. 19952* (SI)].

Hoffmannseggia trifoliata Cav. var. **trifoliata**
Referencias: Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997; Steibel, P., 2001[2000]; Ulibarri, E. A., 1979, 1984b, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–600 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR); CHL(XI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 7261* (SI)]; CHL[*Barros, E. 7235* (SI)].

Hoffmannseggia yaviensis Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1979, 1996b, 1997a.
Hierba. Perenne. Nativa. 3400–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schreiter, R. 11098* (SI)].

Hoita glandulosa (L.) Rydb. = **Otholobium glandulosum** (L.) J.W. Grimes
Referencias: Grimes, J. W., 1990; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Hoita hirsuta Rusby = **Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes

Hoita versicolor Rusby = **Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes

Holocalyx Micheli

Número de especies: 1

Holocalyx balansae Micheli
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M., 1994; Ulibarri, E. A., 1997c.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAA, CAN, CEN, COA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 17059* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18549* (SI)].

Hosackia capitellata (Clos) Brand = **Adesmia capitellata** (Clos) Hauman
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Hymenaea L.

Número de especies: 3

Hymenaea confertifolia Hayne = **Hymenaea courbaril** L. var. **stilbocarpa** (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Hymenaea correana Barb. Rodr. = **Hymenaea stigonocarpa** Mart. ex Hayne var. **pubescens** Benth.

Hymenaea courbaril L. var. **stilbocarpa** (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.
Sin.: *Hymenaea confertifolia* Hayne, *Hymenaea splendida* Vogel, *Hymenaea stilbocarpa* Hayne

Referencias: Bernardi, L., 1984; Lee, Y. T. & Langenheim, J. H., 1987; Lewis, G. P., 1987.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Bernardi, L. 18272* (G)].

Hymenaea martiana Hayne
Sin.: *Cynometra martiana* (Hayne) Baill., *Hymenaea sellowiana* Hayne
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lewis, G. P., Lee, Y. T. & Langenheim, J. H., 1987.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Bernardi, L. 20556* (G), *Hassler, E. 7792* (G)].

Hymenaea olfersiana Hayne = **Hymenaea stigonocarpa** Mart. ex Hayne var. **pubescens** Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Hymenaea rotunda Hayne = **Hymenaea stigonocarpa** Mart. ex Hayne var. **pubescens** Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Hymenaea sellowiana Hayne = **Hymenaea martiana** Hayne
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Hymenaea splendida Vogel = **Hymenaea courbaril** L. var. **stilbocarpa** (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. **pubescens** Benth.
Sin.: *Hymenaea correana* Barb. Rodr., *Hymenaea olfersiana* Hayne, *Hymenaea rotunda* Hayne
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lee, Y. T. & Langenheim, J. H., 1987.
Árbol o arbolito. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Bernardi, L. 19353* (G)].

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne var. **stigonocarpa**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Lee, Y. T. & Langenheim, J. H., 1987; Lewis, G. P., 1987.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, APA, AMA, CAN, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Bernardi, L. 20594* (G)].

Hymenaea stilbocarpa Hayne = **Hymenaea courbaril** L. var. **stilbocarpa** (Hayne) Y.T. Lee & Langenh.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Indigofera L.

Número de especies: 11, 3 endémicas

Indigofera anil L. = **Indigofera suffruticosa** Mill.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Indigofera anil L. var. *angustifolia* Griseb. = **Indigofera kurtzii** Harms
Referencias: Burkart, A., 1942b.

Indigofera anil L. var. *polyphylla* DC. = **Indigofera suffruticosa** Mill.

Indigofera asperifolia Hochst. ex Baker, nom. illeg. = **Indigofera asperifolia** Bong. ex Benth.

Indigofera asperifolia Bong. ex Benth.
Sin.: *Anila asperifolia* (Bong. ex Benth.) Kuntze, *Indigofera asperifolia* Hochst. ex Baker, nom. illeg., *Indigofera retrusa* N.E. Br.
Referencias: Burkart, A., 1942b, 1987a; Eisinger, S., 1987; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(CAA, GUA, MIE); URY(ART, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 1141* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1056* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3614* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 11368* (MVFA)].

[Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. var. lanceolata Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. var. macrophylla Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart var. **bongardiana**
Sin.: *Anila bongardiana* Kuntze, *Indigofera gracilis* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAU, CAN, CEN, ITA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 572* (SI)]; BRA[*Hoehne, F. C. 23387* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4259* (SI)];

Indigofera bongardiana (Kuntze) Burkart var. **graminoides** (Chodat & Hassl.) Burkart
Sin.: *Indigofera gracilis* Benth. var. *graminoides* Chodat & Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(GUA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 5874* (CTES)].

Indigofera campestris Bong. ex Benth.
Referencias: Burkart, A., 1942b; Eisinger, S., 1987; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS); PRY(CEN, GUA, ITA, PHA); URY(ART, PAY, RNO, TAC).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 25554* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2797* (SI)]; PRY[*Pin, A. B. 467* (PY)]; URY[*Rosengurtt, B. 6801b* (MVFA)].

Indigofera campestris Kurtz, nom. illeg. = **Indigofera parodiana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1941, 1942b.

Indigofera campestris Bong. ex Benth. f. *bifoliolata* Hassl. = **Indigofera latifolia** Micheli

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. f. microphylla Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. f. mixta Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. f. transiens Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Indigofera campestris Bong. ex Benth. f. *unifoliolata* Hassl. = **Indigofera latifolia** Micheli

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. f. vera Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. var. angustifolia Micheli]
Notas: Nombre dudoso.

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. var. intermedia Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Indigofera campestris Bong. ex Benth. var. *latifolia* (Micheli) Hassl. = **Indigofera latifolia** Micheli
Referencias: Burkart, A., 1942a, b.

[Indigofera campestris Bong. ex Benth. var. microphylla Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Indigofera drepanocarpa Bergman = **Indigofera suffruticosa** Mill.

Indigofera elongata Michx., nom. illeg. = **Indigofera guaranitica** Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1942a.

Indigofera gracilis Benth. = **Indigofera bongardiana** (Kuntze) Burkart var. **bongardiana**
Referencias: Burkart, A., 1942b.

Indigofera gracilis Benth. var. *graminoides* Chodat & Hassl. = **Indigofera bongardiana** (Kuntze) Burkart var. **graminoides** (Chodat & Hassl.) Burkart

Indigofera guaranitica Hassl.
Sin.: *Indigofera elongata* Michx., nom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); PRY(CEN, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 19129* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7467* (SI)].

Indigofera humilis Kuntze, nom. illeg. = **Indigofera parodiana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1941, 1942b.

Indigofera kurtzii Harms
Sin.: *Anila kurtzii* (Harms) Kuntze, *Indigofera anil* L. var. *angustifolia* Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CAT, COR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Nicora, E. G. 2495* (SI)].

Indigofera latifolia Micheli
Sin.: *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *bifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. f. *unifoliolata* Hassl., *Indigofera campestris* Bong. ex Benth. var. *latifolia* (Micheli) Hassl.
Referencias: Burkart, A.. 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APA, CAU, GUA, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*de Llamas, A. 617* (BAB)]; PRY[*Rojas, T. 5841* (SI)].

Indigofera lespedezioides Kunth
Sin.: *Anila lespedezoides* (Kunth) Kuntze, *Anila pascuorum* (Benth.) Kuntze, *Indigofera lespedezoides* Kunth var. *pascuorum* (Benth.) Hassl., *Indigofera lespedezoides* Kunth var. *typica* Hassl., nom. inval.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10715* (MO, NY)].

Indigofera lespedezoides Kunth var. *pascuorum* (Benth.) Hassl. = **Indigofera lespedezioides** Kunth

Indigofera lespedezoides Kunth var. *typica* Hassl., nom. inval. = **Indigofera lespedezioides** Kunth

Indigofera parodiana Burkart
Sin.: *Indigofera campestris* Kurtz, nom. illeg., *Indigofera humilis* Kuntze, nom. illeg., *Indigofera pascuorum* Griseb., hom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1941, 1942b; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(COR, COS, SAL, SDE, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5338* (BAB)]; PRY[*Vanni, R. O. 2324* (CTES)].

Indigofera pascuorum Griseb., hom. illeg. = **Indigofera parodiana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1941, 1942b.

Indigofera retrusa N.E. Br. = **Indigofera asperifolia** Bong. ex Benth.
Referencias: Burkart, A., 1942b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Indigofera sabulicola Benth.
Sin.: *Anila sabulicola* (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1942b; Eisinger, S., 1987; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); BRA(RGS); PRY(CEN); URY(ART, PAY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 5666* (SI)]; BRA[*Freitas Xavier, E. 1* (SI)]; PRY[*Rosengurtt, B. 5443b* (MVFA, SI)]; URY[*Marchesi, E. 10122* (MVFA)].

Indigofera suffruticosa Mill.
Sin.: *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *brachycarpa* (DC.) Kuntze, *Anila tinctoria* (L.) Kuntze var. *vera* Kuntze, *Indigofera anil* L., *Indigofera anil* L. var. *polyphylla* DC., *Indigofera drepanocarpa* Bergman, *Indigofera tinctoria* Mill. var. *brachycarpa* DC., *Indigofera tinctoria* Mill., nom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1942b, 1987b; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, CAA, CON, COA, GUA); URY(COL, MAL, RNO, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 606* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 1740* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 3609* (SI)]; URY[*Osten, C. 18986* (MVM)].

Indigofera tinctoria Mill., nom. illeg. = **Indigofera suffruticosa** Mill.

Indigofera tinctoria Mill. var. *brachycarpa* DC. = **Indigofera suffruticosa** Mill.

Indigofera truxillensis Kunth
Referencias: Macbride, J. F., 1943.
Hierba. Perenne. Nativa.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ortega, P. 1* (SI)].

Inga Mill.

Número de especies: 17, 3 endémicas

Inga acutifolia Benth. = **Inga affinis** DC.

Inga affinis DC.
Sin.: *Feuilleea affinis* (DC.) Kuntze, *Inga acutifolia* Benth., *Inga arrabideae* Steud., *Inga dulces* Mart., nom. illeg., *Inga velloziana* Mart., *Inga vera* Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn., *Mimosa dulcis* Vell., *Mimosa umbellata* Vell.
Referencias: Hoc, P. S., 2005; Pennington, T. D., 1997.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(CAU, CAA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Tressens, S. G. 3112* (CTES)]; PRY[*Mangieri, H.R. 121* (LP)].

Inga arrabideae Steud. = **Inga affinis** DC.

Inga barbata Benth.
Sin.: *Feuilleea barbata* (Benth.) Kuntze
Referencias: Pennington, T. D., 1997.
Arbolito. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 14417* (GH)].

Inga brachystachya DC. = **Abarema brachystachya** (DC.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Inga brevituba T.S. Elias = **Inga saltensis** Burkart

Inga calycina Benth. = **Inga sessilis** (Vell.) Mart.

Inga canminensis Rusby = **Inga striata** Benth.

Inga cataractae Kunth = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Inga catharinae Benth. = **Inga striata** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.

Inga cauliflora Willd. = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **communis** Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Inga comosa (Benth.) F. Muell. = **Inga globularis** T.D. Penn.

Inga conferta Benth. = **Inga edulis** Mart.

Inga dulces Mart., nom. illeg. = **Inga affinis** DC.

Inga dulcis (Vell.) Mart. = **Inga striata** Benth.

Inga edulis Mart.
Sin.: *Feuilleea conferta* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea scabriuscula* (Benth.) Kuntze, *Inga conferta* Benth., *Inga edulis* Mart. var. *parviflora* Benth., *Inga scabriuscula* Benth., *Inga scabriuscula* Benth. var. *villosior* Benth., *Inga uncinata* Spruce ex Benth., *Inga vera* Kunth, hom. illeg., *Mimosa inga* Vell.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1990; Pennington, T. D., 1997.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7658* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1166* (SI)].

Inga edulis Mart. var. *parviflora* Benth. = **Inga edulis** Mart.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Inga edwallii (Harms) T.D. Penn.
Sin.: *Affonsea dusenii* Harms, *Affonsea edwallii* Harms, *Affonsea hirsuta* Harms, *Affonsea schwebeliana* Harms
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.
Arbolito. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 17233* (F, GH, K, MO)].

Inga eriantha Benth. = **Inga subnuda** Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.

Inga exelsa Poepp. = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. = **Inga marginata** Willd.

Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. f. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Hoc, P. S., 1994.

Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl. = **Inga marginata** Willd.

Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. var. *intermedia* Hassl. = **Inga marginata** Willd.

Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. var. *marginata* (Willd.) Hassl. = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Hoc, P. S., 1994.

Inga globularis T.D. Penn.
Sin.: *Affonsea comosa* Benth., *Affonsea juglandifolia* A. St.-Hil., *Inga comosa* (Benth.) F. Muell., *Inga juglandifolia* (A. St.-Hil.) F. Muell., hom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.
Arbolito. Nativa. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 1404* (HBR, SI)].

Inga glomerata DC. = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Inga guayaquilensis G. Don = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Inga guillemianiana Benth. = **Inga vulpina** Mart. ex Benth.

Inga harrisii Lindl. = **Calliandra harrisii** (Lindl.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998.

Inga heterophylla Willd.
Sin.: *Feuilleea heterophylla* (Willd.) Kuntze, *Inga mapirensis* Pittier, *Inga protracta* Steud., *Inga stenocarpa* Spruce ex Benth., nom. nud., *Inga umbellata* G. Don, *Inga vouapaefolia* Spruce ex Benth., nom. nud., *Mimosa heterophylla* (Willd.) Roxb., *Mimosa parae* Poir.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.
Árbol. Nativa. 0–1600 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18615* (GH, HBR, K, SI)].

Inga juglandifolia (A. St.-Hil.) F. Muell., hom. illeg. = **Inga globularis** T.D. Penn.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Inga laurina (Sw.) Willd.
Sin.: *Feuilleea laurina* (Sw.) Kuntze, *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga tetraphylla* (Vell.) Mart., p.p., *Mimosa fagifolia* L., *Mimosa laurina* Sw., *Mimosa tetraphyla* Vell.
Referencias: Hoc, P. S., 1990, 1994, 2005; Pennington, T. D., 1997; Sousa Sánchez, M., 1993.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Quarín, C. L. 2773* (CTES)]; PRY[*Soejarto 15166* (K)].

Inga lentiscifolia Benth.
Sin.: *Feuilleea lentiscifolia* (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997; Rambo, B., 1966.
Árbol. Endémica. 800–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 2758* (SI)].

Inga leptostachya Spruce ex Benth. = **Inga marginata** Willd.

Inga luschnathiana Benth. = **Inga subnuda** Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Inga mapirensis Pittier = **Inga heterophylla** Willd.

Inga marginata Willd.
Sin.: *Feuilleea marginata* (Willd.) Kuntze, *Inga exelsa* Poepp., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. f. *pedicellaris* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *intermedia* Hassl., *Inga fagifolia* (L.) Willd. ex Benth. var. *marginata* (Willd.) Hassl., *Inga guayaquilensis* G. Don, *Inga leptostachya* Spruce ex Benth., *Inga marginata* Willd. var. *itayensis* J.F. Macbr., *Inga microcoma* Harms, *Inga odorata* G. Don, *Inga puberula* Benth., *Inga pycnostachya* Benth., *Inga sapida* Kunth, *Inga semialata* (Vell.) Mart., *Inga semialata* (Vell.) Mart. var. *latifolia* Benth., *Inga tysonii* T.S. Elias, *Mimosa semialata* Vell.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1990, 1994, 2005; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sousa Sánchez, M., 1993; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 0–700 m.
Países: ARG(COS, JUJ, MIS, SAL); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6641* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13130* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 4761* (SI)].

Inga marginata Willd. var. *itayensis* J.F. Macbr. = **Inga marginata** Willd.

[Inga maritima Benth.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Inga microcoma Harms = **Inga marginata** Willd.

Inga nuda Salzm. ex Benth. = **Inga striata** Benth.

Inga nuda Salzm. ex Benth. var. *longiflora* Benth. = **Inga striata** Benth.

Inga odorata G. Don = **Inga marginata** Willd.

Inga parvifolia Hook. f. & Arn. = **Calliandra parvifolia** (Hook. f. & Arn.) Speg.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Spegazzini, C. L., 1926.

Inga pithecolobioides Harms ex Kuntze = **Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Inga protracta Steud. = **Inga heterophylla** Willd.

Inga puberula Benth. = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Inga pulcherrima Cerv. ex Sweet, nom. nud. = **Calliandra tweedii** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Hoc, P. S., 1992a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Inga pulcherrima Sweet ex Paxton = **Calliandra tweedii** Benth.

Inga pycnostachya Benth. = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Inga ramiflora G. Don = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Inga ramiflora Steud., hom. illeg. = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **lasiopus** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Inga saltensis Burkart
Sin.: *Inga brevituba* T.S. Elias
Referencias: Burkart, A., 1952a; Hoc, P. S., 1990; Pennington, T. D., 1997.
Árbol. Nativa. 700–2200 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 29858* (SI)].

Inga salzmanniana Benth. = **Inga striata** Benth.

Inga sapida Kunth = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Inga scabriuscula Benth. = **Inga edulis** Mart.

Inga scabriuscula Benth. var. *villosior* Benth. = **Inga edulis** Mart.

Inga sellowiana Benth.
Sin.: *Feuilleea selloana* (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Arbusto o arbolito. Nativa. 0–900 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3049* (HBR, SI)].

Inga semialata (Vell.) Mart. = **Inga marginata** Willd.

Inga semialata (Vell.) Mart. var. *latifolia* Benth. = **Inga marginata** Willd.

Inga sessilis (Vell.) Mart.
Sin.: *Feuilleea sessilis* (Vell.) Kuntze, *Inga calycina* Benth., *Mimosa sessilis* Vell.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997; Rambo, B., 1966.
Árbol. Nativa. 0–1800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sehnem, A. 2683* (SI)].

Inga stenocarpa Spruce ex Benth., nom. nud. = **Inga heterophylla** Willd.

Inga striata Benth.
Sin.: *Feuilleea catharinae* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea nuda* (Salzm. ex Benth.) Kuntze, *Feuilleea salzmanniana* (Benth.) Kuntze, *Inga canminensis* Rusby, *Inga catharinae* Benth., *Inga dulcis* (Vell.) Mart., *Inga nuda* Salzm. ex Benth., *Inga nuda* Salzm. ex Benth. var. *longiflora* Benth., *Inga salzmanniana* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10174* (HBR, SI)].

Inga subnuda Salzm. ex Benth. subsp. **luschnathiana** (Benth.) T.D. Penn.
Sin.: *Feuilleea luschnathiana* (Benth.) Kuntze, *Inga eriantha* Benth., *Inga luschnathiana* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 839* (G, K)].

Inga tetraphylla (Vell.) Mart., p.p. = **Inga laurina** (Sw.) Willd.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Inga tysonii T.S. Elias = **Inga marginata** Willd.

Inga umbellata G. Don = **Inga heterophylla** Willd.

Inga uncinata Spruce ex Benth. = **Inga edulis** Mart.

Inga uraguensis Hook. & Arn.
Sin.: *Feuilleea uruguensis* (Hook. & Arn.) Kuntze, *Inga uraguensis* Hook. & Arn. f. *tomentulosa* Chodat &

Hassl., *Inga uraguensis* Hook. & Arn. var. *parvifolia* Chodat & Hassl., *Inga vera* Willd. subsp. *uraguensis* (DC.) T.D. Penn.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1990, 1994, 2005; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Pennington, T. D., 1997; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, PAI); URY(ART, COL, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 7016* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 15587* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 12297* (BAF, G)]; URY[*Berro, M. B. 1872* (MVFA)].

Inga uraguensis Hook. & Arn. f. *tomentulosa* Chodat & Hassl. = **Inga uraguensis** Hook. & Arn.
Referencias: Hoc, P. S., 2005.

Inga uraguensis Hook. & Arn. var. *parvifolia* Chodat & Hassl. = **Inga uraguensis** Hook. & Arn.
Referencias: Hoc, P. S., 2005.

Inga velloziana Mart. = **Inga affinis** DC.

Inga vera Kunth, hom. illeg. = **Inga edulis** Mart.

Inga vera Willd. subsp. *affinis* (DC.) T.D. Penn. = **Inga affinis** DC.
Referencias: Hoc, P. S., 2005.

Inga vera Willd. subsp. *uraguensis* (DC.) T.D. Penn. = **Inga uraguensis** Hook. & Arn.
Referencias: Hoc, P. S., 2005.

Inga virescens Benth.
Sin.: *Feuilleea virescens* (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1979b; Hoc, P. S., 1990, 1994; Pennington, T. D., 1997; Rambo, B., 1966.
Arbolito. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(sin localidad).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. 22* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 2253* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 467* (G)].

Inga vouapaefolia Spruce ex Benth., nom. nud. = **Inga heterophylla** Willd.

Inga vulpina Mart. ex Benth.
Sin.: *Feuilleea guilleminiana* (Benth.) Kuntze, *Feuilleea vulpina* (Mart. ex Benth.) Kuntze, *Inga guillemianiana* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.
Arbolito. Nativa. 600–1300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 2291* (HBR, SI)].

Johnia wightii (Graham ex Wight & Arn.) Wight & Arn., hom. illeg. = **Neonotonia wightii** (Graham ex Wight & Arn.) Lackey
Referencias: Ulibarri, E. A., 1988.

Kennedia ovata Hort = **Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1970; Miotto, S. T. S., 1986.

Kennedia splendens Meisn. = **Camptosema rubicundum** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1970; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1986.

Lablab Adans.

Número de especies: 1 introducida

Lablab purpureus (L.) Sweet
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.
Hierba. Anual o perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de Referencia: URY[*Legrand, D. 4577* (MVM)].

Lablab texanus Scheele = **Galactia texana** (Scheele) A. Gray var. **texana**
Referencias: Burkart, A., 1971.

Laburnum Fabr.

Número de especies: 1 introducida

Laburnum anagyroides Medik.
Referencias: Ezcurra, C. & Brion, C. A. M., 2005.
Árbol. Introducida.
Países: ARG(NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ezcurra, C. 3457* (BCRU)].

Larrea densiflora (Benth. ex A. Gray) Britton = **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert

Larrea glauca Ortega = **Hoffmannseggia glauca** (Ortega) Eifert
Referencias: Eifert, I. J., 1972.

Larrea gracilis Ruiz & Pav. = **Hoffmannseggia prostrata** Lag. ex DC.

Lathyrus L.

Número de especies: 31, 16 endémicas, 5 introducidas

Lathyrus acutifolius Vogel = **Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **pubescens**

Lathyrus andicolus Gand. = **Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **pubescens**

Lathyrus anomalus Phil. = **Vicia bijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1942d; Giangualani, R. A., 1984.

Lathyrus armitageanus Knowles & Westc. = **Lathyrus nervosus** Lam.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1952a, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lathyrus arvensis Phil. = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus berteroanus Colla ex Savi
Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *berteroanum* (Colla ex Savi) Reiche, *Lathyrus gracilis* Phil.
Referencias: Burkart, A., 1942d.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–1100 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Garaventa, A. 3203* (SI)].

Lathyrus cabrerianus Burkart
Sin.: *Lathyrus dumetorum* Burkart, hom. illeg., *Lathyrus pubescens* Clos, hom. illeg.
Referencias: Burkart, A., 1942d, 1952a; Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(NEU, RNE); CHL(VIII, IX, X, XI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Seijo, G. J. 2107* (SI)]; CHL[*Boelcke, O. 300* (SI)].

Lathyrus campestris Phil.
Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel var. *campestris* (Phil.) Reiche, *Lathyrus gracillimus* Reiche
Referencias: Burkart, A., 1942d, 1952a; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU); CHL(VII, X).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Illin, N. s.n.* (BAB)]; CHL[*Philippi, R. A. s.n.* (SGO)].

Lathyrus chilensis Steud. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus cicera L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida.
Países: CHL(V).
Notas: Citada como asilvestrada en Chile sin mencionar ejemplar de referencia (C. Marticorena & Quezada, 1985).

Lathyrus cicera L. var. *patagonica* Speg. = **Lathyrus pusillus** Elliott
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

[Lathyrus collae Martic.]
Sin.: *Lathyrus sericeus* Colla, hom. illeg.
Notas: Nombre dudoso.

Lathyrus crassipes Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Nativa. 0–100 m.
Países: CHL(VIII, X, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Behn, F. s.n.* (CONC)].

Lathyrus crassipes Phil., nom. illeg. = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus debilis Vogel = **Lathyrus subulatus** Lam.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lathyrus debilis Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus debilis Vogel var. *berteroanum* (Colla ex Savi) Reiche = **Lathyrus berteroanus** Colla ex Savi

Lathyrus debilis Vogel var. *campestris* (Phil.) Reiche = **Lathyrus campestris** Phil.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus dicirrhus Clos = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus dumetorum Burkart, hom. illeg. = **Lathyrus cabrerianus** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d, 1952a; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus dumetorum Phil. = **Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **pubescens**

Lathyrus dumetorum Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche = **Lathyrus magellanicus** Lam. var. **longipes** (Phil.) Burkart
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus ecirrhosus Phil. = **Lathyrus multiceps** Clos

Lathyrus elegans Vogel
Referencias: Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 8553* (MBM)].

Lathyrus engelmanni Bisch. = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus epetiolaris Clos = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus eurypetalus Phil. = **Lathyrus multiceps** Clos
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus gladiatus Hook. = **Lathyrus magellanicus** Lam. var. **gladiatus** (Hook.) Kuntze

Lathyrus gracilis Phil. = **Lathyrus berteroanus** Colla ex Savi
Referencias: Burkart, A., 1942d.

Lathyrus gracillimus Reiche = **Lathyrus campestris** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1942d.

Lathyrus guaraniticus Hassl. = **Lathyrus pusillus** Elliott
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus hasslerianus Burkart
Referencias: Burkart, A., 1935, 1952a; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Niederlein, G. 750* (BA), *Seijo, G. J. 2000* (SI)]; BRA[*Neubert, E. E. s.n.* (ICN)].

Lathyrus heterocirrus Phil. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus hirsutus L. var. **ecirrhosus** Schur
Referencias: Burkart, A., 1967a.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 4055* (SI)].

Lathyrus hirsutus L. var. **hirsutus**
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6686* (SI)]; URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].
Notas: Su presencia en Chile es dudosa.

Lathyrus hookeri G. Don
Sin.: *Lathyrus chilensis* Steud., *Lathyrus epetiolaris* Clos, *Lathyrus heterocirrus* Phil., *Lathyrus hookeri* G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus litoralis* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *araucanus* Phil., *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche, *Lathyrus ovalifolius* Phil., *Lathyrus philippianus* Speg., *Lathyrus pisaster* Clos, *Lathyrus roseus* Phil., *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn., *Lathyrus sessilifolius* Hook. & Arn. f. *trichocalyx* (Phil.) Burkart, *Lathyrus trichocalyx* Phil.
Referencias: Burkart, A., 1935; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, NEU, RNE, SLU); BRA(RGS); CHL(VI, VIII, RME); URY(COL, PAY, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 3081* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. s.n.* (ICN)]; CHL[*Bertero, C. L. G. 360* (TO)]; URY[*Rosengurtt, B. 2207* (MVFA)].

Lathyrus hookeri G. Don var. *trichocalyx* (Phil.) Burkart = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus japonicus Willd. var. **aleuticus** (Greene) Fernald
Sin.: *Lathyrus maritimus* (L.) Bigelow var. *aleuticus* Greene
Referencias: Burkart, A., 1942d; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–400 m.
Países: CHL(XI).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Hicken, C. M. s.n.* (SI)].

Lathyrus japonicus Willd. var. **japonicus**
Referencias: Burkart, A., 1935, 1942d; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: CHL(VIII, IX, X).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 22298* (CONC)].

Lathyrus laevigatus Arechav. = **Lathyrus latifolius** L.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus lancifolius Rchb. = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus latifolius L.
Sin.: *Lathyrus laevigatus* Arechav., *Lathyrus silvester* L. var. *latifolius* (L.) Fiori
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba o enredadera. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, LPA, MEN, NEU, RNE); URY(FLA, MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 18800* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6103* (MVFA)].

Lathyrus linearifolius Vogel
Referencias: Burkart, A., 1942d; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001; Rambo, B., 1966; Vanni, R. O., 2005.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 25973* (CTES)]; BRA[*Dutra, J. 549* (SI), *Rambo, B. 35029* (SI)].

Lathyrus litoralis Phil. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus lomanus I.M. Johnst.
Referencias: Burkart, A., 1942d.
Enredadera. Perenne. Endémica.
Países: CHL(II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Johnston, I. M. 5430* (GH, SI)].

Lathyrus longipes Phil. = **Lathyrus magellanicus** Lam. var. **longipes** (Phil.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d; Rossow, R. A., 1982a.

Lathyrus macropus Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Gómez Sosa, E. V., 1994; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MEN, SAL, SJU, SLU); CHL(V, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 822* (SI)]; CHL[*Zoellner, O. 7256* (CONC)].

Lathyrus macrostachys Vogel
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsesslifolius* Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1935, 1942d, 1952a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba o enredadera. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(PHA); URY(CLA, FLA, MAL, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 7137* (SI)]; BRA[*Rosengurtt, B. 8841* (MVFA)]; PRY[*Zardini, E. M. 40518* (AS, MO)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2410* (MVFA)].

Lathyrus magellanicus Lam. f. *longepetiolatus* Hassl. = **Lathyrus nigrivalvis** Burkart

Lathyrus magellanicus Lam. var. *araucanus* Phil. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus magellanicus Lam. var. *campestris* Dusén = **Lathyrus magellanicus** Lam. var. **glaucescens** Speg.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus magellanicus Lam. var. **gladiatus** (Hook.) Kuntze
Sin.: *Lathyrus gladiatus* Hook.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, NEU, RNE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pastore, F. 43* (SI)].

Lathyrus magellanicus Lam. var. **glaucescens** Speg.
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *campestris* Dusén, *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *oxyphylla* Speg.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(XI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Koslowsky, J. 38* (SI)]; CHL[*Rentzell, I. 6092* (SI)].

Lathyrus magellanicus Lam. var. *heterocirrus* (Phil.) Reiche = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus magellanicus Lam. var. **longipes** (Phil.) Burkart
Sin.: *Lathyrus dumetorum* Phil. var. *longipes* (Phil.) Reiche, *Lathyrus longipes* Phil.
Referencias: Burkart, A., 1942d; Rossow, R. A., 1982a, 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2400 m.
Países: ARG(NEU); CHL(VI, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 964* (SI)]; CHL[*Grandjot, G. F. 3467* (SI)].

Lathyrus magellanicus Lam. var. **magellanicus**
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1952a; Rossow, R. A., 1984c; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHU, LPA, NEU, RNE, SCR, TDF); CHL(VI, XII).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Giussani, L. M. 288* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 374* (SI), *Goodspeed, T. H. 18487* (LIL)].

Lathyrus magellanicus Lam. var. *oxyphylla* Speg. = **Lathyrus magellanicus** Lam. var. **glaucescens** Speg.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus magellanicus Lam. var. *subsessilifolius* Kuntze = **Lathyrus magellanicus** Lam. var. **magellanicus**
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus magellanicus Lam. var. *subsesslifolius* Kuntze = **Lathyrus macrostachys** Vogel
Referencias: Burkart, A., 1935, 1952a.

Lathyrus magellanicus Lam. var. **tucumanensis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2800 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, SAL, TUC); CHL(X); URY(CAS, CLA, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5439* (SI), *Venturi, S. 3599* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; URY[*Bayce, D. 22329* (MVFA)].

Lathyrus maritimus (L.) Bigelow var. *aleuticus* Greene = **Lathyrus japonicus** Willd. var. **aleuticus** (Greene) Fernald

Lathyrus missionum Hassl. = **Lathyrus subulatus** Lam.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lathyrus montevidensis Vogel = **Lathyrus pusillus** Elliott
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus multiceps Clos
Sin.: *Lathyrus ecirrhosus* Phil., *Lathyrus eurypetalus* Phil., *Lathyrus multiceps* Clos var. *normalis* Burkart, *Lathyrus multiceps* Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo, *Lathyrus setiger* Phil., *Lathyrus setiger* Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche
Referencias: Burkart, A., 1942d, 1952a; Rossow, R. A., 1982a, 1984c.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, SLU); CHL(V, VI, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Seijo, G. J. 2197* (SI)]; CHL[*Arroyo, M. T. K. 994843* (CONC), *Burkart, A. 9494* (SI)].

Lathyrus multiceps Clos var. *normalis* Burkart = **Lathyrus multiceps** Clos
Referencias: Rossow, R. A., 1982a, 1984c.

Lathyrus multiceps Clos var. *pastorei* Burkart = **Lathyrus pastorei** (Burkart) Rossow
Referencias: Rossow, R. A., 1982a; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus multiceps Clos var. *setiger* (Phil.) Acevedo = **Lathyrus multiceps** Clos
Referencias: Rossow, R. A., 1982a; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus nervosus Lam.
Sin.: *Lathyrus armitageanus* Knowles & Westc., *Lathyrus trigonus* Vogel
Referencias: Burkart, A., 1935, 1952a, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001; Rambo, B., 1966; Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, MIS, RNE, SAL, SCR); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(IX, XI, XII); URY(CAS, CLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SJO, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 1559* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13360* (LIL, SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 207* (SI)]; URY[*Osten, C. 5291* (SI), *Solis Neffa, V. 403* (CTES, LIL)].

Lathyrus nigrivalvis Burkart
Sin.: *Lathyrus magellanicus* Lam. f. *longepetiolatus* Hassl., *Lathyrus nigrivalvis* Burkart f. *puberula* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1935, 1942d, 1967a, 1987a.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.

Países: ARG(CHA, ERI, FOR, SFE); PRY(PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morello, J. 412* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 7030* (SI)].

Lathyrus nigrivalvis Burkart f. *puberula* Burkart = **Lathyrus nigrivalvis** Burkart

Lathyrus nitens Vogel
Referencias: Burkart, A., 1942d; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CLA, RNO, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Neubert, E. E. 68* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 1469pe* (MVFA, SI)].

Lathyrus ovalifolius Phil. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus paraguariensis Hassl.
Referencias: Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1612* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6252* (G)].

Lathyrus paranensis Burkart
Sin.: *Lathyrus paranensis* Burkart f. *albiflorus* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1935, 1942d, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba. Anual. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 4090* (SI)]; BRA[*Araújo, A. C. 365* (SI)]; URY[*Osten, C. 5709* (SI), *Rosengurtt, B. 411b* (MVFA)].

Lathyrus paranensis Burkart f. *albiflorus* Burkart = **Lathyrus paranensis** Burkart
Referencias: Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.

Lathyrus parodii Burkart var. **brevipetiolata** Burkart ex Izag. & Beyhaut
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 3659* (SI)]; BRA[*Dutra, J. 1516* (SI)].

Lathyrus parodii Burkart var. **parodii**
Referencias: Burkart, A., 1935, 1952a, 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS); URY(CLA, MON, RNO, RIV, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 4024* (SI)]; BRA[*Neubert, E. E. 165* (ICN)]; URY[*Brescia 16330* (MVFA)].

Lathyrus pastorei (Burkart) Rossow
Sin.: *Lathyrus multiceps* Clos var. *pastorei* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d; Rossow, R. A., 1982a, 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 2000–3000 m.
Países: ARG(NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ferreyra, M. 445* (SI)].

Lathyrus petiolaris Vogel = **Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **pubescens**
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus philippianus Speg. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus pisaster Clos = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus pubescens Clos, hom. illeg. = **Lathyrus cabrerianus** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d.

Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var. *acutifolius* (Vogel) Griseb. = **Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **monticola** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d.

Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var. **monticola** Burkart
Sin.: *Lathyrus pubescens* Hook. & Arn. var. *acutifolius* (Vogel) Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1942d.
Hierba. Perenne. Nativa. 1000–3000 m.
Países: ARG(SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer 31457* (SI)].

Lathyrus pubescens Hook. & Arn. var. **pubescens**
Sin.: *Lathyrus acutifolius* Vogel, *Lathyrus andicolus* Gand., *Lathyrus dumetorum* Phil., *Lathyrus petiolaris* Vogel, *Lathyrus purpureo-coeruleus* Knowles & Westc.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001; Rambo, B., 1966; Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHU, COR, COS, ERI, LPA, RNE, SAL, SCR, SLU, TUC); BRA(RGS, SCA); CHL(IV, V, VIII, IX, X, RME); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pozner, R. 231* (CTES, SI)]; BRA[*Dutra, J. 1513* (SI)]; CHL[*Garaventa, A. 1219* (CONC)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1666* (MVFA), *Rosengurtt, B. 2758b* (MVFA, SI)].

Lathyrus purpureo-coeruleus Knowles & Westc. = **Lathyrus pubescens** Hook. & Arn. var. **pubescens**

Lathyrus pusillus Elliott
Sin.: *Lathyrus arvensis* Phil., *Lathyrus cicera* L. var. *patagonica* Speg., *Lathyrus crassipes* Phil., nom. illeg., *Lathyrus debilis* Vogel var. *arvensis* (Phil.) Reiche, *Lathyrus dicirrhus* Clos, *Lathyrus engelmanni* Bisch., *Lathyrus guaraniticus* Hassl., *Lathyrus lancifolius* Rchb., *Lathyrus montevidensis* Vogel, *Lathyrus stipularis* J. Presl, *Lathyrus stipularis* J. Presl var. *patagonica* (Speg.) Speg.

Referencias: Burkart, A., 1942d, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001; Rambo, B., 1966; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Anual. Nativa. 0–300 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COS, ERI, LPA, MIS, NEU, RNE, SFE); BRA(RGS, SCA); CHL(X); PRY(ITA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, RNO, RIV, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 1779* (SI), *Seijo, G. J. 1962* (CTES, SI)]; BRA[*Emrich, K. 1128* (LIL), *Osten, C. 4139* (MVM)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1378* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 11396* (MVFA)].

Lathyrus roseus Phil. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus sativus L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(VI, VII, VIII); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Bobadilla 197* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 289b* (MVFA)].
Notas: Cultivada y naturalizada en Uruguay (Izaguirre & Beyhaut, 1998).

Lathyrus sericeus Colla, hom. illeg. = **Lathyrus collae** Martic.

Lathyrus sericeus Lam. = **Lathyrus tomentosus** Lam.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Burkart, A., 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus sessilifolius Hook. & Arn. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus sessilifolius Hook. & Arn. f. *trichocalyx* (Phil.) Burkart = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus setiger Phil. = **Lathyrus multiceps** Clos
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus setiger Phil. var. *eurypetalus* (Phil.) Reiche = **Lathyrus multiceps** Clos
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus silvester L. var. *latifolius* (L.) Fiori = **Lathyrus latifolius** L.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus stipularis J. Presl = **Lathyrus pusillus** Elliott
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus stipularis J. Presl var. *patagonica* (Speg.) Speg. = **Lathyrus pusillus** Elliott

Lathyrus subandinus Phil.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Matthei, O. R., Marticorena, C., Muñoz-Schick, M., Pérez, F. & Humaña, A. M., 2001[2000]; Burkart, A., 1942d; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 1500–2000 m.
Países: CHL(V, VII, VIII, IX, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Arroyo, M. T. K. 20120* (CONC), *Looser, G. 119gh* (SI)].

Lathyrus subulatus Lam.
Sin.: *Lathyrus debilis* Vogel, *Lathyrus missionum* Hassl., *Lathyrus subulatus* Lam. var. *longifolius* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1082* (SI)]; BRA[*Orth, C. 2178* (LIL)]; URY[*Herter, W. G. F. 458* (SI), *Rosengurtt, B. 93b* (LIL, MVFA)].

Lathyrus subulatus Lam. var. *longifolius* Hassl. = **Lathyrus subulatus** Lam.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lathyrus tomentosus Lam.
Sin.: *Lathyrus sericeus* Lam.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, SFE); URY(CAS, COL, MON, ROC, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pastore, A. L. 1167* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 2645* (MVM), *Osten, C. 5287* (SI), *Rosengurtt, B. 4948b* (LIL)].
Notas: Esta especie ha sido citada para Chile con base de en ejemplar con localidad desconocida (Izaguirre & Beyhaut, 1999); este registro extendería el límite occidental de la especie.

Lathyrus trichocalyx Phil. = **Lathyrus hookeri** G. Don

Lathyrus trigonus Vogel = **Lathyrus nervosus** Lam.
Referencias: Burkart, A., 1935, 1952a, 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Lathyrus tropicalandinus Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942d, 1952a.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 2500–3000 m.
Países: ARG(CAT, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schreiter, R. 6206* (SI)].

Leptoglottis leptocarpa (DC.) Standl. = **Mimosa quadrivalvis** L. var. **leptocarpa** (DC.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Leptolobium leiocarpum Vogel = **Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Macbride, J. F., 1919.

Leptolobium punctatum Benth. = **Myrocarpus frondosus** Allemão

Leucaena Benth.

Número de especies: 1 introducida

Leucaena glabrata Rose = **Leucaena leucocephala** (Lam.) de Wit subsp. **glabrata** (Rose) Zárate

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit subsp. **glabrata** (Rose) Zárate
Sin.: *Leucaena glabrata* Rose
Referencias: Ulibarri, E. A., 2004.
Arbusto o árbol. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1867* (SI)].

Leucochloron Barneby & J.W. Grimes

Número de especies: 1

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Mimosa incurialis* Vell.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.
Árbol. Nativa. 700–1500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20050* (MBM)].

Lonchocarpus Kunth

Número de especies: 9, 2 endémicas

Lonchocarpus albiflorus Hassl. = **Lonchocarpus campestris** Mart. ex Benth.
Referencias: Burkart, A., 1942a.

Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth.
Sin.: *Derris leucanthus* (Burkart) N.F. Mattos, *Lonchocarpus albiflorus* Hassl., *Lonchocarpus leucanthus* Burkart, *Lonchocarpus mollis* Benth.
Referencias: Lewis, G. P., 1987; Neubert, E. E. & Miotto, S. T. S., 2001; Tozzi, A. M. G. A., 1989.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, GUA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 585* (SI), *Rodríguez {2° serie}, F. M. 506* (BAF, SI)]; BRA[*Mattos, J. R. 21147* (IPRN), *Sehnem, A. 1502* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6228* (SI), *Stutz, L. C. 1156* (G)].

Lonchocarpus cultratus (Vell.) Tozzi & H.C. Lima
Sin.: *Pterocarpus cultratus* Vell.
Referencias: Engel Neubert, E. & Miotto, S. T. S., 1996.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 28543* (US)].

Lonchocarpus fluvialis (Lindm.) Gómez-Sosa, comb. superfl. = **Lonchocarpus fluvialis** (Lindm.) Fortunato & Palese

Lonchocarpus fluvialis (Lindm.) Fortunato & Palese
Sin.: *Coublandia fluvialis* Lindm., *Lonchocarpus fluvialis* (Lindm.) Gómez-Sosa, comb. superfl., *Muellera fluvialis* (Lindm.) Burkart, *Muellera glaziovii* auct. non (Taub.) Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1969c; Fortunato, R. H. & Palese, R., 1997; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 2331* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4125* (G)].

Lonchocarpus leucanthus Burkart = **Lonchocarpus campestris** Mart. ex Benth.

Lonchocarpus lilloi (Hassl.) Burkart
Sin.: *Lonchocarpus nitidus* (Vogel) Benth. var. *lilloi* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1942a; Gómez Sosa, E. V., 2000a.
Árbol. Endémica.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 2523* (SI)].

Lonchocarpus mollis Benth. = **Lonchocarpus campestris** Mart. ex Benth.

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.
Sin.: *Derris muehlbergianus* (Hassl.) N.F. Mattos
Referencias: Burkart, A., 1942a; Engel Neubert, E. & Miotto, S. T. S., 1996; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Rambo, B., 1966; Stutz, L. C., 1983.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. 262* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13309* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9620* (G), *Rojas, T. 2125* (SI)].

[Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. f. angustifoliolata Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth.
Sin.: *Derris nitidus* (Vogel) N.F. Mattos, *Sphinctolobium nitidum* Vogel
Referencias: Burkart, A., 1942a, 1987a; Engel Neubert, E. & Miotto, S. T. S., 1996; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, ROC, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Dematteis, M. 265* (MNES, SI), *Rodríguez, F. M. 711* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 25131* (SI)]; PRY[*Jiménez, L. 10899a* (AS, MO)]; URY[*Rosengurtt, B. 3223b* (SI)].

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. var. *lilloi* Hassl. = **Lonchocarpus lilloi** (Hassl.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942a.

Lonchocarpus nudiflorens Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969c.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON).

Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 7573* (SI)].

Lonchocarpus subglaucescens Mart. ex Benth.
Referencias: Tozzi, A. M. G. A., 1989.
Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1804* (SI)].

Lonchocarpus torrensis N.F. Mattos
Sin.: *Derris torrensis* (N.F. Mattos) N.F. Mattos
Referencias: Engel Neubert, E. & Miotto, S. T. S., 1996; Mattos, J. R., 1988.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Camargo, O. 1140* (HAS, IPRN)].

Lophocarpinia Burkart

Número de especies: 1 endémica

Lophocarpinia aculeatifolia (Burkart) Burkart
Sin.: *Cenostigma aculeatifolium* Burkart
Referencias: Burkart, A., 1944b, 1957b; Ulibarri, E. A., 1997a.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SAL); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 20216* (SI)]; PRY[*Arenas, P. 1729* (SI)].

Lotodes azureum (Phil.) Kuntze = **Dalea azurea** (Phil.) Reiche

Lotodes glandulosum (L.) Kuntze = **Otholobium glandulosum** (L.) J.W. Grimes
Referencias: Grimes, J. W., 1990.

Lotodes repens (L.) Kuntze = **Trifolium repens** L.

Lotus L.

Número de especies: 7, 1 endémica, 6 introducidas

Lotus angustissimus L.
Sin.: *Lotus gracilis* Waldst. & Kit. ex Willd.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(DUR, TYT).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Seiffert, N. 7930* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 6729b* (MVFA)].
Notas: Burkart (1987a) la señala como cultivada en Brasil.

Lotus capitellatus Clos = **Adesmia capitellata** (Clos) Hauman
Referencias: Burkart, A., 1939a; Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Lotus caucasicus Kuprian. = **Lotus corniculatus** L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lotus corniculatus L.
Sin.: *Lotus caucasicus* Kuprian., *Lotus major* Scop.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1987a; Isely, D., 1981; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, LPA); BRA(PAR, RGS, SCA); CHL(VII, VIII, IX, X, RME); URY(MON, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3649* (SI)]; BRA[*Teixeira, B. C. 8* (SI)]; CHL[*Schlegel, F. 992* (CONC)]; URY[*Cabrera, A. 32412* (SI), *Davyt, M. 24992* (MVFA)].

Lotus corniculatus L. var. *tenuifolius* L. = **Lotus glaber** Mill.
Referencias: Burkart, A., 1952a.

Lotus glaber Mill.
Sin.: *Lotus corniculatus* L. var. *tenuifolius* L., *Lotus tenuifolius* (L.) Rchb., *Lotus tenuis* Waldst. & Kit. ex Willd.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1999; Polhill, R. M., 1994; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, LPA); CHL(V, VIII, IX, X, RME); URY(MON, ROC, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Montes, L. 159* (LP)]; CHL[*Schlegel, F. 410* (CONC)]; URY[*Davyt, M. 24944* (MVFA)].

Lotus gracilis Waldst. & Kit. ex Willd. = **Lotus angustissimus** L.
Referencias: Heyn, C. C., 1970; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lotus hispidus Desf. ex DC. = **Lotus suaveolens** Pers.

Lotus major Scop. = **Lotus corniculatus** L.
Referencias: Isely, D., 1981.

Lotus maritimus Vell., hom. illeg. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Lotus ornithopodioides L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(MON, SOR).
Ejemplares de Referencia: URY[*Rosengurtt, B. 6057* (MVFA)].

Lotus palustris Vell., nom. illeg. = **Sesbania exasperata** Kunth

Lotus pedunculatus Cav.
Sin.: *Lotus uliginosus* Schkuhr
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Polhill, R. M., 1994; Sánchez, M. I., 1984.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, ERI, NEU, RNE, TDF); CHL(VII, VIII, IX, X, XI); URY(MON, TAC).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Ulibarri, E. A. 1139* (SI)]; CHL[*Cabrera, A. 3687* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5925* (MVFA)].

Lotus suaveolens Pers.
Sin.: *Lotus hispidus* Desf. ex DC., *Lotus subbiflorus* auct. non Lag.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Heyn, C. C., 1970; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(RGS); URY(CLA, DUR, FLA, MAL, MON, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Galli 281* (SI)]; BRA[*Burkart, A. 25137* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11790* (MVFA)].

Lotus subbiflorus auct. non Lag. = **Lotus suaveolens** Pers.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lotus subpinnatus Lag.
Referencias: Arroyo, M. T. K., Marticorena, C., Matthei, O. R., Muñoz-Schick, M. & Pliscoff, P., 2002; Burkart, A., Vilchez, O. & Crisci, J., 1972.
Hierba. Anual. Endémica. 0–2300 m.
Países: CHL(II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Ricardi, M. 3950* (CONC)].

Lotus tenuifolius (L.) Rchb. = **Lotus glaber** Mill.

Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. = **Lotus glaber** Mill.

Lotus uliginosus Schkuhr = **Lotus pedunculatus** Cav.

Lucuma spinosa Molina = **Geoffraea decorticans** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Luetzelburgia Harms
Número de especies: 1

Luetzelburgia guaissara Toledo
Sin.: *Luetzelburgia reitzii* Burkart
Referencias: Rizzini, C. T. & Mattos, A., 1977.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6384* (SI)].

Luetzelburgia reitzii Burkart = **Luetzelburgia guaissara** Toledo

Lupinaster amabilis (Kunth) C. Presl = **Trifolium amabile** Kunth var. **amabile**
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Lupinaster circumdatus (Kunze) C. Presl = **Trifolium antucoense** D. Heller
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Lupinaster depauperatus (Desv.) C. Presl = **Trifolium depauperatum** Desv.

Lupinaster ochreatus (Kunze ex Steud.) C. Presl = **Trifolium chilense** Hook. & Arn.
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Lupinus L.
Número de especies: 43, 29 endémicas, 4 introducidas

Lupinus albescens Hook. & Arn.
Sin.: *Lupinus incanus* Graham, *Lupinus parodianus* C.P. Sm.
Referencias: Alonso Paz, E., 1991; Burkart, A., 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984; Planchuelo, A. M., 1978, 1984.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APA); URY(ART, COL, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 16024* (ICN)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 1802* (ICN)]; PRY[*Jiménez 7884* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 1697* (SI), *Marchesi, E. 1198* (MVFA)].

Lupinus albus L.
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(VIII, IX).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Quezada, M. 258* (CONC)].

Lupinus alivillosus C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 143* (SI)].

Lupinus amnis-churquis C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus andicola Gillies
Sin.: *Lupinus praedictus* C.P. Sm.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hawkes, J. G. 3397* (SI)].

Lupinus angustifolius L.
Sin.: *Lupinus canaliculatus* Sweet
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: ARG(ERI); CHL(VIII); URY(FLA, MAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sorarú, S. B. s.n.* (SI)]; CHL[*Quezada, M. 257* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 5877* (MVFA)].

Lupinus arboreus Sims
Sin.: *Lupinus barilochensis* C.P. Sm.
Referencias: Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R., 1999; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Planchuelo, A. M., 1984.
Arbusto. Introducida. 500–1000 m.
Países: ARG(NEU, RNE, TDF); CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Bernardello, G. 587* (CORD)]; CHL[*Gunckel, L. H. 69615* (CONC)].

Lupinus aspersus C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus attenuatus Gardner var. *guaraniticus* Hassl. = **Lupinus guaraniticus** (Hassl.) C.P. Sm.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984; Planchuelo, A. M., 1984.

Lupinus aureonitens Gillies
Sin.: *Lupinus purolanatus* C.P. Sm.
Referencias: Burkart, A., 1967a; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984; Planchuelo, A. M., 1978; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Anual o bianual. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Parodi, L. R. 13385* (SI)].

Lupinus austrorientalis C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Subarbusto. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Diers, L. 67* (SI)].

Lupinus bailettianus C.P. Sm. = **Lupinus ignobilis** C.P. Sm.

Lupinus barilochensis C.P. Sm. = **Lupinus arboreus** Sims
Referencias: Planchuelo, A. M., 1984.

Lupinus berroanus C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **berroanus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus bonplandianus C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus bracteolaris Desr. var. **bracteolaris**
Sin.: *Lupinus bracteolaris* Desr. var. *czermakii* (Micheli) Burkart, *Lupinus czermakii* Micheli
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M., 1978; Rambo, B., 1966.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, ROC, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1225* (BAF, F, GH)]; BRA[*Rosengurtt, B. 8686* (MVFA)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 492* (MVFA)].

Lupinus bracteolaris Desr. var. *czermakii* (Micheli) Burkart = **Lupinus bracteolaris** Desr. var. **bracteolaris**

Lupinus bracteolaris Desr. var. **leptophyllus** (Benth.) Benth.
Sin.: *Lupinus leptophyllus* Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(RGS); URY(MON, PAY, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Archer, W. A. 4437* (NY)]; URY[*Izaguirre, P. 21368* (MVFA)].

Lupinus bracteolaris Desr. var. **tenuifolius** (Arechav.) C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus tenuifolius* Arechav.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(CLA, TAC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2336* (MVFA)].

Lupinus brevicaulis Griseb. = **Lupinus grisebachianus** C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1980.

Lupinus buchtienii Rusby
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978; Rusby, H. H., 1934.
Hierba. Nativa. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2252* (SI)].

Lupinus burkartianus C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus amnis-churquis* C.P. Sm., *Lupinus campestri-florum* C.P. Sm., *Lupinus divorsus* C.P. Sm., *Lupinus hiulcus* C.P. Sm., *Lupinus pavorum* C.P. Sm., *Lupinus solitarius* C.P. Sm., *Lupinus venturianus* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(CAT, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sleumer, H. O. 2449* (SI)].

Lupinus cafayatensis C.P. Sm. = **Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Lupinus campestri-florum C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus canaliculatus Sweet = **Lupinus angustifolius** L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lupinus castillonanus C.P. Sm. = **Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Lupinus catamarcensis C.P. Sm. = **Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Lupinus chilensis C.P. Sm. = **Lupinus subacaulis** Griseb.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1980.

Lupinus comberanus C.P. Sm. = **Lupinus microcarpus** Sims
Referencias: Planchuelo, A. M., 1984.

Lupinus czermakii Micheli = **Lupinus bracteolaris** Desr. var. **bracteolaris**

Lupinus divorsus C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus erectifolius C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 3000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 6684* (US)].

Lupinus fischeranus C.P. Sm. = **Lupinus microcarpus** Sims

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **berroanus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Sin.: *Lupinus berroanus* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); URY(COL, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 22785* (CTES)]; URY[*Berro, M. B. 2775* (K)].

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **gibertianus**
Sin.: *Cytisus heptaphyllus* Vell., *Lupinus aspersus* C.P. Sm., *Lupinus bonplandianus* C.P. Sm., *Lupinus hassleranus* C.P. Sm., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *hilarianus* Benth., *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Lupinus hilarianus* Benth., nom. superfl., *Lupinus propedubius* C.P. Sm., *Lupinus sanctae-anae* C.P. Sm.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Dunn, D. B. & Planchuelo, A. M., 1981; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001; Planchuelo, A. M., 1996.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE, TUC); BRA(RGS, SCA); PRY(ITA, ÑEE); URY(ART, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SJO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 1128* (SI), *Zuloaga, F. O. 6564* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. 1835* (ICN)]; PRY[*Hassler, E. 1470* (G, SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1663* (MVFA)].

Lupinus gibertianus C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Sin.: *Lupinus hilarianus* Benth. var. *reineckianus* C.P. Sm., *Lupinus niederlenianus* C.P. Sm., *Lupinus palmarum* C.P. Sm., *Lupinus reineckianus* (C.P. Sm.) C.P. Sm., *Lupinus rubidus* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, MIS, SFE, TUC); BRA(RGS); URY(COL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2139* (DS, SI)]; BRA[*Reineck, E. M. 93* (BA, K)]; URY[*Bartlett, H. H. 21221* (US)].

Lupinus grisebachianus C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus brevicaulis* Griseb.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1980; Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 552* (SI)].

Lupinus guaraniticus (Hassl.) C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus attenuatus* Gardner var. *guaraniticus* Hassl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984; Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Perrone s.n.* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6165* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5681* (G, SI)].

Lupinus hassleranus C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lupinus heptaphyllus (Vell.) Hassl. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lupinus heptaphyllus (Vell.) Hassl. f. *hilarianus* Benth. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**

Lupinus heptaphyllus (Vell.) Hassl. f. *pseudolinearis* Hassl. = **Lupinus linearis** Desr.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus heptaphyllus (Vell.) Hassl. f. *typicus* Hassl., nom. inval. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**

Lupinus hieronymii C.P. Sm.
Referencias: Smith, C. P., 1943–1944.
Hierba. Endémica. 3000–4000 m.
Países: ARG(LRI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hieronymus, G. H. E. W. 645* (CORD)].

Lupinus hilarianus Benth., nom. superfl. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001.

Lupinus hilarianus Benth. var. *pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm. = **Lupinus linearis** Desr.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus hilarianus Benth. var. *reineckianus* C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus hiulcus C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus honoratus C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus lilloanus* C.P. Sm., *Lupinus monetianus* C.P. Sm., *Lupinus schreiteranus* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 1000–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, TUC).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Montiel, J. C. 57* (GH, SI, U)].

Lupinus ignobilis C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus bailettianus* C.P. Sm., *Lupinus inferior* C.P. Sm., *Lupinus resimus* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Nativa. 2000–3500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 6679* (US)].

Lupinus incanus Graham = **Lupinus albescens** Hook. & Arn.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus inferior C.P. Sm. = **Lupinus ignobilis** C.P. Sm.

Lupinus intortus C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Castillón, L. 7139* (DS)].

Lupinus jorgenseanus C.P. Sm. = **Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Lupinus jujuyensis C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 8163* (GH, K, MO, UC, US)].

Lupinus lanatus Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1989; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS, SCA); URY(ART, RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Bertoni, M. S. 638* (LIL)]; BRA[*Hatschbach, G. 3360* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1677* (MVFA)].

Lupinus leptophyllus Benth. = **Lupinus bracteolaris** Desr. var. **leptophyllus** (Benth.) Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Lupinus lilloanus C.P. Sm. = **Lupinus honoratus** C.P. Sm.

Lupinus linearis Desr.
Sin.: *Lupinus heptaphyllus* (Vell.) Hassl. f. *pseudolinearis* Hassl., *Lupinus hilarianus* Benth. var. *pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus pseudolinearis* (Hassl.) C.P. Sm.
Referencias: Alonso Paz, E., 1991; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001; Planchuelo, A. M., 1978, 1996; Rambo, B., 1966.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(ITA); URY(ART, CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, ROC, SOR, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15477* (SI, UC)]; BRA[*Rambo, B. 37880* (SI)]; PRY[*Bertoni, M. S. 4494* (LIL)]; URY[*Burkart, A. 12666* (SI)].

Lupinus magnistipulatus Planchuelo & D.B. Dunn
Sin.: *Lupinus setifolius* Planchuelo & D.B. Dunn
Referencias: Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1989.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Planchuelo, A. M. 671* (ACOR)]; BRA[*Hatschbach, G. 22845* (SI)].

Lupinus microcarpus Sims
Sin.: *Lupinus comberanus* C.P. Sm., *Lupinus fischeranus* C.P. Sm., *Lupinus verticillatus* C.P. Sm.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Planchuelo, A. M., 1984.
Hierba. Anual. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(CHU, MEN, RNE, SCR, SJU); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Soriano, A. 2360* (BAB)]; CHL[*Werdermann, E. 197* (SI)].

[Lupinus microcarpus Sims var. recurvatus (Meyen) Reiche]
Sin.: *Lupinus recurvatus* Meyen
Notas: Nombre dudoso.

Lupinus missionum (Hassl.) C.P. Sm. = **Lupinus paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus monetianus C.P. Sm. = **Lupinus honoratus** C.P. Sm.

Lupinus multiflorus Desr.
Sin.: *Lupinus multiflorus* Desr. var. *grandiflorus* Benth., *Lupinus multiflorus* Desr. var. *paucifoliolatus* Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984; Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1182* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 1825* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 6700b* (SI)].

Lupinus multiflorus Desr. var. *grandiflorus* Benth. = **Lupinus multiflorus** Desr.
Referencias: Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus multiflorus Desr. var. *paucifoliolatus* Benth. = **Lupinus multiflorus** Desr.
Referencias: Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus niederlenianus C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus opertospicus C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 2500–3000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Budin, E. 11793* (DS, LIL, SI)].

Lupinus oreophilus Greene, nom. illeg. = **Lupinus oreophilus** Phil.

Lupinus oreophilus Phil.
Sin.: *Lupinus oreophilus* Greene, nom. illeg.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Perenne. Endémica. 2700–4400 m.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Schlegel, F. 4774* (CONC)].

Lupinus palmarum C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl.
Sin.: *Lupinus missionum* (Hassl.) C.P. Sm., *Lupinus paraguariensis* Chodat & Hassl. var. *missionum* Hassl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984; Planchuelo, A. M., 1978; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAU, COA, SPE); URY(PAY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29362* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2821* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 4430* (NY)]; URY[*Del Puerto, O. 10464* (MVFA)].

Lupinus paraguariensis Chodat & Hassl. var. *missionum* Hassl. = **Lupinus paraguariensis** Chodat & Hassl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus paranensis C.P. Sm.
Referencias: Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001.
Subarbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 7795* (BM, S)].

Lupinus parodianus C.P. Sm. = **Lupinus albescens** Hook. & Arn.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus pavorum C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus polyphyllus Lindl.
Referencias: Dunn, D. B., 1965; Planchuelo, A. M., 1984.
Hierba. Perenne. Introducida. 500–1500 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, TDF); CHL(X).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Dawson, G. 1347* (BAB)].
Notas: Citada para Chile sin indicar ejemplar de referencia (Planchuelo, 1984).

Lupinus praedictus C.P. Sm. = **Lupinus andicola** Gillies

Lupinus propedubius C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus pseudolinearis (Hassl.) C.P. Sm. = **Lupinus linearis** Desr.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus purolanatus C.P. Sm. = **Lupinus aureonitens** Gillies
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.

Lupinus recurvatus Meyen = **Lupinus microcarpus** Sims var. **recurvatus** (Meyen) Reiche

Lupinus reineckianus (C.P. Sm.) C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus reitzii Burkart ex Pinheiro & Miotto
Referencias: Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2005.
Hierba. Bianual. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Pinheiro, M. 207* (ICN, K, MBM, MO)].

Lupinus resimus C.P. Sm. = **Lupinus ignobilis** C.P. Sm.

Lupinus rotundifolius Sessé & Moç. = **Crotalaria incana** L.

Lupinus rubidus C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **reineckianus** (C.P. Sm.) Planchuelo & E. Fuentes
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus rubriflorus Planchuelo
Referencias: Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001; Planchuelo, A. M., 1996.
Hierba. Bianual. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Burkart, A. 25122* (SI)].

Lupinus sanctae-anae C.P. Sm. = **Lupinus gibertianus** C.P. Sm. var. **gibertianus**
Referencias: Planchuelo, A. M. & Fuentes, E., 2001.

Lupinus schreiteranus C.P. Sm. = **Lupinus honoratus** C.P. Sm.

Lupinus sellowianus Harms
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1984.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 23381* (CTES)]; BRA[*Hatschbach, G. 22575* (SI)].

Lupinus setifolius Planchuelo & D.B. Dunn = **Lupinus magnistipulatus** Planchuelo & D.B. Dunn
Referencias: Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001.

Lupinus sierra-zentae C.P. Sm. = **Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Lupinus solitarius C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus subacaulis Griseb.
Sin.: *Lupinus chilensis* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1980; Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 3000–4500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 8619* (SI)]; CHL[*Martin 283* (UC)].

Lupinus subinflatus C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M. & Dunn, D. B., 1980; Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 2500–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC); CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 240* (SI)]; CHL[*Marticorena, C. 180* (CONC)].

Lupinus tafiensis C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Hierba. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Castillón, L. 2016* (DS)].

Lupinus tarapacensis C.P. Sm.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Nativa.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 1052a* (GH, MO)].

Lupinus tenuifolius Arechav. = **Lupinus bracteolaris** Desr. var. **tenuifolius** (Arechav.) C.P. Sm.

Lupinus tilcanicus C.P. Sm. = **Lupinus umidicola** C.P. Sm.

Lupinus tomentosus DC.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978.
Arbusto. Nativa. 2500–3500 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*West 6331* (GH, MO, UC)].

Lupinus tucumanensis C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978; Smith, C. P., 1943–1944.
Hierba. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(LRI, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 407* (CTES, DS, GH, LIL)].

Lupinus uleanus C.P. Sm.
Referencias: Maciel, H. S. & Schifino-Wittmann, M. T., 2002; Pinheiro, M. & Miotto, S. T. S., 2001.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Miotto, S. T. 1848* (ICN)].

Lupinus ultramontanus C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978; Smith, C. P., 1943–1944.
Subarbusto. Endémica. 2500–3500 m.
Países: ARG(CAT, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schickendantz, F. 106* (CORD)].

Lupinus umidicola C.P. Sm.
Sin.: *Lupinus cafayatensis* C.P. Sm., *Lupinus castillonanus* C.P. Sm., *Lupinus catamarcensis* C.P. Sm., *Lupinus jorgenseanus* C.P. Sm., *Lupinus sierra-zentae* C.P. Sm., *Lupinus tilcanicus* C.P. Sm.
Referencias: Planchuelo, A. M., 1978; Smith, C. P., 1943–1944.
Hierba. Endémica. 1000–3500 m.
Países: ARG(CAT, COS, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7635* (BAB)].

Lupinus venturianus C.P. Sm. = **Lupinus burkartianus** C.P. Sm.

Lupinus verticillatus C.P. Sm. = **Lupinus microcarpus** Sims
Referencias: Planchuelo, A. M., 1984.

Lupinus werdermannianus C.P. Sm.
Referencias: Smith, C. P., 1940.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 1052b* (MO)].

Lysiloma marchiana Griseb. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.
Referencias: Hernández, H. M., 1989.

Lysiloma polyphylla (Clos) Benth. = **Acacia visco** Lorentz ex Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Machaerium Pers.

Número de especies: 15

Machaerium aculeatum Raddi
Referencias: Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Lewis, G. P., 1987; Tamayo, F., 1945.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(AMA, CAN, GUA, PAI, SPE).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 2790* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 44892* (CTES)].

Machaerium acutifolium Vogel
Sin.: *Machaerium acutifolium* Benth. var. *muticum* (Benth.) Benth., *Machaerium muticum* Benth.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Lewis, G. P., 1987; Tamayo, F., 1945.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR); PRY(AMA, CAN, CEN, CON, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Parodi, L. R. 4432* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 6537* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 12276* (SI)].

Machaerium acutifolium Benth. var. *muticum* (Benth.) Benth. = **Machaerium acutifolium** Vogel

Machaerium angustifolium Vogel = **Machaerium hirtum** (Vell.) Stellfeld

Machaerium angustifolium Vogel f. *glauca* Chodat & Hassl. = **Machaerium hirtum** (Vell.) Stellfeld

Machaerium brasiliense Vogel
Sin.: *Machaerium ciliatum* Benth., *Machaerium luschnathianum* J. Presl
Referencias: Burkart, A., 1952a; Lewis, G. P., 1987.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kermes, E. s.n.* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 12210* (SI)].

Machaerium ciliatum Benth. = **Machaerium brasiliense** Vogel
Referencias: Burkart, A., 1952a.

Machaerium dimorphandrum Hoehne
Referencias: Camargo, R. A., 2005.
Arbusto o liana. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2230* (SI)].

Machaerium eriocarpum Benth.
Sin.: *Machaerium eriocarpum* Benth. f. *mucronulata* Chodat & Hassl., *Machaerium eriocarpum* Benth. f. *tomentella* Chodat & Hassl.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CEN, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 7817* (SI)].

Machaerium eriocarpum Benth. f. *mucronulata* Chodat & Hassl. = **Machaerium eriocarpum** Benth.

Machaerium eriocarpum Benth. f. *tomentella* Chodat & Hassl. = **Machaerium eriocarpum** Benth.

Machaerium fertile Griseb. = **Tipuana tipu** (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Machaerium glabrum Vogel
Referencias: Rambo, B., 1966.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 41314* (PACA)].

Machaerium hatschbachii Rudd
Referencias: Camargo, R. A., 2005.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 2652* (SI)].

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
Sin.: *Machaerium angustifolium* Vogel, *Machaerium angustifolium* Vogel f. *glauca* Chodat & Hassl., *Nissolia hirta* Vell.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Camargo, R. A., 2005; Rudd, V. E., 1977, 1987; Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, AMA, CAN, CON, GUA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. 807* (SI)]; BRA[*Camargo, R. A. 238* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 13698* (SI)].

Machaerium luschnathianum J. Presl = **Machaerium brasiliense** Vogel
Referencias: Burkart, A., 1952a.

Machaerium minutiflorum Tul. = **Machaerium stipitatum** (DC.) Vogel
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Machaerium muticum Benth. = **Machaerium acutifolium** Vogel

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.
Sin.: *Nissolia nyctitans* Vell.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Camargo, R. A., 2005; Lewis, G. P., 1987.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rial Alberti, F. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16653* (SI)].

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. var. *scleroxylon* (Tul.) Hassl. = **Machaerium scleroxylon** Tul.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Machaerium paraguariense Hassl.
Sin.: *Machaerium paraguariense* Hassl. var. *cuspidatum* Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Camargo, R. A., 2005; Ortega Torres, E., Stutz de Ortega, L. & Spichiger, R., 1989; Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998; Tressens, S. G., 1981.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CEN, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15183* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 11010* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3133* (SI)].

Machaerium paraguariense Hassl. var. *cuspidatum* Hassl. = **Machaerium paraguariense** Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a.

Machaerium scleroxylon Tul.
Sin.: *Machaerium nyctitans* (Vell.) Benth. var. *scleroxylon* (Tul.) Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 7945* (G)].

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel
Sin.: *Machaerium minutiflorum* Tul., *Nissolia stipitata* DC.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Camargo, R. A., 2005; Ortega Torres, E., Stutz de Ortega, L. & Spichiger, R., 1989; Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14724* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 16540* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 5901* (SI)].

Machaerium tipu Benth. = **Tipuana tipu** (Benth.) Kuntze
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Machaerium uncinatum (Vell.) Benth.
Sin.: *Nissolia uncinata* Vell.
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998.
Arbusto o liana. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 19430* (SI)].

Machaerium vestitum Vogel
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 16937* (SI)].

Machaerium villosum Vogel
Referencias: Sartori, A. L. B., Bagnatori, A. L. & Tozzi, A. M. G. A., 1998.
Árbol. Nativa.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hoehne, F. C. s.n.* (NY)].

Macromiscus brasiliensis Turcz. = **Aeschynomene montevidensis** Vogel

Macroptilium (Benth.) Urb.
Número de especies: 14, 3 endémicas

Macroptilium arenarium (Bacigalupo) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Sin.: *Macroptilium prostratum* (Benth.) Urb. var. *arenarium* Bacigalupo
Referencias: Burkart, A., 1987a; Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995b.
Hierba. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3258* (SI)].

Macroptilium atropurpureum (Moq. & Sessé ex DC.) Urb.
Sin.: *Phaseolus atropurpureus* Moq. & Sessé ex DC.
Referencias: Moreira, J. L. A., 1997.
Hierba o enredadera. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Ribas, O. S. 292* (C)].

Macroptilium brachycalix (Hassl.) Maréchal & Baudet = **Macroptilium sabaraense** (Hoehne) V.P. Barbosa
Referencias: Barbosa, V. P., 1987.

Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet
Sin.: *Phaseolus bracteatus* Nees & Mart., *Phaseolus bracteatus* Nees & Mart. f. *panduriformis* Hassl., *Phaseolus bracteatus* Nees & Mart. f. *rhomboidalis* Hassl., *Phaseolus decipiens* Salzm. ex Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995, 2001; Maréchal, R. J. J. M. & Baudet, J., 1977; Moreira, J. L. A., 1997.
Enredadera. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CEN, CON, COA, PAI, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Drewes, S. I. 501* (BAFC)]; BRA[*Gaudens, E. G. s.n.* (UEC)]; PRY[*Bordas, E. 1008* (CTES)].

Macroptilium chacoensis (Hassl.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Sin.: *Phaseolus chacoensis* Hassl., *Phaseolus chacoensis* Hassl. f. *elatus* Hassl.
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1991.
Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1220* (G)].

Macroptilium erythroloma (Mart. ex Benth.) Urb.
Sin.: *Phaseolus erythroloma* Mart. ex Benth., *Phaseolus monophyllus* Benth. var. *rufus* (Micheli) Hassl., *Phaseolus rubidus* Piper, *Phaseolus rufus* Micheli, hom. illeg.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Burkart, A., 1987a; Drewes, S. I., 1995, 2001; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978; Moreira, J. L. A., 1997; Urban, I., 1928.
Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI, PHA, SPE); URY(RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Palacios, R. A. 1290* (BAFC)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 13604* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9355* (SI, W)]; URY[*Berro, M. B. 2782* (MVFA)].

Macroptilium fraternum (Piper) Juárez
Sin.: *Phaseolus fraternus* Piper, *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. var. *tuberosus* Hicken
Referencias: Drewes, S. I., 1995.
Hierba. Nativa. 500–2800 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 3630* (SI)].

Macroptilium geophilum (Burkart) Debouck, Juárez & Pérez = **Macroptilium panduratum** (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a.

Macroptilium heterophyllum auct. non (Willd.) Maréchal & Baudet = **Macroptilium panduratum** (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a.

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.
Sin.: *Lotus maritimus* Vell., hom. illeg., *Phaseolus crotalarioides* Mart. ex Benth., *Phaseolus hastifolius* Mart. ex Benth., *Phaseolus lathyroides* L., *Phaseolus lathyroides* L. f. *chacoensis* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *reapandus* Hassl., *Phaseolus lathyroides* L. f. *typicus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus lathyroides* L. var. *genuinus* Hassl., nom. inval., *Phaseolus lathyroides* L. var. *semierectus* (L.) Hassl., *Phaseolus maritimus* (Vell.) Benth., *Phaseolus psoraleoides* Wight & Arn., *Phaseolus semierectus* L., *Phaseolus semierectus* L. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *nanus* Benth., *Phaseolus semierectus* L. var. *subhastatus* Benth., *Phaseolus strictus* Braun & Bouché
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995, 2001; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978; Urban, I., 1928.
Hierba. Anual. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CAA, CEN, ITA, ÑEE, PHA); URY(ART).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2366* (BAB, SI)]; BRA[*Longhi-Wagner, H. M. 57* (ICN)]; PRY[*Rojas, T. 12652* (LIL, SI)]; URY[*Del Puerto, O. 23360* (MVFA)].

Macroptilium longepedunculatum (Mart. ex Benth.) Urb.
Sin.: *Phaseolus longepedunculatus* Mart. ex Benth., *Phaseolus longepedunculatus* Mart. ex Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus longepedunculatus* Mart. ex Benth. var. *latifolius* Benth., *Phaseolus longepedunculatus* Mart. ex Benth. var. *subcoriaceus* Benth.
Referencias: Drewes, S. I., 1995, 2001; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978; Urban, I., 1928.
Enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2759* (BAB, SI)]; PRY[*Rojas, T. 8566* (SI)].
Notas: G. P. Lewis (1987) y Barboza (1987) consideran a esta especie sinónimo de *Macroptilium gracile*.

Macroptilium martii (Benth.) Maréchal & Baudet
Sin.: *Phaseolus martii* Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987.
Hierba o enredadera. Nativa. 0–600 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 11002* (SI)].

Macroptilium monophyllum (Benth.) Maréchal & Baudet
Sin.: *Phaseolus monophyllum* Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Maréchal, R. J. J. M. & Baudet, J., 1977; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.
Hierba. Nativa. 0–1100 m.
Países: BRA(RGS); PRY(AMA, CAU, CAN, GUA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Isabelle, M. 433* (P)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6254* (SI), *Hassler, E. 9248* (G, K)].

Macroptilium panduratum (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet
Sin.: *Macroptilium geophilum* (Burkart) Debouck, Juárez & Pérez, *Macroptilium heterophyllum* auct. non (Willd.) Maréchal & Baudet, *Phaseolus geophilus* Burkart, *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth., *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. f. *eupanduratus* Hassl., nom. inval.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a; Drewes, S. I., 1995, 2001; Maréchal, R. J. J. M. & Baudet, J., 1977.
Hierba. Perenne. Nativa. 200–700 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, CEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 34674* (SI)]; PRY[*Vanni, R. O. 2278* (CTES)].

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.
Sin.: *Phaseolus prostratus* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *hirsutus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *linearifoliolatus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *macrophyllus* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. f. *pseudo-ovatifolius* Hassl., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *angustifolius* Benth., *Phaseolus prostratus* Benth. var. *ovatifolius* Benth.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Burkart, A., 1987a; Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995b; Drewes, S. I., 1995, 2001; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Marechal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, MIS, SAL, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, COA, MIE, PAI, PHA); URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Palacios, R. A. 1291* (BAFC)]; BRA[*Rambo, B. 8561* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 6209* (SI)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 3388* (SI)].

Macroptilium prostratum (Benth.) Urb. var. *arenarium* Bacigalupo = **Macroptilium arenarium** (Bacigalupo) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a, b.

Macroptilium psammodes (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Sin.: *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. f. *ovatifolius* Hassl., *Phaseolus panduratus* Mart. ex Benth. f. *psammodes* (Lindm.) Hassl., *Phaseolus psammodes* Lindm.
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1994, 1995b; Drewes, S. I., 1995, 2001; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(CAU, CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI); URY(ART, CAS, MAL, MON, RIV, ROC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Clos, E. C. 1913* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. 28459* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 7677* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 967* (SI)].

Macroptilium sabaraense (Hoehne) V.P. Barbosa
Sin.: *Macroptilium brachycalix* (Hassl.) Maréchal & Baudet, *Phaseolus brachycalix* Hassl., *Phaseolus sabaraensis* Hoehne
Referencias: Barbosa, V. P., 1987.
Hierba o enredadera. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4168* (G)].

Malocchia ensiformis (L.) Savi = **Canavalia ensiformis** (L.) DC.
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Manganaroa furcata (Gillies ex Hook. & Arn.) Speg. = **Acacia furcatispina** Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1947; Cialdella, A. M., 1984.

Manganaroa martii (Benth.) Speg. = **Acacia martii** Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Manganaroa monacantha (Willd.) Speg. = **Acacia monacantha** Willd. f. **monacantha**
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Manganaroa paniculata (Willd.) Speg. var. *paraguayensis* Speg. = **Acacia martii** Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Manganaroa platensis (Manganaro) Speg. = **Acacia visco** Lorentz ex Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Cialdella, A. M., 1984.

Manganaroa subsericea Speg. = **Acacia visco** Lorentz ex Griseb.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Manganaroa velutina (DC.) Speg. = **Acacia velutina** DC. var. **velutina**
Referencias: Burkart, A., 1979b.

Manganaroa velutina (DC.) Speg. var. *glabrescens* Speg. = **Acacia velutina** DC. var. **monadena** Hassl.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Martia physodes Leandro = **Clitoria falcata** Lam.

Martiusia physalodes Schult. = **Clitoria falcata** Lam.

Medica lupulina (L.) Scop. = **Medicago lupulina** L.

Medica sativa (L.) Lam. = **Medicago sativa** L.

Medicago L.

Número de especies: 10 introducidas

Medicago apiculata Willd. = **Medicago polymorpha** L. var. **brevispina** (Benth.) Heyn
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a.

Medicago apiculata Willd. var. *confinis* Koch = **Medicago polymorpha** L. var. **confinis** (Koch) Ooststr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago arabica (L.) All., comb. superfl. = **Medicago arabica** (L.) Huds.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a.

Medicago arabica (L.) Huds.
Sin.: *Medicago arabica* (L.) All., comb. superfl., *Medicago denticulata* Willd. var. *brevispina* Benth., *Medicago maculata* H. Sibth., *Medicago polymorpha* L. var. *arabica* L.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1967a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lesins, K. A. & Lesins, I., 1979; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA, RNE, TDF); BRA(RGS); CHL(V); URY(CAS, COL, FLA, MAL, MON, RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2936* (SI)]; BRA[*Porto, M. L. 2227* (ICN)]; CHL[*Gunckel, L. H. 39199* (CONC)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 2914* (MVM)].

Medicago arborea Aubl., nom. illeg. = **Medicago arborea** L.

Medicago arborea L.
Sin.: *Medicago arborea* Aubl., nom. illeg.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(VII, RME); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Rodríguez Ríos, R. 765* (CONC)]; URY[*Gilbert, B. D. 8941* (MVM)].

Medicago berteriana Moris = **Medicago polymorpha** L. var. **confinis** (Koch) Ooststr.

Medicago denticulata Willd. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago denticulata Willd. var. *brevispina* Benth. = **Medicago polymorpha** L. var. **brevispina** (Benth.) Heyn
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Lesins, K. A. & Lesins, I., 1979.

Medicago denticulata Willd. var. *vulgaris* Benth. = **Medicago polymorpha** L. var. **vulgaris** (Benth.) Shinners
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a.

Medicago falcata L.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 26529* (SI)].

Medicago hispida Gaertn. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago hispida Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Burnat, comb. superfl. = **Medicago polymorpha** L. var. **brevispina** (Benth.) Heyn
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a.

Medicago hispida Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Urb. = **Medicago polymorpha** L. var. **brevispina** (Benth.) Heyn

Medicago hispida Gaertn. var. *confinis* (Koch) Asch. & Graebn., comb. superfl. = **Medicago polymorpha** L. var. **confinis** (Koch) Ooststr.

Medicago hispida Gartner var. *confinis* (Koch) Burnat = **Medicago polymorpha** L. var. **confinis** (Koch) Ooststr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago hispida Gaertn. var. *denticulata* (Willd.) Asch. & Graebn. = **Medicago polymorpha** L. var. **vulgaris** (Benth.) Shinners
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1984a.

Medicago hispida Gaertn. var. *denticulata* auct. non (Willd.) Asch. & Graebn. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a.

Medicago hispida Gaertn. var. *polymorpha* Urb. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**

Medicago intertexta (L.) Mill.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(FLA, MON).
Ejemplares de Referencia: URY[*Rosengurtt, B. 5976pe* (MVFA)].

Medicago lappacea Desr. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**

Medicago lupulina L.
Sin.: *Medica lupulina* (L.) Scop.
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1967a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, CHU, COR, COS, DFE, ERI, FOR, JUJ, LPA, LRI, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TDF, TUC); BRA(PAR, RGS); CHL(II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cialdella, A. M. 147* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 1731* (ICN)]; CHL[*Baeza, C. M. 550* (CONC)]; URY[*Rosengurtt, B. 374b* (MVFA, SI)].

Medicago maculata H. Sibth. = **Medicago arabica** (L.) Huds.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago minima (L.) Grufberg, nom. illeg. = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **minima**

Medicago minima (L.) Bartal. var. **brevispina** Benth.
Sin.: *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *pulchella* (Lowe) Fiori
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, LPA); URY(RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 23693* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 4076b* (MVFA)].

Medicago minima (L.) Bartal. var. *canescens* Ser. ex DC. = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **minima**

Medicago minima (L.) Bartal. var. **minima**
Sin.: *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *canescens* Ser. ex DC., *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *mollissima* (Spreng.) Koch, *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *recta* (Desf.) Burnat, *Medicago minima* (L.) Bartal. var. *vulgaris* Urb., *Medicago minima* (L.) Grufberg, nom. illeg., *Medicago polymorpha* L. var. *minima* L.
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Teillier A., S. & Tomé, A., 2004.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, ERI, LPA, RNE); CHL(IV, V, VI, IX, RME); URY(CAS, CLA, COL, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 30884* (SI)]; CHL[*Gunckel, L. H. 38790* (CONC)]; URY[*Izaguirre de Artuccio, P. 19043* (MVFA)].

Medicago minima (L.) Bartal. var. *mollissima* (Spreng.) Koch = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **minima**

Medicago minima (L.) Bartal. var. *pulchella* (Lowe) Fiori = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **brevispina** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago minima (L.) Bartal. var. *recta* (Desf.) Burnat = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **minima**
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Medicago minima (L.) Bartal. var. *vulgaris* Urb. = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **minima**
Referencias: Burkart, A., 1987a.

Medicago monspeliaca (L.) Trautv. = **Trigonella monspeliaca** L.

Medicago nigra (L.) Krock. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1999.

Medicago polymorpha L. var. *arabica* L. = **Medicago arabica** (L.) Huds.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1999.

Medicago polymorpha L. var. **brevispina** (Benth.) Heyn
Sin.: *Medicago apiculata* Willd., *Medicago denticulata* Willd. var. *brevispina* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Burnat, comb. superfl., *Medicago hispida* Gaertn. var. *apiculata* (Willd.) Urb.
Referencias: Burkart, A., 1967a; Fortunato, R. H., 1984a; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, RNE, SFE); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 7710* (BAB)]; URY[*Rosengurtt, B. 7766b* (MVFA)].

Medicago polymorpha L. var. **confinis** (Koch) Ooststr.
Sin.: *Medicago apiculata* Willd. var. *confinis* Koch, *Medicago berteriana* Moris, *Medicago hispida* Gaertn. var. *confinis* (Koch) Asch. & Graebn., comb. superfl., *Medicago hispida* Gartner var. *confinis* (Koch) Burnat, *Medicago tuberculata* Reiche
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lamberto, S. A., Valle, A. F., Aramayo, E. M. & Andrada, A. C., 1997.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, ERI, RNE, SCR); URY(COL, FLA, LAV, MON, RNO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 25953* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 8009* (MVM)].

Medicago polymorpha L. var. *minima* L. = **Medicago minima** (L.) Bartal. var. **minima**
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Medicago polymorpha L. var. *nigra* L. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

[Medicago polymorpha L. var. polygyra (Urb.) Shinners]
Notas: Nombre dudoso.

Medicago polymorpha L. var. **polymorpha**
Sin.: *Medicago denticulata* Willd., *Medicago hispida* Gaertn., *Medicago hispida* Gaertn. var. *denticulata* auct. non (Willd.) Asch. & Graebn., *Medicago hispida* Gaertn. var. *polymorpha* Urb., *Medicago lappacea* Desr., *Medicago nigra* (L.) Krock., *Medicago polymorpha* L. subsp. *hispida* (Gaertn.) Ponert, *Medicago polymorpha* L. var. *nigra* L., *Medicago reticulata* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, IDE, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, FLO, MAL, MON, PAY, RNO, SAO, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Del Puerto, O. s.n.* (MVFA)]; BRA[*Reitz, P. R. 1247c* (SI)]; CHL[*Hicken, C. M. 211* (SI)]; URY[*Del Puerto, O. 9811* (MVFA)].

Medicago polymorpha L. var. *scutellata* L. = **Medicago scutellata** (L.) Mill.
Referencias: Burkart, A., 1967a.

Medicago polymorpha L. var. **vulgaris** (Benth.) Shinners
Sin.: *Medicago denticulata* Willd. var. *vulgaris* Benth., *Medicago hispida* Gaertn. var. *denticulata* (Willd.) Asch. & Graebn.
Referencias: Burkart, A., 1967a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COS, ERI, LPA, RNE, SCR, SFE); BRA(RGS); CHL(V); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2909* (SI)]; BRA[*Arzivenco, L. 282* (ICN)]; CHL[*Schlegel, F. 2797* (CONC)]; URY[*Del Puerto, O. 7635* (MVFA)].

Medicago polymorpha L. subsp. *hispida* (Gaertn.) Poner = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**
Referencias: Burkart, A., 1967a; Burkart, A., 1987a.

Medicago reticulata Benth. = **Medicago polymorpha** L. var. **polymorpha**

Medicago sativa L.
Sin.: *Medica sativa* (L.) Lam., *Medicago sativa* L. f. *alba* Benke
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Gómez Sosa, E. V., 1994; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Steibel, P., 2001[2000]; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba o subarbusto. Perenne. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE, SJU, TDF); BRA(RGS, SCA); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, IJF, RME); URY(CAS, COL, MON, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 24186* (SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. 1558* (ICN)]; CHL[*Rodríguez, R. 3236* (CONC)]; URY[*Berro, M. B. 6238* (MVFA)].

Medicago sativa L. f. *alba* Benke = **Medicago sativa** L.

Medicago scutellata (L.) Mill.
Sin.: *Medicago polymorpha* L. var. *scutellata* L.
Referencias: Burkart, A., 1967a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(FLA, MON, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14800* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 5553pe* (MVFA)].

Medicago tribuloides Desr. = **Medicago truncatula** Gaertn.
Referencias: Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Lesins, K. A. & Lesins, I., 1979.

Medicago truncatula Gaertn.
Sin.: *Medicago tribuloides* Desr., *Medicago truncatula* Gaertn. subsp. *longiaculeata* (Urb.) Ponert, *Medicago truncatula* Gaertn. var. *longiaculeata* Urb.
Referencias: Burkart, A., 1937a, 1952a, 1967a, 1987a; Fortunato, R. H., 1984a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, RNE); URY(MAL, MON, RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6001* (SI)]; URY[*Lombardo, A. 4739* (MVJB, SI)].

Medicago truncatula Gaertn. var. *longiaculeata* Urb. = **Medicago truncatula** Gaertn.

Medicago truncatula Gaertn. subsp. *longiaculeata* (Urb.) Ponert = **Medicago truncatula** Gaertn.

Medicago tuberculata Reiche = **Medicago polymorpha** L. var. **confinis** (Koch) Ooststr.

Meibomia adscendens (Sw.) Kuntze = **Desmodium adscendens** (Sw.) DC.

Meibomia albiflora (Salzm.) Kuntze = **Desmodium affine** Schltdl.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia aspera (Poir.) Kuntze = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Meibomia barbata (L.) Kuntze = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Meibomia bigelovii (A. Gray) Kuntze = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray

Meibomia brevipes (Vogel) Kuntze = **Desmodium cuneatum** Hook. & Arn.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia bridgesii Schindl. = **Desmodium bridgesii** (Schindl.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Meibomia cana (J.F. Gmel.) S.F. Blake = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia cuneata (Hook. & Arn.) Hoehne = **Desmodium cuneatum** Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia distorta (Aubl.) Schindl. = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Meibomia glabra (Mill.) Kuntze = **Desmodium glabrum** (Mill.) DC.

Meibomia hassleri Schindl. = **Desmodium hassleri** (Schindl.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Meibomia humilis Schindl. = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray
Referencias: Schubert, B. G., 1940.

Meibomia incana (DC.) Vail = **Desmodium incanum** DC.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia incana (Sw.) Hoehne, nom. illeg. = **Desmodium incanum** DC.

Meibomia leiocarpa (Spreng.) Kuntze = **Desmodium leiocarpum** (Spreng.) G. Don

Meibomia lilloana Schindl. = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray
Referencias: Schubert, B. G., 1940.

Meibomia longiarticulatum Rusby = **Desmodium bridgesii** (Schindl.) Burkart

Meibomia mollis (Vahl) Kuntze = **Desmodium glabrum** (Mill.) DC.

Meibomia neo-mexicana (A. Gray) Kuntze = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray
Referencias: Schubert, B. G., 1940.

Meibomia pabularis Hoehne = **Desmodium distortum** (Aubl.) J.F. Macbr.

Meibomia pachyrrhiza (Vogel) Kuntze = **Desmodium pachyrrhizum** Vogel
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia parva Schindl. = **Desmodium neo-mexicanum** A. Gray

Meibomia polygaloides (Chodat & Hassl.) Schindl. = **Desmodium polygaloides** Chodat & Hassl.
Referencias: Vanni, R. O., 2001.

Meibomia purpurea (Mill.) Vail ex Small = **Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.

Meibomia ramosissima (Arechav.) Schindl. = **Desmodium arechavaletae** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia riedelii Schindl. = **Desmodium riedelii** (Schindl.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Meibomia subsericea (Malme) Schindl. = **Desmodium subsericeum** Malme
Referencias: Burkart, A., 1939c.

Meibomia tortuosa (Sw.) Kuntze = **Desmodium tortuosum** (Sw.) DC.

Meibomia uncinata (Jacq.) Kuntze = **Desmodium uncinatum** (Jacq.) DC.

Meibomia venosa (Vogel) Kuntze = **Desmodium venosum** Vogel
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Meibomia villosa (Mill.) Kuntze = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Melilotus Mill.

Número de especies: 4 introducidas

Melilotus albus Medik., nom. nud. = **Melilotus albus** Desr.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Melilotus albus Desr.
Sin.: *Melilotus albus* Medik., nom. nud., *Melilotus leucanthus* Koch, *Melilotus macorrhiza* auct. non Hieron., *Melilotus melanospermus* Ser., *Sertula alba* (Desv.) Kuntze
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba o subarbusto. Bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, CHU, COR, ERI, JUJ, LPA, MEN, MIS, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); CHL(I, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, RME); PRY(APY); URY(CAS, MAL, MON, PAY, RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5323* (BAB)]; BRA[*Sobral, M. 3877* (ICN)]; CHL[*Matthei, O. R. 66* (CONC)]; PRY[*Vanni, R. O. 2003* (CTES)]; URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].

Melilotus arvensis Wallr. = **Melilotus officinalis** (L.) Lam.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Melilotus indicus (L.) All.
Sin.: *Melilotus parviflorus* Desf., *Sertula indica* (L.) Kuntze, *Trifolium indicus* L.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Hierba o subarbusto. Anual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MEN, NEU, RNE, SAL, SCR, SDE, SFE, SJU, TDF, TUC); BRA(RGS); CHL(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, IDE, IJF, RME); URY(CAS, CLA, COL, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15942* (SI)]; BRA[*Freitas Xavier, E. 7* (SI)]; CHL[*Buchtien, O. s.n.* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 369b* (MVFA, SI)].

Melilotus leucanthus Koch = **Melilotus albus** Desr.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Melilotus macorrhiza auct. non Hieron. = **Melilotus albus** Desr.

Melilotus melanospermus Ser. = **Melilotus albus** Desr.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Melilotus messanensis (L.) All.
Sin.: *Melilotus siculus* (Turra) Vitman ex B.D. Jacks., *Sertula messanensis* (All.) Kuntze, *Trifolium messanense* L.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba o subarbusto. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI); URY(MON, SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Eyerdam, W. J. 23395* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2136* (SI)].

Melilotus officinalis (L.) Pall., nom. illeg. = **Melilotus officinalis** (L.) Lam.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Melilotus officinalis (L.) Lam.
Sin.: *Melilotus arvensis* Wallr., *Melilotus officinalis* (L.) Pall., nom. illeg., *Melilotus pallidus* Ser., *Sertula officinalis* (L.) Kuntze, *Trifolium officinalis* L.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005; Rossow, R. A., 1984c; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba o subarbusto. Anual o bianual. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, ERI, LPA, MEN, NEU, RNE, SCR, SFE); CHL(V, VI, XII, RME); URY(MON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6023* (SI)]; CHL[*Magens, O. s.n.* (CONC)]; URY[*Montoro Guarch, A. 2254* (SI)].

Melilotus pallidus Ser. = **Melilotus officinalis** (L.) Lam.
Referencias: Rossow, R. A., 1984c.

Melilotus parviflorus Desf. = **Melilotus indicus** (L.) All.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rossow, R. A., 1984c.

Melilotus siculus (Turra) Vitman ex B.D. Jacks. = **Melilotus messanensis** (L.) All.

Micrantheum glomeratum (L.) C. Presl = **Trifolium glomeratum** L.
Referencias: Zohary, M. & Heller, D., 1984.

Microlobius C. Presl

Número de especies: 1

Microlobius foetidus (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis** (Benth.) M. Sousa & G. Andrade
Sin.: *Goldmania paraguensis* (Benth.) Brenan, *Piptadenia paraguensis* (Benth.) Lindm., *Piptadenia quadrifolia* N.E. Br., *Pithecellobium paraguense* Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1969c; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Sousa Sánchez, M. & Andrade. G., 1992.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR); PRY(APY, CEN, CON, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1976* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 1312* (SI)].

Micropteryx crista-galli (L.) Walp. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Micropteryx fasciculata (Benth.) Walp. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Micropteryx laurifolia (Jacq.) Walp. = **Erythrina crista-galli** L. var. **crista-galli**
Referencias: Krukoff, B. A. & Barneby, R. C., 1974a.

Mimosa L.

Número de especies: 162, 101 endémicas

Mimosa acacioides Benth. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Mimosa acanthophora Harms = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa acerba auct. non Benth. = **Mimosa alleniana** Morong
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa acerba Benth. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **acerba** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa acerba Benth. var. *asperrimoides* Burkart = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa acerba Benth. var. *latifolia* Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa acerba Benth. var. *minor* Benth. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **acerba** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa acerba Benth. var. *strigosa* (Griseb.) Burkart = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa acutiflora Benth. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.) Barneby

Mimosa adenocarpa Benth. f. *inermis* Hassl. = **Mimosa iperoënsis** Hoehne var. **paradenia** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa adenocarpa Benth. f. *paraguariensis* Hassl. = **Mimosa iperoënsis** Hoehne var. **iperoënsis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa adenocarpa Benth. var. *multiglandulosa* Hassl. = **Mimosa iperoënsis** Hoehne var. **iperoënsis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa adhaerens Kunth = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa adpressa Hook. & Arn.
Sin.: *Mimosa denhardtii* L.H. Bailey, nom. superfl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(ART, CAS, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 22582* (SI)]; BRA[*Krapovickas, A. 14336* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2031-b* (F, MVFA, SI)].

Mimosa alegretense Marchiori = **Mimosa sprengelii** DC.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2002.

[Mimosa algarrobo Azara]
Referencias: Burkart, A., 1948.
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa alleniana Morong
Sin.: *Mimosa acerba* auct. non Benth., *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *decumbens* Chodat & Hassl., nom. superfl., *Mimosa hirsutissima* Mart. f. *erecta* Chodat & Hassl., *Mimosa hirsutissima* Mart. var. *pseudodistans* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5553* (G, K, NY, W)].

Mimosa altoparanensis Burkart
Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. f. *rectispina* Chodat & Hassl., *Mimosa regnellii* Benth. var. *aculeata* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1947; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Endémica. 300–400 m.
Países: PRY(APA, CAU, CAA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6107* (SI), *Hassler, E. 5745* (BM, G)].

Mimosa amambayensis Hassl. = **Mimosa monadelpha** Chodat & Hassl. var. **monadelpha**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa amambayensis Hassl. var. *glabrata* Hassl. = **Mimosa monadelpha** Chodat & Hassl. var. **glabrata** (Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa amphigena Burkart var. **amphigena**
Sin.: *Mimosa amphigena* Burkart var. *typica* Burkart, nom. inval.
Referencias: Burkart, A., 1946, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, CLA, DUR, FLO, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 8108* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 6339* (F)]; URY[*Berro, M. B. 2805* (MVFA)].

Mimosa amphigena Burkart var. **eglandulosa** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1946; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(ART, CLA, LAV, MAL, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Rosengurtt, B. 3660–b* (MVFA)].

Mimosa amphigena Burkart var. **glabrescens** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1946; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS); URY(LAV).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 26145* (SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 3615* (SI)].

Mimosa amphigena Burkart var. **inermis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1946; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(PAY, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Legrand, D. 2422* (SI)].

Mimosa amphigena Burkart var. **trachycarpoides** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1946; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(FLA, LAV, MAL, PAY, ROC, SAO).
Ejemplares de Referencia: URY[*Rosengurtt, B. 962-b* (MVFA, SI)].

Mimosa amphigena Burkart var. *typica* Burkart, nom. inval. = **Mimosa amphigena** Burkart var. **amphigena**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa angustisiliqua Lam., nom. superfl. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Mimosa angustissima Mill. = **Acacia angustissima** (Mill.) Kuntze

Mimosa aparadensis Burkart = **Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby

Mimosa apodocarpa auct. non Benth. = **Mimosa glutinosa** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa apodocarpa Benth. var. *intermedia* Hassl., hom. illeg. = **Mimosa glutinosa** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa argentinensis Burkart = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa argentinensis Burkart var. *saltensis* Burkart = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa argillicola Hassl. = **Mimosa morongii** Britton
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa argillicola Hassl. var. *intermedia* Hassl. = **Mimosa centurionis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa argillicola Hassl. subsp. *major* Hassl. = **Mimosa centurionis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa articulata Duch., nom. nud. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa asperata L. f. *armata* Hassl. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. f. *aspera* Hassl. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. f. *glabrescens* Hassl. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. f. *inermis* Hassl., hom. illeg.
= **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. f. *inermis* Lindm. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. f. *longepedunculata* Hassl.
= **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa asperata L. f. *mollis* Hassl. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

[Mimosa asperata L. f. pseudointermedia Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa asperata L. f. *pubescens* (Benth.) Hassl.
= **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperata L. var. *glabrior* Hook. & Arn.
= **Mimosa tweedieana** Barneby ex Glazier & Mackinder
Referencias: Glazier, D. & Mackinder, B. A., 1997; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa asperata L. var. *laevior* DC., nom. illeg.
= **Mimosa pigra** L. var. **pigra**

Mimosa asperata L. var. *pigra* (L.) Willd., nom. illeg.
= **Mimosa pigra** L. var. **pigra**

Mimosa asperata L. var. *scandens* Ducke = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa asperrima Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa atlantica Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 100–200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13366* (MBM, NY, P, US)].

Mimosa aureliana Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C. & Fortunato, R. H., 1987; Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 400–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 8976* (CTES)].

Mimosa australis Izag. & Beyhaut
Sin.: *Mimosa sprengelii* auct. non DC.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2002, 2003.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(ART, LAV, MAL, RIV).
Ejemplares de Referencia: URY[*Rosengurtt, B. 5072b* (MVFA, MVM, SI)].

Mimosa axillaris Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Rambo, B., 1966.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (K)].

Mimosa axillaris auct. non Benth. = **Mimosa pedersenii** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa balansae Micheli
Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *robusta* Chodat & Hassl., *Mimosa balansae* Micheli var. *rojasiana* Hassl., *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *rojasiana* (Hassl.) Barneby, *Mimosa pudica* auct. non L.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Fortunato, R. H., 1989; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Seijo, G. J., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, PHA, SPE); URY(ART, PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 28318* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 4247* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9440* (SI)]; URY[*Osten, C. 2952* (MVM)].

Mimosa balansae Micheli var. *pauperoides* Burkart
= **Mimosa pauperoides** (Burkart) Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1989; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa balansae Micheli var. *robusta* Chodat & Hassl.
= **Mimosa balansae** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa balansae Micheli var. *rojasiana* Hassl.
= **Mimosa balansae** Micheli
Referencias: Fortunato, R. H., 1989.

Mimosa balduinii Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Rambo, B., 1966.
Arbusto. Endémica. 100–1100 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 36179* (K, SI)].
Notas: Su presencia es probable en Santa Catarina, Brasil.

[Mimosa balsamica Molina]
Referencias: Burkart, A., 1948.
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa barbadetiman Vell. = **Stryphnodendron adstringens** (Mart.) Coville

Mimosa barbigera Benth. = **Mimosa hirsutissima** Mart. var. **barbigera** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa barnebiana Fortunato & Tressens
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Fortunato, R. H. & Tressens, S. G., 1989.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 15802* (BAB, CTES, G, K, LIL, MO, NY, SI)]; PRY[*Daciuk, J. 257* (CTES)].

Mimosa bathyrrhena Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 17143* (HBG, MBM, MO, NY, RB, US)].

Mimosa bellatrix Hoffmanns. ex Steud., nom. nud. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa berroi Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(LAV, RNO, RIV, SJO, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sacco, J. C. 223* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1877* (MVFA, SI), *Rosengurtt, B. 9854* (MVFA)].

Mimosa bifurca Benth. var. **bifurca**
Sin.: *Mimosa filiformis* auct. non Benth., *Mimosa hassleriana* auct. non Chodat, *Mimosa hassleriana* Chodat var. *multijuga* Hassl., *Mimosa hassleriana* Chodat var. *virgata* Hassl., *Mimosa rosariensis* Mattos
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(GUA, PAI, SPE); URY(TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 8118* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 4428* (ICN)]; PRY[*Zardini, E. M. 29015* (MO, PY)]; URY[*Rosengurtt, B. 4832-b* (MVFA)].

Mimosa bifurca Benth. var. **desmanthoides** (Hoehne) Barneby
Sin.: *Mimosa desnanthoides* Hoehne
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 200–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Eskuche, U. G. 4696* (BAB)].

Mimosa bifurca Benth. var. **hassleriana** (Chodat) Barneby
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat, *Mimosa hassleriana* Chodat f. *intermedia* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA, PAI); URY(TAC).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6280* (G, GH, K, MO, S, W)]; URY[*Bonifacino, M. 11059* (MVFA)].

Mimosa bifurca Benth. var. **reducta** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa hassleriana* Chodat var. *reducta* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10470* (F, G, GH, K)].

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze f. *micheliana* Hassl. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze f. *vepres* (Lindm.) Hassl. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. **adenocarpa** Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Seijo, G. J., 2000.
Arbusto o árbol. Endémica. 300 m.
Países: PRY(APY, AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4770* (G, GH, L, M, P)].

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Sin.: *Acacia bimucronata* DC., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *sepiaria* (Benth.) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *trichocarpa* Hassl., *Mimosa sepiaria* Benth., *Mimosa stuhlmannii* Harms, *Mimosa thyrsoides* Griseb.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948, 1979b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CEN, GUA, ITA, PAI); URY(ART, RIV, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hicken, C. M. 196* (SI)]; BRA[*Imaguirre, N. 698* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1432* (G), *Fortunato, R. H. 1056* (BAB, SI)]; URY[*Berruti 24354* (MVFA)].

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. *gymnocarpa* Hassl. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. *hexandra* (Micheli) J.F. Macbr. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var. *trichocarpa* Hassl. = **Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze subsp. *hexandra* (Micheli) Hassl. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Burkart, A., 1948.

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze subsp. *sepiaria* (Benth.) Hassl. = **Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**

Mimosa bonplandii (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Sin.: *Acacia bonplandii* Gillies ex Hook. & Arn., *Acacia lepidota* Hook. & Arn., *Mimosa bonplandii* (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. var. *minor* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI); URY(TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 29919* (SI)]; URY[*Mattos, J. R. s.n.* (PACA)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul, Brasil, sin indicar material de referencia (Barneby, 1991).

Mimosa bonplandii (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth. var. *minor* Benth. = **Mimosa bonplandii** (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa botucatuana Hoehne = **Mimosa orthacantha** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bracaatinga Hoehne = **Mimosa scabrella** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.

Mimosa bracaatinga Hoehne f. *paucijuga* Hoehne = **Mimosa scabrella** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bracaatinga Hoehne var. *aspericarpa* Hoehne = **Mimosa scabrella** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa bracteolaris Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 8582* (SI)].

[Mimosa brasiliensis Spreng.]
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Notas: Nombre dudoso. La diagnosis es deficiente y no se ha localizado el material tipo (Barneby, 1991).

Mimosa brevipes Benth.
Sin.: *Mimosa eriophylla* auct. non Benth., *Mimosa vernonioides* Hassl., nom. nud.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAA, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fortunato, R. H. 1059* (BAB)].

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **brevipetiolata**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15447* (GH, SI)].

Mimosa brevipetiolata Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pilosula* (Burkart) Barneby, *Mimosa oligophylla* auct. non Micheli, *Mimosa oligophylla* Micheli var. *pilosula* Burkart, *Mimosa petraea* Chodat & Hassl. var. *hirtula* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 100–400 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15270* (GH, SI, SI)]; PRY[*Hassler, E. 2956* (G)].

Mimosa brevipetiolata Burkart var. *pauperoides* (Burkart) Barneby = **Mimosa pauperoides** (Burkart) Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1989; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa brevipetiolata Burkart var. *pilosula* (Burkart) Barneby = **Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Mimosa brevipetiolata Burkart var. *rojasiana* (Hassl.) Barneby = **Mimosa balansae** Micheli
Referencias: Fortunato, R. H., 1989.

Mimosa burchellii auct. non Benth. = **Mimosa gracilis** Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa burkartii Marchesi
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Marchesi, E., 1987.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: URY(MAL, MON).
Ejemplares de Referencia: URY[*Marchesi, E. 18552* (MVFA)].

Mimosa caaguazüensis Barneby
Sin.: *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *macrophylla* Hassl., *Mimosa procurrens* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(CAU, COA, MIE, ÑEE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 2203* (SI), *Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)]; PRY[*Balansa, B. 1833* (G)].

Mimosa caingüensis Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: ARG(MIS); PRY(ITA, MIE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pierotti, A. 5512* (LIL), *Vanni, R. O. 3902* (CTES)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4367* (SI)].

Mimosa calistachya C. Presl = **Mimosa invisa** Mart. ex Colla var. **macrostachya** (Benth.) Barneby

Mimosa callidryas Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16841* (A, G, GH, M, NY, S)].

Mimosa callosa Benth. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **callosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa callosa Benth. var. *longiracemosa* Burkart = **Mimosa longiracemosa** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa callosa Benth. var. *microphylla* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **callosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa candelabrum Hassl.
Sin.: *Mimosa candelabrum* Hassl. var. *jörgensenii* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947.
Subarbusto. Endémica. 300–500 m.
Países: PRY(CAU, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Jörgensen, P. 4821* (A, C, S, SI)].

Mimosa candelabrum Hassl. var. *jörgensenii* Burkart = **Mimosa candelabrum** Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa canescens Willd. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa capillipes Benth. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **capillipes** (Benth.) Barneby

Mimosa capillipes Benth. var. *brevifolia* Benth. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **capillipes** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa capillipes Benth. var. *microphylla* Benth. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **capillipes** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa carinata Griseb. = **Mimozyganthus carinatus** (Griseb.) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948.

Mimosa carinata Griseb. ex Lorentz, nom. nud. = **Mimozyganthus carinatus** (Griseb.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1948.

Mimosa castanoclada Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C. & Fortunato, R. H., 1987; Barneby, R. C., 1991; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Arbusto. Nativa. 200–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Schinini, A. 14995* (CTES, NY)].

Mimosa catharinensis Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 5946* (SI)].

Mimosa cauliflora (Willd.) Poir. = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **communis** Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Mimosa caven Molina = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**
Referencias: Burkart, A., 1946; Cialdella, A. M., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa cavenia Molina = **Acacia caven** (Molina) Molina var. **caven**

Mimosa centurionis Barneby
Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl. subsp. *major* Hassl., *Mimosa argillicola* Hassl. var. *intermedia* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4001* (E, G, GH, K, M, P, W), *Rojas, T. 3045* (SI)].

Mimosa ceratonia L. var. **pseudo-obovata** (Taub.) Barneby
Sin.: *Mimosa pseudo-obovata* Taub., *Mimosa pungentissima* Ducke
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Eskuche, U. G. 5971* (BAB)].

Mimosa chacoënsis Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C. & Fortunato, R. H., 1987; Barneby, R. C., 1991; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Seijo, G. J., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–400 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Arenas, P. s.n.* (BACP, CTES, NY), *Krapovickas, A. 45480* (CTES)].

Mimosa chaetosphaera Barneby
Sin.: *Mimosa ramosissima* Benth. var. *ulei* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Ule, E. H. G. 1734* (HBG, P, SI)].

Mimosa chartostegia Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 800–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Oliveira 917* (SI)].

Mimosa chodatii Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 600–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10087* (BM, G, K)].

[Mimosa chrysastra Mart. ex Benth.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Mimosa ciliata Spreng., hom. illeg. = **Mimosa sprengelii** DC.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2002.

Mimosa ciliata Willd. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa cinerea auct. non Benth. = **Mimosa pellita** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa cinerea Benth. var. *pubescens* Benth. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa circinalis Cav., nom. illeg. = **Prosopis strombulifera** (Lam.) Benth. var. **strombulifera**
Referencias: Burkart, A., 1948.

Mimosa colubrina Vell. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **colubrina**

Mimosa conferta Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa conferta Benth. f. *brevipila* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa conferta Benth. f. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa conferta Benth. f. *longepedunculata* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa conferta Benth. f. *parvifolia* Chodat & Hassl. = **Mimosa custodis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa conferta Benth. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa conferta Benth. var. *multifoliolata* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa congestifolia Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947.
Arbusto. Endémica. 1200–1700 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Curial, O. s.n.* (HBG, RB, SI)].

Mimosa coniflora Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica. 900–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 10994* (NY, SI, US)].

Mimosa contortisiliqua Vell. = **Enterolobium contortisiliquum** (Vell.) Morong
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa cordistipula auct. non Benth. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **paraguariae**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa cordistipula Benth. var. *multiglandulosa* Hassl. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **multiglandulosa** (Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa cordistipula Benth. var. *pubescens* Hassl. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **multiglandulosa** (Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa cordistipula Benth. var. *tomentosa* Hassl. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **tomentosa** (Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa cordobensis Ariza
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 24372* (CORD)].

Mimosa coroncoro Killip & Dugand = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa crassipes Arechav. = **Mimosa incana** (Spreng.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa cruenta Benth. var. **cruenta**
Sin.: *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); URY(ART, CLA, DUR, FLO, LAV, MAL, PAY, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez {2° serie}, F. M. 426* (BAF, SI)]; BRA[*Klein, R. M. 3263* (HBR, SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 565b* (MVFA, SI)].

Mimosa cruenta Benth. var. **glabra** Burkart
Sin.: *Mimosa sanguinolenta* Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, CLA, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 49018* (ICN)]; URY[*Berro, M. B. 1507* (SI), *Legrand, C. M. D. E. 2402* (MVM, SI)].

Mimosa cubatanensis Hoehne
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Árbol. Nativa. 700–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 58529* (BAB, CTES)].

Mimosa custodis Barneby
Sin.: *Mimosa conferta* Benth. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 400–600 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10961* (A, G, NY)].

Mimosa daleoides Benth.
Sin.: *Mimosa daleoides* Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl., *Mimosa daleoides* Benth. f. *psammophila* Burkart, *Mimosa daleoides* Benth. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948, 1964c; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1100 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(DUR, LAV, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 15790* (CTES, F)]; BRA[*Rambo, B. 37692* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1425* (G)]; URY[*Millot 733* (MVFA)].

Mimosa daleoides Benth. f. *paraguariensis* Chodat & Hassl. = **Mimosa daleoides** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa daleoides Benth. f. *psammophila* Burkart = **Mimosa daleoides** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa daleoides Benth. var. *paraguariensis* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Mimosa daleoides** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Mimosa adhaerens* Kunth, *Mimosa argentinensis* Burkart, *Mimosa argentinensis* Burkart var. *saltensis* Burkart, *Mimosa debilis* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *panamensis* Benth., *Mimosa fervida* Mart., *Mimosa hostmanii* Benth., *Mimosa notata* Steud., *Mimosa obtusifolia* Willd., *Mimosa panamensis* (Benth.) Standl., *Mimosa pauciseta* Benth., *Mimosa rixosa* Mart., *Mimosa sensitiva* auct. non L.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Seijo, G. J., 2000.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAA, GUA, ITA, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5970* (SI)]; BRA[*Dusén, P. K. H. 16924* (GH)]; PRY[*Jörgensen, P. 3635* (SI), *Jörgensen, P. 4555* (SI)].

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *panamensis* Benth. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa deceptrix Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 16274* (GH, K, NY, S)].

Mimosa denhardtii L.H. Bailey, nom. superfl. = **Mimosa adpressa** Hook. & Arn.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa depressa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Luckow, N. A., 1993.

Mimosa desnanthoides Hoehne = **Mimosa bifurca** Benth. var. **desmanthoides** (Hoehne) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa detinens Benth.
Sin.: *Mimosa lorentzii* Griseb.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7582* (BAB)]; PRY[*Hahn, W. J. 1856* (SI)].

Mimosa diffusa Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (K, P)].

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle
Sin.: *Mimosa diplotricha* C. Wright ex Sauvalle var. *inermis* (Adelb.) Verdc., *Mimosa invisa* Mart. ex Colla f. *inermis* Adelb., *Mimosa invisa* Mart. ex Colla var. *echinocarpa* Chodat & Hassl., *Mimosa invisa* Mart., nom. illeg., *Mimosa ixiamensis* Rusby, *Mimosa longisiliqua* Lam., nom. inval., *Morongia pilosa* Standl., *Schrankia brachycarpa* Benth., *Schrankia pilosa* (Sternb.) J.F. Macbr.

Referencias: Barneby, R. C., 1991; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, CEN, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14774b* (SI)]; BRA[*Imaguire, N. 677* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4199* (SI)].

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle var. *inermis* (Adelb.) Verdc. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa dispersa Benth. = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa distachya Vent. = **Albizia lophantha** (Willd.) Benth.

Mimosa distans auct. non Benth. = **Mimosa oligophylla** Micheli

Mimosa distans Benth. var. **distans**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 56013* (CTES)].
Notas: Su presencia en Argentina es dudosa (cfr. Burkart 1948: 221).

Mimosa distans Benth. var. **paraguariensis** Barneby
Sin.: *Mimosa elongata* Benth. var. *paraguariensis* Hassl., nom. nud.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 300–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23118* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9224* (G, GH, K, NY, W)].

Mimosa diversipila Micheli var. **diversipila**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1964c.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 100–400 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14773* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3249* (SI)].

Mimosa diversipila Micheli var. **subglabriseta** Barneby & Fortunato
Sin.: *Mimosa setistipula* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(COS, MIS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 12094* (CTES, US)].

Mimosa dolens Vell. var. *anisitsii* Lindm. = **Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa dolens Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Sin.: *Mimosa dolens* Vell. var. *anisitsii* Lindm., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *macrophylla* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa rigidicaulis* Burkart, *Mimosa rigidicaulis* Burkart var. *ciliata* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 200–600 m.
Países: PRY(AMA, CAN, COA); URY(RIV).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5249* (G, NY, P, W)]; URY[*Brussa, C. 29518* (MVFA)].

Mimosa dolens Vell. var. **deterior** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 600–700 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10125* (G)].

Mimosa dolens Vell. var. **dolens**
Sin.: *Mimosa trachycephala* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21760* (MBM)].

Mimosa dolens Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa meticulosa* auct. non Mart., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *hirsuta* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *intermedia* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. f. *pubescens* Chodat & Hassl., *Mimosa meticulosa* Mart. var. *microphylla* Benth., nom. superfl., *Mimosa rigescens* Benth. var. *foliolosa* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CAN, COA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 8119* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 52566* (NY)]; PRY[*Hassler, E. 5228* (G)].

Mimosa dolens Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acerba* Benth. var. *asperrimoides* Burkart, *Mimosa acerba* Benth. var. *latifolia* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *strigosa* (Griseb.) Burkart, *Mimosa conferta* Benth., *Mimosa conferta* Benth. f. *brevipila* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. f. *genuina* Chodat & Hassl., nom. inval., *Mimosa conferta* Benth. f. *longepedunculata* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa conferta* Benth. var. *multifoliolata* Chodat & Hassl., *Mimosa marginata* Lindl. var. *strigosa* Griseb.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8056* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13487* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6125* (LIL, SI), *Schinini, A. 5763* (SI)]; URY[*Bayce, D. 17351* (MVFA), *Legrand, C. M. D. E. 2419* (MVM, SI)].

Mimosa dolens Vell. var. **pangloea** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 800–900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Lewis, G. P. 1391* (K, MBM, NY)].

Mimosa dolens Vell. var. **pseudorigida** Barneby
Sin.: *Mimosa rigida* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 300 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5032* (G, GH, K, NY, P)].

Mimosa dolens Vell. var. **pubescens** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa meticulosa* Mart. var. *pubescens* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); URY(RIV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 3490* (BAB, G, MO, SI)]; BRA[*Miotto, S. T. S. s.n.* (ICN)]; URY[*Izaguirre, P. s.n.* (MVFA)].

Mimosa dolens Vell. var. **rigescens** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa rigescens* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 10644* (NY)].

Mimosa dolens Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa asperrima* Benth., *Mimosa rudis* Benth., *Mimosa rudis* Benth. f. *intermedia* Hassl., *Mimosa rudis* Benth. f. *latifoliolata* Hassl., *Mimosa rudis* Benth. var. *asperrima* (Benth.) Hassl., *Mimosa rudis* Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 23446* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 36033* (BAB, CTES)].

Mimosa dolens Vell. var. **uncta** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 10049* (NY)].

Mimosa dolens Vell. subsp. **acerba** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acerba* Benth., *Mimosa acerba* Benth. var. *minor* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Subarbusto. Nativa. 700–1300 m.
Países: BRA(PAR, RGS); PRY(AMA, CAA, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13725* (SI)]; PRY[*Schinini, A. 33432* (NY)].

Mimosa dolens Vell. subsp. **callosa** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa callosa* Benth., *Mimosa callosa* Benth. var. *microphylla* Chodat & Hassl., *Mimosa setipes* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 100–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(APA, COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 1666* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13215* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 6792* (G)].

Mimosa dolens Vell. subsp. **eriophylla** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa eriophylla* Benth., *Mimosa eriophylloides* Hoehne, *Mimosa eriophylloides* Hoehne var. *lanosa* Hoehne
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 400–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 39957* (MBM)].

Mimosa dolens Vell. subsp. **rigida** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa rigida* Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Subarbusto. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 11362* (MVFA)]; BRA[*Augusto, J. 20* (MVFA, SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 1013* (MVFA)].

Mimosa dolichocephala Harms = **Mimosa strigillosa** Torr. & A. Gray
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa dolichocephala Harms var. *sabulicola* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Mimosa strigillosa** Torr. & A. Gray
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa dryandroides Taub. var. **extratropica** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 26635* (C, MBM, NY)].

Mimosa dulcis Vell. = **Inga affinis** DC.

Mimosa dutrae Malme var. **dutrae**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA); URY(MAL, ROC, SJO).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dutra, J. 557* (S, SI)]; URY[*Legrand, D. 2795* (MVM, SI)].

Mimosa dutrae Malme var. **major** Izag. & Beyhaut
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(LAV, MAL, ROC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rosengurtt, B. 9236* (MVFA)]; URY[*Rosengurtt, B. 2910–b* (MVFA, SI)].

Mimosa echinocarpa auct. non Benth. = **Mimosa morongii** Britton
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

[Mimosa elliptica Benth.]
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Mimosa elongata Benth. var. *paraguariensis* Hassl., nom. nud. = **Mimosa distans** Benth. var. **paraguariensis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa ephedroides (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Sin.: *Prosopis ephedroides* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 1100–1300 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29560* (SI)].

Mimosa equisetum Barneby
Sin.: *Mimosa heterophylla* Hassl., nom. illeg.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 400–500 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 9486* (G, K, NY, P, W)].

Mimosa eriocarpa Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964c.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (K)].

Mimosa eriophylla auct. non Benth. = **Mimosa brevipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa eriophylla Benth. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **eriophylla** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa eriophylloides Hoehne = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **eriophylla** (Benth.) Barneby

Mimosa eriophylloides Hoehne var. *lanosa* Hoehne = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **eriophylla** (Benth.) Barneby

Mimosa fachinalensis Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Subarbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 54039* (SI), *Reitz, P. R. 1550* (SI)].

Mimosa fagifolia L. = **Inga laurina** (Sw.) Willd.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Mimosa farinosa Griseb.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Arbusto. Nativa. 500–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, LRI, SAL, SDE, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pozner, R. 488* (CTES, SI)].

Mimosa farnesiana L. = **Acacia farnesiana** (L.) Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa fascifolia Rizzini = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa fernandez-casasii Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fernández Casas, F. J. 7642* (MO, NY)].

Mimosa fervida Mart. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa fiebrigii Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.
Arbusto. Endémica. 400–500 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4239* (G), *Fiebrig, K. A. G. 4476* (SI)].

Mimosa filiformis auct. non Benth. = **Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa filipetiola Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Hierba. Perenne. Endémica. 800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 10618* (NY, SI, US)].

Mimosa flagellaris Benth.
Sin.: *Mimosa flagellaris* Benth. var. *hirsuta* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); PRY(CAU, CON, COA, GUA, PAI); URY(ART, CLA, RIV, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 22997* (SI)]; BRA[*Freitas Xavier, E. 18* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 13410* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1029b* (SI), *Rosengurtt, B. 6777b* (MVFA)].

Mimosa flagellaris Benth. var. *hirsuta* Benth. = **Mimosa flagellaris** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa flocculosa Burkart
Sin.: *Mimosa incana* (Spreng.) Benth. var. *robusta* J.F. Macbr., *Mimosa incana* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1964c.
Arbusto. Nativa. 200–400 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 21117* (CTES, SI)]; PRY[*Hassler, E. 9244* (BM, G, K, P)].

Mimosa fragrans auct. non A. Gray = **Mimosa ostenii** Speg. ex Burkart

Mimosa furfuracea Benth.
Sin.: *Mimosa furfuracea* Benth. var. *catharinensis* Burkart, *Mimosa furfuracea* Benth. var. *paranaensis* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964c.
Arbusto. Nativa. 900–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 249* (SI)].

Mimosa furfuracea Benth. var. *catharinensis* Burkart = **Mimosa furfuracea** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa furfuracea Benth. var. *paranaensis* Burkart = **Mimosa furfuracea** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gilliesii Benth. = **Prosopidastrum globosum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1948; Fortunato, R. H., 1984a.

Mimosa glabra Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Rambo, B., 1966.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 2190* (PACA)].

Mimosa glanduliseta Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Arbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ekman, E. L. 1630* (MO, NY, S)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5901* (G, GH, SI)].

Mimosa glaucescens Benth., hom. illeg. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa globosa (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr. = **Prosopidastrum globosum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1964b.

Mimosa glutinosa Chodat & Hassl.
Sin.: *Mimosa apodocarpa* auct. non Benth., *Mimosa apodocarpa* Benth. var. *intermedia* Hassl., hom. illeg., *Mimosa macrostachya* Poir. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa millefoliata* Scheele var. *glaberrima* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1335* (SI)].

Mimosa glycyrrhizoides Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 15480* (HBG, MBM, P, RB, US)].

Mimosa gracilipes Harms = **Mimosa nuda** Benth. var. **gracilipes** (Harms) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilipes Harms f. *armata* Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **gracilipes** (Harms) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilipes Harms f. *inermis* Hassl., nom. superfl = **Mimosa nuda** Benth. var. **gracilipes** (Harms) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilis Benth. f. *glabrifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilis Benth. f. *hirsutissima* Hassl., nom. superfl. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilis Benth. f. *longepedunculata* Hassl. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilis Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilis Benth. var. *intermedia* Hassl. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa gracilis Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa burchellii* auct. non Benth., *Mimosa graminiformis* Chodat & Hassl., *Mimosa selloi* (Benth.) Benth. var. *leiocarpa* Burkart, *Mimosa selloi* auct. non (Benth.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–800 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(CAA, CEN, COA, GUA, ITA, MIE, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14733* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 34544* (PACA)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4309* (SI)].

Mimosa gracilis Benth. subsp. **capillipes** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa capillipes* Benth., *Mimosa capillipes* Benth. var. *brevifolia* Benth., *Mimosa capillipes* Benth. var. *microphylla* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Pierotti, A. 5340* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 13091* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9351* (SI)].

Mimosa gracilis Benth. subsp. **gracilis**
Sin.: *Mimosa gracilis* Benth. f. *glabrifolia* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa gracilis* Benth. f. *hirsutissima* Hassl., nom. superfl., *Mimosa gracilis* Benth. f. *longepedunculata* Hassl., *Mimosa gracilis* Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa gracilis* Benth. var. *intermedia* Hassl., *Mimosa serpens* Chodat & Hassl., *Mimosa serpens* Chodat & Hassl. var. *glabrifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 500–1000 m.
Países: PRY(CAU, COA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 4332* (G)].

Mimosa graminiformis Chodat & Hassl. = **Mimosa gracilis** Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa guaranitica Chodat & Hassl.
Sin.: *Mimosa guaranitica* Chodat & Hassl. f. *heterotricha* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, CEN, COA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Spegazzini, R. A. 10074* (SI)]; PRY[*Krapovickas, A. 45805* (CTES)].

Mimosa guaranitica Chodat & Hassl. f. *heterotricha* Burkart = **Mimosa guaranitica** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa guineensis Schumach. & Thonn. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.

Mimosa gymnas Barneby
Sin.: *Mimosa monticola* auct. non Dusén
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 700–1100 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 45703* (MBM, NY)].

Mimosa habbas Delile, nom. superfl. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hassleriana auct. non Chodat = **Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hassleriana Chodat = **Mimosa bifurca** Benth. var. **hassleriana** (Chodat) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hassleriana Chodat f. *intermedia* Hassl. = **Mimosa bifurca** Benth. var. **hassleriana** (Chodat) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hassleriana Chodat var. *multijuga* Hassl. = **Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hassleriana Chodat var. *reducta* Hassl. = **Mimosa bifurca** Benth. var. **reducta** (Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hassleriana Chodat var. *virgata* Hassl. = **Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hatschbachii Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 43241* (MBM, NY)].

Mimosa heterocarpa C. Presl = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa heterophylla (Willd.) Roxb. = **Inga heterophylla** Willd.

Mimosa heterophylla Hassl., nom. illeg. = **Mimosa equisetum** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hexandra Micheli
Sin.: *Mimosa acanthophora* Harms, *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze f. *micheliana* Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze f. *vepres* (Lindm.) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze subsp. *hexandra* (Micheli) Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *gymnocarpa* Hassl., *Mimosa bimucronata* (DC.) Kuntze var. *hexandra* (Micheli) J.F. Macbr., *Mimosa coroncoro* Killip & Dugand, *Mimosa fascifolia* Rizzini, *Mimosa hexandra* Micheli var. *tropica* S. Moore, *Mimosa hexandra* Micheli var. *vepres* (Lindm.) Chodat & Hassl., *Mimosa vepres* Lindm.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(FOR, MIS); PRY(APY, CEN, CON, ÑEE, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 986* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 6023* (CTES, FCQ, SI), *Pedersen, T. M. 6034* (SI)].
Notas: Citada para Rio Grande do Sul (Rambo, 1966: 31), su presencia en el Sur de Brasil es dudosa.

Mimosa hexandra Micheli var. *tropica* S. Moore = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hexandra Micheli var. *vepres* (Lindm.) Chodat & Hassl. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hilariana Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 6542* (MBM)].

Mimosa hirsutissima Mart.
Sin.: *Mimosa dispersa* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *alboffiana* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *longipila* Benth., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *missionum* Burkart, *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *villosissima* Benth., *Mimosa sturtiana* Huber, *Mimosa tomentosa* Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–800 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 8257* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 8506* (SI)].

Mimosa hirsutissima Mart. f. *decumbens* Chodat & Hassl., nom. superfl. = **Mimosa alleniana** Morong
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa hirsutissima Mart. f. *erecta* Chodat & Hassl. = **Mimosa alleniana** Morong
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

[Mimosa hirsutissima Mart. var. barbigera (Benth.) Barneby]
Sin.: *Mimosa barbigera* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Notas: Variedad excluida del área del proyecto.

Mimosa hirsutissima Mart. var. *pseudodistans* Chodat & Hassl. = **Mimosa alleniana** Morong
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa horrida L. = **Acacia horrida** (L.) Willd.

Mimosa hostmanii Benth. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa implexa Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Subarbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sellow, F. 3028* (F)].

Mimosa implexa auct. non Benth. = **Mimosa uraguensis** Hook. & Arn.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa incana auct. non Benth. = **Mimosa flocculosa** Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa incana (Spreng.) Benth.
Sin.: *Acacia incana* Spreng., *Acacia sprengelii* Hook. & Arn., *Mimosa crassipes* Arechav.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, DUR, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 47190* (SI)]; URY[*Herter, W. G. F. 95844* (F, MO, SI), *Marchesi, E. 17580* (MVFA)].

Mimosa incana (Spreng.) Benth. var. *robusta* J.F. Macbr. = **Mimosa flocculosa** Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa incurialis Vell. = **Leucochloron incuriale** (Vell.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Mimosa inga Vell. = **Inga edulis** Mart.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

[Mimosa insidiosa Mart.]
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Mimosa insignis (Hassl.) Barneby
Sin.: *Schranckiastrum insigne* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 200 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 11082* (G)].

Mimosa intricata Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sellow, F. 2871* (K)].

Mimosa invisa Mart., nom. illeg. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa invisa Mart. ex Colla f. *inermis* Adelb. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa invisa Mart. ex Colla var. *echinocarpa* Chodat & Hassl. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa invisa Mart. ex Colla var. **invisa**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, CAN, CEN, PAI, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1376* (MO, PY)].

Mimosa invisa Mart. ex Colla var. **macrostachya** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa calistachya* C. Presl, *Mimosa macrostachya* (Benth.) J.F. Macbr., nom. illeg., *Schrankia macrostachya* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Notas: Citada para Paraguay sin indicar ejemplar de referencia (Barneby, 1991: 307).

Mimosa involucrata Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 49411* (SI), *Reitz, P. R. 1470c* (SI)].

Mimosa iperoënsis Hoehne var. **iperoënsis**
Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *paraguariensis* Hassl., *Mimosa adenocarpa* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 300–600 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 53720* (MBM)]; PRY[*Hassler, E. 9637* (G)].

Mimosa iperoënsis Hoehne var. **paradenia** Barneby
Sin.: *Mimosa adenocarpa* Benth. f. *inermis* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Endémica. 200–300 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 4945* (BM, G, NY, P)].

Mimosa ixiamensis Rusby = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa jiramenensis H. Karst. = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa kermesina Otto & A. Dietr.
Sin.: *Mimosa lucidula* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–600 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Porto, M. L. 1823* (CTES)].

Mimosa killipii Britton & Rose ex Britton & Killip = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **xanthocentra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa kuhniesteroides Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 44558* (MBM, NY)].

Mimosa lanata Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 700–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 8485* (HBR, SI, US)].

Mimosa lasiocarpa Benth. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa lasiocarpa Benth. f. *glabriflora* Hassl. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa lasiocephala Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–700 m.
Países: BRA(RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sellow, F. s.n.* (G, K, W)].

Mimosa laurina Sw. = **Inga laurina** (Sw.) Willd.

Mimosa leimonias Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4863* (GH, P, SI)].

Mimosa lepidorepens Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964c.
Subarbusto. Endémica. 1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 5289* (SI)].

Mimosa lindleyi Burkart = **Mimosa schleidenii** Herter
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa loeseneriana Glaz., nom. nud. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa longifolia Andrews = **Acacia longifolia** (Andrews) Willd.

Mimosa longipinna Benth. = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **xanthocentra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa longiracemosa (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa callosa* Benth. var. *longiracemosa* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: ARG(MIS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rodríguez, F. M. 626* (F, SI)].

Mimosa longisiliqua Lam., nom. inval. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa lophantha (Willd.) Pers. = **Albizia lophantha** (Willd.) Benth.

Mimosa lorentzii Griseb. = **Mimosa detinens** Benth.
Referencias: Burkart, A., 1948.

Mimosa luciana Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 0–100 m.
Países: URY(CAS, FLA, MAL, ROC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Fruchard, M. s.n.* (P), *Rosengurtt, B. 3103b* (MVFA)].

Mimosa lucidula Benth. = **Mimosa kermesina** Otto & A. Dietr.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa lupinoides Chodat & Hassl.
Sin.: *Mimosa lupinoides* Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *ferruginea* Hassl., nom. superfl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *glabrescens* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. f. *hirsuta* Hassl., *Mimosa nervosa* Bong. ex Benth. var. *lupinoides* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000; Seijo, G. J., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 200–400 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 4978* (BM), *Rojas, T. 6261a* (SI)].

Mimosa lupinoides Chodat & Hassl. f. *glabrescens* Chodat & Hassl. = **Mimosa lupinoides** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa lutea Mill. = **Acacia lutea** (Mill.) Britton

Mimosa lycopodioides Desf. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Mimosa macrocalyx Micheli var. **macrocalyx**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 200–400 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 29166* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 4709* (SI)].

Mimosa macrocalyx Micheli var. **pectinata** Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6407* (SI)].

Mimosa macrostachya (Benth.) J.F. Macbr., nom. illeg. = **Mimosa invisa** Mart. ex Colla var. **macrostachya** (Benth.) Barneby

Mimosa macrostachya Poir. var. *glaberrima* (Chodat & Hassl.) J.F. Macbr. = **Mimosa glutinosa** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa magentea Izag. & Beyhaut
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2002, 2003.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(LAV, MAL).
Ejemplares de Referencia: URY[*Izaguirre, P. 28454* (MVFA)].

Mimosa manguensis Jacq. = **Chloroleucon manguense** (Jacq.) Britton & Rose

Mimosa mansii Mart. = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa maracayuënsis Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 9939* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 5086* (BM, G, K, NY, P, W)].

Mimosa marginata Lindl., hom. illeg. = **Mimosa schleidenii** Herter
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa marginata Lindl. var. *strigosa* Griseb. = **Mimosa dolens** Vell. var. **latifolia** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa martusiana Steud. = **Acacia martusiana** (Steud.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1979b.

Mimosa maxonii Standl. = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

[Mimosa mazatlana M.E. Jones]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

[Mimosa meticulosa Mart.]
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa meticulosa auct. non Mart. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *glaberrima* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *glabrescens* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *hirsuta* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *macrophylla* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

[Mimosa meticulosa Mart. f. polyphylla Chodat & Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa meticulosa Mart. f. *pubescens* Chodat & Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. var. *microphylla* Benth., nom. superfl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa meticulosa Mart. var. *pubescens* Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **pubescens** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa micropteris Benth. var. **micropteris**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947, 1979b.
Arbusto. Nativa. 500–1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 14721* (HBR, SI, US)].

Mimosa micropteris Benth. var. **pungens** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa regnellii* Benth. var. *pungens* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 400–1100 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 11463* (SI, US)].

[Mimosa millefoliata Scheele]
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa millefoliata Scheele var. *glaberrima* Chodat & Hassl. = **Mimosa glutinosa** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa monadelpha Chodat & Hassl. var. **glabrata** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa amambayensis* Hassl. var. *glabrata* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10348* (G, GH)].

Mimosa monadelpha Chodat & Hassl. var. *hirsuto-puberula* Hassl. = **Mimosa monadelpha** Chodat & Hassl. var. **monadelpha**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa monadelpha Chodat & Hassl. var. **monadelpha**
Sin.: *Mimosa amambayensis* Hassl., *Mimosa monadelpha* Chodat & Hassl. var. *hirsuto-puberula* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Subarbusto. Endémica. 200–400 m.
Países: PRY(AMA, CAU, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5795* (BM)].

Mimosa monticola auct. non Dusén = **Mimosa gymnas** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa morongii Britton
Sin.: *Mimosa argillicola* Hassl., *Mimosa echinocarpa* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 100–200 m.
Países: PRY(CEN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Morong, T. 728* (NY)].

Mimosa murex Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1993.
Arbusto. Endémica. 1000–1200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Ribas, O. S. 434* (MBM, NY)].

Mimosa myriophylla Bong. ex Benth.
Sin.: *Mimosa pluriracemosa* Burkart, *Mimosa regnellii* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947; Rambo, B., 1966.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(MIE, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 3834* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. 1838* (LIL, SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 3230* (SI)].

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. f. *ferruginea* Hassl., nom. superfl. = **Mimosa lupinoides** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. f. *glabrescens* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Mimosa lupinoides** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. f. *hirsuta* Hassl. = **Mimosa lupinoides** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. var. *alboffiana* Burkart = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. var. *longipila* Benth. = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. var. *lupinoides* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Mimosa lupinoides** Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1977.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. var. *macrophylla* Hassl. = **Mimosa caaguazüensis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. var. *missionum* Burkart = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nervosa Bong. ex Benth. var. *villosissima* Benth. = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa niederleinii Burkart
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *riograndensis* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947, 1948; Fortunato, R. H., 1989; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 400–1000 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Niederlein, G. s.n.* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3498* (SI)].
Notas: Para la Argentina se conoce sólo por la colección del ejemplar tipo, su presencia debe ser confirmada.

Mimosa niederleinii Burkart var. *pseudolepidota* Burkart = **Mimosa pseudolepidota** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa niederleinii Burkart var. *riograndensis* Burkart = **Mimosa niederleinii** Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Fortunato, R. H., 1989; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa niopo (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Mimosa nitidula Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6265* (G)].

Mimosa notata Steud. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nuda Benth. f. *minor* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **gracilipes** (Harms) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa nuda Benth. var. **angusta** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 300–800 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4268* (SI)].

Mimosa nuda Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa glaucescens* Benth., hom. illeg., *Mimosa obtusifolia* auct. non Willd., *Mimosa rixosa* auct. non Mart., *Mimosa rixosa* Mart. f. *glabrifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa rixosa* Mart. var. *inermis* Chodat & Hassl., *Mimosa sensibilis* auct. non Griseb., *Mimosa velloziana* Mart. f. *acutifolia* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. f. *hispida* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *atrostipulata* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glaberrima* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *guaranitica* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *inermis* Chodat & Hassl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *malmeana* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS, SAL); BRA(PAR); PRY(APY, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Llamas, A. 653* (BAB)]; BRA[*Hatschbach, G. 45987* (NY)]; PRY[*Degen, R. 2626* (FCQ), *Fiebrig, K. A. G. 184* (SI), *Hassler, E. 5921* (G)].

Mimosa nuda Benth. var. **gracilipes** (Harms) Barneby
Sin.: *Mimosa gracilipes* Harms, *Mimosa gracilipes* Harms f. *armata* Hassl., *Mimosa gracilipes* Harms f. *inermis* Hassl., nom. superfl., *Mimosa nuda* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: PRY(CON, GUA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 8511* (G)].

Mimosa oblonga Benth. var. **oblonga**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 700–1200 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 61696* (BAB)].

Mimosa oblonga Benth. var. **pinetorum** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Endémica. 900 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15823* (GH, NY)].

Mimosa obstrigosa Burkart
Sin.: *Mimosa ramulosa* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1946, 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); URY(PAY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 29317* (SI)]; BRA[*Marchiori, J. N. C. 702* (SI)]; URY[*Rezzano 29421* (MVFA)].

Mimosa obtusifolia auct. non Willd. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa obtusifolia Willd. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa oligophylla auct. non Micheli = **Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Mimosa oligophylla Micheli
Sin.: *Mimosa distans* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 200–300 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); PRY(CAA, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15512* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1459* (G)].

Mimosa oligophylla Micheli var. *pilosula* Burkart = **Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby

Mimosa orthacantha Benth.
Sin.: *Mimosa botucatuana* Hoehne
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 14506* (NY)].

Mimosa ostenii Speg. ex Burkart
Sin.: *Mimosa fragrans* auct. non A. Gray
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: ARG(ERI); URY(PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 4213* (SI)]; URY[*Schroeder, J. s.n.* (BAF, LP, MVM)].

Mimosa pachecensis S. Moore = **Mimosa polycarpa** Kunth var. **spegazzini** (Pirotta ex Hook. f.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa palpitans Humb. & Bonpl. ex Willd. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa panamensis (Benth.) Standl. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa papposa Benth. var. *uininervis* Chodat & Hassl. = **Mimosa uninervis** (Chodat & Hassl.) Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa parae Poir. = **Inga heterophylla** Willd.

Mimosa paraguariae Micheli f. *induta* Hassl. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **paraguariae**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa paraguariae Micheli var. *chacoënsis* Hassl. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **paraguariae**

Mimosa paraguariae Micheli var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **paraguariae**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa paraguariae Micheli var. *induta* (Hassl.) J.F. Macbr. = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **paraguariae**

Mimosa paraguariae Micheli var. **multiglandulosa** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *multiglandulosa* Hassl., *Mimosa cordistipula* Benth. var. *pubescens* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 300–400 m.
Países: PRY(CAU).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 9234* (G, NY, P, UC)].

Mimosa paraguariae Micheli var. **paraguariae**
Sin.: *Mimosa cordistipula* auct. non Benth., *Mimosa paraguariae* Micheli f. *induta* Hassl., *Mimosa paraguariae* Micheli var. *chacoënsis* Hassl., *Mimosa paraguariae* Micheli var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Mimosa paraguariae* Micheli var. *induta* (Hassl.) J.F. Macbr., *Mimosa trachycarpa* Benth. var. *inermis* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Endémica. 100–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAN, PHA, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. 707* (SI)]; BRA[*Smith, L. B. 11578* (SI, US)]; PRY[*Hassler, E. 5956* (BM, G, NY, P)].

Mimosa paraguariae Micheli var. **tomentosa** (Hassl.) Barneby
Sin.: *Mimosa cordistipula* Benth. var. *tomentosa* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5752* (BM, G, NY)].

Mimosa paranapiacabae Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 900–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17863* (NY, US)].

Mimosa parasordida Burkart, nom. nud. = **Mimosa urticaria** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa parvifolia Poir. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Mimosa parvipinna Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: ARG(MIS); BRA(RGS); PRY(CAU); URY(FLA, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwarz, J. 4838* (SI)]; BRA[*Marchiori, J. N. C. 769* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 8437* (SI)]; URY[*Osten, C. 15180* (MVM)].

Mimosa pauciseta Benth. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa paupera Benth. var. **dives** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Anisits, J. D. 2687* (S)].

Mimosa paupera Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl. = **Mimosa paupera** Benth. var. **paupera**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa paupera Benth. var. **paupera**
Sin.: *Mimosa paupera* Benth. var. *longepedunculata* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, AMA, GUA, ITA); URY(ART, MAL, PAY, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15485* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1055* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 1463* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 3721b* (MVFA, SI)].

Mimosa pauperoides (Burkart) Fortunato
Sin.: *Mimosa balansae* Micheli var. *pauperoides* Burkart, *Mimosa brevipetiolata* Burkart var. *pauperoides* (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Fortunato, R. H., 1989; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI); BRA(RGS); URY(SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2493* (SI)]; BRA[*Freitas Xavier, E. 17* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 10565* (MVFA)].

Mimosa pedersenii Barneby
Sin.: *Mimosa axillaris* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(CAN); URY(ART, MON, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15452* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11939* (C, NY, SI)]; PRY[*Hassler, E. 4601* (G)]; URY[*Berro, M. B. 5621* (MVM)].

Mimosa pedunculosa Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba. Perenne. Endémica. 200–400 m.
Países: PRY(CAU, CAA, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Balansa, B. 1434* (F, G, P)].

Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd.
Sin.: *Mimosa cinerea* auct. non Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APY, APA, CAU, CAN, CEN, COA, GUA, ITA, PAI, PHA, SPE); URY(COL, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Bossi, F. 28* (MNES, SI), *Deginani, N. B. 1440* (SI)]; BRA[*Duarte, A. P. 1857* (SI)]; PRY[*Hahn, W. J. 2174* (SI), *Jiménez, B. 32* (BM, PY)]; URY[*Izaguirre, P. 19652* (MVFA)].

Mimosa pellita Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dehiscens* Barneby = **Mimosa pigra** L. var. **dehiscens** (Barneby) Glazier & Mackinder
Referencias: Glazier, D. & Mackinder, B. A., 1997.

Mimosa per-dusenii Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947, 1979a.
Subarbusto. Endémica. 800–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 12087* (SI)].

Mimosa peregrina L. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Spegazzini, C. L., 1923b.

Mimosa pernambucana L. = **Desmanthus pernambucanus** (L.) Thell.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Mimosa petraea Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Fortunato, R. H., 1989.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, COA, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 6619* (BM, F, G, K, NY, W)].

Mimosa petraea Chodat & Hassl. var. *hirtula* Burkart = **Mimosa brevipetiolata** Burkart var. **hirtula** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa pigra auct. non L. = **Mimosa tweedieana** Barneby ex Glazier & Mackinder
Referencias: Glazier, D. & Mackinder, B. A., 1997.

Mimosa pigra L. var. **dehiscens** (Barneby) Glazier & Mackinder
Sin.: *Mimosa pellita* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *dehiscens* Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Glazier, D. & Mackinder, B. A., 1997.
Arbusto. Nativa. 200–1000 m.
Países: PRY(APY, CON, COA, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Zardini, E. M. 2574* (NY)].

Mimosa pigra L. var. **pigra**
Sin.: *Mimosa asperata* L., *Mimosa asperata* L. f. *armata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *aspera* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *glabrescens* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Hassl., hom. illeg., *Mimosa asperata* L. f. *inermis* Lindm., *Mimosa asperata* L. f. *longepedunculata* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *mollis* Hassl., *Mimosa asperata* L. f. *pubescens* (Benth.) Hassl., *Mimosa asperata* L. var. *laevior* DC., nom. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *pigra* (L.) Willd., nom. illeg., *Mimosa asperata* L. var. *scandens* Ducke, *Mimosa bellatrix* Hoffmanns. ex Steud., nom. nud., *Mimosa canescens* Willd., *Mimosa ciliata* Willd., *Mimosa cinerea* Benth. var. *pubescens* Benth., *Mimosa habbas* Delile, nom. superfl., *Mimosa polyacantha* Willd., *Mimosa procumbens* Schumach., *Mimosa sicaria* Hoffmanns., *Mimosa vellosiella* Herter var. *pubescens* (Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI, PHA); URY(COL, SJO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2541* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 6773* (HBR, SI)]; PRY[*Schinini, A. 6275* (G)]; URY[*Izaguirre, P. 19652* (MVFA)].

Mimosa pilulifera Benth. f. *calvescens* Malme = **Mimosa pilulifera** Benth. var. **pilulifera**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa pilulifera Benth. var. *discolor* Burkart = **Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa pilulifera Benth. var. **pilulifera**
Sin.: *Mimosa pilulifera* Benth. f. *calvescens* Malme, *Mimosa tacuarembensis* Arechav.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1964c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(BAI, ERI); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CLA, COL, DUR, LAV, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 24820* (SI)]; BRA[*Sehnem, A. 3955* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 4767* (MVM), *Herter, W. G. F. 1011* (SI)].

Mimosa pilulifera Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa aparadensis* Burkart, *Mimosa pilulifera* Benth. var. *discolor* Burkart, *Mimosa pseudincana* Burkart, *Mimosa simulans* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); URY(ART, CLA, MON, PAY, RNO, SJO, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20175* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1538* (MVFA)].

Mimosa plena L. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Mimosa plumosa Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964c.
Arbusto. Endémica. 200–300 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Balansa, B. 4424* (C, F, G, P)].

Mimosa pluriracemosa Burkart = **Mimosa myriophylla** Bong. ex Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa podocarpa Benth. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa polyacantha Willd. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa polycarpa auct. non Kunth = **Mimosa polycarpa** Kunth var. **subandina** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa polycarpa Kunth var. **spegazzini** (Pirotta ex Hook. f.) Burkart
Sin.: *Mimosa pachecensis* S. Moore, *Mimosa polychaeta* Malme, *Mimosa spegazzini* Pirotta ex Hook. f.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Seijo, G. J., 2000.
Arbusto. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APY, CEN, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1176* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 8200* (G), *Krapovickas, A. 45189* (CTES)].
Notas: Cultivada en Uruguay (Izaguirre & Beyhaut 2003: 167).

Mimosa polycarpa Kunth var. **subandina** Barneby
Sin.: *Mimosa polycarpa* auct. non Kunth
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–600 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*O'Donell, C. A. 2696* (LIL)].

Mimosa polycarpa Kunth var. *subglabrata* Hoehne = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa polychaeta Malme = **Mimosa polycarpa** Kunth var. **spegazzini** (Pirotta ex Hook. f.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

[Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd.]
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Mimosa portoricensis Jacq. = **Zapoteca portoricensis** (Jacq.) H.M. Hern. subsp. **flavida** (Urb.) H.M. Hern.

Mimosa prionopus Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 1200 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Cordeiro, J. 716* (MBM, NY)].

Mimosa procumbens Schumach. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa procurrens auct. non Benth. = **Mimosa caaguazüensis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa prostrata Schleid. & Vogel, nom. nud. = **Mimosa schleidenii** Herter
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa pseudincana Burkart = **Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa pseudo-obovata Taub. = **Mimosa ceratonia** L. var. **pseudo-obovata** (Taub.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa pseudocallosa Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Subarbusto. Endémica. 1300 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 6443* (SI, US)].

Mimosa pseudolepidota (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa niederleinii* Burkart var. *pseudolepidota* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Subarbusto. Endémica. 700–900 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 11208* (NY, R, SI, US)].

Mimosa pseudopetiolaris Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Balansa, B. 1465* (G, K, P)].

Mimosa pseudotrachycarpa Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 700–900 m.
Países: BRA(PAR, RGS).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 10824* (GH, K, NY)].

Mimosa pudica auct. non L. = **Mimosa balansae** Micheli
Referencias: Burkart, A., 1948.

Mimosa pudica L. var. **hispida** Brenan
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–1500 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Ferrucci, M. S. 299* (CTES, NY)].

Mimosa punctata L. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Mimosa pungentissima Ducke = **Mimosa ceratonia** L. var. **pseudo-obovata** (Taub.) Barneby

Mimosa quadrijuga Salzm. ex Benth. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa quadrivalvis L. var. **leptocarpa** (DC.) Barneby
Sin.: *Leptoglottis leptocarpa* (DC.) Standl., *Schrankia argentinensis* Burkart, *Schrankia leptocarpa* DC.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–900 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, CEN, GUA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Meyer, T. 8872* (SI), *Rodríguez, F. M. 179* (SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 16061* (CTES)]; PRY[*Pedersen, T. M. 4160* (SI)].

Mimosa ramboi Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1946; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Endémica. 100–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, CAS, PAY).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Marchiori, J. N. C. 1404* (SI)]; URY[*Chebataroff, J. 7709* (MVJB)].

Mimosa ramentacea Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica. 1500–2000 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Smith, L. B. 7797* (F, SI)].

Mimosa ramosissima Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Rambo, B., 1966.
Arbusto. Nativa. 800–1600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 3601* (HBR, SI)].

Mimosa ramosissima Benth. var. *ulei* Burkart = **Mimosa chaetosphaera** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa ramulosa Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, CLA, FLA, LAV, MAL, MON, RIV, ROC, TYT).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sobral, M. 3924* (NY)]; URY[*Osten, C. 5193* (MVM, SI)].

Mimosa ramulosa auct. non Benth. = **Mimosa obstrigosa** Burkart

Mimosa reduviosa Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 20101* (HBG, MBM)].

Mimosa regnellii auct. non Benth. = **Mimosa myriophylla** Bong. ex Benth.

Mimosa regnellii Benth. f. *rectispina* Chodat & Hassl. = **Mimosa altoparanensis** Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa regnellii Benth. var. *aculeata* Chodat & Hassl. = **Mimosa altoparanensis** Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa regnellii Benth. var. **exuta** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 13869* (S)].

Mimosa regnellii Benth. var. **grossiseta** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 48862* (NY)];

Mimosa regnellii Benth. var. *pungens* Burkart = **Mimosa micropteris** Benth. var. **pungens** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa regnellii Benth. var. **supersetosa** (Burkart) Barneby
Sin.: *Mimosa supersetosa* Burkart, *Mimosa supersetosa* Burkart var. *rufohispidula* Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 500–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 4898* (SI), *Smith, L. B. 11876* (SI, US)].

Mimosa reptans Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966.
Subarbusto. Endémica. 0–200 m.
Países: BRA(RGS); URY(DUR, LAV, MAL, RNO, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sehnem, A. 5649* (SI)]; URY[*Arrillaga de Maffei, B. R. 2182* (MVFA)].

Mimosa rigescens Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rigescens** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rigescens Benth. var. *foliolosa* Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **foliolosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rigida auct. non Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **pseudorigida** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rigida Benth. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **rigida** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

[Mimosa rigida Benth. f. puberula Chodat & Hassl.]
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa rigidicaulis Burkart = **Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rigidicaulis Burkart var. *ciliata* Burkart = **Mimosa dolens** Vell. var. **anisitsii** (Lindm.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rixosa auct. non Mart. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rixosa Mart. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rixosa Mart. f. *glabrifolia* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rixosa Mart. var. *inermis* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rocae Lorentz & Niederl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1964c; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Subarbusto. Endémica. 200–700 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, PAY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 4710* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 4632b* (LIL)]; URY[*Legrand, D. 3649* (MVM, SI)].

Mimosa rojasii Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Seijo, G. J., 2000.
Subarbusto. Endémica. 300–800 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 6268b* (SI), *Schinini, A. 33645* (CTES)].

Mimosa rosariensis Mattos = **Mimosa bifurca** Benth. var. **bifurca**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rudis Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rudis Benth. f. *intermedia* Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rudis Benth. f. *latifoliolata* Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rudis Benth. var. *asperrima* (Benth.) Hassl. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rudis Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Mimosa dolens** Vell. var. **rudis** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa rupestris Benth.
Sin.: *Mimosa subinermis* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(LAV, RIV).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sobral, M. 9533* (MBM)]; URY[*Berro, M. B. 832* (MVFA)].

Mimosa sabulicola Chodat & Hassl. = **Mimosa strigillosa** Torr. & A. Gray
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa sanguinolenta Barneby = **Mimosa cruenta** Benth. var. **glabra** Burkart
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa scabrella Benth.
Sin.: *Mimosa bracaatinga* Hoehne, *Mimosa bracaatinga* Hoehne f. *paucijuga* Hoehne, *Mimosa bracaatinga* Hoehne var. *aspericarpa* Hoehne, *Mimosa scabrella* Benth. var. *aspericarpa* (Hoehne) Burkart, *Mimosa secunda* Hoehne ex Angely, nom. nud.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1979b; Rambo, B., 1966.
Árbol. Nativa. 700–1900 m.
Países: ARG(BAI); BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Clos, E. C. 6930* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 3603* (SI)].
Notas: Introducida en Buenos Aires, Argentina. Burkart (1948: 225) indica que "Sellow la recogió...de Montevideo hasta San Pablo" sin indicar ejemplares para Uruguay.

Mimosa scabrella Benth. var. *aspericarpa* (Hoehne) Burkart = **Mimosa scabrella** Benth.

Mimosa sceptrum Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10086* (A, G, NY)].

Mimosa schleidenii Herter
Sin.: *Mimosa lindleyi* Burkart, *Mimosa marginata* Lindl., hom. illeg., *Mimosa prostrata* Schleid. & Vogel, nom. nud.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Subarbusto. Endémica. 0–300 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, MAL, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 27244* (LIL, SI), *Rambo, B. 27809* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 277* (MVFA)].

Mimosa secunda Hoehne ex Angely, nom. nud. = **Mimosa scabrella** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa selloi auct. non (Benth.) Benth. = **Mimosa gracilis** Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby

Mimosa selloi (Benth.) Benth.
Sin.: *Schrankia selloi* Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Rambo, B., 1966.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1165* (SI)].

Mimosa selloi (Benth.) Benth. var. *leiocarpa* Burkart = **Mimosa gracilis** Benth. var. **leiocarpa** (Burkart) Barneby

Mimosa semialata Vell. = **Inga marginata** Willd.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa sensibilis auct. non Griseb. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby

Mimosa sensibilis Griseb. var. **aquidabani** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 300–400 m.
Países: PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4065* (G, SI)].

Mimosa sensibilis Griseb. var. **sensibilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 300–900 m.
Países: ARG(JUJ); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 11524* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 13619* (SI)].

Mimosa sensibilis Griseb. var. **urucumensis** Barneby
Sin.: *Mimosa velloziana* Mart. f. *moorei* Hoehne
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 100–300 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1596* (NY)].

Mimosa sensitiva auct. non L. = **Mimosa debilis** Humb. & Bonpl. ex Willd.
Referencias: Burkart, A., 1948.

[Mimosa sensitiva L. var. pudica (L.) Matoso]
Referencias: Burkart, A., 1948.
Notas: Nombre dudoso.

Mimosa sepiaria Benth. = **Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa serpens Chodat & Hassl. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa serpens Chodat & Hassl. var. *glabrifolia* Chodat & Hassl. = **Mimosa gracilis** Benth. subsp. **gracilis**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa serra Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Subarbusto. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13792* (SI)].

Mimosa sessilis Vell. = **Inga sessilis** (Vell.) Mart.
Referencias: Burkart, A., 1979b; Pennington, T. D., 1997.

Mimosa setipes Benth. = **Mimosa dolens** Vell. subsp. **callosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa setistipula auct. non Benth. = **Mimosa diversipila** Micheli var. **subglabriseta** Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa setosa Benth. subsp. **paludosa** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 500–1200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Krapovickas, A. 32594* (CTES, NY)].

Mimosa sicaria Hoffmanns. = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa simulans Burkart = **Mimosa pilulifera** Benth. var. **pseudincana** (Burkart) Barneby

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *viscida* Chodat & Hassl. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glandulosa* Griseb. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *podocarpa* (Benth.) Niederl. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *quadrijuga* (Benth.) Niederl. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **lasiocarpa** (Benth.) Barneby
Sin.: *Mimosa acutiflora* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth., *Mimosa lasiocarpa* Benth. f. *glabriflora* Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 500 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 10683* (G)].

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Sin.: *Mimosa articulata* Duch., nom. nud., *Mimosa palpitans* Humb. & Bonpl. ex Willd., *Mimosa podocarpa* Benth., *Mimosa quadrijuga* Salzm. ex Benth., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. f. *viscida* Chodat & Hassl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *glandulosa* Griseb., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *podocarpa* (Benth.) Niederl., *Mimosa somnians* Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *quadrijuga* (Benth.) Niederl., *Mimosa somniculosa* Kunth, *Mimosa tobagensis* Urb., *Mimosa vialis* Benth., nom. nud.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Seijo, G. J., 2000.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(APY, CAU, CAA, CAN, CEN, COA, GUA, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 5320* (SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 11146* (SI)].

Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **viscida** (Willd.) Barneby
Sin.: *Mimosa trijuga* Benth., *Mimosa viscida* Willd.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Seijo, G. J., 2000.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR); PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 65331* (NY)]; PRY[*Hacker, J. B. 1046* (CTES)].

Mimosa somniculosa Kunth = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa sparsa Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1979b.
Arbusto. Endémica. 500–600 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 28727* (PACA, SI), *Sehnem, A. 3761* (SI)].

Mimosa sparsiformis Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Pereira, E. 8557* (NY, R)].

Mimosa spegazzini Pirotta ex Hook. f. = **Mimosa polycarpa** Kunth var. **spegazzini** (Pirotta ex Hook. f.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa sprengelii auct. non DC. = **Mimosa australis** Izag. & Beyhaut
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2002.

Mimosa sprengelii DC.
Sin.: *Mimosa alegretense* Marchiori, *Mimosa ciliata* Spreng., hom. illeg.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2002, 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–400 m.
Países: BRA(RGS); URY(ART, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, RIV, ROC, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Marchiori, J. N. C. 1409* (ICN)]; URY[*Berro, M. B. 2803* (MVFA, SI)].

Mimosa stenoptera Benth. = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **xanthocentra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa stipularis Bong. ex Benth. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa striata (Benth.) Speg. = **Prosopidastrum striatum** (Benth.) R.A. Palacios & Hoc
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2005.

Mimosa strigillosa Torr. & A. Gray
Sin.: *Mimosa dolichocephala* Harms, *Mimosa dolichocephala* Harms var. *sabulicola* (Chodat & Hassl.) Hassl., *Mimosa sabulicola* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, SFE, TUC); PRY(APY, CEN, CON); URY(CLA, FLO, RNO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Rojas, T. 12360* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 3054a* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 670b* (MVFA, SI)].

Mimosa strobiliflora Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1947.
Arbusto. Endémica. 700–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15157* (BM, F, GH, MICH, NY, S, SI)].

Mimosa strombulifera Lam. = **Prosopis strombulifera** (Lam.) Benth. var. **strombulifera**
Referencias: Correa, M. N., 1984i; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.

Mimosa stuhlmannii Harms = **Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa sturtiana Huber = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa subinermis Benth. = **Mimosa rupestris** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa subsericea Benth.
Sin.: *Mimosa loeseneriana* Glaz., nom. nud., *Mimosa stipularis* Bong. ex Benth., *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *minor* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *hirsuto-strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *oblonga* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigosa* Chodat & Hassl., *Mimosa xanthocentra* Mart. subsp. *subsericea* (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948, 1979b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Seijo, G. J., 2000.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON, COA, GUA, MIE, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15389* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 3024* (HBR)]; PRY[*Fortunato, R. H. 1153* (SI), *Krapovickas, A. 45478* (CTES)].

Mimosa subsericea Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa subsericea Benth. f. *armata* Chodat & Hassl. = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby

Mimosa subsericea Benth. f. *minor* Chodat & Hassl. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa subsericea Benth. var. *hirsuto-strigosa* Chodat & Hassl. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa subsericea Benth. var. *oblonga* Chodat & Hassl. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa subsericea Benth. var. *strigosa* Chodat & Hassl. = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa subsericea Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl. = **Mimosa xanthocentra** Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa supersetosa Burkart = **Mimosa regnellii** Benth. var. **supersetosa** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa supersetosa Burkart var. *rufohispidula* Burkart = **Mimosa regnellii** Benth. var. **supersetosa** (Burkart) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa tacuarembensis Arechav. = **Mimosa pilulifera** Benth. var. **pilulifera**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa taimbensis Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1964c, 1979b.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: BRA(RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Sehnem, A. 4290* (SI), *Sehnem, A. 5140* (SI)].

Mimosa tandilensis Speg.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 200–1000 m.
Países: ARG(BAI); BRA(RGS); URY(LAV, MAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Martínez Crovetto, R. 1786* (SI)]; BRA[*Marchiori, J. N. C. 2152* (SI)]; URY[*Pedersen, T. M. 3594* (SI)].

Mimosa tenuifolia L. = **Acacia tenuifolia** (L.) Willd.

Mimosa tenuipendula Burkart
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 200–300 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 3047* (G, K, M, SI, US)].

Mimosa tetraphyla Vell. = **Inga laurina** (Sw.) Willd.
Referencias: Pennington, T. D., 1997.

Mimosa thyrsoides Griseb. = **Mimosa bimucronata** (DC.) Kuntze var. **bimucronata**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa tobagensis Urb. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa tobatiensis Barneby & Fortunato
Referencias: Barneby, R. C. & Fortunato, R. H., 1987; Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica. 200 m.
Países: PRY(CEN, COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Chodat, R. H. 274* (A, G, GH, MO, NY)].

Mimosa tomentosa Humb. & Bonpl. ex Willd., nom. illeg. = **Mimosa hirsutissima** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa trachycarpa Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); URY(CLA, LAV, TYT).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 9956* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 1044* (MVFA, SI)].

Mimosa trachycarpa Benth. var. *inermis* Burkart = **Mimosa paraguariae** Micheli var. **paraguariae**

Mimosa trachycephala Benth. = **Mimosa dolens** Vell. var. **dolens**

Mimosa trijuga Benth. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **viscida** (Willd.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa troncosoae Fortunato & Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Árbol. Endémica. 200–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hahn, W. J. 1548* (BAB, MO, NY)].

Mimosa tweedieana Barneby, nom. nud. = **Mimosa tweedieana** Barneby ex Glazier & Mackinder
Referencias: Glazier, D. & Mackinder, B. A., 1997.

Mimosa tweedieana Barneby ex Glazier & Mackinder
Sin.: *Mimosa asperata* L. var. *glabrior* Hook. & Arn., *Mimosa pigra* auct. non L., *Mimosa tweedieana* Barneby, nom. nud., *Mimosa vellosiana* Herter, nom. nud., *Mimosa vellosiella* Herter
Referencias: Burkart, A., 1987a; Glazier, D. & Mackinder, B. A., 1997; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COS, DFE, ERI, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, SPE); URY(SJO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3274* (SI)]; PRY[*Wolf, N. M. s.n.* (SI)]; URY[*Lema 8233* (MVFA)].

Mimosa uliginosa Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1948.
Arbusto o arbolito. Endémica. 100–300 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(AMA, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8059* (BAB, SI)]; BRA[*Pedersen, T. M. 11518* (CTES)]; PRY[*Rojas, T. 4135* (SI)].

Mimosa umbellata Vell. = **Inga affinis** DC.

Mimosa uninervis (Chodat & Hassl.) Hassl.
Sin.: *Mimosa papposa* Benth. var. *uininervis* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Arbusto. Nativa. 300–400 m.
Países: PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5736* (G, GH, K, NY, P, W)].

Mimosa uraguensis Hook. & Arn.
Sin.: *Mimosa implexa* auct. non Benth., *Mimosa uruguayensis* Hook. & Arn.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS); URY(ART, FLA, MON, PAY, RNO, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1183* (SI)]; BRA[*Sobral, M. 4541* (ICN)]; URY[*Rosengurtt, B. 946-b* (MVFA, SI)].

Mimosa urticaria Barneby
Sin.: *Mimosa parasordida* Burkart, nom. nud.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Endémica.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 13230* (C, F, M, MBM, NY, P, US)].

Mimosa uruguayensis Hook. & Arn. = **Mimosa uraguensis** Hook. & Arn.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa vellosiana Herter, nom. nud. = **Mimosa tweedieana** Barneby ex Glazier & Mackinder
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa vellosiella Herter = **Mimosa tweedieana** Barneby ex Glazier & Mackinder
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimosa vellosiella Herter var. *pubescens* (Benth.) Burkart = **Mimosa pigra** L. var. **pigra**
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa velloziana Mart.
Sin.: *Mimosa heterocarpa* C. Presl, *Mimosa jiramenensis* H. Karst., *Mimosa maxonii* Standl., *Mimosa velloziana* Mart. var. *glabra* Wawra, *Mimosa velloziana* Mart. var. *jiramenensis* (H. Karst.) Benth., *Mimosa velloziana* Mart. var. *oranensis* Burkart, *Mimosa viva* Vell., hom. illeg.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1948.
Arbusto o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS, SAL); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Bertoni 1291* (LIL), *Morrone, O. 1158* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 52849* (CTES)].
Notas: Barneby (1991) cita esta especie para el estado de Paraná, Brasil, sin indicar ejemplar de referencia. El ejemplar aquí citado, *Hatschbach 52849,* es del estado de Minas Gerais.

Mimosa velloziana Mart. f. *acutifolia* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. f. *hispida* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. f. *moorei* Hoehne = **Mimosa sensibilis** Griseb. var. **urucumensis** Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *atrostipulata* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *glaberrima* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby

Mimosa velloziana Mart. var. *glabra* Wawra = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *guaranitica* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *inermis* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *jiramenensis* (H. Karst.) Benth. = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *malmeana* Chodat & Hassl. = **Mimosa nuda** Benth. var. **glaberrima** (Chodat & Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa velloziana Mart. var. *oranensis* Burkart = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa vepres Lindm. = **Mimosa hexandra** Micheli
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Bernardi, L., 1984.

Mimosa vernonioides Hassl., nom. nud. = **Mimosa brevipes** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa vialis Benth., nom. nud. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **somnians**
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa virgata L. = **Desmanthus virgatus** (L.) Willd.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Luckow, N. A., 1993.

Mimosa viscida Willd. = **Mimosa somnians** Humb. & Bonpl. ex Willd. subsp. **viscida** (Willd.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mimosa viva Vell., hom. illeg. = **Mimosa velloziana** Mart.
Referencias: Burkart, A., 1948.

Mimosa warmingii Benth. = **Pseudopiptadenia warmingii** (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima

Mimosa weddelliana Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Arbusto. Nativa. 0–200 m.
Países: PRY(AMA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Ferrucci, M. S. 1529* (CTES)].

Mimosa xanthocentra Mart. var. **mansii** (Mart.) Barneby
Sin.: *Mimosa mansii* Mart., *Mimosa polycarpa* Kunth var. *subglabrata* Hoehne, *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(sin localidad); PRY(APY, GUA, PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Rojas, T. 3385a* (SI)].
Notas: Hasta el presente no existe material de referencia que pueda corroborar la cita realizada para Corrientes y Misiones, Argentina, (Barneby, 1991: 638–639).

Mimosa xanthocentra Mart. var. **xanthocentra**
Sin.: *Mimosa killipii* Britton & Rose ex Britton & Killip, *Mimosa longipinna* Benth., *Mimosa stenoptera* Benth., *Mimosa subsericea* Benth. f. *acerosa* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. f. *armata* Chodat & Hassl., *Mimosa subsericea* Benth. var. *strigoso-aculeata* Chodat & Hassl.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.
Subarbusto. Nativa. 200–2300 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, SAL); BRA(SCA); PRY(APY, CEN, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 8315* (BAB)]; BRA[*Ribas, O. S. 2236* (NY)]; PRY[*Schinini, A. 15025* (CTES)].

Mimosa xanthocentra Mart. subsp. *subsericea* (Benth.) Barneby = **Mimosa subsericea** Benth.

Mimosa yaguaronensis Larrañaga = **Calliandra tweedii** Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1998; Burkart, A., 1948; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Mimozyganthus Burkart

Número de especies: 1

Mimozyganthus carinatus (Griseb.) Burkart
Sin.: *Mimosa carinata* Griseb., *Mimosa carinata* Griseb. ex Lorentz, nom. nud.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1939b, 1952a; Fortunato, R. H., 1997c; Ulibarri, E. A., 1994a.
Arbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 4520* (BAB)]; PRY[*Zardini, E. M. 45905* (AS, BAB, MO)].

Miscolobium nigrum Mart., nom. nud. = **Dalbergia miscolobium** Benth.

Miscolobium violaceum Vogel = **Dalbergia miscolobium** Benth.

Morongia pilosa Standl. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Mucuna Adans.

Número de especies: 1

Mucuna mattogrossensis Barb. Rodr. = **Canavalia mattogrossensis** (Barb. Rodr.) Malme
Referencias: Sauer, J. D., 1964.

Mucuna sloanei Fawc. & Rendle
Sin.: *Dolichos urens* Jacq., hom. illeg., *Mucuna urens* (L.) DC., hom. illeg., *Mucuna urens* auct. non Burkart
Referencias: Burkart, A., 1970.
Liana. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Krapovickas, A. 15777* (CTES, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 1675* (SI)].

Mucuna urens (L.) DC., hom. illeg. = **Mucuna sloanei** Fawc. & Rendle
Referencias: Burkart, A., 1970.

Mucuna urens auct. non Burkart = **Mucuna sloanei** Fawc. & Rendle
Referencias: Burkart, A., 1970.

Mucuna virgata (Rich.) Desv. = **Dioclea virgata** (Rich.) Amshoff
Referencias: Burkart, A., 1970.

Muellera fluvialis (Lindm.) Burkart = **Lonchocarpus fluvialis** (Lindm.) Fortunato & Palese
Referencias: Bernardi, L., 1984; Fortunato, R. H. & Palese, R., 1997.

Muellera glaziovii auct. non (Taub.) Chodat & Hassl. = **Lonchocarpus fluvialis** (Lindm.) Fortunato & Palese

Myrocarpus Allemão

Número de especies: 1

[Myrocarpus fastigiatus Allemão]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Myrocarpus frondosus Allemão
Sin.: *Leptolobium punctatum* Benth., *Myrocarpus frondosus* Allemão f. *paraguariensis* (Hallier f.) Hassl., *Myrocarpus paraguariensis* Hallier f.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1972a; Sartori, A. L. B., 2000; Stutz, L. C., 1983; Ulibarri, E. A., 1997c.

Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAN, CON, COA, GUA, ITA, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2055* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2480* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8649* (SI)].

Myrocarpus frondosus Allemão f. *paraguariensis* (Hallier f.) Hassl. = **Myrocarpus frondosus** Allemão
Referencias: Rudd, V. E., 1972a.

Myrocarpus paraguariensis Hallier f. = **Myrocarpus frondosus** Allemão
Referencias: Bernardi, L., 1984; Rudd, V. E., 1972a.

Myrospermum pedicellatum Lam. = **Myroxylon peruiferum** L. f.

Myroxylon L. f., nom. cons.

Número de especies: 1

Myroxylon grayi Warb. = **Xylosma tweediana** (Clos) Eichler
Referencias: Sleumer, H. O., 1980.

Myroxylon peruiferum L. f.
Sin.: *Myrospermum pedicellatum* Lam.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Sartori, A. L. B., 2000; Ulibarri, E. A., 1997c.
Árbol. Nativa. 500–1000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL); BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ahumada, O. 4333* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 14495* (SI)].

Myroxylon pubescens (Griseb.) Warb. = **Xylosma pubescens** Griseb.
Referencias: Sleumer, H. O., 1980.

Myroxylon tweedianum (Clos) Kuntze = **Xylosma tweediana** (Clos) Eichler
Referencias: Sleumer, H. O., 1980.

Myroxylon warburgii Briq. = **Xylosma tweediana** (Clos) Eichler
Referencias: Sleumer, H. O., 1980.

Neocracca heterantha (Griseb.) Speg. = **Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin
Referencias: Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.

Neocracca heterantha (Griseb.) Speg. var. *minor* (R.E. Fr.) Burkart = **Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin
Referencias: Lavin, M., 1988.

Neocracca kuntzei (Harms ex Kuntze) Kuntze var. *minor* R.E. Fr. = **Poissonia heterantha** (Griseb.) Lavin
Referencias: Lavin, M., 1988.

Neonotonia Lackey

Número de especies: 1 introducida

Neonotonia wightii (Graham ex Wight & Arn.) Lackey
Sin.: *Glycine bujacia* Benth., *Glycine wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Verdc., *Johnia wightii* (Graham ex Wight & Arn.) Wight & Arn., hom. illeg., *Notonia wightii* Graham ex Wight & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1988.
Hierba o enredadera. Introducida. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, JUJ, MIS); PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 33987* (SI)]; PRY[*Burkart, A. 18353* (SI)].

Neptunia Lour.

Número de especies: 2

Neptunia floridana Small = **Neptunia pubescens** Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Windler, D. R., 1966.

Neptunia hexapetala Micheli = **Desmanthus hexapetalus** (Micheli) J.F. Macbr.
Referencias: Luckow, N. A., 1993.

Neptunia lindheimeri Rob. = **Neptunia pubescens** Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Neptunia mazatlana Britton & Rose = **Neptunia pubescens** Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Windler, D. R., 1966.

Neptunia plena (L.) Benth.
Sin.: *Acacia lycopodioides* (Desf.) Desv., *Acacia punctata* (L.) Desv., *Desmanthus comosus* A. Rich., *Desmanthus plenus* (L.) Willd., *Desmanthus polyphyllus* DC., *Desmanthus punctatus* (L.) Willd., *Mimosa lycopodioides* Desf., *Mimosa plena* L., *Mimosa punctata* L., *Neptunia polyphylla* (DC.) Benth.
Referencias: Chodat, R. H. & Hassler, E., 1904; Windler, D. R., 1966.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Zardini, E. M. 45909* (AS, BAB, MO)].

Neptunia polyphylla (DC.) Benth. = **Neptunia plena** (L.) Benth.

Neptunia pubescens Benth.
Sin.: *Neptunia floridana* Small, *Neptunia lindheimeri* Rob., *Neptunia mazatlana* Britton & Rose, *Neptunia pubescens* Benth. var. *floridana* (Small) B.L. Turner, *Neptunia pubescens* Benth. var. *lindheimeri* (Rob.) B.L. Turner
Referencias: Burkart, A., 1979b; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Isely, D., 1970; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Windler, D. R., 1966.
Hierba subleñosa. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SAL, SDE, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, COA, PAI, PHA); URY(ART, CLA, DUR, RNO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 2230* (BAB)]; BRA[*Rambo, B. 25852* (PACA)]; PRY[*Meyer, T. 18754* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 11664* (MVFA)].

Neptunia pubescens Benth. var. *floridana* (Small) B.L. Turner = **Neptunia pubescens** Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Windler, D. R., 1966.

Neptunia pubescens Benth. var. *lindheimeri* (Rob.) B.L. Turner = **Neptunia pubescens** Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Windler, D. R., 1966.

Neurocarpum barbatum Desv. = **Eriosema simplicifolium** (Kunth) G. Don

Neurocarpum densiflorum Benth. = **Clitoria densiflora** (Benth.) Benth.

Neurocarpum falcatum (Lam.) DC. = **Clitoria falcata** Lam.

Neurocarpum rufescens Benth. = **Clitoria rufescens** (Benth.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1949c.

Newtonia glaziovii (Harms) Burkart = **Pseudopiptadenia warmingii** (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima

Newtonia warmingii (Benth.) G.P. Lewis = **Pseudopiptadenia warmingii** (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima

Nicolsonia barbata (L.) DC. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Nicolsonia villosa Cham. & Schltdl. = **Desmodium barbatum** (L.) Benth.

Niopa peregrina (L.) Britton & Rose = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Nissolia Jacq.

Número de especies: 1

Nissolia fruticosa Jacq. var. **fruticosa**
Referencias: Burkart, A., 1939c; Rudd, V. E., 1956.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); PRY(APA, CEN, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7588* (BAB)]; PRY[*Woolston, A. L. 1067* (SI)].

Nissolia fruticosa Jacq. var. **guatemalensis** (Rose) Rudd
Sin.: *Nissolia guatemalensis* Rose
Referencias: Rudd, V. E., 1956.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAU, GUA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Zardini, E. M. 11026* (FCQ, MO)].

Nissolia guatemalensis Rose = **Nissolia fruticosa** Jacq. var. **guatemalensis** (Rose) Rudd

Nissolia hirta Vell. = **Machaerium hirtum** (Vell.) Stellfeld
Referencias: Bernardi, L., 1984; Rudd, V. E., 1956.

Nissolia nyctitans Vell. = **Machaerium nyctitans** (Vell.) Benth.
Referencias: Rudd, V. E., 1956.

Nissolia stipitata DC. = **Machaerium stipitatum** (DC.) Vogel
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Nissolia uncinata Vell. = **Machaerium uncinatum** (Vell.) Benth.
Referencias: Camargo, R. A., 2005.

Notonia wightii Graham ex Wight & Arn. = **Neonotonia wightii** (Graham ex Wight & Arn.) Lackey
Referencias: Ulibarri, E. A., 1988.

Odonia tomentosa Bertol. = **Galactia striata** (Jacq.) Urb. var. **striata**
Referencias: Burkart, A., 1971; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Ononis L.

Número de especies: 1 introducida

Ononis mitissima L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de Referencia: URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].

Ophiocaulon serpens (L.) Raf. = **Chamaecrista serpens** (L.) Greene var. **serpens**

Ormosia Jacks.

Número de especies: 2

Ormosia acuta Vogel = **Ormosia arborea** (Vell.) Harms

Ormosia arborea (Vell.) Harms
Sin.: *Abrus arboreus* Vell., *Ormosia acuta* Vogel
Referencias: Rudd, V. E., 1965.
Árbol. Nativa. 0–1200 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4212* (BR, G, NY, S, U, UC, US)].

Ormosia escragnolliana Glaz. = **Ormosia fastigiata** Tul.

Ormosia fastigiata Tul.
Sin.: *Ormosia escragnolliana* Glaz., *Ormosia glazioviana* Harms
Referencias: Lewis, G. P., 1987; Rudd, V. E., 1965.
Árbol. Nativa. 0–600 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 12193* (S, SI)].

Ormosia glazioviana Harms = **Ormosia fastigiata** Tul.

Ornithopus L.

Número de especies: 4, 1 endémica, 3 introducidas

Ornithopus compressus L.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Barros, E. 3555* (SI)].

Ornithopus micranthus (Benth.) Arechav.
Sin.: *Arthrolobium micranthum* Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966.
Hierba. Anual. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, SFE); BRA(RGS); URY(CAS, CLA, DUR, FLA, MAL, MON, ROC, SJO, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 27249* (SI)]; BRA[*Jarenkow, J. A. 490* (ICN)]; URY[*Herter, W. G. F. 974* (SI)].

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce
Referencias: Marticorena, C., com. pers.
Hierba. Anual o perenne. Introducida. 0–100 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Sparre, B. B. 28* (CONC)].

Ornithopus sativus Brot.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Hierba. Anual. Introducida. 0–200 m.
Países: CHL(VIII).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Junge, C. 2752* (SI)].

Otholobium C.H. Stirt.

Número de especies: 3, 1 endémica

Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes
Sin.: *Hoita glandulosa* (L.) Rydb., *Lotodes glandulosum* (L.) Kuntze, *Psoralea glandulosa* L.
Referencias: Grimes, J. W., 1990; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985, 1991; San Martín, C., Ramírez, C., San Martín, J. & Villaseñor, R., 2001.
Arbusto o árbol. Endémica. 600–1400 m.
Países: CHL(IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, RME).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Werdermann, E. 177* (SI)].
Notas: Cultivada en Uruguay (Izaguirre & Beyhaut, 1998).

Otholobium higuerilla (Gillies ex Hook.) J.W. Grimes
Sin.: *Psoralea higuerilla* Gillies ex Hook., *Psoralea monosperma* (Griseb.) J.F. Macbr., *Rhynchosia monosperma* Griseb.
Referencias: Grimes, J. W., 1990; Gómez Sosa, E. V., 1997b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 20615* (SI)].

Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes
Sin.: *Hoita hirsuta* Rusby, *Hoita versicolor* Rusby, *Psoralea lasiostachys* Vogel, *Psoralea pubescens* Poir., *Psoralea pubescens* Poir. var. *lasiostachys* (Vogel) J.F. Macbr., *Psoralea remotiflora* J.F. Macbr.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.
Arbusto. Nativa. 2000–3000 m.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Schlegel, F. 5073* (CONC)].

Pachyrhizus Rich. ex DC.

Número de especies: 1

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi
Sin.: *Dolichos ahipa* Wedd., *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi var. *albiflora* Parodi, *Pachyrhizus ahipa* (Wedd.) Parodi var. *violacea* Parodi
Referencias: Parodi, L. R., 1935.
Hierba o subarbusto. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(JUJ).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ragonese, A. E. s.n.* (BAA)].

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi var. *albiflora* Parodi = **Pachyrhizus ahipa** (Wedd.) Parodi

Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi var. *violacea* Parodi = **Pachyrhizus ahipa** (Wedd.) Parodi

Parapiptadenia Brenan

Número de especies: 2

Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart
Sin.: *Piptadenia communis* Benth. var. *excelsa* Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo, *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo f. *jujuyensis* Griseb., *Piptadenia excelsa* (Griseb.) Lillo f. *tucumanensis* Lillo, *Prosopis herzogii* Harms
Referencias: Burkart, A., 1952a, 1969c; Cialdella, A. M., 2000; Forster, R. C., 1958.
Árbol. Nativa. 600–2900 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, TUC); BRA(PAR); PRY(CEN, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 12756* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 46040* (NY)]; PRY[*Zardini, E. M. 36225* (AS, MO)].

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
Sin.: *Acacia angico* Mart., *Piptadenia rigida* Benth., *Piptadenia rigida* Benth. var. *grandis* Lindm.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Brenan, J. P. M., 1963; Burkart, A., 1979b; Cialdella, A. M., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1400 m.
Países: ARG(COS, FOR, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, APA, AMA, CAU, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, CLA, MON, RIV, ROC, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwarz, G. J. 5182* (SI), *Seijo, G. J. 185* (MNES)]; BRA[*Reitz, P. R. 14421* (HBR, SI)]; PRY[*Pérez de Molas 216* (BAB)]; URY[*Berro, M. B. 1526* (MVFA)].

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen = **Albizia lophantha** (Willd.) Benth.

Parkinsonia L.

Número de especies: 1

Parkinsonia aculeata L.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Schery, R. W., 1951; Steibel, P., 2001[2000]; Ulibarri, E. A., 1994a, 1997c.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COS, ERI, FOR, LPA, SAL, SDE, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, COA, PHA); URY(ART, CAS, CLA, DUR, FLA, MON, PAY, RNO, SAO, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 2999* (SI), *Zuloaga, F. O. 2656* (SI)]; BRA[*Camargo, O. 542* (PACA)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1428* (G), *Rojas, T. 7676* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 335* (MVFA)].

Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **praecox**

Parosela azurea (Phil.) J.F. Macbr. = **Dalea azurea** (Phil.) Reiche

Parosela boliviana (Britton) J.F. Macbr. = **Dalea boliviana** Britton
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000b.

Parosela boliviana (Britton) J.F. Macbr. var. *herrerae* J.F. Macbr. = **Dalea boliviana** Britton

Parosela calliantha (Ulbr.) J.F. Macbr. = **Dalea boliviana** Britton

Parosela elegans (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr. = **Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **elegans**

Parosela eosina J.F. Macbr. = **Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby

Parosela hofstenii (R.E. Fr.) J.F. Macbr. = **Dalea boliviana** Britton
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Parosela leporina (Aiton) Rydb. = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock

Parosela multifoliolata (Clos) J.F. Macbr. = **Errazurizia multifoliolata** (Clos) I.M. Johnst.

Parosela onobrychioides (Griseb.) J.F. Macbr. = **Dalea elegans** Gillies ex Hook. & Arn. var. **onobrychioides** (Griseb.) Barneby
Referencias: Bortiri, E., 1999.

Patagonium adenophorum (Phil.) Reiche = **Adesmia frigida** Phil.

Patagonium aegiceras (Phil.) Kuntze = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium aegiceras (Phil.) Reiche, comb. superfl. - **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium affine (Hook. f.) Macloskie = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **affinis** (Hook. f.) Burkart

Patagonium alcicornutum Rusby = **Adesmia spinosissima** Meyen
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium ameghinoi (Speg.) Speg. = **Adesmia ameghinoi** Speg.

Patagonium angustifolium (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **macrocarpa** Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.

Patagonium aphananthum (Speg.) Speg. = **Adesmia aphanantha** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium aphyllum (Clos) Kuntze = **Adesmia aphylla** Clos

Patagonium apricum (Phil.) Kuntze = **Adesmia viscida** Bertero ex Colla

Patagonium arachnipes (Clos) Kuntze = **Adesmia arachnipes** Clos

Patagonium araucanum (Phil.) Kuntze = **Adesmia araucana** Phil.

Patagonium araucanum (Phil.) Kuntze var. *glaucescens* (Phil.) Reiche = **Adesmia glaucescens** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1960a, 1967b.

Patagonium arboreum (Bertero ex Clos) Kuntze = **Adesmia confusa** Ulibarri

Patagonium arenicola R.E. Fr. = **Adesmia arenicola** (R.E. Fr.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1939a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium argenteum (Meyen) Kuntze = **Adesmia argentea** Meyen

Patagonium argyrophyllum (Phil.) Kuntze = **Adesmia argyrophylla** Phil.

Patagonium arvense (Phil.) Kuntze = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**

Patagonium asperum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia aspera** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium atacamense (Phil.) Kuntze = **Adesmia atacamensis** Phil.

Patagonium axillare (Phil.) Kuntze = **Adesmia parvifolia** Phil.

Patagonium balsamicum (Bertero ex Colla) Kuntze = **Adesmia balsamica** Bertero ex Colla

Patagonium berteroi (Kuntze) Speg., comb. superfl. = **Adesmia exilis** Clos

Patagonium bicolor (Poir.) Kuntze = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium bijugum (Phil.) Reiche = **Adesmia bijuga** Phil.

Patagonium boronioides (Hook. f.) Kuntze = **Adesmia boronioides** Hook. f.

Patagonium brachycarpum (Phil.) Kuntze = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.

Patagonium bracteatum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia brachysemeon** Phil.

Patagonium caespitosum (Phil.) Reiche = **Adesmia minor** (Hook. & Arn.) Burkart var. **caespitosa** (Phil.) Ulibarri & Burkart

Patagonium calocarpum (Phil.) Kuntze = **Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium calycosum (Phil.) Reiche = **Adesmia monosperma** Clos

Patagonium campestre Rendle = **Adesmia volckmannii** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium candidum (Hook. f.) Macloskie = **Adesmia candida** Hook. f. var. **candida**

Patagonium carnosum (Dusén) Speg. = **Adesmia salicornioides** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium chillanense (Phil.) Reiche = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium ciliatum (Vogel) Kuntze = **Adesmia ciliata** Vogel

Patagonium cinereum (Clos) Kuntze = **Adesmia argentea** Meyen

Patagonium cinereum (Clos) Kuntze var. *dichotomum* (Clos) Reiche = **Adesmia dichotoma** Clos

Patagonium clarenii R.E. Fr. = **Adesmia miraflorensis** J. Remy
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium closii (Phil.) Kuntze = **Adesmia mucronata** Hook. & Arn.

Patagonium colinense Phil. ex Reiche = **Adesmia colinensis** (Phil. ex Reiche) Martic.
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].

Patagonium coluteoides (Phil.) Kuntze = **Adesmia prostrata** Clos var. **eglandulosa** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Patagonium compactum (Phil.) Kuntze = **Adesmia glomerula** Clos var. **glomerula**
Referencias: Burkart, A., 1964b.

Patagonium confertum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.

Patagonium confertum (Hook. & Arn.) Kuntze var. *berteroi* Kuntze = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium coronilloides (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium coronilloides (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium coronilloides (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *glaucum* (Phil.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium corymbosum (Clos) Kuntze = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**

Patagonium crassicaule (Phil.) Reiche = **Adesmia crassicaulis** Phil.

Patagonium cuneatum (Meyen ex Vogel) Kuntze = **Adesmia cuneata** Meyen ex Vogel

Patagonium curvifolium (Clos) Kuntze = **Adesmia curvifolia** Clos

Patagonium cytisoides (Griseb.) Kuntze = **Adesmia cytisoides** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium darapskyanum Phil. ex Reiche = **Adesmia darapskyana** (Phil. ex Reiche) Martic.
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].

Patagonium davilae (Phil.) Kuntze = **Adesmia davilae** Phil.

Patagonium decumbens (Phil.) Kuntze = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium dendrodes (Phil.) Kuntze = **Adesmia propinqua** Clos

Patagonium dentatum (Lag.) Kuntze = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium denticulatum (Clos) Kuntze = **Adesmia denticulata** Clos

Patagonium denudatum (Phil.) Kuntze = **Adesmia denudata** Phil.

Patagonium deserticolum (Phil.) Kuntze = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.

Patagonium dessaueri Phil. ex Reiche = **Adesmia dessaueri** (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Patagonium dichotomum (Clos) Kuntze = **Adesmia dichotoma** Clos

Patagonium dispermum (Phil.) Reiche = **Adesmia disperma** Phil.

Patagonium dumosum (Phil.) Reiche = **Adesmia dumosa** Phil.

Patagonium echinus (C. Presl) Kuntze = **Adesmia echinus** C. Presl

Patagonium elatum (Clos) Kuntze = **Adesmia elata** Clos

Patagonium elegans (Clos) Kuntze = **Adesmia elegans** Clos

Patagonium elongatum (Phil.) Kuntze = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**

Patagonium emarginatum (Clos) Kuntze = **Adesmia emarginata** Clos

Patagonium eremophilum (Phil.) Kuntze = **Adesmia eremophila** Phil.

Patagonium erinaceum (Phil.) Kuntze = **Adesmia erinacea** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium erinaceum (Phil.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia erinacea** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium exile (Clos) Kuntze = **Adesmia exilis** Clos

Patagonium filicaule (Phil.) Kuntze = **Adesmia filicaulis** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Patagonium filifolium (Clos) Kuntze = **Adesmia filifolia** Clos

Patagonium filipes (A. Gray) Speg. = **Adesmia filipes** A. Gray

Patagonium frigidum (Phil.) Kuntze = **Adesmia frigida** Phil.

Patagonium gayanum (Phil.) Kuntze = **Adesmia echinus** C. Presl

Patagonium genistoides (C. Presl) Kuntze = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.

Patagonium genistoides (C. Presl) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.

Patagonium germainii (Phil.) Kuntze = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium germainii (Phil.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium gilliesii (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **gilliesii** (Hook. & Arn.) Burkart

Patagonium glabriusculum (Vogel) Kuntze = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a, 1967b.

Patagonium glanduliferum Rendle = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium glandulosum (Phil.) Kuntze = **Adesmia atacamensis** Phil.

Patagonium glareosum Chodat & Wilczek = **Adesmia longipes** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium glaucescens (Phil.) Kuntze = **Adesmia glaucescens** Phil.

Patagonium glaucum (Phil.) Kuntze = **Adesmia coronilloides** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium glomerulum (Clos) Kuntze = **Adesmia glomerula** Clos var. **glomerula**
Referencias: Burkart, A., 1964b.

Patagonium glutinosum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia glutinosa** Hook. & Arn.

Patagonium godoyae Phil. ex Reiche = **Adesmia godoyae** (Phil. ex Reiche) Martic.
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].

Patagonium gracile (Meyen ex Vogel) Kuntze = **Adesmia gracilis** Meyen ex Vogel

Patagonium graminideum (Speg.) Speg. = **Adesmia graminidea** Speg.

Patagonium grandidentatum Rusby = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **dentata** (Lag.) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium grandiflorum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia grandiflora** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium graveolens (Phil.) Kuntze = **Adesmia obscura** Clos

Patagonium griseum (Hook. f.) Speg. = **Adesmia incana** Vogel var. **grisea** (Hook. f.) Burkart

Patagonium hedysaroides Schrank = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **muricata**
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium hirsutum (Phil.) Kuntze = **Adesmia hirsuta** Phil.

Patagonium horridum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium humifusum Kuntze = **Adesmia exilis** Clos

Patagonium humile (Phil.) Kuntze = **Adesmia glomerula** Clos var. **glomerula**
Referencias: Burkart, A., 1964b.

Patagonium hystrix (Phil.) Kuntze = **Adesmia hystrix** Phil.

Patagonium incanum (Vogel) Kuntze = **Adesmia incana** Vogel var. **incana**

Patagonium inconspicum (Phil.) Kuntze = **Adesmia exilis** Clos

Patagonium intricatum Phil. = **Adesmia pungens** Clos
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Patagonium karraikense (Speg.) Speg. = **Adesmia karraikensis** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium kingii (Phil.) Kuntze = **Adesmia kingii** Phil.

Patagonium lanatum (Hook. f.) Kuntze = **Adesmia lanata** Hook. f.

Patagonium lanatum (Hook. f.) Kuntze var. *axillaris* (Phil.) Speg. = **Adesmia parvifolia** Phil.
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

Patagonium landbecki (Phil.) Kuntze = **Adesmia landbecki** Phil.

Patagonium latifolium (Spreng.) Kuntze = **Adesmia latifolia** (Spreng.) Vogel
Referencias: Ulibarri, E. A., 1978.

Patagonium laxum (Clos) Kuntze = **Adesmia laxa** Clos

Patagonium leiocarpum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia leiocarpa** Hook. & Arn.

Patagonium leiocarpum (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elatum* (Clos) Reiche = **Adesmia elata** Clos

Patagonium leiocarpum (Hook. & Arn.) Kuntze var. *elongatum* (Phil.) Reiche = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**

Patagonium leptacanthum (Phil.) Kuntze = **Adesmia obovata** Clos

Patagonium leptopodum (Speg.) Speg. = **Adesmia pumila** Hook. f.

Patagonium leucopogon (Phil.) Kuntze = **Adesmia horrida** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium longipes (Phil.) Kuntze = **Adesmia longipes** Phil.

Patagonium longisetum (DC.) Kuntze = **Adesmia longiseta** DC.

Patagonium longisetum (DC.) Kuntze var. *landbeckii* (Phil.) Reiche = **Adesmia landbecki** Phil.

Patagonium lotoides (Hook. f.) Kuntze = **Adesmia lotoides** Hook. f.

Patagonium lotoides (Hook. f.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia lotoides** Hook. f.

Patagonium loudonii (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia loudonia** Hook. & Arn.

Patagonium loudonii (Hook. & Arn.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia loudonia** Hook. & Arn.

Patagonium macrostachyum (Benth.) Kuntze = **Adesmia macrostachya** Benth.

Patagonium maulinum Reiche = **Adesmia maulina** (Reiche) K. Schum.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Patagonium medinae (Phil. ex Reiche) Reiche = **Adesmia medinae** (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A., 1982.

Patagonium melanocaulon (Phil.) Reiche = **Adesmia melanocaulos** Phil.

Patagonium melanthes (Phil.) Reiche = **Adesmia melanthes** Phil.

Patagonium meyenianum (Phil.) Kuntze = **Adesmia prostrata** Clos var. **prostrata**
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Patagonium micranthum (Phil.) Kuntze = **Adesmia micrantha** Phil.

Patagonium microcalyx (Phil.) Reiche = **Adesmia microcalyx** Phil. var. **microcalyx**

Patagonium microphyllum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia microphylla** Hook. & Arn.

Patagonium miraflorensis (J. Remy) Rusby = **Adesmia miraflorensis** J. Remy

Patagonium monospermum (Clos) Kuntze = **Adesmia monosperma** Clos

Patagonium montanum (Phil.) Kuntze = **Adesmia montana** Phil.

Patagonium morenonis (Harms) Kuntze = **Adesmia villosa** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium mucronatum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia mucronata** Hook. & Arn.

Patagonium mucronatum (Hook. & Arn.) Kuntze var. *apricum* (Phil.) Reiche = **Adesmia viscida** Bertero ex Colla

Patagonium mucronatum (Hook. & Arn.) Kuntze var. *asperum* (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche = **Adesmia aspera** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium multicuspe (Clos) Kuntze = **Adesmia multicuspis** Clos
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.

Patagonium muricatum (Jacq.) Kuntze = **Adesmia muricata** (Jacq.) DC. var. **muricata**
Referencias: Burkart, A., 1954; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

[Patagonium muricatum (Jacq.) Kuntze var. incanum Kuntze]
Referencias: Burkart, A., 1954; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.
Notas: Nombre dudoso.

Patagonium nanun Chodat & Wilczek = **Adesmia nana** (Chodat & Wilczek) Hauman
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium negeri (Dusén) Macloskie = **Adesmia karraikensis** Speg.

Patagonium nordenskioldii R.E. Fr. = **Adesmia miraflorensis** J. Remy
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium obcordatum (Clos) Kuntze = **Adesmia obcordata** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium obovatum (Clos) Kuntze = **Adesmia obovata** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium obscurum (Clos) Kuntze = **Adesmia obscura** Clos

Patagonium obscurum (Clos) Kuntze var. *graveolens* (Phil.) Reiche = **Adesmia obscura** Clos

Patagonium occultum R.E. Fr. = **Adesmia occulta** (R.E. Fr.) Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium odontophyllum (Phil.) Kuntze = **Adesmia odontophylla** Phil.

Patagonium oligophyllum (Phil.) Kuntze = **Adesmia capitellata** (Clos) Hauman
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A., 1994a.

Patagonium oresigenum (Phil.) Kuntze = **Adesmia arachnipes** Clos

Patagonium oxalidophyllum (Phil.) Kuntze = **Adesmia multicuspis** Clos
Referencias: Burkart, A., 1960a.

Patagonium palenae (Phil.) Reiche = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**

Patagonium papposum (Lag.) Kuntze = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **papposa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium parviflorum (Clos) Kuntze = **Adesmia parviflora** Clos

Patagonium parviflorum (Clos) Kuntze var. *micranthum* (Phil.) Reiche = **Adesmia micrantha** Phil.

Patagonium parvifolium (Phil.) Reiche = **Adesmia parvifolia** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium parvifolium (Phil.) Reiche var. *axillare* (Phil.) Reiche = **Adesmia parvifolia** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium parvulum (Phil.) Kuntze = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**

Patagonium patagonicum (Speg.) Speg. = **Adesmia patagonica** Speg.

Patagonium patancanum (Ulbr.) Rusby = **Adesmia occulta** (R.E. Fr.) Burkart

Patagonium pauciflorum (Vogel) Kuntze = **Adesmia pauciflora** Vogel

Patagonium pearcei (Phil.) Kuntze = **Adesmia pearcei** Phil.

Patagonium pedicellatum (Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.

Patagonium pentaphyllum (Phil.) Reiche = **Adesmia pentaphylla** Phil.

Patagonium peraltae Phil. ex Reiche = **Adesmia peraltae** (Phil. ex Reiche) Ulibarri

Patagonium philippianum Hosseus = **Adesmia trifoliata** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Patagonium phylloideum (Clos) Kuntze = **Adesmia phylloidea** Clos

Patagonium pinifolium (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub. = **Adesmia pinifolia** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A., 1986.

Patagonium polygaloides Chodat & Wilczek = **Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium polyphyllum (Phil.) Reiche = **Adesmia polyphylla** Phil.

Patagonium propinquum (Clos) Kuntze = **Adesmia propinqua** Clos

Patagonium prostratum (Clos) Kuntze = **Adesmia prostrata** Clos var. **prostrata**
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Patagonium psilocarpum (Phil.) Kuntze = **Adesmia leiocarpa** Hook. & Arn.

Patagonium psoralodes (Vogel) Kuntze = **Adesmia psoraleoides** Vogel

Patagonium pulchrum (Phil.) Kuntze = **Adesmia viscosa** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium pumilum (Hook. f.) Kuntze = **Adesmia pumila** Hook. f.

Patagonium pungens (Clos) Kuntze = **Adesmia pungens** Clos

Patagonium pusillum (Phil.) Kuntze = **Adesmia pusilla** Phil.

Patagonium quadrijugum (Phil.) Kuntze = **Adesmia volckmannii** Phil.

Patagonium radicans (Clos) Kuntze = **Adesmia bicolor** (Poir.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1966a; Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium radicans (Clos) Kuntze var. *filicaule* (Phil.) Reiche = **Adesmia filicaulis** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1966a.

Patagonium radicifolium (Clos) Kuntze = **Adesmia papposa** (Lag.) DC. var. **radicifolia** (Clos) M.N. Correa

Patagonium rafaelense Chodat & Wilczek = **Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium rahmeri (Phil.) Reiche = **Adesmia rahmeri** Phil.

Patagonium ramosissimum (Phil.) Kuntze = **Adesmia ramosissima** Phil.

Patagonium renjifoanum Phil. ex Reiche = **Adesmia renjifoana** (Phil. ex Reiche) Ulibarri
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium resinosum Phil. ex Reiche = **Adesmia resinosa** (Phil. ex Reiche) Martic.
Referencias: Marticorena, C., 2001[2000].

Patagonium retrofractum Chodat & Wilczek var. *rectirostris* Chodat & Wilczek = **Adesmia retrofracta** Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium retusum (Griseb.) Kuntze = **Adesmia retusa** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium retusum (Griseb.) Kuntze var. *grisebachii* (Phil.) Reiche = **Adesmia retusa** Griseb.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium salicornioides (Speg.) Speg. = **Adesmia salicornioides** Speg.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium schneideri (Phil.) Kuntze = **Adesmia schneideri** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium schneideri (Phil.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia schneideri** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium senticulum (Phil.) Reiche = **Adesmia erinacea** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium sentis (Phil.) Reiche = **Adesmia hystrix** Phil.

Patagonium serrazzianum (Speg.) Speg. = **Adesmia obscura** Clos

Patagonium sessiliflorum (Phil.) Kuntze = **Adesmia sessiliflora** Phil.

Patagonium silvestrii Speg. = **Adesmia silvestrii** (Speg.) Burkart
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium simonsii (Phil.) Kuntze = **Adesmia viscida** Bertero ex Colla

Patagonium smithiae (DC.) Kuntze = **Adesmia smithiae** DC.

Patagonium spinosissimum (Meyen) Kuntze = **Adesmia spinosissima** Meyen
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium stipulaceum (Clos) Kuntze = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.

Patagonium subsericeum Chodat & Wilczek = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium subterraneum (Clos) Kuntze = **Adesmia subterranea** Clos

Patagonium suffocatum (Hook. f.) Macloskie = **Adesmia suffocata** Hook. f.

Patagonium tehuelches (Speg.) Speg. = **Adesmia tehuelcha** Speg.

Patagonium tenuicaule (Phil.) Reiche = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**

Patagonium torcaeum (Phil.) Reiche = **Adesmia torcaea** Phil.

Patagonium trifoliatum (Phil.) Kuntze = **Adesmia trifoliata** Phil.

Patagonium trifoliolatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze ex Taub. = **Adesmia trifoliolata** Gillies ex Hook. & Arn. var. **trifoliolata**
Referencias: Burkart, A. & Correa, M. N., 1984; Burkart, A., 1962, 1967b.

Patagonium trijugum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia trijuga** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium trijugum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze var. *remyanum* (Phil.) Reiche = **Adesmia aegiceras** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium triphyllum Speg. = **Adesmia trifoliata** Phil.
Referencias: Burkart, A., 1967b.

Patagonium triste Chodat & Wilczek = **Adesmia exilis** Clos
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium ulicinum (C. Presl) Kuntze = **Adesmia pedicellata** Hook. & Arn.

Patagonium uspallatense (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia uspallatensis** Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium valdesium (Clos) Kuntze = **Adesmia exilis** Clos

Patagonium vallis-pulchrae Reiche = **Adesmia corymbosa** Clos var. **corymbosa**
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium venosum (Phil.) Reiche = **Adesmia conferta** Hook. & Arn.

Patagonium vesicarium (Bertero ex Colla) Kuntze, comb. superfl. = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**

Patagonium vesicarium (Bertero ex Colla) Reiche = **Adesmia tenella** Hook. & Arn. var. **tenella**

Patagonium villanuevae Reiche = **Adesmia hystrix** Phil.

Patagonium villosum (Phil.) Reiche = **Adesmia obscura** Clos

Patagonium villosum (Hook. f.) Speg. var. *glabratum* Speg. = **Adesmia villosa** Hook. f.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium virens (Phil.) Reiche = **Adesmia virens** Phil.

Patagonium viscosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze = **Adesmia viscosa** Gillies ex Hook. & Arn.

Patagonium volckmannii (Phil.) Kuntze = **Adesmia volckmannii** Phil.
Referencias: Ulibarri, E. A. & Burkart, A., 2000.

Patagonium volckmannii (Phil.) Reiche, comb. superfl. = **Adesmia volckmannii** Phil.

Pauletia affinis (Vogel) A. Schmitz = **Bauhinia affinis** Vogel
Referencias: Fortunato, R. H., 1996.

Pauletia bauhinioides (Mart.) A. Schmitz = **Bauhinia bauhinioides** (Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Pauletia candicans (Benth.) A. Schmitz = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Pauletia cheilantha Bong. = **Bauhinia cheilantha** (Bong.) Steud.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Pauletia cuiabensis Bong. = **Bauhinia ungulata** L. var. **cuiabensis** (Bong.) Vaz

Pauletia dodecandra Bong. = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Pauletia holophylla Bong. = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.

Pauletia longifolia Bong. = **Bauhinia longifolia** (Bong.) Steud.
Referencias: Vaz, A. M. S. F. & Tozzi, A. M. G. A., 2003.

Pauletia mollis Bong. = **Bauhinia mollis** (Bong.) D. Dietr. var. **mollis**
Referencias: Fortunato, R. H., 1984c.

Pauletia pentandra Bong. = **Bauhinia pentandra** (Bong.) Vogel ex Steud.

Pauletia pruinosa (Vogel) A. Schmitz = **Bauhinia forficata** Link subsp. **pruinosa** (Vogel) Fortunato & Wunderlin
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Pauletia rufa Bong. = **Bauhinia rufa** (Bong.) Steud.

Pauletia rufa Bong. var. *cordata* (Vogel) A. Schmitz = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Pauletia rufa Bong. var. *dodecandra* (Bong.) A. Schmit = **Bauhinia holophylla** (Bong.) Steud.

Pauletia ungulata (L.) A. Schmitz = **Bauhinia ungulata** L. var. **ungulata**

Peltophorum (Vogel) Benth.

Número de especies: 1 endémica

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
Sin.: *Brasilettia dubia* (Spreng.) Kuntze, *Caesalpinia dubia* Spreng., *Peltophorum vogelianum* Benth., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *ferruginea* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *glabrata* Chodat & Hassl., *Peltophorum vogelianum* Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Rambo, B., 1966; Ulibarri, E. A., 1997a.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, MIS, SFE); BRA(RGS, SCA); PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, COA, GUA, ITA, PAI); URY(ART, MON, RNO, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Deginani, N. B. 1205* (SI), *Rodríguez {2° serie}, F. M. 168* (SI)]; BRA[*Reitz, P. R. 5566* (PACA)]; PRY[*Jörgensen, P. 4187* (SI), *Zardini, E. M. 5653* (FCQ, MO)]; URY[*Berro, M. B. 1780* (MVFA)].

Peltophorum vogelianum Benth. = **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Ulibarri, E. A., 1997a.

Peltophorum vogelianum Benth. f. *ferruginea* Chodat & Hassl. = **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.

Peltophorum vogelianum Benth. f. *glabrata* Chodat & Hassl. = **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.

Peltophorum vogelianum Benth. f. *intermedia* Chodat & Hassl. = **Peltophorum dubium** (Spreng.) Taub.

Periandra Mart. ex Benth.

Número de especies: 1

Periandra angulata Benth. = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Periandra dulcis Mart. ex Benth. = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.
Sin.: *Glycinopsis mediterranea* (Vell.) Kuntze, *Glycirrhiza mediterranea* Vell., *Periandra angulata* Benth., *Periandra dulcis* Mart. ex Benth., *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *linearifoliolata* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *microphylla* N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mediterranea* (Vell.) Taub. var. *mucronata* (Benth.) Burkart ex N.F. Mattos & F. Oliveira, *Periandra mucronata* Benth., *Periandra racemosa* Benth.
Referencias: Mattos, N. F., 1973.
Arbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 17864* (NY)].

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. var. *linearifoliolata* N.F. Mattos & F. Oliveira = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. var. *microphylla* N.F. Mattos & F. Oliveira = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Periandra mediterranea (Vell.) Taub. var. *mucronata* (Benth.) Burkart ex N.F. Mattos & F. Oliveira = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Periandra mucronata Benth. = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Periandra racemosa Benth. = **Periandra mediterranea** (Vell.) Taub.

Perlebia bauhinioides Mart. = **Bauhinia bauhinioides** (Mart.) J.F. Macbr.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Fortunato, R. H., 1986.

Phaca acutidens Phil. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca amoena Phil. = **Astragalus philippianus** (Kuntze) Hauman
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca andicola Gillies ex Hook. & Arn. = **Astragalus carinatus** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca araucana F. Phil. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca arnottiana Gillies ex Hook. & Arn. = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca atacamensis Phil. = **Astragalus coquimbensis** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca berteriana Moris = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca brachyptera Phil. = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca brachytropis Phil., hom. illeg. = **Astragalus maulensis** Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1997e.

Phaca bustillosi Phil. = **Astragalus vesiculosus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca canescens Hook. & Arn. = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca carinata Hook. & Arn. = **Astragalus carinatus** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca carrizalensis Phil. = **Astragalus coquimbensis** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca chamissonis Vogel = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984.

Phaca chilensis Nees = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca chrysantha Moris = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca clandestina (Phil.) Hieron. = **Astragalus cryptobotrys** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca compacta Phil. = **Astragalus reichei** Speg.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca concinna Phil. = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca coquimbensis Hook. & Arn. = **Astragalus coquimbensis** (Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca cruckshanksii Hook. & Arn. = **Astragalus cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Phaca cryptantha Phil. = **Astragalus cryptobotrys** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca curvicaulis Clos = **Astragalus curvicaulis** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca depauperata Phil. = **Astragalus bustillosii** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca diminutiva Phil. = **Astragalus diminutivus** (Phil.) Gómez-Sosa var. **diminutivus**

Phaca dissitiflora Phil. = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca dolichostachya Phil. = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca domeykoana Phil. = **Astragalus domeykoanus** (Phil.) Reiche
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984.

Phaca edmonstonei Hook. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca elata Hook. & Arn. = **Astragalus curvicaulis** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca flava Hook. & Arn. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca grata Clos = **Astragalus berteri** Colla
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca inflata Gillies ex Hook. & Arn. = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.

Phaca landbecki Phil. = **Astragalus cruckshanksii** (Hook. & Arn.) Griseb.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca laxiflora Phil. = **Astragalus berterianus** (Moris) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca macrocarpa Phil. = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984, 1994; Johnston, I. M., 1947.

Phaca macrophysa Phil. = **Astragalus darumbium** (Bertero ex Colla) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca nana Phil. = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca nubigena Meyen ex Vogel = **Astragalus vesiculosus** Clos
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Phaca ochroleuca Hook. & Arn. = **Astragalus chamissonis** (Vogel) Reiche
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1979, 1984; Johnston, I. M., 1947.

Phaca oligantha Phil. = **Astragalus orthocarpus** I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca oreophila Phil. = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**

Phaca orites Phil. = **Astragalus domeykoanus** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca palenae Phil. = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca patagonica Phil. = **Astragalus patagonicus** (Phil.) Speg.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Phaca pissisii Phil. = **Astragalus pissisii** (Phil.) I.M. Johnst.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca podocarpa Phil. = **Astragalus edmonstonei** (Hook.) B.L. Rob.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca pulchella Clos = **Astragalus bellus** (Kuntze) R.E. Fr.
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca quindecimjugus Phil. = **Astragalus quindecimjugus** (Phil.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca rahmeri Phil. = **Astragalus palenae** (Phil.) Reiche var. **palenae**
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca reedi Phil. = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca robusta Phil. = **Astragalus darumbium** (Bertero ex Colla) Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca salsula Pall. = **Sphaerophysa salsula** (Pall.) DC.
Referencias: Barneby, R. C., 1964.

Phaca san-romani Phil. = **Astragalus vagus** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca saxifraga Phil. = **Astragalus bustillosii** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca striata Clos = **Astragalus pehuenches** Niederl.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1984; Johnston, I. M., 1947.

Phaca tricolor Clos = **Astragalus amatus** Clos
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca triflora DC. = **Astragalus triflorus** (DC.) A. Gray

Phaca uspallatensis Phil. = **Astragalus arnottianus** (Gillies ex Hook. & Arn.) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca vaga Clos = **Astragalus vagus** (Clos) Reiche
Referencias: Johnston, I. M., 1947.

Phaca verticillata Phil. = **Astragalus verticillatus** (Phil.) Reiche
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1997e; Johnston, I. M., 1947.

Phaseolus L.

Número de especies: 3

Phaseolus aborigineus Burkart = **Phaseolus vulgaris** L. var. **aborigineus** (Burkart) Baudet
Referencias: Baudet, J., 1977.

Phaseolus adenanthus G. Mey. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

[Phaseolus adenanthus G. Mey. f. guaraniticus Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Phaseolus adenanthus G. Mey. f. subtortus Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Phaseolus adenanthus G. Mey. f. *velutinus* (Chodat & Hassl.) Hassl. = **Phaseolus truxillensis** Kunth f. **velutina** Chodat & Hassl.

Phaseolus adenanthus G. Mey. var. *caeduorum* (Mart.) Hassl. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus adenanthus G. Mey. var. *genuinus* Hassl., nom. inval. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus adenanthus G. Mey. var. *radicans* (Benth.) Hassl. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus adenanthus G. Mey. var. *truxillensis* (Kunth) Hassl. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus amoenus Macfad. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus amplus Benth. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus appendiculatus Benth. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus asper Benth. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus atropurpureus Moq. & Sessé ex DC. = **Macroptilium atropurpureum** (Moq. & Sessé ex DC.) Urb.
Referencias: Moreira, J. L. A., 1997.

Phaseolus augusti Harms
Sin.: *Phaseolus bolivianus* Piper
Referencias: Burkart, A., 1942a; Harms, H. A. T., 1921; Marechal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.
Hierba o enredadera. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 10671* (SI)].

Phaseolus balansae Micheli = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001b.

Phaseolus barbulatus Benth. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus bertonii Franceschi ex Benth. = **Vigna caracalla** (L.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus bolivianus Piper = **Phaseolus augusti** Harms
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001b.

Phaseolus brachycalix Hassl. = **Macroptilium sabaraense** (Hoehne) V.P. Barbosa
Referencias: Barbosa, V. P., 1987.

Phaseolus bracteatus Nees & Mart. = **Macroptilium bracteatum** (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus bracteatus Nees & Mart. f. *panduriformis* Hassl. = **Macroptilium bracteatum** (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus bracteatus Nees & Mart. f. *rhomboidalis* Hassl. = **Macroptilium bracteatum** (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus brevipes Benth. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus caeduorum Mart. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus candidus Vell. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Burkart, A., 1987a; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus candidus Vell. f. *appendiculatus* (Benth.) Hassl. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

[Phaseolus candidus Vell. f. integer Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

[Phaseolus candidus Vell. f. intermedius Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Phaseolus candidus Vell. f. *obliquifolius* (Benth.) Hassl. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus candidus Vell. f. *sublobatus* (Micheli) Hassl. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus candidus Vell. var. *genuinus* Hassl., nom. inval. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus candidus Vell. var. *membranaceus* (Benth.) Hassl. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus caracalla L. = **Vigna caracalla** (L.) Verdc.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Verdcourt, B., 1970.

[Phaseolus caracalla L. var. brachystachys Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Phaseolus caracallensis (St.-Hil.) Lag. = **Vigna caracalla** (L.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus chacoensis Hassl. = **Macroptilium chacoensis** (Hassl.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1991.

Phaseolus chacoensis Hassl. f. *elatus* Hassl. = **Macroptilium chacoensis** (Hassl.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1991.

Phaseolus cirrhosus Kunth = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus clitorioides Mart. ex Benth. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus clitorioides Mart. ex Benth. var. *modestus* Benth. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus cochleatus Vell. = **Vigna caracalla** (L.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus coriaceus Desv. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus crassifolius Mart. ex Benth. = **Vigna firmula** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus crotalarioides Mart. ex Benth. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus cuernavacanus Rose = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus cumingii Benth. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus decipiens Salzm. ex Benth. = **Macroptilium bracteatum** (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus dolichicarpus Burkart = **Dolichopsis ligulata** (Piper) A. Delgado
Referencias: Delgado-Salinas, A. & Torres-Colín, L., 2004.

Phaseolus elongatus Rose = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus erythroloma Mart. ex Benth. = **Macroptilium erythroloma** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Urban, I., 1928.

Phaseolus firmulus Mart. ex Benth. = **Vigna firmula** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus firmulus Mart. ex Benth. var. *crassifolius* (Mart. ex Benth.) Hassl. = **Vigna firmula** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus fraternus Piper = **Macroptilium fraternum** (Piper) Juárez

Phaseolus geophilus Burkart = **Macroptilium panduratum** (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a.

Phaseolus grandiflorus Steud. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus hastifolius Mart. ex Benth. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus hirsutus Mart. ex Benth. = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Phaseolus lasiocarpus Mart. ex Benth. = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Phaseolus lasiocarpus Mart. ex Benth. var. *balansae* (Micheli) Chodat & Hassl. = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.

Phaseolus lasiocarpus Mart. ex Benth. var. *igatimianus* Chodat & Hassl. = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.

Phaseolus lathyroides L. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus lathyroides L. f. *chacoensis* Hassl. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus lathyroides L. f. *hirsutus* Hassl. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus lathyroides L. f. *reapandus* Hassl. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus lathyroides L. f. *typicus* Hassl., nom. inval. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus lathyroides L. var. *genuinus* Hassl., nom. inval. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus lathyroides L. var. *semierectus* (L.) Hassl. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus ligulatus Piper = **Dolichopsis ligulata** (Piper) A. Delgado

Phaseolus linearis Kunth = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus linearis Kunth var. *coriaceus* (Desv.) Chodat & Hassl. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus linearis Kunth var. *latifolius* Benth. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus linearis Kunth var. *violaceus* (Vell.) Hassl. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus lobatus Hook. = **Vigna hookeri** Verdc.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus longepedunculatus Mart. ex Benth. = **Macroptilium longepedunculatum** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Urban, I., 1928.

Phaseolus longepedunculatus Mart. ex Benth. var. *angustifolius* Benth. = **Macroptilium longepedunculatum** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus longepedunculatus Mart. ex Benth. var. *latifolius* Benth. = **Macroptilium longepedunculatum** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus longepedunculatus Mart. ex Benth. var. *subcoriaceus* Benth. = **Macroptilium longepedunculatum** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus longifolius Benth. = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Verdcourt, B., 1970.

Phaseolus longirostratus Ducke = **Vigna caracalla** (L.) Verdc.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus lunatus L. var. **sylvester** Baudet
Referencias: Baudet, J., 1977; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978; Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001b.
Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 300–1600 m.
Países: ARG(CHA, JUJ, MIS, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ahumada, O. 4622* (SI)].

Phaseolus luteolus (Jacq.) Gagnep. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Verdcourt, B., 1970.

Phaseolus macfadyenii Steud. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus maritimus (Vell.) Benth. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987.

Phaseolus maritimus Salzm., nom. nud. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus martii Benth. = **Macroptilium martii** (Benth.) Maréchal & Baudet

Phaseolus membranaceus Benth. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus modestus Mart. ex Benth. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus monophyllum Benth. = **Macroptilium monophyllum** (Benth.) Maréchal & Baudet
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Maréchal, R. J. J. M. & Baudet, J., 1977.

Phaseolus monophyllus Benth. var. *rufus* (Micheli) Hassl. = **Macroptilium erythroloma** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus obliquifolius Mart. ex Benth. = **Vigna candida** (Vell.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus oblongifolius Micheli = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus occidentalis Rose = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus ovatus Benth. = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. = **Macroptilium panduratum** (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a.

Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. f. *eupanduratus* Hassl., nom. inval. = **Macroptilium panduratum** (Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1995a.

Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. f. *ovatifolius* Hassl. = **Macroptilium psammodes** (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1994, 1995a; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. f. *psammodes* (Lindm.) Hassl. = **Macroptilium psammodes** (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1994; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus panduratus Mart. ex Benth. var. *tuberosus* Hicken = **Macroptilium fraternum** (Piper) Juárez

Phaseolus pascuorum Mart. ex Benth. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **peduncularis**

Phaseolus peduncularis Kunth = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **peduncularis**
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

[Phaseolus peduncularis Kunth f. intermedius Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Phaseolus peduncularis Kunth f. *oblongifolius* (Micheli) Hassl. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus peduncularis Kunth f. *pius* (Mart. ex Benth.) Hassl. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

[Phaseolus peduncularis Kunth f. subhastatus Hassl.]
Notas: Nombre dudoso.

Phaseolus peduncularis Kunth f. *typicus* Hassl., nom. inval. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus peduncularis Kunth var. *clitorioides* (Mart. ex Benth.) Hassl. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus pilosus Kunth, nom. illeg. = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001b.

Phaseolus pilosus Kunth var. *lasiocarpus* (Mart.) Hassl. = **Vigna lasiocarpa** (Mart. ex Benth.) Verdc.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Phaseolus pius Mart. ex Benth. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **clitorioides** (Mart. ex Benth.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus productus Ducke = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus prostratus Benth. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.
Referencias: Urban, I., 1928.

Phaseolus prostratus Benth. f. *hirsutus* Hassl. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.

Phaseolus prostratus Benth. f. *linearifoliolatus* Hassl. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.

Phaseolus prostratus Benth. f. *macrophyllus* Hassl. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.

Phaseolus prostratus Benth. f. *pseudo-ovatifolius* Hassl. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus prostratus Benth. var. *angustifolius* Benth. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987.

Phaseolus prostratus Benth. var. *ovatifolius* Benth. = **Macroptilium prostratum** (Benth.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus psammodes Lindm. = **Macroptilium psammodes** (Lindm.) S.I. Drewes & R.A. Palacios
Referencias: Drewes, S. I. & Palacios, R. A., 1994; Drewes, S. I., 1995; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Phaseolus psoraleoides Wight & Arn. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus radicans Benth. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus rubidus Piper = **Macroptilium erythroloma** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001b.

Phaseolus rufus Micheli, hom. illeg. = **Macroptilium erythroloma** (Mart. ex Benth.) Urb.
Referencias: Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus sabaraensis Hoehne = **Macroptilium sabaraense** (Hoehne) V.P. Barbosa

Phaseolus schottii Benth. = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus schottii Benth. f. *ovatus* (Benth.) Hassl. = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.

Phaseolus schottii Benth. var. *genuinus* Hassl., nom. inval. = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus schottii Benth. var. *longifolius* (Benth.) Hassl. = **Vigna longifolia** (Benth.) Verdc.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus semierectus L. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus semierectus L. var. *angustifolius* Benth. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus semierectus L. var. *nanus* Benth. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus semierectus L. var. *subhastatus* Benth. = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus senegalensis Guill. & Perr. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus speciosus Kunth = **Vigna speciosa** (Kunth) Verdc.
Referencias: Moreira, J. L. A., 1997.

Phaseolus spixianus Mart. ex Benth. = **Vigna peduncularis** (Kunth) Fawc. & Rendle var. **peduncularis**

Phaseolus strictus Braun & Bouché = **Macroptilium lathyroides** (L.) Urb.
Referencias: Barbosa, V. P., 1987; Drewes, S. I., 1995.

Phaseolus subtortus Benth. = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

Phaseolus truxillensis Kunth = **Vigna adenantha** (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier
Referencias: Burkart, A., 1987a; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.

[Phaseolus truxillensis Kunth f. velutina Chodat & Hassl.]
Sin.: *Phaseolus adenanthus* G. Mey. f. *velutinus* (Chodat & Hassl.) Hassl.
Notas: Nombre dudoso.

Phaseolus violaceus Vell. = **Vigna linearis** (Kunth) Maréchal, Mascherpa & Stainier

Phaseolus vulgaris L. var. **aborigineus** (Burkart) Baudet
Sin.: *Phaseolus aborigineus* Burkart, *Phaseolus vulgaris* L. subsp. *aborigineus* (Burkart) Burkart
Referencias: Baudet, J., 1977; Maréchal, R. J. J. M., Mascherpa, J. M. & Stainier, F., 1978.
Hierba o enredadera. Anual. Nativa. 1000–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, JUJ, SAL, SLU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. L. 30341* (SI)].

Phaseolus vulgaris L. subsp. *aborigineus* (Burkart) Burkart = **Phaseolus vulgaris** L. var. **aborigineus** (Burkart) Baudet
Referencias: Baudet, J., 1977.

Piptadenia Benth.

Número de especies: 4, 1 endémica

Piptadenia affinis Burkart
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Liana. Perenne. Endémica. 300–400 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 8037* (HBR, SI)].

Piptadenia cebil (Griseb.) Griseb. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 2000.

Piptadenia colubrina (Vell.) Benth. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **colubrina**
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Piptadenia communis Benth. = **Piptadenia gonoacantha** (Mart.) J.F. Macbr. var. **gonoacantha**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b.

Piptadenia communis Benth. var. *excelsa* Griseb. = **Parapiptadenia excelsa** (Griseb.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969c; Cialdella, A. M., 2000.

Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo = **Parapiptadenia excelsa** (Griseb.) Burkart

Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo f. *jujuyensis* Griseb. = **Parapiptadenia excelsa** (Griseb.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969c.

Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo f. *tucumanensis* Lillo = **Parapiptadenia excelsa** (Griseb.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1969c.

Piptadenia falcata Benth. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Piptadenia glaziovii Harms = **Pseudopiptadenia warmingii** (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima
Referencias: Burkart, A., 1969c; Burkart, A., 1979b.

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. var. **gonoacantha**
Sin.: *Acacia gonoacantha* Mart., *Piptadenia communis* Benth., *Pityrocarpa gonoacantha* (Mart.) Brenan
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, SCA); PRY(CON).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1800* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 4524* (G)].

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. var. **inermis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Árbol. Nativa. 100–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 18055* (SI), *Reitz, P. R. 9044* (SI)].

[Piptadenia grata (Willd.) J.F. Macbr.]
Sin.: *Acacia grata* Willd.
Notas: Nombre dudoso, posible sinónimo de *Adenanthera colubrina*.

Piptadenia hassleriana Chodat = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964.

Piptadenia hassleriana Chodat var. *fruticosa* Chodat & Hassl. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul

Piptadenia macrocarpa Benth. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 2000.

Piptadenia macrocarpa Benth. f. *microcarpa* Chodat & Hassl. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964.

Piptadenia macrocarpa Benth. f. *puberula* Chodat & Hassl. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964.

Piptadenia macrocarpa Benth. f. *rupestris* Chodat & Hassl. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964.

Piptadenia macrocarpa Benth. var. *cebil* (Griseb.) Chodat & Hassl. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Bernardi, L., 1984; Cialdella, A. M., 2000.

Piptadenia macrocarpa Benth. var. *vestita* Chodat & Hassl. = **Anadenanthera colubrina** (Vell.) Brenan var. **cebil** (Griseb.) Altschul
Referencias: Altschul, S. S. P. R., 1964.

Piptadenia niopo (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spruce = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

[Piptadenia nitida Benth.]
Notas: Especie excluida del área del proyecto.

Piptadenia paniculata Benth. var. **aculeata** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Árbol. Nativa. 0–200 m.
Países: BRA(SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 7097* (SI)].

Piptadenia paniculata Benth. var. **paniculata**
Sin.: *Pityrocarpa paniculata* (Benth.) Brenan
Referencias: Burkart, A., 1979b.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klein, R. M. 7251* (FLOR, HBR, SI)].

Piptadenia paraguensis (Benth.) Lindm. = **Microlobius foetidus** (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis** (Benth.) M. Sousa & G. Andrade
Referencias: Bernardi, L., 1984; Sousa Sánchez, M. & Andrade, G., 1992.

Piptadenia peregrina (L.) Benth. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Piptadenia peregrina (L.) Benth. var. *falcata* (Benth.) Chodat & Hassl. = **Anadenanthera peregrina** (L.) Speg.

Piptadenia quadrifolia N.E. Br. = **Microlobius foetidus** (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis** (Benth.) M. Sousa & G. Andrade
Referencias: Sousa Sánchez, M. & Andrade, G., 1992.

Piptadenia rigida Benth. = **Parapiptadenia rigida** (Benth.) Brenan
Referencias: Bernardi, L., 1984; Brenan, J. P. M., 1963; Cialdella, A. M., 2000; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Piptadenia rigida Benth. var. *grandis* Lindm. = **Parapiptadenia rigida** (Benth.) Brenan

Piptadenia subtilifolia (Kunth) Benth. = **Piptadenia viridiflora** (Kunth) Benth.
Referencias: Burkart, A., 1949c; Cialdella, A. M., 2000.

Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth.
Sin.: *Acacia subtilifolia* Kunth, *Acacia viridiflora* Kunth, *Piptadenia subtilifolia* (Kunth) Benth., *Pityrocarpa viridiflora* (Kunth) Brenan
Referencias: Brenan, J. P. M., 1963; Burkart, A., 1949c; Cialdella, A. M., 2000.
Arbusto o árbol. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 4598* (SI), *Venturi, S. 5057* (SI)].

Piptadeniopsis Burkart

Número de especies: 1 endémica

Piptadeniopsis lomentifera Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1944b; Luckow, M., Fortunato, R. H., Sede, S. & Tatiana, L., 2005.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Arenas, P. 1514* (SI), *Mereles, F. 5436* (FCQ)].

Pirottantha modesta Speg. = **Plathymenia reticulata** Benth.
Referencias: Warwick, M. C. & Lewis, G. P., 2003.

Piscidia erythrina Vell. = **Dahlstedtia pinnata** (Benth.) Malme

Piscidia punicea Cav. = **Sesbania punicea** (Cav.) Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1987a.

Pithecellobium anajuliae Rizzini = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Pithecellobium caribaeum Urb. = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Pithecellobium cataractae (Kunth) Benth. = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium cauliflorum (Willd.) Mart. = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **communis** Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium cauliflorum auct. non (Willd.) Mart. = **Zygia morongii** Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium cauliflorum (Willd.) Mart. f. *nivea* Lindm. = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium chacöense Burkart = **Chloroleucon chacöense** (Burkart) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Pithecellobium divaricatum Benth. = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium edwallii Hoehne = **Albizia edwallii** (Hoehne) Barneby & J.W. Grimes

Pithecellobium foliolosum Benth. = **Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Pithecellobium glabratum Mart. = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **glabrata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium glomeratum (DC.) Benth. = **Zygia cataractae** (Kunth) L. Rico
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium grisebachianum Harms = **Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Pithecellobium guaraniticum Chodat & Hassl. = **Enterolobium timbouva** Mart.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Pithecellobium hassleri Chodat = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Barneby, R. C., 1964.

Pithecellobium langsdorffii Benth. = **Abarema langsdorffii** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Pithecellobium lasiopus Benth. = **Zygia latifolia** (L.) Fawc. & Rendle var. **lasiopus** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium multiflorum (Kunth) Benth. var. *brevipedunculata* Chodat & Hassl. = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Pithecellobium myriophyllum Malme, hom. illeg. = **Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Pithecellobium niopoides Spruce ex Benth. = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Pithecellobium oligandrum Rizzini = **Chloroleucon foliolosum** (Benth.) G.P. Lewis

Pithecellobium paraguense Benth. = **Microlobius foetidus** (Jacq.) M. Sousa & G. Andrade subsp. **paraguensis** (Benth.) M. Sousa & G. Andrade
Referencias: Bernardi, L., 1984; Sousa Sánchez, M. & Andrade, G., 1992.

Pithecellobium pendulum Lindm. = **Albizia inundata** (Mart.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Burkart, A., 1949c.

Pithecellobium pithecolobioides (Harms ex Kuntze) Hassl. = **Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997; Bernardi, L., 1984.

Pithecellobium pithecolobioides (Harms ex Kuntze) Hassl. var. *harmsii* Hassl., nom. superfl. = **Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes

Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium pithecoloboides (Harms ex Kuntze) Hassl. var. *reductum* (Malme) Hassl. = **Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium polycephalum Benth. = **Albizia polycephala** (Benth.) Killip
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Pithecellobium reductum Malme = **Zygia pithecolobioides** (Harms ex Kuntze) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1997.

Pithecellobium scalare Griseb. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Pithecellobium scalare Griseb. f. *parvifolium* Chodat & Hassl. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992c.

Pithecellobium scalare Griseb. var. *hirsutum* Chodat & Hassl. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Hoc, P. S., 1992c.

Pithecellobium tenuiflorum Benth. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Pithecellobium tortum Mart. f. *scalare* (Griseb.) Hassl. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Bernardi, L., 1984; Hoc, P. S., 1992c.

Pithecellobium tortum Mart. var. *pubescens* Benth. = **Chloroleucon tenuiflorum** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes

Pityrocarpa gonoacantha (Mart.) Brenan = **Piptadenia gonoacantha** (Mart.) J.F. Macbr. var. **gonoacantha**
Referencias: Burkart, A., 1979b.

Pityrocarpa paniculata (Benth.) Brenan = **Piptadenia paniculata** Benth. var. **paniculata**
Referencias: Burkart, A., 1979b.

Pityrocarpa viridiflora (Kunth) Brenan = **Piptadenia viridiflora** (Kunth) Benth.
Referencias: Brenan, J. P. M., 1963; Cialdella, A. M., 2000.

Plathymenia Benth.

Número de especies: 1

Plathymenia foliolosa Benth. = **Plathymenia reticulata** Benth.
Referencias: Warwick, M. C. & Lewis, G. P., 2003.

Plathymenia foliolosa Benth. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl. = **Plathymenia reticulata** Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Warwick, M. C. & Lewis, G. P., 2003.

Plathymenia modesta (Speg.) Burkart = **Plathymenia reticulata** Benth.
Referencias: Warwick, M. C. & Lewis, G. P., 2003.

Plathymenia reticulata Benth.
Sin.: *Pirottantha modesta* Speg., *Plathymenia foliolosa* Benth., *Plathymenia foliolosa* Benth. var. *paraguayensis* Chodat & Hassl., *Plathymenia modesta* (Speg.) Burkart, *Plathymenia reticulata* Benth. var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) Malme
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1979b; Warwick, M. C. & Lewis, G. P., 2003.
Árbol. Nativa. 300–1100 m.
Países: BRA(PAR); PRY(AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Spegazzini, C. s.n.* (LPS, SI)]; PRY[*Hassler, E. 7674* (G)].

Plathymenia reticulata Benth. var. *paraguayensis* (Chodat & Hassl.) Malme = **Plathymenia reticulata** Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984.

Platymiscium Vogel

Número de especies: 1

Platymiscium cordatum Taub. = **Platymiscium floribundum** Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.
Referencias: Klitgaard, B. B., 2005.

Platymiscium ellipticum Rusby = **Apuleia leiocarpa** (Vogel) J.F. Macbr.

Platymiscium floribundum Vogel var. **floribundum**
Referencias: Klitgaard, B. B., 1999, 2005.
Árbol. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 529* (SI), *Smith, L. B. 7604* (NY)].

Platymiscium floribundum Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.
Sin.: *Platymiscium cordatum* Taub., *Platymiscium floribundum* Vogel var. *majus* Benth., *Platymiscium latifolium* Benth.
Referencias: Klitgaard, B. B., 1999, 2005.
Árbol. Nativa. 200–300 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Klitgaard, B. B. 49* (NY)].

Platymiscium floribundum Vogel var. *majus* Benth. = **Platymiscium floribundum** Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.
Referencias: Klitgaard, B. B., 1999.

Platymiscium latifolium Benth. = **Platymiscium floribundum** Vogel var. **latifolium** (Benth.) Benth.
Referencias: Klitgaard, B. B., 1999.

Platypodium Vogel

Número de especies: 1

Platypodium elegans Vogel
Sin.: *Platypodium elegans* Vogel var. *major* Benth.
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Bernardi, L., 1984; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Árbol. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR); PRY(APY, AMA, CAN, CON, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 25570* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 10624* (G), *Rojas, T. 8528* (SI)].

Platypodium elegans Vogel var. *major* Benth.
= **Platypodium elegans** Vogel

Poecilanthe Benth.

Número de especies: 1 endémica

Poecilanthe parviflora Benth.
Sin.: *Poecilanthe parviflora* Benth. var. *floribunda* Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Gómez Sosa, E. V., 2000a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1977.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COS, ERI, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(AMA); URY(ART, COL, MON, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 1264* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21529* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 11438* (NY)]; URY[*Burkart, A. 18029* (SI), *Rosengurtt, B. 8590* (MVFA)].

Poecilanthe parviflora Benth. var. *floribunda* Hassl.
= **Poecilanthe parviflora** Benth.

Poinciana bijuga Lour. = **Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.

Poinciana elata Lour. = **Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.

Poinciana gilliesii Wall. ex Hook. = **Caesalpinia gilliesii** (Wall. ex Hook.) D. Dietr.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Lewis, G. P., 1998.

Poinciana pulcherrima L. = **Caesalpinia pulcherrima** (L.) Sw.

Poinciana spinosa Molina = **Caesalpinia spinosa** (Molina) Kuntze

Poiretia Vent.

Número de especies: 3

Poiretia angustifolia Vogel
Referencias: Rudd, V. E., 1972b.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 11866* (SI)].

Poiretia latifolia Vogel
Referencias: Burkart, A., 1939c; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1972b.
Subarbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Zuloaga, F. O. 6545* (SI)]; BRA [*Burkart, A. 25124* (SI)]; PRY[*Jörgensen, P. 4550* (SI)].

Poiretia psoraloides DC. = **Poiretia tetraphylla** (Poir.) Burkart
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rudd, V. E., 1972b.

Poiretia tetraphylla (Poir.) Burkart
Sin.: *Poiretia psoraloides* DC., *Psoralea tetraphylla* Poir.
Referencias: Burkart, A., 1939c, 1987a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rambo, B., 1966; Rudd, V. E., 1972b; Steibel, P., 2001[2000]; Vanni, R. O., 1983.
Subarbusto. Nativa. 0–800 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SDE, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); URY(CAS, CLA, COL, FLA, MAL, MON, PAY, RIV, ROC, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. s.n.* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 35069* (SI)]; URY[*Cabrera, A. 3296* (SI), *Rosengurtt, B. 2821b* (MVFA)].

Poissonia Baill.

Número de especies: 2

Poissonia heterantha (Griseb.) Lavin
Sin.: *Coursetia heterantha* (Griseb.) Lavin, *Neocracca heterantha* (Griseb.) Speg., *Neocracca heterantha* (Griseb.) Speg. var. *minor* (R.E. Fr.) Burkart, *Neocracca kuntzei* (Harms ex Kuntze) Kuntze var. *minor* R.E. Fr., *Tephrosia heterantha* Griseb.
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 1994, 2000a; Lavin, M., 1988; Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.
Hierba. Anual o bianual. Nativa. 500–3500 m.
Países: ARG(CAT, JUJ, LRI, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 31601* (SI)].

Poissonia hypoleuca (Speg.) Hauman = **Poissonia hypoleuca** (Speg.) Lillo
Referencias: Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.

Poissonia hypoleuca (Speg.) Lillo
Sin.: *Chiovendaea hypoleuca* Speg., *Coursetia hypoleuca* (Speg.) Lavin, *Poissonia hypoleuca* (Speg.) Hauman
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000a; Lavin, M., 1988; Lavin, M., Wojciechowski, M. F., Gasson, P. E., Hughes, C. E. & Wheeler, E., 2003.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(JUJ, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 25703* (SI), *Spegazzini, C. L. s.n.* (LPS)].

Pomaria Cav.

Número de especies: 4, 2 endémicas

Pomaria glauca Cav. = **Cercidium praecox** (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. **glaucum** (Cav.) Burkart & Carter
Referencias: Burkart, A. & Carter, A., 1976; Fortunato, R. H., 1984a.

Pomaria parviflora (Micheli) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia balansae* Ulibarri, *Hoffmannseggia parviflora* Micheli
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Balansa, B. 4444* (CORD, F, G, SI)].

Pomaria pilosa (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia epunctata* (Vogel) Benth., *Caesalpinia modesta* Arechav., *Caesalpinia pilosa* (Vogel) Benth., *Cladotrichium epunctatum* Vogel, *Cladotrichium pilosum* Vogel
Referencias: Bernardi, L., 1984; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: BRA(RGS); PRY(COA); URY(CLA, RNO, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Rambo, B. 48968* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 7087* (G)]; URY[*Legrand, C. M. D. E. 2405* (SI)].

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **hauthalii** (Harms) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia dictamnoides* Chodat & Hassl., *Caesalpinia dictamnoides* Chodat & Hassl. f. *punctata* Chodat & Hassl., *Caesalpinia hauthalii* Harms, *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. var. *hauthalii* (Vogel) Hassl., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. var. *intermedia* Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1936; Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(MIS); PRY(APA, AMA, CAU, CAN, COA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schwarz, E. A. 10842* (CTES, LIL)]; PRY[*Hassler, E. 10199* (G, SI)].

Pomaria rubicunda (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis var. **rubicunda**
Sin.: *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. f. *subobtusata* Chodat & Hassl., *Caesalpinia rubicunda* (Vogel) Benth. var. *genuina* Hassl., nom. inval., *Cladotrichium rubicundum* Vogel
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1936; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b, 1997a; Vogel, T., 1837.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAA, CAN, GUA, ITA, MIE, SPE); URY(ART, MON, SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 7971* (BAB, SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2799* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 6259* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 972b* (MVFA, SI)].

Pomaria stipularis (Vogel) B.B. Simpson & G.P. Lewis
Sin.: *Caesalpinia stipularis* (Vogel) Benth., *Cladotrichium stipulare* Vogel
Referencias: Simpson, B. B. & Lewis, G. P., 2003; Ulibarri, E. A., 1996b.
Arbusto. Nativa. 400–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dombrowski, L. T. 765* (SI)].

Prosopidastrum Burkart

Número de especies: 6 endémicas

Prosopidastrum angusticarpum R.A. Palacios & Hoc
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001a, 2005.
Arbusto. Endémica. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, LPA, NEU, RNE, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hoc, P. S. S. 369* (BAFC, MO, SI)].

Prosopidastrum benthami (Chodat & Hassl.) R.A. Palacios & Hoc
Sin.: *Prosopis benthami* Chodat & Wilczek
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2005.
Arbusto. Endémica. 800–1800 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 11394* (SI)].

Prosopidastrum dehiscens R.A. Palacios & Hoc
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001a, 2005.
Arbusto. Endémica. 1400–2200 m.
Países: ARG(MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Palacios, R. A. 2550* (BAFC, MO, SI)].

Prosopidastrum globosum (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Sin.: *Mimosa gilliesii* Benth., *Mimosa globosa* (Gillies ex Hook. & Arn.) J.F. Macbr., *Prosopis globosa* Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001a, 2005.
Arbusto. Endémica. 0–1100 m.
Países: ARG(CAT, MEN, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Biurrun, F. 5416* (SI), *Burkart, A. s.n.* (SI)].

Prosopidastrum gracile R.A. Palacios & Hoc
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2001a, 2005.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CAT, MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hoc, P. S. S. 368* (BAFC, MO, SI)].

Prosopidastrum striatum (Benth.) R.A. Palacios & Hoc
Sin.: *Mimosa striata* (Benth.) Speg., *Prosopis striata* Benth.
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, CHU, MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruiz Leal, R. A. 21481* (SI)].

Prosopis L.

Número de especies: 32, 18 endémicas

Prosopis abbreviata Benth.
Sin.: *Strombocarpa abbreviata* (Benth.) Hutch.
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994.
Arbolito. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, COS, SDE, SJU, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Biurrun, F. 5011* (SI)].

Prosopis abbreviata Benth. var. *argentina* Griseb. = **Prosopis reptans** Benth. var. **reptans**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis adesmioides Griseb. = **Prosopis torquata** (Cav. ex Lag.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis affinis Spreng.
Sin.: *Prosopis algarrobilla* Griseb., *Prosopis algarrobilla* Griseb. var. *ñandubay* (Lorentz ex Griseb.) Hassl., *Prosopis nandubey* Lorentz ex Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Marchiori, J. N. C., Longhi-Wagner, H. M. & Galvão, L., 1983; Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L., 2000.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, SDE, SFE); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, CON, COA, ÑEE, PAI); URY(ART, CLA, COL, MON, PAY, RNO, RIV, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morello, J. s.n.* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 4215* (LIL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 14032* (SI)]; URY[*Brussa, C. 29195* (MVFA), *Rosengurtt, B. 3360b* (SI)].

Prosopis alba Griseb. f. *arborescens* Monticelli, nom. nud. = **Prosopis flexuosa** DC. f. **flexuosa**
Referencias: Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.

Prosopis alba Griseb. f. *fruticosa* (Hauman) Monticelli = **Prosopis flexuosa** DC. var. **depressa** F.A. Roig
Referencias: Roig, F. A., 1998.

Prosopis alba Griseb. var. **alba**
Sin.: *Prosopis atacamensis* Phil., *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC. var. *longisiliqua* Phil.
Referencias: Burkart, A., 1976, 1987a; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Árbol. Nativa. 0–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, SAL, SDE, SFE, SLU); CHL(I, II, III); PRY(APY, CEN, ÑEE, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 28991* (SI), *Zuloaga, F. O. 7902* (SI)]; CHL[*Baeza, C. M. 348* (CONC)]; PRY[*Mereles, F. 5842* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 8480* (SI)].
Notas: Cultivada en Uruguay.

Prosopis alba Griseb. var. **panta** Griseb.
Sin.: *Prosopis panta* (Griseb.) Hieron.
Referencias: Burkart, A., 1976, 1987a.
Árbol. Nativa. 0–2000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, JUJ, SAL, SFE, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Báez, J. R. s.n.* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8418* (SI)].

Prosopis algarrobilla Griseb. = **Prosopis affinis** Spreng.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976.

Prosopis algarrobilla Griseb. var. *ñandubay* (Lorentz ex Griseb.) Hassl. = **Prosopis affinis** Spreng.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976.

Prosopis algarrobilla Griseb. var. *nigra* Griseb. = **Prosopis nigra** (Griseb.) Hieron. var. **nigra**
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Prosopis alpataco Phil. f. **alpataco**
Sin.: *Prosopis stenoloba* Phil.
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Arbusto. Endémica. 500–2500 m.
Países: ARG(BAI, CHU, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 13081* (SI), *Pujalte, J. C. 1* (SI)].

Prosopis alpataco Phil. f. **rubra** F.A. Roig
Referencias: Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Roig, F. A., 1987b.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Roig, F. A. 223* (MERL)].

Prosopis alpataco Phil. var. **lamaro** F.A. Roig
Referencias: Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b; Steibel, P., 2001[2000].
Árbol. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(LPA, MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troiani, H. O. 9122* (SRFA)].

Prosopis argentina Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 0–2000 m.
Países: ARG(CAT, LRI, MEN, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 31244* (SI)].

Prosopis astringens Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Acacia atramentaria** Benth.
Referencias: Cialdella, A. M., 1984.

Prosopis atacamensis Phil. = **Prosopis alba** Griseb. var. **alba**
Referencias: Burkart, A., 1976; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Prosopis barbatigridis Stuck. = **Prosopis kuntzei** Harms
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976.

Prosopis benthami Chodat & Wilczek = **Prosopidastrum benthami** (Chodat & Hassl.) R.A. Palacios & Hoc
Referencias: Palacios, R. A. & Hoc, P. S., 2005.

Prosopis burkartii Muñoz
Referencias: Burkart, A., 1976; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(I).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Balboa, O. s.n.* (SI)].

Prosopis calden Monticelli, nom. nud. = **Prosopis caldenia** Burkart

Prosopis caldenia Burkart
Sin.: *Prosopis calden* Monticelli, nom. nud.
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Árbol. Endémica. 0–1200 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, MEN, RNE, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 300* (SI)].

Prosopis calingastana Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 2000–2500 m.
Países: ARG(SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Maqueda 5844* (SI)].

Prosopis campestris Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(COR, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Castellanos, A. 513* (SI)].

Prosopis campestris Griseb. var. *elata* Burkart = **Prosopis elata** (Burkart) Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996.

Prosopis casadensis Penz. = **Prosopis kuntzei** Harms
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976.

Prosopis castellanosii Burkart
Referencias: Burkart, A., 1941, 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 500–1500 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Gómez Sosa, E. V. 381* (SI)].

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **catamarcana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 500–2000 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, SAL, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sayago, M. 1965* (SI)].

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **chilensis**
Sin.: *Acacia siliquastrum* Cav. ex Lag., *Ceratonia chilensis* Molina, *Prosopis schinopoma* Stuck., *Prosopis siliquastrum* (Cav. ex Lag.) DC.
Referencias: Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Nativa. 500–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); CHL(III, IV, V, VI, RME); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 2383* (SI)]; CHL[*Looser, G. 4483* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 8387* (SI)].

Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **riojana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 1900–2100 m.
Países: ARG(CAT, LRI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Biurrun, F. 6794* (SI)].

Prosopis denudans Benth. var. **denudans**
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 500–1000 m.
Países: ARG(CHU, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 33273* (SI)].

Prosopis denudans Benth. var. **patagonica** (Speg.) Burkart
Sin.: *Prosopis patagonica* Speg.
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica. 800–1100 m.
Países: ARG(MEN, NEU, RNE, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 3232* (SI)].

Prosopis denudans Benth. var. **stenocarpa** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(CHU, LPA, SCR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 25681* (SI)].

Prosopis dulcis Kunth var. *australis* Benth. = **Prosopis nigra** (Griseb.) Hieron. var. **nigra**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis elata (Burkart) Burkart
Sin.: *Prosopis campestris* Griseb. var. *elata* Burkart
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–400 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Sayago, M. 1776* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2882* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 8423* (SI)].

Prosopis ephedroides Gillies ex Hook. & Arn. = **Mimosa ephedroides** (Gillies ex Hook. & Arn.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991; Burkart, A., 1976.

Prosopis ferox Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto o árbol. Nativa. 2000–4000 m.
Países: ARG(JUJ, SAL).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Taylor, C. M. 11231* (SI)].

Prosopis fiebrigii Harms
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(FOR); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Palacios, R. A. 484* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 1254* (G), *Pedersen, T. M. 4064* (G), *Rojas, T. 7727* (SI)].

Prosopis flexuosa DC. f. **flexuosa**
Sin.: *Acacia flexuosa* Lag., nom. illeg., *Prosopis alba* Griseb. f. *arborescens* Monticelli, nom. nud., *Prosopis juliflora* (Sw.) DC. f. *arborea* Hauman, nom. nud.
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Árbol. Nativa. 0–2200 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, LPA, LRI, MEN, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, II, III, IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Cabrera, A. 29707* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 455* (SI)].

Prosopis flexuosa DC. f. **subinermis** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Árbol. Endémica.
Países: ARG(BAI, LPA, SAL, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, J. H. 6451* (SI)].

Prosopis flexuosa DC. var. **depressa** F.A. Roig
Sin.: *Prosopis alba* Griseb. f. *fruticosa* (Hauman) Monticelli, *Prosopis juliflora* (Sw.) DC. f. *fruticosa* Hauman
Referencias: Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b; Steibel, P., 2001[2000].
Arbusto. Endémica. 1000 m.
Países: ARG(CHU, LPA, MEN, NEU, RNE, SJU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Steibel, P. 11285* (SRFA)].

Prosopis flexuosa DC. var. **fruticosa** (Meyen) F.A. Roig
Sin.: *Prosopis fruticosa* Meyen
Referencias: Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b; Steibel, P., 2001[2000]; Zöllner, O. & Nilo S., M., 1996a.
Arbusto. Nativa. 100–800 m.
Países: ARG(LPA, RNE); CHL(III, IV).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Steibel, P. 9021* (SRFA)]; CHL[*Wagenknecht, R. 26w* (SI)].

Prosopis fruticosa Meyen = **Prosopis flexuosa** DC. var. **fruticosa** (Meyen) F.A. Roig
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis globosa Gillies ex Hook. & Arn. = **Prosopidastrum globosum** (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Fortunato, R. H., 1984a.

Prosopis hassleri Harms var. **hassleri**
Referencias: Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, FOR, SFE); PRY(APY, CEN, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Palacios, R. A. 322* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2986* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 8450* (SI)].

Prosopis hassleri Harms var. **nigroides** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ragonese, A. E. 2423* (SI)];

Prosopis herzogii Harms = **Parapiptadenia excelsa** (Griseb.) Burkart

Prosopis humilis Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Arbusto. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, COR, LPA, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ezcurra, C. 516* (SI)].

Prosopis juliflora (Sw.) DC. f. *arborea* Hauman, nom. nud. = **Prosopis flexuosa** DC. f. **flexuosa**
Referencias: Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.

Prosopis juliflora (Sw.) DC. f. *fruticosa* Hauman = **Prosopis flexuosa** DC. var. **depressa** F.A. Roig
Referencias: Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.

Prosopis kuntzei Harms
Sin.: *Prosopis barbatigridis* Stuck., *Prosopis casadensis* Penz.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976, 1987a; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, LRI, SAL, SDE, SFE); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hurrell, J. A. 4905* (SI), *Venturi, S. 54822* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5404* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 8318* (SI)].

[Prosopis laevigata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.C. Johnst. var. andicola Burkart]
Referencias: Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Notas: Nombre dudoso.

Prosopis nandubey Lorentz ex Griseb. = **Prosopis affinis** Spreng.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. **longispina** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schulz, A. G. 1356* (SI)].

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. **nigra**
Sin.: *Prosopis algarrobilla* Griseb. var. *nigra* Griseb., *Prosopis dulcis* Kunth var. *australis* Benth.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Marchiori, J. N. C., Longhi-Wagner, H. M. & Galvão, L., 1983; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, LRI, SAL, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY, CEN, MIE, ÑEE, PAI, PHA); URY(ART, PAY, RNO, SAO, SOR).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 27959* (SI), *Pedersen, T. M. 13401* (CTES, SI)]; PRY[*Mereles, F. 4690* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 8314* (SI)]; URY[*Berro, M. B. 4363* (MVFA)].
Notas: Citada para Brasil sin indicar material de referencia.

Prosopis nigra (Griseb.) Hieron. var. **ragonesei** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1947, 1976; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(SFE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5933* (SI)].

Prosopis nuda Schinini
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Arenas, P. 1733* (SI), *Mereles, F. 3329* (FCQ)].

Prosopis panta (Griseb.) Hieron. = **Prosopis alba** Griseb. var. **panta** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1976, 1987a.

Prosopis patagonica Speg. = **Prosopis denudans** Benth. var. **patagonica** (Speg.) Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i.

Prosopis pugionata Burkart
Referencias: Burkart, A., 1949c, 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994.
Árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SJU, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Hunziker, A. T. 12255* (SI)].

Prosopis reptans Benth. var. **chilensis** Zoellner
Referencias: Zöllner, O. & Olivares, M. A., 2001.
Arbusto. Endémica.
Países: CHL(III).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Zoellner, O. 20883* (Herb. Zöllner)].

Prosopis reptans Benth. var. **reptans**
Sin.: *Prosopis abbreviata* Benth. var. *argentina* Griseb., *Strombocarpa reptans* (Benth.) A. Gray
Referencias: Burkart, A., 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COR, LRI, RNE, SDE, SFE, SJU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Piccinini, B. 1951* (BAB, SI)].

Prosopis rojasiana Burkart
Sin.: *Prosopis striata* Fiebrig & Rojas, hom. illeg.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1941, 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996.
Árbol. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Mereles, F. 5840* (CTES, FCQ), *Pedersen, T. M. 4171* (SI), *Rojas, T. 8310* (G)].

Prosopis rubiflora Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976.
Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APY, AMA, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5348* (G)].

Prosopis ruizleali Burkart
Referencias: Burkart, A., 1942a, 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Arbusto. Endémica. 1000–2000 m.
Países: ARG(LPA, MEN, NEU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Böcher, T. W. 1391* (SI)].

Prosopis ruscifolia Griseb.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SDE, SFE, TUC); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Venturi, S. 577* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 4682* (CTES, FCQ, MO), *Rojas, T. 8238* (SI)].

Prosopis schinopoma Stuck. = **Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **chilensis**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis sericantha Gillies ex Hook. & Arn.
Referencias: Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto o árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CAT, CHA, COR, FOR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC); PRY(APY).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Múlgura de Romero, M. E. 657* (SI), *Scarpa, G. F. 539* (SI)]; PRY[*Mereles, F. 5455* (FCQ), *Rojas, T. 7102a* (SI)].

Prosopis siliquastrum (Cav. ex Lag.) DC. = **Prosopis chilensis** (Molina) Stuntz emend. Burkart var. **chilensis**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis siliquastrum (Cav. ex Lag.) DC. var. *longisiliqua* Phil. = **Prosopis alba** Griseb. var. **alba**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis stenoloba Phil. = **Prosopis alpataco** Phil. f. **alpataco**
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis striata Benth. = **Prosopidastrum striatum** (Benth.) R.A. Palacios & Hoc

Prosopis striata Fiebrig & Rojas, hom. illeg. = **Prosopis rojasiana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976.

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. var. **ruiziana** Burkart
Referencias: Burkart, A., 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto. Endémica.
Países: ARG(MEN).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Ruíz Leal, R. A. 3787* (MERL, SI)].

Prosopis strombulifera (Lam.) Benth. var. **strombulifera**
Sin.: *Acacia strombulifera* (Lam.) Willd., *Mimosa circinalis* Cav., nom. illeg., *Mimosa strombulifera* Lam., *Spirolobium australe* Orb., *Strombocarpa strombulifera* (Lam.) A. Gray
Referencias: Burkart, A., 1976; Correa, M. N., 1984i; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005; Steibel, P. & Troiani, H. O., 2000[1999]b.
Arbusto. Nativa. 0–1600 m.
Países: ARG(BAI, CAT, COR, JUJ, LPA, LRI, MEN, NEU, RNE, SAL, SJU, SLU, TUC); CHL(I, III, IV, V, VI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 4268* (SI)]; CHL[*Werdermann, E. 932* (SI)].

Prosopis tamarugo Phil.
Referencias: Burkart, A., 1976; Marticorena, C. & Quezada, M., 1985.
Árbol. Endémica.
Países: CHL(I, II).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Muñoz-Pizarro, C. s.n.* (SI)].

Prosopis torquata (Cav. ex Lag.) DC.
Sin.: *Acacia torquata* Cav. ex Lag., *Prosopis adesmioides* Griseb., *Strombocarpa torquata* (Cav. ex Lag.) Hutch.
Referencias: Burkart, A., 1976; Gómez Sosa, E. V. & Palacios, R. A., 1994; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Arbusto o árbol. Endémica. 0–2500 m.
Países: ARG(CAT, COR, LRI, MEN, SAL, SDE, SJU, SLU, TUC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 5556* (BAB, SI), *Nicora, E. G. 9176* (SI)].

Prosopis vinalillo Stuck.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1976; Degen, R. & Mereles, F., 1996; Palacios, R. A. & Brizuela, M. M., 2005.
Árbol. Endémica. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COR, FOR, SAL, SDE, TUC); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*López 4* (SI)]; PRY[*Degen, R. 2853* (FCQ), *Rojas, T. 8235* (SI)].

Pseudocassia spectabilis (DC.) Britton & Rose = **Senna spectabilis** (DC.) H.S. Irwin & Barneby
Referencias: Bernardi, L., 1984; Irwin, H. S. & Barneby, R. C., 1982.

Pseudopiptadenia Rauschert

Número de especies: 1

Pseudopiptadenia warmingii (Benth.) G.P. Lewis & M.P. Lima
Sin.: *Mimosa warmingii* Benth., *Newtonia glaziovii* (Harms) Burkart, *Newtonia warmingii* (Benth.) G.P. Lewis, *Piptadenia glaziovii* Harms
Referencias: Burkart, A., 1969c, 1979b; Lewis, G. P. & Lima, M. P. M., 1991.
Árbol. Nativa. 0–300 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Reitz, P. R. 4594* (HBR, SI)].

Psoralea L.

Número de especies: 1 introducida

Psoralea azurea Phil. = **Dalea azurea** (Phil.) Reiche

Psoralea glandulosa L. = **Otholobium glandulosum** (L.) J.W. Grimes
Referencias: Grimes, J. W., 1990; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.

Psoralea higuerilla Gillies ex Hook. = **Otholobium higuerilla** (Gillies ex Hook.) J.W. Grimes
Referencias: Grimes, J. W., 1990.

Psoralea lasiostachys Vogel = **Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes

Psoralea leporina Aiton = **Dalea leporina** (Aiton) Bullock
Referencias: Gómez Sosa, E. V., 2000b.

Psoralea monosperma (Griseb.) J.F. Macbr. = **Otholobium higuerilla** (Gillies ex Hook.) J.W. Grimes
Referencias: Grimes, J. W., 1990; Gómez Sosa, E. V., 1992.

Psoralea multifoliolata Clos = **Errazurizia multifoliolata** (Clos) I.M. Johnst.

Psoralea pinnata L. var. **speciosa** Harv.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Arbusto. Introducida. 0–100 m.
Países: URY(MON, ROC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Brescia, R. s.n.* (MVFA)].

Psoralea pubescens Poir. = **Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes
Referencias: Marticorena, C. & Quezada, M., 1991.

Psoralea pubescens Poir. var. *lasiostachys* (Vogel) J.F. Macbr. = **Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes

Psoralea remotiflora J.F. Macbr. = **Otholobium pubescens** (Poir.) J.W. Grimes

Psoralea tetraphylla Poir. = **Poiretia tetraphylla** (Poir.) Burkart
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Rudd, V. E., 1972b.

Pterocarpus Jacq.
Número de especies: 2

Pterocarpus amazonicus Huber = **Pterocarpus santalinoides** L'Hér. ex DC.

Pterocarpus cultratus Vell. = **Lonchocarpus cultratus** (Vell.) Tozzi & H.C. Lima
Referencias: Engel Neubert, E. & Miotto, S. T. S., 1996.

Pterocarpus ecastaphyllum (L.) L. = **Dalbergia ecastaphyllum** (L.) Taub.

Pterocarpus frutescens Vell. = **Dalbergia frutescens** (Vell.) Britton
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Carvalho, A. M. V., 1997.

Pterocarpus grandis R.S. Cowan = **Pterocarpus santalinoides** L'Hér. ex DC.

Pterocarpus michelii Britton = **Pterocarpus santalinoides** L'Hér. ex DC.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Rojo, J. P., 1972.

Pterocarpus rohrii Vahl
Referencias: Camargo, R. A., 2005; Rojo, J. P., 1972.
Árbol. Nativa. 0–1000 m.
Países: BRA(PAR, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 46656* (FLOR)].

Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC.
Sin.: *Pterocarpus amazonicus* Huber, *Pterocarpus grandis* R.S. Cowan, *Pterocarpus michelii* Britton
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, FOR); PRY(APY, CEN, CON).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Jörgensen, P. 2707* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2123* (SI), *Rojas, T. 478* (G)].

Pterogyne Tul.
Número de especies: 1

Pterogyne nitens Tul.
Sin.: *Pterogyne nitens* Tul. f. *parvifolia* Chodat & Hassl.
Referencias: Bernardi, L., 1984; Burkart, A., 1952a; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003; Ulibarri, E. A., 1997a.
Árbol. Nativa. 0–1500 m.
Países: ARG(CHA, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, AMA, CAU, CAN, CEN, COA, PAI); URY(SAO).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Scarpa, G. F. 439* (SI)]; BRA[*Pastore, U. 46* (FLOR, HBR)]; PRY[*Hassler, E. 152* (SI), *Zardini, E. M. 5642* (FCQ, MO)]; URY[*Speroni 29309* (MVFA)].

Pterogyne nitens Tul. f. *parvifolia* Chodat & Hassl. = **Pterogyne nitens** Tul.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 2003.

Ramorinoa Speg.
Número de especies: 1 endémica

Ramorinoa girolae Speg.
Referencias: Burkart, A., 1952a; Gómez Sosa, E. V., 1994.
Arbusto. Endémica. 1400–2600 m.
Países: ARG(LRI, SJU, SLU).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Kiesling, R. 3074* (SI)].

Reichardia decapetala Roth = **Caesalpinia decapetala** (Roth) Alston

Rhadinocarpus brasiliensis Vogel = **Chaetocalyx brasiliensis** (Vogel) Benth.
Referencias: Rudd, V. E., 1958.

Rhynchosia Lour.
Número de especies: 21, 5 endémicas

Rhynchosia angustifolia A. Gray = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.

Rhynchosia apoloensis (Rusby) J.F. Macbr. = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1983.

Rhynchosia arenicola Hassl.
Sin.: *Rhynchosia arenicola* Hassl. var. *mayor* Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR); PRY(CAU, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Morrone, O. 1047* (SI), *Xifreda, C. C. 512* (SI), *Zuloaga, F. O. 6474* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 2577* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 9565* (BM, G, K, NY, P)].

Rhynchosia arenicola Hassl. var. *mayor* Hassl. = **Rhynchosia arenicola** Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia balansae Micheli var. **balansae**
Sin.: *Dolicholus balansae* (Micheli) Kuntze, *Rhynchosia hagenbeckii* Harms, *Rhynchosia hassleriana* Chodat, *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f. *balansae* (Micheli) Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); PRY(AMA, CEN, CON, COA, GUA, PAI, SPE); URY(MON).

Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 6744* (SI), *Fortunato, R. H. 8024* (BAB, SI)]; PRY[*Pedersen, T. M. 9448* (SI)]; URY[*Fruchard, M. 1022* (P)].

Rhynchosia balansae Micheli var. **psilantha** Fortunato
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS); PRY(CEN, ITA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Schinini, A. 13037* (CTES), *Tressens, S. G. 649* (SI)]; PRY[*Bertoni, M. S. 1037* (LP)].

Rhynchosia burkartii Fortunato
Referencias: Degen, R. & Mereles, F., 1996; Fortunato, R. H., 1983.
Hierba. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, SAL); PRY(APY, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Correa, M. N. 7662* (BAB)]; PRY[*Mereles, F. 4123* (FCQ), *Schinini, A. 15106* (SI)].

Rhynchosia caaguazuensis Hassl.
Referencias: Grear, J. W., 1978.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAU).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Krapovickas, A. 12574* (SI), *Rojas, T. 4181* (SI)].

Rhynchosia clausseni Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1978.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(CAN, SPE).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5315* (BM, F, G, GH, K, NY, P, S, UC)].

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth.
Sin.: *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth. f. *glabrior* Chodat & Hassl., *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth. var. *discolor* Chodat & Hassl., *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth. var. *erecta* Micheli, *Rhynchosia corylifolia* Mart. ex Benth. var. *orbiculata* Chodat & Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia reticulata* (Sw.) DC. f. *subumbellata* Chodat & Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, CAA, CAN, CEN, CON, COA, GUA, ITA, MIE, ÑEE, PAI, PHA, SPE); URY(ART, CLA, MAL, MON, RIV, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Xifreda, C. C. 364* (SI), *Zuloaga, F. O. 4898* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 12819* (SI)]; PRY[*Hassler, E. 4655* (BM), *Pedersen, T. M. 8660* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 2797b* (SI)].

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth. f. *glabrior* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth. var. *discolor* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth. var. *erecta* Micheli = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Rhynchosia corylifolia Mart. ex Benth. var. *orbiculata* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Rhynchosia crinita (Kunth) DC. = **Eriosema crinitum** (Kunth) G. Don var. **crinitum**

Rhynchosia diversifolia Micheli var. **diversifolia**
Sin.: *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. emend. Griseb., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. f. *genuina* Hassl., nom. inval., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. f. *glabrata* Hassl., *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. var. *diversifolia* (Micheli) Hassl.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(COA, MIE, PAI); URY(ART, CAS, CLA, COL, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14489* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10607* (SI)]; PRY[*Balansa, B. 1508* (SI), *Rojas, T. 13449* (SI)]; URY[*Izaguirre, P. 19140* (MVFA)].

Rhynchosia diversifolia Micheli var. **prostrata** Burkart
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, SFE, SLU); BRA(RGS); URY(ART, CLA, COL, FLO, FLA, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Bacigalupo, N. M. 1562* (SI), *Najera, M. 29* (SI)]; BRA[*Mobrdieck 1* (SI), *Rambo, B. 3916* (SI)]; URY[*Rosengurtt, B. 1441e* (MVFA), *Rosengurtt, B. 751b* (SI)].

Rhynchosia edensis Izag. & Beyhaut
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–200 m.
Países: URY(MAL, TAC).
Ejemplares de Referencia: URY[*Izaguirre, P. 19896* (MVFA)].

Rhynchosia edulis Griseb.
Sin.: *Dolicholus apoloensis* Rusby, *Dolicholus melanostictus* (Griseb.) Kuntze, *Eriosema edule* (Griseb.) Burkart, *Eriosema volubile* Micheli, *Eriosema volubile* Micheli f. *pube-densiore* Chodat & Hassl., *Rhynchosia apoloensis* (Rusby) J.F. Macbr., *Rhynchosia melanosticta* Griseb., *Rhynchosia pinetorum* Standl.

Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(CHA, COR, COS, ERI, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, SLU); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APY, CAU, CAA, CEN, CON, COA, GUA, MIE, PAI).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Lorentz, P. G. 1202* (B, K), *Lorentz, P. G. 351* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 21128* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2929* (SI)].

Rhynchosia hagenbeckii Harms = **Rhynchosia balansae** Micheli var. **balansae**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.

Rhynchosia hassleriana Chodat = **Rhynchosia balansae** Micheli var. **balansae**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.

Rhynchosia hauthalii Harms ex Kuntze
Sin.: *Dolicholus hauthalii* (Harms) Kuntze, *Eriosema rotundifolium* Micheli, *Eriosema rotundifolium* Micheli var. *macrophyllum* Chodat & Hassl., *Rhynchosia uruguaya* Arechav.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988.
Hierba. Perenne. Nativa. 400–500 m.
Países: ARG(COS, MIS, SFE); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, CAU, CAN, COA, GUA, MIE, PAI); URY(RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 15436* (SI), *Cabrera, A. L. 28439* (SI)]; BRA[*Rambo, B. 37906* (LIL)]; PRY[*Burkart, A. 18254* (SI), *Hassler, E. 5496* (BM)]; URY[*Berro, M. B. 4624* (MVFA)].

Rhynchosia ituana Hoehne = **Rhynchosia rojasii** Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia lateritia Burkart
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966.
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(RGS); PRY(PAI); URY(CLA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 14356* (SI), *Guaglianone, E. R. 830* (SI)]; BRA[*Barreto, I. L. 956* (SI), *Rambo, B. 40391* (LIL)]; PRY[*Montes, J. E. 12969* (LP)]; URY[*Rosengurtt, B. 4685pe* (MVFA)].

Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth.
Sin.: *Arcyphyllum leucophyllum* Benth., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth. f. *elliptica* Chodat & Hassl., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth. f. *laxifolia* Chodat & Hassl., *Rhynchosia leucophylla* (Benth.) Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl.
Referencias: Grear, J. W., 1978; Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C., 2000.
Hierba, subarbusto o enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(APA, AMA, CAU, CAA, CAN, CON).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5621* (BM, G, K, NY, P), *Rojas, T. 6477* (SI)].

Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth. f. *elliptica* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia leucophylla** (Benth.) Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth. f. *laxifolia* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia leucophylla** (Benth.) Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia leucophylla (Benth.) Benth. f. *pubescens* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia leucophylla** (Benth.) Benth.
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia lineata Benth.
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966; Troncoso, N. S. & Bacigalupo, N. M., 1977.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(COS, ERI, MIS); BRA(RGS, SCA); PRY(APA); URY(ART, CLA, DUR, PAY, RNO, RIV, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 30875* (SI)]; BRA[*Araujo, A. C. 182* (SI), *Rambo, B. 3860* (SI)]; PRY[*Montes, J. E. s.n.* (LP)]; URY[*Cabrera, A. L. 32380* (SI), *Del Puerto, O. 3554* (MVFA)].

Rhynchosia melanocarpa Grear
Sin.: *Rhynchosia phaseoloides* (Sw.) DC. var. *erecta* Micheli
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.
Hierba o enredadera. Perenne. Nativa. 200–1500 m.
Países: ARG(MIS); BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(APA, CAU, COA, GUA, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Grüner, G. 25* (SI), *Keller, H. A. 56* (CTES, SI)]; BRA[*Labourian, M. 71* (SI)]; PRY[*Fiebrig, K. A. G. 5835* (SI)].

Rhynchosia melanosticta Griseb. = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

[Rhynchosia mendocinensis Gillies ex Hook.]
Referencias: Grear, J. W., 1978.
Notas: Nombre dudoso. Probablemente pertenezca al género *Galactia*.

Rhynchosia mexicana Hook. & Arn. = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia minima (L.) DC.
Sin.: *Dolicholus minimus* L., *Glycine lamarckii* Kunth, *Glycine littoralis* Vahl ex DC., *Glycine reflexa* Nutt., *Rhynchosia mexicana* Hook. & Arn., *Rhynchosia minima* (L.) DC. var. *pauciflora* Kuntze, *Rhynchosia punctata* DC.
Referencias: Burkart, A., 1942a; Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Pensiero, J. F. & Gutiérrez, H. F., 2005.

Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(CHA, COS, FOR, JUJ, MIS, SAL, SFE, TUC); CHL(I); PRY(APY, CON, PHA).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Guaglianone, E. R. 1198* (SI), *Pozner, R. 475* (CTES, SI)]; CHL[*Zoellner, O. 4935* (SI)]; PRY[*Pavetti, C. V. M. 10544* (SI), *Schinini, A. 16595* (CTES, SI)].

Rhynchosia minima (L.) DC. var. *pauciflora* Kuntze = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia monosperma Griseb. = **Otholobium higuerilla** (Gillies ex Hook.) J.W. Grimes
Referencias: Grimes, J. W., 1990.

Rhynchosia naineckensis Fortunato
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 1999; Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M., 1994; Fortunato, R. H., 1983.
Enredadera. Nativa. 0–1000 m.
Países: ARG(COS, FOR, JUJ, SAL); PRY(AMA, CEN, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Fortunato, R. H. 57* (BAB), *Meyer, T. 8869* (SI)]; PRY[*Fortunato, R. H. 1139* (BAB, SI), *Zardini, E. M. 5637* (FCQ, MO)].

Rhynchosia pallida Micheli
Sin.: *Rhynchosia schomburgkii* auct. non Benth., *Rhynchosia schomburgkii* Benth. f. *pallida* (Micheli) Hassl.
Referencias: Grear, J. W., 1978.
Hierba o subarbusto. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: PRY(PAI).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Balansa, B. 1511* (K, P)].

Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.
Sin.: *Dolicholus phaseoloides* (Sw.) Kuntze, *Glycine phaseoloides* Sw.
Referencias: Fortunato, R. H., 2000; Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988; Rambo, B., 1966.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA); PRY(CAN, PAI, SPE).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Kummrow, R. 707* (MBM, TRT)]; PRY[*Gentry, A. 59292* (BAB)].

Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC. var. *erecta* Micheli = **Rhynchosia melanocarpa** Grear
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia pinetorum Standl. = **Rhynchosia edulis** Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia punctata DC. = **Rhynchosia minima** (L.) DC.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f. *balansae* (Micheli) Hassl. = **Rhynchosia balansae** Micheli var. **balansae**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f. *oblongifolia* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f. *ovalifolia* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. f. *subumbellata* Chodat & Hassl. = **Rhynchosia corylifolia** Mart. ex Benth.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

[Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var. brevipetiolata Chodat & Hassl.]
Referencias: Fortunato, R. H., 1983.
Notas: Nombre dudoso, probable híbrido entre *Rhynchosia corylifolia* y *R. lineata*.

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var. **kuntzei** (Harms ex Kuntze) Grear
Sin.: *Dolicholus kuntzei* Harms ex Kuntze
Referencias: Grear, J. W., 1978.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–800 m.
Países: BRA(PAR).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Dusén, P. K. H. 15885* (F, G, MO, PH, S)].

Rhynchosia reticulata (Sw.) DC. var. **reticulata**
Sin.: *Dolicholus reticulatus* (Sw.) Millsp., *Glycine reticulata* Sw.
Referencias: Grear, J. W., 1978.
Nativa. 0–500 m.
Países: URY(MON).
Ejemplares de Referencia: URY[*Ewernberg 311* (P)].
Notas: En el mapa de distribución dado por Grear (1978) para esta especie, se indica su presencia en Paraná, Brasil, pero no está citada en el texto.

Rhynchosia rojasii Hassl.
Sin.: *Rhynchosia ituana* Hoehne
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Miotto, S. T. S., 1988.
Enredadera. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(COS, MIS); BRA(PAR, RGS); PRY(APA, AMA, CAU, GUA, ÑEE).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Montes, J. E. 367* (SI)]; BRA[*Hatschbach, G. 10103* (LIL, SI)]; PRY[*Rojas, T. 10424* (BAB, BAF, LIL, SI), *Rojas, T. 5814* (SI)].

Rhynchosia schomburgkii auct. non Benth. = **Rhynchosia pallida** Micheli
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia schomburgkii Benth. f. *pallida* (Micheli) Hassl. = **Rhynchosia pallida** Micheli
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. emend. Griseb. = **Rhynchosia diversifolia** Micheli var. **diversifolia**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. f. *genuina* Hassl., nom. inval. = **Rhynchosia diversifolia** Micheli var. **diversifolia**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. f. *glabrata* Hassl. = **Rhynchosia diversifolia** Micheli var. **diversifolia**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. f. *minor* Griseb. = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **senna**
Referencias: Burkart, A., 1987a; Fortunato, R. H., 1983.

Rhynchosia senna Gillies & Hook. var. *angustifolia* (A. Gray) Grear = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. *cordobensis* (Griseb.) Burkart = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. *diversifolia* (Micheli) Hassl. = **Rhynchosia diversifolia** Micheli var. **diversifolia**
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. **senna**
Sin.: *Dolicholus senna* (Gillies ex Hook.) Kuntze, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. f. *minor* Griseb.
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Gómez Sosa, E. V., 1994; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Miotto, S. T. S., 1988; Steibel, P., 2001[2000].
Hierba. Perenne. Endémica. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CHA, COR, COS, ERI, JUJ, LPA, MIS, SAL, SDE, SFE, SLU, TUC); BRA(RGS); URY(ART, CLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, SJO, SOR, TAC).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Troncoso, N. S. 3830* (SI), *Zuloaga, F. O. 7456* (SI)]; BRA[*Freitas da Silva, M. 16* (SI)]; URY[*Marchesi, E. 10154* (MVFA), *Rosengurtt, B. 1056b* (MVFA, SI)].

Rhynchosia senna Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Sin.: *Dolicholus angustifolius* (A. Gray) Kuntze, *Rhynchosia angustifolia* A. Gray, *Rhynchosia senna* Gillies & Hook. var. *angustifolia* (A. Gray) Grear, *Rhynchosia senna* Gillies ex Hook. var. *cordobensis* (Griseb.) Burkart, *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray, *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray f. *cordobensis* Griseb., *Rhynchosia texana* Torr. & A. Gray var. *microphylla* Hassl.
Referencias: Fortunato, R. H., 2000; Johnston, M. C., 1984.
Hierba o subarbusto. Perenne. Nativa. 0–500 m.
Países: ARG(BAI, CAT, CHA, COR, COS, ERI, LPA, LRI, SDE, SFE, SJU, SLU, TUC); BRA(RGS); PRY(APY); URY(CLA, COL, DUR, FLA, LAV, MAL, MON, PAY, RNO, RIV, ROC, SAO, TAC, TYT).
Ejemplares de Referencia: ARG[*Burkart, A. 5669* (SI), *Troncoso, N. S. 3280* (BAB, SI)]; BRA[*Rambo, B. 35052* (SI)]; PRY[*Rojas, T. 2117* (MVM)]; URY[*Fruchard, M. s.n.* (SI), *Izaguirre, P. 19078* (MVFA)].

Rhynchosia sericea Gillies ex Hook. & Arn., hom. illeg. = **Galactia glaucophylla** Harms
Referencias: Burkart, A., 1971.

Rhynchosia simplicifolia (Kunth) DC. = **Eriosema simplicifolium** (Kunth) G. Don

Rhynchosia texana Torr. & A. Gray = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Referencias: Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Rhynchosia texana Torr. & A. Gray f. *cordobensis* Griseb. = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Referencias: Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Rhynchosia texana Torr. & A. Gray var. *microphylla* Hassl. = **Rhynchosia senna** Gillies ex Hook. var. **texana** (Torr. & A. Gray) M.C. Johnst.
Referencias: Grear, J. W., 1978.

Rhynchosia uruguaya Arechav. = **Rhynchosia hauthalii** Harms ex Kuntze
Referencias: Fortunato, R. H., 1983; Grear, J. W., 1978; Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998.

Riedeliella Harms

Número de especies: 1

Riedeliella graciliflora Harms
Sin.: *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms, *Riedeliella hassleri* (Chodat) Harms var. *glabrescens* (Chodat) Harms, *Sweetiopsis hassleri* Chodat, *Sweetiopsis hassleri* Chodat var. *glabrescens* Chodat
Referencias: Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N., 2002; Lima, H. C. & Vaz, A. M. S. F., 1984.
Arbusto. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CAN).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 7998* (MO)].

Riedeliella hassleri (Chodat) Harms = **Riedeliella graciliflora** Harms
Referencias: Lima, H. C. & Vaz, A. M. S. F., 1984.

Riedeliella hassleri (Chodat) Harms var. *glabrescens* (Chodat) Harms = **Riedeliella graciliflora** Harms
Referencias: Lima, H. C. & Vaz, A. M. S. F., 1984.

Robinia L.

Número de especies: 1 introducida

Robinia pseudoacacia L.
Referencias: Izaguirre, P. & Beyhaut, R., 1998; Matthei, O. R., 1995b.
Árbol. Introducida. 0–1000 m.
Países: CHL(V, VI, VIII, RME); URY(CAS, MAL, MON).
Ejemplares de Referencia: CHL[*Gunckel, L. H. 18867* (CONC)]; URY[*Izaguirre, P. 24206* (MVFA)].

Robinia striata Willd. = **Geoffraea spinosa** Jacq.
Referencias: Ireland, H. & Pennington, R. T., 1999.

Rudolphia dubia Kunth = **Centrosema sagittatum** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Brandegee ex L. Riley
Referencias: Barbosa, V. P., 1977.

Samanea Merr.

Número de especies: 1

Samanea saman auct. non (Jacq.) Merr. = **Samanea tubulosa** (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984.

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Sin.: *Calliandra tubulosa* Benth., *Samanea saman* auct. non (Jacq.) Merr.
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996; Bernardi, L., 1984.
Árbol. Nativa. 0–500 m.
Países: PRY(AMA, CON, COA).
Ejemplares de Referencia: PRY[*Hassler, E. 5406* (G)].

Sarothamnus scoparius (L.) Koch = **Cytisus scoparius** (L.) Link

Schizolobium Vogel

Número de especies: 1

Schizolobium excelsum Vogel = **Schizolobium parahyba** (Vell.) S.F. Blake
Referencias: Rambo, B., 1966.

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake
Sin.: *Cassia parahyba* Vell., *Schizolobium excelsum* Vogel
Referencias: Barneby, R. C., 1996; Rambo, B., 1966.
Árbol. Nativa. 0–400 m.
Países: BRA(PAR, RGS, SCA).
Ejemplares de Referencia: BRA[*Hatschbach, G. 1511* (PACA, SI)].

Schnella microstachya Raddi = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Schnella microstachya Raddi var. *bahiensis* (Bong.) A. Schmitz = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Schnella spicata (Vogel) A. Schmitz = **Bauhinia microstachya** (Raddi) J.F. Macbr.
Referencias: Fortunato, R. H., 1986.

Schranckiastrum insigne Hassl. = **Mimosa insignis** (Hassl.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Schrankia argentinensis Burkart = **Mimosa quadrivalvis** L. var. **leptocarpa** (DC.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Schrankia brachycarpa Benth. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Schrankia leptocarpa DC. = **Mimosa quadrivalvis** L. var. **leptocarpa** (DC.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Schrankia macrostachya Benth. = **Mimosa invisa** Mart. ex Colla var. **macrostachya** (Benth.) Barneby
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Schrankia pilosa (Sternb.) J.F. Macbr. = **Mimosa diplotricha** C. Wright ex Sauvalle
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Schrankia selloi Benth. = **Mimosa selloi** (Benth.) Benth.
Referencias: Barneby, R. C., 1991.

Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. = **Tachigali aurea** Tul.

Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. var. *polyphyllum* Hassl. = **Tachigali aurea** Tul.

Sclerolobium aureum (Tul.) Benth. var. *velutinum* Benth. = **Tachigali aurea** Tul.

Sclerolobium denudatum Vogel = **Tachigali denudata** (Vogel) Oliveira-Filho

Scytalis helicopus E. Mey. = **Vigna luteola** (Jacq.) Benth.
Referencias: Verdcourt, B., 1970.

Sebipira major Mart. = **Bowdichia virgilioides** Kunth f. **major** (Mart.) Yakovlev

Secula hystrix (Poir.) Small = **Aeschynomene histrix** Poir. var. **histrix**

Secula viscidula (Michx.) Small = **Aeschynomene viscidula** Michx.
Referencias: Rudd, V. E., 1959.

Senegalia guacamayo Britton & Killip = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Senegalia liebmannii Britton & Rose = **Albizia niopoides** (Spruce ex Benth.) Burkart
Referencias: Barneby, R. C. & Grimes, J. W., 1996.

Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose ex Britton & Killip = **Acacia polyphylla** DC.

FABACEAE (continúa en el Volumen 3)

BOLIVIA
REGIÓN CENTRAL-OESTE
BRASIL
(Central-Western Brazil)
PARAGUAY
SUR DE
BRASIL
(Southern
Brazil)
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
20º
30º
40º
50º
80º
70º
60º
50º
40º
Área del Proyecto: Países
Project Area: Countries
0 1000 2000km
N
O
E
S

Missouri Botanical Garden Library
3 1753 00356 3340

Missouri Botanical Garden

IBODA
CONICET
ANCEFN

ISBN 978-1-930723-75-7

978-1-930723-75-7 (Volumen 2)
978-1-930723-70-2 (Obra completa)